

A. Stazzo



EPITOME ET RE-
CISCO A BO-
PIENSI EPISCO-
patrono suo, &
pnlis,
GALENI P
GAMENI OPERUM, IN Q.

TUOR PARTES DIGESTA, PULCHER-
RIMA METHODO UNIVERSAM ILLIUS VIRI DO-
ctrinam complectens: per Dn. ANDREAM LACUNAM Secobiensem, Equitem
auratum, & Medicum longè excellentissimum, summa
fide studioq; collecta.

ACCESSERVNT EIVSDEM AND. LA-
CVNAE ANNOTATIONES IN GALENI INTERPRETES:
quibus varij loci, in quos hactenus impegerunt lectores, & explicantur

Et summa fide restituntur.
Carolus Gul. de Meis, et Gul. de Meis?
Johannes TEM, Andreas, J. J. J.

De ponderibus & mensuris medicinalibus utilis Commentarius!

Index rerum & verborum maxime memorabilium copiosissimus.

Editio Postrema prioribus multò castigatior atq; correctior.

Ex Libr. Hieronymi Blagden M. D. Prof. Calverani.
1794.




Strasbourg.
ARGENTORATI,

Sumptibus Lazari Zetzneri Bibliopola.

M. DC. IV.

63

3 VI - 2



ILLUSTRISSIMO ET RE-
VERENDISSIMO D. D. FRANCISCO A BO-
VADILLA ET MENDOZZA, CAURIENSI EPISCO-

po, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ Senatori vigilantissimo, Patrono suo, &

optimo Mecœnati, ANDREAS LACUNA Secobiensis,

Doctor, Medicus, Miles S. Petri,

S. P. D.



EROSTRATVM ILLVM INSOLENTISSIMVM
haud immeritò infamant, conviciſq; proſcindunt litera, Pater ampliſ-
ſime, quòd combuſſerit antiquiſſimum illud ac celeberrimum Epheſi Dia-
na delubrum: idquæ non odio aliquo in Deam ipſam accenſus, ſed ut
tantum memoriam ſui, poſteritati relinqueret: quæ ſanè vel hodie vi-
get, piacularis tamen, & flagitioſa, nimirum qualis fuit ille. Siquidem
ſi non aliud, ac certè veriſimile eſt, nebulonem illum fuiſſe caduci, vilis

atque deiecti animi: qui cum potuiſſet optimis inſtitutis & artibus inſervare mortalium genus,
ſimulquæ immortalẽ ſe reddere, maluerit tamen facinus tam indignum perpetrans, omni-
bus innotescere, famamquæ ſibi eam conciliare, quam præſtituiſſet illi ſi conſecutus non fuiſſet.
Contra verò fecerunt veteres illi patres, philoſophiq; graviſſimi, bonorum nobis omnium au-
thores, qui ob admirandam illam ſapientiam ſuam, ſtrenuequæ in communem uſum nava-
tam operam, hodie celebrantur ab uniſverſis, atque inter divos relati ſunt. In quibus illi,
mea quidem ſententia, ſumma laude videntur digni, qui arti Medicæ, totius humani gene-
ris tutrici, conſervatriciquæ, ſummo ſtudio incubuerunt, eamq; opibus & facultatibus ſuis
auxerunt, atque locupletarunt: cuius porrò inventionem Græci fere uniſverſi, in Deos ipſos
atque illorum amicos, referunt. Tradunt quippe Aſculapium ab Apolline patre inſtitutum,
filios ſuos poſtea Medicinam docuiſſe, atque in hunc modum artem ipſam cæptam divinis au-
ſpiciis, ſucceſſione quadam hereditaria, à parentibus propagatam ſemper in libros, ad Hippo-
cratem uſque (qui oriundus etiam ab Aſculapio fuit) perveniſſe. Cautum ſiquidem erat in
illa Aſclepiadarum familia, ne quis artem & induſtriam medendi, poſſeſſionem planè divi-
nam, à Deoq; ſolis ipſis conſeſſam, cuiſpiam communem faceret, qui ab eodem non eſſet gene-
re exortus. Id quod fuiſſe in cauſa, videtur, ut peritos artis illius, τῶν ἰατρῶν παῖδας, hoc
eſt, filios Medicorum, Græci ſemper vocarint: ac ſi fieri ullo modo non poſſet, ut legitime quiſ-
piam Medicinam profiteretur, quam minimè à genitoribus ſuis accepſſet. Nec perperam
quidem illi, iudicio meo, faciſſabant: quandoquidem vel optimà quæq; inſtituta vileſcunt,
& dilabuntur, variſq; ſiunt obnoxia adulteriis, dum circa delectum ullum ab omnibus
profanantur: multoq; aptiores ad quamcunque artem capeſſendam, exercendamquæ, ſunt
ij, qui à parentibus ſuis, unà cum generationis primordiis contradixerunt quandam veluti
inclinationem, propenſionemq; in eam ipſam artem, cui poſtea indulſerunt: quàm quibus na-
tura & mens, ob diverſam genituram, ad contraria inclinatur. Quare ſapè ſoleo admirari,
cum ad cudenda numiſmata Principes admittant tantum eos viros, qui & ingenui ſunt, &
indutriæ, moribusquæ integerrimis præditi: cur ad conſervandam inſtaurandamq; ſalutem
hominum (quæ quibuſvis gemmis & margaritis longè preſcioſior eſt) ut deligant quidem in-
culpatiffima ingenia, eiſq; ſolis provinciam adeò periculoſam committant: abigant autem
illos à tam ſacro & heroico munere, qui ad aurigandum vel remigandum ſunt, potius quàm
ad medendum, aptiores, non ſint æquè ſoliciti. Hoc ſiquidem maximè ſua ipſorum intererat.
Ut igitur ad Hippocratem redeam, ille, omnium primus artem Medicam rationali methodo
condidit, nobiſq; volumina octoginta reliquit, quæ incomparabilem doctrinam eiſ, vitæq;
innocentiam, teſtantur. Eum poſtea ſecuti ſunt Diocles Cariftius, Praxagoras, Chryſippus
ſophiſta, Eraſiſtratusq; ex filia Ariſtoteliſ genitus: qui antiſtites Rationalis ſectæ extiterunt.
Nam ſub Philino Coo, eodem fere tempore, factio Empiricorum eſt orta: cuius fautores fue-
runt Serapion Alexandrinus, Apollonius Antiochenus, & Menodotus. Qui ſanè diſidebant
à Rationalibus, quod illi quidẽ ratione ſimul & experientia uterentur ad inveſtiganda præ-
ſidia, morbis ipſis congruentia: hi autem ſolo uſu contenti eſſent, eorum quæ aliàs obſerva-
verant. Ab utriſque receſſerunt ex æquo Methodici nuncupati, cauſarum abditarum inda-
ginem (quas Logici ſummo ſtudio explorabant) reſpuentes: nec tribuentes quicquam expe-
rimentis particularibus, quibus nitebantur Empirici. Reducebant autem hi, ut omnes par-
ticulares affectus ad generales duos, nempe ſtriſtum & laxum: ſic uniſverſas curationes

EPISTOLA DEDICATORIA.

ipforum, ad duas similiter: astrictiorem videlicet eorum quæ laxa essent, & relaxationem illorum quæ astricta. Auspicia huic sectæ dedit Themison Laodiceus: absolvit autem eam Thessalus ille Trallianus, qui pollicebatur se edoctrum artem ipsam accuratissimè, vel sex mensibus tantum. Post quos omnes tandem Galenus secutus, Medicinam in tot sectas divulsam, laceramq;, suæ integritati atque nitore restituit: explodens quidem omnia perversa dogmata, quæ grassabantur suo tempore, diramq;, exercebant tyrannidem: revocans autem Hippocraticam rationem medendi, quæ iam plus quàm sexcentos annos sepulta fuerat, eamq; & explanans, & validissimis rationibus roborans. Cuius viri doctrina & methodus, ob dulcedinē insitam, atq; sublimitatem, adeò allicit omnium studiosorum animos, ut qui semel illam gustarit, amplius abstinere ab ipsa non possit. Caterum cum ob crebras digressiones, quas facit, dum pravas opiniones aliquantulum morose refellit, nonnulli quibus cordi est brevitās, à lectione illius deterrentur: rem non minus gratam, quàm utilem universis, me facturum existimaui, si omnia Galeni opera in Epitomen succinctam redigerem, excutiens quidem illa, quæ nihil succi in se haberent, colligens verò reliqua, ex quibus tota ars constaret. Quod hercle institutum meum mirum in modum promovit, ac veluti concalfecit clarissimus & ornatissimus vir, amplitudinisque tuæ amantissimus, Ioannes Aquilerius, Medicus Pontificius: qui quidem quo fervet sapientiæ incredibili amore, nunquam desistit me hortari, monere, instigare, & (ut ingenuè fatear) cogere, donec ad laborem me accinxi. Quam provinciam difficilem, ac meis humeris imparem, equidem vix suscepissem, nisi ille institisset tanta vehementia. Quantum verò laboris exhausserim, dum huic saxovolvendo incumbo, nemo æquè novit ac tua Celsitudo, Antistes reverendiss. sub cuius umbra & auspiciis omnia fuerunt elaborata. Quanquam vel ex ipsius operis mole, atque difficultate, perpendere lectores candidi poterunt, non potuisse hunc nostrum partum in lucem edi, citra enixus atq; conatus maximos: cum nobis necessum fuerit, in primis quidem, instaurare depravata exemplaria, tam Latina, quàm Græca: dein ea mutuò inter se conferre: postea lapsus omnes corrigere, lucemq; obscuris sententijs addere: demùm succum omnem atque medullam elicere, eamq; digerere in ordinem: ac deniq; universos locos communes, præcipuasq; sententias, ad margines annotare. Quod si addidero, quoties mihi opus fuerit eadem ipsa relegere, examinare, & transcribere, priusquàm traderentur prælo, nec modum, nec finem fecero. Perpetuò autem summa cum religione curavimus, ne aut aliquid insereremus huic operi, quod Galeni non esset: aut ex doctrina illius quippiam relinqueremus, quod pertinere videretur ad artem. Iam verò præcipua loca quæ restituenda censuimus, asterisco annotavimus, quo videlicet Lector admonitus, posset, si quando vellet, codices græcos consulere, iudiciumq; suum interponere. Ex annotationibus margini apposis, quæ esse vice scholiorum possunt, conflavimus copiosissimū Indicem, ut omnium rerum & sententiarum, quæ præcipue in Galeno habentur, lectori ad manum larga semper copia suppeteret. Porro universum opus in quatuor sectiones, siue classes, digessimus: quarum prima quidem continet ea omnia, quæ ad artis constitutionem, humaniq; corporis fabricam atq; compositionem pertinent. Secunda autem, quæ tum ad sanitatem tuendam, tum ad morborum cognitionem spectant. Tertia verò, omnes differentias morborum, generalemq; medendi methodum, ambit. Quarta deniq;, vendicat sibi historiam omnium medicamentorum simplicium, atque compositorum. Harum autem nostrarum lucubrationum eam partem consecrare T. C. statui, quæ ut lectu iucundissima est, sic in se veram philosophiam, adeoq; (si Galeno credendum sit) exactissimam Theologiam amplexatur: cum exercitatio meditatioq; assidua circa res naturales, ac præsertim circa nostri structuram corporis, nostram erga Deum fidem, propensionemq; multum adaugeat, ac veluti concalfaciat. Nam cognitis ijs perfectè quæ sapientiæ & bonitatis suæ fecit ille conditor noster, in maximam admirationem, commendationemq; sui, omnium animos revocat. Tali autem admirationi, charitas, fides, atque firmissima spes, e vestigio succedunt. Sed ex hac etiam naturalium rerum contemplatione, cogimur æquitatem exercere & iustitiam: quandoquidem & elementa ipsa, & ceteras universi partes, sibi invicem cedere, & suum amare quæque ordinem, æqualitatemq; servare Geometricā, nemo tam cecutiens est, qui non cernat. Vnde ab ambitione, possidendiq; libidine, naturalis Philosophiæ pars nos reddet alienos. Hinc etiam non vulgarem fortitudinem comparamus contra mortis formidinem: cum didicerimus hominem esse portiunculam vix perceptibilem universi, cunctaq;, si genita sint, etiam corruptioni esse obnoxia.

Vt verò hanc naturalium rerum historiam dicarem T. C. eadem me cause impulerunt, quæ iam pridem conciliarunt tibi omnium studiosorum animos, Pater observantissime: nempe, singularis prudentia tua, rara temperantia simul & continentia, non vulgaris animi magnitudo,

EPISTOLA DEDICATORIA.

gnitudo, constantia insignis, admiranda clementia, incomparabilisque omnium linguarum, artium, atque disciplinarum peritia. Eo siquidem semper sapientia amore flagrasti, ut quarum unam tantum aut alteram, vel optima quæque ingenia vix tandem post multos annos assequi mediocriter possunt, eas omnes disciplinas, non per transennam (quod aiunt) aut primoribus degustandas labris, sed consummate, integreque tibi esse indispicendas putares. Quem fervorem ac divinum affectum animi, adeo labore improbo, vigiliisque immensis fovisti, ut non modo tui voti compos, sed promptuarium etiam omnium musarum, quia dico promptuarium? imò sacratissimum quoddam templum, nobis evasisse videaris. In quo quidem, si latina, græca, atque hebraica lingua puritatem ac proprietatem requirat quis: si artium omnium liberalium ornatum: si iurisprudentiæ, Theologiæque veluti summum apicem, universas inquam has scientias & facultates reperiet absolutissimas. In quarum singulis tam feliciter es versatus, ut ex aquo omnes didicisse videaris. Quæ immortales virtutes tuæ, adeo tanquam per gradus quosdam, te ad maximum dignitatis fastigium pari amoris vicissitudine promoverunt, ut primò quidem, dum egressus pueritiæ fines vix esses, cum maximo bonorum omnium applausu creatus fueris Gymnasiarcha celeberrimæ Academiæ Salmanticensis: quam ita singulari prudentia tua & consilio rexisti, ut eorum, qui eo in munere te præcesserant, gloriam prorsus oblitteraveris. Haud multò post factus es Toletanæ Ecclesiæ Archidiaconus: quæ dignitas quantoperè in Hispaniis illustris sit, nemo est qui vivat & nesciat. Nec intercesserunt multa mensium curricula, quin iam Episcopus Cauriensis evaderes. Quod pastoris tam insigne munus, adeo pie religiosèque hætenus semper administrasti, ut si ceteri Ecclesiastici procures eandem, quam tu, viam ingrederentur, non tot cladibus hodie afficeretur Ecclesia: non tot indies sauciaretur vulneribus: sed semper contra hostes suos prævaleret. Postea verò PAULUS III. Pont. Max. famæ tuarum virtutum adductus, à Deoque ipso inspiratus, te ultrò (ut solet complures alios, quos & pietate & doctrina ceteris antecellere intelligit) in ordinem Patrum amplissimorum censuit esse accersendum. Inter quos adeo splendes & fulges, ut de te cunctis raram quandam expectationem exhibeas. Nihil dicam impræsentiarum de antiquissima & nobilissima, ex qua oriundus es, Mendozzarum familia: quandoquidem illa universo innotescit orbi: & animus nobis est persequi, non quæ natura tibi, sed quæ virtutes tuæ præstiterunt. Ut autem reliqua expediam: quemadmodum ingenuissimus iste animus tuus Musarum omnium delubrum atque sacrarium est, sic ades tua semper Academia quædam hominum doctissimorum quam absolutissima existit: quos adeo semper foves, auges, honestasque muneribus, ut eruditus tantum viris notus esse videaris. Quam sanè tibi insitam, cognatamque in studiosos omnes benignitatem, abundè etiam sum ipse expertus: quippe cum me anno quadragesimo sexto supra milesimum, ex Germania redeuntem, ubi primum attigi Romam, quam munificentissimè exceperis, exceptumque præfeceris cura valetudinis tuæ, ac postea indies magis summa liberalitate locupletaveris. Hæc itaque omnia adduxerunt me, ut hæc mei ingenii primitias, calore splendoris tui confectas, ad maturitatemque perductas, Tuæ Celsitudini offerrem. Tuæ igitur partes erunt, Pater amplissime, eorum meditationes contra maledicorum morsus defendere, quos in tutelam tuam recepisti quam benignissimè.

Vale. Venetijs ex adibus illustrissimi D. D. Ioannis Furtadi à Mendoza,
in hac insigni Republica Cæsarei Oratoris circum-
spectissimi.

xv. Calend. Maias, M. D. XLVIII.

4 3



ELENCHVS LIBRORVM GALENI,
QVI IN QVAQVE SECTIONE HABENTVR, CVM EORVN-
dem Interpretibus, quorum versiones, dum Epitomen conderemus,
sequeuti sumus.

PRIMÆ SECTIONIS LIBRI.



X HORTATIO ad artium liberalium studia, Erasmo Roterodamo, interprete. col.	I
De optimo docendi genere, lib. I. eodem interprete.	3
Quòd optimus medicus idem sit & philosophus, lib. I. eod. interpr.	4
De sectis ad eos qui introducuntur, lib. I. Augustino Ricco Luc. interpr.	5
De optima secta ad Thrasybulum, lib. I. Junio P. Cracoviensi interpr.	9
De constitutione artis Medicæ, lib. I. Victore Trincavelio interprete.	20
De partibus artis Medicæ, lib. I. Victore Trincavelio interprete.	31
De elementis, lib. II. Victore Trincavelio interprete.	33
De temperamentis, lib. III. Thoma Linacro interprete.	39
De inæquali intemperie, lib. I. Thoma Linacro interprete.	61
De optima corporis constitutione, lib. I. Augustino Ricco interp.	65
De optimo corporis habitu, lib. I. Augustino Ricco interp.	67
De animæ morum & corporei temperamenti mutua consecutione, lib. I. Joanne Paul. Craff. interpr.	68
De naturalibus facultatib. lib. III. Thoma Linacro interprete.	73
De naturalium facultatū substantia, lib. I. Victore Trincavelio interprete.	89
An sanguis in arteriis natura contineatur, lib. I. Victore Trincavelio interprete.	90
De motu musculorum, lib. II. Nicolao Leonicensio interprete.	91
De uteri dissectione, lib. I. Jano Cornario interprete.	103
De semine, lib. II. Jano Cornario interprete.	106
De foetuum formatione, lib. I. Jano Cornario interprete.	121
De septimestri partu, lib. I. Augustino Ricco interprete.	126
De instrumento olfactus, lib. I. Victore Trincavelio interprete.	128
De ossibus ad tyrones, lib. I. Ferdinando Balamio interprete.	131
De dissectione venarum & arteriarū, lib. I. Antonio Fortolo interprete.	141

De nervorum dissectione, lib. I. Antonio Fortolo interprete.	149
De anatomicis administrationibus, libri IX. Joanne Guinterio Andernaco interprete.	151
De usu partium humani corporis, libri XVII. Nicolao Regio interprete. col.	194.
De placitis Hippocratis & Platonis, libri IX. Joanne Guinterio Andernaco interprete.	321

SECUNDÆ SECTIONIS LIBRI.

Num ratio tuendæ sanitatis, ad medicinalem, an ad exercitatoriam spectet. Junio Paul. Pat. interprete.	359
De exercitio parvæ sphaeræ, lib. I. Joanne Fichardo interprete.	365
De alimentorum facultatibus, libri III. Martino Gregorio interprete.	368
De euchymia & cacoehymia, lib. I. Ferdinando Balamio interprete.	404
De attenuante victus ratione, lib. I. Martino Gregorio interprete.	413
De cognoscendis curandisque animi affectibus, lib. I. Bernardino Donato interprete.	419
De consuetudine, lib. I. ex veteri translatione restitutus.	426
De sanitate tuenda, lib. VI. Thoma Linacro interprete.	428
De usu respirationis, lib. I. Jano Cornario interprete.	484
De causis respirationis, lib. I. Jano Cornario interprete.	488
De difficili respiratione, libri III. Jano Cornario interprete.	489
De pulsuum usu, lib. I. Thoma Linacro interprete.	505
Introductio in pulsus, Martino Gregorio interprete.	510
De differentiis pulsuum, lib. IV. Hermannno Cruserio interprete.	519
De dignotione pulsuum, lib. IIII. Hermannno Cruserio interprete.	538
De causis pulsuum, lib. IV. Hermannno Cruserio interprete.	552
De præcognitione ex pulsibus, libri IV. Hermannno Cruserio interprete.	579
De diebus decretoriis, libri III. Joanne Guinterio Andernaco interp.	607
De crisi, lib. III. Nicolao Leonicensio inter-	

GALENI LIBRORVM ELENCHVS.

no interprete. 622
De præcognitione, lib. I. Leonardo Ja-
chino interprete. 645
De præſagio ex inſomniis ſumendo. col.
652.
Quomodo morbum ſimulantes ſint co-
arguendi, lib. I. Joan. Ficardo inter-
prete. 653

TERTIÆ SECTIONIS LIBRI.

De differentiis morborum, lib. I. Guiliel-
mo Copo Baſilienſi, & Thoma Linac-
cro interpretibus. 657
De cauſis morborum, lib. I. Guil. Copo,
& Thoma Linacro interpret. 660
De ſymptomatum differentiis, lib. I. Gui-
lielmo Copo, & Thoma Linacro in-
terpretibus. 664
De ſymptomatum cauſis, lib. III. Gui-
lielmo Copo, & Thoma Linacro in-
terpretibus. 668
De cauſis procatarctiſis, lib. I. ex anti-
qua reſtitutus verſione. 694
De plenitudine, lib. I. Victore Trinca-
velio interprete. 696
De atra bile, lib. I. Auguſtino Ricco Lu-
cenſi interprete. 702
De tumoribus præter naturā, lib. I. Au-
guſtino Ricco interprete. 705
De tremore, palpitatione, convulſione
& rigore, lib. I. Dominico Montefau-
ro interprete. 710
De morborum temporibus, lib. I. Joan-
ne Guinterio Andernaco interpre-
te. 716
De totius morbi temporibus, lib. I. Jo-
anne Guint. And. interprete. 719
De locis affectis, lib. VI. Gulielmo Copo
Baſilienſi interprete. 722
De differentiis februm, lib. II. Nicolao
Leoniceno interprete. 780
De Marafmo, lib. I. Victore Trincavelio
interprete. 802
Contra eos qui de typis ſcripſerunt, lib. I.
Victore Trincavelio interprete. 809
De typis, lib. I. Auguſtino Ricco inter-
prete. 810
Ars medicinalis, Nicolao Leoniceno in-

terprete. 813
De methodo medendi, lib. XIV. Tho-
ma Linacro interprete. 840
De arte curativa ad Glauconem, lib. II.
Nicolao Leoniceno interprete. 955
De venæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum
lib. I. Joſepho Teſtandro interprete.
col. 985
De venæ ſect. aduerſus Eraſiſtratos Ro-
mæ degentes, lib. I. Joſepho Teſtan-
dro interprete. 987
De curandi ratione per venæ ſectionem,
lib. I. Theodorico Gerardo interpre-
te, col. 989
De hirudinibus, revulſione, cucurbitu-
la & ſcarificatione, lib. I. Theodorico-
Gerardo interprete. 999
De purgantium medicamentorum fa-
cultatibus, liber I. Joanne Guinterio
Andernaco interprete. 1000
Quos purgare, quando, & qualibus me-
dicamentis oporteat, liber I. Joanne
Guinterio Andernaco interp. 1002
De ptifana, lib. I. Auguſtino Ricco inter-
prete. 1008
Conſilium puero comitiali morbo la-
boranti, Auguſtino Ricco interpre-
te. 1004

QUARTÆ SECTIONIS LIBRI.

De ſimplicium medicamentorum facul-
tatibus, lib. XI. Theodorico Gerardo
interprete. 1012
De ſubſtitutis, lib. I. 1144
De compoſitione medicamentorum ſe-
cundum genera, lib. VII. Joan. Guin-
terio Andernaco interprete. 1148
De compoſitione medicamentorum ſe-
cundum partes, lib. X. Jano Cornario
interprete. 1188
De theriaca ad Piſonem, lib. I. Joanne
Guinterio Andernaco interpr. 1270
De antidotis, libri II. Joanne Guinterio
Andernaco interprete. 1280
De ponderibus & menſuris libellus,
Andrea Lacuna Secobenſi, authore.
col. 1289
Vita Galeni, eodem authore. 1294

FINIS.



AD LACUNAM.

DEbemus tibi plurimum Lacuna,
Quicunq; egregias amamus artes,
Et Coi studijs senis tenemur.

Tu, quicquid pater asserit Galenus
Versu multiplici & laborioso,
Paucis contrahis, explicasq; chartis,
Et suum statuis modum labori.

Felix o ter & amplius vocandus.

Non frustratibi contigit Lacuna,
In re difficili, & parum expedita,

Ἀπάντων μέτρον ἐμμετρεῖν ἄριστον.

Pyrrhus.

GALENI



GALENI

PERGAMENI EXHORTATIO AD BONAS ARTES DISCENDAS.



AME SI animalia bruta nō habent rationem illam enunciativā, sermocinatricēve, qua nos ipsi prādicti sumus: eam tamen quā secundum animam intelligitur, quā ἐν ψυχῇ τὸν vocant, hoc est, *rationē intus delitescētem, fortasse nobiscum habent omnia cōmunem, licet alia magis, alia minus. Cōterum cū animantia omnia sint artis omnino expertia (paucis quibusdam exceptis, quibus natura magis quā institutione cōtigisse videntur artes) solus autem homo scientiā capax, quancūq; velit artē percipiat, ac tum ea quā subter humum, tum ea quā supra cōelos sunt, contempletur: ac deniq; omnium bonorū maximū, nempe philosophiā, sua sibi parārit industria, merito solus dicitur rationalis, quōd ratione cāteris omnibus antecellat. Quare longē turpissimū est, hanc ipsam rationis vim, quā nobis inest cōmunis cū Diis, negligentes, caducarum rerum studio teneri, ac spretis artibus, nos improbā fortunā cōmittere; quā plerūq; bonis viris posthabitis, quorū oportebat haberi rationē, locupletat indignos, ac ne id quidem cōstanter, sed tantisper donec, pari quā dedit temeritate, rursus eripiat donata. Quā deam qui infelices sequuntur, omnes infelicitate pereunt. Contrā verō qui Mercurio, rationis domino, omnīq; artis auctori, se addiūt, nunquā destituuntur ab eo, sed quādiu sequuntur illum, semper ejus providentia, patrociniū, & splendore fruuntur. Qui igitur pendentes ex ipsius solo nutu fortunā, honestissimas artes & disciplinas, ceu virus, torvè intuentur, & cū interim equos ipsos & canes artium exercitijs erudint, famulum autē ignavum, nulliusq; peritum artis, nullo precio dignum existiment, curēt prāterea & agros, & cāteras possessiones; ut quāq; sit quam optimē exculta, solos seipsos negligunt, bdicantque ab omni liberali instituto, ne hoc quidē intelligētes, animā habeant nec ne, an nō i, quamvis Cræso ditiores sint, omniū abjectissimi existunt, contemptissimīq; famulis similes? Ijsdem farinā videntur, qui nobilitatem sui generis venditant, atq; hinc sibi placentes, erigunt cristas: quanquā non vident infelicissimi, qui generi non respondent suo, eos magis cōtemni, quā obscuro loco natos. Siquidē imperiti, qui generi sunt vehementer obscuro, hoc lucrifaciunt, quōd pleriq; nesciant, quales nam illi sint. At quos decus & claritudo generis non finit latere, qui aliud fructus ferunt ex illa nobilitate, nisi ut eum infelicitas sit illustrior? Proinde si quis sapi, ad exercendam artē se conferat: per quam si nobilis fuerit, videbitur genere non indignus: si minus, suum ipse genus nobilitabit. Sed nec ob elegantem corporis formam, quā nisi arte fuerit exculta, prorsus ad omnia est inutilis, debemus animi venustatem negligere, quā tanto illa cōgnior

& excellentior est, quanto ipse animus corpore videtur esse quippiā prāstantius. Oportet itaque adolescentem suam ipsius formam ad speculum contemplari: qui se conspexerit facie pulchra, advigilandum est, ut talis sit etiam animus: existimetq; vehementer absurdum, in formoso corpore animū habitare deformem. Rursus, si se viderit esse forma corporis infelici, tanto magis illi curandum est, ut elegantem efficiat animum, quo audire possit illud Homeri:

Est aliquis, cui forma parum sit corpore felix.

Sed cōmptis formam verbis Deus ornat, &c.

Quōd autem nec ipsa Athletarum professio, quā pollicetur maximū robur, gloriāq; apud vulgus conciliat, etiam componi debeat cū artibus homine libero dignis, vel hinc nobis licet colligere, quōd cū variā sint bonorum species, quā natura hominibus insunt, putā quā ad animum, quā ad corpus, & quā ad facultates exteriores spectant, nullam harum Athletā, ne in formis quidem, agnoscunt. Siquidē quod ad primam attinet, animam habeant nec ne, prorsus ignorant Athletā: tantum abest, ut illam sciant esse rationis participē. Etenim cū semper maximam vim carniū, sanguinisq; coacervent, habent animam suam veluti multo immersam cōno, ut nihil possit intelligere, verū nō minus stupida sit, quā brutorum animā. Cū autē supra modum laborent, supra modumq; (ut dixi) expleantur, manifestum utiq; est, eorum habitudinem maximē periculosam existere: id quod sentiens Hippoc. ait, summē bonā habitudinē Athletarū in maximo versari discrimine: affectionēq; Athleticā nō esse secundum naturā: meliorem autē esse habitudinem salubriorem. Quibus verbis nō solum negavit palam eorum exercitacionem naturalem existere, sed ne habitudinē quidem illam dignatus est appellare, quōd obnoxia periculo sit, facileq; in diversum mutabilis. Iam quod ad formā corporis attinet, sic illis habet res, ut non solum exercitatio Athletica nihil ad pulchritudinem conferat, verū etiam plurimum obfit, ob ingluviē illam, qua distenduntur, ac supra modum ingurgitantur. At fortasse nihil quidem ex iis quā exposita sunt, sed robur sibi vendicabunt Athletā. Quod per deos robur? aut ad quid utile? an ad agrum colendum? Perpulchrē igitur vel fodere, vel metere, vel aliud quidpiam, quod ad agricolationem pertinet, possunt. Sed fortassis ad res bellicas valet. Audi Euripidem igitur, qui laudes eorum canit, dicens:

Num adversus hostem praeliabuntur, manu

Discos ferentes? Numne vibrata asside,

Pedibus citi hostem submovebunt patria?

Nullus profecto: vana sunt haec,

Vbi cominus ferrum micare coeperit.

Ergo inde fortē gloriātur, quōd prā cāteris plurimum colligāt, coacerventq; pecuniarū. Atqui videre licet omnes istos ari alieno obstrictos, nō solum id temporis, quo exercent artem Athleticā, verū etiam dum ab ea dimissi sunt. Quāquam ne id quidem prāclarum est, ex arte parare divitias, sed talem potius artem scire, quā fracta navi, simul cū domino enater. Ex dictis igitur evadit perspicuum, o ingenuissimi adole-

*Animi Genes
stas praeferent
da pulchritud
dini corporis*

*Athletarum
professio.*

*Bonorum spe
cies tres.*

*Athleta o
mnis genere
bonorum sunt
destituti.*

*Athletarum
animam esse
veluti mul
to demersam
ceno.*

*Athletarum
habitudinē
maximē per
iculosam exi
stere.*

*Athleticā ex
ercitacionem
pulchritudi
nis obesse.*

*Athletarū
esse robur in
utile.*

*Athletas o
mnes esse ari
alieno obstri
ctos.*

*Ars qua p
randa.*

scientes, nec divitiis, nec generis claritate, nec pulchritudine formæ, nec exercitio aut robore Athletico fretos, oportere nos studia liberalium artium negligere. Verum enim verò cum in generis discrimen ipsæ artes distribuatur, quarum quædam ratione constant, suntque ingenuæ & honestæ: quædam contra, cōtemptibiles, quod corporis laboribus cōstent, quas sedentarias & manuales vocant: præstiterit utique ex priori genere quampiam ediscere. Nam posterius alterum genus destituere solet senectute cōfectos artifices. Prioris porro generis sunt, Medicina, Rhetorica, Musica, Geometria, Arithmetica, Dialectica, Astronomia, Grammatica, & Legum prudentia. Adde his si velis, fingendi, pingendi, artificium. Quanquā enim hæ in manuarum consistunt opera, earum tamen exercitatio non eget robore juvenili. Ex his itaque artibus aliquam eligere cōvenit, & in ea exercere optimè juventutē, cui mens non sit omnino pecunia: vel præstantissimā harum omnium, quæ quidē iudicio meo, est ars medendi, quod deinceps nobis est demonstrandum.

GALENI PERGAMENI
de optimo docendi genere, liber unus.

Doctrina generis optimi quod.

Epochæ.



Avorinus censet illud esse optimum genus doctrinæ, per quod utranque in partem præparamur. Quam doctrinā Academici vetustiores existimabāt desinere in epochen, hoc est suspensam sententiā. Siquidem cum argumentis contrariis in utranque partem suo more agitassent aliquod dogma, tandē permittebant discipulis, ut quod verius ipsis videretur, eligerent. Cæterum cum nonnulla videamur nobis videre, aut aliquo alio sensu percipere, ut in somniis, aut per insaniam: nonnullā item revera videamus, aut alio quovis percipiamus sensu: hæc quidem posteriora, omnes homines, exceptis Academicis & Pyrrhoniis, credunt ad certam cognitionē pertingere. Quæ verò per somnium, aut mentis errorem apparent animo, ea falsa prorsus existimant. Quod quidem si sic se habere Academici nobis concesserint, deleant oportet è libris suis, quod inibi scriptum est, in rerum iudicio nec sano esse magis fidem habendā, quam insano: nec rectè valenti magis quam ægro, nec vigilantibus magis quam dormientibus. Quippe si istis nihil est cognoscibilius, quam iis qui sunt diverso modo affecti, nimirum veritatis iudicia confusa erunt: nec ipse præceptor Academicus, neque etiam ejus discipulus poterit judicare rationes, quæ in ambas partes inter se pugnantibus differuntur. Atque hoc ipsum est, quod veteres illi docuerunt, nullum esse datum à natura iudicium homini, quo exactè possit dignoscere: eoque nulla de re pronuntiandum esse absolutè, sed de omnibus semper suspendendam esse sententiā. Verū si nobis physicis concedant (ut decet) sensus jam nihil opus habebimus in utranque exerceri partem, sed opus tantum erit repetitione eorum, quæ fuerint exemplis tradita. Lubens autem Favorinum interrogarem, num homini naturalis quædam iudicandi vis insit, quæ sermones veros discernat à

falsis: an potius ars quædam & ratio sit, utrumque cognoscendi. Si natura, qui sit, ut non omnes inter nos consentiamus, nec similiter judicemus? Si ars est, & ratio, hæc omnium primum erat discenda. Dein conveniebat ludimagistros variis modis exercere discipulos, multis exemplis propositis. Nam dicere, nullum adesse nobis veri ac falsi iudicium, est omnem agnitionis spem prorsus exterminare. Igitur quamvis iudicium naturæ, sophistæ contendunt nullum, eo tamen nullum nec antiquius habemus, nec generosius. Cui quidem naturali iudicio licet credere, vel non credere: ipsum autem per aliud iudicari non potest, cum nimirum eo cætera iudicentur omnia. Quoniam autem ex ipso naturali iudicio artes omnes parant sibi & instrumenta, & iudicandi secundum artem, organa: per quæ quidem alia sibi componunt homines, alia rursus ab aliis composita iudicant: docebo equidem in universum & instrumenta, & iudicia, tum ea per quæ tibi parabis veros sermones, tum ea per quæ iudicabis ab aliis dictos. Nam quod ex sese evidenter apparet sensibus, aut intellectui, ad id nihil est opus inquisitione. Cæterum si nihil sit tale, necessum est ut accedat cognitio, quæ aliunde petatur. Et enim si perinde ac in corpore oculus, sic fit intellectus in animo, hoc est, non pariter acutus omnibus, consentaneum profectò rationi est, ut quemadmodum qui cernit acutius, adducit ad id quod videtur, eum cui visus hebetior est: ita qui bus contigit in rebus intelligibilibus perspicere clarè, quod intellectui offertur, veluti manu ducant ad contemplationem & cognitionem eandem, illos qui hallucinantur. Atque hoc quidem est præceptoris officium.

GALENI PERGAMENI,
quod optimus medicus idem sit &
philosophus, liber.



Quod accidere solet Athletarum plebique, qui cupiunt quidem in Olympiis victores evadere, cæterum ut id assequatur, nihil exercet curantve, tale quippiam cōpluribus medicis usu venit. Nam ludant quidem Hippoc. ac medicis omnibus arteponunt: ut autē similes illi evadant, quidvis studio habet potius quā hoc: quippe qui ne legunt quidem illius cōmentarios, nec si id faciāt, intelligunt quæ dicuntur: aut si quis id quoque cōsequatur, non perducit speculativā artis rationē ad experiētiā, ut confirmet quod didicit. Quorū si sit alterutrum, necessum est sui universi studij atque instituti sine frustretur. Nullū autem nunc nati, qui natura satis cōpositus sit ad percipiendam artem tam familiarē, tamque amicā humano generi, dictu absurdum videtur, cum idem sit nunc mundus qui olim. Probabile tamen est, ob præam educationem, qua hodie instituntur mætales, & ob divitias virtuti antepositas, ita nunc amplius existere, qualis fuit vel Phidias inter statuarios, vel Hippocrates inter medicos. Siquidem fieri non potest, ut qui pluris facit divitias, quā virtutem, quique artem non in hoc dicit, ut bene de hominibus mereretur, sed ut di-

Favorinus convincitur.

Iudicio naturali singula iudicantur.

Præceptoris officium.

Speculativa artis ratione confirmanda esse experientia.

ut ditesceret, ad proprium artis finem perveniat. Proinde fieri etiā nequit, ut simul & pecuniæ studio serviamus, & exerceamus artem tam sublimem, tamq; arduam: sed necesse est, ut qui vehementius incumbit in alterum, alterum negligat.

Medicū oportet varias regiones orbis lustrasse.

Jam verò cum oporteat medicū varias regiones orbis lustrasse, diversasq; civitatum & locorum temperaturas, situs, & constitutiones accurate novisse, ut de illis possit iudiciū ferre, manifestū vtiq; est, qui talis sit evasurus, eum debere non modo contemptorem pecuniæ, sed suprà modū etiā industrium, atque impigrū esse. At fieri non potest, ut is sit industrius & impiger, qui inebriatur, qui sese ingurgitat, quiq; (ut summam dicam) pudendis tantū, ac ventri obsecundat.

Medicum debere esse contemptorem pecuniæ.

Qui igitur sobrietatis amator est, nec minus veritatis amans, hic verus medicus comperitur. Huic autem cum naturali, etiam ars rationalis discenda, exercendaq; est: quò sciat, quot in universum sint morbi, & quo pacto cujusq; sumenda sit curationis ratio, qualisq; præterea sit universa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, sive logica, docet accuratissimè. Quid

Medicus accuratus quis sit.

Rationalis ars necessaria medico.

igitur jam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisquis Hippocratis artem, ut par est, exercuerit? Etenim si ob dictas causas eum in logica speculatione exerceri convenit: ut verò impigrè perseveret in exercenda arte, oportet ipsum tum aspernari pecuniam, tum sobrietatē amplecti, nimirū omnes philosophiæ partes habebit, nempe eam quæ rationalis dicitur, & eam quæ naturalis: atq; adeò etiam cum his, eam quæ moralis. Nec enim verendū fuerit, ne qui pecunias contemnit, ac sobrietatē suscipit, aliquid absurdum cōmittat. Nam quicquid facinoris audent

Medicum debere esse philosophum.

Philosophiæ partes, naturalis, rationalis, moralis.

patrare homines, aut avaritiæ persuasui, aut voluptatis fallacia patrant. Nec arbitror ulla esse opus demonstratione, ut probemus, medicis esse necessariam philosophiam ad rectè utendum arte, cum plerūq; videamus eos non medicos, sed veneficos esse, qui pecuniæ studio dediti, in aliud utuntur arte, quam est inventa. Ergo ipsi philosophiæ navemus strenuam operam, si modo veri sumus æmulatores Hippocratis. Quod quidem si fecerimus, nihil vetat quo minus evadamus, non dicam illi similes, sed superiores certè illo, percipientes quidem quæ rectè ab eo sunt tradita, quæ verò restant, nostra ipsorum industria invenientes.

Facinorose petriari, aut avaritiæ persuasui, aut voluptatis fallacia.

GALENI PERGAMENI

de Sectis ad eos qui introducuntur,
liber unus.

Medicina scopus, sanitas. Medicina finis, sanitatis adeptio.

Curationes. Vetus ratio salubris.

Medicina quid. Salubria quæ.

Ropositum artis medicæ sanitas est: finis, ipsius adeptio. Quibus autem quis vel absentē sanitatem recuperet, vel præsentem conservet, medicis est necessariū cognoscere. Porro quæ absentē quidem sanitatē restituunt, curationes & auxilia appellatur: quæ verò præsentē cōservant, salubris victus ratio. Hac igitur de causa, & ipsam medicinā salubrium & morbosorum scientiam esse, antiqua definitio asserit: salubria quidem vocans ea, quæ præsentē sanitatem tuen-

tur, restituuntq; deperditā: morbosa verò, quæ contraria his sunt. Utraq; igitur medicum nosse oportet. Cæterū qua ratione horum scientiā facile quis consequatur, nō pariter adhuc omnibus est confessum. Verum hi experientiam solam arti satis esse affirmant: alijs verò & ratio non parū videtur conferre. Qui igitur sola experientia du-

Morbosa quæ Medicū quæ nosse oportet.

cuntur, Empirici & Memores nuncupantur: sicuti Dogmatici & Rationales, qui utuntur ratione ad inveniēda remedia. Atq; hæc quidem duæ principes sunt inter medicos sectæ: altera quidē per experientiam ad remediōrū inventionem festinans, altera verò per indicationē. At tum juvantia, tum noxia Empirici in duas species dividunt, quarū primā naturalem appellant, completē affectus omnes, qui in corpore citra manifestam causam oriuntur; secundam autem, artem fortuitam, quam eorū esse volunt, quæ à casu solent homini accidere. Ipsius autē inspectio-

Empirici sola experientia ducuntur. Dogmatici et Rationales qui.

nis Empiricæ tres sunt species. Prima dicitur Græcis *ἐμπειρία* quasi incidentiam dicas, dum inconsulto ad experiendum accedimus. Secunda *ἀντιπρόβλεπτος*, hoc est, ex proposito, nominatur, quando vel in somniis admoniti, vel alia opinione ducti, aliqui spontē experiuntur. Tertia deniq; dicitur imitatrix, dum quidvis eorum quæ opem attulerunt, aut noxā, rursus in iisdem affectibus aut experimur, aut declinamus. Quæ quidem ultima species, ipsorū artem maximè cōstituisse videtur. Quia verò occurrunt ipsis Empiricis interdum affectus incogniti, vel quorum nō habet satis explorata remedia, instrumentū quoddam commentū sunt ad inveniēda præsidia, nempe transitū ad similia, nimirū ab affectu ad affectū, à loco ad locū, sicuti ab auxilio ad auxilium. Talis itaq; via est per experientiam ad artis finem. Quæ verò ratione perficitur, corporis curandi naturam prius addisci jubet, nec non omniū causarū vires, in quas incidens corpus, vel salubrius, vel morbosius seipso efficitur. Præter ista, aeris etiā, & aquarum, & regionū naturæ, & vitæ studiorū, & ciborum, & potuum, & cōsuetudinū, oportere medicum necessariò peritum esse, Rationales contendunt, ut ægritudinū omniū causas, & medicaminū facultates inveniāt, riteq; tum ab affectu ipso, tum à viribus ægrotantis, nec non ab omnibus iis, quæ recensui, possit indicationes elicere, congruentiaq; morbis semper accommodare remedia: semper contrariis affectibus contraria præsidia ministrans. Cæterū à quibus rei cōferentis indicationē Dogmatici, ab iisdem Empirici observationē eliciunt. Dogmaticus siquidem interdū plus sanguinis detrahit, ipsa rei natura & ratione ductus: Empiricus verò, quod in alijs sic observaverit. In universum autē, eadem in iisdem affectibus remedia Dogmatici pariter & Empirici admittūt, de modo inventionis ipsorum interim altercantes. Ex apparentibus enim accidentibus circa corpus, indicatio causæ Dogmaticis fit, per quam inveniunt. Empiricis verò instituitur recordatio eorū, quæ sæpius eodē modo observata sunt. In quibus autem Dogmatici nullū habent accidēs manifestum, quod causam ipsam demonstraret, in his causam procatareticam nō cunctatur investigare: ut, si canis radibus fue-

Empirica inspectio tres species.

ἐμπειρία. ἀντιπρόβλεπτος. ἀντιμίμητος.

Imitatrix.

Transitus ad similia.

Rationalium progressus.

Medicis quæ cognoscenda sint secundū rationalium habesim.

Empirici Dogmaticiq; discernimur.

Morsus rabie di canis cō-ratio.

rit, aut vipera, quod momordit, tunc sanè minime cicatricem statim inducunt ulceri, sed potius contra, particulas quæ circa ulcus cōsistunt, nonnunquā minutatim præcidunt, dein verò calidis & acribus medicamentis venenum extrahunt, q̄ in corpus unà cum morfu est illapsum. Eadem autem medicamenta etiam Empirici applicant, nō ipsa rei natura ad illorum inventionem perducti, quæadmodum Rationales, sed recordatione solū eorum, quæ longo usu atq; experientia explorant. Dogmatici porro ipsam experientiam accusant, hi tanquā inconstantem, alij ceu imperfectam, alij ut artis omnino expertem. Rursus rationem Empirici, tanquam probabilem quidem, sed non veram, damnant. Methodici autem (sic enim seipso nuncupaverunt, ac si non etiā priores dogmatici artem methodo pertractandā esse tradiderint) non verbō tenus cum veterū sectis certare mihi videntur, sed multa adhuc artis immutare opera: quandoquidē neq; locum passum, neq; causam, neq; ætatem, neq; anni tempus, nec regionem, nec consuetudinem, nec virium ægri inspectionem, seu naturæ, seu habitus, conferre quicquā ad indicationē ajūt, sed à solis affectibus, eius quod confert, indicationē satis sibi esse putant. Atq; horum sanè quidam, morborū omnium qui ex victus ratione proveniunt, alij omnium simpliciter, duas esse cōmunitates, & tertiam quandam ex illis mistam, ostendere nobis conantur, astrictionē videlicet, fluoremq; atq; ex his tertiā dispositionem conflata. Morbum itaq; omnē vel astrictum, vel fluentem, vel etiam ex utroq; complicatum esse contendunt. Utilis autem indicationem, in astrictis quidem, laxationem: in fluentibus verò, suppressionē existere. At in complicatis affectibus, ei qui magis urget, esse occurrendum. Suam autem sectam definiunt esse cognitionem evidentium cōmunitatum, finem medicinae sequentium. Nolunt porro dici dogmatici, quod jactitent se nō indigere latentibus, quæadmodum illi. Nec Empirici etiam se appellari patiuntur, licet illi quā maximè circa evidentia versentur, quod Empirici in evidentibus utantur observatione, ipsi verò indicatione regantur: quodq; illi quidem, tanquam ab ignotis, ab obscuris recedāt, ipsi verò tanquā ab inutilibus, inanibusq;. Porro totam artem medendi adeo brevem efficiunt, atq; in angustum contrahunt, ut non modò in pervulgatis illis sex mensibus (quibus posse doceri eam profitentur) verum multò eam citius universam possit quispiam ediscere: cum juxta eorum decreta, sat sit nobis causis universis, tam procatarcticis, quàm conjunctis, neglectis, astrictos quidem affectus laxare, fluidos autem sistere, à quacunq; illi causa processerint: idq; nulla habita temporum, ætatum, regionum, aut laborantium particularum ratione. At quantopere hallucinentur hi, vel Empirici percipere possunt: qui vident planè, quos rabidus canis momordit, si statim ulcus ad cicatricē ducatur, prius non administratis remediis, quæ ab ipsius causæ procatarcticæ indicatione sumuntur, convulsos omnes animam exhalare: servari autē quibus juxta indicationem illius, adhibita fuerit medendi ratio. Quare neq; ipsarum causarū,

Methodici multa artis immutant opera.

Methodici à solis affectibus indicationes sumunt Methodici cōstituunt duas cōmunitates morborū, astrictiorem atq; fluentem, ac tertiam ex his conflata.

Methodicorū secta quid.

Methodici quibus distinguantur ab Empiricis & Rationalibus.

Methodici pollicentur se totam artem docturos curriculo mensium sex.

neq; ætatum, nec temporum, nec regionum, nec deniq; affectarum particularum indicationes negligunt: cum experientia didicerint, nec senectute confectis, nec item admodum pueris, vel si laborarent pleuritide, venam secandam esse. Sub capite autem, & ante canem laboriosas purgationes existere. Eos qui septentrioni subjacent, aut Aegyptum, aut plagam meridionalem incolunt, copiosas & semel factas evacuationes non ferre. Qui verò inter hos sunt medij, manifestam subinde ex venæ sectione utilitatem sentire. Quinetiam oculum phlegmone obsessum, diversam curationem requirere, ab ea, quam inflammata auris postulat. Quippe acetū cum oleo rosaceo instillatum, unice aurium inflammationi auxilia tur. Oculis autem, si quis id infundat, haud levi noxam attulerit. Ad hæc gurgulioni inflammato. Spinæ Ægyptiæ fructus, necnō scissile alumen, præsentanea remedia sunt: quibus tamen neque in auribus, neque in oculis uti impunè licebit. Obijcient etiam Empirici cōtra ipsos methodicos: ubi pars quæpiam astricta est, non continuo laxandam esse: cum nimirum in ipsius cruris inflammatione, quæ spontè decubuit, minimè quidem ante totius corporis evacuationem (dum plethora adest) laxanda sit inflammata particula: sed refrigerantibus potius & astringentibus medicamentis admodum cōprimenda. Ubi autē corpus vacuatum fuerit, tum demum laxandam esse. Atque his quidem contra illos argumentis utuntur Empirici. At Dogmatici, quod tum sudores, tum urinas, tum dejectiones alvi, atque adeo etiam sanguinis fluxus per nares, quavis modum naturæ excedant, in morbis contingat oriri utiliter, cōvellunt eorū methodicorū sententiā, qui ex immoderatis fluxionibus morbos cōmuniter judicant: nempe in fluore quidem vocantes morbum, ubi humores excernuntur immodicè: in astrictione autem, ubi præter naturam sistuntur: curantesq; utrumq; remedio contrario. Nam tametsi illæ excretiones creticæ suppressæ ullo modo non sint, quia per eas id quod lædit, vacuatur: Methodici tamen, qui naturalibus excretionibus ad omnia, tanquā regula, utuntur, prohibere ejusmodi accidentia conantur. Cæterum qui methodici non in excretionibus ipsis, sed in affectionibus corporum, cōmunitates suas collocant (nomine siquidem tenus inter se omnes concordantes sunt, sed in rebus ipsis dissentiant) quo pacto eas dicere evidentes sunt ausi, cum à sensibus remotissimæ sint, nec possint nisi per signa cognosci? Quod quidem si nobis fateantur, in quonam à priscis medicis discrepent, non satis novi: nec etiam qua freti ratione, sex tantum mensium curriculo, se edocturos artem promittant. Quippe ad cognoscenda ea quæ nostros sensus effugiunt, non videtur mihi esse opus methodo exigua: cum præsertim talia indaganti necessaria in primis sit anatomica administrationis cognitio, ac tum naturalis scientia, tum dialectica exercitatio: ut quæ uniuscujusq; partis propria functio sit, atq; ejus quis usus, facile deprehendat: utq; etiam ex quibus quid concluditur, planè perspiciat, ne sophismatis quandoque aut ab aliis, aut etiam à seipso fallatur. Verum quan-

Pueris senibusq; nullo pacto venam secandam esse.

Vacuaciones copiosas qui ferant minime, quicquid facile.

Aurium inflammationi auxiliari acetum cum rosaceo instillatum.

Oculis acetū esse perniciosissimum.

Gurgulioni inflammato quæ confert Empiricorū argumenta cōtra methodicos.

Dogmaticorum obiectio nes cōtra methodicos.

quandoquidem & de phlegmone, & de meatibus, plurima absurda prodiderunt Methodici, pauca adversus eos dicere est animus, quæ juven-
turi erudiendæ nonnihil utilitatis adferent. In-
flammatiō est tumor præter naturam, dolorificus, tactui renitens, durus & calidus, partem ipsam, quàm antea (contrà quàm illi existimant) nec ra-
riorem, nec densiorem, nec etiam duriorē effi-
ciens: sed affluxu humoris supervacui repletam, atq; ea de causa distentam. Cujus quidem cura-
tio, evacuatio est humorum: quibus vacuatis, partes laxiores reddentur. Tensio igitur, neces-
sario comitatur repletas: sicuti laxitas, eas, quæ evacuata fuerint, particulas. At densitas & ra-
ritas horum neutri sunt ex necessitate annexæ: sicuti nec fluor, nec retentio. Neque enim si ra-
rum quippiam existit, etiam ex ipso quid effluere prorsus necesse est (quid enim si crassum & pusil-
lum fuerit quod continetur?) nec si densum sit, ne-
cessario quodcunq; continebit. Nam multum & tenue, etiam per densos meatus diffluit. Præsta-
bat itaq; didicisse illos, externi quod prius in par-
ticula contentum est, rarefacto eo quod ipsum continet: & eo quod continetur, attenuato, co-
piosioremq; effecto, & vehementius moto, & ab ali-
quo exteriorum attracto, vel ab aliquo interno-
rum expulso: nō autem ipsam evacuationem re-
ferre ad solam raritatem meatuum. Frequenter etiā natura ipsa impetu vehementiori insurgens, quic-
quid sentit supervacaneum in corpore, expellit, exprimitq; Oculi præterea nonnunquam fluxione affligitur, aut copiosiori existente quod fluit, aut etiam tenuiori effecto, aut à natura per eam partem expulso, nihil illis corporibus à naturali constitutione mutatis. Et oportet quidem, si velimus mederi affectui, tenuem fluxum cras-
siorem reddere, copiosum verò evacuare. Opiniari autem inflammationē unam affectum astrictum esse, & complicatum aliā, quemadmodum opinatur methodici, depravati certè est iudicij. At quia iis, qui introducendi sunt, ista sufficiunt, huic præsentī sermoni jam suum finē imponam.

GALENI PERGAMENI
de optima secta ad Thrasybulum,
liber unus.



Edicorū * theorematum singulum, atq; universum omne theorema, in primis verū esse debet: secūdō, utile: tertio, jactis fundamentis cōsen-
tens. quorū si desit unum, ne theorema quidem dici meretur. Quatenus enim sub cōprehensionem omne theorema cadit, eatenus verū sit est necesse. Falsi nanq; cōprehensio nulla est. Quatenus autem ad finem aliquem vitæ com-
modum pertinet, eò utile esse affirmandum est. Quia verò quemadmodum sub uno principe sub ditorū multitudo mente concipit, sic & theorema ipsum ad antè jactum principium refert: ob id omne theorema verum, utile, cōsentiensq; nec-
essario dicendum. Quare si omne aliud, liquidum certè est, medica etiā theoremata his tribus esse dijudicanda. Igitur quandoquidem nec verum ipsum, quale nam sit, nec utile, nec etiam conse-
quens, facile aut æstimari, aut deprehendi pos-

sunt, notas horum aliquas judicandi, instrumē-
ta in primis tradere, præciū operæ fuerit. Ipsum porro verum, ex orationis cum rebus concordia æstimabitur. At rerum, aliqua sensibus eviden-
tes sunt, aliqua sensum latent. Evidentium rur-
sus aliqua per se innotescunt, ut albus aterq; co-
lor: alia ab aliis evidentiam adipiscuntur, ut quæ deprehenduntur signis. Ad hæc, rerum sensui ab ditarum aliqua intellectui & perspicua sunt, & dicuntur: ut, bis duo, quatuor constituunt: alia cognoscuntur per ostensionem: ut si dixeris, quo bene uti licet, eodem & abuti. Oportet autem semp sermonem, atq; omne theorema ad propo-
sitæ rei speciem referre. Jam verò judicia de reb⁹ sensui evidentibus atq; occultis differunt. Quæ-
cunq; enim sensui evidentium rerum, per se de seipsis notitiam faciunt, sensu dijudicantur: ut album & atrum. Quare illi medici jure sunt de-
ridendi, qui de rebus sensui evidentibus, senten-
tiam, non sensoriis, sed ferre demonstratione co-
nantur. At evidentium quidem sensui, non au-
tem per se cognitorum, iudex est observatio. Præ-
terea, sensui abstrusarum rerum, ut plures sunt differentia, ita & diversa judicandi instrumenta. Ex abstrusis autem sensui, aliqua intellectui per-
spicua sunt: ut hoc, fieri non posse, ut idem ho-
mo Athenis simul atque in Ægypto sit. Aliqua per ostensionem agnoscuntur. De perspicuis in-
tellectui iudicium ex communi omnium hominum conceptione habetur. At quæ ostensione perci-
piuntur, per consensum ab iis, quæ ab omnibus conceduntur, dijudicantur. Rursus, concessi di-
judicatio in plura dividitur. Aut enim ex cōsensu cum sensui apparentibus, aut cum intellectui per-
spicuis, aut cum demonstratis, concessum discer-
nitur. Igitur quo modo verum, & ad iudicium ve-
ri ducentia, judicari oporteat, jam explicavimus. Deinceps de utili dicamus theoremate. Utile theorema, cum ad artis finē refertur, dignoscitur. Oportet autem ipsum, primum quidem com-
prehendi posse: alioqui inutile theorema reddi-
tur. Deinde, ipsius apprehensionem non conve-
nit vulgaribus esse communem, sed artificibus propriam. Idcirco nanq; eos falsos esse nos dici-
mus, qui sensui evidentia initiū artis existimant. Neque enim ex sensui evidentibus ars constitui-
tur, nec per sensui evidentia fit ejus traditio: quandoquidem nemo sensui nota tradit, sed ea consistit ex quæ ex sensui notis præcepta oriuntur, quæ planè sensui subjecta non sunt. Hæc igitur artis princi-
pium esse, haud ab re quispiam existimaverit: di-
co enim theoremata, ex evidentibus sensui nata, quod principium tradendæ ab sensui evidenti-
bus artibus evadant. Itaq; sensui nota, principium inventionis theorematū esse jure dicentur: prin-
cipium verò artis nequaquam. Nam artis prin-
cipia vulgo ignota esse debent, sicuti & ipsæ ar-
tes illi omnes ignotæ sunt. Præterea, artium prin-
cipia traduntur: evidentia autē sensui haud qua-
quam traduntur. Theoremata nanq;, aut in sen-
sui notis, aut in iis quæ ex aliis percipiuntur, aut in his quæ præostensa fuere, aut in manifestis in-
tellectui consistunt. Quod igitur ex manifestorū sensui cōsensu, aut in iis quæ manifesta sunt sen-
sui, ratione inventū est, & universim prolatum,

Verum unde æstimetur. Rerum differe-
ntia,

Utile theorema quomodo dignoscatur.

Artem nota consistit ex evidentibus sensui.

Artis principia vulgo esse ignota. Artes vulgo esse ignotas. Theoremata in quibus consistant. Theorema quid dicatur.

Theorema o- id appellatur theorema. Omne autē theorema, *mne aternū,* æternum, firmum, atq; perpetuum est. Quamob- *firmum atq;* rem hallucinantur illi, qui ab ipsis theorematis *perpetuū esse.* medicinam appellari existimant artem conjecta- tricē: cū ab actione, & medentium opēra, quæ incertum habet eventum, ea cōjectrix reddatur. Cæterum quoniam utile dijudicandum esse pro- fitebamur, si referretur ad finem, artis finem pro- *Artiū fines* ponere jam tempestivum fuerit. Artium igitur *diversi.* aliqua, ea quæ non sunt efficiunt: ut navium stru- ctoria. Nonnullæ, quæ facta sunt, conservant: ut navium gubernatoria. Aliæ utrunq; præstant: ut ædificatoria. Porro in facientibus artibus, aut servantibus, unus est consequendi finis modus: ac proinde in his simplex est utilis æstimatio. At in iis quæ juxta faciunt & servant, non ita facile fuerit dijudicare. Ars itaque medica inter eas *Medicam ar-* est, quæ faciunt, atq; conservant: non ob id tamē *tem esse fa-* geminum esse eius finem credere convenit, & *ctricē simul* quod non est facere, utpote sanitatem: & eam *& conserva-* quæ est, conservare. Siquidem ipsius artis unicum *tricem.* est propositum, sanitas scilicet: finisq; unicus, nē- *Medicina ef-* pe adeptio illius: quamvis modi sint ipsius ade- *se propositū* ptionis multiplices. Quippe dum submovemus *atque finem* adversa & noxia, sanitatem acquirimus: dum vi- *unicum.* tamus illa, præsentem sanitatem tuemur. Quare utile in medicina rectē æstimabimus, nōnunquā si ad sanitatem accersendam, nōnunquā si ad eā retinendam confert, nobiscum reputantes. Cōse- cutionē autem ipsam dijudicare oportet ex eo, *Consequen-* quod sublato uno, aliud necessariō aufertur: sic- *tia qua dicā-* uti & posito, ponitur. Talia nanq; consequen- *tur.* tia, consociataq; jure putanda sunt. Neq; enim quod medicinale theorema verum utileq; sit, co- gnoscere satis fuerit, sed nihilo secius ipsum cum aliis cohærere, cōsentireq; opus est. Quandoqui- dem igitur omnis oratio, omneq; theorema, tri- bus hisce perpēditur: tres autē in medicina sectæ celebres sunt, Rationalis, Empirica, Methodi- caq;: agē & hisce judicandi rationibus usi, earum singulas diligentius examinemus, ut synceræ & salutari, cæteris posthabitis, adhæreamus. In pri- mis itaque quid inter eas conveniat, & quid cu- jusque sit proprium, exponere videtur necesse. Dein autem, singulas ad examen reducere. Por- *Sectarū triū* rō cōvenit inter illarum trium sectarum p̄fesso- *communis.* res, quod evidentia theoremata utilia sunt, ana- logismus, observatio, historia, ad simile trāsitus. Præterea quod historia sine judicio nō admitten- da: quod instrumenta, & remediorum applicādo- rum modus ex usu sint: quod ex aliis alia depre- henduntur: quod iisdem præsentibus malis ea- dem sint faciēda: quod adjectionibus & subtra- ctionibus sanitas cōservatur, atq; fugatur mor- bi: q̄ ad materiæ adhibendæ notitiam, experien- tia potēs atq; utilis est. Siquidem quæ nutriunt, & quæ nō nutriunt, purgantia & letalia omnia, ex perientia cōperta sunt. Verum Methodici & Ra- tionales eatenus inter se conveniunt, quatenus utriq; utile percipi ex indicatione arbitrantur. Quatenus verō à diversis accipiunt, eatenus sunt discordes. Siquidem methodici ex evidentibus sensui, utilia judicari existimant. At Rationales, ab hujuscemodi quidem minimē, sed ab occul- tis, hoc est, à causis. Quia in re etiam Empirici

Rationalibus suffragatur. Rursum, hoc loco in- ter Empiricos methodicosq; cōvenit, occultum ex evidentibus nō agnosci, ex quo conferentium indicatio oriatur. Obijciunt autem Empirici & Methodici Rationalibus, inutilem esse rerum ab- ditarum notitiam: nihil enim abditum utile re- periri. Ad hoc Rationales Empiricis quidem re- spondent, sensu cognita non satis esse, ut in ipsis utilia observatione deprehendantur, cū ne ipsi quidem Empirici in omnibus sensu perceptis, utantur observatione. Ac proinde occultis esse opus, ut à quibus cōferentium indicationes na- scantur. Ultra dicta etiam, quandoquidem Em- pirici asserunt, & in præteritis & in præsentibus observandum esse, cū infinita sint, tum præ- terita, tum præsentia, in infinitis autem observa- tio fieri nō possit, planē eorum observationem ex iis esse, quæ fieri non possunt. In Methodicos autem, sensui perspicua conferentium esse indi- cativa putantes, hæc Rationales adducunt: Sen- sui nota ex seipsis percipi possunt: vulgo igitur nota erunt. Quoniam verō & cōmunitates indi- cant, simulq; eum indicantibus sese indicata of- ferunt, vulgaribus utiq; indicabunt communita- tes: atq; ita nihil à vulgaribus, o Methodici, dif- feretis. Quod ab affectibus verō conferentium indicatio non proveniant, hinc maxime licet cer- nere: quod eodem affectu, exempli gratia, phle- gmone, occupante differentes corporis partes, ut oculos, jecur & gulam, non utimur eadem ra- tione medendi, cū nimirū desideretur diversa. Oculo nanq; inflammato, succus fœniculi, & lac muliebre cōveniunt. Gulæ autē, aut jecori, aliud quippiam: cū tamen idem semper in omnibus eidem affectui applicandum esset præsidium, si affectus ipsi conferentia indicarent. Non appli- catur autem, affectus igitur conferentia nō indi- cant. His summarim expositis, quidnam sit ipsa indicatio, atq; etiā analogismus, & qua ratione ab illis, necnō ab observatione sumatur utile, ex- pedit aliquid dicere. Quemadmodum igitur sen- sui evidentium aliqua per seipsa percipiuntur, ut album, & nigrum: nōnulla, adhibita observatio- ne, ut ea quæ dignoscuntur per notas: ita & ju- vantia quidem per indicationem patefiunt, nul- liusq; cogitationis ope indigent. Quare quod in apertissimis & sine cōtroversia cōcessis reperit, id nimirum & in perceptis ex indicatione cōrige- rit. Observatio autē, proportionē ad ea respon- det, quæ per signa & notas comprehenduntur. Verum ex analogismo juvans ipsum percipitur, quando causa ipsa ignoratur, nullaq; observa- tio habetur, sed affectus quāsimillimus ex sym- ptomatis est. In hujusmodi enim ab indicatione profuturum colligi nequit, cū ignoretur cau- sa. Idcirco nulla præterea facta observatione, ca- suum similitudinem intuentes, cogimur ad simi- le transgredi. Analogismus itaq; per transitū ad simile fit: quo utentes, à simili ad similia transi- mus. Empirici verō secus ac nos (hoc est, nullo prorsus judicio adhibito) transitum hujusmodi usurpāt. Est igitur indicatio, juvantis cōprehen- sio, simul cum comprehensione infestantis adve- niens, sine observatione aut ratiocinio. Experien- tia verō, est ejus quod frequenter & eodē modo visum

Empiricorū methodicorū que in ratio- nales obie- ctio.

Rationaliū contra Empi- ricos respon- sio.

Rationaliū assertio con- tra methodi- cos.

Indicationē conferentiū non sumi ab affectibus.

Oculo inflan- mato succus fœniculi, & lac muliebre auxiliatur.

Affectus con- ferentia non indicant.

Instantia p- indicationē patefieri.

Juvans quo pacto percipi- tur ex ana- logismo.

Analogismū fieri per tran- situm ad si- milia.

Indicatio quid.

Experientie quid.

*Observatio
et experien-
tia idem.
Analogif-
mus quid.*

*Empiricorū
propria.
Rationaliū
obestiones
adversus
Empiricos.*

*Observatio-
nem absque
ratione fieri
non posse.
Observatio-
nem non posse
colligi in si-
milium acci-
dentium con-
curſibus.*

*Observatio
debet fieri in
pluribus.*

*Portulaca
auxiliatur
stupori den-
tium.*

visum est, cōprehensio & memoria. Cæterū ob-
servatio & experientia sunt idem. Analogismus
autem est comparatio, & perceptio causarum ju-
vantium, per similitudinem. At deinceps, pro-
pria cujusque sectæ cum exposuerimus, adversus
singulas aliquid inducimus. Empiricorum sunt
propria, juvantium in cōcurſibus observatio, hi-
storia, diversusq; à simili transitus. Ab ipsis tamē
causa jure petenda est, cur non in omnibus acci-
dentibus, sed in certis quibusdam, se conferentia
observare fateantur: cum accidentia, quatenus
sensui evidentia sunt, tam illa in quibus fit obser-
vatio, quam cætera omnia inutilia, nulla ex parte
dissideant. * Dicant igitur nobis, quid nam ac-
cidentia utilia commonſtrent: apparensne, an
occultum? Si enim apparens dixerint, quo utilia
accidentia produntur, & in quibus est observan-
dum, inferemus iterum, hoc apparens, quatenus
conspicuum est, nihil ab inutilibus differre acci-
dentibus. Quod si occultum esse id quod indicat
utilia accidentia, affirmant, occulta ad acciden-
tium observationem conducere, necessum est fa-
teantur. At occulta nulla vi alia, quam ratione
comprehendi queunt. Quare si occulta utilia
sunt, in concursibus occultorum est observatio.
Et si nihil aliud quam ratio cōprehendit ea, aper-
tum jam est, absque ratione observationem fieri
non posse. Quod autem in similibus accidentium
concurſibus observatio colligi nequeat, per hæc
evadet perspicuum. Cum enim prorsus oporteat
ipsa concurrentia, non modò genere eadem, nu-
mero æqualia, magnitudineq; similia esse, sed e-
tiam idem tempus, eundemque ordinem servari
necessum sit (ut etiā confitentur Empirici) si de-
beat integra, absolutaq; observatio fieri: cumq;
in omni vita, ne duobus quidem ægrotis, nedum
pluribus, omnia symptomata quæ comitantur
morbos, accidere similiter queant, clarum est hu-
jusmodi observationem fieri haudquaquam in
istis concursibus posse. Quod si duo etiam ægri
nulla in re differentes inventi fuerint, non ob id
tamen concedenda observatio est: quandoqui-
dem ipsa in pluribus fieri debet. Porro in quibus
propositis utile ipsum aut inutile nos observe-
mus, jam dicamus Empiricis. Nos scilicet in solis
symptomatum generibus observare, in quibus
nec potētia, nec tempore, nec magnitudine, nec
ordine, nec alio quopiam est opus, ut in dentium
stupore: quæcūq; causæ, loci, facultatisve sym-
ptomata sunt, ea reputantes utilia: quæ verò non
hujusmodi, ceu inutilia explodentes. Cæterum si
dicant, morsum hæmorrhoi plura symptomata
comitantur, vos autem nihil in his observatis:
ad hæc eis respondebimus, non in illis sympto-
matis, sed in antegressa causa, nos observationem
facere: symptomata verò ad antegressarum cau-
sarum cognitionem, in quibus observationem
statuimus, expendere. Causa nanque ignorata,
& facultate curandi ex indicatione carentes, ob-
servationem in antegressis causis præstamus.
Etenim cum dentes stupent, minimè portulaca
observatur, sed affectus ab acidis acerbisque or-
tus: qui si ex fluxione, aut vomitu, aut secantis fer-
ræ stridore productus sit, nihil in portulaca præ-
sidii fuerit. Prius itaq; causam rimari, dein portu-

laca utemur. Iam verò Empiricorum historiam,
qua utuntur, cum ut remediis cōtra omnes mor-
bos abundant, tum ut ipsa traditio sit brevior,
inanē omnino esse, nec confici posse, mox patefa-
ciam. Omnis enim historia, aut præsentium, aut
præteritorum est. Siquidem futurorum non hi-
storia, sed potius divinatio est dicenda. Etenim
ipsi Empirici frequenter præteritorum historia
sunt usi: quam definiunt esse narrationē rerum
sæpius circa eadem probatarum. Cum autem o-
mnia in historia enarrata vera esse affirmant, ali-
quem profectò judicem habere deberent, qui re-
ctè historiam institutam esse, dijudicaret. Is cum
non adsit, aliquod dijudicandæ historiæ instru-
mentum est reperiendum, quo à falsis vera di-
scerni possint. Siquidem circa unam eandemque
rem, non solum non consentiunt medici, sed e-
tiam contraria opinantur. Quare cum ipsi fate-
ri cogantur, utile esse historiam admittere, inter-
rogandi sunt, experientiāne, an ratione, histori-
am judicent. Ratione quidem nequeunt, cum
ipsam exterminent, & alioqui eo judicare debēt,
quo istorum unumquodq; percipitur. Atqui ex-
perientia, quæ juvant, deprehensa fuisse prædi-
cant: experientia igitur etiam judicari ea est ne-
cesse. Quare necessario etiā Empirici de historia
per experientiam iudicium facient: id quod si ita
est, reliquitur, supervacuum inutilemque esse hi-
storiā. At Rationalis medicus, per causam diju-
dicare historiam poterit: qui ubi causam nancisci
non potest, historiæ iudicium experientiæ com-
mittit. Nullius autem juvantis noticiam haberi
posse ex historia, non magno quis negotio pro-
baverit. Siquidem per quæ conclusimus in con-
curſibus observationem fieri non posse, per ea-
dem efficitur, neque historiam posse constitui.
Neque enim observationem fieri nō posse, posse
autem non observata describi, quispiam dixerit.
Utuntur autem ipso transitu ad simile Empirici,
nonnunquam ab auxiliis ad auxilia, nonnunquā
à locis ad locos: est cum à vitiis ad vitia. Ab auxiliis
quidē ad auxilia, ut quando mespilos, vice coto-
neorum, torminosos exhibent. A locis autem ad
locos, ut quando ea quæ in musculosis membris
observantur, talibus etiam applicuerunt. A vi-
tiis verò ad vitia ita transeunt, veluti cum reme-
dia ad sanguinis fluxum probata, ad hæmorrhoi
morsum accipiunt. Quomodo autem intelli-
gant ipsam similitudinem, si interrogas, facile
ipsos convinces, atque in absurditates innume-
ras præcipitabis. Nunc verò declarandum su-
per est, quo modo Rationales transitum ad simi-
le (quem nonnulli vocant analogismum) usur-
pent. Ipsorum symptomatum, aliqua quidē cau-
sas, aliqua passos locos, aliqua facultates, aliqua
ægrotantes sequuntur. Hæc Rationalis omnia
distinguit, noscitq; ubi observandum sit, nec ne.
Quod alia verò adsit, absintve, non laborat, cum
nihil ad curationem conferant. Quinetiam, ubi
concurſus ipse in aliquo symptomate inutili va-
riare videtur, haud secius iisdem utitur, quam si
penitus consimilis concurſus adesset. Quocir-
ca utilia symptomata distinguens Rationalis ab
inutilibus (qua facultate carent Empirici, cum
secundum concurſum aut absentiam similibus

*Historiam om-
nino esse præ-
sentium aut
præteritorū.
Futurorum
non historiā,
sed divina-
tionem esse.*

*Historiā ja-
dicari ab
Empiricis
per experien-
tiam, & à
Rationalib.
per causas.
Ex historia
non posse ha-
beri juvan-
tis noticiam.*

*Empirici
quomodo ut-
antur transi-
tu ad simili-
le.*

*Rationales
quo pacto u-
surpēt ad si-
mile transi-
tum.*

symptomatum, soleant semper curationē variare) sæpius dissimili in multis apparente cōcursu, eadem medicamenta sectatur, ut in emprostho-
 rono, opisthotono, & terano: qui affectus diver-
 sum cōcursum habere videntur. Intelligēs siqui-
 dem copiam sanguinis (si sic evenierit) in causa esse
 illorum affectuum, musculorumq; esse vitium, atq;
 unum eundemq; morbum, eadem via incedet.
 Nam in priorem, aut in posteriorem, aut æquali-
 ter in utranq; partem convelli, patientis sympto-
 ma est: quod observatum, nullum ad curationem
 momentum adfert: quemadmodum nec lachry-
 mari. Contrā nonnunquā simili apparente con-
 cursu, ubi causam animadvertit, differenti cura-
 tione utitur: ut in illis qui ob erosionem, aut fra-
 cturam, cruenta ore emittebant. Dividens enim
 symptomata Rationalis, ad utileq; indicantia re-
 spiciens, atq; utilia tantum ex ipsis deligens, au-
 xiliisq; contra ea pugnare valentibus utens, ple-
 runque diverso apparente concursu, eodem ipse
 semper modo curabit: aut contrā, apparente si-
 mili, diversam curationē instituet, remedia nem-
 pe causis symptomata producentibus, contraria
 adhibens. Sed quomodo, dicet aliquis, utilia sym-
 ptomata à vanis, ipse Rationalis distinguet? Ad
 indicantia proposita referendo, respondeas.
 Quemadmodum autem concursus, ita & curan-
 di rationem distinguit: atque in primis perspicu-
 um habet, quænam curationis auxilia, sympto-
 matis quæ à causis producta sunt, adversantur:
 quæ symptomatis à loco, facultatēve exortis. Sci-
 ens nanquē hoc à causis symptoma nasci, à locis
 illud, aliud denique à facultate: à causa præterea,
 auxilii genus indicari, à loco utendi modum, si-
 cuti à facultate mensuram, si quidem eadem
 causa sit, & causam prodentia signa simul etiam
 appareant, sed nec locus sit idem, nec facultas ea-
 dem, utique idem remedii genus accipiet, sed
 mensuram, & utendi rationem variabit. Contrā
 si causa planē diversa fuerit, sed locus & facultas
 sint ijdem, nō idem auxilii genus, sed mensura, &
 utendi ratio servabitur. Postquā igitur Rationa-
 lis medicus & concursus & curationes metiri est
 idoneus, potest secundum concursuum similitu-
 dines, aliquas curationis partes pro suo arbitratu
 mutare. At Empiricus neque causam, neque cau-
 sarum, aut loci, aut facultatis proditoria rimatus
 symptomata, id neutiquam facere poterit: quo-
 circa neque ad simile transitum inter curandum
 ritē usurpaverit. Ostendimus itaque ea quibus
 Empiricorum secta insignitur, atq; informatur:
 nempe observationem, historiam, & ad simile
 transitum, frustratoria esse, minimeq; consistere
 posse. Modò superest ultima acies cum Metho-
 dicis depugnanda, quorum sanē instituta sunt
 hæc. Cum eadem symptomata sunt, affectus au-
 tem, quibus hæc inbærent, differunt, non eadem
 medendi ratione est utendum: ut in phrenitide
 generis astricti, atque laxi. Rursus, si ijdem adfint
 affectus, symptomata autem differāt, eadem (in-
 quiunt) curatione utemur: ut in costarum, cere-
 briq; phlegmone, si utraq; sub astrictionis genere
 cōtinenatur. Quandoquidem igitur symptomata
 eadem cum sint, dissidente tamen ratione in
 medendo utimur, cumq; illa differunt, eodem nō

nunquā modo curamus, ideo inutilia prorsus ad
 curationem pronuntiāt esse symptomata. Cum
 autem sublatis affectibus, ipsa pereant sympto-
 mata: positis autē, perdurent, utiles esse affectus
 contendunt, ut qui hæc exorientes producant,
 extinguant autem evanescentes. Quod autem
 per ea quæ methodici faciunt, cogantur utilia fa-
 teri symptomata, facile cognitu est. Nam homi-
 nes utcunque insanientes, sive ob fluxum, sive ob
 astrictionem insaniant, collocant in tenebricoso
 cubiculo, lucem ipsam addere ad insaniam exi-
 stimantes. At veterinosos, sive astrictione, sive
 etiam fluxu laborent, loco splendido continere
 conantur. Tenebris enim veterinum augescere
 putant. Cum igitur delirantes ex astrictione, in
 tenebris, quæ adaugent ipsam astrictionem, deti-
 neant: in luce autem, veterinosos ex fluxu, licet
 lux ipsa fluxum reddat magis exorbitantem, vi-
 dentur certē mihi affectus ipsos negligere, solaq;
 intueri symptomata. Sed neq; affectus conferen-
 tia indicare, ut opinantur Methodici, ijdem illis
 rationibus, quibus ipsi inutilia esse symptomata
 nitebantur probare, etiam elici poterit. Nam si
 ijdem affectus sint, causæ verò differant, non e-
 andem curationem admittunt. Urinæ nanq; sup-
 pressio, unus quidem affectus est. Verum si calcu-
 lus sit in causa, excindimus: si phlegmone, cata-
 plasma illinimus. Si vesicæ supra modum disten-
 tio, oricularium specillum, aut cathetera impo-
 nimus: aut ægrū in genua flectentes, aphronitro
 extremum urinariæ fistulæ perfricamus. At una
 cum est causa, licet affectus dissideant, idem cu-
 randi genus admittimus. Cholera nanque & ar-
 quatus morbus, quamvis dissimiles, eadem fermē
 & ipsi ratione curantur. Quamobrem, quoniam
 sublata causæ affectus auferunt, posita constitu-
 unt: item diversæ causæ, quamvis affectus sint
 ijdem, diversam: eadem, licet affectus varient,
 eandem curationem postulant, non injuria nos
 & causas, & affectus, & passos locos expendimus.
 Et quemadmodum symptomata ipsi Methodi-
 ci, quoniam à diversis affectibus eadem, & ab ij-
 dem diversa proveniunt, nihil commodi indica-
 re testantur: itidem nos, à diversis causis eosdem,
 ab ijdem diversos gigni affectus cernentes, eos
 ad utilium indicationem incommodos esse dici-
 mus: ad curationem autē sufficere perceptionē
 causæ, dignotionem perpeffi loci, nec non ipsius
 facultatis mensuram. Quandoquidē sit ne fluor,
 an astrictio, supervacaneum puto cognoscere, cū
 affectus nō quid agendum sit, aut quo modo, sed
 suam ipsorum sublationē indicent: id quod ne-
 bruta quidem ignorant. At artifices tali indicati-
 one nō egent, sed illa scire exoptant, per quæ lan-
 guores pellantur. Nam si morbi sua ipsorum re-
 media edocerent, laborantes ipsi, per quæ ad sani-
 tatem redirent, intelligerent. Quin & ex auxiliis
 adhibitis, non morbos, sed causas indicare mede-
 lam, deprehenditur. Auxilia nanq; non effectis,
 sed efficientibus adversantur. Itaq; non prorsus
 incommoda esse symptomata, nec à morbis con-
 ducibile, sed à causis, indicari, satis amplē est o-
 stensum. Iam verò cū Methodici medicam facul-
 tatem definiāt esse cognitionem per se evidentiū
 cōmunitatum, manifestē etiam hallucinantur,
 atque

*Rationales
contra me-
thodicos.*

*Insanientes
communitatē
collocari in
tenebris.*

*Lucem auge-
re insaniam.
Tenebris ve-
terinum au-
gescere.*

*Affectus cō-
ferentia non
indicare.*

*Urina sup-
pressa varia
curationes,
pro diversi-
tate causa-
rum.*

*Causa genus
auxilij indi-
cat.*

*Locus indi-
cat utendi
modum.*

*Facultas mē-
suram præsi-
dij indicat.*

*Rationales
posse curati-
onem varia-
re, id quod nō
licet Empi-
ricis.*

*Methodico-
rum dogma-
ta.*

*Curationi
quæ suffici-
ant.*

*Affectus suā
ipsorum sub-
lationem in-
dicare dun-
taxat.*

*Causa mede-
lam indicat.
Auxilia non
effectis, sed
efficientibus
adversantur.*

atq; convinci possunt: quandoquidem cōmunitates ipsæ, quas vocant, neque evidentes sunt, neque per se perceptibiles. Siquidem cū non omnis densatio & retentio astrictio sit, neq; omnis raritas aut excretio fluor (in pręgnantibus enim retentio menstruorū non est astrictio: sicuti neq; fluor, expulsio illa materię inutilis, quę in mulierculis molliori victus ratione usis excerni singulis mensibus solet) relinquitur manifestum, qui sola ipsa symptomata respicit, eum nec fluxum, nec astrictionem deprehendere posse. Sed hæc ex aliis etiam esse dijudicanda. Siquidē densitas ipsa & raritas, nonnullis quidem ingentis, aliis adventitię, & præter eorum naturam sunt: ac proinde oportet, in aliud quippiam affectiones eas referentes, ita secundum naturam ne sint, an vitiosę, iudicium ferre. Amplius, id quod immoderatum, atq; præter naturam est, evidens nō est: quandoquidem ut cognoscatur, magna est opus inquisitione, nec non collatione ad vires. Atqui communitates (quod fatentur etiam Methodici) præter naturam sunt, atque immodica quędam, communitates igitur evidentes non erunt. Illud etiam considerandum est, num quispiam vnquam medicum accersierit, spissitudine aut immodica raritate vexatus. Quod si nemo unquam cōmunitates percipit sensu, cur ipsi artem medicam definiunt esse notitiam per se evidentium communitatū, quas quidem investigare & cognoscere, Erasistratus & Hippocrates oppidō quā difficile & laboriosum existimarunt? Cæterum etiam si communitates ipsę evidentes sint, nec ob id tamen eas aliquid utile indicare est fatendum, cū aliunde ipsa vera indicatio investigari debeat, nempe ab efficientibus causis, quarum differentia communissima est duplex: alię siquidem in nostro corpore continentur, alię accedunt extrinsecus. Verū cum ab aliqua externa causa pulsamur, minimē lædi possumus, nisi alia intestina causa in corpore delitescens, impetum externę illius excipiat. Porro Methodici nō duabus tantum communitates, sed plures etiam statuūt. Alias nāq; in victus ratione, alias in chirurgia collocant. In victus quidem ratione, ut astrictum, & fluens, adjunctamq; magnitudinem, & morbi tempora quatuor, & longinquitatem, & accretionem, & intermissionem. In manuaria autem opera, quod a natura alienum est, ponunt, loco, & tempore, & pluribus aliis. Sed de ijs tantum cōmunitatibus, quę ad victus rationem pertinent, satis fuerit impresentiarum aliquid dicere: quas quidem introduxerunt, nihil reperiētes, quod auxiliorum differentias indicaret, ut scilicet juxta ipsarum diversitatem, diversam invenirent medendi rationem. Quod autem magnitudo communitatum nō indicet magnitudinem remediorum, hinc nobis discere licet, quod in ipsis morbis curandis, non simpliciter auxiliorum magnitudine egemus, sed hujuscemodi certa magnitudine. At magnitudo communitatum, non hanc hujusce auxilii magnitudinem, sed simpliciter magnitudinem indicat. Deinceps neque morbi tempora utile quippiam indicare ostendemus: prius tamen aliqua de temporum differentiis tractanda sunt. Duę igitur temporū

differentiæ apud medicos celebrantur. Aliqua enim morborum, aliqua auxiliorū dicuntur tempora. Atque hinc jam manifesta curatio fiet. Causarum autem motiones morbi esse tempora dicunt. At motionis differentiæ sunt quatuor: initium, incrementū, status, & declinatio. Hęc eadem sunt & temporum nomina. Auxiliorū verò tempora, ea quę ad ipsorum exhibitionem idonea sunt prædicant. Sunt autem idonea, quando remedium postulantia quidem adsunt: prohibens verò, nullum. Plerique autem auxiliorum morborumque tempora, non re ipsa, sed cogitatione tantum differre existimant: quod auxilii morbiq; tempus simul incidant, interdumque eodem tempore & morbus sit, & auxiliis optima repariatur occasio. Hallucinantur autem non leviter. Nam si eadem auxiliorum morborumque tempora forent, nec re ipsa distaret, oporteret quocunque morbi tempore, tempus etiam auxilii adesse: non autem quocunque morbi tempore auxilia adhibemus, nō eadem igitur auxiliorum morborumque sunt tempora. Plerumque etiam administramus remedia, cū morbus quidem non adest, sed futurus timetur. In morbi autem vigore & impetu, auxiliis commodum tempus non est. Contrā verò in ipso uno declinationis tempore, plura quis auxiliorū tempora, & quidem opportunissima accipiet. Ad hæc, morborum quatuor tempora habentur, initium, augmentum, status & inclinatio, quę quidem in auxiliis minimē reperire licebit. Quinetiam morborum tempora, aliqua universalis, aliqua particularia sunt. At remediorum, generalia quidem describi possunt, particularia verò non item. Ex quibus liquidō constat, nō sola cogitatione, sed re ipsa etiam, distinguui hujuscemodi tempora. Ac tempora quidem id quod utile est indicare, methodici hac ratione impulsu putarunt, quod tempora nō omnia ad cibi medicamentive assumptionem apta esse cernebant: cūq; temporibus nonnullis hæc utiliter exhiberi, nonnullis verò noxię spectaret, id ob temporum discrimina accidere arbitrabatur. Quare ex eodem fonte & cibi proposita, & remediorum tempora manare profitebantur. Thessalūque inter illos fefellit Hippocrates, dicens: Quando morbus in summo est, tunc victu tenuissimo utendum. Suspiciatus est quippe, ipsum natura temporis ductum, alimenti qualitatem tunc præscripsisse, cū tamen a tempore facultatem illic mensus fuerit, ac secundum ipsius facultatis mensuram, cibi qualitatem acceperit: id quod ex ijs quę subjunxit, declarat. Conjectandum enim, inquit, an æger possit durare. Plerumque enim tempora, quod a facultate requiritur, intervertūt, & ne accipiatur impediunt: nonnunquā aut quid faciendum sit, edocent. Cū igitur id quod aliquid postulat, ejus quod postulatur propositum sit: quod verò nos postulatum sumere impedit, propositum nequaquā dicatur: utiq; morbi tempora nos interdum postulatum sumere prohibentia, proposita minimē fuerint. Neq; alia ratione constat dixisse Hippocratem, inter morbum initia si quid videtur movendum, move: vigentibus autē, quiescere melius est: quā quod circa ipsa principia, vires nondū infirmas esse intellexerit, sed

Menstruorū retentio, non est astrictio, sicuti neque fluor eorū naturalis, excretio.

Communitates evidentes non esse.

Causarum differentia duplex.

Causa externa non lædit, nisi intestina causa adsit.

Temporum differentia duplex. Causarū motionis differentia sunt quatuor. Tempora auxiliorum.

Tempora auxiliorum remediorumque non eadem esse.

In vigore morbo existente, nō esse opportuna auxilia. Declinante morbo opportunum esse auxiliorum usum. Morborum tempora quatuor.

Tempora interdum intervertere quod a facultate requiritur.

sed posse eas facile inanitiones perferre: at circa morbi statum, & invalescere causas morificas, & virtutem languidam effici, prosterni, atq; labefactari. Cui accedit, neq; impunè posse administrari remedia, cum omnia præter naturam sint, ob idq; naturales facultates infestent, nec possint adeo morbosas causas rescindere, quin unà cum illis, aliquid etiam benignæ substantiæ rapiant. Quare primum ipsam auxiliorum naturam, & usum, non ignorare oportet. Auxilia autem per se, causas extirpare non possunt, sed naturæ adminiculum postulant: & ferè solum imperum, motusq; initium naturæ injiciunt, quæ per se postea totum opus absolvit. Igitur cum est valida, remedium violentiam perfert, & bonæ ingentæque substantiæ detractionem facile sustinet, minimoque negotio ipsam divexitia excutere potest. At in morbi vehementia valde laborans, adhuc remediis adhibitis magis opprimitur, & propriis direptis opibus, infirmior redditur, & lædentibus causis magis succumbit, morbiq; auctores nullatenus potest expellere. Cum verò natura ipsa conata, discutere sibi infesta non valuit, magnoperè ex ipso conatu imbecilla efficitur. Atque his de causis, in principio quidem nō licet, movere, juxta doctrinā Hippocratis: in statu autē cessandum est. Quod autem neq; facultas ipsa indicare remediū possit, ex hoc evadet perspicuū. Nam si constans vis remedium indicat, in sanis quoque, quandoquidem in eis constat, remedium similiter indicabit. Sed in sanis remedium nō indicat, ergo neque etiam in ægris modum servans facultas indicabit remedium. Siquidem opus est, ut scopus præsentia indicet: facultas autem ipsa, quemadmodum supra est expositum, prohibere ne accipiat id quod requiritur, valet: itaque remedii scopus, ipsa nequaquam existit. Quam vicem autem in exhibendis remediis facultas gerit, eandem in dandis cibis, morbi tempora. Item, ut ad remedia se habent eorum appetentes causæ, ita & ad alimenta facultas. Facultatem verò exiguam escam postulare, nō initium, aut incrementum, inde declaratur, quod ex ægritudine convalescentibus modicum cibum præbemus, quem facultas requirit. Nam si modicum cibum incrementū ostenderet, expediret istos ad saturitatem impleri, absente nempe ipso paucum cibum indicante proposito. Ad hæc, non indicari alimenti qualitatem, quantitatemve à tempore, hinc etiam liquet. Quod genus indicat, id qualitatem indicare est necesse. Atqui alimenti genus facultas indicat: illius igitur qualitatem, quantitatemque indicabit: nam sine differentia alimenti genus indicat. Differentiam verò accipiens, & discrimē in genere demonstrabit. Quare meritò Hippocrates ciborum quantitatis scopum, facultatem statuisse videtur, ubi ait: Auge-scentia corpora plurimum habent calidi innati: plurimo igitur alimento indigent. Item qualitatem pro facultatis differentia evidenter assumit, dicens: Cibus juvenibus quidem in summo ætatis flore non mutatus: senibus autem exquisitè permutatus. Ex quibus clarissimum est virtutem absolute escarum genus appetere: differentia verò addita, qualitatem. At tempus, nec ciborum qua-

litatem, nec quantitatem ostendere. Nam si morborum tempora ciborum quantitatem & qualitatem præscriberent, aut in sui cōservationem, aut abolitionem id facerent. Primum autem est omni ex parte ridiculum. Ex secundo verò infer-tur, talem tantumq; cibum, aliqua adversus tempora contrarietate esse præditum. A solis nanque contrariis contraria tolluntur. At temporibus nec talis nec tantus cibus contrarius dicitur, cum non sub eodem genere contineantur, nec possit quod unum est, dici cōtrarium pluribus. Hac eadem ratione efficietur, ut nec remedium differentiam morborum tempora indicet. Quod autem aiunt, principium indicare, quod augmentum prohibet, scopum autem agnitiū indicare nihil, extremè ridiculum est. Cujus erroris origo ipsis ex altera falsa opinione manavit. Credentes enim quemlibet morbum transire per quatuor tempora, verisimile arbitrati sunt, ut morborum initia suppressionem incrementi indicarent. Id igitur ipsos latuit, non omnem morbum incipere, augeri, in summo cōsistere, ac declinare. Acuti nanque morbi, qualis apoplexia est, simulatque invaserunt, ad extremam ascendunt magnitudinem. Et qui judicatur morbi, uno tempore, declinatione scilicet, mutilantur. Siquidem judicationes, in sua vehementia morbos, adhuc etiam augescentes, discutiunt. Potest præterea inter initia, remediis adhibitis, deleri morbus: atque ita cætera morbi tempora præverti, succidique continget. Id præterea Methodicorum decretum est factum, quod inter morborū initia astringentibus semper utendum cēsent. Causam verò inde placitum illud accepit, quod multæ phlegmonæ per astringentia, reprimentiaq; inter initia desinant. Cum autē quælibet secundum ipsos phlegmone, astrictio sit, absurdū planè videtur, astrictos affectus per condensantia tolli: id quod se hoc nomine facere profitentur, non ut causæ reprimantur, sed ut corpora firmiora, minúsque patibilia reddantur. Quibus ita responsum velim, minimè fieri posse, ut nocentibus causis simul auctis, corpora ægrè patibilia reddantur. Cæterum quod inchoantibus phlegmonis, commodè astringentia admoveantur, ob repercussionē humorū lædentium: nō ut cōcilietur robur particulæ, ut illi existimant, nemo id non fatetur. Nam si ex astrictoria ratione firmitudo conciliaretur corporibus, cutem rigidā distentamq; præ egestate habentes, valentiores benè sanis senesq; junioribus longè vegetiores existerēt. Qui igitur corporibus robur firmitudinemque comparare studuerit, minimè qui corpus durum reddatur, cogitet opus est: sed qua ratione membrorum vires augeant, quibus liberè atque expedite proprios usus exhibeant.

GALENI PERGAMENI DE
Constitutione artis medica, li-
ber unus.



Vandoquidem divino quodā præditus affectu, Patrophile, mihi videris, ut qui omnia cū demonstratio-ne & methodo indipisci desideres, nec soli eā provinciā tibi cōmitte-re au-

Remedia
omnia esse
præter natu-
ram.

Auxilia
per se causas
morificas
extirpare nō
posse sed ini-
tium motus
naturæ inji-
cere.

Facultatem
non indicare
remedia.

Facultas pro-
hibet, ne ac-
cipiatur id
quod requi-
ritur.

Convalescē-
tibus modi-
cū cibū præ-
beri.

Tempus nec
qualitatem
nec quanti-
tatem alimen-
ti indicare.
Facultas in-
dicat alimen-
ti genus.
Facultatem
esse ciborum
quantitatis
scopum.

Contraria à
solis cōtrari-
is tolli.

Unum pluri-
bus dici cō-
trarium non
posse.

Morborum
tempora, reme-
diorū diffe-
rentiam non
indicant.

Morbi non o-
mnes quatu-
or sortiuntur
tempora.

Acuti morbi
simulatq; in-
vaserunt, ad
extremam
perveniunt
magnitudi-
nem.

Morbi qui in-
dicantur, mu-
tilantur de-
clinatione.

Morbi posse
in initio dis-
cuti

Phlegmonis
incipientibus,
comodè ad-
hiberi astring-
entia.

Robur qua
ratione con-
ciliandum
corporibus.

re audeas, statui alacritati tuæ obsecundare atque in tuam gratiam duos commentarios cōscribere, alterum in quo monstratur, quamlibet artem à finis notione suam habere constitutionē: alterū (quem habemus præ manibus) ubi ostendimus, methodum eam quæ omnes alias artes, ipsam quoque medicinam cōstituisse: id quod jam nobis est exordiendum. Cum igitur artium ipsarū aliæ quidem in sola naturæ rerum contemplatione, quas sibi proposuerunt considerandas, suum habeant finem, ut astrologia & physice: aliæ edant præterea nonnullas actiones, à quibus cessantes, nullum permanens opificium ostendunt, ut saltatoria: aliæ opificium aliquod possint ostendere, ut ars ædificatoria & fabrilis: aliæ denique nihil efficiant ipsæ, aliquid tamen aucupari conentur, ut venatoria: manifestum utiq; est, artē medicam ex effectivarum genere existere: habet. n. aliquod opificiū quod finita actione possit ostendere. Quare jam operæ precium fuerit, eandem methodū, quam in cæteris factivis artibus priori commentario tradidimus, ad hanc, quam in præsentī constituere conamur, transferre, posito hic quoque eodem principio, quod in aliis est statutum, nempe finis notione. Prima igitur quæ in nobis suboritur cognitio, est hominum rectē valentium: altera ab illa, eorundem, cum morbis impliciti sunt. Unde mox in nobis bene valendi desiderium assurgit, artēque aliquam sanitatis consiliatricem constituendi. Ut autem proponimus efficere integram valetudinem, sit ex factivarum numero ars ea futura est, quam constituere volumus. Dein, cum duplices factivæ artes sint (nonnullæ quidem res ipsas conficiunt, aliæ labefactatas instaurant, corriguntque) hæc quam investigamus, in eis potius erit, quæ rem jam factam reficiunt, quam quæ aliquid, quod prius non esset, edunt. Quemadmodum igitur illi qui ædificaturus, aut collapsas instauraturus est ædes, necessum est prius omnes ædium particulas, earumque constitutionē accuratē novisse: sic etiam qui artem, quæ circa humanum corpus versatur, constituturus est, illius partes omnes sigillatim necessario debet cognoscere: quali nimirum substantia, qua magnitudine, quali figura & numero præditæ sint, quamque inter se structuram sortiantur. Et quemadmodū ille qui extruit domū, nunquā cognitionē particularum, nisi ex resolutione assequi poterit, ita nos corporis humani notitiam, ex illius dissectione consequimur. Deus quippe & natura, instar illius qui primum ædes est fabricatus, prænorunt partes, earum officiis pro exemplari usi. Nos verò illum qui extructam domum contemplatur, imitamur. Ubi autem ex dissectione ipsa, naturā, formam, magnitudinem, numerū; & concretionē partium similiariū apprehenderimus, compositorū pariter membrorum (quæ nonnunquā & instrumentaria vocantur) scientiā assequemur. Quo fit deinde, ut duplices partium actiones in corpore reperiantur, simplicium nempe, atq; cōpositarum: cum & crur universum moveri, & sigillatim musculos ejus omnes videamus: cumque musculo quocunque per transversum resecto, necessum sit deperire ipsius motum aliquē cruris: vulneratoque nervo,

primum quidem, musculum cui inseritur, expertem motus & sensus reddi, mox verò & articulū qui ab eo movebatur. Quare hanc nobis artem constituturis, necessarium fore arbitror, etiam partium actiones cognoscere: id quod sanè ab ædicatoribus nos distinguit. Duplex igitur est, ut particularum, ita & actionum natura: una quidem prima, & maximè propria, dum pariter omnes simplices partes agunt: altera verò ex accidenti, aut secundaria, quæ totius est instrumenti. Ut, totius quidem cruris actio incessus est, qui fit, dum articuli illius vicissim nunc extenduntur, nunc inflectuntur. Ipsius porro facultatis motricis à cerebro descendens, nervus veluti via quedam est. Cerebrum nanque esse nervis omnibus hujuscemodi facultatis originem, principiumve, inde perdiscas licet, quod secto quocunque nervo, in supremis partibus, quæ cerebro continentes sunt, actiones servantur integræ, cum tamen omnes in inferioribus pereant. Incessus itaque actio est totius cruris, cui actioni musculorum præest genus. Ossa siquidem, cartilagine, adeps, glandula, arteria, cutis, venæ membranæ, ligamenta, à musculis habent initium motus. Primum enim ab ipsis ossa moventur, mox cætera una cum ipsis etiam moveantur oportet. Ad quem motum necessaria fuit optima cum ossium, tum etiam ligamentorum cōmoderatio, cōstitutioque. Ac de cæterarum partium actione & usu, similiter differendum, ut quæ optimè constitutæ sunt, servantur, quæ autem vitio nō carent, ad meliorem statum ducantur: id quod minimè nobis licebit, nisi uniuscujusque partis tum actionem, tum usum, atque adeo etiam structuram examinaverimus. Structuram porro cujuspiam rei, aut vitiosa sit, an ab omni prorsus immunis vitio, nemo perpēdere potuerit, nisi is magnitudinē, numerum, figuram, & situm omnium partium, ex quibus talis res cōstat, optimè scrutatus prius fuerit. Quandoquidē omnium instrumentariorū corporum, quæ ex compositione suam essentiam sortiantur, tum vitium, tum integritas, affectusque omnis quatuor generibus his continetur. Quod si partes unionis quoque ex natura participes sint, quintum hoc genus his addendum erit corporibus: ita ut quod in ipsis se præstantissimè habuerit, sit optimas habiturum actiones: quemadmodum pessimas, quod deterrimè. Si ergo etiā unio solvatur, talis affectio erit morbus, quem unitatis divortium vocamus, quo nō solum instrumentaria, sed similes etiam affliguntur particulae. Cæterū in osse is affectus fractura dicitur: in carnea verò musculorum parte, si cum distentione accidat, *pryma*, hoc est, scissura. Ubi autem sic filamenta tenduntur ut disrumpantur, convulsio: ubi caro citra tensionem solvitur, vulnus. In nervo dicitur affectus is, scissio. Si vulnus ab acuto telo infligatur, punctio vocatur: si à gravi, contusio: si à corrosione ortum habeat, in osse quidem, caries: in alijs autem partibus, ulcus vocatur. Tot ergo, talesque in hoc quinto morborum genere, quum simplices particulas occupat, differentia erant. Instrumentarijs verò sæpe accidunt, atque divulsiones dicuntur. Sed si similis quæpiam particula disseccetur in totum, affectio illa, partim illius

Medicam artem cōstituturis, necessaria est partium actionum cognitio.

Cerebrū esse originem facultatis motricis per nervos delata.

Musculos præesse incessui.

Instrumentariorum vitium integritatemque in magnitudine, numero, figura & situ consistere.

Unitatis solutio communis morbus est similariū & instrumentariorum partium.

Fractura. Scissura. Convulsio. Vulnus. Scissio. Punctio. Contusio. Caries.

Ulcus.

Divulsio.

illius

Ars qualibet a finis notione suā habet constitutionē Methodus quæ alias artes, ipsam quoque medicinam cōstituit.

Medicā artem, ex effectivarū genere existere.

Factivæ artes duplices.

Medicā artem ex ijs esse quæ labefactatas instaurant.

Medicā artem cōstituturam corporis humani particulas exquisitè debet cognoscere.

Deus & natura prænorunt corporis partes, earū officiis pro exemplari usi.

Actiones partium duplices, simplicium nempe, & cōpositarum.

illius quæ facta est, dicetur, partim totius instrumenti: quamvis nonnunquam huius non nisi ex accidenti dicenda sit, ut cum aliquis musculus patitur. Quâdoque autem etiam primum, ut cum aliquod ligamentum: quemadmodum igitur in hoc uno morborum genere fecimus, sic in alijs quatuor differentiae tibi scrutandae sunt. Quibus examinatis, nosse oportet, possit ne pars quæpiam in

Carne refecta, similem instaurari posse. Nervum aut ligamentum scissum, reficere, rursus non posse.

Carnem ex sanguine, nervos ex semine generari.

alterius locum restitui, an minimè. Quandoquidem si refeceris carnem vitiatam, facile poteris similem aliam reficere: secus autem si nervus, vel ligamentum dissectum fuerit. Neque enim alia refarciens, qualia erant priora: cum illa quidem ex sanguine generetur, hæc verò ex semine ducant originem. Os quoque in ijs est, quæ per primam efformationem constructa sunt. Cæterum in locum ipsius aliquid suggerere possumus, quod ossi quam simillimum sit. Verum jam methodus ipsa nos cogit ad inquirendum, utrum unaquæque pars, earum quæ & simplices, & similes videntur, unum sit, an potius ex pluribus constituta: & præterea, quis sit earum compositionis modus. Quæ inquisitio, quavis non philosophis modò, sed etiam medicorum nonnullis admodum sit visa difficilis, ij tamen quibus adsint septem adiumenta quæ subdam, facile cum illius, tum aliarum omnium difficultatum, ipsam veritatem inveniunt: aut si minus, saltem non omnino de inventionem desperabunt.

Adiumenta septem ad veritatem in abstractis rebus perestigandam.

Septem igitur illa sunt, natura perspicax, educatio optima, præceptores ingenui, labor improbus, veritatis ardentissimus amor, optima methodus, exercitatio denique assidua. Quorum si vel unum desideretur, qui ad viam veritatis introducendus est, non est admodum sperandum, illum posse sui voti compotem fieri: si verò omnia cumulata adsint, quid deinde vetat, quo minus veritatem, bona etiam spe, exquiramus? Revertamur autem eo, unde digressa est oratio, disquiramusque primum, an carnis (exempli gratia) elementum, unum specie sit. Deinde verò, si secus videatur, an plura. Mox quot ea sint, & quæ, & quem

Carnis elementum non esse unicum.

habeant compositionis modum. Profectò si caro cum vel secatur, vel impenitus calfit, dolet, fieri nequit ut ex uno elemento constet: ut ex atomo, quemadmodum Epicurus existimavit. Quare pulchre divus inquit Hippocrates: Si unus existat homo, ne utiquam dolebit: quia in alterum nequit mutari, si unum est, cum nihil præterea relinquatur, in quod mutetur. Quod si est mutationis, erit quoque alterationis expers, atque impatibile, ac proinde nulli dolori obnoxium. Si itaque elementum carnis esset specie unum, nunquam illa doleret: dolet autem, igitur elementum carnis non erit specie unum. Rursus, si impatibile esset elementum carnis, non doleret: atqui dolet, non igitur est impatibile. Quibus rationibus subvertuntur dogmata eorum, qui tum atomos, tum similitudines, tum elementa quatuor, sed quæ mutuo inter se transmutari nequeant, introduxerunt. Quippe si duos digitos simul committas, moxque disjungas iterum,

Carnis elementum non esse impatibile.

neque eorum conventus, nec diductio, aliquid excipiat dolorem. Ut enim aliquid dolet, ita patitur. Siquidem pati, ab his duobus prodit, ab alteratione per totum, & à continui dissolutione. Quandoquidem igitur nec conventus, nec sepa-

Pati contingit aliquid, ob alterationem & solutionem continui.

ratio corporibus vel manifestò patibilibus, ullum adfert dolorem, minus profectò adferet impatilibus. Etenim quodcumque in dolore futurum est, necessum habet, ut cum patiendi, tum sentiendi facultate præditum sit. Nulla tamen necessitas cogit, id quod sentit, ex illis primis constare, quæ ipsa etiam vim habeant sentiendi: nam sat erit si ex patibilibus sit. Dū enim patientur, alterabunturque, poterit aliquam sentiendi vim assequi. Cum

Dolitur corpus idem esse, debet patibilis, & sensibile.

Sensibile corpus non necessarium ex sensibilibus constitui.

innumeræ possint esse alterationes elementorum, unde mox innumeræ particularum poterunt proprietates oriri, sic ut aliæ evadant sensus expertes, aliæ illo præditæ sint. Ex dictis igitur constat, elementa esse plura uno, eaque alterationi esse obnoxia: nunc verò numerus eorum nobis investigandus est. Necessum autem est, ut illa quæ rem quampiam alterant, primum quidem illud contingat, quod ab eis alterandum est, atque ita mox ipsum tandem immutent, idque per tactiles qualitates, quæ alterare totam proximæ rei substantiam possunt: cuiusmodi sunt caliditas, frigiditas, humiditas, atque siccitas: quæ quidem activæ qualitates planè & sunt, & dicuntur: ex eisque vel maximè oppositio prima, atque in hac ipsa, caliditas. Præter has quatuor, nulla reperitur qualitas, quæ corpora quibus occurrit, alterare per totum possit. Unde si nivem ad minima usque secueris, nix quidem servabitur: sed simulac calfiat, definit actutum nix esse. Quare quaecumque corpora

Elementa esse tum plura uno, tum alterationi obnoxia.

Alterationem fieri absque contactu non posse.

Tactiles qualitates.

Activæ qualitates, caliditas, frigiditas, humiditas et siccitas.

has quatuor qualitates sibi vendicaverint primum, erunt omnium corporum elementa: sunt autem hæc, terra, aqua, aer, ignisque. Ac proinde universi, qui demonstrationi parent, philosophi, hæc esse omnium quæ gignuntur, intereuntque vera elementa, necnon mutuo se transmutare, habereque omnia subjectum quoddam commune, autumant. Igitur ex quatuor elementis simul contemperatis, corpus unum simile gignitur: quod pro varia temperamenti ratione, aut particeps sensus, aut illius expers evadit. Unde corporum similitudinem differentiae, quæ simplices quidem sunt, tot sunt, quod elementa: calidiores nempe, frigidiores, humidiores, atque sicciores. Totidem verò & compositionis, ut quæ simul calidiores & humidiores sunt: quæque frigidiores & humidiores: & præter has, alia tertia, siccior atque calidior: & quarto deinde loco, quæ siccior est, & frigidior: sic tamè, ut quæ temperatissima est, & horum omnium prima, non negligatur. Cum igitur abundè sit jam ostensum, similitudinem partium integritatem & vitium, in elementorum tum moderatione, tum immoderatione consistere, superest ut inquireamus, quomodo ab earum vitio morbus sit distinguendus. Distinguetur autem à rei cuiusque notione. Porro salubris constitutio corporis, actiones sibi ex natura debitas, inoffensas habet: morbosa, offensas. Idcirco si quis sanus quidem sit, altero tamen, qui itidem prospera valetudine fruatur, actiones habeat imbecilliores, erit sanè is intemperatior illo, nec dum tamen ægrotat. Itaque inter salubres habitus universos, unus erit temperatissimus, octo autem intemperati. At inter morbos, nullum temperatum invenias: eundem tamen numerum complent, quem intemperaturæ salubres. Ac de his hætenus. Deinceps autem dicendum est, quo

Elementa omnium sunt, terra, aqua, aer, ignisque.

Similitudinem corporum differentias simplices, tot esse quot elementa, totidemque etiam compositiones.

Similitudinem partium integritatem et vitium in elementorum moderatione immoderatione neque consistere.

Morbos quæ distinguendos à vitio similitudinem particularum.

Morbi tot sunt quot constitutiones salubres.

modo

modo quis morbos curet, quo modo & sanitatē tueatur. Enimverò medendi Methodus ex ipso cum sanorū, tū ægrorū corporū affectu, suū principium habet. Cum. n. id qđ exquisitè sanum existit, omni ex parte sit moderatū: qđ verò ægrum, immoderatū: advertendū in primis est, quānam ea sit illius immoderatio. Quippe necessariū est aliā inveniri immoderationē contrariam, per quā illam exterminemus. Reditus siquidem ab immoderatione ad temperiē, in omnibus erit per immoderationē contrariam. Ut tandem necessum sit, id quod præter naturam affectū est, dum ad naturalem statum redit, illam eandem quasi viam incedere, quam prius cōfecerat, præterquā quòd ordine contrario. Quare generalissimus curandorū morborū scopus erit, Contraria contrariis remedia esse, & particularibus particularia cōtraria. Calido enim morbo, frigidum: & frigidum calidū. Ita etiā sicco, qđ humectat: humido quod exiccat. In similaribus siquidē res se habet hoc modo. In instrumentariis autem, oportet in unoquoq; prædictorū quatuor generū, morbofæ immoderationi eo usq; adhibere contrariam, donec ad moderationē, naturalemq; statum per ventum fuerit. Ut, si (exempli gratia) caro plus quā par sit, ulceri excreverit, erodenda est. Sin autem nimis cavum sit ulcus, implendum. Similiter & in aliis faciendum. Considerandum autem in omnibus generibus est, num habeamus facultatem, ea quæ ex indicatione se offerunt, per

Reditum ab immoderatione ad temperiē, per immoderationē contrariā fieri debere.

Contraria cōtrariis remedia sunt.

Morbi species curationē tantum indicat.

Natura quæ nequeat præstare, & quæ possit.

Medicū esse naturæ ministerium.

Naturam nihil ex iis quæ a semine ortæ sunt, posse denuo reficere.

Remediorum universū genus in quibus consistat.

fit, absolvisse putandus est: his omnibus redactis in capita duo, nempe corporū cognitionem, quibus remedia offerenda sunt, atq; ipsam remediorum naturam. Verum hoc mox illi quoq; supererit, ut sibi aliquā affectuum omnium dignoscendorum facultatē compareret, maximè verò eorū, qui partes in alto sitas occupant: quos exactè cognoscere, unā cum affectis particulis, haud fuerit obvii cuiusq;. Quocirca de his etiam aliquid impræsentiarum dicendum. Tria sunt genera rerum præter naturā. Primū, affectus qui lædunt naturales functiones. Secundū, horū causæ. Tertium, symptomata. Sed causæ potissimū appellantur, cum agunt: quāvis ita nonnunquā dicantur, quòd vim habeant agendi. Symptomatum verò genus in tres differentias digeritur: in actionis læsionem, in ea quæ corpori accidunt, & in excrementorum exuperatias. Quocirca omnium symptomatum existit causa ipse affectus: ob idq; merito ex illis agnoscitur. Symptomatum porro nonnulla affectus ipsos necessariò concomitantur. Alia non ex necessitate, sed aut sæpius, aut rarò, aut æqualiter. Sicuti alia rursus, affectuum differentias necessariò sequuntur: quædā sæpe, alia rarò, alia in ancipiti sunt. Ea itaq; symptomata, qđ morbos ex necessitate sequuntur, quòd affectuū in se cognitionē habeant, dicuntur Græcis pathognomonica, & pro morborū notis habenda sunt. Quæ verò non necessariò, ea vel morbi differentia, vel illius mores, vel magnitudinē indicant. Utrorūq; autē vim uno eodemq; aperiamus exemplo. Costas succingens mēbrana teneatur inflammatione: quæ affectum necessariò sequetur tumor præter naturam, robur, & dolor veluti pungens circa ipsas costas: quoniā est substantia affectæ partis membranea. Latè etiam vagabitur dolor, quòd ea ipsa membrana latè etiam diffunditur. Febrim quoq; tum ex ipsa phlegmone, tum ex vicinia cordis, sequi necessarium est. Quorū si vel alterum desit, jam nō ex necessitate febris aderit. Nam si digitus inflammatione laboret, aut costas cingens membrana * scirrhus, œdemateve affligatur, nō continuo adoriatur febris. Quin & spirandi difficultas incidet, quam affectus ipse producet, potius quā læsa pars. Dolor nanq; respirationis operā (ejus usu nondum expleto) dissolvit: ut mox necessum sit alterā celerius illi succedere actionem, unde spiritus frequēs & parvus redditur. Aderit etiā, præter eam quæ sejungi à febre nō potest, & pulsuum quoq; alteratio, nempe durities tensioni juncta: quia pars phlegmone obsessa, nervosa est. Cum autē duplex sit ea tunica quæ costas velat, si ea pars quæ exterius ossibus hæret, valde aliquando laboret, facilius ægri in latus decumbūt oppositū. Nam si decumbant in læsum, cōpressio molestiā adfert. At si interior (qđ frequentius contingit) vehementius dolent, si in oppositum latus reclinent, cum nimirū pensilis sic reddatur inflammata particula. Quòd si utraq; membrana afficiatur, par in utroq; latere decubitus fuerit. Ad hæc, si inflammatio in supremis illius partibus excitetur, clavicula trahi deorsum videtur. Si in infernis, dolor præcordia pertingit. Quamobrem exigua inflammatio erit, & secundū partes costarū

Rerum præter naturam esse tria genera.

Affectus.

Causæ.

Symptomata.

Symptomatum differentia tres.

Affectū cognosci ex symptomate.

Pathognomonica.

Pleuritis Symptomata.

Dolorem lateris exolvere respirationis operam.

medias, si in neutram se inclinet partē. Quod vero tenue quid, purulentumq; ex inflammata effluat particula, cum ex morbo ipso, tum ex parte læsa procedit. Suboritur etenim inflammatio ex humorum affluxu. Ubi igitur multus, tenuisq; is humor fuerit, qui influit in inflammata partem, atq; pars etiam ipsa est rarior, plurimum est quod effluit. E contrario autem, si fluxio fuerit tum exigua, tum crassa, corpusq; præterea densum, minimū erit quod transfundetur: ac proinde excitabit tussim, ita ut nihil inde excernatur.

Quemadmodum si copiosum fuerit, tussient plurimum, nec parum expuent. Hunc itaq; affectū semper ac necessario sequitur tussis. Sreatus autem post tussim, non semper: at majori ex parte.

Quod sputo rejicitur, necessum est semper esse infectum colore, non tamen perpetuò eodem, cum nec excrementū in inflāmata particula semper sit ejusdem naturæ. Etenim cum sanguinolentum fuerit, biliosum ve (ejusmodi siquidem ferè semper ea fluxio est, quæ in pleuriticis phlegmonem gignit) à detento succo in inflammata particula, sputū colore inficitur: rubeo quidem, si sanguineum id fuerit: flavo autem, si biliosum.

Cæterum si pituitosus primū fuerit is succus, qui & conclusus demū putrescat, ac deinde sit in causa fluxionis gignentis phlegmonē, tunc spumosa excreantur. Sed quandoq; cernitur sreatus niger, dum biliosa, sanguinolentave fluxio præassatur. Quare omnia hæc, cum partis affectæ, affectusque ipsius dignotione, etiam fluxionis indicant differentiam. Ex dictis igitur constat, per necessariū esse ad affectus, lociq; affecti inventionē, tum uniuscujusq; affectæ partis substantiam, actionemq; , tum ejusdem cum vicinis consortium callere: necnon morborū & symptomatum genituras, adeoq; morborum effectrices causas, prius investigasse. Porro in nuper proposito exemplo, perniciosissimus succus est atra bilis: omnium mitissimus, sanguis. Medium in simplicitate & malignitate reliqui duo obtinēt. Ex symptomatibus autē, ut nihil omnino expuere, perniciosissimū est: ita sreatus facilis, saluberrimus, præcipuè si concocta expuantur. Pulsuum etiam symptomata morborū mores ostendunt: sicuti & quæ lege consortij accidunt, ut deliria, somni quidam inexpugnabiles, fastidia, urinæ, dejectionesq; alvi. Ex quibus omnibus erit pendenda ratio cum prælagendi, tum cōmodè utendi remediis. Prælagia nanq; , & medicum ab omni mortis culpa reddunt immunē, & ægros ad obtemperandū faciles, occasionemq; remedium præmonstrant. At verò quod aptus remedium usus, id sit, quod in arte est præcipuum, liquet. Jam excrementorū species, multorū notitiam adfert, cum & corpus secum cōnexum habeat, è quo illa excerni videmus. Locus autē per quem fit excretio, poterit certius nos ad affectas partes perducere. Nam si per inferiorem alvum, membraneum quid excernatur, ulcus indicabit in intestinis. Si per superna vomatur, in ventriculo. Si per tussim excreetur, abradi tunicas asperæ arteriæ, indicium erit. Sicuti si mingatur, vel vesicam, vel pudendi meatū. Sed non parū præterea ad rem faciet, ea quæ primario affectu, ab

iis quæ per consensum laborant, distinguere. In universum autem maximè necessariū est ad com-
modum remediorū usum, partis, quam curaturi sumus, substantiam, figuramq; , & positum, accurate cognoscere. Substantia enim affectus primos, qui in intemperie consistunt, quantū à naturali statu aberrarint, ostendit, quantumq; refrigerare, calfacere, humectare, aut exiccare oporteat. Figura verò, morbos qui ad ipsam spectant, eorumq; magnitudinem indicat: necnō quousq; sit opus ad naturalem habitum per contraria reducere. Obstructiones autem ad hoc genus pertinent: quanquā habent aliquam cōmunionem cū illis indicationibus, quæ desumuntur à situ: de quibus jam agam, uno proposito exemplo. Obstructio affectus est partium instrumentariarum, qui præcipuè jecori solet negocium facessere. Nam venæ quæ à portis oriuntur, per universam hujus visceris partem cavam disseminatæ, tandem illis quæ in gibba sunt, per quædam oscula sensum effugientia applicantur. Univerſum verò alimentū, ex ventriculo in hunc unum locum qui ob id ipsum, quod nuper diximus, porta appellatus est, suggeritur. Quemadmodū enim in urbes nihil invehiri nisi per portas potest, ita ferri nihil potest in jecur, nisi in hunc prius locum feratur: unde in totam jecoris partem cavam demittitur: inde verò, per eos quos diximus terminos, in ipsam gibbam. Quare nihil mirum videatur, si viscus hoc, & ob viarum angustiam, & ob copiam pertranseuntis substantiæ, assiduè obstructionibus corripiatur. Ei igitur curatio adhibenda est, prius quàm obstructiones excreſcant, atq; accendatur febris, tum cibis tum medicamentis attenuantibus administratis. Nam si auctæ illæ fuerint, evacuatione erit opus: quæ per quem locum molienda sit, mēbri figura & situs dictabunt. Quippe si quid jecoris cavo adhærescat, id per intestina detrahemus. Quæ autem in gibbo comprehenduntur, urinam cientibus evacuabimus. Eodem etiā modo, quæ in pulmone & pectore delitescent, per tusses sunt expurganda: si sim.

Quæ in cerebro sunt. Nec minus à membri figura & situ desumpta ratio est, sanandi phlegmone detentas particulas. Siquidem fluxiones quæ decubuerunt in coxam, infectis venis in poplite aut in talo, evacuemus: & eas pariter quæ in utero cōprehensæ sunt. Quæ in thorace aut pulmone, per cubiti interiorē venam. Sicuti eas quæ in capite & collo, per humeralem. Ea quippe vacuatio facillimè & optimè fiet, quæ per vicinas venas, & affines parti affectæ, fuerit administrata. Porro & suam ex morbo habet indicationē, in halitū difflandum esse, quod in inflammatū locum defluxit. Situs tamen affectæ partis, varium deinde insinuat particularium auxiliorū usum. Etenim quæcunq; in summa cute ortum habent, tale exposcunt difflatorium remedium, quale ipsa indicat inflammatio nis species. At quæ in profundo, eò egent medicametis acrioribus, quò magis ab exterioribus recessere: ut quandoq; cucurbitulis sit utendum, si sedem plurimū profundam habeant, quod tamen inflammationibus, quæ in summa cute consistunt, quam adversissimum est. Nec minus etiā

Substantia partis quid indicet.

Figura partis quid indicet.

Obstructionē esse affectum partium instrumentariarum.

Porta vena cur sic dicatur.

Jecur assiduè obstructionibus corripitur.

Jecoris partes causa gibba, & p quas regiones purganda.

Pulmonis pectorisq; excrementa expurganda per tussim.

Vena secunda ratio in fluxionibus quæ decubunt ad coxam, uterum, thoracē, pulmone, caput, & collū.

Vacuatio omnium optima qua.

Situs variæ auxiliorum particula-rium sum.

Cutis summa affectus, quæ lia remedia postulent.

Profundarū partium affectus quæ lia remedia postulent.

Concubitulis uten- tur in affectibus aliis suis.

situs

Effluxus ratio.

Pleuritimæ necessario sequitur tussis

Sputorum colores varij ob varietate humorum gignentis pleuritidem fiunt.

Atra bilis perniciosissimus succus.

Sreatus qui saluberrimus.

Prælagiorum virtus.

Remediorum usus aptus, est in arte præcipuum.

Excrementorum species. Locus per quem fit excretio.

situs loci æstimandus est, quando astringente medicamento opus fuerit. Quia si medicamentum ipsum astringens potest eo pervenire, nihil vetat quo minus ipsum administremus. Sin minus, cavendum tunc, ne humorem ex vicinis partibus in affectum locum pellamus. Quare vel aliquid admiscendum astringenti medicamento est, quod eo virtutem illius perducatur: vel ab illius usu in totum fuerit superfedendum. Ac de his quidem jam dicta sufficiant. Deinceps nonnihil de præfagio dicendum, cuius artem qui constituere voluerit, is necesse habet prius examinasse, an sicuti cuilibet rei animatae proprii vitæ spacium constitutum est à natura, sic etiam omnibus morbis: ut nullo deinde pacto, si sit alicui illorum à natura constitutum bimestre tempus, possit is quatuor diebus absolvi: an verò & in longum protrahi, & celerrimè possit finire. Ubi igitur excrementa in locum aliquem decubuerint, nec defluant amplius, si cuiusq; humoris naturam exploraverimus, facile artificiali quadam cōjectura concoctionis rationem & tempus deprehendemus: modo cætera omnia rectè circa ægrotantem tractentur. Nam quicquid erroris fuerit in his commissum, erit profectò in causa, ut vel serius morbus solvatur, vel mors celerius adveniat. Quare tunc sanè præfagia sunt eventura, ubi & medicus præstantissimus fuerit, & æger in nullo delinquat. Medicus igitur his duobus, morbo inquam & naturæ, veluti colluctantibus, semper mentè intendit: ac dum discernit quòdnam horum robustius sit, primum quidem suum de salute hominis aut interitu, præfagium depromit. Dein verò, quò alterum altero fortius esse novit, eo & illius præfinitum tempus agnoscit. Ut enim celerrimè morbus solvèdus est, si vires sint validiores: sic citò mors advètabit, si hæ imbecilles fuerint, morbus autem vehemens. Sed magnitudo excessus horum temptus indicabit. Naturæ robur ex propriis illius actionibus comprehendes, maximè verò expulsi. Siquidem is, facultatis vitalis est opus. Morbi autem magnitudinè cognoscas ex suis symptomatis. At quatenus alterum altero prævalet, concoctio cruditasq; indicabit: quas subinde ex propriis excrementis cognoscas. Quæ enim in ventriculo conficiuntur, dejectiones cōmonstrant: quæ in vasculis, urinæ: quæ in corpore universo, sudores. Quo etiam modo & reliquæ concoctiones omnes se habent, quæ in una quapiam parte, aut pluribus absolvuntur. Quibus omnib. commune est, nunquam morbum solvi posse, nisi prius in excrementis, concoctionis signa cernantur. Nam ut concoctiones omnes celerem crism, salutisq; securitatem indicant, sic cruda, & quæ in pravos vertuntur abscessus, vel nullam crism, vel labores, vel tempus prolixum, vel mortes, vel recidivas declarant. Ac jam mihi videtur universa methodi Methodus (quæ formam tantum, ac veluti universalem speciem totius negotij continet) ad finem suum pervenisse. Reliqua autem nunc fuerit, ut modum aliquem, quo quis posset eos, qui à morbis sunt liberati, reficere: prospicere autem iis, qui in morbos proclives sunt: ac eos deniq; qui inculcata fruuntur corporis valetudi-

ne conservare, doceamus. Ergo ex symptomatibus, quæ medium inter ea quæ sanis insunt, & ea quæ eveniunt ægris, servant, deprehenditur ipsa in morbos proclivitas. Affectiones verò quæ talem proclivitatem gignant, per contraria sunt corrigendæ: si tamen hæc res summam tractanda est: nam si transigenda particulatim, omne exuberans est vacuandū: sic ut prius sit distinguenda exuberandi ratio, quantitatis an qualitate, aut utraque etiam ratione exuberet. Ac deinde, quod potest iterum ad naturalem statum redire, sic per contraria alteretur, ut quod crassum lentumq; est, tenue fiat: quod tenue, crassius reddatur: ambo verò pariter concoquantur: obstructions præterea aperiantur: quæ toto genere existunt præter naturam, quemadmodum venena animalium, tum alterentur, tum evacuentur. Alteratio autem per contraria fiat, quæ vel tota substantia adversantur, vel altera, vel utraq; qualitate. At evacuatio, per ea quæ trahendi vim habet. Cæterum hæc omnia quibus sint peragenda remediis, ab ipsis morbis petendū est. Quin si omnes pariter humores accreverint, præcipua ipsorum vacuatio erit per sectam venam. Deinde verò per frictiones, per exercitia, per balnea, per inediam. Nec alia etiam erit vacuandi ratio, cū solus sanguis excesserit. Ubi autem flavæ vel atræ bilis succus, vel serosus humor contineatur in primis venis, purgandi tales humores sunt iis, quæ alvum commoveant. Si in aliis tenuia & aquosa excrementa fuerint, per urinā: si biliosiora, per purgatoria. Possunt tamen & tenuia etiam alvi dejectione purgari. Sed quæ totum corporis habitum occupaverint, cū tenuia fuerint, aut sudore, aut medicamentis, quæ cuti applicita, vim exiccandi habent: cū verò biliosa, primum quidem purgatione egent, mox evacuatione per cutim. At cū pituitosus succus exuberarit, si salus sit, est purgandus. Si acidus, experiendum an possimus eum alterare: & longè etiam magis si dulcis fuerit, erit enim is cōcoctū facilior. Porro ad concoctionem conducit quies, calfactio modica, cibi parcus usus, boni tamen succi, potus vini parū calfacientis, moderata frictio, mediocris usus calidarum aquarum, insuperq; cibi atq; medicamenta moderatè calfacientia. Obstructions referant quæcunq; vel esculenta, vel medicamenta attenuantia. In quibus autem nulla causa, nullusq; affectus præter naturam est, sed cum gracilitate, sola imbecillitas virium, ij facile in naturalem habitum reducentur, si moderatis cibis & motionibus reficiantur. At materias quibus hi alendi instaurandiq; sint, in opere de sanitate tuenda explicuimus. Ne tamen deesse aliqd huic sermoni videatur, non modò ipsius analeptices, sed universi etiam salubris negotij methodus, hoc quoq; loco repetenda est. Si solum hoc eveniret corpori, ut in halitus diffilaretur, & subinde inaniretur, cibus potusq; defectū illum sarcire posset. Quia verò humorū copia, pravaq; excrementa gignuntur, egemus exercitationibus: quarum nimirum est munus, superfluum succum vacuare, excrementa verò cōcoquere & expurgare: si tamē causæ omnes vitentur, à quibus solet vitari sanitas, refrigeratio inquam, æstus,

Medicinam esse numero lassitudo, cruditas, temulentia, ira, furor, & con-
facturarum similia. Ergo ut universam medicinæ rationem
artium, qua per capita resumamus, medicina est è numero fa-
vitiata refi- ctivarum artium, quæ res vitiatas reficiunt. Ea
ciunt. autem sibi exemplar nullum confingit, sed con-
Medicina templatur quidem omnia ex corporis affectio-
ancillatur ne: ac dein, si quid vitij sit, corrigere id conatur.
natura. Sed hoc differt ab aliis artibus, quod maxima ex
 parte se operanti naturæ ministram præstet.

GALENI PERGAMENI

de partibus artis medicæ lib.



Romanis esse Non absq; ratione mihi quidem, Ju-
medicina ar- ste charissime, de partibus artis me-
tem multi- dicæ dubitare videris: quippe cum
plicem. alios alio modo eas partiri animad-
 vertas: idq; maximè Romæ, ubi ar-
 tē ipsam medicā, in mēbra innumera refecāt: ita
 ut alios ocularios medicos vocent, alios auricu-
 lares, & eos etiam qui ani cristis medentur, pecu-
 liari suo nomine appellēt, totq; in summa medi-
 cos faciant, quot sunt corporis humani particu-
 læ. Quanquā certè mirum non est, si ars ea, quæ
 omnium maxima sit, tot in se admittat sectiones:
 atq; etiam, si in maxima civitate, pro unaquaq;
 harum statim aliquis reperiatur, qui inde dica-
 tur medicus. Neq; enim in oppido quodam exi-
 guo posset quis victum sibi parare, qui tantum
 suffusiones pungeret oculorum, aut hernias in-
 cideret. Roma verò & Alexandria, præ morta-
 lium in eis multitudine, possunt quencunq; ale-
 re, qui vel unicam tantum ex artibus his profi-
 teatur. Unde hujuscemodi medici urbes Græciæ
 sæpe mutare coguntur, ut idem tota Græcia illis
 afferat, quod aliis qui in Italia sunt, sola Roma.
 Igitur ut sermonem, quatenus ego sentio, insti-
 tuam: quemadmodum in corporis humani se-
 ctionibus, particulas omnes ad minimam usque
 scrutamur secundū speciem, quæ elementa etiā
 sensibilia appellantur: si artium minimas oportet
 etiam investigare particulas, quæ & ipsæ sint
 earum sensibilia elementa. Etenim instrumentū
 quoddam est caput (exempli gratia) cujus par-
 tes, præter alias, sunt aures & nasus. Harū quæli-
 bet in alias dividitur, ut puta in carnem, nervum,
 venam, arteriam. Arteria duplici tunica constat:
 quarum altera obliquas habet fibras, altera re-
 ctas. Quas fibras non amplius in aliam quam-
 piam speciē partiri possumus, utpote minimas
 & individuas specie. Ex eis autem unumquodq;
 instrumentorum contextum est. Pro istius itaq;
 exempli similitudine, punctoriā suffusionū ar-
 tem, talem universæ artis medicæ partem existi-
 mabimus, qualis ea est corporis pars, quam in-
 strumentū sive organū appellamus. Cujus una-
 quæq; particula, proportionē respondet sensibi-
 libus corporis elementis. Hujuscemodi artis par-
 tes sunt, theoremata, sive notiones. Quarū pri-
 ma est cognitio illius instrumenti, quod est pun-
 gendum. Secunda, illius particulæ hujus instru-
 menti, ubi pungerē oportet. Tertia est mensurā,
 pro affectus ratione. Quarta conversionem re-
 spicit. Quinta remotionē suffusionis è loco quē
 occupabat. Sexta circa astrictionem versatur.
 Atque hæ sunt notiones ultimæ & minimæ, quæ

in alias simpliciores haud quidem secari susti-
 nent. Universa tamen ratio curandi suffusiones,
 aliis quibusdam notitiis eget, & illis quidem du-
 plicibus secundū genus. Sunt autem hæ, prima
 quidem præparatoria. Secunda verò illa, quam
 apothérapeuticē Græci vocant. Siquidem si
 quis velit aliquem nimis repletū, aut pravis ple-
 num humoribus, vel etiam dolentem secundum
 caput, ad hujusmodi operationem deducere, is
 inflammationes in membranīs quæ punctæ fue-
 rint, facile excitabit & malè universum caput
 afficiet. Quod ne fiat, arte præparatoria erit o-
 pus: cujus institutum est, totum corpus ab ex-
 cremētis, succisq; exundantibus vacuū, atq; etiā
 caput ab omni dolore immune reddere. Nec ve-
 rò eodē modo se habet notitia inflammationis
 curandæ, quo illam se habere diximus, qua suc-
 currendum est suffusionibus. Quin etiam alia est
 ars curandæ inflammationis secundum genus:
 alia ejus, quæ ex certa particula definitur: ut
 ophthalmiæ, quæ inflammatio externæ oculo-
 rum tunicæ existit: aut peripneumoniæ, quæ pul-
 monis: aut pleuritidis, quæ membranæ costas
 ambientis. Porro si secundum corporis affectio-
 nes velit quis ipsam artem partiri, primæ maxi-
 mæq; ejus partes erūt, curatrix, salubris, prophylactice,
 analeptice, senum custodiendorū ratio, educatrix
 infantium, necnon optimi habitus cōciliatrix.
 Est tamen & alia partitio, quæ à ratione operationum,
 & earum differentiis depromi potest, quemadmodum
 chirurgicē, pharmaceuticē, & diætericē, esse primas
 atq; præcipuas artis medicæ partes pronunciant.
 Quæ partitio quibusdam penes materierum differenti-
 as fieri videtur. Nam cum omnis particula corporis
 juvari & servari possit, aut victus ratione, aut medi-
 camentis, aut manuum opera, inde tres illas me-
 dicinæ partes distinxisse videntur. Dicamus itaq;
 primas, & proprias, & quam maximè esse artis
 medicæ partes eas, per quas ipsius artis finem cō-
 sequimur: alias autem esse his superiores. Ac tot
 quidem secundum numerum primæ proximæq;
 sunt, quot sunt maximè propriæ rationes me-
 dendi. Licebit porro medicam ipsam artem in
 suas partes dividere duplici modo: uno quidem,
 si sumamus initium ab ipsius artis prima ac ma-
 ximè propria materia, ut constat per multumem-
 brem illam divisionem, quam assignavimus. Al-
 tero verò, à secunda materia, nec ita propria, hoc
 est, à corpore humano (quod quidem per acci-
 dens, eatenusq; artis medicinalis, necnon philo-
 sophiæ materia existit, quatenus sanitatē & mor-
 bum recipit, generationemq; & interitum subit)
 initio divisionis exordio. Ceterū non modò par-
 titio quæ ex hujusce materiæ sectione elicitur,
 ad ultimas usq; deducitur, & elementares ipsius
 artis particulas, verū & illa etiā, quæ à præcipua
 totius artis materia oriebatur. Præterea aut & a-
 lio modo fieri hæc artis partitio potest, si unum-
 quodq; morborū propositū genus, per proximās
 differentias ad ultimas usq; particulas animus sit
 dividere: quæ partitio si rectè fiat, consequenter
 etiam perveniet ad elementares usq; notitias. Ni-
 hil igitur est, cur ex multiplicitate partitionū tur-
 beris. Quin potius tecum perpende, an nihil sit
 præter-

*Suffusioni cu-
 randa quæ vo-
 tiones sint ne-
 cessariæ.
 Notitia præ-
 paratoria
 Notitia apo-
 therapeutice.*

*Pūgi debere
 neminem ex
 suffusis,
 ante vacua-
 tionem hu-
 morum pec-
 cantium.*

*Ophthalmiæ
 quid.
 Peripneumo-
 niæ quid.
 Pleuritidis
 quid.*

*Medicina
 partes secū-
 dum corporis
 affectiones.
 Medicina
 partes secun-
 dum opera-
 tiones dictas.*

*Partes serva-
 ti victus ra-
 tione, medi-
 camentis,
 aut manu-
 um opera.*

*Medicina
 partes maxi-
 mæ propria
 sunt, per
 quas artis fi-
 nem conse-
 quimur.
 Medicina
 partitio du-
 plex.*

*Corpus hu-
 manum ex
 accidenti di-
 ci subiectum
 medicinæ phi-
 losophiæ.*

*Punctoria
 ars.*

Theoremata

prætermisum, ex iis quæ occurrere possunt.

*Medicina di-
visionem or-
diendam es-
se à maximè
propria ipsi-
us artis ma-
teria.*

Optimum tamen iudicio meo fuerit, si initium à maximè propria sumpserimus ipsius artis materia: cui mox ex prædicta methodo addiderimus cætera.

GALENI PERGAMENI. de elementis lib. I.



*Elementum
est minima
rei, quam cõ-
stituit, por-
tio.
Sensum non
esse iudicem
priorum
elementorũ.*

Quandoquidem elementũ est minima rei, quam constituit, portio: nec id ipsum quod videtur, est etiam re- vera minimũ: manifestè sanè liquet, sensum minimè eorũ fore iudicem, quæ verà, & ex ipsa natura sunt rei uniuscuiusq; elemēta. Idcirco nos cum Hippocrate, neglectis iis quæ prima, sensus iudicio, simplicissimaq; habentur, illa statim quæ verè sunt naturæ humanæ elementa, quæq; in alia dissolvi non possunt, nec minus curandis morbis ex usu sunt, quam hæc, quæ sensui talia videntur, summo studio inquiramus: nempe an unum tantũ specie, an plura potius & dissimilia sint. Quod si non tantũ unũ, sed plura sint atq; varia elementa, quærendum rursus, quot nimirum sint illa: sicuti & quæ, & qualia, quamq; inter se tandem cõmunionem fortiantur. Quod igitur primũ id elementũ, ex quo tum nostrum, tum aliorum omniũ corpora constant, nec forma, nec potestate sit unum, hac docet ratione Hippocrates. Si homo esses unum, neutiquam doleret. Quod si doleret, unicũ ne-

*Elementum
corporum nõ
esse unum.*

cessariò medicamentum desideraret, rectè quidem ille & brevissimè totam rei summã demonstrans. Nam si homo esset unum, hoc est, unico ex elemento conflatus, nõ esset ex quo dolorem posset accipere. Quod si aliquo dolore corripere- retur, unica tantũ esset medendi ratio. Nam cum à nulla causã externa perpeti posset, necessariò à sua ipsius natura, internè pati deberet. Cum autem unica tantũ fuerit uniuscuiusque natura, unicũ erit affectus, ratioq; redeundi ad naturalem statum unica: id quod absurdum est, cum infinitæ ferè sint, ut morborum, sic præsidiorum species. Eadem quoq; ratione licet eorum sententias convellere, qui atomos, omnis prorsus qualitatis atque alterationis expertes, nec non incompactilia corpuscula introduxerunt, universæ generationis primordia. Quippe nec homo doleret, si talis esset natura illius. Siquidẽ necessum est, ut id quod dolet, cum sensus, tum etiam alterationis sit capax. Quod si ab omni-

*Atomos
haud posse
quidem esse
elementa cor-
porum.*

*Doliturum,
necessariò de-
bere esse tum
sensus, tum
alterationis
capax.*

penitus sit alteratione alienum, eundem omnino statum, quem ab initio sortitũ est, perpetuò servabit. Jam verò, si transmutetur quidem, sed nulla illi sit innata sentiendi vis, nihil propterea magis affectiones ipsas sentire poterit, quam ipsi lapidès sentiunt. Cum igitur utrunq; horum atomis in alternis illis corpusculisque desideretur, certè si ex eis, aut alia quapiam simili atque uniformi natura concreti essemus, non utiq; do- leremus: dolemus autẽ, nequaquã igitur sumus ex ulla simplici uniformiq; substantia conditi. Porro cum duo sunt instrumenta, quibus omnia inveniuntur dogmata, esse duo, rationẽ & experientiam.

*Instrumenta
quibus o-
mnia inveni-
untur dog-
mata, esse
duo, rationẽ
& experien-
tiam.*

quæ pariter impatibilia, & sine sensu sint: quod ipsum deinde patibile sit, atq; sensus particeps. Imò verò quantumlibet illæ omnes atomi infinitum haberent sensum, essent tamen impatibiles impenetrabilesq;, ita ut ex solo mutuo earum complexu, ipsa caro generaretur, nihilo magis impactam acum persentiremus, quam cum acu ipsa digitos junctos disjungimus. Reliquum igitur erit, ut sentiens corpus vel ex iis sit, quæ pariter vim habeant sentiendi & patiendi: vel ex iis, quæ pati quidem possint, sed nullum deinde sensum habeant. Nos autem mox percedemus, utrum horum sit verum. Si igitur elementũ non potest esse impatibile, nõ erit etiam specie unum. Siquidem quod est unum, semper est imparibile: cum nihil reliquum sit, in quod transmutari, aut à quo pati queat. Quicquid enim transmutatur, in alterum transmutatur: & quod patitur, ab altero patitur. Quare plura esse elemēta, jam compertum cum sit, eorum numerum inquiramus. Prius tamen sectas omnes eorum, qui in universum de elementis disserunt, distingua- mus. Rediguntur enim in quatuor: quarum prima est, quæ ex sensu vacuis, pariter & impatibilibus: altera, quæ ex sensu quidem præditis, cæterum impatibilibus, consistere quæ sunt alterationi obnoxia, pronũciat. Quæ ambæ in hoc cõveniunt, quod ex impatibilibus statuũt. Quare cum impossibilia tradant, eas missas faciamus. Supersunt itaq; duæ: altera, quæ corpus sentiens, ex primis elementis facultatem cum patiendi, tum sentiendi habentibus, constituit: altera, quæ ex patibilibus, sed sensu expertibus. Inter quas item ea est cõmunio, quod ambæ ex patibilibus ajunt. Quarum sectarum utraq; possibile quid proficetur. Nam si ipsas particulas explorare, rationeq; examinare volueris, ea quæ corporum sunt vim sentiendi habentium, omnes & patibiles sunt, & facultate sentiendi præditæ. Quod si prima respexeris elementa, facillè fieri poterit, ut quamvis ea nullum habere sensum dicatur, modo possint in se mutuò, multifariamq; & agere & pati, & aliquod inde, multis intercedentib; particularibus alterationibus, sensu præditum corpus gignatur. Quotiescunque enim ex pluribus quicquam componitur, si ea quæ in compositionem veniunt, qualia sunt, talia ad extremum duraverint, nunquam profectò id novam aliquam, adventitiãve adipiscetur formam, quæ in iis non præfuerit, ex quibus constituebatur. At si ea multifariam varientur, transmutentur, & cõmisceantur, poterit tunc in composito aliquid suboriri, quod ab iis quæ prius in primis illius elementis reperiebatur, sit generis alterius. Quare qui ex igne, aqua, aère & terra, invicem transmutatis atq; alteratis, & ad temperamentũ quoddam reductis, gigni corpus volunt sentiente facultate præditum, hi cõsentanea pronunciant. Qui verò ex illis ita ut sunt permanentibus, & permistis tantummodo, perinde ut triticum hordeũq; & fabæ sunt in acervo, ij nimirum ea, quæ fieri nequeunt, sectantur. His igitur, & quod uno plura omnino sint elementa, & quod pati etiam possint, monstratũ est: id quod confirmans Hippocrates, ait: Qui, obsecro, fieri po-

*E'elementum
non posse ef-
se imparibi-
le*

*Transmuta-
tionem fieri
in alterum
Passionem fi-
eri ab altero.
Sectas eorũ
qui de elemē-
tis disserunt,
esse quatuor.*

*De elemen-
tis opinio cõ-
sentanea ra-
tioni.*

test, ut ex uno quicquam constituatur, cum ne ex pluribus quidem possit, nisi ea probè fuerint contemperata? An verò ex iis primis elementis, quibus omnibus vis insit sentiendi, cōstent sensilia corpora: an ex illis potius quæ illa careant, nondum monstratum est. Porro nonnulla quidem omni carere sensu inde perspicuū est, quòd ex compositis etiam quædam huiusmodi sint. Fatua itaq; est hæc tam naturalium philosophorum, quam medicorū opinio, qui unum vel hominis, vel etiam ipsius universi elementum asserunt. Thales etenim, Anaximenes, Anaximander, cum illisq; etiam Heraclitus, ex elementorū transmutatione mutua, quòd singula in vicina alia cernant degenerare, unūquodq; ex illis esse elementum universale, prorsus demonstrare conantur, sic tamen ut alius aliud statuatur. Qui sanè mihi videntur omnes cōmunem illam somniasse materiam primam, omnibus elementis subiectam: quam ut unicam viderunt, sic etiam unicam esse elementum putarunt. Cæterum qui universa pronunciant unum, tam ipsius naturalis philosophiæ, quam Medicinæ principia destruant, ob idq; contra eos disputandum non est. Id autem ab omni ratione est alienū, si propterea quòd nullum ex elementis quatuor, solum syncerumq; in corpore cernitur, velit quis inficiari, ea omnia simul in eo reperiri. Nam cur vis tu in animantium corporibus reperire terram (exempli gratia) impermistam & puram, quum ne in universo quidem ejuscemodi à te ostendi queat? Quamcunq; enim particulam ejus acciperis, ea statim erit alicujus caloris humorisque, & aëreæ substantiæ particeps: cum tamen ea terra, quam opinamur esse elementum, sit q̃ maximè densa, gravisq; , ac præterea frigida & sicca. Quòd si tu in mundo mihi ostenderis lapidem, terreum sanè corpus: ego tibi aliquid illi simile in animantium corporibus, ossium nempe, cartilaginū, pilorum, testarumq; genus ostendam. Ne igitur amplius impermistum quicquam exquiras in animalium corporibus, quandoquidem nec in ipso orbe id reperiēs, adulterio carens. Sed quotiescunq; aliquam videris particulam frigidam, siccamq; & densam, ea satis sit, ad revocandam tibi in memoriam terram. Satis etiam sit humidum aliquid conspexisse, rarumq; & fluens, & ad concipiendam mente aquam. Calor quoq; animantis, ignis tibi repræsentet memoriam: necnon natura spiritus, citra quem animal constare nequaquam potest, aëris in primis, ac mox ignis, tibi memoriam refricet. Nec verò inficiari poteris, universos fructus ex terra gigni & ex aqua, cum inde suum habere ortum videantur. Quòd autem aëris ignisq; per tota simul temperatorū etiam participes sint, hinc planè licet cognoscere, quòd si aqua maceraveris terram, nihil præter lutum efficies: fructus autē lutum non sunt. Si igitur fructus omnes ex elementis universitatis suam ducunt originem, non est quòd de ipsis animalibus dubites, cum nimirum & ab illis alantur. Audenter itaq; profitemdum est, terram, aquam, aërem & ignem, prima esse, cōmuniaq; & simplicissima rerum omnium elementa, & primordia: ex quibus utique tum

stirpes, tum animalia omnia gignuntur, aluntur, atq; augmentum suscipiunt. In ipsis enim solis summas qualitates reperies, absque ulla mixtura aut temperie. In igne nempe, summam caliditatem & siccitatem. In terra, summam frigiditatem & siccitatem. In reliquis, reliquas qualitates, prout sui cuiusq; natura postulat. Affirmare autem esse aliquod elementū summè humidum, simulq; arbitrari illud esse quippiam ab aqua diuersum, extremæ cuiusdam ineptiæ est. Porro quòd summus calor igne simplicior sit, quòdq; illo accedente ad materiam, ignis gignatur, pro confesso ab omnibus habetur philosophis: quicquidem in universum fatentur, materiam quandam prorsus qualitatum expertem (quæ omnibus elementis subijcitur) atq; etiam calorem summum, qui in ea producit, igni existerē suæ generationis principium. Quin etiam materiam ipsam esse ab omni penitus generatione & interitū immunem: qualitatem autem id esse, quòd in illa tum gignatur, tum pereat. At elementum eò à principio differt, quòd minimè sit necesse principia in eodem esse genere, cum ijs quorum sunt principia: elementa verò, ad idem semper genus pertineant. Simplex nanq; qualitas compositæ, & simplex corpus, corporis compositi elementum existit. Cum igitur calidum, frigidum, humidum atq; siccum, dicantur tripliciter: nempe vel sicut qualitas, vel sicut impermistum corpus, vel sicut illud quod mistum est: nec ipsa deinde qualitas esse elementū videatur, nec etiam mistum, temperatumque corpus: reliquum est, ut elementum id esse corpus dicamus, quod est omnis temperamenti atq; mixturæ expers, necnō qualitatibus simplex. Quare ad ipsum ignem, aërem, aquam & terram, tandem ac necessario devenimus: in quibus primis summus est calor, summum frigus, summus humor, & summa siccitas. Quibus etiā elementis universalibus, vel synceris, persæpe utimur: quemadmodum aqua quotidie, cum bibimus, aut lavamur: & aëre, qui nos undiq; ambit, dum illum in spirando attrahimus. Igne etiam, dum frigemus, ut caleamus utimur. Animantia præterea quæ vel arena, vel terra, vel lapidibus, vel etiam luto, ossibusve vescuntur, terram manifestè introducunt in corpus. Quare non video equidem, cur dicant nonnulli, nec ignem, nec aërem, nec aquam, nec terram, vel detrahi ex corpore nostro, vel illi etiam apponi: ac proinde ea minimè nostri corporis elementa existere. Quòd si qui ob id non putent ullum nos corpori elementum offerre, quòd nemo eatenus calfiat, donec curatur: vel bibat, quòd disrumpatur: ii non intelligunt, si vel unum elementum omnino intreat, statim etiā interiturū animal. Interibit autem frigidum elementum, si comburatur: calidum, si nimis refrigeretur: humidum, si arescat impenfè: siccum deniq; , si plus quàm par sit, humectetur. Unde aliter se habet res, quàm illi sentiunt. Semper enim aut eximitur elementū aliquod, aut apponitur corpori: id quod moderatè fieri debet ab iis, qui servare incolume animal ipsum conantur. Siquidem immoderatus elementorū usus, ad interitū ducit. Ergo cum nulla qualitas reperiri seorsum à sub-

Elementis solis summas qualitates inesse.

Aquam esse summè humidam.

Calore summo accedente ad materiam, constituit ignem.

Materiam ingenerabilem, incorruptibilem.

Qualitatem gigni in materia perire que.

Elementi & principij discrimen.

Calidum, frigidum, humidum & siccum tripliciter dicti.

Elementum quod esse corpus dicatur.

Elementis universalibus nos ipsos persæpe uti.

Animal interiturum, si vel unum ex elementis intreat.

Elementum semper aut eximitur aut apponitur corpori.

Elementorū usum immoderatum, ad interitum ducit.

à sub-

Materiam primam unicam quatuor elementis subiectam esse.

Elementum purum nullibi reperiri posse.

Terra elementaris cuiusmodi esse debet Elementorū.

Elementorū singulis esse quid simile in animantium corporibus.

Fructus universos ex terra gigni & ex aqua.

Elementa prima esse terram, aquam, aërem & ignem.

*Qualitas
nulla esse, ut
que substan-
tiis potest.*

à substantiis queat, cogimur eas unà cum sub-
stantiis assumere, atque ita corporibus, quæ illis
egent, offerre. Quæ si illas summas exposcant,
ipsum elementum administramus: ignem in-
quam, aut aquam, aut terram, aut aërem. Ubi ve-
rò mediocri opus est qualitate, misto ex elemen-
tis medicamento, atq; interdum nutrimento uti-
mur. Neque sanè unquam ceu medicina elemen-
tum ex usu est, nisi dum corpus summa qualitate
indiget. Quod autem Hippocrates nomine qua-
litis, corpus summa præditum qualitate sæpe-
numero intelligat, ex dictione illius licet nobis
colligere. Siquidem ubi ait, cum interit homo,
necessum esse unumquodque ad propriam natu-
ram reverti, siccum ad siccum, humidum ad hu-
midum, calidum ad calidum, frigidum denique
ad frigidum: non solas profectò qualitates, sic-
cum, humidum, calidum, & frigidum vocat, sed
substantias illas, in quibus qualitates ex repe-
riuntur. Ipsæ enim sunt, quæ animali vita fun-
cto abeunt, quæque elementis universitatis mi-
scentur. Qualitates autem dixerimus animante
mortuo interire: ad propriam verò eas naturam
reverti, non item. Quare non est quod quispiam
amplius persuadere conetur, illum ex qualitati-
bus, quæ ne seorsum quidem à corporibus con-
sistere possunt, animalia gigni arbitrari: sed ex
corporibus, quibus summæ illæ qualitates in-
sint. Ea quippe sunt communia elementa omniū.
Quæ verò calidum, frigidum, humidum, atque
siccum, ob aliquam excellentiā horum, dicun-
tur, propria sunt unicuiq; Homo igitur constat
ex simplicissimis sensibilibusque elementis, quæ
similaria vocantur. Ipsa autem ex quatuor hu-
moribus. Qui rursus ab esculentis & potulentis
suam ducunt originem. At hæc, ex aëre, igni, a-
qua, & terra gignuntur. Quæ sanè ex nullo am-
plius corpore constituta sunt, sed ex materia &
qualitatibus tantum: quas ipsorum esse princi-
pia concedimus, elementa autem nequaquam:
tamen si elementa, ab ipsis qualitatibus habeant,
quod elementa sint. Siquidem si summus calor
materiæ accedat, jam id totum elementū ignis
evadet: similiterque de cæteris qualitatibus tri-
bus, dicendum. Ex nulla autem qualitate alia,
præterquam ex his quatuor, judicatur esse ele-
mentum. At verò de propriis animalium elemē-
tis, hoc est, de ipsis humoribus, in sequenti com-
mentario tractandum est. Ex eis enim partes si-
milares gignuntur. His rursus simul coeunt-
ibus, primum id, ac simplicissimum instrumen-
tum absolvitur, quod unius functionis gratia à
natura productum est. Mox autem, quum hæc
item unà componuntur, aliud majus instrumen-
tum perficitur: ac dein, universi integritas cor-
poris. Ergo, ut totam reperamus disputationem,
si nos dolemus, neque specie una erit, nec impa-
tibilis nostra substantia. Atqui dolemus, non igitur
erit specie una, neq; impatibilis. Rursus, si pa-
tiatur, oportet ut calfacta, vel frigefacta, vel hu-
medata, vel resiccata patiatur: quum nulla alia
qualitate possint quæ proxima sunt, alterari to-
ta per tota. Quocirca manifestum est, calidita-
tem ipsam, frigiditatem, humiditatem & siccita-
tem substantiam cuiusq; rei constituere. Quo pa-

*Substantias
elementorū,
animali vi-
ta functo, re-
verti ad pro-
pria elemēta
Qualitates
elementorū
interire, ani-
mali intere-
unte.
Elemēta se-
cūdam sub-
stantias mi-
scet.
Hominis cō-
stitutio.*

*Elementa ex
materia &
qualitatib.
constitui dū-
taxat.
Elementa ex
qualitati-
bus habere
quod elemen-
ta sint.*

*Elementa a-
nimaliū pro-
pria, quatu-
or humores.
Similares
partes.
Instrumen-
tum primum
unius fun-
ctionis gra-
tia est pro-
ductum.
Instrumentū
majus.*

*Substantiā
cuiusq; rei à
qualitati-
bus primis
constitui.*

cto autem ea quæ miscentur, tota per tota mi-
sceantur, solis ne qualitatibus (ut Aristoteles sen-
sit) an potius ipsis etiam substantiis in sese pene-
trantibus mutuò, non est opus medicum explo-
rasse. Hoc tamen dixisse impræsentiarum sit sa-
tis, quod si vinum (exempli gratia) aqua miscea-
tur, particulæ utriusque horum infringuntur in
minima: moxq; inter se mutuò agunt, atque pa-
tiuntur: eoq; facilius sibi invicem qualitates con-
municant, quò in minutiora redacta, diutiusq;
commota, & cōmixta fuerint. Tempore nanque
est opus, ut eorum quæ cōmiscentur mutuò, par-
ticulæ inter se invicem exactè agant, exacteq; e-
tiam patiantur, ac ita totum id unum & sibi un-
dique & penitus simile evadat.

GALENI PERGAMENI de elementis lib. II.

Igitur ut calidum, frigidum, humidum atque
siccum, omnium rerum communia sunt ele-
menta: sic nimirum sanguis, pituita, ac bilis
tum atra, tum flava, omnium animalium sangui-
ne præditorum propria elementa existunt. Cæ-
terum hominum propriæ sunt similes particu-
læ: quamvis & hæ nonnullis sanguine prædito-
rum etiam communes adsint, ut bovi, cani, & e-
quo: non tamen usque adeo humanis similes. At
verò quod omnes sanguineorum animalium par-
tes, ex materno gignantur sanguine, satis omni-
bus constat: qui cum sit non modò pituitæ, sed
utriusque etiam bilis particeps, demonstratum
est, qua ratione adductus Hippocrates, ipsos
quatuor humores materiam esse generando ho-
mini tradidit. Caro porro & nervus particulæ si-
milares existunt. Cum autem caro sanguinea sit,
præterea mollis & calida: at nervus exanguis,
durus & frigidus: similiterque aliæ particulæ a-
lias differentias sortiantur: rationi consentaneū
videtur, ipsam sagacem naturam, quo tempore
ex sanguine menstruo efformabat fœtum, quod
crassius in eo erat, ad solidiora: quod tenuius,
ad molliora: sicuti quod calidius, ad calidiora:
& quod frigidius ad frigidiora corpora constitu-
enda, attraxisse. Subsequenti autem tempore u-
namquæque ex cōcretis particulis, suum habuisse
alimentū incrementumq; ex propria & peculia-
ri materia. Nam quemadmodum in lacte reperi-
tur & serum, & quædam caseosa substantia: sic in
sanguine reperire licet quendam tenuem liquo-
rem sero lactis persimilem, nec non veluti limū
quendam, ac præterea ipsas fibras, quibus à sangui-
ne exemptis, ut non amplius ipse sanguis concre-
scet, sic etiam colore variabitur. Unde sanguis
minimè simplex erit. Alioqui in omnibus quum
animalibus, tum hominibus esset perpetuò si-
milis. Contrariū autem licet experientia cogno-
scere, cum ex varietate colorum, tum vel maxi-
mè ex ijs quæ vacuantur ope medicamentorum
purgantium. Quæ quidem si propinentur, ut de-
cet, pro differentia morborum, differentes ac pe-
culiaries sibi succos elicient: contrā quā Ascle-
piades persuadere conatur, nempe medicamen-
ta ipsa haud quidem familiares sibi succos attra-
here, sed trāsmutare illos corrumpereq; ac in sui
naturam, qualescunque fuerint illi, convertere.

*Missioni cor-
porum exa-
ctissima, plu-
rimum con-
ducere com-
munionē.
& in ipso com-
gressu morā.*

*Elementa es-
sentialia.*

*Elementa
propria.
Similares
particula ho-
minibus pro-
pria.*

*Menstruo ex
sanguine gi-
gnit omnes
sanguineorū
partes.*

*Humores
quatuor,
sunt mate-
ria humana
generationis*

*Solidiores
partes ex so-
lidiori men-
strui portio-
ne constru-
tas esse.*

*Alimenti,
incrementūq;
ratio.*

*Sanguinis
partes de-
verse.*

*Sanguinem
nō concre-
re, si eius fi-
bra detra-
hantur.*

*Sanguis non
est simplex.*

*Asclepiadis
opinio refel-
litur circa
medicamēta
purgantia.*

*Purgantia me-
dicamenta hu-
mores propri-
os trahere, et
quoniam or-
dine.*

Quæ sanè ut sunt absurdissima, sic ea quæ per immodicas purgationes indies fieri videmus, ostendunt evidentissimè, quemadmodum proprium humorem quodlibet pharmacum attrahat. Siquidem quotiescunque aliquis medicamentum hauserit, quod vim habet bilem supra modum vacuandi, primò quidem, vomitu talem humorem eijciet; mox pituitam, postmodum bilem atram, postremò sanguinem purum, quo evacuato agunt animam. Quod si medicamentum pituitam solvens propines, illa in primis vacuabitur: dein flava bilis, quod eductu sit facilis: postquam atra, ad motum rebellis & contumax: ultimò autem omniū semper educitur sanguis, quod naturæ is admodum affinis existat. Ubi igitur primus ille humor prorsus vacuatus est, non potest jam esse incolume animal, cum unum ex suis elementis amiserit: sed dissolvitur prorsus, & perit. Mox autem ex reliquis profluit humoris, qui aptior est ut vacuetur. Quippe naturalis quædam vis rei unicuique inest, ea quæ conveniunt sibi, tradendi. Sicuti in magnete vis est attrahendi ferrum. Atque per hanc facultatem nutritiones, tū vacuationes fiunt: ipsa quidem semper id quod expediens est, attrahente, nonnunquam tamen cum hoc, aliquid ejus quod non est congruum: ut in purgantibus medicinis usu aliquando venit. Quæ quidem, ubi universum id bilis, aut pituitæ, quod in corpore fluitat: attraxerint, peculiarem solidarum partium humorem, vi & labore arripiunt, eas quasi dissolventes & colliquantes, deducentesque ad elementa, atque animal ipsum internecioni tradentes. Violentiam verò illius attractionis, alius quispiam humor consequitur illi affinis, qui primum vi attrahebatur.

*Sanguinem
ultimò om-
nium & vacu-
ari, quod sit
affinis natu-
ra.*

*Attrahente
familiarium
vim inesse
singulis.
Magnetis tra-
hit ferrum.*

*Purgationes
immodica.*

GALĒNI PERGAMENI

de temperamentis lib. I.

*Constitutio
animalium ex
dispari ele-
mentorum
miscella.*



*Animalia
non dici ca-
lida in sum-
mo, sed per
excellensam.*

Onstare animalium corpora ex calidi, frigidi, sicci, humidique mixtura, neque esse horum omnium parem in temperatura portionē, demonstratum antiquis abundè est, tum philosophorum, tum medicorum præcipuis. Cum autē ex calidi, frigidi, humidum & sicci temperie cōflari corpora dicunt, de iis quæ summo gradu sic se habent, ipsis scilicet elementis, intelligendum ajunt. Cum verò animal, stirpemve, calidam, frigidam, humidam, aut siccam esse, non item. Neque enim ullum animal aut calidum in summo esse posse, ut est ignis, aut in summo humidum, ut est aqua. Pari modo nec frigidum, siccumve in summo: sed ab eo quod in mixtura pollet, appellationem fortiri. Non posse autem differentias temperamentorum esse plures quàm quatuor, hinc docere conantur, quod duntaxat quatuor sint qualitates, quæ in se agere patique possunt: nempe calor, frigus, siccitas & humiditas: ex quibus quatuor tantum (judicio suo) oriuntur temperamentorum cōjugationes, quæ cōsistere possint: nempe calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum. Siquidem conjugia alia duo, quæ ex contrariis qualitatibus constant, calidum nem-

pe & frigidum, necnon siccum & humidum, minime consistere posse. Quæ verò illi mihi prætermisisse videntur, nunc adijcienda reor. Unū igitur & primū id est, quod temperatam naturam, quæ & virtute & viribus, reliquis præstat, sine qua de illis ne loqui quidem potuerunt, omnino ac si nulla sit, omiserunt. Quippe quod vel in calida temperie calidum prævalet frigidum, vel in frigida temperie frigidum præstet calidum, id ne intellexisse quidem est, nisi prius ponantur eucratos, sive temperata: ad quæ sunt intenti, cum videtur sanitatis tuenda investigant, efficereque temperatum quendam statum conantur. Ergo quem assidue sectantur, & quod semper respicientes, in temperatos status corrigunt, hunc ego quidem primum omniū statuum censuerim. Hi autē tantum abest ut ejus meminerint, ut etiam totū prætereant. At non præterimus, inquit ex iis aliqui: in calido namque & humido comprehenditur. Quam sententiā Athenæi sectatores foventes, ipsas quatuor temperaturas, quatuor anni temporibus comparant. Hyemem itaque frigidam & humidam dicunt. Aestatem autem, calidam simul & siccam. Autumnū, frigidum atque siccum. Ver denique, tum temperatum, tum calidum & humidum vocant. Ad eundem modum & ex ætatibus, puerilem quidem tum temperatam esse, tū verò calidam humidamque. Sed & mortem ajunt animantium corpora ad frigidum & siccum perducere. Unde colligunt, vitam, cum illi contraria sit, calidam & humidam esse: ac proinde calidum & humidum temperamentum, optimū & temperatissimū esse. Bifariam autem hallucinantur. Primū quidem, quod in quatuor anni temporibus, quartam temperamentorum conjugationem inveniri contendunt: id quod non videtur necesse. Dein, quod ea ratione concludunt, ver calidum & humidum esse, quod sit hyeme quidem calidius, æstate autem humidius. Siquidem eodem nomine dicitur frigidum simul & siccū propterea quod æstate frigidius est, sicuti & siccus hyeme. Quare nec æstati, nec hyemi ver comparare est æquum, sed potius ipsum per se æstimare: cum quodlibet anni temporum, non ex alterius comparatione, sed suapte æstimatum natura, indicare debeat tale, vel tale. Ad quam formā si expendas ver, videbitur tibi planè in omnis excessus medio consistens. Proinde rectè ab Hippocrate est dictum, vel saluberrimū esse, minimeque morbis perniciosus obnoxium. Est & autumnus, ut quàm æstas minus calidus, sicuti quàm hyems minus frigidus. Quare ratione hac nec calidus absoluto sermone est, nec frigidus: quippe cum ambo sit, ac neutrum ad summum. Cæterum alterum in eo incommodum, nempe inæqualis ipsa temperies, quæ autumnum maximè morbificum facit. Quod Hippocrates etiam significavit, dicens: Cum eodem die modo calor, modo frigus non afficit, expectandos est: se autumnales morbos. Itaque non rectè frigidus, siccusque dicitur. Nec tamen æquabiliter est temperatus, ut ver: quin potius hoc maximè ab illo tempore dissidet, quod mediam temperiem & æqualitatem perpetuò parem non servet. Quippe meridie multo est calidior quàm manè, aut vespere:

*Temperatā
naturam esse
à veteribus
prætermis-
sam.*

*Temperatā
naturam esse
regulā con-
stituendā vi-
tæ rationi.*

*Veterum du-
plex lapsus
circa assigna-
tionem tem-
peramento-
rum.*

*Ver esse per
se æstimand-
um.*

*Ver in medio
omnis excessus
consistit.
Ver saluber-
rimum esse.*

*Autumni
inæqualis tem-
peries illum
morbificum
facit.*

Autumnus ad siccus declinat.

Ver non esse dicendum calidum & humidum.

Temperiem aeris calida atq; humidam, esse omnium aliarum pessimam, nec reperiri posse in quatuor anni temporibus.

Incorrupta servari a frigido & sicco omnia, putrescere a calido & humido.

Boream servare imputria universa. Austrinum statum praeservare singula. Ver temperatum, et saluberrimum.

Animantia dicta esse calida & humida non absolute, sed collata ad stirpes.

Canis siccior homine.

Canis humidior formicis & apibus. Temperamentorum collationes diversa.

Elementa soladii absolute calida, aut humida aut frigida, aut siccata.

speri: nec in humido & sicco omnino medium statum obtinet, quemadmodum ver, sed ad siccus declinat. Idcirco patere arbitror, nec autumnum absoluto sermone, & citra exceptionem frigidum & siccum dicendum esse: sicut neq; ver calidum atque humidum. Ego siquidem, tantum abest ut ver, aut si quid aliud est temperatum, calidum & humidum esse credam, ut quod plane contrarium est, id affirmem, omnium scilicet aeris temperamentorum id pessimum esse, quod humidum est & calidum. Quod sane temperamentum in quatuor anni temporibus invenire non possis: quamvis id in pestilenti aeris constitutione incidere aliquando videatur, quemadmodum Hippocrates olim contigisse in Cranone memorat, ubi nimirum assidue per aestum largo imbri pluerat (quod calidi humidique status est proprium) quam intemperiem aeris comitati sunt varii & gravissimi affectus, haud dubie dirae putredinis soboles. Nam ut a frigido & sicco omnia incorrupta servatur, sic a calido & humido facillime coputrescunt. Boreae etenim flatus siccus & frigidus, omnia quam diutissime imputria conservat. Austrinus autem flatus, qui calidus & humidus est, illa subito ad corruptionem perducit. Ver itaque haquaqua calidum & humidum pronunciamus, cum nec tale sit, nec si esset, utiq; salubre esset, aut sanitati accommodum. At quatuor qualitatibus mixtionis aequalitas, & mediae temperaturae eius, & salubritatis est causa. Perperam etiam faciunt, dum aetatum temperamenta, ad quatuor anni tempora transferunt, quum non idem sit, aut similiter dicatur animalis temperies calida & humida, sicuti aeris temperamentum calidum & humidum dicitur. Qui error inde illis videtur ortus, quod non meminerint animantia veteribus pronunciata fuisse calida & humida, non propriae temperaturae ratione, nec sermone absoluto, sed ad stirpes, & demortua, collata. Quippe demortuis & stirpibus, animantia calidiora humidioraq; sunt. Quinetiam ex animantibus ipsis inter se speciatim collatis, canis quidem est siccior, homo autem humidior. At si formicae, vel api ipsum canem compares, illas sicciores, hunc humidiores invenies. Ita idem animans, prout homo, siccum: prout apicula, humidum fuerit. Rursus ad hominem collatum, calidum: ad leonem, frigidum erit. Calidus etiam est canis, ut vivens (cum mortuus non amplius calidus sit) non calidus autem, si ad alterum comparatur canem. Atq; haec quidem omnia per collationem inter se dicuntur. Quae vero in animantium genere conferuntur, alia ratione: sicut etiam quaecumq; in aliqua animalium specie. Canis namq; ad formicam est humidus: in animantium genere est siccus. Rursus, ipsorum speciatim canum, hic siccus, ille humidus, alius (ut fas est cani) temperatus existit. Quod ergo absoluto sermone, nec ad aliud ullum collatum, vocatur siccum, id in solis est elementis: similiterq; de ceteris qualitatibus est sentiendum. Nullum enim ceterorum corporum, prorsus calidum aut frigidum est, sed sola elementa. Quicquid praeter haec ceperis, ex his mixtis constat. Ac propterea per secundam significationem, non amplius ab-

soluta ratione, veluti syncerum & a mixtione alienum, reliquorum quodvis calidum aut frigidum dicitur. Ac duo quidem significata calidi, frigidi, humidi & sicci, haec sunt: alterum, absoluto sermone loquentium, mixtura carens atq; syncerum: alterum contrariis quidem mixtis constans, ceterum ex pollentis in mixtura nomine appellatum. Quo genere sanguis humidus dicitur, sicuti & os siccum. Formica vero sicca est, & vermis humidus: scilicet ut sunt animalia. Dicitur porro unumquodq; secundum genus, vel speciem, non modo calidum esse, aut frigidum, sed aliis etiam qualitatibus praeditum, cum supra medium cre atque medium fuerit. Verbi gratia, animal dicitur calidum, cum supra medium temperie sit animal. Equus calidus, cum supra medium temperie equus fuerit. At vero in quoque genere speciei sunt media, quae a summis in eo genere, speciei, finibus aequaliter distant. Ac genus quidem est animal, species equus & canis. Medium temperie in toto animalium genere, est homo. Medium vero ut in hominum specie, quem Graeci eusarcon, hoc est, quadratum appellant, ab omni excessu, defectu remota. Quisquis igitur supra hunc fuerit, is aut prorsus calidior, aut frigidior, aut humidior, aut siccior erit: idque partim absoluto sermone, quia minimè uni alicui privatim collatus dicitur talis: partim non absoluto, quod symmetrò & medio totius speciei comparatur. Ergo unumquodq; horum quae talia sunt, aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum tripliciter dicimus. Nempe aut comparantes id cuilibet particulari individuo: aut cum uniuscujusque tum generis, tum speciei medio id conferentes: vel deniq; summum atq; impermixtum ipsum esse aestimantes, id quod sanè ad sola pertinet elementa, Quare ad tractationem de temperamentis illi duo primi modi nobis tantum sunt necessarij. Quoniam autem multa genera sunt, quemadmodum & individua, ad quae comparare possumus, poterit idem corpus multis modis, calidum, frigidum, humidum atque siccum existere, simulq; suscipere varias appellationes. Verum ubi stirpem animansve ullum, eucraton, si ve optimè temperatum dicimus, nequaquam in eadictione, simpliciter contraria inter se coparamus: sed ad naturam vel animalis, vel stirpis referimus, cum eorum quodq; pro sua natura optimè sese habeat, optimeq; suas obeat functiones. Sic enim dicimus animalia ipsa & stirpes optimam & mediam habere suo in genere temperaturam, non utiq; absoluto sermone, ac si paritas exquisita contrariorum in iis reperiatur, sed quod ea medio-critas, quae ad potestatem refertur, eis adsit. Ac tale quid etiam dicimus esse & iustitiam, non quae mensura & pondere, sed quae eo quod pro dignitate convenit, aequalitatem explorat. Est ergo temperatura aequalitas, in omnibus animalibus temperatis, stirpibusq; non ea quae ex pari elementorum commistorum mole spectatur, sed quae tum animalis, tum stirpis naturae convenit. Convenit autem alias, ut humidum sicco, & frigidum calido praeponderet. Itaq; ad interrogantem, cuius temperamenti sit homo: si quidem ut in animalibus interrogatio fiat, ad id quod medio est inter animalia

Media in quo genere, vel specie, qua dicatur. Homo est medium in toto animalium genere.

Temperatura corporum quotupliciter assumatur.

Temperatura ad iustitiam. Iustitia quid

animalia omnia temperamento respicientes, respondere oportet. Si verò facta collatione cum individuo aliquo, utique ad illud solum cōferendo, tunc respondendum est. Si absolute, atque ut ad omnem substantiam, sic jam contraria quæ sunt in eo comparare oportet, atque æstimare, haudquaquã ad actionem referētes temperiem, sed potius ad elementorum portiones, hoc est, ad substantiam quandam, quæ pariter ab extremis distet, quæ prima omnium sunt elementa. Si quidem quæ supra citrãve hanc substantiã temperies fuerit, eam simpliciter calidam, frigidam, humidã, siccãve asseremus. Ubi verò cum medio temperamento conferimus, non simpliciter, sed quoad mediocre ejusdem generis sic se habet. Porro generum omnium supremum substantia est, sub qua quidem tam animata, quàm inanimata continentur. Ultima autem genera, superne descendētib; nobis, sunt, homo, cornus & ficus, eoq; species dicuntur. Inferne verò ascendētib; , scilicet ab individuis substantiis, eadem sunt prima genera: indicatũq; alio opere est, meritò omnia quæ media sunt, inter individua & genera prima, tum genera, tum species à veteribus nominari. Iam verò, quemadmodũ nomen albi, tum de colore albo, tum de corpore, quod ipsum colorem suscipit, enunciatur: sic etiam calidi nomen, non solum de substantia calore prædita, sed de ipsa etiam caliditate dicitur. Dicitur itaq; ipsa caliditas calidum: sicuti & corpus ipsum, quod tamen nunquam caliditas appellabitur: in cæterisq; similiter qualitatibus eadem ratio est habenda. Quæ corpora igitur has qualitates quatuor, caliditatem inquam, frigiditatem, humiditatem & siccitatem, puras & impermixtas sortiuntur, absolute dicuntur talia, elementaque genitorum & pereuntium existunt. Reliqua verò universa corpora, in illorũ medio sunt collocata, cum non sint summis qualitatibus prædita, sed prorsus aut in medio contrariorum consistent, aut ad alterum extremorum sint propensiva & propensa. Idcirco novem in universum temperamentorum differentia exoriuntur. Quarũ una quidem temperata est & media, octo verò nõ temperata. Harum rursus quatuor simplices sunt, calida, frigida, humida & sicca: quatuor verò compositæ, calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca. Temperatã enim dicimus esse, in qua illæ quatuor qualitates ad æquilibrium miscentur. Non temperatam autem, in qua una aut duæ qualitates præpollent. At calidam temperaturam pronuncio, in qua calor, vincit ipsam frigiditatem alterius oppositionis, quæ in humido & sicco est, interim paritate servata. Similiterque in frigida, humida, & sicca temperie simplici judicandum. Ceterum calidam & humidam eam temperaturam censemus, in qua frigiditatem caliditas, siccitatem humiditas superat. Nec secus calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca temperies sunt æstimandæ. In qualibet autem dictarum temperatarum permagnus est excessus, defectusque modus. Idcirco, si cui agnoscendarum illarũ est cura, incipiat exercitationem ab ijs naturis in quolibet genere oportet, quæ temperatæ mediæque

sunt: quandoquidem si cum his alias comparet, facile quod in quavis superet, deficiatve, inveniret. Cum igitur temperies calida, alia quidem actu, alia potestate dicatur, quod videlicet nondum sit, sed possit esse quod dicitur: differamus primum de ijs, quæ calida, frigida, humida, aut sicca esse actu dicuntur, idque auspiciati ab universa substantia, mox descensuri ad animalia & stirpes. Cum autem quod in omni genere, maximeque in universa substantia est medium, id ex mixture extremorum cōfletur, certè si à calidissimo igni, aut aqua ferventi, ad frigidissimam glaciem transeamus, in ipso exquisitissimo medio, id quod symmetron est, intellectu deprehendemus. Quinetiam id nobis præparare licebit, miscentibus aquæ ferventi parem modum glaciei. Quod enim ex ambobus est mistum, pari intervallo ab utroque extremorum aberit. Quare non erit difficile ei, qui tale mistum tetigerit, habere medium universæ substantiæ, in calidi & frigidi oppositione: atque alia omnia, illi veluti formæ adaptata, discernere. Quod si terram etiam pari aquæ modo imbueris, medium in sicci humidique oppositione feceris. Quanquam hæ non mixture veræ, sed tantum particularum appositiones sunt. Siquidem miscere corpora tota per tota, nõ hominis, sed Dei & naturæ est opus. Iam verò corpus de quo judicandum est, mediocriter calens esto: nam interdum nimio calore liquatur adeo, ut humoris falsam imaginem præ se ferat. Sicuti interdum etiam adeo cogitur frigore, ut siccius quàm sit mediocre, nobis esse videatur. Porro ipsa hominis temperatissimi cutis, ac præcipue quæ in manu est, omnium extremorum est media: fuitque sic temperata à natura, quod sensibile omnium esset veluti norma quædam, tactusque instrumentũ futura. Ex dictis igitur constat, inter omnia quidem corpora, hominem esse temperatissimum: inter omnes autem humanas particulas, cutim eam, quæ intra manũ habetur, si modo nullum callum contraxerit. Quæ quidem quæ sunt duriores particula, in his omnibus sic prævalet, quæcunque verò molliores, in ijs humidi plus est quàm sicci. Cæterũ homo temperatissimus, qui tum hominũ, tum reliquorum animalium futurus est regula, cum universa substantia collatus, medius apparere in ea debet: magisque cum hominibus atque bestiis. Dein verò sapientissimus sit oportet, habeatq; actiones corporeas consentientes animi moribus: ac non solum mediam temperaturam, sed optimam etiam formationem fortiaur. Quod verò ad manus pertinet, quum ex gemini usus gratia sint factæ, nempe tangendi atque comprehendendi: utique illæ quæ molles sunt, ad exquisitius tangendum, ut duræ ad aliquid vi majori capiendum, magis idoneæ existunt. Quinetiam cutis, quæ universæ, quæ generationi corruptionique subijcitur, substantiæ est media, nec dura lapideæve est, sed ab omni exuberantia remota, atque omnino secundum naturam se habens. Quod scilicet cutis genere maxime perfectum esse tactum censemus. Etenim nervus omnis est exanguis & frigidus. Caro multi sanguinis, atque calida. Media inter utrumque est cutis: nec planè exanguis

Substantiam esse generum omnium supremum. Genera ultima dici species.

Elementa quæ sint.

Temperamentorum differentia novem.

Temperata temperies. Temperies non temperata quæ.

Temperiem calidam dici vel actu vel potestate.

Medium in universa substantia.

Mixture exquisitam, solum Dei atque naturæ esse opus.

Cutim sola manus in homine temperato esse extremorum mediam.

Cutim esse instrumentum tactus. Hominem esse omnium corporum temperatissimũ. Hominem quæ futurus sit animalium omnium regula, qualẽ nam esse oporteat.

Manus tangendi atque apprehendendi gratia esse factas.

Manus molles.

Manus dura Cutis media qualis nam esse debeat.

Nervorum omnem esse exanguem, & frigidum.

Carnem esse multi sanguinis, calidamq;

exanguis ut nervus, nec sanguine abundans ut caro, sed veluti nervus sanguine præditus. Si igitur hanc omnium animalium partium, veluti normam iudicemus; proponens, reliqua illi conferas, octo in universum diversas intemperies reperies: de quibus membratim disseram. Humidissimum frigidissimumque in corpore pituita est. Calidissimum, sanguis: non tamen perinde is humidus est ut pituita. Frigidissimum est ac siccissimum, pilus. Minus eo & frigidum & siccum, os. Hoc verò minus siccum est cartilago. Proximè hanc sequitur chondrosyndesmos. Post hunc tendo. Deinceps membrana, & arteria & vena. Succedunt dein nervi duri: molles quippe in humiditate & siccitate mediam naturam, sicuti cutis, obtinent. Nam in altera oppositione tantum caloris desiderant, quantum sanguinis. Ita verò & reliqua prius dicta, tantò sunt frigiora cute, quantum minus habent sanguinis. Etiam vasorum tunicæ non solum exanguis sunt, sed etiam naturæ frigidae: contactu tamen sanguinis calfiunt, atque ad mediū temperamenti statum deveniunt. Sanguis verò ipse à corde suum calorem accipit. Id viscus siquidem tum omnium animalis particularum maximè sanguineum, tum verò calidissimum est. Proximè illi est jecur. Verum cor, paulò minus quam cutis est durum: jecur multò. At caro humidior cute est: eadem tamen calidior. Spinalis autem medulla cute est humidior, atque frigidior: sicuti hac rursus humidius est cerebrum. Cerebro autem ipso adeps: cui concretio contingit, propterea quod oleosa cum sit, membranis frigidis adjacet, ob quarum viciniam cogitur. At nec circa jecur coire adeps potest, nec circa arterias, venas, aut cor: sicuti nec circa ullam aliam præcalidam partem. Quoniam autem cogitur ab eo quod valde est frigidum, idcirco calfacta liquatur, cæterorum coagulatorum more. At cerebrum calfactum liquatur minimè: eoque adipe minus est humidum. Minus humida quam adeps est ipsa etiam pulmonum caro, quæ ne calfacta quidem liquatur. Iam longè etiam quam hæc adipe minus humida est tum lienis, tum renum caro. Omnia tamen hæc cute sunt humidiora. Quarum rerum demonstrationes proximo commentario trademus.

GALENI PERGAMENTI de temperamentis lib. II.



Ergo quot sint in universum temperamenta, quotque modis unum quodque illorum dicatur, in proximo est libro. Ubi à nobis etiā est traditum, animal ipsum minimè quidē absoluto sermone calidum & humidum dici, quod in eo scilicet humiditas aut calor exuperet (sic enim liceret invenire animalia sicca, frigidaque complura, veluti culices, muscas, apes formicasque), sed tantum ad demortua collatum. Monstratumque similiter est cutem volæ manus, in homine qui optima temperatura sit præditus, esse temperatissimam, totiusque medium substantiæ. Est aut plurima in hominibus differentia. Verum maximè temperatus is est, qui corporis habitu medius horum extremorum videtur, gracilitatis neque, crassitudinis, mollitie, duritie, itemque caloris & frigoris (nam interdum in animali sangui-

ne prædito & humido, frigiditatem quandam polentem reperias) quique etiam liber cum sit ab immodicis animi affectibus, omnes tam naturales quam animales actiones & facultates habet inculpatissimas. Idem medius oportet sit inter somnolentum atque pervigilem, inter glabrum & hirtum, inter nigrum & candidum: pilosque habeat cum puer est, magis rufos, quam nigros: cum in flore consistit, contrā. Cæterum quandoquidem se nobis occasio jam obtulit, de ætatibus non nihil dicendum est. Prima constitutio animalis recens formati in utero, ex semine & sanguine est: qui humores calidi sunt & humidi. His autem magis semper sicciscentibus, primum quidem formantur membranae, tunicae, nervi, visceraque & sanguinis vasa, nempe illorum substantia tensa. Ultimo verò perficiuntur ossa, ungues, & cartilaginee, scilicet substantia ipsorum concreta. Quibus perfectis in utero, ita deinde paritur infans, adeo tamen mollis & humidus omnibus partibus suis, ut omnia ipsius membra nutrices, perinde ac si cerea sint, pro arbitrio forment & fingat. idcirco nuper nati animalis corpus maximè si suillum, ovillumve id sit, propter redundantem in eo humorem, libens non comedas. Nam caprillum, quod siccius sit, & melius esui est, & jucundius. Contrā verò quam in novellis porcellis, quæcunque jam consenuerunt, hæc omnes partes præsiccas, rigidasque, & sine succo possident. Quæ medio statu horum, ac nuper natorum sunt, ea quantum à senio absunt, tantum & ab extrema sunt siccitate remota. Quæ minora sunt, atque adhuc augescunt, tantum ea quoque absunt ab humore foetus delitescens utero, quantum processerunt ætate. Florescens verò ætas omnium animalium, maximè in medio extremorum est. Porro senes naturali particularum temperamento sunt sicci, licet copia excrementorum humidi esse dicantur. Siquidem cum particularum senilium corporum per caloris imbecillitatem similiter nutriri non possint (qua ratione dicuntur siccae) foris illis copia humidi excrementi redundat, & superfluitat. His itaque siccus est senex, quibus scilicet puer est humidus: ipsis nimirum solidis corporis partibus. Quod igitur siccissima ætatum senilis sit, ex jam dictis constat. Quod autem & frigidissima, ex tactu ipso, ex livore qui videtur in senibus, ex frigidis morbis, quibus facile corripuntur, ac denique ex imbecillitate naturalium functionum, facile etiam quis judicaverit. Et quid quaeso aliud est senium, quam via ad interitum? Si enim mors, naturalis caloris extinctio est, uti que senium veluti tabes quædam ejus fuerit. At verò de puerorum & florentium ætate, utra nam sit calidior, maxima inter medicos digladiatio est. Qui quidem omnes perperam mihi videntur facere, dum sensibilibus rerum cognitionem, laborioso cōsequi ratiocinio moliuntur. Nam cum eorum quæ actu calida sunt, alius esse iudex quam tactus nullus possit, sanè si multos viros, tum senes, tum adolescentes, tum pueros, tum infantes tetigerint, invenient facile, qui magis, minusve calidi sint. Ego siquidem, quod actu calidum est, tactu iudicio: sicuti & quod potestate calidum iudicatur, id ratione conor investigare.

Calidum

Formatione primam animalis constare ex semine, & sanguine menstruo. Partes quæ citius, quæ posterius formantur utero.

Recens edita animalium corpora esui inepta existere. Capreolore carnes laudantur.

Ætatem florentem esse in medio extremorum. Senes esse naturaliter temperie siccos, humidos excrementorum copia.

Senilem ætatem esse siccissimam animalium, & frigidissimam.

Senium esse ad interitum viam.

Mortem esse extinctionem naturalis caloris.

Tactum solum esse iudicem eorum quæ actu calida sunt.

Potestate calidum inveniri signari ratione non.

Intemperies cellata ad cum octo. Pituita. Sanguis. Pilus. Os. Cartilago. Chondrosyndesmos. Tendo. Membrana. Arteria. Vena. Nervus.

Sanguinem à corde suum calorem accipere. Cor omnium particularum tum maximè sanguineum, tum calidissimum esse. Hepar. Caro. Spinalis medulla. Cerebrum. Adeps quo pacto gignatur, & quibus habeat partibus.

Pulmonum caro.

Lienis caro. Renum caro.

Animalia frigida quæ. Animalia dici calida & humida, non simpliciter, sed ad demortua collata. Cutim volæ esse medium: totius substantiæ. Hominis nepe ratissimum nota.

Calidum itaq; quod in ætatibus cognoscere cupimus, primum & maximè tactu dijudicemus. Fiet autem optimum iudicium in alicujus infans corpore. Potest namq; & qualis calor illi ante biennium fuerit, in memoria reponi, & qualis nunc sit, post duos fortè vel tres interpositos annos. Nam si mutatio omnino ulla ad calidum frigidumve infanti facta videbitur, nullū præterea negotium erit, qui usq; ad florentem ætatem excessus futurus sit, colligere. Quod si plures pueros pluribus cōferre ætate florentibus velis, similes per omnia, & natura, & educatione, suis similibus conferes, ita ut reliqua omnia, quantum fieri potest, sint paria, una tantum ætate excepta. Si quidem in contrariis naturis disquirere differentiam ætatum, citra maximam imposturā non licet. Quare te his jam instructum, ceu rectè iudicaturū, ad ipsam experienciā remitto. Quippe si reliquis omnibus quæ extrinsecus adveniūt alterationibus circūcis, eas quæ ex sola ætate proveniunt differentias perpenderis, nec puer juvene, sicuti nec juvenis puero, absolute videbitur esse tibi calidior, cum nimirum eorū calores differant qualitate quadam, quæ ex imparitate difflatus gignitur. Est enim puerorū calor magis halituosus atq; copiosus, tangentiq; blandior. Florentium verò calor subacre quiddam habet, atq; insuave. Quæ differentia occurfus adducit plures ut credant, florentium corpus esse longò calidius. Res verò secus se habet. Nam quemadmodū aër, aut etiam lapis, aliquando pari calore cum aqua esse potest, nullum eo faciente discrimen, quod lapis ficcus sis, aqua humida: sic nimirum caloris æqualitas in pueris, florentibusq; invenietur, etiam si alter in humida, alter in substantia sicca repræsentetur. Qua ratione in pueris magis halituosus, & multus, & suavis: in florentibus verò exiguus & aridus, nec similiter suavis occurfus caloris existit. Siquidem puerorum substantiæ, utpote humidæ, multum foras effluit: florentium substantiæ parum, utpote siccæ. Itaq; neuter eorum simpliciter videtur calidior, sed alter multitudine ejusq; difflatur, alter acrimonia. Quippe infiti caloris, ejusq; blandioris, plus habet puer, quàm florens ætate, à quo quidem acrimonia caloris vincitur. Ergo calidi frigidique corporis solus tactus est iudex: humidi autem & sicci, unà cum tactu ipsa ratio. Siquidem quod siccum est, durum prorsus est: non tamen si quid durum est, idem statim & siccum erit, nisi mediocriter existat calidum. Nam & quod à frigore concretum est, durū cernitur, sicuti glacies. Quare nec si quid cum vehemēti calore sit molle, idem statim est humidum: verum cum mediocriter est calidum tum æstimare durum ne, an molle sit, oportet. Si enim molle sit, humidum est: si durū, siccū. Quæ quidē si sic se habet, partium quæ in humano corpore duræ sunt, nulla est humida. Neq; enim tanta in eo esse frigiditas potest, ut aliquid in ipso cōcrescere in duritiē queat. Potest tamen quod prius fuit fluxile, aliquando concrefcere, ut adeps: at durum, ne sic quidem evaserit. Cōmodè igitur dictum veteribus est, humidissimā esse adipem. Secundo post eam loco, carnosum genus. Ejus plures sunt species. Prima quidem, quæ propriè

caro appellatur, quā scilicet nusquam in corpore per solam invenies, sed est perpetuò musculi pars. Dein cujusque viscerum propria substantia est, cui ipsorum tota actio tribuitur. Porro cerebri pulmonisque corpus, proximum adipi est, humiditatis ratione. Propinquam habet naturam his, ossium medulla: non est tamen ejusdem generis cum ipso cerebro, neque etiam cum spinali medulla. Hac cerebrum calidius est, & humidius, eoque mollius. Cujus anteriores partes tantò humidiores sunt, quantò molliores. Omnia tamen hæc cute humidiora & frigidiora existunt: ac breviter, omne exangue, frigidius est sanguine prædito. Proxima cuti est mollium nervorum natura. Duriores autem in humido & sicco, secundum cutis naturam se habent. At calore ab ejus natura tantum absunt, quantum consentiens est exangue corpus à sanguine prædito abesse. Lienis autem, renum, & jecinoris caro, tantò cute est humidior, quantò est mollior: calidior verò, quantò magis abundat sanguine. Iam cordis caro ijs omnibus tantò est siccior, quantò durior: calidior autem non modò his, sed etiam omnibus absolute corporis partibus. At jecoris, lienis, renum, pulmonisque caro, simplicis cujusdam naturæ est, circa cujusq; visceris venas, arterias, & nervos crescens. Cordis simplex carnis natura non est, sed sunt in eo fibræ, quales in musculis cernimus, quibus caro circumhæret. Atq; hæc quidem carnes cute sunt calidiores: fibræ verò quæ cutis, partim paulò magis, partim paulò minus, tum frigidæ sunt, tum siccæ, partim similes omnino cutis substantiæ. Porro omnes membranae cute sunt sicciores: ligamentaq; ipsa, quantò cute duriora sunt, tantò etiā sicciora. Tendones quoq; longè duriores sunt cute. Cartilago verò post ligamētum est: ac deinceps medium quoddam inter ea corpus, quod *νεροχονδρώδης σπινθηρ* quidā anatomici appellant, ac si dixeris ligamentum cartilagineum. Os verò omnium quæ cutis operit, durissimum est. At eorum quæ cute extant, siccissimus est pilus: deinde cornu, mox ungues, ungulæ, calcaria, & rostra. Succorum optimus ac maximè familiaris est sanguis. Hujus veluti sedimentum est fæx, atra bilis. Quæ idcirco tum frigidior, tum crassior sanguine est, sicuti flavas bilis longè calidior. Frigidissimum verò ac humidissimum omnium quæ in animali habentur, pituita est. Instrumentum autē quo id cognoscitur, ipse est tactus. Ac particulæ quidem, & succi corporis, ad hunc modum se habent. Iam verò crassitudo & gracilitas habitus, corporum temperamenta sequuntur, non ea modò quæ naturalia sunt, sed etiam si qua ex longa consuetudine sunt cōtracta. Multos siquidem, qui natura graciles fuerant, pingues redditos vidi: cōtraq; qui pingues fuerant, graciles: illis quidem ex ociosa & delicata vita, toto temperamento ad humidius mutato: his verò, multa tolerantia, & curis & tenui victu perficcatis. Cæterū quibuscunq; latiores sunt venæ, ij calidiores natura sunt. Quibus angustiores, contrā, magis frigidi. Caloris namque opus est, has dilatare. Quare meritò in idem recidunt, venarum quidem angustia, cum habitu pingui & crassiori: habitus autē gracilis, cum laxitate venarum,

Carnē nusquam per se reperiri.

Exanguia omnia frigidiora sunt sanguine prædita.

Cordis caro calidior universis corporis partibus.

Fibræ.

Membranae.

Tendones. Cartilago.

Chondrosyn-desmos.

Os.

Pilus. Sanguis succorum optimus.

Atra bilis fæx sanguinis.

Pituita frigidissima & humidissima.

Instrumentū quo in corpore habentur.

Tactus est instrumentū qualitatū discernendum.

Pinguitudo unde cōtrahatur.

Gracilitas unde cōtrahatur.

Venis latioribus præditi, calidiores: sicuti angustioribus, frigidiore.

Gracilitas unde cōtrahatur.

Venis latioribus præditi, calidiores: sicuti angustioribus, frigidiore.

Gracilitas unde cōtrahatur.

Venis latioribus præditi, calidiores: sicuti angustioribus, frigidiore.

Ætatis calores qua methodo dignoscendi.

Puerorū juvenumq; calorem differre inter se qualitate tantum. Puerorū calor mitis. Florentiū calor acris.

Tactus quorū sit iudex. Sicca omnia esse dura. Dura quæ sunt, non necessario esse sicca.

Molle cū mediocri calore esse humidū.

Carnis plures species.

venarum. Quod si quis simul pinguis crassusque est, ac venas latas habet, is consuetudinis alicujus occasione, non natura, pinguis est redditus. Sicuti est diverso, qui angustas habet venas, & gracilis est, ne hunc quidem talem esse natura, est necesse. Quineriam cum fames urget, ex laxitate & angustia venarum, non ex cetero corporis habitu, spectanda esse mediocritatem, monet divus Hippocrates. Quippe qui angustas possident venas, & exigui sunt sanguinis, nec longam inedia ferunt. Quibus sunt latae, iis copia sanguinis inest, & citra noxam cibo abstinent. Etenim quicquid pingue est in sanguine, leveque, id in corporibus calidioribus alimentum quoddam calido fit: in frigidioribus vero asservatur. Ubi igitur id a venis transmissum, inciderit in particulas frigidas, in ipsis quidem concrevit. In calidioribus vero natura partibus, cujusmodi sunt carnosae, a calore absorbitur, & digeritur: nisi forte frigiditati temperamenti vita indulgentior accedens, ipsis carnosae particulis allinat aliquid pinguitudinis. Atque hac ratione foeminae viris pinguioribus sunt, quod nimirum sint eis frigidiores, plurimumque domi versentur. At qui habitus natura sunt temperati, mediocrique exercitio utuntur, hos necesse est eufarcos esse, hoc est, mediocri habitudine corporis. Quibus vero abundat humidum, & calor a mediocritate summa non longe abest, ij corpulenti sunt. Corpulenti etiam sunt, qui natura sunt temperati, ceterum ociosi & desidiosi vivunt: cum videlicet consuetudo sit veluti acquisitiva natura. Adeps etenim, ex habitus frigiditate gignitur. Corpulentia, ex sanguinis copia. Mediocritas, temperata natura est nota. Et corpulenti quidem, omnino plus adipis habent, quam mediocri habitudine praediti. Nec tamen pro carnis semper portione, adeps simul augetur: sed alios habere plus carnis, alios plus adipis videas: aliis ambo pari modo sunt aucta, cum videlicet tantum illis, supra temperatam naturam, humoris est, quantum & frigoris. Quibus autem plus est adipis, in his frigidi plus est, quam humidi: aequum ut quibus caro est plenior, his humoris plus justo est, non tamen frigoris. Porro ubi nullum adhuc morbosum symptoma crassato corpori incidit, ipsa abundantia humoris intra sanitatis est fines. Cum autem mediam temperatamque naturam, reliquarum veluti canonem semper statuamus, quae vero ex huius utraque sunt parte, judicemus intemperatas, manifestum utique est, in sanitatis statu & latitudine, & majoris minorisque inveniri rationem. Est enim alia sanitatis, alia morbi intemperies. Morbi quidem, ea quae a media temperie quam longissime abest. Sanitatis, quae paulum. Definire autem modum, nec mensura, nec pondere licet. Ceterum intemperiei quae intra sanitatem consistit, sufficiens nota est, quod nulla functio animalis manifeste adhuc sit oblaesa. Quantum igitur intervallum est inter id quod perfectissime suam obit functionem, & id quod actionem aliquam habet manifeste vitiata, tanta est profecto & sanitatis, & intemperiei, quae intra sanitatem consistit, latitudo. Ab hac proxima est intemperies morbofa, cum scilicet animal vitio intemperiei jam aegrotat. Rursus, quemad-

modum naturali calore optimam servante temperiem, humidum, quod intra sanitatis terminos est, auctum, non adipem modo in homine, sed etiam corpulentiam gignit: & adipem quidem parcius adiciit, liberalius autem carnem adauget: sic etiam, si humidum & siccum mediocritate ad unguem inter se servant, calor autem sit in homine minor, necesse est huius corpus adipe quam carnis copia magis abundet. At vero si calor augeatur, servetque mediocritatem altera contrarietas, minus erit ei animalis adipis, quam carnis. Sicuti est diverso, si quando praepolleat siccum, altera contrarietate medium modum servate, & gracilius & durius corpus evadet. Ex quibus liquet, non solum ratione monstratum esse, quod simplices in animalium corporibus intemperies habeantur, sed etiam, quod singularum manifestae sint notae, idque in universis habituum corporis differentiis. Porro calida & sicca temperies, hirsuta est: verum ea in summo. Mediocriter autem, quae calida quidem est, sed in altera contrarietate mediocritatem habet. Similiter & quae sicca quidem est, sed in calido & frigido mediam temperiem obtinet, modice est hirta. Nuda pilis sunt frigida omnia temperamenta, sive ea modice se habeant in humiditate, sive etiam immodice. Ceterum ad summum glabra est frigida temperies & humida. Minus hac, quae frigida est, sed in altera oppositione, temperata. Adhuc minus, quae frigida est & sicca. Siquidem siccitas cutis, in iis qui molli sunt cute, maxime omnium idonea est ad pilorum generationem: & quo siccior calidiorque fuerit, eo magis pilos gignere potest. Hanc enim siccam & calidam cutem, velim terrae statui assimiles, quae abeunte sit vere, vel ineunte aestate. Etenim per omnem cutem digeritur semper a calido aliquid, quod secum etiam non nihil interni humoris evehit. In quibus igitur humida est cutis, & mollis, qualis modo concrevens caseus, in iis, eorum quae exciderunt, via per cutem dilatata non manent: neque partibus ejus, quae prius dissidebant, rursus inter se coeuntibus. At in quibus dura est, nec absterilis caseo concreto, perforatur quidem, eorum quae exeunt transfluxu. Cum autem uniri rursus per siccitatem nequeat, servat immutatos meatus, qui etiam perpetuo transfluentium ictu, indies magisque fistulant. Per eos igitur, hallitui minime impeditus est transitus. Sin autem fuliginosus, terreusque vapor sit, id quod permeat, subinde contingit, ut in angustis spiramentis impactus, nec facile rursus intro redeat, nec item possit vacuari, sed impellatur ab alio secundo vapore, atque ille rursus ab alio, & sic consequenter, simulque multi vapores fuliginosi invicem complicati & conjuncti, in unum corpus degenerent, quale est fuligo ea, quae foris cernitur. Fit autem niger pilus, cum deusto vi caloris vapore, excrementum in exactam fuliginem permutatur. Flavus vero, cum vapor minus torretur. Nam quod tunc est impactum, flave bilis excrementum existit. At albus pilus ex pituita nascitur. Rufus, sicuti coloris albi, flavique est medius, sic generatio ejus ex pituitosa biliosaque facis, media quadam natura provenit. Crispi pilis sunt, vel propter siccitatem temperamenti, quae intorquet illos (quae

Venas angustas habentes, aegre ferunt inedia.

Venas latas habentes, facile cibo absterunt.

Famina cur sint viri pinguioribus.

Eufarcos.

Corpulenti qui.

Consuetudo veluti acquisitiva natura.

Adeps qui gignatur.

Temperata naturam esse omnium animalium canonem.

Sanitatis spatium habere in se latitudinem.

Intemperies sanitatis & morbi, quibus notis deprehendantur.

Hirsuta esse quae calida sunt & sicca.

Glabra existere, quae frigida sunt & humida.

Cutis siccitatem idoneam esse pilorum generationi.

Pilorum generatio.

Pili nigri generatio.

Pili flavi generatio ex flava bile.

Pili albi generatio ex pituita.

Pili rufi generatio.

Pili crispi generatio.

Aethiopes o- ratione Aethiopes omnes sunt crispi) vel pro-
mnes cur cri- pter imbecillitatē exhalationis, quæ rectam viā
spi. sibi moliri non potest: vel deniq; ob duriorē cu-
 ris naturam, quæ ipsam exhalationē, etiam si va-
 lens sit, prohibet recta ferri regione, cogitq; ut
 ad latus se inflectat, ac sibi obliquum transitum
 paret. Est quādo ambobus coeuntibus, & exha-
 lationis, quæ meatum finxit, imbecillitate, & cu-
 tis siccitate, pilorum radicibus obliquitas ipsa
 contingit. Quales autem in radice finguntur, ta-
 les rationabile est pilos perpetuò fore. Atq; hæc
 quidem pilorum est generatio. Sequens est, ut
 causas omniū quæ temperamentis in pilorum

Pilorum va- riis contingunt, dicamus. Ergo Aegyptij, Ara-
rietates secu- bes, Indi, quiq; calidam & siccam regionem in-
dum Varias colunt, nigros, exigui incrementi, siccos, crispas,
etatum, re- & fragiles pilos habent. Contrā, qui humidam,
gionum, cor- frigidamq; regionem habitant, Illyrij, Germani,
porumq; tē- Sarmatæ, & omnis Scythica plaga, modicē au-
peraturas. ctiles, graciles, rectos, & rufos obtinent. Qui ve-
 rò inter hos temperatum colunt tractum, hi pi-
 los plurimi incrementi, robustissimos, & modi-
 cē nigros, mediocriterq; crassos, tum nec pror-
 sus crispas, nec omnino rectos, emittunt. In æta-
 tibus ad eundem modū. Infantium quidem pili,
 Germanis: florentiū ætate, Aethiopibus: Ephe-
 borum atq; puerorū, ijs qui temperatum locum
 incolunt, in robore, crassitudine, magnitudine,
 colereq; ad portionem se habent. In corporum

Infantes cur glabri. similiter se habere pili videntur. At pueri admo-
 dum parvi, nudi prorsus sunt pilis, quod nec
 meatus adhuc ullus illis in cute sit, nec excre-
 mentum fuliginosum. Incipientes autem pube-
 scere, parvos & imbecilles exigūt. Qui verò jam
 florent, hi valentiores, multos, magnos, & ni-
 gros habent: quod & frequentes meatus jam il-
 lis sint facti, & excrementis fuliginosis, præ ficci-

Pilorum ca- pitis, ciliorū & superciliorū generatio qualis exi-
stet. rate & calore, abundant. Cæterum pili qui in ca-
 pite, cilijs & supercilijs habentur, etiam pueris no-
 bis innascuntur. Siquidem generatio iis est, non
 qualis herbis, sed qualis stirpibus prima ratione
 à natura conditis, nō temperamentū necessario
 sequentibus. Verū hi quoq;, quod quidē sint,
 id naturæ arti acceptum ferunt. Quod nigri, ru-
 fivē, aut alio quovis sint colore, id ætatis tempe-
 ramento omnino debent. Subnigri enim ferē
 sunt, quoniam quod in meatibus est impactum,
 nondum totū est nigrum: quippe cū humiditas
 multa sit, & transitus facilis, & deustio imbe-
 cilla. Boni verò incrementi & modicē crassi sunt,
 propter excrementorū, quibus aluntur, copiam.
 Siquidem ipsa pars corporis, in qua fiunt, sicca
 est. Tota namq; calva ossea est. Cutis verò quæ il-
 li est circumdata, tantō reliqua totius corporis
 cute est siccior, quantō durior. Ascendunt tamē
 tum ab iis quæ circa cerebrū sunt, tum verò ex
 toto corpore, fuliginosi excrementi non parva
 vis. Quo fit, ut quale ætate florentibus totū cor-
 pus, ejusmodi jam infantibus sit capitis cutis.
 Eoq; rationabilius nōnulli procedente tempo-
 re calvi redduntur, quibus scilicet à primo ortu
 cutis durior erat. Siquidē in ea cute, quæ fuerit
 siccata impensius, nihil nasci potest. Itaq; etiam

interna manuum, & inferna pedū, semper sunt
 pilorū expertia, quod siccissimus, densissimusq;
 is tendo sit, qui sub cute habetur. Quibus autē
 ad summam ariditatem cutis capitis non perve-
 nit, imbecilli iis omnino, albiq; pili fiunt: quos
 vulgò canos appellant. Imbecilli quidem, con-
 gruentis alimenti penuria: albi verò, propterea
 quod alimentum quō aluntur, veluti marcor pi-
 tuitæ est, quæ spacio computruit. Ubi enim mea-
 tus etiamnum manet, excrementū verò exiguum
 est & lentū, languideq; à calore propellitur, non
 dissimiliter putredini afficitur. Jam calvi fiunt
 homines, cū senescunt, à syncope magis. Ca-
 nescunt magis à temporibus: quoniam regio il-
 la est omnium aliarū siccissima. Hæret enim cu-
 tis illic ossi nudo. Tempora verò, humidiora
 sunt, quod in his muscoli magni sub ipsa cute ha-
 beantur. Omnis namq; musculus carnosus est. At
 caro tum osse, tum cute humidior. Verū enim-
 verò, quandoquidem humanum corpus nōnul-
 lis quidem æquabili per totum temperamento
 esse potest, nōnullis autē, neq; iis paucis, inæqua-
 liter esse affectum, cū eorū aliæ particulae tem-
 peratæ, aliæ intemperatæ esse possint, certē ex uni-
 ca particula corporis, simpliciter de toto sem-
 per conjectandum nō est. Neq; enim hi, qui do-
 cere mores ex ingenio corporis profitentur, de
 omnibus pronunciant simpliciter. Verū si quis
 impensē hirtus est pectore, hunc audacem judi-
 cant. Sin cruribus hirtis, salacem. Quare homi-
 num temperamenta cōsiderantibus, singulæ par-
 tes per se examinandæ sunt. Nec si cui thorax
 hirsutus est, huic totū corpus calidius, sicciusq;
 ex necessitate putandum: sed plurimū in corde
 caloris esse, eoq; audacem illum, cui talis fuerit, si
 existere. Posse verò aliquādo etiam hujus ipsius
 rei occasione accidere, quo minus totū his cor-
 pus similiter calidum siccumq; sit, quod scilicet
 plurimū caloris sursum spiraverit, atque in am-
 biente abierit. Nam si tota corporis temperies
 æqualis sit, erit his statim thorax ipse universus
 latissimus, venæ amplæ, arteriæ magnæ, eadēq;
 maximē vehemētissimeq; pulsantes: tum pluri-
 mi per totum corpus pili, atq; hi quidem in capi-
 te plurimi incrementi, nigri, & crispi: utiq; in pri-
 ma ætate. Procedente verò tempore, calvities
 excipiet. His etiam & robustum, & exactē deli-
 niatum, & musculosum totum erit corpus: tum
 cutis nigrior, durior, hirsutiorq;. Ad eundē mo-
 dum si cōtraria omnia in thorace sint, atq; æqua-
 lis in toto corpore vigeat temperies, hoc est, si
 humidiores & frigidiores universa corporis
 partes fuerint, thorax quidem angustus, & gla-
 ber erit: sicuti etiam totum corpus pilis nudum.
 Cutis verò mollis & alba, capilli subrubi, potissi-
 mum in juventute. Hi in senectute nō calvescūt,
 timidiq; statim, & ignavi, & segnes: adde etiam,
 parvis venis, ac minime conspicuis, & adiposi
 sunt. Iidem nervis musculisq; imbecillis, & artu-
 bus parū exactē deliniatis, & blæsis. At ubi varia
 partiū temperies est, ex una earū, de toto pronū
 ciare nō licet: sed ad eūdā singulæ sunt, earumq;
 temperaturæ ex functionibus sigillatim investi-
 gandæ. Cutis siquidē in nostra regione (quæ tē-
 perata est) subjectarū partiū naturā producit: nō ta-

Vola manus
cur glabra.
Plantæ pedis
cur glabra.
Cani qui fi-
ant.

Calvities cur
in syncope
magis.
Canities cur
in temporibus
potius.

Pronunciā-
dum simpli-
citer de corpo-
re uniuscuius-
que non esse, ex u-
nica eius par-
ticula.

Hirti pectore
audaces.
Hirti cruri-
bus libidino-
si.

Calidi & sic
ei tempera-
menti nota.

Frigidi hu-
midq; tem-
peramenti
nota.

Temperies par-
tium, ex ea-
rum functio-
nibus pensi-
tanda.

Cutim in re-
gione tempe-
rata, subie-
ctarum par-
tium natu-
rā producere.

men omnium, sed earum tantum, quae similem habent ipsi cuti temperie. At in regionibus iis quae recesserunt a temperamento, non potest ex eo affectu, qui in cute cernitur, internarum partium temperies clare discerni, cum internae externaeque partes non ad eundem modum se habeant. Gallis enim, Germanis, & omni Thracio ac Scythico generi, frigida, humidaque cutis est: ideoque etiam mollis, alba, & pilis nudata. Omnis vero naturalis his calor in viscera confugit, una cum sanguine: ubi dum agitur & premitur, fervetque, iracundi, audaces, & praecipitis consilii redduntur. Aethiopibus vero & Arabibus, omnibusque breviter iis, qui ad meridiem incolunt, natura cutis ex ambiens aestu & naturali calore foras acta, usta, ficca, dura, & nigra redditur: toto nimirum corpore, naturalis quidem caloris exigua obtinente portione, sed alieno, atque adscititio incalescente. Quare attendendum in singulis corporibus est, suone ac proprio, an adscititio calore incalcant. Quae enim putrescunt omnia, adscititio calore sunt calida, frigent proprio. Qui meridianam plagam incolunt, adscititio calore sunt calidi, proprio frigidi. Apud nos quoque naturalis calor hyeme est uberior, adscititius minor. Aestate contra, adscititius major, & naturalis minor. Omnia namque haec definit oportet, qui recte temperamentum est cogniturus. Neque enim si cutis nigrior appareat, totus homo omnino calidior est. Nam si alter in sole versatus diutius fuerit, alter in umbra, illi nigrior, huic albidior cutis erit. Verum hoc ad totius temperamenti alterationem nihil facit: quare singulae partes particulatim examinandae sunt, iudicandaeque ex functionibus propriis. Verbi gratia, ventriculus, si bene concoquit, temperatus: si non bene, intemperatus cognoscitur. Si nidorosus, vel fumosus ructus edat, quod igneus calor in eo sit: si acidus quod imbecillus, deprehendes. Simili modo, si qui bubulam, & omnia quae concoctu difficilia sunt, concoquunt, quod immodicus eorum calor sit: si qui autem haec concoquere nequeant, conficiant autem saxatiles pisces, aliaque similia, quod infirmus, pronunciare ne dubites. Videndum autem his rursus, num succi alicuius aliunde confluentis culpa, ejusmodi symptomata ventriculo accidant. Compluribus enim ex capite pituita, idque maxime Romae, ac locis perinde humidis, in ventriculum confluit. Nonnullis etiam, licet hoc raro, & paucissimis accidat, flava ex jecinore bilis. Si quidem ipse vidi quibusdam perquam pituitosis hominibus, multam in ventriculo colligi flavam bilem. Vidi & qui bilem nunquam vomuerunt, qui tamen & graciles, & hirsuti, & musculosi, & nigri, & venosi erant. Intelligere autem convenit, meatum illum, per quem jecur bilem in ventriculum vomit, aliis geminum esse, aliis unicum. Ac plurimum quidem is unicus est, in exortum intestinum insertus. Vel si geminus meatus sit, in exortum ipsum major inseritur: minor in fundum ventriculi, parum supra pylorom. Sed tamen in paucissimis superior pars major, inferior minor existit. Caterum quibus est major, his quotidie in ventrem, non exiguum bilis effunditur: quam & vomant ante cibos oportet, & nisi id faciant, la-

duntur. Quibus autem unicus est omnino meatus, is tota bilis in jejunum confluit. Hos igitur licebit nobis dignoscere, primum quidem, ex totius corporis temperamento. Deinde ex iis quae infra exfluunt. Tertiū notae genus, in iis quae vomitu reiciuntur, consistit. Siquidem qui multam colligunt bilem, cujus nihil per supernam partem excernunt, iij biliosa miera deiciunt. Qui autem & pituitoso sunt corporis habitu, & bilem evomunt, ab his minus deiciuntur biliosa, quod & minimam flavam bilis gignant, & ejus maxima portio in superiorem ventrem perveniat. Jam vero, quibus in ventre biliosum excrementum gignitur, id porri virorem praefert: debetque omnino iis cibis fuisse cum justo calidior, tum cacoehymus. Quibus autem ex jecinore in ventrem defluxit, his flava ea, pallidave evomitur, etiam si boni in primis succi fuerit id quod sumpserunt, ad summumque fuerit concoctum. Imo vero magis iis qui ad unguem coxerunt vomuntur flava: atque etiam magis his, qui diutius cibo abstinerunt. Quae vero bilis porrum refert, iis solis gignitur in ventre, qui utique concoxere male. Quinetiam sollicitudo, ira, dolor, labor, exercitatio, vigilia, & inedia, plus succi flavae bilis coeervat, propterea quod plus ejus in jecinore gignunt. Sunt igitur haec certa indicia: tum praeterea, quod ubi siccu & igneus ventriculi calorem converterio ad biliosum sequitur, panis, & suilla, & bubula caro, commodius quam saxatiles pisces coquantur. Quod si ex jecinore bilis affluat, ex comestorum mutatione nulla secutura est concoctionis diversitas. Ad eundem modum, si defluens a capite in ventrem pituita, acidi ructus in causa est, aut si caput etiam dolore tentetur, discernere semper oportet illa quae propria sunt, ab iis quae per consensum accidunt. Jam cerebrum ipsum cujus sit temperamentum, per se aestimare est satius: nempe ex canitie, catarrhis, rufi, destillatione, & salivae copia (quae illud frigidius, humidiusque esse docent) quam ex corporis totius affectu. At calvities ex siccitate provenit. Nigrorum autem, & frequentium pilorum proventus, aequalis in cerebro temperamenti est nota. Qui igitur resimos, humidos, aduncos autem absolute siccos dixerunt, duplici nomine hallucinari videntur. Primum, quod unius particulae occasione, de toto corpore pronunciare sunt ausi. Secundum, quod formatricis in natura virtutis, quae artifex facultas est, & particulas secundum animae mores effingit, parum minerunt. De hac enim Aristoteles dubitavit, numquid divinius originis esset, atque a miscella elementorum diversa. Rationi autem est consonum, quae litates quidem ipsas esse organa: at formatore, esse organum opificem. Nec vero propterea quod pueri nascentis sunt resimos, florentes aetate magis aduncis, idcirco rationabile est, resimos omnes censere humidos, aduncos siccos: cum fieri possit, ut formatricis potentiae id opus sit, potius quam temperamenti. Quod si temperamenti est nota, at certe ejus quod in naso tantum habetur, non ejus quod in toto corpore, nota fuerit: nisi forte totius corporis temperies, cum nasi temperamento pari ratione se habeat. Ad eundem modum est iudicandum de cute, de ceterisque corporis partibus. Nec enim si cutis sit dura, necessario sic-

Bilis miera
sa quibus in
jejunum co-
fluit.

Nota quibus
discernuntur
hi quibus bi-
lis in ventri-
culum atque
in jejunum
confluit.

Bilis praefert
quibus in ve-
tre gignatur.

Bilem gignit
ira.

Bilis orsa ab
igneo calore
ventriculi,
et eius qua
confluit a je-
cino, indicat.

Cerebri tem-
peries quibus
aestimanda sit
notis.

Calvities ex
siccitate ori-
tur.

Formatricis
natura effin-
git particu-
las secundum
animae mo-
res.

Qualitates
esse organum
opificem.

cum est animans. Quippe ostrearum corpus humidissimum est, cutis ipsa siccissima. Verum si per totum æquabiliter sit corpus attemperatum, ratio est, ut qualis sit cutis, talis sit & reliquarum partium unaquæque. Spectandum præterea in universum est, ex quibus in quæ, mutationes ipsæ sint factæ. Fit enim nec raro, ut præsens nota, prioris temperamenti sit, non ejus quod in corpore nunc habetur. Veluti si quis sexaginta annos natus, denso pilo sit, non quod calidus & siccus nunc sit, sed quod talis antea fuerit. Jam verò neque ex ipsa excrementorum natura, indefinite de temperamenti est pronunciandum. Fieri siquidem potest, ut colligantur pituitosa excrementa, nec tamè humida sit particula, sed simul frigida & sicca: cum nimirum ex cibis, nequiquam ex nostro corpore, ipsa pituita oriatur. Corpus enim ubi ingestos cibos non vincit, simile illi ipsum quoque excrementum gignit. Cæterum quod non omnia, quæ calfaciunt, necessario etiā exiccent, ut perperam nonnulli putarunt, nemini obscurum existimo. Aqua siquidè calida, & quæcunque natura sunt calida & humida, si inflammationi, exèpli gratia, admoveantur, tamen si ipsa quidè supervacanea, quæ media similarium spatia occuparunt, evocet, corpora tamè ipsa tantum abest ut siccet, ut etiā illis humorem adiciat. Atque jam huc secundum cōmentariū claudamus.

G A L E N I P E R G A M E N I.
de temperamenti, liber III.

Cum igitur antea traditum sit, unumquodque actu calidum, frigidum, humidum, atque siccum, vel ex eo tale dici, quod summam habeat hujusmodi qualitatem: vel quod vincat in eo id genus qualitatum aliqua: vel quod ad cognati generis mediocre aliquid, vel ad unumquodlibet, à nobis sit collatum: monstratumque præterea sit, quemadmodum ea quis cognoscere exactè possit: reliquum est, ut de iis, quæ talia potestate sunt, differamus. Etenim quod quale dicitur, tale nondum est sed potest tale esse, id hoc esse potestate dicimus: verbi gratia, hominem qui nuper natus fuit, rationale, & avem volatilem, scilicet quod eorum unumquodque futurum est, hoc ceu jam id sit, appellantes. Est autem perfectum quid, ac præsens, ipse actus: sicuti imperfectum, ac futurum, potestas. Ac maximè quidem propriè sola ea potestate esse dicimus, in quibus natura ipsa suo preceptu impetu ad absolutionem venit. Proximus huic modus, eorum est, quæ sunt propinqua materia, ut dum sanguinem potestate carnem appellas, quod minimam mutationem ad carnis generationem requirat. Dicitur potestate etiā esse, quod ei, quod ex accidenti dicitur, est ex adverso positum: ut si quis dicat, frigidam lavationem ex accidenti, non ex propria potestate calfacere corpus carnosum juvenis. Porro quæcunque medicamenta calfacere nostrum corpus sunt nata, ea, licet talia non appareant tangenti, calida tamen potestate vocamus, quod facile possint calida esse, quodque promptè in ignem vertantur, hoc interiecto discrimine, quod oleosa & ærea, in flammam, in prunam autem terrea degeneret. At quemadmodum neque ignis ipse augetur prius quam

victa ab eo ligna mutata sint, ita nec animantium calor à medicamentis, nisi illa prius & cōminuta aliquatisper, & nostro corpori juncta, ab ipso etiam mutetur. Quæ quidem si perfrigerato corpori quantumvis tenuia inspergantur, non calfacient illud. Proinde quæ refrigerata sunt partes, eas ejusmodi medicamentis plurimum perficamus, rarefacimusque, quod scilicet introrsum pharmacum penetrans, naturali animalis calori junctum, mutetur, & calfiat: quippe cujus si particula quæpiam vel minima, calorem actu concipiat, hunc deinde in totum, propter continuitatem, porrigat. Ac quicquid potestate quidem calidum est, huic nondum in natura sua frigido calidum præpollet, sed in propinquo est ut præpolleat, adeo ut brevè opem quod vincat, requiratur extrinsecus. Hanc illi modò frictio abundè præstare potest, modò vel ignis, vel corporis naturæ calidi contactus. Alia tamen citius, alia tardius corpus nostrum recalfaciunt. Cum autem quatuor sint corporis facultates, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, quæ effectus sunt totius in quovis corpore substantiæ, quam constare ex calido, frigido, humido & sicco, inter se mistis, dicimus, sanè ubi corpus nostrum unaqualebet earum qualitatum corpus sibi admotum demutat, nec ipsum hoc casu tota substantia existimandum est agere, nec quod ab ipso mutatur, posse ei assimilari. Quare nec unquam nutrietur quod ita mutatum est, id quod ipsum mutavit. At si exactè illud mutet, id est, si tota operetur substantia, uti que tunc sibi assimilabit id quod mutabitur, tum etiam ab eo nutrietur. Neque enim aliud nutritio est, quàm assimilatio perfecta. Omne autem animal congruenti, sibique simili alimento nutritur, quale est, quicquid corpori, quod nutritur, assimilari potest. Cæterum pro ratione similitudinis, alia citius, alia tardius assimilantur. Avium siquidem caro, haud magno negotio: suilla, majori: bubula etiam hac majori: vinum verò, omnium minimè, assimilari poterit, ubi prius in instrumentis coctionis manserit aliquandiu. In quibus antequam demutatū sit, fieri non potest, ut animalis corpori sit nutrimentum. At quæ quidem assimilantur, omnia quidem nutrimenta vocantur: reliqua omnia, medicamenta: quorum duplex natura est. Quippe vel cujusmodi sunt assumpta, ejusmodi etiam permanentia, vincunt, corpusque mutant, ad eundem modum, quo id cibos: atque hæc prorsus tum venenosa, tum naturæ animalis corruptoria medicamenta sunt. Vel mutationis initium ab animalis corpore consecuta, deinceps jam putrescunt, & corrumpuntur, ac deinceps corpus unum corrumpunt, & putrefaciunt. Sunt hæc quoque noxia venena. Est præterea & tertia medicamentorum species, eorum nimirum, quæ corpus quidem recalfaciunt, mali tamen nihil afferunt: sicuti & quarta alia eorum quæ & agunt, & patiuntur aliquid, sed spacio vincuntur, planeque assimilantur: quibus accidit, ut tam medicamenta sint, quam nutrimenta. Nihil autem miri est, si exiguum consecuta momentū aliqua, maximam à priori naturæ mutationem habent: cum cōstet olim in Mysia domum integrā cōflagrasse ex solo stercore columbino, quod ab ardenti sole inflammatum, fenestram proximam

Pituita oriatur ex cibis, minimè ex nostro corpore.

Calfacientia omnia non ex necessitate siccant.

Actu calidum, frigidum, humidum atque siccum, quotupluciter dicatur.

Potestate qua dicatur.

Actus, perfectum ac præsens quid. Potestas, imperfectum ac futurum. Potestate propriè quæ dicantur.

Oleosa in flammam vertuntur.

Terrea in prunam degenerant.

Medicamenta augere calorem nostrum non posse priusquam ab ipso mutentur.

Facultates nostri corporis quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix.

Nutritio est assimilatio perfecta.

Animalia omnia sibi simili alimento nutrir.

Vinum quæ citissime assimilari posse.

Nutrimenta qua dicantur.

Medicamentorum natura duplex perniciosa et sanatoria.

Medicamentorum familiarium natura duplex.

Stercoris columbini inflammabile.

proximam

Archimedis industria. Specular-entia.

Lapides attriti edunt flammā.

Medea medicamentum.

Calida potestate.

Vinum nutritur celeriter. Nutrimētū dici tripliciter.

Vinū immodicē laesū, frigidus affectus inducere.

Erodentium cutim nonnulla, cur intus tuto sumantur.

Nihil intus forisq; parē agendi facultatem sortiri. Lachrymam Cyrenaicam tuto per se nō sumi.

proximæ suum cōmunicavit incendiū. Qua ratione etiam ajunt Archimedem hostiū triremes urentibus speculis incendisse. Succenditur his promptè lana, stupa, ellychnium, ferula, & quicquid similiter his siccum & rarum fuerit. Flammā edunt & lapides attriti, atq; eò magis, si quis sulfure illos illeverit. Quare lucernā extinguens quidam, ac rursus lapidi, vel muro admovent, quē antea sulfure illeverat, ceu prodigiū quid illam accensam ostendit. Ejusmodi erat medicamentum Medeæ, ex sulfure & humido bitumine constans: quod quidem quibus illitum erat, omnia, ubi in id incidebat calor, accendebat, & inflammabat. Universa igitur hæc, potestate dicuntur calida. Jam verò quicquid corporum natura calidorum proprium est nutrimentum, id ea semper non roborabit tantum, sed etiam insitum eorum calorem augebit: id quod omni nutrimento est cōmune. At vino præter cætera proprium ac suum est, mutationis celeritas, ita utiq; ut tædæ, ellychnio, stupæ, & pici. Porro cum trifariam nutrimentum dicatur, secundum Hippocrate, nempe & quod nutrit, & quod veluti nutrimentum est, & quod futurum est nutrimentum: id utiq; quod jam nutrit, propriè nutrimentum vocatur, cum corpus nutriat & calefaciat: quod reliquorum neutrum facit. Quemadmodum igitur si exigua & imbecillæ flammæ, confertim multū olei infundatur, illam prorsus extinguet: sic etiam vinum, ubi plus bibitur quā ut vinci possit, tantum abest ut animal calefaciat, ut etiam apoplexias, paraplexias, comata, caros, nervorum resolutiones, epilepsias, convulsiones, & teranos, qui affectus sunt frigidi, inducat. Generatim enim, quæcunque assumpta in corpus ut nutrimentum calefaciunt, hæc interim frigefacere deprehendes, si immodicē aut intēpestivè sumantur. Nec verò mirari debemus, si nonnulla quæ cuti imposita, hanc erodunt, exulcerantq; ut sinapi, muria, allia, & cepæ quamtūtiſsimè comedantur: cum nimirum neq; intus in uno semper loco permaneant, sed undequaque ferantur, ac tum cibus, tum variis succis permixta cōminutaq;, innumeras subeāt alterationes: ita ut quod conveniens in eis est, assimiletur: quod supervacaneū & acre, per alvum, urinas, sudoremq; excernatur. Quod autem si acrimoniam suam servarent, etiam exulcerarent interna, ex iis quæ ob cacochymiam spontē accidunt ulceribus, cum in internis partibus, tum vel maxime in ipsa cute, facile intelligere poteris. Neq; etiā est dubitandū, cur medicamentorū, nonnulla, cum nihil nos offendāt extrinsecus, intrò assumpta magnū afferant malum: aliqua rursus intrò assumpta, nonnunquam lædant, nonnunquam conferant: aliqua nō solum intrò assumpta, sed etiam extrinsecus applicita offendant. Quippe nihil intus forisq; parē agendi facultatem sortitur. Mirum etiam esse nō debet, si lachrymam Cyrenaicam ipsam quidem per se non liceat citra incōmodum sumere: quæ tamen si omnino exigua, vel cum aliis opportunè sit sumpta, magnopere conducit. Atque ad hunc quidem modum, quæcunque corpus excalfaciunt, ubi mutationis principium in ipso accipere, recalface-

re illud sunt apta. Quæ verò refrigerant, veluti papaveris succus, hæc à nostro corpore, ne vel paululum quidem demutatur, sed ipsum statim vincunt, ac mutant, etiam si calfacta prius dederis. Est enim eorum natura frigida, ut aqua: quæ per se quidem frigida est, ex accidenti verò aliquando calida. Verum acquisititius ejus calor brevi perit, naturalis frigiditas manet. Quemadmodum igitur aqua calida flammæ injecta eam extinguit, sic meconium, vel si id quantum vis calfactum dederis, & calorem animalis refrigerabit, & necis periculum afferet. Quamquam id genus medicamenta, si parçè exhibita sint, & unā cum iis quæ ipsorum frigiditatem retundāt, nonnunquam usum aliquem nostris corporibus præstāt. Jam verò medicamen id quod cantharidas recipit, hydericis auxiliatur, tametsi cantharis ipsa vesicam exulceret. Discernere autem in omnibus quāmaximè oportet, quæ per se sunt, ab iis quæ per accidens. Nonnulla quippe cum siccam sint sortita substantiam, ubi largo calore liquata fuerint, humiditatis speciē exhibent: ut æs, & ferrum. Quædam per se humida, ubi in syncero frigore sunt morata, apparent sicca, uti glacies. Quocirca de illis absolute pronunciandum non est: sed qualiter in calore frigoreq; se habeant, considerandum: ac si tandem non ad id quod secundum accidens est, sed ad id quod per se, respicientibus nobis, judicandum. Porro cōmunis in omnibus, unaq; judicandi ratio, est alterationis celeritas. At cum calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, quædam dicantur: nempe hæc quidem, per id quod exuperat: illa vero secundum qualitatem quam habent summam, à qua nimirum denominantur: in utrūcunq; horum promptè vertitur, de quo agitur judiciū, tale potestate fuerit. Oleum namque, bitumē, resina, & pix, calida potestate sunt, quod in flammam verrantur facile. Vinum autem, quod facile fiat sanguis. Pari modo mel, caro, & lac. Atque hæc quidem, totis ipsorum alterationis substantiis, nutrimenta se alterantiū sunt. Quæ verò unaqualibet qualitate alterantur, ac mutantur, ea medicamenta tantum sunt. Medicamenta itidem sunt, & quæ nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota servata integra, corpus ipsum afficiunt. Cæterum totum eorum genus naturæ ipsi contrarium, grave, ac maxime deleterium existit: quamvis ubi planè exhibentur minima, nullum exhibent sensibile nocumentum. Porro judicabitur contrarietas ipsorum ex ea, quæ media intercedit, mutatione. In elementis, verbi gratia, neque aqua mutari potest in ignem, neq; ignis in aquam, sed ambo in aërem, ipse verò in utraque. Ergo continens & sine medio est aquæ mutatio in aërem: itemq; ignis: non continens ignis & aquæ in alterutrū. Hæc igitur inter se contraria, pugnantiaq; sunt. Non dissimili ratione papaveris succus humano corpori prorsus contrarius est, ut quod in eum quicquam agere, ne una quidem qualitate possis, ac multò minus tota sua substantia. Atq; unum quidem deleteriorū genus ejusmodi est. Alterum est eorum, quæ ex nostro calore motum aliquod mutationis accipiunt, ac dein-

Papaveris succus nō immutatur à nostro corpore. Aqua per se est frigida.

Cantharis vesicam exulcerat. Distingueda esse, quæ per se, atq; ex accidenti dicuntur.

Potestate tale qua ratione dicatur a liquid. Potestate calida qua dicuntur.

Nutrimenta qua. Medicamenta qua.

Deleteria qua dicuntur. Contrarietas qualiter iudicanda.

Elementorū in se invicem transitus.

Papaveris succus humani corpori omnino contra-rius.

Deleteriorū genus. Deleteriorū secundum genus.

de in multifarias alterationes vertuntur, quibus corrumpi naturam nostram accidit. Quæ igitur corpus rodunt, putrefaciunt, & liquant, meritò potestate calida nominantur. Cōtrā, quæ refrigerant, & sensum auferunt, notabilemque inducunt torporem, frigida. Verum in applicandis iis quæ natura quidem sunt frigida, sed per accidens calida, contingit eorum calorem acquisitum necessario perire: propriā autem temperiem frigidam, à nostra nihil immutatam per 10 severare. At quemadmodum salamandra ad certum usque terminum ab igne nihil patitur, uritur autem si longiori spacio sit igni admota: sic & mandragora, & cicuta, & psillium, brevi spacio igni applicita, proprium adhuc temperamentum servant: largius autem excoacta, illico corrumpuntur, nec quicquam efficere, eorum quæ prius poterant, valent. At talium quidem omnium natura, hominibus maximè existit contraria: eorum verò quæ celerrimè nutriunt, cōvenientissima. 20 Reliqua omnia, media inter hæc sunt, quorum alia magis, alia minus agere ac pati à nostro corpore possunt. Siquidem castoreum & piper, agere magis in corpus nostrum, quam pati ab eo valent: vinum, & mel, & ptisana, pati magis quam agere. Cæterum ubi duo corpora inter se cōmissa multo repugnant tempore, certantque de alterando, utrumque eorum tum agere, tum pati est necesse. Semper quippe agit id quod vincitur, in id quod vincit: adeo tamen exiguum ut sensum effugiat. Hoc autem in iis quæ nutriunt, etiam 30 compertum est. Lactuca siquidem, quandiu ab æstuantis ventriculo coquitur, manifestè quidè refrigerat, sitim compescit, atque adeo quod frigida & humida sit, somnum conciliat. Ubi verò ex ea nutritus homo jam fuerit, insiti caloris substantiam augebit. Ventriculum autem ea lædit refrigeratum. Quare ubi id genus utrumque præstant, & quod veluti medicamenta corpus nostrum afficiant, & tanquam nutrimenta naturalem calorem augeant: cum hoc exploratum jam sit, interdum qualitatem caloris intendi, interdum substantiam ejus augeri: si ergo non concoquatur lactuca, aut si mavis, succus ipsius, quando is, si liberalius sumatur, similem cum 40 paveris succo in homine effectum sortitur, erit utique tantum medicamentum: at si absolutè concoquatur, quis ambigit, quin corpori etiam sit nutrimentum? Lactuca itaque, tam cibus, quam frigidum medicamentum existit. Eruca autè, & ex herbis anethum, ruta, origanum, pulegium, calamintha, thymbra, atque thymum, tum cibi, tum medicamenta calida sunt: dum scilicet adhuc coquantur, medicamenta: mutata verò in sanguinem, nutrimenta: secunda nimirum nutrimenti significatione, qua id significatur, quod nondum est alimentum, sed veluti alimentum. Si igitur frigidior 50 iusto fuerit ventriculus, quandiu in eo delituerint, donec coquantur omnes id genus herbe, calfaciunt ipsum, atque ad temperamentum æqualitatem revocant, profuntque ut medicamenta. Si verò calidior impendit sit, inflammabunt illum, ac magnoperè lædent; atque has quidem alterationes, qualitate sua inducent. Nam omnino percoacta, atque in sanguinem bonum convertæ substantiam

caloris naturalis augebunt, non qualitatem intendent. In universum autem, sive frigidus, sive calidus potestate sit cibus, posteaquam in sanguinem est cōversus, naturalem similiter calorem augebit. 60 Quod verò ad sanguinis formam spectat, nec dum planè sanguis est redditus, refrigerat, calfacitve animal, medicamenti ritu. Etenim cuilibet corpori proprietas quædam temperamenti est, quæ huic quidem naturæ cōsentiens, ab hac verò dissentiens videtur. Quod si id quod sibi cōsentiens est, in suam naturam transmutet, caloris proprii substantiam augebit. Sin verò ipsum temperamentum mutatum sit, utique vel calorem quendam conquirit, si id à quo est mutatum, sit calidum: vel etiam proprium amittet, si id minimè calfaciat. Quare omnia ejusmodi ex eorum sunt numero, quæ ad aliquid relata dicuntur: cum ad proprietatem mutantis naturæ, quicquid assumitur, vel nutrimenti, vel medicamenti, vel 20 utrumque nomen sortiatur. Verbi gratia, cicuta sturno nutrimentum existit, homini medicamentum. Rursus, coturnici veratrum est nutrimentum, homini medicamentum. Ergo manifestum jam arbitror factum, iudicium ejus quod respectu nostri calidum, frigidum, humidum, atque siccum dicitur, non ex iis quæ posita extrinsecus sunt, sed ex illis quibus ipsi afficimur, certum exactumque fieri posse: atque id tanquam primum ac maximum spectandum esse: deinde, si res exigit, etiam quod ab externis petitur: idque non quo vis modo, sed secundum quæ sitæ rei substantiam. 30 Ut igitur absolutissimè judicemus, cibus vel medicamen quod admoveatur corpori, expers esto omnis acquisitij caloris & frigoris, planeque sit tepidum. Nam sive potestate frigidum, cum id applicas, manifestè calfacias, sive calidum refrigeres, corpus primo occursum qualitatis acquisitione, non ejus quæ propria est rei admotæ, sensu afficietur. Applicetur autem ipsum medicamen- 40 tum, quum ejus vim exploras, non cuilibet corporis affectui, sed simplicissimo, & summo. Quod si summi quidem caloris affectioni admotum, frigoris sensum excitet, erit profectò sic frigidum. Pari modo, si frigidus affectui applicatum, calidum statim appareat, id quoque erit calidum. Sin vel calidæ affectioni calidum, vel frigidæ frigidum percipiatur, non est quod hoc calidum, illud frigidum omnino pronuncies. Iudicabimus autem quod ex accidenti aliquid facit, tum ex affectu ipso, tum tempore. Ex affectu, si unus sit & simplex: ex tempore, ad hunc modum. Quod protinus ut admotum est, manifestè calfacere vel refrigerare cernitur, id utique ex se, & per se tale fuerit. Quod tempore id facit, fortasse ex accidenti aliquo huc est actum. Veluti juveni quadrati corporis tetano æstate media laboranti, frigida liberaliter affusa, caloris percussum ex accidenti facit, curum nimirum astringens. Cæterum quod aqua frigida per se minimè calfaciat, ex primo ejus occursum patet. Sed non minus quandoque calor ex accidenti refrigerat, vacuatione utique intercedente: sicuti perfusio phlegmonem. Cum enim ex calida fluxione consistat phlegmone, propria quidem ejus curatio, 60 vacuatio supervacui est, cui succedit affectæ par-

*Salamandra
uri ab igne, si
diutius ad-
mota fuerit.*

*Lactuca sa-
lutaris.*

*Nutrimenta
simul & me-
dicamenta.*

*Lactuca suc-
cus liberali-
ter sumptus,
similem cum
paveris
succo facul-
tatem sorti-
tur.*

*Cibus omnia
in sanguinem
versus, na-
turalem ca-
lorem augeat.*

*Ad aliquid
relata dicuntur:
qua dicatur.*

*Cicuta stur-
no nutrime-
tum existit.
Veratrum est
nutrimentum
coturnicibus*

*Medicamen-
ta & nutri-
menta explo-
randa esse:
admovenda
tepidæ, & cor-
poris simpli-
cissimo affe-
ctui.*

*Accidentia
actiones
qualiter in-
dicanda.*

*Aqua persusio
frigida,
calfacit ex
accidenti.*

*Calor ex acci-
denti refrige-
rat.*

*Phlegmones
generatio &
curatio.*

is refrigeratio. Ergo cū duplex, in his quæ phlegmone laborant particulis, affectus consistat, unus quidem in quantitate, alter in qualitate, sequitur prioris curationem, etiam posterioris curatione: fiuntq; ex accidenti ea medicamenta, quæ materiam calentem evacuant, inflammationis etiam particularū refrigeratoria. Sed pro modo simplicis affectus etiam viriū medicamēti inveniatur modus. Nempe calido in summo affectui, frigidum in summo medicamen paretur. Paululum recedenti à summo, medicamen etiam pro ratione adhibeto, quod declinet parū à summo frigore. Quippe si auspicatus à tali conjectura examen ipsorum sis, facilius propriam vim eorum inveneris. In universum aut, in omni simplici affectu calido, quodcunq; adhibitum medicamen primo statim occurru, frigoris sensum intulit, id frigidum potestate est: ac multo profecto magis, si post primam exhibitionem tale perpetuo manet. Quod si prorsus calidū ipsum affectum sanet, frigidum id ex necessitate fuerit. Adhibendum verò est, quum exploratur quidem, omnino tepidum. Ubi autem jam cognitum est, & gratia curationis petitur, rectius frigidum sumitur: nisi medicamen quidem ipsum, summi sit frigoris, morbus aut in summo calore non sit. Porro cū frigidum calidumve aliquid per se, vel primò, vel nullo intercedēte medio, esse dicimus, omnibus ejusmodi verbis idem potestate significamus. Quemadmodum igitur actu calidum corpus dicitur, vel ut summam caliditatem habens, vel ut præpollentem duntaxat, vel ut collatum ad mediocre sui generis, vel ad quodvis aliud, quicquid fors ipsa tulerit, sic etiam quod potestate calidum est, intelligi, probariq; multis modis oportet. Quo utique minus rectè, si quid non statim inflammatur, id aliqui, ut ad nos quidem, calidum nō esse potestate existimant. Nam sive facile concoquitur & citò nutrit, sive admotum, veluti medicamentū, calfacit, erit ut ad hominem potestate calidum. Est enim ex ijs quæ ad aliquid referuntur, quicquid potestate aliquid dicitur. Quare & probatio quæ propria est, melior utique est, quàm quæ ab externo petitur. Propria verò est una in singulis, utique si celeriter tale fieri appareat, quale id esse potestate diximus. Est enim potestate ignis, quicquid celeriter in ignem vertitur. Potestate verò calidum, ut ad hominem, quicquid homini applicitum, naturalis ejus caloris vel qualitatem, vel substantiam adaugēt. Idem etiam & de alijs censendum est, quæcunq; potestate frigida, humida, & sicca dicuntur. In omnibus autem, tactus ipse, qui judicaturus est, omnis acquirat caloris frigorisq; oportet sit expertus.

GALENI PERGAMENI
de inæquali intemperie, liber unus.



E inæqualis intemperies aliàs in toto animalis corpore fit, veluti in ea hydropis specie, quæ anasarca vocat, ac ferè in omnibus febribus, exceptis quas appellamus hecticas: interdum in singulis partibus, idq; tum ob fluxio-

nem, ut dum ea tumore aliquo præter naturam affecta sunt: tum ob solā qualitātū alterationē quæ multifariā solet accidere, atq; in octo intemperaturas, quatuor quidē simplices, quatuor verò cōpositas, ut diximus antea, digeritur. Quod autem ejusmodi intemperies eo ab æqualibus distent, quod in omnibus intemperanter affecti corporis partibus, non insint æqualiter, id clarè liquet. Ergo quis sit omnis inæqualis intemperaturæ generandæ modus, in proposito libello exequi est animus. Meminisse tamen oportet, corpus quidem ipsum dividi in maximas partes: has rursus, in alias minores: atq; illas deniq; in similes & primas, quas divisisse in aliam speciem nō est: quin etiam cōplura esse spacia inter ipsas similes particulas, atq; ijs etiam plura & majora, inter ipsas instrumentarias cōpositasq; aliqua verò, & in unaqualibet similari particula, veluti osse, cuteq; At quæ molliora quidē sunt corpora, ea, quoniam sibi invicem incūbunt, interposita spacia latèra conspectū nostrū faciunt. Quæ dura siccaq; sunt, in ijs cernere spacia licet: sicuti ossium cavernulas, quæ plurimo humore tum crasso, tum albo refertæ sunt, ad alenda ossa. Quandoquidem igitur omnium particularū inæqualiter affecti corporis, non eadem est temperies, certè differentia ipsius intemperamēti inæqualis, naturam corporū affectorum sequuntur: cum aliter simplex caro, aliter universus musculus, impari temperamento afficiatur. Quippe calida fluxio, ubi procubuit in musculum, primū majores arteriæ, venæq; opplentur, ac distenduntur. Ab his minores: atq; ita res procedūt ab minimas. In ijs, ubi valenter impacta fluxio est, neque adhuc sistitur, pars quidem ejus per ipsarū ora, pars per tunicas transcolatur ad exteriora. Tum verò spacia ipsa vacua, quæ inter prima sunt corpora, fluxione implentur. Sic omnia ab humore, omni ex parte incalescunt, & perfunduntur. Ea sunt nervi, ligamenta, membranae, caro ipsa, anteq; hæc, arteriæ & venæ, quæ scilicet & primæ, & præter cætera, vario dolore afficiuntur. Interius namque à fluxione tum excalfiunt, tum distenduntur, & divelluntur: exterius nō modò calfiunt, sed etiā premuntur, ac degavantur: appellaturque morbus ipse phlegmone, quæ musculi inæqualis est intemperies. Fervet enim jam qui in eo est sanguis: ac secū excalfacit primū quidem, ac maximè, arteriarum atq; venarum tunicas: mox omnia quæ extra has sunt, quibus scilicet circumfunditur. Ita duorum alterum necesse est sequi, ut si fluxio vicerit, corruptio sequatur victorum corporum: sin fluxio sit victa, ut musculi ad naturalem statum redeant. Esto igitur prius victa fluxio: duplex hinc incidit curationis genus: nempe aut discusso omni eo quod in partem confluxit, aut concocto. Verum discussio, sive digestio, optanda maximè curatio est. Concoctionem hæc duo necessario sequuntur, puris generatio, & ejus in aliquo spaciū abscissio. Abscedit aliquando in capacitatum quæ proximè sunt, tum maximam, tum minimè momentaneam: quæ sanè abscessionis genus optimū est. Aliàs in nō momentaneam quidem, non tamen maximam. Interim in maximā, non tamen

Inæqualis intemperies, æqualis distent.

Corporis humani divisio.

Spacia partibus insita.

Inæqualis intemperies differentia, natura corporum sequuntur.

Phlegmonis generatio exquisita.

Phlegmonis est musculi inæqualis intemperies.

Phlegmonis curatio.

Digestionem phlegmonis, esse illius curationem optandam.

Phlegmonis concoctionem quæ necessario sequuntur.

*Abscessuum
modi diversi.*

*Inflammata
partis dolor
quando sol-
vatur.*

*Dolores fieri,
dum altera-
tur, corrup-
piturque na-
tura.*

*Qualitates
efficacissimæ
quæ existant.*

*Spiritum al-
terari facile.
Flava bilis
est calidissi-
ma.*

*Pituita est
frigidissima.
Sanguis qua-
lis.*

*Attra bilis
qualis.*

*Tenui par-
tium omnia
promptè al-
terari: crassa
rum contra,
agrè.*

*Perspiratu
carentia ce-
leriter pu-
trescere.*

non momentaneam. Ac quæ in ventriculum in-
cidunt abscessionum optima est, quæ in sinum e-
jus internū abit, in quem etiam plerunq; se ape-
riunt: mala verò, quæ sub peritonæum. Pari mo-
do in ijs quæ circa cerebrum existunt, bona est,
quæ in priores ventriculos ejus abscedūt: mala
quæ sub involucri ipsius, & quæ etiam in posticū
ejus ventrem se recipit. Qui verò circa costas
colliguntur abscessus, hi in capacitates erum-
punt pectoris. At musculorū abscessus, sub cu-
tem: viscerum autem, in arterias & venas, quas
in se continent: vel in membranam quæ ipsis pro-
eute est. Verum si victæ à fluxione fuerint parti-
culæ, in tantam intemperiem devenient, vnde
tū earum pereat actio, tū ipsæ tempore cor-
rumpantur. Porro desinent tū primū dolere, cū
mutatrici qualitati fuerint assimilatae. Nō enim
cū mutata particularū temperies jam est, do-
lent, sed dum mutantur. Siquidē dum alterascit,
corrumpiturque natura (quemadmodum dixit
Hippocrates) dolores fiunt. Alteratur autem,
corrumpiturque natura cujusq; cum vel calfit,
vel frigesit, vel humectatur, vel exiccatur, vel
unitas ejus dissolvitur, in ijs quidem intemperā-
tijs, quæ inæquales sunt, ex calfaciendo, vel fri-
gefaciendo, potissimum: quippe cū efficacissi-
mæ qualitates hæ sint: secundo loco, è siccando
vel humectando. Ex esuriendo verò, vel sitien-
do, deficiente hīc humida, illic sicca substantia.
Ex vulnerando, & rodendo, & tendendo, & pre-
mendo, & convellendo, unitate soluta. Ergo si
calor sanguinis in particula quæ phlegmone la-
borat, est mitis, tū qui in toto animalis est cor-
pore, mediocriter temperatus, non facilē unā cū
afflicta particula calfit. Sin vel ille fervet vehe-
mentius, vel qui per totum spargitur animal bi-
liosus est, illico totus ad calorem vertitur. Mul-
tò verò magis, sicubi ambo concurrunt. Porro
calfit primū, qui in arteriis est sanguis. Post hunc
verò etiam qui in venis est. Quod si in propin-
quo visceri, cui plurimus sit sanguis, & obsessa
phlegmone particula fuerit, jam celerius cum
hoc, universus qui in animali est sanguis ipsum
calorē excipiet. In summa, quicquid facilē altera-
bile est, aut calidū natura, id à quovis calfacien-
te primū calfit, Non secus & ab eo quod frige-
facit, quicquid facilē alteratu est, vel natura frigi-
dum, id primū refrigeratur. Ac promptus qui-
dem, ut alteretur, spiritus est. Calidissima autem
natura est, flava bilis: frigidissimaq; pituita. San-
guis post flavam bilem maximē est calidus. Sicuti
nigra bilis post bituitam, est frigida. Quinetiā
alteratur flava bilis levi momento, ex quovis in
eam agente. Nigra agrè alterascit. In summa,
quicquid tenuium est partium, id promptè alte-
ratur. Cōtrā, cui crassæ sunt partes agrè. Iam ve-
rò quæ perspiratu carent, celerius putrescunt,
præsertim si calida sint & humida. Quare pro va-
rietate horum omnium quæ dicta sunt, neces-
sum est nō tantis phlegmonum inæquales al-
terationes incidant: maximē quidem inflamma-
to eo qui in phlegmone est sanguine: dein eo,
qui in viscerib. habetur & corde: atq; hujus ma-
ximē eo, qui in sinistro ejus situ cōsistit. Etenim
ubi totū corpus incalescit præter naturam, sinus

ille ad summum calorem pervenit, cū tenuissi-
mum ac maximē spiritosum sanguinē habeat, &
moveatur perpetuò. Cæterum in febribus id ge-
nus omnibus, calefit quidem sanguis aliquando
universus, * recipitq; calorem illum præter natu-
ram, qui ex humorum putredine est ortus. Non
tamen aut arteriarum, aut ipsarum venarum tu-
nicæ, aut aliud ullum circumjacentium corpo-
rum, suū prorsus mutavit temperiem, sed adhuc
calfiens mutatur: quod si id patiatur diutius, etiā
aliquando vincetur, prorsusq; mutabitur. Ter-
minus mutationis cujusq; particulæ, est functio-
nis illius læsio. Ad quem usq; terminū omnis al-
terationis latitudo, via est in id, quod præter na-
turam est. Ergo toto hoc tempore corpus in ca-
lescens, pro modo alterationis, ad portionē sen-
tit dolorem. Quum verò omnes solidæ particu-
læ corporis excalfactæ ad absolutionem jã sunt,
ejusmodi febrem Hecticam Græci nomināt, ceu
non amplius in humoribus & spiritibus, sed in
corporibus ijs, quæ habitus rationem habent,
cōprehensam. Hæc doloris est expers: putantq;
qui ea feбриunt, omnino se nō febrere. Neq; enim
ejus calorem percipiunt, nimirum omnibus eo-
rum partibus æquē percalfactis: quum neque
etiam citra alterationem sit sensus, neque in ijs
quæ jam ad perfectionem sunt alterata, dolor.
Porro quod alicubi Hippocrates ait, omnē mor-
bum esse ulcus, id quidem nō usque adeo alienū
videri debet. Ulcus nanq; unitatis solutio est. Im-
modicus aut calor, segregando substantiæ con-
tinuitatem: summum verò frigus, stipando, ex-
primendo, & quassando, proximē accedunt ut
unitatem solvant: id quod certē immodici calo-
ris & frigoris terminus commodè statui poterit.
Cæterum omnis immoderatus excessus, in habi-
tudine consistit ad aliquid. Non enim pari ratio-
ne à calidis frigidisq; afficitur omne corpus. Un-
de fit, ut aliqua animalium cōvenientes inter se
succos habeant: aliqua nō solum nō convenien-
tes, sed etiā qui se mutuò corrumpant: veluti ho-
mo, atq; vipera, quorū utriusq; saliva alteri per-
niciēs existit. Ita utiq; & scorpiū necaveris, si il-
li jejuna inspuas. At non homo hominem, nec
vipera viperam, nec aspis aspidem, morsu interi-
mit. Siquidem quod simile est, id cōgruum, ami-
cūque est: quod contrariū est, inimicū & no-
xium, Augetur enim quidq; ac nutritur simili-
bus: perimitur & corrumpitur à dissimilib. Quo-
circa sanitatis tutela, per similia perficitur. Mor-
borū sublatiō, per cōtraria. Hecticā itaq; febrem
minimā sentit, qui ea laborat. Reliquarū febriū
nulla est, quæ non à laborante sentiatur: sed aliæ
magis, aliæ minus sunt graves. Sunt enim ex ijs,
& quæ rigorem ingerant: quod symptoma fit ab
inæquali intemperie. Iam verò accendi febrem,
& citra phlegmonem, ex solis humoribus putre-
scentibus, licet: sicuti & aliud genus inæqualis
intemperiei in toto corpore oriri, modò fuligi-
noso vapore detento, modò exercitationibus
& plusculis laboribus calore adaucto, modò ab
ira, modò à deustione quavis externa, sanguine
incalescente. Quod igitur intemperies ipsa non
nunq; spirituosam duntaxat invadat partē, non-
nunquā etiam ipsos humores, quodq; omnibus
hujus-

*Functionis
læSIONem eff
terminū mu-
tationis cu-
iusq; parti-
cula.*

*Hecticam f
brim occup
re solidas co
poris partes
Hecticam f
brim esse do
loris expertē
Sensus nō es
absq; altera-
tione.
Morbu om-
nem esse ul-
cus.*

*Vlcus est un-
tatis solutio*

*Excessus o-
mnē immod-
eratū, cōsiste-
re in habitu-
dine ad ali-
quid.*

*Salicam je-
juni homi-
nis enecare
scorpionem.*

*Similia om-
nia sibi esse
mutuò con-
grua & ami-
ca.*

*Dissimilia,
esse inimica
& noxia in
vicem.*

*Sanitatis tu-
tela per simi-
lia perfici.*

*Morbos per
contraria
tollit.*

*Febres pu-
tride.*

*Febris epho-
mera generatio.*

*Refrigeratio
vehemens.*

huiusmodi febribus, si diu perduraverint, hec-
tica superveniat febris, nemini obscurum exi-
stimo. Quemadmodum ergo ex deustione accen-
ditur febris, ita nonnulli saepe ex frigore refrige-
rati vehementer toto corpore sunt: aliqui vero
etiam perierunt. Sed quod ij omnes etiam doleant,
ne id quidem latet. Dolent etiam, maximeque circa
unguium radices, & qui ex rigore ingenti vehe-
menter refrigerati, celeriter sese calfacere prope-
rarunt. Quam quidem inaequalem intemperan-

*Doloris cau-
sam esse ina-
equalem intem-
perantiam.*

*Epiala fe-
bres.*

tiam, quam videat aperte quis esse causam dolo-
ris, non est quod de ceteris dubitet: nec si simul
rigeat & febricitet agrotantiū aliqui, sentiantque
humorem pituosum, qui frigidus est, mistum
amarum bili, quae est calida, moveri per sensibilia
membra: ut in epialis febribus, in quibus simul
ambas qualitates contrarias intra corpus aeger
sentire videtur, cum nimirum calidum ipsum &
frigidum, per id genus febres, tenuissimis por-
tionculis aspergantur, adeoque misceantur invi-
cem, ut ne minimam quidem unius sumere pos-
sis particulam, in qua alterum * non sit compre-
hensum. In ipsa tamen accessionis invasione, non-
nulli & rigent & sitiunt: atque intus quidem, & in
ipsis visceribus, magnū incendiū: in externis au-
tem partibus, frigus maximum sentiunt. Ac tales
febres sunt, quae graece lypiriae vocantur, atque ar-
dentium febrium quoddam perniciosissimum ge-
nus. Quinetiam ijs qui rigent, nec tamen febricitant,
inaequale temperamentum adest. Rarum tamen

*Lypiria fe-
bres.*

est id symptoma, licet tum mulieribus, tum vi-
ris quibusdam accidat, ubi aut deses vita, aut con-
tinua ciborum copia praecessit. Porro antiqui-
tus nemo, ut videtur, ita est affectus, cum neque
adeo ociosi, nec in victus saturitate tunc vive-
rent. Unde factum est ut scripserint veteres me-
dici, rigori febrem necessario supervenire: tam-
etsi saepe numero rigorem viderimus, quem nul-
la sequuta sit febris. Componitur autem ex hac
intemperie, & ea quae febrientium est, epialus.

*Rigor absque
febris quibus
accidat.*

*Veteres fuisse
se temperan-
tiores.*

*Rigorem sa-
epe accidere
citra febrem*

*Epiala fe-
bris quadi-
antur.*

Appello ita febre illam, cui ambo semper simul
accidunt. Nam in qua rigor quidem praecedit, fe-
bris sequitur, veluti in tertianis & quartanis,
hanc epialam non voco. Ita ex duplici inaequali
intemperie epialus componitur, atque etiam aliae
ferè omnes febres, praeter hecticas. Pariter & qui
particulæ alicujus cum tumore sunt morbi, hi
quoque omnes cum temperamento inaequali con-
sistunt: ut cancer, erysipelas, carbunculus, her-
pes, oedema, phagedaena, gangraena: differunt ta-
men, pro ipsa fluxionis diversitate. Siquidem
qualis fluxio fuerit, talem praeter naturam tumo-
rem gignit.

*Febres ferè
omnes praeter
hecticas con-
sistere ex du-
plici inaequa-
li intemperie.
Tumores au-
tem cum ina-
equali intem-
perie.*

GALENI PERGAMENI

de optima corporis constitutione,
liber unus.



*Similarium
partium sa-
mitas quae sit.*

Vando quidem temperamentum ex
calido, frigido, humido & sicco,
definitum congruenti mensura, simi-
lariū membrorum existit sanitas: no-
stri autem ex omnibus his constru-
ctio, positione, magnitudine, figura, & partium
numero constituitur: concedendum jure est, corpus
aliquod, licet ex plurimis optime reperiatis par-

ticulis compositum sit, secundum tamen ipsarum ma-
gnitudinem, aut numerum, aut figuram, aut mu-
tuum inter se conexum, non nihil posse vitij con-
trahere. Porro, ut à communi notione exordia-
mur, saluberrimum corpus omnes uno ore lau-
dant: nec non id quod Graeci εὐκτατον vocant,
hoc est, optimo habitu praeditum: idque ad unam,
eandemque rem respicientes. Quippe omnium i-
psiū corporis particularum functiones esse robu-
stas adiut, nec à morbiferis causis facile vinci pos-
se. Ceterum cum ipsae particularum functiones se-
cundum naturam promptè obeunt, sanitas est.
Ubi vero id cum quodam etiam robore praestant,
bonus habitus dicitur. Comune autem utrisque
est, non facile morbis succumbere. Quare bonus
habitus, omnium illa saluberrima constitutio exi-
stet, quam universi percipiunt: cuius accidens
& mensura est, in obeundis functionibus stre-
nuitas, atque constantia. Qua ratione merito bo-
nus habitus appellatur. Meminisse autem oportet,
nostra corpora ex miscella quatuor elemen-
torum constare, variisque esse partium tempera-
turas, ad haec, singulis organicis membris uni-
cam inesse particulam, cui tota actionis causa tri-
buitur: cuius gratia reliqua omnia creata sunt,
quae totum complent instrumentum. Quibus pra-
missis, erit optima corporis constitutio ea, in
qua similes partes propriam temperiem possi-
dent, nec non cuiusque instrumentariorum compo-
sitio ex illis, secundum ipsarum magnitudinem,
numerum, figuram, mutuumque inter se conne-
xum, certa quadam & exacta mensura constru-
cta fuerit. Quocirca id tale corpus optimè suis
fungetur actionibus, ac proinde aliorum omnium
& firmissimum erit, & minimè prolabetur in mor-
bos. Siquidem universis causis morbificis tam
extrinsecis quam intrinsecis facile reluctabitur;
quod omnino ab utrisque extremis recedat, adeoque
optimis succis abundet, ut tristitia, iras, vigilias,
curas, imbres, squalores & pestilentiam, aliis o-
mnibus ferant multo facilius. Nam quae maxime
vitiosis succis redudant, facile ab huiusmodi cau-
sis tentatur, utpote quae per se jam morbis proxi-
ma sint. Quoniam autem sanitas extendi in satis am-
plam latitudinem potest, non solum in hoc com-
mentario corpus illud absolutissimum, quod ra-
rò invenitur, & tanquam Polycleti regulae exem-
plum est, debes effingere, sed eorum etiam memi-
niste, quibus cum quotidie versamur, quaeque ab
eo breve aliquid deficiunt, non tamen adhuc in-
signem admodum lapsum sunt nata. Quod igitur
exquisite bona temperie praeditum est, medium
sanè locum obtinet inter molle & durum, & in-
ter hirsutum & glabrum: pariter neque amplius, neque
angustius est venis, nec pulsibus magnis aut par-
vis recedere à mediocritate videtur. Quod verò
undecumque exacta in instrumentariis particulis
mensura constat, id tanquam Polycleti est regu-
la. At ea corpora quae jam calidiora sunt, plus
quam par sit, non tamen admodum multo, pari-
ter etiam quae frigidiora, humidiora, & sicciora
modicè, etsi partem unam non rectè efformatam ha-
beant, corpori tamen symmetrio nonnunquam praesta-
re videntur. Quippe ubi id genus corpus mode-
rato durius evaserit, adversus omnes externas
causas

*Notio com-
nis.
Saluberr-
imum corpus*

*Sanitas quae
do dicitur.
Habitus bo-
nus quando
dicitur.*

*Corpora non
sua constare
ex quatuor
elementorum
miscella.
Instrumento
rum singulis
in esse parti-
culari uni-
cam cui tota
actio tribui-
tur.
Constitutio o-
tima quae.*

*Vitiosis succis
redundantia
corpora facili-
tè à causis
morbificis
affici.
Sanitatis est
se latitudine
amplam.*

*Temperatis-
sima corporis
nota.
Polycleti re-
gula.
Durius mo-
derato cor-
pus ad er-
ras externas
causas firmi-
us reddi: non
line ad er-
ras internas
causas*

Raritas corporis quibus salubrior et insalubrior.

Densus corpus magis esse ab extrinsecis causis intum.

Medium exquisitum corpus, excedentibus mediocritatem, secundum aliud quid esse deterius.

Magnū corpus, unde sit tale.

Parvum corpus unde fiat tale.

Magnitudinē nihil conferre ad optimam constitutionem corporis.

Augmentū sit, quo usque ossa confirmantur.

Optima corporis constitutio in quibus consistat.

Habitus de quibus dicatur.

Habitus simpliciter bonus.

Habitus non simpliciter bonus.

Sanitas latitudinē habet.

Habitus bonus est sanitatis interfectio.

Athletarum habitus periculosus.

Habitus simpliciter bonus, vel si ad summū perveniat, omnium affectuum tutissimus.

Habitus simpliciter bonus, et non simpliciter bonus, cō-

venientia, discrepantiq;

causas, firmitus ac tutius redditur. Ubi verò mollius, adversus internas. Atq; eadem ratione ubi densius fuerit, externis magis resistit. Ubi verò rarius, ab internis minus offenditur. Raritas siquidem corporis, quibus plus recrementi per difflationem educitur, salubrior existit: quibus verò minus, insalubrior. Nam ab omnibus externis causis facilius corpus rariū oblaeditur. Corpus autem quod exquisitissima cōstat mensura, nec rariū, nec densum dici potest, sed in medio prorsus cōsistit. Cui quidem utrunq; excedentium corporum præstat secundum aliquid. Quod enim densius est, magis ab exterioribus causis est tutum: quod verò rarius, ab interioribus. Utrisque autem quod exactè resistat, planè non invenies. Sed mediocriter id resistit, q̃ inter omnes excessus est medium, quodq; omnium etiam corporum saluberrimū esse censemus. Quare id singulis excedentibus mediū, secundū aliquid est deterius: collectum verò omnium optimū, & maximè eligendum videtur. Quod autem corpus ipsum, quod tum similaribus, tum instrumentariis particulis optimè constitutum est, vel parvum, vel magnū, vel mediocre necessario esse nō debeat, hinc discas licet, quod magnū quidem ob humoris, vel materiæ multitudinem: parvū autem, ob siccitatem, aut ob materiæ penuriā efficitur tale. Potest itaq; aliquod corpus & pulcherrimum, & optimè temperatum effici, quantamcunq; magnitudinem sortitū id fuerit. Augmentum enim sit, quousq; ossa cōfirmantur: confirmantur autem, in exigua magnitudine, ob materiæ defectū, vel ob siccitatem: ita ut simpliciter neq; magnitudo, humiditatis indicium sit, neq; parvitas siccitatis, nisi aut magnū molle, aut parvum etiam sit durum. Quamobrem optimā cōstitutionem in his duob. meritò collocabimus, moderata scilicet consimiliū particularū temperie, necnō exactissima instrumentaliū mensura.

GALENI PERGAMENI

de optimo corporis habitu, liber unus.



Habitus nomen de omni fixo & vix solubili pronunciare cōsuevimus: nihil adhuc magis laudātes, vel improbant. At cum bonū habitum aut malū dixerimus, jam tunc qualem nam habitū dicamus, distinguimus. Quippe bonus simpliciter habitus, optimam corporis constitutionem sequitur: eum verò qui non simpliciter bonus sit, in quacunq; corporis natura reperire licebit, aut simpliciter, aut ad aliquid relatum. Igitur quum sanitas latitudinem habeat, intensiorem quidem ipsius medici bonum habitum vocant: lapsū verò nōdum nomine proprio appellarunt, sed perinde ac genus ipsum, sanitatem nūcupaverūt. Itaq; bonus habitus optima quādam sanitas est. Ceterum habitus Athletarum, non est simpliciter bonus habitus, ac proinde periculosus existit, si ad summū pervenerit, quemadmodum dixit Hippocrates. Nam bonus simpliciter habitus ad summū bonitatis perveniens, omnium erit corporis affectuum tutissimus. Porro tam bono sim-

pliciter, quā ipsorum Athletarū habitū, bona omnium particularū temperies cōmunis est: ut etiam functionum robur, atq; succorum bonitas. Interest autem, quod in habitu simpliciter bono, sanguinis cōmoderatio, ac totius solidarum partium molis, habeatur: in Athletico autem, horum ipsorum, potissimumq; carnosī generis, excellens sit copia, ratione cuius periculū necessario sequetur, si is in summo constiterit, ne aut exstinguatur, & suffocetur calor innatus, ob plenitudinem illam exuberantem difflatione prohibita, aut aliquod ex præcipuis vasis rumpatur, quæ in pulmone, & in jecore, & in thorace sunt sita. Siquidem sanguis ipse, tum ob naturalis caliditatis copiam, tum ob actionis perpetuitatem, necnon ob incrementum assiduum quasi effervescens, ipsorum vasorum tunicas, ut mustum dolia, dirumpit. Hæc igitur omnia, necnon repentinæ omnium functionum resolutiones (ut paucis docuit Hippocrates) necessario immoderatas repletiones sequuntur.

Repletiones immoderatas quæ sequuntur.

GALENI PERGAMENI

de animæ morum & corporei temperamenti mutua consequutione, liber unus.



Vemadmodū ex cibo & potu, necnon ex quotidianis exercitationibus, bonam corpori conciliamus temperiem, sic etiā ex hac, ad virtutem animæ comparandam, nō nihil emolumenti attulerimus: id quod certè in actionibus atque universis affectibus, qui secundum tres animæ species, ob temperamentorum diversitatem maximè in puellis differunt, liquidò constat. Alij enim timidissimi sunt, alij audaces, alij inexplēbiles, alij sobrij, alij verecundi, alij deniq; admodū impudentes. Ex quo quidem in illis morū discrimine, ratione concludere aliquis poterit, non eandem omnibus animæ naturam, sive substantiā, inesse. Nam si substantia animæ esset illis per omnia similis, easdem utiq; actiones agerent: eisdemq; ob causas similes, afficerentur affectib. Quare haud dubiè pueri tantum inter se animorū essentia differunt, quantum proprijs actionibus atque affectibus discrepant. Quod quidem cum sic habeat, facultatibus quoque differant. Porro singulorum quæ fiunt, effectrix quādam causa est, quæ ad aliquid referri intelligitur, cuiq; nomen per se est inditum. In quadam autem à seipsa ad genitū relatione, geniti facultas consistit. Quocirca tot facultatibus substantiam, quot etiam actionibus, esse prædictam dicimus. Siquidem quia aloë (exempli gratia) vires habet purgandi, os vetriculi roborandi, cruenta vulnera glutinandi, plena ulcera solidandi, & humiditas palpebras exiccandi, tot facultates, quot etiam opera, profiteamur ipsam fortiri. In universum autem, animæ species sunt tres: rationalis scilicet, irascibilis, & appetitoria. Quarum quidem illa prima (quam etiam intellectricem vocamus) veritatis, scientiæ, disciplinarum, atque, ut summam dicam, honestorum omnium desideratrix est, secundum desiderij communis

Temperiem optimam conciliamus. Temperiem probam conciliamus ad virtutem animæ.

Pueriliū morum diversitates.

Anima substantia non eadem omnibus inest.

Effectrix causa.

Substantiam esse tot facultatibus quot actionibus prædictam. Aloë facultates.

Anima species tres. Rationalis anima quæ appetit.

irascibilis anima quarum flaret libidine.
 mune significatū. At irascibilis, quam etiam animosam appellant, libertatis, victoriæ, potentia, imperii, gloriæ, honorisq; flagrat libidine. Tertia verò illa, quæ à Platone per excellentiam appetitoria appellata est, veneris, esculentorū, potulentorumque voluptatibus perfrui desiderat. Hæ honestum expetere nequaquam potest: sicuti nec rationalis venerea, nec escas, nec potum: cum quibus etiam imperiū, gloriā, dignitatesq; haud injuria aspernabitur. Pariter quoque irascibilis animæ pars, quæ à rationali & appetitrice exoptantur, non appetet. Iam verò appetitoriam animæ partem in jecore, irascibilem in corde, rationalem in cerebro collocari, alibi à nobis est demonstratum. Ex quibus quidem rationalē esse immortalem, Plato sibi persuasisse videtur. Ego verò, sit immortalis, nec ne, quid illi obijciam nō habeo. Hoc autem mihi cum illo convenit, species animæ, quæ in corde & jecinore habitant, simul cum animali interire. At verò cum universa corpora ex duobus constent principijs, materia nempe, & temperie quatuor qualitarum primarū, quæ illi inest, & species necessario dicenda est: anima autē ipsa, dum corporis dicitur esse species ab Aristotele, nō de ea specie, quæ instrumentarijs hæret corporibus, sed potius de altero similarium & naturalium membrorum principio dicatur, quandoquidem ab istis primò actiones proveniunt: certē substantia animæ, calidi, frigidi, humidi, & sicci, quodammodo temperamentū erit. Quod autē animæ substantiam propriæ eius vires sequantur, ostensum fuerit, si ejus etiam actiones ita se habere declaraverimus. Quamobrem, si ratiocinandi facultas anima pars existat, interibit utiq; cum & ipsa cerebri sit quædam temperies. Atque in hunc modum omnium animæ specierum vires ipsam temperaturā sequentur: hujusq; naturæ animæ substantia fuerit. Itaq; ipsius animæ intellectricis, non quælibet corporis species est capax. Cujus tamen dogmatis nullam firmam rationē adferre valeo, cum animæ substantia, qualis nam sit, me prorsus lateat, si in corporeis ipsam annumeremus. In corporibus quippe, temperamenta inter se longissime distantia, numeroq; permulta esse conspicio. * Incorporeæ verò substantiæ, quæ ipsa per se subsistere queat, neque corporis qualitas aut species sit, nullum discrimen invenio. Novi tamen illud exactē, sanguinis missione, & cicuta potu corpus frigescere: sicuti & vehementi feбри plus quam par sit calferi. Cur autem refrigeratum nimis, aut calore æstuans corpus, penitus ab anima relinquatur, longa indagatione fatigatus nōdum reperi: quemadmodum neque cur flava bile in cerebro copiosiore collecta, desipimus: atra verò, melancholia vexamur: neq; cur pituita, & omnino refrigeratia, lethargi causæ esse soleant: unde & memoriæ, & intelligentiæ jacturam facimus. Necnon cur stultitiam cicuta propinata conciliet: omnē autē mærorem & anxietatem discutiatur epotū vinū, atq; etiam œnopia radix. Porro vinum si largius sumatur, malo est: sin verò quis ipsum scitē bibat, concoquet, digeret, sanguinemq; augebit, & nutriet, cum hocq; animū miorē juxta & audacio

rem efficiet: interveniēte scilicet mediā temperatura, quam producet ex mediis humoribus. Corporis itaq; temperamenta, nō modo animæ actiones variant, sed etiam ipsam à corpore interdū sejungere possunt: cū extremē frigida, calidave medicamēta, statim perimere assumētē cernamus. Quo in genere continentur & ferarū venena. Quippe demorsos ab aspide illicō examinari cernimus, perinde ac si cicutam biberēt: utpote ipsius veneno etiā refrigerante. Sed nec minus ab humido & sicco, quā à frigido, & calido, vires animæ permutantur: ut in assumendis medicamentis, atque adeo in quotidiano victu, percipimus: id quod etiam demonstratur à Platone in Timæo, ubi humiditatem dementiæ, ariditatem intelligentiæ in anima causam esse arbitratur. Cæterū si humiditas amentiam, siccitas sagacitatem parit, extrema siccitas extremā sagacitatem producet: admista verò humiditas tantū perfectæ sagacitati detrahet, quanta ejus portio siccitati permista fuerit. Quare animantia omnia, summa intelligentia destituta quum sint, quantum humoris, tantum & amentia fortuntur. Si igitur pars animæ capax rationis, unā cū corporis temperamento mutatur, certē mortalem speciem animæ non solum gerere morem corpori, sed corporis etiam esse temperiem censendū est. Temperies itaq; cordis irascibilis anima existit: jecinoris autem, appetitoria. Etenim anima ipsa, substantia quædam existens, facultatibus multis prædita est. Cum autem substantia dicatur tum materia, tum species, tum ex utroq; compositū: animam eam esse substantiam quæ species dicitur, Aristoteles pronunciavit, aliud quippiam temperatura esse animam planē asseverare non potens. Spiritum autem esse animam, quemadmodum & naturam, Stoici contendunt: sed humidiores frigidioresq; naturalem: animalem contra, aridiores & * calidiores. Quem quidem spiritū materiam propriam esse animæ constat. Materiæ autem species, temperamentū fuerit in comoderata aëreæ igneæq; substantiæ missione consistens. Neque enim aërem solum, aut ignem, animam esse, dicere possumus: cum nec summē frigidum animalis corpus, nec summē calidum effici unquam appareat, neq; ab horum alterutro excellentius occupari deprehendatur. Porro aër, suapte natura frigidum elementū est, sed per ignei elementi missionem, mediocre, ac temperatū redditur. Qui igitur animā corporis esse speciem, hoc est, formam existimant, hi non siccitate, sed temperaturæ commoderatione ipsam perspicaciorem fieri, dicere contra Platonicos poterunt, neque ob id tamen asserere, siccitatem adyersari mentis acumini: quum nimirum splendor siccus, secundum Heraclitum, sit animus sapientissimus: quæ sententia videtur potior. Quippe sydera pellucida juxta & sicca, summa intelligentia esse prædita cernimus: quā si quis illis inesse inficietur, deorum excellentiam non sentire, planeq; ignorare videbitur. Cum autem alibi senilem ætatem prolabi ad siccitatem dixerimus, cur haud ita pauci ad extremā usq; senectam viventes desipiant, si quis interroget, respondebimus, id non

Temperamentum corporis, anima mores variare, illamq; explodere possunt. Aspidis venenum refrigerare.

Dementiam inducit humiditas. Intelligentia parit ariditatem.

Amentia tantum esse animantibus insitum quantum humoris.

Anima mortalem speciem esse temperiem corporis.

Substantia quatuorplex dicitur.

Anima esse speciem, quæ temperatura existit.

Stoicorum de anima opinio.

Spiritus animalis est propria materia anima.

Materiæ speciem esse temperamentum.

Aër esse naturaliter frigidum elementum.

Anima perspicaciorem reddi temperatura commoderatione.

Heracliti sententia de animo.

Sydera esse prædita intelligentia summa.

Senes desperare frigiditate rationis.

*Frigiditatē
adversari o-
mnibus ani-
mae actioni-
bus.*

*Anima to-
tam corpore
am suscipit.
tur Galenus.*

*Malum esse
neminem ul-
tro, Plato as-
seris.*

*Anima vi-
res sequi tem-
periem men-
strui, Aristo-
teles ait.*

*Mores cogno-
sci ex figura
partium A-
ristoteles ait.
Septentrio-
naliū mores
esse agrestis-
mos.*

*Asia, Asia-
ticorūq; mo-
res magnifi-
cē commen-
dantur.*

*Mores sequi
plerūq; na-
turā regio-
nis.*

*Furibundos
esse quibus
cubiti arte-
ria vehementer
pulsat.*

*Iracundiam
caloris abun-
dantia exci-
tat.*

*Stupidos fri-
giditas effi-
cit.*

*Vino citra
duodecimū
annū pue-
ris Plato in-
terdixit.*

*Vinum lenit
acerbitatem
senectæ.*

*Vinum seni-
bus cur utile
vinum ad-
versatur cre-
scentibus.*

*Vino quibus
intēdixit
Plato.*

id non ob siccitatem, sed ob frigiditatem acci-
dere: quæ omnibus animæ actionibus officit.
Ex hoc igitur ingens mihi jam oboritur suspi-
cio, ut totā animæ substantiam esse corpoream
credam, quod interdum non modò pereant in-
genitæ animæ facultates, sed etiam aliæ contra-
riæ illis introducantur: ut dum cernere quæ non
cernuntur, audire quæ non audiuntur, sese quis
arbitratur. Quo pacto enim ex ea quæ ipsi cum
corpore intercedit necessitudine, in naturā pla-
nè contrariā transire posset, nisi aut qualitas ali-
qua, aut forma, aut affectus, aut facultas corpo-
ris esset? Porro ex vitioso corporis habitu lan-
guere animā, ac neminē spontē esse malum, sed
ob pravam habitudinē corporis, & rudem edu-
cationem: ac proinde nec debere turpia vitupe-
rari, professus quidem est Plato in Timæo. Ari-
stoteles autē, secundo de partib. animalium, ipsius
animæ vires, materni sanguinis sequi temperiem
existimat. Qui rursus, primo de historia anima-
lium innuit instrumentariarū partium figuratio-
nem, animæ moribus accommodari: ac proinde
ex illa recòditos hos cognosci. Hippocrates etiā
in libro de aquis, aëre, & regionibus, ait, eos qui
plagam Septentrionalem incolunt, aut etiā mō-
tana loca, agrestissimis esse moribus præditos:
Asiam autem regionibus cæteris longè clemen-
tiores existere, in eaq; omnia multò meliora &
grandiora nasci: necnō mores hominū tum mi-
tiores, tū ad agendū promptiores esse, ob opti-
mam Asiatici cœli temperiem: haberi tamē illic
magis imbelles homines, quàm in Europa. In
summa verò, species & mores hominū ait ple-
runq; naturam regionis sequi: calido autē, frigi-
do, humido, & sicco, unam regionē differre ab
alia. Alibi etiam tradit Hippocrates, quibus cu-
biti vena (veteres enim arterias etiam vocabant
venas) vehementē ederet pulsationem: eos ho-
mines furentes existere: & meritò quidem. Nam
præ nimia in corde abundantia caloris, ita vehe-
menter moventur arteriæ: furentes autem atq;
iracundos, caloris abundantia efficit. Stupidos
verò, graves, & pigros, temperaturæ frigiditas.
Hippocrates itaque voluit, non solum irascibilis
appetitoriaq; partis animæ, sed etiam cogitatri-
cis vires & facultates, corporis temperaturæ ad-
hærere, atq; illam omnino sequi. Nec secus Pla-
to, ex terræ diversis habitationibus, ex vario spi-
ritu, ea insolationibus, ac deniq; ex varietate nu-
trimentorū, non solum ipsorū corporū, sed ani-
morum etiam profitetur nasci diversitates: tem-
peramento scilicet ipso (quod subintelligere o-
portet) interveniente. Quare pueris quidem ci-
tra duodecimū annū prorsus vino interdicit, se-
cundo de legibus: idque ne in furorem agantur.
Provectis autē, ut ipso utantur, permittit: quip-
pe quod adversis acerbitatem senectæ remedio
fit, animiq; mœrores discutiat, ac denique durio-
res mores emolliat. Etenim juvenilis ætas cali-
da est, ac multo referta sanguine. Contrā senilis,
& frigida, & sanguinis inops. Propterea senibus
vini potus utilis est: ijs autem qui crescūt, adver-
satur q̃ maximè. Iam verò neq; in exercitu per-
mittebat Plato ut vinum gustarent milites, neq;
in civitate ipsa servi: sicuti neq; principes, neque

administrantes rempublicam, neq; iudices, neq;
hi breviter, qui de re aliqua essent consultaturi:
quod nimirum veluti quidam tyrannus animæ
facultatibus imperet. Sed neq; interdū, nisi aut
exercendi corporis, aut tollendi morbi gratia,
permisit unquā vini potionē: neq; item noctu-
dum libris navanda esset opera. Pro virili autem
esse enitendum singulis, ut alimento, studiis, &
disciplinis simul & vitium fugerēt, & virtutem
ipsam capefferent, idem professus est. Cæterum
qui cunctos homines virtuti comparandæ ido-
neos, & qui nullum iustitiæ amantem esse arbi-
trantur (quod est nullū naturalem finem statue-
re) utriq; hominū naturam ex dimidio tantū co-
gnoverunt. Neque enim omnes iustitiæ hostes,
neq; omnes amatores nascuntur, ob corporis tē-
peraturam utriq; tales geniti. * Ac sanè qui talia
astruūt, subinde petunt, quò videlicet iurē quis-
piam debeat laudari, vituperari, odio haberi,
aut amari, cum bonus, aut improbus non suo pte
ingenio, sed à temperatura sit factus, quàm ab a-
liis causis quisq; accepisse deprehenditur. Quia
(scilicet respondebimus nos) omnibus hoc nō
bis inest, ut amplectamur bona, ambiamus, a-
memus: malum abominemur, atq; procul arceā-
mus, ignorantes adhuc, genitūmnē si tale, an mi-
nus. Scorpiones enim, phalangia, viperasque neca-
mus, cum tamen à natura, non sua sponte, talia
creata sint. Primū etiam, maximūq; Deum nō
genitum Plato asserens, bonū tamen illum esse
pronūciat, nosq; ipsum talem ab æternitate, non
ex seipso bonū effectum, natura duce colimus,
& amamus. Prorsus enim nullo unquam tempo-
re genitus est, omnibus seculis increatus, sempi-
ternusq; existens. Meritò itaque malos odimus,
causam cur mali existant, necdum præmeditati.
Bonos vicissim, sive natura, sive institutione &
doctrina, sive honesto vitæ exercitio probitatem
sint affecuti, recipimus, atque amorē prosequi-
mur. Quocirca Stoicos admiror, qui homines
universos ad virtutem adipiscendam habiles es-
se opinantur, sed ab aliis quibus cum vivūt, a-
cto itinere detorqueri. Haud siquidē dicere po-
terunt, qui omnium hominū primi geniti sunt,
à quibus nam depravati fuerint, ante se nullum
alium habentes. Videmus etiam pueros complu-
res, ijsdem parentibus ortos, ab eisdem præce-
ptoribus educatos, ijsdemque alimentis usos, na-
tura tamen q̃ longissimè inter se differre. Quos
quidem quis per deos flagitia edocuit? Reperies
enim paucos admodū pueros natura ad virtutē
propensos, sed à parentib. & pædagogis ad eam
minis increpationibusq; converti. Porro illj ex-
trema dementia tenentur, qui nos voluptate à
virtute detorqueri ajunt. Quos quidem erudi-
tissimus Posidonius refutans, ait in nobis ipsis
intestinalia quædam vitiorum semina, & tanquam
igniculos delitescere: nec tam nobis à vitiosis
cavere, quàm vitiorum incrementū restinguere
& coercere esse opus. Non enim (ut fert Stoico-
rum opinio) totū extrinsecus ingruit in nostros
animos vitiū, sed plurimū in seipsis vitiosi ho-
mines causæ habent. Quod extrinsecus advenit,
longè minus est. Proinde sanè cōsuetudine pra-
va accedente, secundum partem animæ ratione
carentem,

*Vini im-
rat animæ
facultatibus
veluti quæ
tyrannus*

*Inclinat
hominum
cōmenda-
honestā
turpia &
peranda*

*Deus non
natus, a-
terno, &
se bonū
existit.*

*Stoicos si-
gillat G-
nus.*

*Hominu-
nus non
se ab are
videtur
nuere G-
len.*

*Puerorū
cos esse n-
ra ad vi-
tem prop-
sos.*

*Posidonij
gregia sen-
tia.*

*Consuetu-
quantum
sit ad bonū
tem mori-
vel pravi-
tem.*

carentem, pravi reddimur: falsis autem opinio-
nibus, secundum intellectricem partem imbui-
mur. Sicuti dum à bonis, syncerisq; viris instrui-
mur, opiniones quidem veræ sunt, mores autē
humani. At in cogitatrice animæ parte, intelle-
ctio, stultitiaq;, ratione majoris minorisq; eva-
riantes, corporis temperaturas sequuntur. Ipsæ
autē temperaturæ, primam in utero generationē
& cibū probos succos parantē, habēt autorem:
atq; hæc mutuò sese & adaugent, & foveant. Cali-
da nanq;, exempli gratia, temperies, iracundos fa-
cit: inde rursus iracundia ingenitū calorē accen-
dit, & igneum reddit. Contrā qui mediocri tem-
peratura constant, mediocriterq; commoti ani-
mo, ad probos succos gignendos proficiunt.

GALENI PERGAMENI
de naturalibus facultatibus, liber
primus.



Quandoquidem sentire & moveri
secundum electionē, propria ani-
malium sunt: augeri verò, & nutri-
ri, plantis etiam cōmunia: erunt u-
tiq; priora quidē, animæ, postero-
ra verò, naturæ ipsius opera: quare animalia i-
psa simul & ab anima & à natura gubernari dici-
mus, stirpes à sola natura. Quanquam his etiam
animā vegetatricem aliquis tribuere haud im-
merito poterit, distinguens illā à sensitricem, quæ
animalibus inest. Porro cū corpus aliquod ab
iis sub quibus antè fuit in nullo est immutatum,
quiescere id dicimus. Quòd si in aliquo ab iis re-
cessit, eatenus id moveri. Ubi igitur corpus ipsū
ab una in alterā qualitatem mutatur, ut ab albo
in nigrū, aut à frigido in calidum, motum ipsum
alterationem vocamus: estq; unū motus genus.
Alterum genus in corporibus iis est, quæ situm
mutant: cui generi latio nomen est. Atq; hi qui-
dem duo motus simplices & primi sunt: auctio
verò & diminutio, ex his compositi. Illa, cū ex
minori majus fit: hæc, cū ex majori minus: pro-
pria scilicet utrobique, servata forma. Alij autem
duo ab his motus sunt, generatio & corruptio:
illa quidem ad substantiā productio, hæc illi cō-
traria. Omnibus iis motibus cōmunis est prio-
ris status immutatio: sicuti è diverso quietibus,
prioris status conservatio. His præmissis, inqui-
rendum jam nobis est, quot & quæ naturæ sint
facultates: tum, quod opus edere singulæ earum
sint natæ. Porro opus appello, quod jam factū
atq; completū per actionē est: veluti sanguinē,
carnē, nervū. Actionē autē, ipsum activū motū.
Causam verò, à qua hæc procedit, facultatem.
Etenim ubi cibus fit sanguis, passivus quidem ci-
bi, activus verò ipsius venæ fit motus: quā actio-
nem licebit tibi appellare naturæ opus, nō tamē
opus ipsum, actionem. At mihi quidem tam ve-
na, quā reliquarū particularū singulæ, ob cer-
tam quandam temperiem, quā ex quatuor sunt
qualitatibus natæ, hoc vel illo modo videntur
agere. Quāq; Aristoteles, atq; ipsum Stoici secu-
ti, calido & frigido omnem actionem tribuunt:
siccum & humidū pro patientibus iis subijciūt:
cū tamen satius fuisset omniū particularium

causas ad ipsas quatuor qualitates reducere. Nā
tametsi in animalibus & stirpibus calidum & fri-
gidum magis agere, siccum verò & humidū pa-
ti videatur, nō ob id tamē si res habet in omni-
bus. Cæterū omnis potentia sive facultas, in re-
latione ad aliquid intelligitur. Primū siquidem,
actionis ipsius potentia est causa, dein etiam o-
peris, ex accidenti quodam: quare si causa ad ali-
quid est, potentia quoq; in relatione dicetur ad
aliquid, nimirum causa cū sit. Cujus quidem
agentis causæ substantiam quandiu ignoramus,
facultatem eam, sive potentiam, appellamus: in
venis quidem potentiam quandam sanguificā,
in ventriculo concoctricem, in corde pulsato-
riam dicentes. Incipiendum itaq; nobis ab ipsis
operibus est, si certa ratione & via, quot & quæ
facultates sint, inventuri sumus. Singula nanq;
opera, ab aliqua procedunt actione. Hanc verò
omnino aliqua præcedit causa. Ergo naturæ o-
pera dum adhuc in utero gestatur, ac fingitur a-
nimal, omnes corporis sunt particulæ: edito ve-
rò in lucem, cōmune in omnibus naturæ opus
est, earū ad magnitudinē perfectam perductio.
Postea verò, etiam ut omnes perdurent, moli-
tio. Actiones quæ tribus his operibus respon-
dent, necessariò tres sunt, una scilicet cuiq; gene-
ratio, auctio, & nutritio. Verū generatio, sim-
plex actio naturæ nō est, sed ex alteratione & for-
matione cōposita. Siquidem alterari oportet, ef-
fingi; materiā ipsam, ut ex ea gignatur animal.
Auctio verò, solidarū ac jam formatarū anima-
lis particularū augmentum, ampliatioq; in lon-
gum, latum, & profundū est. At nutritio, iisdem
partibus appositio quædam est, sed sine amplia-
tione. Ergo primò omniū agamus de ipsa gene-
ratione. Projecto in uterum, aut etiam in terrā
semine, statis quibusdam temporibus, multæ cō-
stantur partes ejus quæ gignitur substantiæ, hu-
miditate, siccitate, calore, & frigore, cæterisq; o-
mnibus, quæ hæc sequuntur, qualitatibus (hoc est
tactilibus, atq; iis etiā quæ gustu, odoratu & vi-
su dijudicantur) inter se differentes. Quocirca si
primas & elementares alterationis facultates re-
quiris, hæc sunt, humiditas, siccitas, caliditas, &
frigidity. Si verò eas quæ ex his inter se mistis
nascuntur, tot sanè omni in animali erunt, quot
fuerint in eo sensibilia elementa, hoc est, simila-
res particulæ: quas nimirum in prima animalis
generatione, natura creat, usā generatrice, alte-
ratriceq; potentia. Propriū autē uniuscujusq; vi-
sceris corpus, si ab eo venas, nervos, & arterias
execueris, simile, simplexq; atq; cōpositionis
est expers. Cæterum si qua organa ex geminis
cōstant tunicis, sed simplicibus & dissimilibus,
horum ipsæ tunicae elementa sunt. Atq; in utraq;
tunica sua quædā alteratrix vis est, quæ ex men-
struo sanguine eam particulam generavit. Itaq;
alteratrices facultates in omni animalis genere
tot membratim erunt, quot habet in se elemen-
tares particulas. Sed & actiones proprias cuiq;
membratim particulæ necesse est esse, quemad-
modū & usus. At alteratrices naturæ facultates,
quæ particulares sunt, omnes tunicarū & ventri-
culi, & intestinorū, & uteri substantiā, qualis est,
effecerunt: cōpagem verò, formamq;, formatrix

Facultas o-
mnis in rela-
tione consistit
ad aliquid.

Venis inest fa-
cultas sangui-
fica.
Corde inest
sim pulsato-
riam.

Partes corpo-
ris universas
efficit natura o-
pera.

Actiones na-
tura tres, ge-
neratio, au-
ctio, nutritio.
Generatio est
esse actionē
compositam.

Auctio quid
sit.
Nutritio
quid.

Generatio-
nis progres-
sus.

Facultates e-
lementares
primæ, quæ.

Facultates
ex primis cō-
state, quot.

Elementa sen-
sibilia sunt si-
milares par-
ticulæ.

Alteratrices
facultates
tot inesse sim-
ilibus quot e-
lementares
particulæ.

Formatrix
facultas.

quædam virtus effluxit, quæ ars optima existens, tam cōsultò & artificiosè compingit singula, ut nō possint aliter se habere melius. Sed neq; ipsa facultas auctrix, deest iis qui gestantur in utero, sicuti nec vis nutritrix. Sunt tamē eo tempore alteratricis & formatricis potentia, veluti ministræ quædam, nec sustinent ipsæ primas partes. Ubi

Auctrix facultas quando vigeat, & qua famulatur illi.

Auctricis facultatis proprium

Augere secundum triam dimensionē, solius naturæ est opus.

Augescentibus nutritio nem esse per-necessariam.

Nutritio quā do fiat.

Assimilatio.

Nutricis facultatis opus esse assimilatiōem.

Assimilatiōi qua requirantur

Organa naturalia cur instituta plurima.

Instrumentorum nutritiōi inservientium genera varia.

Nutritio quid

Agglutinatio semper assimilatiōem præcedit.

Appositio præcedit agglutinatiōem

verò perfectā magnitudinē animal est adeptū, toto postquā editum est tempore, usq; ad ætatis vigorem, auctrix virtus dominatur. Auxiliatrices & veluti ministræ ejus sunt, alteratrix & nutritrix. Auctricis autem facultatis est proprium, in omnem partem proferre solidas corporis partes, quas elementares & similes, simplicesq; appellavimus: id quod solius naturæ proprium est munus. Nam quæ à nobis extensa sunt, sicut una dimensione id patiuntur, ita minuuntur reliquis. Quare iis quæ augentur, necessaria mutatio est: de qua jam nonnihil dicamus. Quum id quod in nutrimenti affluit specie, corporis ejus quod nutritur, omni parti affigitur, actio quidē ipsa nutritio est: causa verò hujus ipsa facultas. Et alteratio quidem hīc quoq; ipsius actionis genus est, nō tamen qualis erat in generatione. Ibi namq; quod os non erat, postea factum est os: in nutritione verò, ei quod jam factū est, id quod affluit efficitur simile. Ita nō immeritò alteratio nem illam nominamus generationem, hanc assimilationem. Ergo generatio, auctio, & nutritio, prima naturæ operum, ac veluti capita sunt: quare etiam effectrices horum facultates primæ principesq; tres fuerint. Desiderant tamē tū ipsa rum inter se, tum aliorū ministeriū. Ac quæ quidem generatrix, auctrixq; desiderant, dictū jam est. Quæ autem nutritrix facultas requirat, nunc dicetur. Ergo cum actio hujus facultatis assimilatio sit, nec fieri possit, ut assimilentur mutanturque inter se ulla, nisi societatem aliquam, cognitionemq; in qualitatibus habeant, idcirco primū quidem nec quodq; animal quocunq; cibo nutriti potest: deinde nec quibus nutriti potest, iis utiq; protinus. Atq; hujus necessitatis causa pluribus alterationis nutrimenti instrumentis utiq; animali est opus. Nam ut ex pane, aut lactuca, aut beta fiat sanguis, permulta sanē alteratio requiritur. Quæ quidem una est causa, cur multa sint ad alterationem nutrimenti instituta organa. Altera causa est excrementorū natura: quibus excipiendis & evacuandis, secundum quoddam in corpore particularū genus est destinatū. Est & aliud tertium genus instrumentorū, pro bonis succis undiq; per totū corpus deferendis, tributū. Alia namq; organa idoneū cuiq; particularē nutrimentū alterando præparant, alia separant excrementa, alia transmittūt, alia suscipiūt, alia expellunt, alia salubrium succorum in omnem partem ferendorū sunt viæ. Quæ omnia unius nutritionis gratia, sunt à natura condita. Porro nutritio ipsa, ad idq; nutritur, ejus quod nutrit assimilatio est: quam necessariò præcedit semper agglutinatio: sicuti & hanc appositio. Postquā enim succus is qui omnē animalis particulam nutriturus est, à vasis excidit, in totam eam primum dispergitur: mox adjungitur: deinde agglutinatur, ac demū assimilatur. Differre aut

appositionem ab agglutinatione, sicuti & agglutinationem ipsam ab assimilatione, hinc cōstat, quod in hydrope quidem humoris fiat appositio, nō tamen agglutinatio: in leuce autem, adhærentia quidem cernatur, at assimilatio non item. Porro nutrimentum dicitur propriè quod

Nutrimentum propriè dictū

assimilatur & nutrit: nam q; agglutinatur, vel quod apponitur, id nō propriè nutrimentū est, sed æquivocè, ut veluti nutrimentū: multoq; minus, quod in ventriculo cōtinetur, quanquā id etiam nutrimentū vocamus, quod si probè concoquatur, aliquando sit nutriturū. Ceterū nullam esse assimilationem veram, sed apparentem tantum, dicunt hi qui nec artificiosam naturam existimant, nec animalis habere providentiā, nec denique ullas proprias obtinere facultates, quibus scilicet alia trahat, alia teneat, alia demutet, alia expellat. Asclepiades porro nō solum ne

Nutrimentum æquivocè dictum.

gavit inesse renibus vim secernendi lotiū à sanguine, verum etiam urinam ipsam minimè quidem per meatus ureteras demitti in vesicā, sed per alias quasdam obscuras vias, ac nullo sensu perceptas, professus est, contrā quā licet planè cognoscere, vel ex ipsa vivorū anatome. Sed nec admittit, æstate plus bilis iisdem medicamentis vacuari, hyeme pituitæ: neq; rursus plus bilis, in juvene: in sene, plus pituitæ. Quippe medicamenta ipsa minimè familiares sibi succos attrahere, imò verò nihil prorsus ab ullo trahi impudenter pronunciat. Opinio cujus q; sit absurditatis plena, indicat lapis magnes: ex quo quidem vidimus ferreos stylos quinq; continenter appensos, quorum primus partem lapidis tetigit, per illum scilicet diffusa in reliquos, ipsius lapidis vi. Hippocrates verò, qui naturæ mysteria

Asclepiadis error.

novit, hanc semper tum admiratur, tum prædicat. Huic facultates adesse affirmat: unā, qua sibi cōveniēns attrahat: alteram, qua alienū à se repellat. Ipsam præterea tum nutrire animalia, tum augere. Jam morbos quoq; finire, indicareq; iisdem facultatibus putat. Porro non modò medicamenta purgatiā proprias sibi qualitates attrahunt, sed etiam quæ furculos, & telorū cuspidēs, quæ præaltè nōnunquā in carne sunt infixæ, evellunt. Jam verò quæcūq;, vel serpentium venena, vel quæ telis sunt illita educunt, hæc quoq; eandem quam magnes lapis facultatem ostendunt. Ceterū eorum quæ venena extrahunt, alia venenum viperæ, alia pastinacæ marinæ, alia alterius cujuscūque eliciunt: liquidoq; videre licet super ipsis medicamentis venena jacentia. Est itaq; rebus quibusq; facultas quædā, quæ nimirum congruentem sibi qualitatem attrahit: id quod certè vel in tritico videre licet manifestissimè. Nam si fictilia vasa aquæ plena, in tritici acervo recondas, id humorem in se per fictilia evocans, tum molem sibi, tum pondus

Magnes.

Hippocrates cultor & admirator naturæ.

Purgantibus medicamentis inesse vim proprias sibi qualitates trahendi.

Medicamentis educuntur venena.

Attrahit sibi congruentem inesse singulis rebus.

Triticum habere maximam vim trahendi sibi humorem vicinū. Renibus inesse vim lotij trahendi.

adjeit: cum videlicet triticū ipsum trahendi ad se vicini humoris majorem vim habeat, quā vel vehemens calor Solis. Atq; ad hunc modū rebus inest propria quædam vis lotiū trahendi. Si quidem venæ cavæ pars altera, sursū ad cor ascendit: reliqua sup spinā incedit, per totam eam ad crura usq; porrecta: cui renes à lateribus utrinq; p venas quasdam emulgentes adhærent. Per

quas

*Latij expur-
gandi ratio.*

quas quidem cum etiam feratur sanguis, quod serosum ejus, & tenue est, id per renes, ceu p-
latoria quædam transibit (non quidem consecu-
tione ad id quod vacuatur, qualiter Erasistratus
existimavit, sed ob renum facultatem tractricem,
alioqui nulli ex retenta urina perirent) quod ve-
rò sanguineum & crassum, id coercetur, ac per
universum corpus regeritur. Non ex autem di-
versa ratio, qua urinæ per renes in vesicam fe-
runtur, & qua sanguis in omnes animalis par-
tes: neq; etiam qua flava secernitur bilis.

G A L E N I P E R G A M E N I
*de naturalibus facultatibus, liber
secundus.*

QUOD necesse quidē sit fateri vim quan-
dā in renibus esse, quæ hujusmodi qua-
litatem, qualis in urina percipitur, ad se
trahere sit habilis, superiori monstravimus libro.
Qua nimirū facultate cor etiā, unicū ex iis quæ
post habentur, in dexterum proculdubio sinū,
suum alimentū trahit, deinde per arterialem ve-
nam ad pulmonē transmittit. Reliquorū quip-
pe nullum, nec Erasistrato quidem ipsi, nutrirī
ex corde placet, propter eas, quæ super vasis cre-
scunt, membranas. Jam verò, qui pro tenuitate,
aut crassitie humorū, latitudine autem, aut an-
gustia meatuū, fieri ajunt ipsam humorū segre-
gationem, hi nobis rationem reddant oportet,
cur urinā, quam bile esse tenuiorē constat, in bi-
lis vasa nō influat. At certē nullam aliam redde-
re poterūt, præter facultatem illam à natura uni-
cuiq; instrumēto statim ab initio tributam, sine
qua durare animalia nō poterūt. Siquidē nec vi-
vere, nec durare ulli animalium, vel brevissimo
tēpore fas erit, si tot in se particulas, tamq; dissi-
dentes cum habeat, nulla facultate utatur, nec q-
conveniens trahat, nec quæ alienū secernat, nec
quæ id quod nutriat, alterabit. Quibus quidem
facultatibus utitur natura illa, quæ particulas ef-
fingit, easq; sensim adauget, atq; omnino est per
eas totas extensa: ut quæ sanē totas per totas, sin-
gat, nutriat, atq; augeat, veteri semper ipsius ma-
teriæ forma mutata: quo vel maximē nomine
differt natura ab statuaria, quæ foris quidē ma-
teriam ipsam adornat, intus autem illaboratam
atq; neglectam relinquit. Phidias siquidē ex ce-
ra efficere ebur, aurūve nō potuit, sed neq; ex
auro ceram: quippe horum quodq; manens id
quod à principio erat, foris tantū speciem artis
adeptū, perfectā fit statua. At natura, nullius ma-
teriæ veterem formā servat: alioqui sanguis om-
nino essent cunctæ animalis particulae, is scili-
cet qui à matre cōcipiente confluit ad maris se-
men, instar ceræ cujuspiam, atq; unius & unifor-
mis materiæ, artificii subjectæ. Nulla autem ani-
malis particula ex ea ipsa materia fit ita rubea,
humidave, sicuti est ipse sanguis. Nam os, cartila-
go, arteria, vena, nervus, adeps, glandula, mem-
brana, medulla, exanguia quidē sunt omnia, li-
cet cōcreta ex sanguine, videlicet materiali prin-
cipio. Semē verò cum sit efficiens animalis prin-
cipium, trahendi sanguinis possidet facultatem,
nō secus q̃ magnes ferrū. Quare primò quidem
cōpetentem sibi sanguinem attrahat, quem &

facile vincere, & celeriter assimilare, & sibi nu-
trimentū facere possit. Mox arbitror secūdo at-
trahet, & tertio, quò scilicet sibi molem magni-
tudinēq; justā ex nutritione adiciat. Unde jā
alteratrix inventa vis est. Tertia verò formatrix
apparebit: cujus ope semen primū veluti cōcre-
tum quiddam tenue, membranam illam sibi in-
duat, quam Hippocrates sexta die cum fœtu, Mu-
fica cuidam mulieri ovarū tunicae similem exci-
disse ait. Post hoc verò reliqua etiam quæcunq;
ab eo, in libello de infantis natura, sunt scripta,
fingit. Cæterum cum augeri illa post formatio-
nem cōveniat, id profectò assequetur, tum in o-
mnē extensa partem, tum verò nutrita. Cor igitur
ab initio ita mihi parvum esse, ut nihil à mi-
lij semine, aut si mavis à faba distet, intellige. Au-
gentur porrò ea tantū, quæ vivunt, quorum ni-
mirum formæ perfectæ jam sunt. At ejus quod
fit, processus ille qui est ad formam, nō utiq; au-
ctio, sed generatio nominatur. Siquidē augetur
id quod est: gignitur quod nō est. In universum
autem deridenda Erasistrati est opinio, dicētis at-
tractionem fieri successione cōtinui ad id quod
vacuatur. Quæ ratio, tantū succedere cōtinui ne-
cessariū facit, quantum effluit. Hoc verò iis qui
cōmodo sunt corporis habitu, satis ad nutritio-
nem est: utpote quibus ea quæ apponuntur, iis
quæ effluunt, paria esse oportet. At in iis qui ad
ultimum sunt graciles, ac liberaliter refici postu-
lant, nisi multo plus sit quod apponitur, quā
id quod vacuatur, pristinus restitui habitus nun-
quam poterit. Liquet igitur, quò tanto plus
sunt hi attracturi, quanto etiam pluribus egent.
Trahitur itaq; nutrimentū, nō successione conti-
nui, ad id quod vacuatur, sed p̃inde ac à magne-
te lapide ferrum, qui scilicet talis qualitas tra-
hendæ vim habet. At verò distributionis princi-
pium expressio ventriculi præstat: reliquū autē
ejus progressum omnem, tum venæ ipsæ cōtra-
ctæ ac propellentes, tum singula quæ nutriuntur
ad se trahentia. Quare improbè Erasistratus hal-
lucinatur, dum horum omnium causam succes-
sionem illam ad id quod vacuatur, statuit: sicuti
etiā ubi ex jecinoris scirrho gigni semper hydro-
pem ait: id quod certē hominis planē est secor-
dis. Siquidem ex diuturnis hæmorrhoidibus, vel
suppressis, vel immodica profusione, hominem
ad extremā frigiditatem ducentib⁹, nō semel aut
bis, sed sæpe jam aquam intercutem collectā vi-
di. Sicuti mulieribus quoq; tum menstruæ pur-
gationis omnimoda cessatio, tum immodica va-
cuatio, sæpe hydropem accersiverunt. Nonnul-
lis verò earum, & qui muliebris vocatur fluxus,
in hūc terminatus est morb⁹: ut interim qui ab
illis incipiunt, aliōve quopiam opportunorum
ad id membrorum, hydropas impræsentiarum
prætereant. Est tamen ea prima generandi hydro-
pis causa, quæ ex sanguificationis defectu proce-
dit: simili genere, atq; ex ciborū cōcoctionis de-
fectu diarrhœa. Atqui in tali hydropis genere,
nec aliud viscus ullū, nec jecur vitio est affectū.
Sed illud etiā, quod innuere videtur, præ se fert
extremā absurditatē: nēpe fieri posse ut bilis ci-
bis statim mista, forinsecus nobis adveniat, non
gignatur in corpore. Mel siquidē, non eò q̃ plu-

*Formationis
factus ratio.*

*Auctio qui
fit
Cordis mag-
nitudine in pri-
mo artu
Augeri tan-
tū quā vī-
vunt.*

*Generatio
quid dicatur.*

*Nutrimentū
trahi, non
successione
ad id quod
vacuatur,
sed p̃inde
ut à magne-
te trahitur
ferrum.
Distributio
alimenti quo
modo fiat.*

*Hydrops qui
bus ex occa-
sionibus gigni
possit.*

*Hydropis ge-
nerandi pri-
ma causa, ex
sanguifica-
tionis defe-
ctu.*

*Diarrhœa ex
ciborū conco-
ctionis defe-
ctu.*

rimam in se bilem continet, sed quod intra corpus est mutatum, in hanc alteratur & vertitur. Quippe amarum gustantibus esset, si bilem in se extra corpus contineret: omnibusq; similiter hominibus æqualis ex eo gigneretur bilis copia.

Mel florentibus in bilem convertitur. Mel senibus commodum. Bile generatio.

Verum id secus habet. Siquidem qui jam sunt in flore, potissimum si calidiore natura sint, ac vitam laboriosam transigant, in iis totum mel vertitur in flavam bilem. Senibus verò admodum est accommodum, utpote quibus non in bilem, sed in sanguinem convertatur. Gignitur autem in jecinore, atq; etiã in venis, ipsa bilis unã cum sanguine. Est enim exactè jam demonstratum veteribus, dum in venis alimentum ab innato calore alteratur, sanguinem quidem ex mediocri calore fieri: reliquos verò succos, ex eodẽ immodico.

Signis fit ex mediocri calore.

Atq; huic sententiæ, quæ evidenter sensibus apparent, omnia consentiunt: quando & ex cibis, hi qui natura sunt calidiore, magis sunt biliosi: qui frigidiore, magis pituitosi. Simili modo ex ætatibus, quæ calidiore natura sunt, has biliosiores esse constat: quæ frigidiore, pituitæ magis obnoxias. Jam vitæ rationum, & regionum, & anni temporum, multoq; priores his, ipsarum quoq; naturarum, quæ frigidiore sunt, eam magis cernuntur pituitosa: quæ calidiore, magis biliosæ. Præterea ex morbis quoq; qui frigidi sunt, hi à pituita oriuntur: qui calidi, hi à bile ortum habent. Cum enim ob certam illarum quatuor qualitatũ temperiem, particula quæq; certam habeat functionem, necesse omnino est, propter ejus temperiei vitium, aut prorsus corrumpi functionem, aut impediri: ac proinde vel totum, vel in parte ægrotare animal.

Frigidi morbi à pituita oriuntur. Calidi morbi à bile.

Morbi primi quatuor.

Ac primi quidem, maximeq; generales morbi sunt quatuor: qui calore, frigore, siccitate, humiditateq; inter se dissident. Porro in febribus, admodum vitatur ipsa cõcoctio ventriculi, ob calorem illum præter naturam, qui cum substantia sua functionem lædat, meritò inter primos morbos annumeratur: quare actio ipsa necessario ex commoda nasceretur temperie.

Concoctione ventriculi vitari maxime in febribus.

Actionem ex commoda oriri temperie.

Neq; enim alia de causa potest intemperies primorum esse causa morborum, nisi quod cõmoda sit temperies corrupta. Cum enim ab hac manent actiones, necesse est prima earum vitia, ex hac manare corrupta. Est autem cõmoda caloris temperies, ipsius actionis causa. Quare in omni actione, id quod melius est, cõmodo temperamento ferre acceptum cõvenit: quæ deteriora sunt, vitioso. Sanguinem itaq; à mediocri, bilem ab immodico calore nasci, putandum.

Ieiunantibus, diu præter cõsuetudinem, quam accidunt.

Quæ coquantur immodicè, primo salustiora postea maiora reddunt.

Mel reddi ex longa coctura amarum.

Unde iis qui sani citra vitium sunt, ubi aliqua coacti occasione contra consuetudinẽ cibo abstinerunt, os quidem amarum, lotium verò biliosum redditur, atq; etiam mordetur venter, quod videlicet ea quæ coquantur immodicè, primũ quidẽ falsiora, postea verò amariora reddantur. Nam si mel ipsum, quod omnium dulcissimũ est, plurimum percoquere velis, id quoque reddideris amarissimũ. Quod nanq; ad dulcedinem generandam caloris ei debebat accedere, id totum prorsus intra se obtinet. Quare si calidum cum sit, calido adhuc jungatur, statim fit bilis, non sanguis. Postulat itaq; ut vertatur in sanguinem, naturam hominis frigidam, ætatemq; frigidam.

Non ab re igitur censuit Hippocrates, mel biliosis naturis nõ esse ex usu: inimicũ autẽ esse morbis, quos amara excitavit bilis. At senili naturæ, maximè cõveniens existere. In universum autẽ, corporibus calidis, quacũq; ex occasione sint calida, mel atq; dulcia omnia, generandæ bili causam præbent: iis autẽ quæ contrarij sunt habitus, sanguini. Atqui non potest idem cibus aliis verti in bilem, aliis in sanguinem, nisi intra corpus eorũ generatio peragatur. Etenim si cibus quifque à se & in se hanc habens, nec in animalis corpore mutatus, bilem gigneret, utiq; in omnibus eam corporibus pari modo generaret. Sunt igitur semper nobis causæ ipsæ inquirendæ. Qui enim intemperamentorum causas cognovit, is facile ad naturam suam ea reducet. Porro affectus qui minimè ex accidenti, sed primũ & per se labefactat functionẽ, is verè morbus est. Jam verò Hippocrates temperatũ calorem, & qui modicè est humidus, sanguinis generandi causam affirmat: qua ratione sanguinem potestate calidum & humidũ esse ait, æquè ut flavã bilem calidam atq; siccam, quantumvis sit aspectu humidam.

Mel biliosis naturis non esse ex usu, cõveniens autem senibus.

Affectus primus labefactans functionem, est morbus.

Sanguis calidus & humidus.

Bilis calida & sicca.

Pituita frigida.

Atra bilis acrior & malignior quam flavæ.

Lien receptaculum atræ bilis.

Liene imbecillo, quæ accidunt.

Regij morbi à liene orti, nigriores.

Musti & sanguinis comparatio.

Flavam bilẽ ad ultimum perassatur, crassam, igneam, vitellinã reddi.

Atra bilis per assata, qualis redditur.

Quippe dissidet quod secundum apparentiam humidum est, ab eo quod viribus tale existit. Cum enim ubi plurima in ventriculo flava bilis cõtinetur, perpetua siti urgeamur, signum est, potestate ipsam calidam esse, & siccam: æquè ut pituitã frigidam, humidamq;: cum qua etiam albicans ille succus, quem βλενας, id est, mucum, appellat Prodicus, frigidus atque humidus est. Est & alius humor frigidus simul & siccus, qui & in autumno, & in ætate illa quæ succedit vigori, crescit, quam atram vocamus bilem, flava multò acriorem, & maligniorem. Dysenteriam siquidem quæ ab atra incipit bile, mortiferã pronunciat Hippocrates. Non tamẽ quæ à flava ortitur, prorsus mortifera est, sed pleriq; ex ea servatur. Est autem atræ bilis receptaculum lien: qui ubi minus quàm justũ sit, illam ad sese trahit, ut puta quando est malè affectus, neq; valenter trahit, ut sanguis impurior est, sic totum corpus magis redditur decolor. Tum regij morbi, qui à liene ægrotante ortũ habent, nigriores sunt: itemq; ulcerum cicatrices nigræ. Cæterum quibus corpus floret, iis lien, Hippocratis testimonio, minuitur. Quibus verò id viscus magnũ & tumens augefcit, iis corpus minuit, & cacochymũ reddit. Quemadmodũ igitur in ferventi musto duo provenire excrementa cernimus, alterũ levius, magisq; æreum, quod nimirum florem vocamus: alterum gravius & magis terreum, quod appellamus facem: sic etiam in sanguine generando, excrementa gignuntur duo, quæ illis proportionẽ respõdent: alterũ tenue, humidumq; & fluidũ, quod flava dicitur bilis, & in vesicã felis excipitur: alterum sæculentũ & terreũ, quem veteres atrum succum appellant, quemq; ad se lien ipse trahit. Cæterum nõ eandem habent huiusmodi speciem, cum respondent naturæ modo, quam ubi præter naturã se habent. Quippe quæ flava dicitur bilis, dũ ad ultimum perassatur, crassa, ignea, & vitellina redditur. Atra etiam bilis, perpessa idem, longè malignior quàm naturalis, evadit. Siquidẽ tum acris, in morẽ aceti, fit: tum corpus

corpus rodit, nec non terram ipsam fermentat, ubi scilicet ascititia putredo nigro illi succo naturaliter se habenti accessit. Mihiq; videntur veterum medicorum pleriq;, id quod è tali succo naturaliter se habet, quodq; infra deiicitur, & sæpe supra fluitat, atrum vocare succum, non atram bilem: quod verò exustione quapiã ac putrescentia, in acidã migravit qualitã, id atram nuncupare bilem: quod excrementũ jam præter naturã est, quum nimirũ ab ustione non naturalis caloris acrimoniã illam asciverit, ac veluti cinis quidam sit redditum. Sic quodammodo & fœx usta, à nõ usta dissidet. Illa nanq; admodum calida est, adeo ut carnem urat, liquet, atq; corrumpat. Altera quæ nondum est usta, ad omnia utuntur medici, at quæ terra figulari, aliisq; etiã quæ tum siccandi, tum refrigerandi facultatẽ habent. Sanẽ in atræ bilis sic ustæ speciem etiam vitellina illa subinde vertitur, quoties ipsa quoq; igneo percocta est calore. Reliqua bilis generatim ex jam dictorũ mixtura constant universa, partim tanquam viæ quædam sunt ad harum tum generationem, tum inter se mutationem. Distant inter se, quod aliæ meracæ sunt, ac solæ: aliæ veluti sero quodam imbutæ. Verum seri genera quæ in succis habentur, omnia sunt excrementa, purumq; ab iis esse postulat animalis corpus. Ea verò quæ prædicta sunt, naturæ usum aliquem conferunt. Purgatur autem ab iis sanguis tum per lienem, tum per eam quæ jecinori lubest vesicã. Requirit enim sanguis in non paucis animalis particulis crassitudinem. Est etiam quando neq; in postremis flavum succum postulet, qui tamen igneus ad extremũ factus non sit. Porro quod pituitam expurget, natura nullum instrumentum cõdidit, propterea quod frigida & humida est, ac veluti ex dimidio coctum nutrimentum. Dẽsiderat igitur talis succus non utiq; vacuari, sed in corpore manens alterari. Excrementũ verò quod a cerebro destillat, fortasse nec pituitam quis rectẽ, sed mucum, & destillationem appellet. Ergo quemadmodum ex bilis generibus aliud utile naturaleq; in animalibus est, aliud inutile & præter naturam: sic pituitæ quod dulce est, id salutare esse animanti & naturale putandũ. Quod acidum salsumq; est, acidũ quidem, omnino crudũ esse: salsum verò, computruisse. Porro omnimoda cruditas pituitæ intelligenda est, quæ in secunda concoctione incidit, quæ in venis agitur: non aut in ea quæ prima est, quæq; in ventriculo perficitur: quũ si hac de stitueretur, ne succus quidẽ omnino esse posset.

GALENI PERGAMENI

de naturalibus facultatibus, liber

tertius.

Nutritio quã
do fiat.Facultatum
naturalium
ordo.

Nutritionem quidem fieri, quũ id quod nutrit, ei quod nutritur, assimilatur: esseq; in singulis animalis particulis facultatem quandam alteratricẽ, quam membratim assimilatricem & nutritoriã vocavimus: aliamq; præterea attractricem, quæ materiam cõvenientis nutrimenti suppeditat, in proximo demonstratum est libro. Indicatu præterea est, & quod

ante assimilationem agglutinatio fit: hanc verò ab appositione præcedi, quæ finis est actionis quæ ab attractrice perficitur. Porro ad nutritionem ipsam ampliori opus est tempore, quàm ad perficiendas aliarum facultatũ actiones: requiriturq; ut appositus in particula succus, si illam sit nutriturus, minimẽ transferatur ad alias, sed in ea quiescat: quare necessaria etiam videtur naturæ ipsi facultas quædã retentrix, quæ id quod appositum est retineat. Talis autem vis, in maximis, maximãq; cavis instrumentis cõspicua admodum cernitur: in parvis aut obscurior. At inter animalis partes maximẽ cavæ, amplissimæq; sunt, ventriculus, uterus, & quæ secundæ vocantur. Retinet autẽ venter cibum, quo ad eum cõcoxit: nec minus fœtũ uterus, quo ad hunc consummavit. Cæterum longẽ amplius perficiendi fœtus tempus, quàm cibi concoquendi. Ac proinde retentrix uteri à nobis multo clariũ cognoscetur. Quippe novem mensibus plerisque mulieribus perficitur in utero fœtus, qui tota quidem cervice conniveret: complectitur autem fœtum undiq; unã cum secundis. Estq; tum oris conniventia, tum moræ fœtus in utero finis, ipsa actionis utilitas. Nam ubi id completum est, cuius gratia retentrice facultate est usus uterus, utiq; hanc inhibet, ac cessare facit, propultrice, quæ hætenus quieverat, loco ejus assumpta. Sanẽ erat sicuti quietis hujus facultatis finis, ipse usus: ita etiã actionis ejusdẽ, finis, similiter ipse usus, utpote quo excitante agat, nõ excitante quiescat. Succedẽibus igitur rectẽ omnibus quæ in utero fiunt, expultrice quiescit omnino facultas: improspere autem cedentibus, non amplius expectat uterus novem mensium temporis moram: imò retentrix facultas statim desinit ab opere, & expultrici ut moveatur permittit: etenim sibi mutuo succedunt. Jam verò prægnantes ipsæ primis diebus, potissimumq; eo ipso quo semen est conceptũ, moveri, atq; in seipsum cõcurrere uterum sentiunt: quod si præter hæc, citra affectum aliquem, etiam conniveat os uteri, jam semẽ ipsum a mare, & se cepisse, & retinere arbitrantur: quo tẽpore adeo clauditur uterus, usq; ad horam partus, ut ne specilli quidem mucronẽ admittat. At verò Hippocrates cõnivere os uteri, & in conceptionibus, & dum phlegmone affectũ est, profitetur. Cæterum in conceptionibus, servato naturali habitu: in phlegmone, in durum mutato. Igitur absoluto, aut etiam mortuo fœtu, sub facultate expultrice os uteri aperitur: fundus aut, atq; universæ partes circumjacentes utero, sese deorsum contrahunt, atq; fœtum propellunt: idq; tanto labore & conatu, ut interdum ipse uterus excidat, potissimum cum ejus ad spinã ligamenta sunt laxa. Porro obstetrices ipsæ non jubent surgere parturientes, neq; in sella collocant, donec ad fœtus trãsitũ os uteri satis patet: id quod ex assidua manũ contrectatione sentiunt fieri paulatim. Opus autem ipsum quod a seipsis præstant parientes, non uteri est, sed muscutorum qui sunt in abdomine, qui scilicet tum ad dejectionẽ, tum ad reddendam urinam nobis etiã auxilio sunt: atq; ita quidem in utero, duæ memoratæ facultates apparent. In-

Nutritio
quæ sint ne-
cessaria.Retentrix fa-
cultas in qui-
bus cõspicua.
Partes maxi-
mæ caruæ.Uteri natura
& operatio
admiranda.Expultricem
& retentri-
cem uteri si-
bi mutuo suc-
cedere.
Conceptionis
ratio.Uteri os cõ-
nivere, & in
conceptioni-
bus, & dum
phlegmone af-
fligitur
Uteri progre-
dentia.Obstetrican-
di ratio.

ventre verò, ad hunc modum. Quum is pro sua natura se habet, ac constrictoria virtute utitur, quamlibet exiguum sit quod in se continet, totum id undiq; complexus nullum vacuum relinquit locum. Quum imbecillus est, quacumq; parte complexu exactè assumpta non valet, ac proinde laxum quoddam spatium efficit, permittitq; ea quæ in se continent humida, ex alio in alium locum transire, ac fluctuationem sonitus edere. Talis autem ventriculus, quum imbecillus sit, haud quidem propè concoquet: sed in eo diutius videbitur quædam manere gravitas, tum cibi, tum potus, ut qui etiam tardius cōcoquat. Ejus autem diutina ciborum moræ, non est causa angustia infimi orificij ventriculi, quum videamus indies multa longè crassissima, quæ per imprudentiam vorantur, facile excerni: sicuti & alia liquida retineri: unde neq; etiam ejusdem in ventriculo moræ finis aut terminus erit ciborum in cremorem conversio (alioqui sorbitiones, & lac, & pituita cremor, in omnibus illic transirent) sed concoctio, quæ à conversione in cremorem res est diversa, sicuti nutritio à sanguificatione. Est autem concoctio ipsa in ventriculo, nutrimenti in propriam ejus quod nutritur qualitatem mutatio. Ubi igitur ad perfectionem concoxit cibos ventriculus, tum aperit inferius os, exciduntq; per ipsum facile cibi, etiam si lapides, ossa, acinos, aliave quæ verti in cremorem non possint, plurima secum habeant. At interim dum coquit ventriculus, cibos totus (perinde ut uterus foetum) ambit, & amplexatur, clauditurq; ad unguem infimum illius orificium, quod pyloron nominant. Itaq; neq; in utero, neq; in ventre, neque in vesica utravis, licet reperire locum aliquem vacuum, scilicet instrumentorum tunicis, ea quæ continent, semper arctè amplectentibus, quandiu naturaliter se habet animal. Quare illis omnibus ingentia sunt aliquæ facultates, quibus retinere quæ expectant, expellere aliena, possint. Siquidem quod bilem ad se trahat ea quæ jecinori subest vesica, supra est monstratum: quod autem & in ventre quoti die efficiat, id quoq; evidenter cernitur. Atqui si tractricis operam statim expultricis actio exciperet, nec media semper inter eas intercederet vis retentrix, par semper in vesica bilis inveniretur modus: at non sic invenitur, sicuti nec urinæ in altera, quæ lotio est addicta. Porro ubi ventriculus circa imas partes multitudine ac acrimonia humoris afficitur, si firmæ sint quæ circa stomachum habentur partes, diarrhœæ citantur. Quum verò sic ejus os infestatur, si cæteræ partes valentes sint, vomitiones sequuntur. Quippe ventriculus, non secus quam partes reliquæ, ut convenientem sibi qualitatem experit, sic prorsus alienam respuit. Quare si experit, trahet utiq;: sicuti & expellet, si etiam fastidiat aliquid. Ad hæc autem, si trahit, necessario etiam fruitur: id quod non licebit illi, nisi retineat. Sed ipsius fruitionis aliquis erit finis, nempe benignioris ciborum substantiæ factus, & repositio intra venas. Post quem finem jam expultricis facultatis agendi succedet tempus. Nam ubi abundè saturatus est venter, quicquid reliquum nutrimenti est, veluti onerosum aliquid rejicit, quanquam ex eo, quod cum ventriculo

habuit, commercio, ipsum quoq; consecutum est salutare aliquid. Quippe ubi conveniunt duo corpora, quæ ad agendum ac patiendum sunt nata, si pares iis vires sint, ex æquo tum agent, tum patietur. Sin longè superet, vincatq; alterum, magnum quiddam, in id quod patitur, efficiet: ipsum verò vel exiguum aliquid, vel omnino nihil patietur: quo nomine dissidet nutrimentum à medicamento venenoso: hoc namq; vim corporis vincit, illud ab hac vincitur. Minimè igitur potest conveniens animali nutrimentum esse, quod ab iis quæ in animali sunt qualitatibus non vincitur. At vinci aliud non est, quam alterari. Non rationem æquali omnes modo vincunt nutrimentum particulæ. Siquidem alteratio quæ fit in ventre, major est quam quæ in ore perficitur: minor verò ea, quæ in jecinore & venis. Horum namq; alteratio, nutrimentum in sanguinis substantiam mutat. Quæ in ore agitur, mutat quidem id in alteram speciem manifestè, non tamen ad perfectionem transformat. Cæterum quam magna sit ciborum in ore alteratio, hinc discas licet, quæ manus triticum crudos furunculos occisime & mutatur & coquit: quum tamen si aqua admisceatur, nequeat tale quicquam præstare. Nec est quod id mirere. Nam pituita quæ in ore habetur, & lichenum remedium est, & scorpios statim necat: præterea multas ex venenatis bestiis, partim proptinus perimit, partim spatio: omnes certè insigniter lædit. Verum quanto ij qui mansi sunt cibi, ijs qui inhærescunt in vacuis dentium intervallis, magis sunt alterati, tanto etiā his magis ij qui devorati sunt. Siquidem incomparabilis est horum alterationis excessus, si & quæ in ventre est pituita, & bilis, & spiritus, & calor, & tota ventris substantia, æstimetur. Quod si viscera quoq; illi adjacentia, tanquam magno lebeti plures ignis foci, pariter æstimata sint, à dextris quidem jecur, à sinistris lien, supernè cor, & transversum septum, & elevatum, & assidue motum, ingentem quandam ciborum, qui in ventriculo sunt devorati, alterationem fieri credideris. Quo autem pacto mutari facile in sanguinem possent, nisi tales essent mutatione præparati? Monstratum namq; est, nihil in contrariam qualitatem totum simul migrare. Porro venter duas habet tunicas, usq; ad ipsum os pertinentes. Quarum interior quidem qualis in ipso est ventre, talis persistit, in directumq; porrectas fibras sortitur, trahendi nimirum gratia. Altera ad carnosiorè speciem in gula convertitur, habetq; transversas fibras, ad contrahendum undiq;. Quippe singulorum quæ moventur instrumentorum corpora, pro fibrarum positura motus habent. Jam in singulis intestinis circulares in utraq; tunica fibræ sunt, quod contrahuntur duntaxat, nec quicquam trahant. At venter alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet trahat: alias transversas, quibus cōstringat. Verum ubi transversæ fibræ tenduntur, latitudinē ventris minorem reddunt. Rectæ autem dum contrahuntur, necessario longitudinem minuunt. At verò deglutientibus nobis, liquido cernitur larynx sursum in tantum currens, quantum gula deorsum trahitur: quicquid cōpleta jam deglutitione laxaverit sese gula, luculenter descendere

Ventriculus
quando non
rectè conco-
quat.

Concoctio est
nutrimenti in
propriam e-
jus quod nu-
tritur, quali-
tatem, mu-
tatio.

Eyloros.

Vesica felle
trahit bilem.

Diarrhœa
quando exci-
tantur
Vomitiones
quando.

Nutrimentum
à deleterio
medicamen-
to quo modo
differat.

Vinci non est
se aliud quæ
alterari.
Alterationis
ubi differen-
tia

Alteratio
quæ fit in ore

Triticum man-
sum crudos
furunculos
coquere.
Pituita oris
necare scor-
pios.

Alterationis
quæ in ventre
culo fit, descri-
bitur.

Ventriculo
duas inesse
tunicas usq;
ad os perti-
nentes.

Fibra recta,
trahendi gra-
tia.
Fibra trans-
versa ad con-
tractionem.

Intestina non
trahere, sed
contrahi tan-
tum.

Larynx sur-
sum tantum
trahitur,
quantum gula
deorsum.

ventriculi
internam tu-
nicam os tue-
lire.

Gula esse ci-
boris ad ven-
triculū viā.
Deglutire
cur facilius
quam vomere

Gula exter-
na tunica
inferre vo-
mitū atq;
degutōni.
Venter qui
in ore in-
venitur.

Gula inter
degutendū
impleri spi-
ritu.

Gula sitis
abstinens.
Ventriculi
quatuor fa-
cultates na-
turales, quæ
nutritioni
inferunt.

Instrumentis
singulis mes-
se attracti-
ōis & expul-
tricem poten-
tiam.

Fibra obli-
qua capitulū
tur retenti-
ci parantia.

derē cernitur illa summitas asperę arterię. Siqui-
dē interna * ventriculi tunica, quæ rectas habet
fibras, quæq; tū gulam intrinsecus vestit, tum os
ipsum, ea inquam super internis partibus ipsius
laryngis extenditur. Itaque fieri nequit, quum i-
psa a ventriculo deorsum trahitur, quin simul e-
tiam secum detrahat laryngem. Sed quod su-
pernis partibus contractis, infernæ dilatentur,
commune quidem id est, tum vivis, tum demor-
tuis corporibus. Gula igitur, ut monstravimus, 10
trahitur: alioqui laryngem nō traheret. Trahit
aut per gulam ipse vētriculus cibos, quos etiam
per eandem vomit. Atq; idcirco facilius est de-
glutire quā vomere, quod scilicet deglutiatur
ambabus ventris tunicis operantibus, interna
quidem trahente, externa se cōtrahente, ac tru-
dente: vomatū autem altera tantum, quæ foris
est ac trudit, agente, nec ulla in os trahente. Nō
enim sicuti ventris appetentia deglutiendos ci-
bos præcedit, sic in vomitionibus appetit oris 20
pars ulla, excitati affectus quippiam, sed sunt am-
bo ventris affectus inter se contrarii: quorum u-
trique infervit gulæ tunica externa, cui transver-
sæ sunt fibræ. Etenim deglutitio in ijs qui immo-
dicę appetunt, ocysimē fit: ventre nempe cibos
deorsum vellente, prius quā sint mansi, ut in
Hiatulis, & Synodontibus accidit, quorum præ-
gulositate (ut Aristoteles inquit) venter aliquan-
do in ore invenitur. At verò utraq; gulæ tunicam
prædictis fungi actionibus posse, hinc de- 30
prehendes: quod si in uno animali externā qui-
dem tunicam, cui transversæ adsunt fibræ, in alio
autem internam, cui rectæ, trāsversa incisio-
ne secueris, utrumque planē animal deglutire vi-
debis. Ex quo manifestē patet, q̃ altera earū de-
glutire licet, ceterum deterius quā ambabus.
Sed hoc interim perpendendū est, spiritu qui u-
nā cum cibis deglutitur, gulā inter deglutiendū
impleri, esseq; sicū hujus obliquū. Indicavimus
igitur quatuor in ventre virtutes sitas, nempe in 40
deglutendo attractricē, in coquendo retentri-
cem, in vomitione, & concoctorū ciborū in te-
nue intestinū descensu, expultricem: ipsam verò
concoctionem quandam existere alterationem.
Quas quidem facultates ministras esse nutritio-
nis, similiter expositū est. Sed enim ut sterco hu-
manum canibus existit suavissimū, ita jecinoris
excrementorum, aliud lieni, aliud bilis vesicæ, a-
liud renibus est acceptum. Ergo universa instru-
menta geminas facultates obtinet, & qua cōve- 50
niens trahunt, & qua alienū repellūt. Proinde si
quod vel ex unica tunica instrumentū cōstat, vel
uti ambæ vesicæ, uterus, & vena, utrumq; fibrarū
genus obtinet, rectarū & transversarū. Quin ter-
tium quoq; fibrarū genus obliquarum est minus
omnino, quā duo prædicta genera, numero-
sum. Invenitur id in ijs instrumentis, quæ ex dua-
bus tunicis constant, in altera sola, rectis scilicet
ipsis fibris immistum. In his autem quæ ex singu-
lari constituuntur tunica, unā cum duobus aliis 60
generibus. Sanē hæ maximē opitulantur reten-
tricis facultatis actioni. Postulat etiam in hoc o-
pere particula quæq; super ea quæ continet, strin-
gi ac circum ea tendi: ut puta venter quidem, to-
tū concoquendi cibi, vterus toto gestandi fœ-

tus tempore. Venæ porro tunica, ex multifariis
fibris est condita. Externa arteriæ tunica, ex cir-
cularibus: interna ex rectis plurimis, paucis au-
tem cum his obliquis, cōflatur. Sola instrumen-
torum omnium ex duabus tunicis, atque harū
utraq; ex transversis constante fibris, facta sunt
intestina. Aut venter & utraq; vesica, & uteri, u-
bi vel multitudine eorum quæ continent degra-
vantur, vel qualitate mordentur, quod offendit
abijcere properant. Quorum utrumq; aliquando
violenter incidit, quo casu provocatur abortus:
fit autem is plerunq; ex naturę commodo, quod
genus non abortus, sed partus nominatur. Atq; 10
abortus quidem sequuntur vel medicamenta
quæ ipsos provocāt, vel etiam tensionem uteri:
partus autem, ipsius fœtus motiones vehemen-
tissimas. Communis aut omnibus his affectibus
ipsa est offensio. Cujus triplex est causa: aut mo-
les nimia, aut pondus aliquod, aut morsus. Mo-
les, ubi amplius distendi uterus nō tolerat. Pon-
dus, quū supra vires eius sit, quod cōtinet. Mor-
sus, ubi vel humores qui prius in membranis cō-
tinebantur, his ruptis, in ipsum uterū sunt effusi:
vel etiam totus partus corruptus & putris, ac in-
noxiam saniem dissolutus, uteri tunicā eius oc-
casionē irritat, atq; mordet. Ad hæc, excrementa
singula, si morā in corpore diutius trahant, pu-
trescunt: quare mordacia & acria, atq; his quæ i-
psa cōtinent, infesta redduntur. Minimē tamen
id in ea vesica quæ jecinori subest, similiter se ha-
bet, ut quæ nervorū planē sit expers. Quāquam
certē cum hæc ipsa trahat liquidū, excernatque, 20
necesse est eam vel succi multitudine pressam,
vel qualitate illius offensam, expulsionem desi-
derare. Iam nec illud difficile cōpertū est, & tra-
ctum & expulsionē diversis in temporibus per
eundem ejus meatum fieri. Uteri præterea sto-
machus, pari modo sicut intrō seminis, ita foras
partus via est. Verū hīc tractrix facultas, æquē
atq; expultrix, non liquet vulgō. Quum igitur
attractionem & expulsionem, per unam ean-
demq; fieri viam cernamus, non debemus mira-
ri, etiam si per venas in ventrem natura nonnun-
quam excrementa propulset, dū purgantia phar-
maca propinamus: at multo minus, si per quas
venas a ventre in jecur facta est digestio, rursus
ex jecinore in ipsum trahi aliquod alimentum
in longiori inedia potest. Venæ siquidem illæ,
quæ medium spatium inter jecur & partes cir-
ca ventrem occupant, duplex ministerium præ-
stant, nempe ut quum in his abundantia fuerit
alimenti, per eas sursum feratur in jecur: quum
autem vacua sunt, nutritique avent, per easdem
ipsas ex hepate rursus trahatur. Siquidem totū
ex toto trahere, ac toti impartire, unaq; omniū
confluxio ac cōspiratio esse videtur. Quare mul-
tis eorum qui valentem exercitationem subito
ac prorsus intermiserunt, aut artuum aliquem
præciderunt, sanguinem per intestina certis pe-
riodis simul plurimū cernimus evacuari, sicuti
illac, etiā alios humores a natura in morbis ex-
pelli. Ac trahit quidem id quod est valentius: va-
cuatur aut id quod est imbecillius. Porro valen-
tior, imbecilliorq; altera quā altera particula est,
vel absoluto sermone, naturaq; et communiter

Vena dūstio-
tūto.

Arteria con-
stans.

Intestina sa-

la cōstant et

duabus tu-

nica, quæ rē

singula ex

transversis fi-

bris constan-

tur.

Abortus.

Partus.

Vteri offensa

triple

causa.

omnibus: vel privatim huic cuius talis effici-
tur. Et natura quidem, omnibusq; communiter
animalibus, cor q; jecur, & jecur q; intestina & ve-
ter, item arterie q; venę, tum quod utile est ad se-
se trahere, tū quod diversum ab hoc est, a se re-
pellere, magis valent. At privatim in unoquoq;
nostrum alio tēpore jecur valentiū trahere po-
test, alio ventriculus. Quippe ubi in ventriculo
copia alimenti est, ac jecur vehementer appetit,
omnino id valentiū trahit. Invicemq; jecinore
referto & distento, ventre verō appetente, ac va-
cuo, valentior habendi vis in hunc transfertur.
Estq; nonnunquā quo minus anima esuriat cau-
sa, nutrimenti abundantia in jecinore. Nam ven-
ter, si melius, paratiusq; nutrimentū habet, ex-
ternū non postulat. Sin aliquando postulat, neq;
ejus copia datur, excrementis biliosis, pituosis,
atq; serosis impletur: quę utiq; trahenti jecur illi
remittit. Siquidem ut particula altera ab altera
nutrimentū trahunt, sic altera in alteram, quod
supervacuum est, a se pellit. Estq; hæc vocatarū
fluxionum causa. Confluunt autem ac fugantur
superflua a fortioribus semper ad imbecilliores
particulas, donec ad omnium imbecillimas de-
ventum sit: a quibus postea in alias transfluere
nequeunt. Constat itaq; non esse unicum motus
modū, quo in corpore materię moveantur, quū
contrarias potentias, necessariō cōtrarij motus
sequantur. Eoq; venter, quod excrementorum
in eo fluitat, per vomitionem expurgat: quod
subsidet, alvi dejectione: etsi in morbo Ileo in
quo trāsitus omnino est præclusus, ob ipsius in-
testini phlegmonem, stercus etiā vomatur. Un-
de mirū non est, si a corporis superficie, insolito
frigore subitō, & stipata, & imbecillori reddita,
ad ipsa usq; intestina, & ventrē aliquid, transla-
tum pervenit. Ac tales quidē motus celerius ces-
sant. Qui autem ab internis partibus irritant, ij
& vehementiores fiunt, & diuturniores. At ve-
rō quum particula quęq; similiter ventri appe-
tat, utique & nutritur, & nutrimentum ample-
ctitur ad eundem, quo venter, modū. Cæterum
venter ipse non idcirco circa cibos se contrahit,
quō reliquis partibus eos reddat accommodos,
sed quod totū eius corpus, & attrahendę pprię
sibi qualitatē, & eadem fruendi, sicut antē mon-
stratū est, vim obtineat. Accidit verō interim, ut
eos alteret. Humore quorū ubi impletus satia-
tusq; est, pro onere eos de cætero habet, & deij-
cit, ipse scilicet ad aliud opus, nempe ut aggluti-
net, cōversus. At ab eo nutrimentū descendens,
quum per tota intestina tunc permeet, per vasa
quę ad ea pertinent, rapitur: plurimū quidem in
venas, exigua quædam portio in arterias. Quo
tempore tunicis etiam intestinorum apponitur.
Ac inibi omnem jam naturę circa nutrimentū
operam in tres temporū vices cogitatione par-
titus, in prima quidē simul & manere id in ven-
triculo, & cōcoqui, intellige: tum ventri ipsi ad
saturitatem apponi, aliquid verō ejus etiam ad
jecur ascendere. In secūda, transire ad intestina,
ijsq; ipsis & jecinori ad saturitatem apponi: tum
portionculam eius exiguā in omnem corporis
partem ferri. Porro hoc tempore, quod in pri-
mo est appositū, id ventriculo affigi intellige. In

tertia verō temporis portione, ventriculus qui
dem jam nutriri, iis quę affixerat planē assimila-
tis: affigi verō tam jecinori, q̄ intestinis, quę iis
fuerant apposita: præterea in omnes corporis
partes digestionem appositionemq; fieri. Quod
si rursus animal nutrimentū accipiat, quo tem-
pore id venter coquit, eoq; fruitur, quicquid uti-
le ex ipso est, tunicis suis apponens: eodem inte-
stina quidem eum quem sibi affixerant succum,
prorsus assimilabūt. Pari modo jecur. In toto ve-
rō corpore, partes nutrimenti quę fuere apposi-
tæ, affingentur. Sin aut venter manere sine cibo
cogatur, hoc tempore a venis quę in lactibus ac
jecinore sunt, nutrimentum trahet, non ex ipso
jecinoris corpore. Siquidem qui in quaq; parti-
cula jam contentus, agglutinatus, ac assimilatus
est succus, hūc alteram particulam revellere nō
est credibile. Iam verō lienem, quod in jecinore
crassius est, ad se trahere, conficereq; & ad uti-
lius mutare, a lienēq; etiam aliquid trahi in vici-
nas partes, compertū est. Sicuti & in ventriculū
alio tēpore lienem excrementū remittere: alio
rursus ex ventre aliquid propriū illius nutrimen-
ti ad se attrahere. Ergo, ut summam dicā, quod-
que ex quoque trahere, ac in unū quodque mit-
tere, diversis in temporibus potest: ut in arteriis,
corde, thorace, & pulmone videre licet: quibus
dilatatis vicissim, cōtractisq; necessum est a qui-
bus aliquid prius est attractum, in ea mox emit-
ti. Quare vasorum, quę in corde sunt, osculis,
membranas applicuit natura, quę retroferri ma-
terias prohiberent. Quanquā non possunt ita ad
unguem claudi illorum vasorum ora, ut ex eis
nihil recurrat retrō, præcipuē in arteriam veno-
sam. Est autem singulis arteriis vis quędam a cor-
de profecta, qua tum dilatantur, tum contrahū-
tur. Cæterum quę arteriæ ad cutim finiuntur,
externum aërem, quum dilatantur, attrahunt.
Quę verō parte aliqua ad venas se aperiunt,
quod tenuissimū, maximēque halituosum in iis
sanguinis est, ad se alliciūt. Sicuti a corde, quę illi
vicinæ sunt. Quippe in successione ad id quod
vacuatur, q̄ levissimū & tenuissimū est, prius ei
quod vacuatur succedit, quā id quod gravius &
crassius existit. Est aut omnium quę in corpore
sunt, levissimū, tenuissimūque, spiritus. Secun-
do loco halitus. Tertio gradu, qui planē absolu-
tus, attenuatusq; est sanguis. Hæc igitur arteriæ
ex omni parte ad se trahunt. At ex intestinis &
ventre, quę adeo crassum gravēq; in se nutrimē-
tū habent, nihil, de quo ratio ulla sit habenda, in
se possunt transferre arterię, quū prius implean-
tur levioribus. Sunt itaque duo tractionū gene-
ra, unum, quod successione ad id quod vacuatur
cōtingit: alterum, quod qualitatē fit convenien-
tia. Aliter nanq; aër in folles, aliter ferrum a ma-
gnete attrahitur: ac secundum prius quidem ge-
nus etiam eminus trahi aliquid potest: at secun-
dum posterius, cominus duntaxat. Præterea suc-
cessione ad id quod vacuatur, prius id trahitur
quod levius est: convenientia qualitatē, nōnun-
quam quod gravius. Transfertur autem sanguis
in arterias a venis ob reclusa ora, quę inter se ha-
bent alterū vas in alterū. Necnon ex dextro cor-
dis specu in sinistrū, quod tenuissimū sanguinis
est,

*Pamistolo-
gāda causa.*

*Ventriculū
per nutrime-
ti inopiā, im-
pleri excre-
mentis varijs.
Fluxionum
causa.
Fortiores par-
tes semper
ad imbecil-
iores excre-
menta propel-
lunt.*

*Ileo morbo
infestāte ster-
cus exomi.*

*Venter cur
circa cibos
contrahatur.*

*Tēpora tria
circa nutri-
menti conco-
ctionem, di-
stributio-
nemq;.*

*Ventrem, an
esurit, per
meseras can-
genas sibi
nutrimentum
trahere.
Succū semm
appositū au-
cui parts, in
revelli ab
vera.*

*Lien aliquā-
do mittit in
ventriculū
melancholici
cum succū.*

*Quodq; cau-
sa, quę trahit
re, et in quā
que mittit.*

*Membranas
vasorum con-
duci quorsum
facta.*

*Arteriis o-
mnibus quā-
quā in cor-
de a corde
qua dilata-
tur et cōtra-
hantur.*

*Arteriæ
quę dilatantur,
aërem
externum
attrahunt.*

*Arteriæ em-
genti attrahunt
substitu-
tem, per se
sanguinis.*

*Spiritus eff-
se somniū te-
nuissimum
quid.*

*Halitus pessi-
spiritum est
tenuissimum
Tractionum
duo genera.*

*Successio ad
id quod va-
cuatur quę
fiat.*

*Sanguinem
substitu-
a dextro cor-
dis sinu trās-
fluere in sinu
sinistru per me-
dū septum.*

est, etiam trahitur, id quod constat, cum ob foramina illa interpositi septi, quæ à lato ore magis magisque in angustius procedunt: tum vel maxime, quod cum in dextro cordis sinu duo ora sint, unum quo sanguis invehitur, alterum quo emittitur in pulmonem, longè majus est id quo infertur, quam id quod emittitur. Neque est quod dicat aliquis, absumptum esse sanguinis aliquid in ipsam substantiam cordis nutritionem. Siquidem alia vena est, quæ in id variè fissa dispergitur, quæque nec ortu à corde habet, nec sanguinem ab eo accipit. Manifestum igitur est, aliquam portionem illius sanguinis, qui invehitur in dextrum ventriculum, in sinistru sinu transmitti: cum etiã duorum numero quæ in sinistro cordis ventriculo sunt vasorum, longè minus id sit, quod à pulmone in eum ducit spiritum, quam arteria illa magna, quæ ex eo procedit, à qua reliquæ omnes, quæ sunt in corpore, oriuntur: ceu non spiritum modo à pulmone accipiat, sed etiam ex dextro sinu, per jam dictas communes vias, sanguinem. Porro carnes tum viscerum omnium, tum musculorum, ex sanguine exigua alterationem consecuto, nutriuntur. Ossa vero quod nutriantur, numerosa quæ intercedat mutatione egent. Estque qualis carnibus sanguis, talis ossibus medulla. Nam quibus similis est substantia, ijs mutari inter se fas est: quibus plurimum inter ipsa est discrimen, ea fieri similia citra omnes quæ in medio sunt mutationes, non possunt. Tale quiddam & cartilagini est musculum illud quod ei circumfunditur: necnon ligamentis, membranis, & nervis, lentus humor qui in mediis eorum spaciis inspersus cernitur. Iam vero quod ocysime aliquid digeratur per corpus (ut in plurimis eorum qui biberunt immodicè, atque id quod biberunt, intra breve tempus totum plus minus emingunt, videre licet) qualitatibus convenientia, humoris tenuitate, vasorum laxitate, atque adeo trahentis facultatis robore id accidit. Ita nihil miri est, vinum aqua, propter qualitatibus convenientiam, citius excipi à venis. Ipsorum vero vinorum, quod album est, & purum, tenuitatis gratia, promptè in corpus digeri. Sic uti è contrario nigrum & turbidum, crassitudinis vitio, per viam hære, & tardari.

GALENI PERGAMENI

de naturalium facultatum substantia, liber unus.



Uod quidem in nobis anima sit, nemo est qui nesciat: utpote cum norit, earum omnium functionum, quas corpore indies obimus, aliquam oportere esse causam. Quippe nihil fieri sine causa potest. At quænam ea sit causa, unde hæ functiones prodeant, non æquè est compertum. Varij enim vario modo opinantur. Ego autem, licet non sim is, qui velim mihi persuadere, me eorum certam habere notitiam, quorum certam demonstrationem non habeam, de ijs tamen in presentiarum non nihil disseram, inde nobis exordio sumpto. quod ego hæc firmiter me scire profiteor. Omnia nimirum corpora, quæ hic penes nos gignuntur, ex quatuor elementorum

per totum mistorum temperatura suum habere ortum. Quorum elementorum ipsa corporea substantia, an per se invicem permeent, ver solæ potius qualitates, ut id scire non duco esse operæ precium, sic nec pronuciare velim. Probabilius tamen mihi videtur, quod temperamentum id per qualitates fiat. Anima vero ipsa, an immortalis sit, quæ corporis immista substantiis, animantia gubernet, me nequaquam hoc certò scire affirmaverim: sicuti neque illud, an ullam ea peculiarem, & per se, substantiam possideat. Sed hoc mihi planè constat, quod quantumlibet anima in hæc commigret corpora: ipsorum tamen naturis ex elementorum temperie constantibus, obnoxia est. Oportet autem corpus ipsum, quod animam suscepturum est, paratum idoneumque esse. Nam si magnam subjerit illius temperamenti alterationem, cogitur inde anima exire: veluti etiam cum omnino respiratio intercipitur. At dum corpus ipsum naturalem servat suam constitutionem, nunquam fieri posse crediderim, ut ab illo anima secernatur. Et hac de causa, scire quænam sit animæ substantia, nec est ad morborum curationes necessarium, neque etiam ad ipsam philosophiam. Porro stirpes, internum aliquod motus initium, & aliquem præterea rerum sibi congruentium sensum habent, præditæ nimirum facultatibus illis quatuor, attractrice nempe, retentrice, alteratrice, & expultrice, quas naturales dicimus. Sensu autem & motu, qui ab interno & proprio impetu fit, animalia ipsis plantis præstant. Est enim stirpibus ea tantum cognitio tradita, quæ ex voluptate quadam, vel tristitia, aut alia quapiam istis simili affectione, aut saltem istis ex proportionem respondente, nascitur: cum nulla alia causa esse possit, cur ea quæ sibi competat, & attrahant, & conficiant, præter voluptatem, & fruitionem, quæ ab illis gignitur. Nam alterius cujuscumque cognitionis quæ ad sensus spectet, nequit esse particeps anima naturalis, utpote quæ visibiles qualitates, vel auditiles, vel gustatiles, vel olfactiles, vel tactiles nequaquam possit apprehendere: sed illas tantum, quæ his, quæ alere possunt, vel secus, insunt. Cæterum cum stirpes trahant, retineant, alterent, atque à se expellant, rectè mihi videtur Plato eas & sensu congruentium incongruentiumque præditas, & animalia etiam esse, dixisse.

GALENI PERGAMENI

an sanguis in arterijs natura contineatur, liber unus.



Um secta quacumque arteria sanguis inde effluere videatur, duorum alterum necesse est: aut illud in ipsis arteriis contineri, aut aliud in eas transfundi. Sed aliud de transfunditur, jam sane cuilibet constat, eas solum spiritum (cum secundum naturam haberent) continuisse. Quod si ita res esset, profectò esset opus, ut illato vulnere, ante sanguinem, exeuntem spiritum videremus: at non videmus, igitur neque prius solus ille continebatur. Itaque arteriæ nunquam visæ sunt solum spiritum continere. Etenim secto abdomine una cum peritoneo, in hædis qui nuper lactarunt, manifestè videlicet mesenterij arterias refertas lacte. Enim vero

Temperamentum fieri per qualitates, probabilius videtur Galeno.

Anima esse immortale, Galenus ambigit.

Animam commigret corpora sentire naturis corporum

Animam non posse secerni a corpore, quoad illud naturalis constitutione servat.

Stirpes habere congruentium sensum.

præditasque eas se quatuor facultatibus naturalibus

Animalia præstare plantis sensu & voluntario motu.

Anima naturalis quas qualitates apprehendere nequeat. Stirpes animalia appellavit Plato.

Arteria nuncquam solum spiritum continet.

Cor nutriti a vena quæ per eius superficiem dispergitur, non ab ea quæ dextrum ventriculum ingreditur.

Carnem nutriunt ex sanguine.

Medulla esse nutrimentum ossibus.

Cartilagine nutriti ex musculo quodam humore

Distributio humoris velax per corpus unde accidat.

Vinum aqua citius excipi a vena.

Vinum album purum promptè in corpus digeri, nigrum contra.

Nihil fieri sine causa posse.

Corpora nutriuntur ex miscella quatuor elementorum.

vero quæ in humanam veniunt cognitionem, omnia tum sensu, tum ratione deprehenduntur. Unde quemadmodum ex sensibilibus multa sunt, quæ plurimis de causis sensus effugiunt, ita etiam & rationem. Dubitant autem Erasistrati sectatores, quomodo, si sanguine repletæ sint ipsæ arteriæ, possit spiritus à corde in universum corpus deferri. Ad quos dicemus, non mitti spiritum sed attrahi: nec ex solo corde, sed undiq; Demonstratū quippe à nobis est, in libro de usu respirationis, aut nihil penitus, aut admodum parum substantiæ spiritus, in cor trāssumi. Universus siquidē expirari potest, ut diligentioribus tum philosophis, tum medicis visum est: qui nō ejus substantiam, sed qualitatem potius cordi esse ex usu autumant, utpote quod refrigerari appetat: atque hunc esse respirationis finē. At verò arteriæ ipsæ non eò dilatantur, quia implentur, sed ideo potius implentur, quia dilatantur. Cum enim in suis tunicis vires quasdam habeant, quibus se dilatant, ex unaquaq; sui parte, per extrema foramina, quicquid illis continens est, unde possunt, attrahunt. Poteris facilius intelligere exemplis, quæ sit differentia, quod aliquid repletum dilatetur, vel quod dilatatū repleatur. Utres quippe sacciq; dum implentur, dilatantur: fabrorū verò folles, dum dilatantur, implentur. At facultatis illius quæ arterias dilatat, cor veluti fontē esse, alibi à nobis est dictum. Et est hoc sanē magis naturæ congruens, ut sic opinemur, quam ut spiritū per eas, veluti per inanima quædam corpora, ferri arbitremur. Differt siquidem vivēs, à non vivente, non tam substantiæ cōplexu, quam quod sit facultatis particeps. Quod autem à corde ipso tunicis arteriarum facultas quædam qua dilatentur, nō autem materia per illarum cavitatem, mittatur, ex hoc cognosces manifestissimē, quod si aliquā conspicuam arteriā cute nudaveris, illiq; per longitudinem secte, fistulā aliquam imposueris, ita ut totum vulnus obstruatur, videbis illam pulsantē. Ubi verò circūducto laqueo, ipsius arteriæ tunicā circa calamū astringeris accuratē, non amplius ultra laqueū (quantumlibet tam sanguinis quam spiritus delatio per cavitatem fistulæ fieri possit) pulsantem videbis. Porro movetur arteria universa uno eodemq; tempore, nec altera ejus pars prius, altera verò posterius, sed quemadmodum simulac movere pedis digitū proposuerimus, quamvis nulla in ea parte ratiocinandi vis sita sit, confestum tamē facultate illi, in temporis momento distributa, monemus, ita etiā id ipsum fit in corde & arteriis. Motus enim celeritas, ut facultatibus attestatur, materis adversatur.

GALENI PERGAMENI de motu musculorum, liber I.



Musculi sunt instrumenta voluntarij motus. Musculos numerari non posse.

plici sunt figura, & in dissimiles inferuntur partes, modum motus difficulter comprehensibilem habent. Cæterum omnis musculus tendove transversim atq; insigniter sectus, aut phlegmone, aut scirrho, aut putrefactione, aut contusione, aut duritie cicatricis affectus, nocet quidē omnino quibusdam morib. particulæ, in quam inferitur. Tendonū porro natura, mista mediāq; est, inter ligamentū & nervum. Etenim ligamentum ipsum, corpus nervosum est, ex osse omnino ortum habens, insertum autem in os, aut in musculū. Nervus autem & τὸν ex cerebro aut spinali medulla oriuntur: quorū substantia est veluti duriusculū factum cerebrū, qualem esse spinalem medullam constat. Sed ipsius etiam cerebri pars posterior, durior est anteriori: & quicunq; nervorū molliores sunt, hi nihil à spinali medulla tibi videbuntur differre. At aliorum ossium medulla, humida & fluxilis est, pinguediniq; persimilis: quare ex ea oriri nullum nervū videbis: neque est ipsi involucrum ullum, nec arteria, aut venæ cōplexus, nec ulla prorsus communicatio cum musculis. Porro à cerebro aut spinali medulla musculi omnes necesse est ut nervū accipiant, qui visu quidem parvus, sed virtute magnus existit. Cognosces autem id ex passionibus. Nam incisus, oppressus, contusus, laqueo interceptus, scirrhis affectus, & putrefactus, aufert musculo omnem motū & sensum. Quin & nervo inflammato, non pauci spasmo correpti sunt, & mente alienati: quorū quidam sic affecti, cum sapientiore medicum nacti essent, qui nervum illis abscinderet, statim spasmo, & mentis alienatione sunt liberati: sed postea musculum, in quem nervus insertus erat, insensilem atque inutilem ad motum habuerunt: tanta vis nervis à superno principio affluit. Non enim ex seipsis eam, neque connatam habent. Id autem hinc facile cognoscere poteris. Nam si aliquem nervū, aut ipsam spinalem medullam incideris, quantum superius est incisione, continuum cerebro, id quidem adhuc conservabit principij vires. Omne autem quod inferius est, neque sensum neque motum ulli præbere poterit. Nervi itaq; rivorum instar, à cerebro, ceu à quodam fonte, deducunt musculis suas facultates. Quos quum primum attigerint, scinduntur multipliciter in aliam subinde atq; aliam sectionem: tandemq; in tenues toti & membraneas fibras soluti, totum sic musculi corpus texunt. Ligamenta verò, per quæ ossibus musculi colligantur, coalescuntq; membranas circa ipsos gignūt, & quasdam intrò propagines in ipsam carnem musculorū demittunt: quam veluti quendam locum intellige multis rivis irriguum, uno quidem prædicto nervo, duobus verò aliis, altero sanguinis calidi & tenuis & vaporosi, altero frigidioris atque crassioris. Vocatur autem ipso- rum alter, arteria: alter, vena. Isti igitur principum à corde & hepate habētes, corpus musculorum irrigant. Quorum gratia fit ipse musculus, veluti quædam planta. At propter sensum & voluntarium motum, quibus animal à nō animali differt, & quos musculus ab ipso suscipit nervo, factus est animale instrumentum, sicuti propter

Tendonū natura media inter ligamentum & nervum.

Ligamentū quid. Nervus. τὸν. Spinalis medulla.

Medulla ossium.

Nervi omnes aut à cerebro, aut à spinali medulla oriuntur.

Nervi affectū musculi actionem & sentire, corrumpere.

Nervi influunt vim à superno principio.

Nervo aut spinali medulla transversim incisione, quæ inferius est, sunt partes destituti motu simul & sensu.

Nervos à cerebro deferunt musculi suas facultates. Ligamenta aut gignūt membranas circa musculos. Musculorū caro qualis.

Arteria.

Vena.

Musculus veluti quædam planta.

Musculus animale instrumentum.

art.

Motus naturales qui. arteriam & venam; naturale. Etenim motus qui ex arteria & vena procedunt, sunt naturales, & voluntatis expertes: qui autem à musculis, & animalibus, & voluntariis. Est autem musculus, instrumentum non sensus, sed motus, etiam si utriusque sit particeps: quia nullus motus voluntarius potest sine musculis fieri: at sensus inest universis particulis, quaecumque nervi participes sunt. Iam tendo tanto durior est nervo, quanto ligamento mollior: quin & mole corporis talis, ut qui ex ambobus maximè factus sit. Et ligamentum quidem omne insensibile: nervus autem omnis sensu præditus: tendo verò, neque insensibilis, quia est nervi particeps: neque ita sensibilis ut nervus: non enim est nervus tantum, Quatenus igitur ligamenti naturæ est particeps, eatenus hebetatur in eo acrimonia sensus. Cum namque ex fine musculi oriatur, multo major nervo qui descendit in musculum, liquet utique non ex nervo tantum ipsum constatum esse, verum etiam aliquid momentaneum ex natura ligamentorum sumpsisse. Multis quippe locis sexcupla, multis etiam decupla crassitudine nervum superat. Et merito sanè tantus & talis est factus, ut qui & nervi, & ligamenti usum exhibiturus erat. Alligat enim musculum subjectis ossibus, in quorum capita munita cartilagine inferitur: & hac quidem ratione nihil differt à ligamento. Sentim autem, atque movetur, qua ratione nervi est particeps. At nervus ipse via quadam existens facultatis motricis, à cerebro descendens, ut eam communem faciat, extensus est, atque ligamento commixtus. Tendo itaque sic ex utrisque conflatur. Omnis igitur tendo, in os omnino inferitur: non tamen omnis musculus desinit in tendonem. In nullo enim musculorum moventium linguam (constat enim ex variis musculis) tendo nascitur. Nullum siquidem os erat lingua motura, sed editura vocem articulata, & sapores dijudicata, & masticationi atque deglutationi adiumento futura. Iam cor plurimum à musculo differt, & crassitudine, & formatione, & contextu, & duritie, sicuti & etiam operibus. Perpetuo quippe movetur cor, tum systole, tum diastole, idque citra voluntatis imperium. At musculus nec similes motus sunt, nec sine voluntate fieri unquam possent. At labra oris, ex cute musculoque concreta, absque ossibus moventur. Similiter oculi, motum habent voluntarium à musculis: nullum autem os cum eis movetur. Præterea & cutis quæ in fronte & superciliis est, tum plurimæ partes faciei, ossibus quiescentibus, motu voluntario moventur. Quod si stomachus ipse, vel œsophagus, musculus etiam est, erit utique musculus neque in tendonem desinens, neque os secum movens. At qui in cervice vesicæ suscipiens urinam, & qui in sede etiam est, quique in testes & penem descendunt musculi, nullum profecto secum os movent: quare à prædictis musculis nullus prorsus nascitur tendo. Cæteri omnes musculi, quicumque ossa movent, in tendones omnino desinunt. Qui verò aliud quippiam movent, quam os, ut musculi oculorum, linguæ, testium, penis, pharyngis, atque laryngis, horum quibusdam sunt tendones, quibusdam minimè. Musculi igitur oculorum, membranis quibusdam, sed validis aponeurosibus, in duram &

nervosam tunicam adjacentem ragoidi, perveniunt. Penis autem & testium, nulla aponeurosi facta, carneis ipsorum particulis innascuntur. Musculorum qui in pharynge & larynge sunt, quibusdam obscuræ quædam aponeuroses, quibusdam omnino non sunt. Motionis autem modus alibi alius existit. In lingua quidem motum omnem videre possis: sursum enim atque deorsum, ante & retrò, sinistrorsum & dextrorsum circumferri videtur: partim etiam quasi reflexa & propensa, nonnunquam circulariter undique circumducta. Sed in oculis quatuor quidem sunt recti motus: sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum: duo autem alii circulares. Duo etiam musculorum circa tempora: firmantibus enim dentes, invicem tenduntur, atque curvantur: hiantibus verò, laxantur & porriguntur. Ad hæc, in magna illa brachij motione, dum musculus flectit cubitum, curvatur planè & in seipsum coit: dum extendit illud, laxatur & exporrigitur. Eisdem motus & musculus magnus interna parte cubiti apparentes habet: contrahitur quidem in flectendis digitis, laxatur & exporrigitur, dum illi extenduntur. Sic etiam & alij musculi penè omnes qui in artubus sunt, duplices motus videbuntur habere, si eos denudaveris cute. Sedis musculus proprium motum, quoniam & figuram diversam, possedit, contractis crumenis similem. Cæterum septum transversum simile est tali cuiuspiam rei, nisi quod non perforatum est. Accidit autem abdominis musculis, diversum ab ijs qui in artubus & facie locantur: hi enim cum tenduntur & ad principium retrahuntur, curvantur: illi autem dum tenduntur, exporriguntur: curvantur verò, dum laxantur. Porro musculorum qui in cruribus, manibus, atque temporibus sunt, nullus habet tertium alium motum diversum ab extensione & contractione. Quare illi omnes hallucinantur, qui uniuscuiusque musculi multos esse motus affirmant, ignorantes aliam ab alio musculo gigni motionem. Uterque enim oculus, quatuor rectos obtinet motus, quia & rectos musculos quatuor. Habet etiam duas circulares motiones, quia duos circumvertentes musculos. Ergo ut actio una, sic illorum musculorum singulis, natura unicus motus inest, alius verò per accides. Siquidem operatur quisque, trahens ad seipsum particulam quæ movetur: non operatur autem cum in contrarium locum ab alio musculo simul cum mota particula abducitur. Ideoque omnis pars quæ movetur, non uno, sed variis utitur musculis, à quibus, veluti à validis in contrarium distracta habentis, vicissim habet alterum ipsorum, nempe qui trahit, intentum, alterum qui trahitur, laxatum. Iam verò si totos musculos atque tendones per transversum abscindas, penitus dissolves motum subjectarum particularum. Sin autem incideris solum, utique tantum lædes, quantum incidisti. Quod si unusquisque musculorum contrariorum pereat, motio simul peribit. Necesse namque est, motuum qui sibi invicem succedunt, altero pereunte, & reliquum simul perire. Nam si is motus pereat, qui particulam est natus extendere, flectetur quidem primum, manebit autem in hoc statu semper quod non amplius extendi possit, motu extensorio privata. Quia enim extendi non amplius potest,

Lingua motus.

Oculorum motus.

Temporum musculi.

Brachij musculus.

Cubiti musculus.

Sedis musculus.

Septum transversum.

Abdominis musculi.

Crurum musculi.

Oculorum utrumque habere quatuor motus rectos, quia totidem musculos similiter rectos.

Musculorum singulis, ut una actio sic unum esse natura motum tributum.

Motuum qui sibi succedunt in vicem necessarium est uno pereunte, perire alterum.

re, idcirco nec flecti quidem. Similiter si motu, qui natus est particulam flectere, exolvi accadat, extendetur quidem primu, sed immobilis in posterum fiet, quoniam non amplius ad flexionem venire possit, qua precedente extensio sequitur. Itaque; abscisso eo qui intus est musculo, extensa pars in hac figura perseverabit: eo autem qui foris, flexa non extendetur amplius. Quod si tuis illam extendas manibus, statim in pristinum statum redibit. Quippe flexio ab internis, extensio ab extrinsecis editur, tum musculis, tum tendonibus. Ad haec, si principium supernum musculi transuersim abscideris, totus ad caudam feretur. Si finem inferiorem, retrahetur ad caput. Si utrinque; abscideris, eum concurrentem ad medium inter ipsos fines videbis: adeo omnis particula musculi cognatum habet motu in se, ipsam scilicet coitione. At vero, scirrhus genito in interno, aut tedone, aut musculo, pars flexa non amplius extenditur: in externo vero, extensa non amplius flectitur: contrario modo quam in vulneribus se habebat. Quae autem in scirrhis, eadem in phlegmone, & in cicatricum duritie fieri, cernuntur. Ergo tendi quidem sursum, & demitti manum, articuli qui in humero est, & musculorum ipsum moventium: extendi autem & flecti, brachij ad ulnam: at volvi ad pronum, & ad supinum, brachij ad radium est actio. Quae vero manus tangit spinam, ea actio a quatuor articulis simul motis fit. In universum autem, unusquisque; dum tenditur musculus, trahit ad seipsum partem in qua inseritur. Qui enim in caput brachij inseruntur, sursum tendunt ipsum. Cubiti vero os extendit qui in cubito sunt, foris in ipsum *ἀγώνια* finientes. Radium ad pronu qui intus in cubito sunt, in ipsum extrinsecus terminantes. Porro quisque; digitus ab internis tendonibus flectitur. Ceterum neque; omnis motus manuum, actione fit musculorum: neque; omnis immobilitas quiete. Nam cum duo motus sint sibi invicem proximi, sed qui dissimiliter fiunt, reclinatio scilicet ac decidentia, reclinatio quidem actione musculorum, atque; ob id voluntarie, perficitur: decidentia praeter voluntatem accidit, nec musculo agente, sed potius quiescente indiget. Hae enim ratione, decidere & declinare differunt: eademque, & deorsum ferri manum, atque; demitti. Deorsum enim fertur cessantibus omnibus musculis qui in ea sunt, & corporibus ab innata gravitate deorsum tractis. Demittitur autem, musculis qui sub ala sunt, ad seipsos trahentibus brachium. Tertius itaque; hic decidentiae motus inventus est musculorum, praeter duos illos jam dictos: quo quidem etiam si nec extendatur, nec contrahatur aliquis musculus, ad totius tamen membri motu movetur, perinde ut ossa, aut aliquod inanime corpus. Ex ipsis autem veris musculi motibus, contractio quidem est tanquam instrumenti animae actio: extensio autem tanquam instrumenti quidem, non tamen actio, sed simpliciter motus. Est & quartum genus motionis, quo quidem agunt valenter musculi, quamvis haud moveri videantur: ut si manum sursum tensam esse fingamus, & in ea diu figura servari: quia namque; tunc musculi agunt, ideo eos moveri dicimus. Quatuor

gitur omnino differentiae motuum reperiuntur in musculis. Nam aut contrahuntur, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Est autem eiusdem generis quarta differentia cum prima: ambae enim actiones musculi sunt. Porro qui musculorum corpus sic constitutu ajunt, ut suapte natura contrahi & flecti possit, sine adminiculo animalis potentiae, hi quidem minime probabilia pronunciant. Nam si uterque; musculus, quod secundum illos natus est facere, id semper ageret, nihil certe prohiberet, perpetuo corpus obnoxium esse tetano affectui, qui tum sane fit, dum invitae partes in contraria retrahuntur ab oppositis musculis. In exactam itaque; & perfectam flexionem nunquam corpus musculi ex seipso pervenire poterit, nisi a facultate animali adjutu: licet magis propriu sit corpori ipsius musculi contrahi, quam extendi. Jam vero cum ossa invicem coeant, ut aliquis articulus fiat, alteru quidem ipsorum est quod movetur, alterum veluti sedes quaedam ei quod movetur est subfirmatum, quomodo cernis cardines ostiorum se habere. Quare necessario manenti quidem, cavitas ei vero quod movetur, convexitas adest. Vocatur autem cavitas glene & cotyle: sicuti convexitas, caput, condylusque. Verum tantu cotyle quam glene est profundior, quantum caput condylo est longius. Cum vero hoc modo bene se haberent quae movenda erant, multo adhuc aptius artificiosiusque; natura conjunxit eis, quae motura erant. Nam musculos quidem instrumenta motu produxit ex superjacentibus ossibus, in quibus sunt cotyle. Inseruit autem in capita subjacentiu, quae erant movenda: & per haec extenta, capitibus sursum tractis, simul cum eis totum membru sursum trahitur. Cum autem alter ipsorum majus, alter vero minus eos esset moturus, magnitudinem musculorum qui moturi erant, creavit proportionem parem moli movendoru ossium. Quare alij quidem jure ex ipsis capitibus aut condylis superjacentium ossium sunt exorti: alij vero paulo his inferius juxta cotylem aut glenam, sed non multu. Parvi siquidem hoc pacto penitus fuissent, nec potuissent movere subjectu os. Ergo nullus musculorum dictoru, extremam flexione, aut summa extensionem partis efficere poterit, absque; animali impetu: quo quidem si priventur musculi, media videbis figura ossium inter se mutuo fieri. Quod si extremu incideris musculum, flecti membru ultra mediam figura videbis. Pari modo si musculu internu incidas, extendi particulam plus medio videbis. Itaque; prevalente musculo externo, extensionem: interno autem, flexionem fieri contingit. Quare aequipollens ipsius corporis musculorum fit motus, quando neuter tonum animale habet auxiliarem; non aequipollens vero, cum alter solus dominatur: ac proinde necessum est vincat contractio illius musculi, qui ab animali facultate adjuvatur. Porro musculi, quantum ad structuram quidem ipsorum pertinet, perfecte contrahi possunt: ob ligamentum autem in caput ossis insertum, prohibentur quo minus extreme contrahantur, cogunturque; mediam servare figuram, nisi forte ab animali facultate moveantur. Ex dictis igitur constat, abscisso musculo

Motu quatuor differentia in musculis.

Tetanus quando fiat.

Musculu abscis- que facultate animali posse exquisire contrahi. Ossium motionis ratio.

Glene, cotyle Condylus.

Musculoru insertionis ratio.

Media figura in motione artuum quando servetur.

Extensio quomusculo fiat: Flexio interno sit muscululo.

Flexio ab internis, extensio ab externis fit in musculis, tum tendonibus. Musculus transuersim sectus, in qua reuelletur partem.

Musculus omnis dum tenditur, trahit ad seipsum partem in qua inseritur.

Reclinatio qui fiat. Decidentia fit praeter voluntatem. Delatio manus atque; deorsum lapsus quomodo differant.

Contractio. Extensio.

Motionis quartum genus.

musculo externo, ultra quidem mediā figuram subito inflecti membrum, non tamen ad extremam: quandoquidem externus musculus non potest penitus extendere ipsum, absque animali impetu. His subscribunt quæ ab Hippocrate de figuris sunt tradita. Primum quidem, quod flectentes penitus, aut extendentes quācūq; partem, dolemus. Secundum, quod mediā istarum figurā, minimū dolorem affert. Tertiumq; mutationē celerem in extremis figuris appetimus. Quartū, quod diutissimē mediā figurā servamus, nullā mutationē cupientes. Quintū quod hanc quōq; mutare aliquādo desideramus. Sextum, quod omnis figurā molesta, est summē imbecillis. Nam figurarū excessus, meritō dolorem afferunt: nempe quum alter musculorum agat, alter extendatur præter naturā. Media verō istorum figurā & ab actione & à nimia tensione utroq; inhibens, meritō jucundissima est. Quare & mutationem figurarum quidem quæ dolorificæ sunt, celerem optamus: ejus verō quæ dolorē caret, tardam: quippe & ipsam mutare aliquādo desideramus, quia in ea etiam tensionē quandā muscoli sustinent, minorē tamen quā in omnibus aliis. Eam autem dolore carere dicimus, non quod nullius penitus doloris sit particeps, sed q; minimi, & ejus fermē insensibilis, propter paucitatē. Atq; ipsam mutari tum cupimus, quum cōgregatus paulatim, sensibilis redditur. Dum enim summē imbecilli fuerimus, ut in stomachicis & cardiacis syncopis, tūc nec brevem quidem tensionem ferim⁹, nec mediā toleram⁹ figurā: quo fit, ut quāvis impotētes simus ad motus, tamen alias aliō jactemur mēbra, aliquā quidē cōsequi figurā dolore carentē optantes, sed nihil tale prius invenire potentes. Igitur omnes muscoli, ex se quidem in extremā contractionem festinant, sed non possunt hanc consequi, quod oppositos in contraria trahentes habeant, & cum illis gravitatem ossium annexam.

GALENI PERGAMENI
de motu musculorum, liber
secundus:

Porro in mediā figurā, quæ in partibus cernitur, necesse est duplicem constitutionē inesse musculis: alterā, qua neuter oppositorum musculorum agit, sed ambo quiescunt: alteram, in qua similiter utriq; agunt: quæ actio tonica nominatur. Sic autē et si prope mediā figuram utriq; constitueris membrū, æquē utriq; musculis agere poteris. Quum autem ad aliquā superantium figurarū duxeris ipsum, alteri muscoli satis esse possunt actioni ejusmodi. Quare mediā figurā cum tali actione, neutra superantiū inferior est: unde nec ipsam simpliciter carere dolore dicamus, sed eam quæ in quiete sit. Mediā nanq; figurā cum intensione utrorūq; musculorū, æquē ac extremā, dolorem affert. Quum verō in ipsa quiete mediā figurā partim simpliciter est, partim nō simpliciter: simpliciter quidem mediā omnium mēbri superantiū figurarū: nō simpliciter autē, quæ alteri⁹ oppositionis solius est: quæ quidem simpliciter mediā est, ea sine fatigatione duntaxat fuerit: de nulla tamē aliarū

exactē id dici possit. Hujus autem sermonis in manu constituamus exemplum. Etenim quum in ipsa extremā figurā sint quatuor, prona, supina, summa extensio & flexio summa: atq; figurā quidem supina manus sit, quum ejus concava pars, sursum est, convexa autem deorsum: prona verō huic cōtraria: sicuti mediā ambam, quum intrinsecus quidem sit concava, extrinsecus autem convexum: ac subjectus quidem est parvus digitus cæteris: os verō cubiti, ossi radij: quæ figurā mediā, potest quidem extensa perfectē manu, potest etiam flexa constare: quemadmodum & alterius oppositionis mediā figurā constare potest, quum supina est manus. & quum etiam est prona: certē quæ quidem simpliciter mediā figurā est, omnium istarum est mediā. Quæ autem non simpliciter mediā, unus est mediā utriusvis oppositionū. Alia enim extensionis atque flexionis extremā, alia supina & prona, mediā figurā existit. Mediā itaq; simpliciter ex cōcursu ambarum dictarum mediā figurarū conflatur. Alia verō mediā quatuor quidem erunt universæ, sed nulla ipsarum simpliciter mediā totius mēbri erit, sed unius tantū oppositionis. Aut enim extensionis & cōtractionis solū erit mediā, aut supina & prona. At quæ utraq; ipsarū sit duplex, juncta vicissim excessibus reliquæ oppositionis, sic necesse est quatuor omnino fiant. In singulis autem ipsarum, aliud quidem commune est omnium, aliud verō proprium cujusq;. Commune quidem, quod omnino unum aliquod genus musculorum agit: reliquæ verō tria tenduntur quidē per accidens, non autem agunt. Propriū verō cujusq; angularis quidem & prona est, ut agat ij quidem muscoli, qui intus cōvertunt os radij, alij autem omnes quiescentes tendantur. Cæterum angularis quidē, sed supina, est propriū, ut qui extra circūducunt, agant, reliqui verō quiescentes tendantur. Eodem autē modo & in mediā inter pronam & supinam, ut cum summa quidem extensione soli extendentes agant, est propriū: cum flexione verō soli flectentes, quum cæteri omnes ociosi quidem sint, sed tendantur. Rem autem accuratius examinemus in hunc modum. Brachium est pars totius manus maxima: cujus terminantur sunt articuli duō, quorū alter in flexura brachij, alter in humero cernitur: estq; illi unicū os rotundum & magnum. Altera pars totius manus, quam ulnam dicimus, brachio quidem jungitur per cubiti articulum: carpo autem, per ipsum. Cōstatq; ulna ipsa duobus ossibus: uno quidem, quod etiam dicitur ulna: altero verō, quod radius. Inarticulantur autem ambo ad brachij inferiorem oram: ulna quidem ubi mediū locus condylorum brachij est: radius verō externum brachij ipsius cōdylum amplectitur, in glenem definens, atq; circum ipsum veluti axem quendam, manus cōversiones regit: quare intro quidem dum circumagitur, prona figurā manus: extra verō, supina sequitur. Extendere autem & flectere manum, de articulationis cubiti ad brachium est actio. Brachij enim ora inferior dilatata, nodis circūscribitur. Ulna verō, pectus duos flexos faciens sibi invicem oppositos, me-

diamq; ipsorum cavitatem figura Σ literæ similem efficiens, hac cavitate amplectitur medium locum condylorum brachij. Quum igitur concavitas ulnæ circumfertur circa concavitatē brachij, extendi atq; flecti accidit toti membro. Ut autem in neutra partem inclinet, supercilia mediæ cavitatis, causæ sunt, coarctantes ulnæ apophyses. Quum igitur anterior apophysis, motus dux est, flectitur membrum: extenditur autem, quum posterior. Terminus verò, flexionis quidem, ut anteriorem apophysin affirmet ad os brachij: extensionis verò, ut posteriorem. Duo autem musculi in partibus anterioribus brachij, ac totidē in posterioribus orti sunt, validis ligamentis ulnæ inserti. Incipiunt enim majores eorum à capite brachij: minores multò inferius: ferunturq; omnes quatuor recta ad ulnam: & inseruntur in hunc maximè locum, unde oriri incipiunt coronæ. Ab his igitur musculis ulnam attrahentibus, extensio, & flexio fit.

Extensio, flexioq; brachij, à quibus musculis fiat.

Quatuor autem alij, principia quidem habent ab ulna, ex utraq; parte flexuræ, quæ in gibbero est: duo quidem extrinsecus, duo verò intrinsecus. Omnes tamen quum sint obliqui, ossi radij inferuntur: ad finem quidem ipsius inferiorem magni: in medio verò, parvi: qui etiam ipsi dum tenduntur, ad principia simul attrahunt radiū, & per hunc totam manum, pronam quidem interni: supinam externi efficiunt. Ex prædictis igitur facile demonstrare licebit, in quatuor differentiis figurarum non simpliciter mediarum, unum quidem genus musculorum semper agere: omne autem aliud quiescere quidē ab actione, verum extendi: ut in angulari simul & pronæ figura, in qua musculi quidem interiores moventes radium operantur, exteriores autem otiosi extenduntur. Similiter & ulnæ musculi, & alij omnes in figura ea invertuntur, quantum tota manus discedit à figura secundū naturā. Nec secus in figuris aliis non simpliciter mediis existimandum. Ergo media simpliciter figura, præterquam quod nullum musculum habet, nec agentem, nec qui violenter moveatur, ne aliquid quidem eorū quæ in membris sunt distorquet: quare sola prorsus caret dolore. Cæteræ verò omnes, aliæ magis, aliæ minus inversos habent musculos omnes, & tendones, & nervos, & præterea etiam arterias & venas, ac proinde dolorificæ sunt. In singulis autem ipsarum, quantum discedens ab extrema constitutione ducis membrum ad mediam, tanto minus dolorificam efficies figuram. Sola itaq; figura simpliciter media, musculos omnes perfectè quiescentes exhibet. Jam verò ex dormientibus ij tantum musculos omnes perfectè quiescentes habent, qui ob ebrietatem, aut defatigationem, aut virium infirmitatem, omnes corporis partes omnino exolutas habentes, in mediam eas figuram reducere, ipsis musculis permiserunt. Non tamen in extremis figuris ullam particulam quivis potest habere, dum dormit. Quæcunq; autē in medio sunt inter extremas, & mediam figuram, in his ut plurimum, somnum capimus. In quacunque enim talium constituens membrum, musculis circa ipsum tonicè agentibus * commi-

Figura exquisita media, sola prorsus caret dolore.

Somnus in quibus capitur figuræ.

seris ipsius figuræ conservationem, adeò illam tuentur, ut sedētes quidā dormiverint, & deambulantes nonnulli. Id quod mihi olim contigit, quifermè stadium integrum dormiendo peregi. Sunt qui parvum aliquod corpus flexis digitis etiam dormientes servant, nec citra tonicam actionem vehementem. Ad hæc, inferior maxilla, nō discedit à superiori, nisi aut ebrius, aut valde ignavus, aut defessus sit is qui dormiat. Et ipse quoque stertor, propter hæc fieri assolet, relaxata quidem inferiore maxilla, supino autem jacente homine. Itaq; & supinum jacere, & hiarē * cum stertore, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignaviæ sunt signa. Ob idq; Hippocrates utrunq; damnat: decubitus autem in alterum latus commendat: sicuti & mediocrem hiatum. Extremæ igitur inferioris maxillæ figuræ sunt, tum quæ maximè hiantibus, tum quæ dentes invicem firmanibus fit: quarum illa quidem à musculis qui in mento & collo sunt, deorsum trahentibus: hæc autem ab ijs qui intra maxillam ex palato oriuntur, & eis qui temporales vocantur, perficitur. Verum mediocriter hianto, media figura fit omnibus dictis musculis quiescentibus: ad quam morientibus maxilla inferior sponte sua meritò accedit: omnes enim tunc muscoli sua actione privantur. Porro meatuum excretoriorū finibus, ceu portis quibusdam, custodes præfunt prævalidi musculi, qui ne in dormientibus quidem permittit quicquam excerni, priusquam ratio jusserit. Contingit autem invitis nobis aliquod excrementum excerni, aut resolutis his musculis, aut ratione depravata, ut in phreneticis: aut etiam ratione & musculis gravatis, ut in ebrietatibus. Temeraria igitur sententia est, quæ asserit dormientium animam quiescere: quandoquidem cessatio illa non quies perfecta, sed intermissio vigoris existit. Non enim sensus expertes penitus sunt dormientes, sed difficulter sentientes: ac proinde actiones quæ in illis fiunt, non omnes sunt naturales, sed ex eis multæ animales existunt, quum nimirum variè transferant membra, necnō dormientes loquantur. Ac respiratio ipsa, actio existens phrenōn & musculorum thoracis, motu etiam fit voluntario, estq; animæ, non naturæ opus, nempe judicio subdita: quippe movere musculos, animæ officiū est. Etenim si quæ fiunt, sedare potes quū vis, & quæ nō fiunt, facere, idq; citius aut tardius, crebrius & rarius, hic motus est volūtarius. At motus arteriæ & cordis, quandoquidem non subicitur nostræ voluntatis imperio, non animæ, sed esse opus naturæ dicitur. Respirationi itaq; etiam inter dormiendum dominatur voluntas, etiamsi id non assequamur mente. Siquidem neq; palpebrarum motui, neq; aliis multis actionibus animalibus animū adhibemus semper dum vigilamus. Quare quam causam in vigilantibus dixeris, quod sæpè non animadvertant particulares actiones: hanc etiā & ad dormiētes & gravius oppressos transferre licet. Multos enim homines interdum actiones quasdam egisse constat, quarū paulò post penitus sunt oblitī, quod intēti actionibus tota mente non fuerint. Pars quippe animæ imaginatrix, quæ

Dormiēs Gal. integrum stadium absēsit.

Stertor quomodo accidat.

Decubitus supinus damnat.

Decubitus in alterū latus commendat.

Maxilla inferioris figura extrema, à quibus musculis fiat.

Maxilla figura media morientibus accedit.

Musculi excretoriorū rationem dant.

Dormientes non esse omnino sensus expertes.

Respiratio est voluntarius motus, opusq; animæ.

Motus solutarius qui fit.

Motus arteriæ & cordis est naturalis.

Imaginatrix vim recedat.

*Memoria te-
nere, quid.
Oportet, quid.*

*Respiratio-
ne cohibita,
servum quē-
dam sibi mor-
tem conscis-
sisse.
Voluntaria
opera dupli-
cia.*

*Tacuisse nō-
nullos annū
integrum.
Respiratio-
nis necessi-
tas.*

*Naturam cō-
suetudinem-
que conside-
rans, inveni-
et mediam fi-
guram dolo-
re carentem.*

*Doloris exper-
tes figura.*

*Spina figura
media nō est
recta.*

quæ etiā & recordari videtur, si insignes impres-
siones rerum imaginatione cōceperit, cōservat
perpetuò eas: atq; id quidem est memoria tene-
re. Sin verò obscuras & penitus superficiarias,
non cōservat: & hoc est oblivisci. Ob idq; in ve-
hementibus animi affectibus, nullius eorū quæ
egerint, in posterum meminerunt. Quid igitur
miri est, in somnis obscure agente anima, obscu-
ras etiā imaginationes fieri, ideoq; neq; stabiles,
quū id etiā in vigiliis contingat? Quod autem
totum opus respirationis voluntariè & spontè
ab ipsa anima fiat, declaravit quidē id barbarus
ille servus, qui cohibita respiratione mortem si-
bi conscivit. Cæterum voluntariorum operum,
alia quidē libera esse, alia verò affectibus corpo-
ris inservire videntur. Priora itaq; ut ire ad ali-
quem, & alloqui (verbi gratia) perpetuò à nobis
& absque obstaculo fiunt: quare absolute sunt li-
bera. Posteriora verò, ut egerere, mingereq; nō
perpetuò, sed in tempore quodā & cum mensu-
ra: suntq; corporis affectuū remedia. Atqui nō
nulli tacuerunt quidem ultrò annū integrum:
egestionem verò vel urinam retinere non mo-
dò annis, sed nec diebus quidē paucis nemo po-
tuit. Simile igitur & his est spirationis opus: imò
multo magis urget, acceleriorem necessitatem
habet. Etenim periculum est, ne quis moriatur,
nisi respiraverit. Quare non est quod quispiam
existimet, naturale esse opus respirationē, quod
usquequaq; retinere ipsam citra discrimen vitæ
nō liceat. Sed jam quod deest sermoni de mediis
figuris, deinceps absolvamus. Ut enim in mani-
bus angularis figura, omnis prorsus doloris est
expers: sic in cruribus illa dolore caret, quæ cōfi-
sit inter mediā figuram, & extensionē extremā.
Causa aut cōsuetudo est. Plurimū enim extensis
cruribus utimur: multoq; magis laboramus in
extremis flexionibus, q̄ extensionibus. Tantum
igitur à media figura ad extensionem progres-
sum est, quod perfectè caret dolore, quantum à
diuturna cōsuetudine membrorū est coactum.
Hæc igitur duo cōsiderās in articulis universis,
naturam videlicet & consuetudinem, invenies
medium & dolore carens. Videtur autem in idē
conspirare ubiq; consuetudo cum natura: figu-
ra verò dolore carens cū medio. Etenim in cru-
ribus idem est quod dolore caret, & medium. In
universum igitur in omnibus articulis extre-
mos motus cōsiderans, invenies medium, & fi-
guram doloris expertem. Ut enim in articulo ad
gibberum, quod vocatur angulare: in articulo
verò ad genu, quod propius est extensioni: sic in
spina quod propius est flexioni, in articulo verò
ad carpum, quod exquisitè rectum est, doloris
expers existit. Etenim non ut carpi, sic etiā spi-
næ rectum ipsum est medium, sed aliquantum
curvū. Quapropter recti magis laboramus par-
ticulis spinæ, quàm sedentes, aut jacentes. Opus
enim est stantibus quidē, tensam esse: jacentibus
verò & sedentibus, nihil prohibet esse curvatā
spinam. Porro quicumque musculi sine articulis
sunt, etiam in his media constitutio sine dolore
est: sicuti in ano se habet, vesica, & lingua. Nam
& summè constringere, & maximè dilatare a-
num, dolorem inducit: ac sic de cæteris. Atque

omnes homines quo tempore cessant ab actio-
nibus necessariis, mediam figuram & dolore ca-
rentem in omnibus partibus habent. Verum in
lingua quidem per conjugationem omnes mu-
sculi orti sunt superne, inferne, & à dextris, & à
sinistris: quare nihil miri si in contrarios motus
particula deducatur, à musculis oppositis. In
musculo aut ani et vesicæ, necnō diaphragmatis,
aliter habet negotiū. Nam quum singulis harū
partiū unicus tantum sit rotundus, sine ullo op-
posito, musculus, in cōtrarios deduci motus hæ
particulæ non æque facile possunt. At musculi
qui est ad vesicam & anum, officiū est, nō excer-
nere superflua alimēti, sed retinere: nisi fortè per
accidens, quum desierint agere. Cæterum instru-
menta excretionis, duplicia genere sunt. Eorum
quippe alia animæ, alia naturæ sunt. Atq; animæ
quidem instrumenta semper motu voluntario
agunt: instrumenta verò naturæ, citra ipsum. At
phrenes quidem, & omnes musculi epigastrij,
instrumenta animæ sunt. Intestinorum autem
structura, unā cum vētriculo, ipsius naturæ. Mu-
sculi itaq; epigastrij omnes, quum agentes ten-
duntur, premunt intro naturæ instrumenta: hæc
autem, si phrenes ipsis cedant, in illarum locum
abeuntia, musculorum violentiam exolvūt. Sin
autem resistat, tunc ceu à duabus manibus pres-
sa, extrinsecus à musculis, intrinsecus à phreni-
bus, anteriore quidem parte cartilagini pecto-
ris, posteriore spinæ cohærentibus, ea quæ con-
tinentur in cavitatibus illorū, fortiter propel-
luntur: quo tempore musculus ani est ociosus.
Cæterum in egerendo quidem, superiores: in
meiando autem, inferiores magis tenduntur mu-
sculi. Simul autem cum ambobus extenduntur
musculi servientes respirationi: ut videlicet oc-
currant ventriculo & intestinis, ab epigastrio i-
pso propulsatis ad regionē thoracis. Jam expira-
tionis nullus musculus omnino est opifex: sed
videtur hoc ipsum opus, aut potius affectus tho-
racis, omnino esse similis decidentia illi à no-
bis expositæ. Efflatio autem est spiritus confer-
tim emissus ab intercostalibus musculis: quod
etiam thoracis opus, dictæ reclinationi, quadā
proportionē respōdet. Verum quū expirationi
contraria sit inspiratio, efflationi verò vehemēs
inspiratio, priorem quidem oppositionem so-
læ phrenes efficiunt: alteram verò intercostales,
cum musculis qui ad thoracem ex collo, scapu-
lisq; proveniunt. Quum autem maxima quidē
inspiratio per externos, maxima verò expira-
tio per internos intercostales fiat, justius utiq;
quispiam musculos thoracis externos, ijs qui
thoracis parte interna sunt, quàm phrenibus,
oppositos esse dixerit. Porro diaphragma i-
psum, ubi agere desierit, laxiusq; fuerit, nunc qui-
dem ipsius cōvexitas versus spinā vergit, nunc
verò ad ventrē: multo tamen promptius versus
spinā fertur. Estq; in omnibus figuris hominis
(una excepta prona) superius quidem diaphra-
gma, inferior verò spina: quare meritò ad eam
vergit: tum quia gravatur quidē ab his quæ ante-
riori parte superjacent, tum quia retro molissi-
mum & tenuissimum omniū viscerū habet pul-
monē. Duplex igitur quū sit tensio omnib. mu-

*Musculi ani
& vesicæ mu-
sculus est non
excernere,
sed constrin-
gere.*

*Excretionis
instrumenta
duplicia.*

*Phrenes.
Intestina
sunt natura
lia instrumenta.*

*Epigastrij
musculorum
apud.*

*Expiratio-
nis nullum
musculū es-
se opificem.*

Efflatio quidē

*Inspiratio ex-
pirationis cō-
traria.*

*Inspiratio-
nem maxi-
mam fieri
per externos
intercostales
musculos, ut
expirationē
per internos.*

*Tensio du-
plex muscu-
lis omnib.
inest.*

sculis, una quidem, quum agentes in seipsos coeunt: altera verò, quum à musculis oppositis extenduntur: priorem quidem phrenes, in inspirationibus non violentis habent: altera verò fit, aliàs musculis ventris agentibus, aliàs intercostalibus, & his etiam solis. Verum musculi costarum & ventris, quandiu quiescunt, convexi perpetuò sunt: quum autem agunt, intrò cedunt, minusq; curvi fiunt, contrà quàm cæteri omnes aliarum partium musculi.

G A L E N I P E R G A M E N I
de uteri dissectione, Liber unus.

*Uterus inter
vesicam &
intestinum re-
ctum.
Collum vesti-
cae femineae.
Rectum inte-
stinum.*



*Uteri mode-
rati magni-
tudo.*

*Pudendi mu-
liebris descri-
ptio.*

*Cornua, sive
apices uteri.*

*Uteri conne-
xiones.*

Terus sub peritonæo, inter incubentem vesicam, & rectum intestinum, suam sedem sortitur. At verò foeminarum vesica circa pubem sita est, collum brevi⁹ & laxius habens, quàm vesica virilis, quod inter ossa 20 pubis ad foemineum pudendum extèditur. Rectum verò intestinum ossi sacro, & quibusdam spinæ vertebrae innititur: ac proinde spina circa id incurvatur. Magnitudo uteri nō æqualis omnib. est. Cæterum magnitudine moderatus, superna quidē extremitate est propinquus umbilico, inferna aut muliebri pudendo cōmittitur. Estq; spatium ab illa extremitate suprema, usq; ad oram 30 exteriorem pudendi, ut plurimum, quod moderatum est, undecim digitorum. Secundum latitudinē verò, ad utrunq; latus per suos apices, sive cornua, extenditur. Ipsum autem muliebri pudendum circa externas partes pelliceā eminentiā adnatā habet, instar præputij virilis. Corpus uteri, vesicæ simile est: à lateribus tamen habet papillares exortus, versus lumbos nutātes, qui apices & cornua appellantur. In mulieribus tamen minimè reperiuntur foetus intra ipsa cornua, quēadmodū in cæteris animalibus, numerosum partū gestatibus (multò enim minora sunt, 40 quàm pro magnitudine foetus) sed in reliqua tota uteri cavitare. Cōtingit aut moderatæ magnitudinis uterus ipsa tenuia intestina: qui verò excellenter est parvus, ea solum cum omnibus coaluit. Rursus maximus uterus, nēpe qui jam foetum gestat, latera implet, ac imū ventrem, & multa intestina contingit. Appendet aut per fibrosas quasdā & tenues distantias intestino recto & vesicæ. Appendet itē ossi sacro per quasdā ligamenta robusta, ac per similia etiā, ipsius spinæ vertebrae: cuius musculis magnis (qui memo- 50 rables utrinq; faciunt exortus, & in utranq; uteri partē, & in vesicæ collū, & in sedē distribuuntur) connexus est. Laxa sunt autem hæc omnia ligamenta, & ob id uterus plurimum moveri, & habitu suo transmutari potest. Sunt ligamenta alia & appendices quæ in ipsum uterum inferuntur, partim quidem ejus corpus textentia: quorum pars nō exigua sunt nervi ab spinali medulla orti: partim verò incrementi & nutrimēti ipsius 60 uteri, itemq; foetus gratia, constructa: ut sunt arteriæ atq; venæ. Vesicæ autem & podici sic juxta collum coalescit uterus, separari ut per excoriationem facile ab ipsis possit. Coalescunt etiam ei testes & seminalia vasa: quemadmo-

dum cū pudendo ipse circa extremitatē sui colli. Jam verò à vena cava, & arteria magna illi incumbente, exoriuntur duæ venæ, & duæ arteriæ *Uteri vasa.* utrinq; sanè una, vena quidem à vena cava, arteria verò ab arteria. Deinde altera quidem à dextris ad dextram, altera verò à sinistris ad sinistram uteri partem delata, antequam in ipsum uterum inferantur, ramulos ad testes extendunt, posteaq; in uteri corpus se insinuant, atq; intertexunt ipsum. Hæc itaque quatuor vasa, paulò inferius sunt sita, quàm quæ deferuntur sub renes: venæ tamen multò sunt arteriis majores. Aliæ præterea venæ & arteriæ, ab utraq; uteri parte, circa collum ipsius inferuntur, ab ea quæ ad pudendum & sedem pervenit, manifestè distinctæ. Ipsum *Uterum con-* autem uteri corpus duæ constituunt tunicæ ob- *sistunt duas* versim positæ, ad distensionem & contractionem aptissimæ: quarum externa quidem, nervosior, simplex, & una est: interna autem venosior & duplex: cuius partes committuntur quidem inter sese, non coalescunt tamen, nec prorsus uniuntur, sed se duntaxat contingunt, & à circumscita tunica continentur. Si igitur per excoriationē eas separare cōtendas, duo videbuntur tibi uteri esse, sub una eademq; tunica siti. Hanc enim tunicam veluti uterum in duas partes separare amplius non potes. Habet autem multas aspredines illa venosa tunica, maximè circa fundū. At nervosa quæ ipsam ambit, multò crassior quàm vesicæ tunica est, & ipsa multis venis arteriisq; interstincta. Cæterum collum uteri musculosum existens, ex carne natū *Uteri collum cartilagineū* est dura cartilaginosaq;: ac progressu temporis adeò cartilagosum evadit, ut quæ sæpius perpererunt, aut jam aniculæ sint, his multum durum & cartilagosum existat. Habet autem in se foramen, p quod excernuntur menses, ac tum viri semen excipitur, tum egreditur partus. Finit autem collum ipsum in muliebrem sinum non rectum, neq; rectā in omnibus: sed declinat in sinistram, & dextrā, sursumq; & deorsum. Quod autem ad anteriorem & posteriorem partem attinet, similiter se habet in omnibus. Cōsistentiam etiam uteri, pro ætate atque affectuum ratione, contingit variari. Quin secundum naturam, crassus quidem & magnus, ac tumidus apparet uterus, lunari purgatione prodeunte. Siccus autem & tenuis est, qui longissimè ab eo tempore abest. Crassior item prægnantis: crassissimus, ejus quæ sæpe peperit. Rursus, ejus quæ jam concepit, crassus est: ejus verò quæ partui est vicina, magnus simul & tenuis. At verò testes foeminei à lateribus uteri siti sunt, singuli ab utraq; fundi parte, propè cornua: magnitudine multò minores quàm in maribus: figura item & corporis miscella omnino multum differentes. Lati enim sunt foeminis, rotundi verò & oblongi maribus: & glandulosi quidem illis, tenera verò carne masculis. Complectitur autem utrumvis eorū propria pellicula tenuis. At scrotum foeminei testes non habent: eis tamen & arteriæ & venæ inferuntur, ex eis quæ ad uterum tendunt, in singulos singulæ progredientes. Verum cōmixta inter se hæc vasa priusquā inferantur testibus, instar cæsariæ intorquētur, nō secus quàm

*Uterus præ-
gnantium cras-
sus.*

Testium foemineorum

*Testium foemineorum magni-
tudo, seu in eorūq;
discrimen.*

*Testiculorum
pellicula*

*Testes foemina-
rum carent
scroto.*

*Testium foemina-
rum vasa.*

Seminaria vasa in foetibus. quàm in ipsis maribus. Cæterum seminaria vasa, quæ & ipsa continent semen, propè testes quidè sunt ampla, sensilemque possident cavitatem: angustiora verò ac veluti non cava redduntur, paulò longius inde progressa. Deinde rursus juxta cornua dilatantur, ubi sanè in uterum inferuntur. Porro prægnante muliere, primò quidem intra uterum secunda producitur: dein tunicae foetui ambientes, ac demum foetus. Secunda ipsa, vasa multa sunt, tum venæ, tum arteriæ, ex propinquo inter se sitæ: quarum spatia intermedia, membranis quibusdam explentur. Ex tunicis autem ipsis, altera totum foetum amplectitur, altera incumbit duplicata circa caput, clunes, ac pedes ejus. Ac vocatur quidem illa agnina, hæc autem farciminalis. Ambæ autem candidæ sunt, ac tenues, ferè aranei telæ consimiles. Adnascitur secunda utero in hunc modum. Vasorum uteri oscula, per quæ mulieri menses purgantur, aperiuntur quando mulier est conceptura. Con-
Prægnante muliere, quæ prius gignitur.
Secunda descriptio.
Agnina membrana.
Farciminalis.
Secunda conexio cum utero.
Conceptione fieri aut incipientibus fluere menses, aut desinentibus.
Conceptio cur ante quæ fluere menses inciperint fieri nequeat.
Asperum quæ larve, aptius ad concretionem.
Secunda iuxta vasorum oscula tantum ipsi utero accrescere.
Cotyledones, seu acetabula.
Vasorum secunda progressus.
Umbilicus quid.
Vrægos.
 tingit autem hoc tempus, incipientibus fluere menstruis, aut desinentibus. Aperiuntur & reliquo omni purgationis tempore hæc vasa, sed tunc non concipit mulier: neque enim in utero potest semen manere, quòd multitudine sanguinis influentis eluatur. Quando verò cessant menses, & quum incipiunt, reſerata sunt vasa, & purgatio ipsa nec multa, nec coacervatim effunditur, sed modica & paulatim, ceu sanguineo humore exudante. Quare ob aspredinè quidem, semen utero adhæret: sufficiens aut alimentum habet, paucitatem sanguinis in ipsum confluentis. Priusquam enim fluere cœperint menses, mulier non concipiet, propterea quòd nutrimento privatum sit semen, & unde hæreat non habeat: lævis enim tunc uterus est, ob conclusionem vasorum: quare defluit semen, & cum tunica ipsius non unitur. Aptius enim ad concretionem asperum est, quàm læve. Ex quibus liquet, secundam juxta vasorum oscula tantum ipsi utero accrescere, & juxta aliud nihil. Vas etenim quod in secunda nascitur, principium habet extremitatem ejus quod se in uterum ingerit, adeò ut quis duo hæc possit esse unum dicere: unita enim sunt juxta oscula, alterumque transsumit ab altero, vena quidem sanguinè à vena, arteria verò spiritum ab arteria. Juxta hæc vasa etiam cotyledones (quos acetabula vocant) habentur, vinculum firmum secundæ ad uterum existentes. Itaque ipsius secundæ vasa, unde dictum est, inde initium summentia, intertexunt secundam, mutuoque miscentur, & perinde ac variæ radices arborum, quæ in unum coeunt stipitem, sic ipsa mutuo inter se cōcrescentia, in duos ceu truncos degenerant, venosa quidem in venas, arteriosa verò in arterias. Qui stipites utrique, ex utraque parte dextra & sinistra, ad ipsum foetum circa umbilicum confluunt. Neque enim aliud quicquam umbilicus est, quàm quatuor hæc vasa, mediū quendam & communem uragon, hoc est, urinæ ductorè, vel aquæ ductum, habentia. Hic verò existit principium membranæ farciminalis, perforatusque est ad fundum vesicæ ipsius foetus amplo meatu, adeò ut vesicæ unio sit ad tunicam farciminalem, per ipsum uragon in medio utriusque situm. Hu-

mor autem non modicus in utraque continetur membrana: flavus quidem in farciminali, albidior verò in agnina, & corpiosior: quandoquidem hæc altera major est, utpote universum foetum contegens.

Agnina membranam contingere totum foetum.

GALENI PERGAMENI de Semine, Liber primus.



N semen sit tum materiale, tum efficiens generationis principium, ut Hippocrates quidem professus est, an efficiens tantum, ut Aristoteles autumat, nobis venit considerandum. Quòd igitur ex animalibus brutis, quæ quidem retinent semen, omnia etiam concipiant, minimè autè quæ excernunt illud post coitum, ipse didici experimento: id quod etiam in mulieribus postea exploravi, quas quum hac de re percontatus essem, responderunt mihi, se quendam, circa uterum, motum percipere, ut qui veluti vellatur, & paulatim in seipsum contrahatur, ubi semen concipiant. Quibus etiam & scripta medicorum subscribunt, & quæ ipse etiam expertus sum, per reſectiones animalium prægnantium, quorum omnium uteri apparebant foetibus obvoluti. Videntur enim uteri (ut Placito ait) veluti animal quoddam, prolis desiderio affici, & ob id attrahere in seipſos semen, & circumcirca in rugas cōplicati continere, quem admodum & hoc ipsum viris aliquando evidenti sensu est perceptum, nimirum ad cucurbitulæ medicinalis similitudinem attrahente utero ipsorum pudendum. Maxime autem contingit hoc, cessantibus jam ipsis mensibus, quo præcipue tempore uteri semen concipiunt. Porro qui putant Aristotelem quidè voluisse, semen masculi conjectum in uterum, principium motus menstruo recremento imponere, ac mox excerni: quique id partem fieri foetus ex Aristotelis sententia existimant, utrique mentè illius viri ignorarunt. Is quippe, veluti ex ligno & fabro fit mensa, sic ex menstruo sanguine, & motivo principio viri, foetum constitui ait. Quapropter nonnulla animalia, nec excernere genituram affirmat, sed distribuere tantum in foeminam animalè caliditatem, esseque talia ex insectis quædam: ita ut foemina quidem articulum in marem demittat, commorataque in complexu per multum tempus, corpus quidem accipiat nullum, sed solam facultatem formantem, & formam ipsam specificantem. Jam verò, quòd ipsemet Aristoteles ait, inflari & dissolvi genituram in utero, alienum à ratione videtur: quum nimirum conceptionis tempore, minores & minus inflati cernantur uteri. Cæterum, etiam si id concedamus, perscrutabimur postea, utrum in ipsa amplitudine uteri, menstruum quidem recrementum consistat, semen autem acervatim allabens, ipsum percutiat, atque exhibito motus principio excernatur rursus, per ipsius uteri collum: an potius eo tempore quo foemina masculo coit, semini obviam menstruus sanguis feratur, ut suscipiat eam, quam illo assequitur, facultatem. Utrumque tamen absurdum. Nam si in ventre uteri acervatum, ac longo

Bruta excernunt semen post coitum, non concipere.

Uterum proli desiderio affici, veluti animalia quædam.

Semen quo præcipue tempore concipitur.

Aristotelem interpretatur Galenus.

Aristotelis opinio improbat.

tempore contineatur menstruum, non amplius utiq; sanguis hoc fuerit, sed grumus. Quando-
Grumum quid sit.
 cunq; enim exciderit sanguis ex vasis in quodq; organum cavum in animali, statim fit grumus. Nec reperio quo pacto etiam semen sine sanguine excerni possit, cū quo convenit & conspirat in idem juxta amplitudinem uteri. Si verò obviam venit semini sanguis, oportet sanè ipsorum congressum in vasorū osculis fieri. Verum si hoc ita habet, unum in tot partes semen dice-
 mus dividi, quot sunt ipsa vasorū oscula, ut ad singula sua pars deveniat? (id quod seminis viscositati adversatur, & altera moderatē substantia opus habet, quæ dividat) aut cohærens sibi manere? quod longè convenientius est ipsi substantiæ seminis: & tertia alia substantia nō indiget, præterquam attractione uteri, & seminis ejectione. Quemadmodum enim venter ubi cibos appetit, cum fundo suo ad gulam recurrit, qua nimirum veluti manu utitur: eodem modo

uterus qualitatem seminis concupiscens, it ob-
Præterea ad pudendum procurrere, ut eas obviam semini.
 viam, ac totus quidem ad pudendū accurrens, collo ipso, veluti stomacho, ad similitudinē manus, utitur, intrudenti confertim semen. Itaq; si quando hic stomachus debilitetur, semen attrahere nō potest. Quod si etiam allabatur vasorū osculis semen, & rursus discedat, discutiaturq; in aërem, quod per Deos erit principium fœtus? Primum etenim invenire causam oportet ipsius elapsus sanguinis, semini appropinquantis, ex singulis osculis vasorum uteri: deinde alteram, quæ totum in idem coacervet: postea autem & causam membranæ totum hunc sanguinem forinsecus cooperientis: quæ quidē nō ex rarione tantum, sed ex eo quod apparet, necessitatem habet. Apparet enim nobis orbiculatim ipsum conceptum continens statim post conceptionem primam. Nam & trium & quatuor à principio dierum sæpe excidit mulieribus genitura tenui contenta involucri: id quod ex resectione animalium licet deprehendere. Videbis enim

manifestè uterum quidem totum circum semē contractum, membranam verò huic obvolūtā: qualem quidē excrevit illa nequissima mulier, quam Hippocrates (ut ipsemet fatetur libro de fœtus natura) prudēs ac volens coëgit facere abortum. Cohærens namque sibi ipsi semen, quo tempore ab utero attrahitur, extenditur quidem & dilatatur, nempe omnibus uteri partibus æqualiter appetentibus ipsum. Propterea verò quod viscosum & crassum est, calidis corporibus conversatur, facili in membranam coalescit, quæ juxta vasorum ora ex ipso utero pendet, de cætero in totū illi subtentā. Porro vena, arteria, & nervus, prima & cōmunissima animalium organa, à quibus omnes partes reguntur, nō ex sanguine, ut Aristot. ait, sed ex semine generantur: nimirū alba & exāguia quū sint. Quod si sanguinem transmutās natura, ex rubro faceret album, ex liquido crassum, viscosum ex lævi, ut ex eo rectē illa vasa cōpingi possent, laboraret utiq; frustra, studens hujusmodi parare sanguinem, quale à principio habet semen. Atqui natura ipsa nihil frustra molitur: cui quidem nullū majus operæ præciū accidere potest, quam

principium optimè cœptum, ut quod nō solum medium totius, sed potētia etiam totum esse dicatur, vel testimonio Aristotelis. Absurdū itaq; fuerit dicere, statim in ipsis auspiciis frustra operari naturam: habentemq; album & crassum & viscosum humorem, ad nervorum, venarum, & arteriarum generationem, eicere quidem hunc, ut Aristoteles putat, ex sanguine verò alium similem gignere. Si namq; exanguem esse horum trium organorum substantiā natura vult, si-
Semen substantia quibus rebus aptissima.
 five crassam, si-
Semen vita spiritum est.
 five extendi, & in fistulæ modum cavari, ac quamlongissimè progredi citra diffusionem, ad hæc omnia certè nihil substantia seminis reperiri possit aut cōmodius, aut aptius. Est autem semen vitali spiritu plenum. Quare maximè contrarius hic sermo naturæ operibus est, si excerni quidē in aërem dissolutum, ipsum dicamus retineri autem sanguinem menstruum, ceu benignissimum, quem ut alienum natura excernit singulis mensibus. Non enim est familiaris utero sanguis menstruus, sed ipsum semen: & propterea susceptorium hujus organum natura constituit uterum. Quantum igitur ex semine uterum ipsum cōtingit, hoc fit statim membrana. Reliquum verò totum, habuit quidem & ipsum insitas facultates: attractricem quidem familiarium, & per quam retenturum, & altera-
Semen inest se quatuor facultates naturales.
 turum, alimentumq; sibi facturum erat: expultricem deniq; alienorum & superfluatorum. Habuit præterea & familiares materias quas attracturum erat ab utero, sanguinem videlicet & spiritum, per oscula quibus connexū est. Et sanè hæc statim à principio per ambientē membranā nō dum duram factam, attraxit. Ad finem verò, tantum per foramina illius, ob attractricem perpetuam, obq; intervētum humorū, minimè coalescentia, sed ad aperta magis, per quæ scilicet ferebantur materiæ. Solet autem alimentum non semper pari copia, sed juxta proportionem augmenti illius quod alitur, aut exiguum, aut copiosum affluere sanguis quidem ex venis, spiritus verò cum sanguine tenui, modico & calido, per arterias, utrunq; ad propriam suam cavitatem. Quin & temporis progressu necessariū est hanc viam in fistulæ modum cavari, ac vas fieri. Cæterum quandoquidem impossibile erat, semen ad fundum uteri illapsum, ipsum totum illinire, utpote qui exortus utrinque veluti cornua quædam haberet, hæc sanè fœmineo semine ille vit natura. In hæc siquidem cornua, singula ab utraque parte existentia, vas seminale se-
Seminalia vasa fœminea à testibus, inferuntur in cornua matris.
 ingerit, ex fœminæ profectum testibus. Quando igitur simul sub idem tempus, cum mare semen fœmina emisserit, ipsum muliebrem semen per utrunque ejectum cornu, delatumq; in medium uteri spatium, simul quidem oblitit vias, simulq; ad masculi semen perveniens, unā cum illo miscetur. Sic ita per membranas ambo mutuo innectuntur, quas tunc in sua profectione ipsum muliebrem semen produxit, ut totam genituram amplectens, hanc fœtui utilitatem præstaret, ut veluti alimentum quoddam, masculo semini fieret: tenuius enim est illo, & frigidius, familiarius verò omni alio ad ipsius nutritionem. At verò fines illi vasorū, per quos singulis

Principium de-
 citur potētia
 esse totum.

Semen substantia
 quibus rebus ap-
 tissima.

Semen vita
 spiritum est.

Sanguinem
 menstruum nō
 esse familiaris
 rem utero.

Membrana
 ex qua semina
 nascuntur.

Semen inest
 se quatuor
 facultates
 naturales.

Semen quas
 materias tra-
 hat ab utero
 & per quas
 vitas.

Seminalia
 vasa fœminea
 à testibus
 inferuntur
 in cornua
 matris.

Semen muliebrem
 miscetur
 virili in
 utero.

Semen femineum
 tenuius
 frigidius
 quæ masculo.

men-

*Acetabula
qua Cotyle-
dones.
Secunda qua
dicatur.* mensibus superfluum sanguinis ex toto corpo-
re in uterum derivatur, existunt vera acetabu-
la, sive cotyledones. Appellatur autem secun-
da, extera illa membrana, quam pertranseunt
tum arteriæ, tum venæ, materias ipsas ad fœ-
tum ex utero deferentes. Altera autem mem-
brana, quæ sursum ad cornua pertingit, farcimi-
nalis vocatur: quæ augescentibus liquidis excre-
mentis in fœtu, ex ipsis suscipit alterum. Porro
ex spiritu & tenuissimo sanguine, qui unâ cū il-
lo per arterias ad fœtum confluit, calidissimū ex
visceribus ipsa natura constituit. Alter verò san-
guis crassus, speciem hepatis originalem produ-
cit: atq; hanc etiam pleræq; venæ per secundā la-
tæ perficiunt. At arteriæ ad aliud calidissimū vi-
scus feruntur, quod ob excellentem caliditatem,
moveri veluti flamma quædā non cessat, sed sem-
per vicissim distenditur & contrahitur. Et venæ
quidem arteriæq; materias in hæc viscera dedu-
centes, veluti radices ipsorum existunt. Quæ ve-
rò protenduntur in totū fœtum, tunicis similes
sunt, in multos ramos distractis. Generatio autē
his est, ex substantia seminis in fistulæ modum
cavata. Tertium verò principium, à quo omnes
producti sunt nervi, generationē ex solo semine
habet. In permissione quippe ipsius ad semē mu-
liebre, multæ bullæ sunt ruptæ, ex quibus intrò
& ad profundū spiritus seipsum servare cupiēs,
concessit. Neq; enim veluti vapor erat, sed per
se mobile animalis principium, quemadmodum
& cavitatem spiritus plenam, ex circūstante hu-
more produxit semini. Quò autem neq; etiam
inde promptē evacuaretur, firmam sibi domū
fecit ex liquida seminis substantia, quæ ipsum
ambit: id quod in ea crassius & durius erat, ad
externum lineamentum extrudens: quod utiq;
ipsum progressu temporis calefactū & resicca-
tum, erat futurum os. Hoc in principio quidem
facultas opifex, ac fingēs animal operatur: non-
dum tamen apparet, præ parvitate. Quando ve-
rò primum apparere incipiūt, maxima sunt tria
hæc ex vicino inter se sita, & se invicem contin-
gentia. Principium quidem nervorū futurum,
quod cerebrum appellamus, in altiori sede lo-
catum: cor autem & hepar (quæ sese mutuò cō-
tingunt) ei subdita. Quæ principia tria, longius
progressu temporis disparantur, & in totum,
quod eis efformatur, animalis corpus transmit-
tunt germina. Spinalem nanq; medullam cere-
brum veluti truncum quendam producit: cor
verò arteriam maximam, quam aortam Aristo-
teles vocat: hepar deniq; venam cavam. Et sanē
apparet statim à principio circa medullā spina
ipsa firmata: circa cerebrum verò, calva obdu-
cta: sicuti & juxta cor thorax, * qui nō solum do-
mus futurus erat in partu, sed primum & princi-
palissimum respirationis organum. Hæc igitur
aliquantō posteriùs fiunt. Ipsi autem fœtum
generationis, quatuor in universum sunt tem-
pora. Primum, in quo seminis species vincit, &
dominatur: quæ quidem constitutio, non fœ-
tus, sed genitura vocatur. Ubi verò expletus
quidem sanguine fuerit fœtus, cor autem, cere-
brūq; & hepar adhuc inarticulata sunt & infor-
mia, firmitudinem tamē & magnitudinem mo-

mentaneam jam habent, hoc tempus secundum
erit. Tertium deinde est tempus, quando illa prin-
cipia tria manifestē videre licet, reliquarum ve-
rò partium designationem per lineamenta, &
quasi obscuriorem quandam adumbrationem.
Quartum deniq; & postremum tempus hoc est,
quū fœtus omnibus artubus suis est integre con-
summatus & absolutus: quo tempore non fœ-
tus solum, sed jam puer ab Hippocrate nomina-
tur. Fœtus itaq; veluti planta, omnem genera-
tionem & formationem à semine accipit, du-
plexq; principium motus & formationis statim
ab ipso principio. Qualis enim est radicatio in
plantis deorsum, talis est fœtibus insertio arte-
riarum & venarum in uterum. Qualis verò sur-
sum vergens truncus in plantis, tales sunt in fœ-
tibus à tribus principiis exortus. Etenim natu-
ra seminis non aliis viribus producit plantam,
aliis animal: sed quemadmodum plantæ semen
terra indiget, ut nutriatur ex ipsa & augescat: sic
nostrorū indiget uterō semē, ob causas easdem.
Ad hæc, radices sibi generat planta, quibus tra-
hat alimentum ex terra: ita chorion, hoc est, se-
cunda, gignit vasa fœtū radices. Producit qui-
dem truncum à seipso semen plantæ, & ab illo
alios & alios ramos, usq; ad extremas propagi-
nes: sicut non secus in fœtu videre licet juxta illa
tria principia tres truncos natos, arteriam nem-
pe aortam venam cavam, & spinalem medul-
lam: qui in varios ramos divaricantur, usq; ad ul-
tima germina. Quæ triplex planta animal futura
est, non rejecta illa, quam à principio habuit fa-
cultate vegetatrice, sed altera insuper acquisita.
Ex loco autem in locum ipsum transire oportet,
ubi perfectum fuerit, ex uteroq; solutum: quod
facere minimē posset, si frigidum ut arbores fie-
ret, & si organis ad ambulandum aptis careret.
Quare duo principia acquisivit, alterum orga-
norum, quæ custoditura sunt ipsi naturalem ca-
liditatem: alterū eorum quæ subservitura sunt om-
nibus ad quas concitatur actionibus. Sed his
quidem posteriùs utetur. Principio autem plan-
tatitio primò est usum, quo utiq; nō ex sangui-
ne, sed ex semine, arteriam, venam, nervum, os
& membranam produxit: & secundam quidem
primum ei forinsecus circundedit, ac simul cum
ipsa farciminales membranas condidit, tenuem
quidem, angustamque & infirmam, futuram ta-
men adjumento secundæ, in materierum attra-
ctione, suscepturamq; formati animalis urinam.
Nam ad totum fœtum ambiendum, excipien-
dumq; vaporem defluentem ab illo, generata est
tunica agnina, satis ampla & robusta. Reliqua-
rum autem membranarum, quibus variæ partes
teguntur, nulla in primis diebus necessariam ha-
bet generationem (neq; enim suffecisset ad ipso
rum omnium opificium, substantia seminis) sed
procedente tēpore, dum quod antea erat semē,
jam grandis factum est fœtus. Ad quarum ge-
nerationem naturā utitur genituræ viscositate:
ex qua quidem quicquid crassius magisque ter-
reum, ac minus tractile est, ad ossium regionem
delegat: quæ sanē arida & terrea, pinguitudi-
nisq; expertia, sed obducta membranulis tenui-
bus, carneque operta perfecit, ad id maximē usa

*Fœtum ad
plantas com-
paratio pul-
cherrima.*

*Animal di-
citur triplex
planta.*

*Principium
plantatitium,
quæ ex semi-
ne gignat.*

*Secunda.
Farciminales.*

*Agnina tu-
nica*

*Genitura &
fœtus, qui-
bus sit gene-
randis ido-
nea.
Ossium gene-
ratio.*

caloris vi: qua nimirum omnem glutinosam substantiam ab ossibus exugens, ligamentis quibus invicem copulantur, imposuit. Cæterum ubi ipsis ossibus carnem superservit, prius quam membranis integeret, ibi minus aridum totum os factum est. Extendit autem à membranis circumossalibus, etiam carnibus ipsis gracilia opercula. Quin & nervum in unamquamque ipsarum disperfit, ubi eos prius in fibras araneorum telis tenuiores dissolvit. Sed alias etiam fibras & similiter tenues ex ligamentis productas & carnibus implicatas invexit, atque ita rursus in unum & idem ambo coëgit fibrarum genera, totum quidem organum in quo hæc fabricavit, musculum efficiendo, id verò ubi fibræ cōgrediuntur, tendinem. Ligamentorum etiam non modicam partem in ipsos musculos indidit: ut nervorum, non in hos solum, sed & in viscera omnia. Est & aliud fibrarum genus in ventre, intestinis, & utraq; vesica, adeoq; in utero & corde, generationem ex semine habens, quibus veluti nexui cuiuspiam totum visceris corpus circumcirca accrevit, ex sanguine ortum. Omnia siquidem quæ carnosæ specie prædita sunt, sunt ex sanguine cōdita. Membranosa verò omnia, ex semine suum ortum sortiuntur. Ob id quæ ex sanguine generata sunt, si corrumpantur quandoq;, facile regenerantur, ut quæ materiam generationis largam possideant. Quæ verò ex semine, aut neque prorsus, aut valde raro, regigni possunt: quamquam efficiens ipsius causa perfectis animalibus insit. Quod si quisquam eorum quæ ex semine ortum duxere, carne nudatū sit, caro quidem circumnascetur, simile verò illi quod denu datum est, nullo modo amplius innasci potest? vel si Aristoteles moneat, singulorum inesse naturis, ut sibi ipsis similia faciant. Etenim in id quod naturæ eius quod transmutatur propinquius est, facilis est transmutatio. Ac proinde sanguini facillimum est carnem fieri: difficillimum verò * membranam, nervum, venam, arteriam, tunicamve. Primum igitur unumquodq; eorū quæ nutriri debent, familiarem sibi ex sanguine, ac similem succum trahit: qui postea dissolutus vaporis instar, his quæ ipsam attraxerunt, apponitur: ac tandem ab eis transmutatus, illis assimilatur. Non ergo videtur, unamquamque primarū partium animalis à principio quidem ex semine natam esse, aliud autem esse ipsarum ultimum & familiarissimum alimentum. Procedunt porro arteria & vena in utrumque testem non recta via, sed flexuosa, multiformiq;, in qua quidem licet videre sanguinem albescentē paulatim: postea verò, ubi ipsum vas testem contingit, in eo planè seminis substantia jam perspicuè conspicitur. Est enim utriq; tum arteriæ tum venæ, generatrix natura seminis. Verum ex sanguine ipsum conficiunt, diutissimè in vertiginibus illis versatō. Alteratur enim sanguis transiens in semen: quum omne alterās, in suam naturam ducat ipsum quod alteratur, quemadmodum etiam apparet. Album enim & crassum & viscosum est semen, aptum ut ex eo arteriæ & venæ nutriantur. Cæterum amputatas venas, ac rursus generatas in magnis ulceribus vidimus:

id quod assolet fieri conspirante in unum robustissima facultate cum materia seminaria copiosa. Arteriam verò aut nervum nemo unquam vidit regeneratum, ob penuriam materiæ, quam & copiosam & validæ facultati junctam, adeo crassorum vasorum requirit generatio. Verum juxta primam generationem ex semine, coacervatus adhuc est humor, ex quo vasa ipsa formantur: opifex autem ipsius duplex est, tum facultas, quæ in ipso semine habetur, tum quæ in uteri vasis, quibus allapsum est. Quare nihil mirum, prima naturæ organa velociter formari in foetibus. Sed nec tribuere vasis illis flexuosis totam seminis generationem est æquum, ut Aristoteles facit, privas testes facultate semen gignendi. Arteria itaq; & vena, à vasis quæ circa spinā sunt progredientes, per illa deorsum feruntur, donec perveniant ad venam testicularem dictam, quæ juxta caput testiculi incumbit, quod epididymis appellatur, ex qua fistulæ multæ in testem perveniunt, seminario humore refertæ. Huic testiculari venæ & arteria & vena adnascuntur, circa paulò antè relata obvolutionem: cui & parvam quandam à seipsis distributionem largiuntur, priusquam inferantur testis. Inde seminalis meatus genituram hauriens, ad pudendi exortum eam subvehit. Quousq; enim intra illa sunt arteria ipsa & vena, peritonæo integuntur. Hinc verò peritonæū, vtrinque momentaneo foramine perforatū est, & meatus ab ipso maximus ad testes descendit. In quo & obvolutio vasorum gignitur, & vas seminale ex vena testiculari enascens, ad illa ascendit: contingens quidem circa exortū ipsum testiculum, non tamen ex ipso generationem habens. Iam verò juxta utrumque meatum arteriam & venam descendentem reperias, ascendens aut vas seminarium. Inde verò rursus non amplius extra pubis ossa, sed per profundū & supra ipsa in declive fertur, donec ad vesicæ perveniat collum, cui pudendum continenter cohæret. Quia enim vas seminarium longissimum factum est, ob id tantam viam circumcurrit. Cōtingit enim ita sanguinē in vasis morantem concoqui, & in grumos cogi, & vas seminale longissimum & varicosum iuxta vesicæ collum existens, genituram quam longissimè iaculari. Cæterū in quibus testes execti sunt, epididymide intacta, nihil patitur vas seminarium. Deperit autem animalibus nō solum emissio seminis (hoc enim iis feliciter cederet, qui abstinere à venis percipiunt) sed & virilitas & omnis masculina inclinatio. Sic etiā si animali fœminæ excindas testiculos, neq; libidine concitabitur, neque marem admittet, sed amittet fœmineam naturam. Quo nomine scrofæ castrantur, fiuntque sic castratis masculis similes, atq; uberius alimentum accipiunt, pinguiorēq; & suaviorem carnem, quam reliquæ scrofæ, habent, quemadmodum & mares maribus. Non tamen similiter periculo vacans ablatio testium ipsis fœminis est. Aliter enim ab utraq; parte singuli adiacent, arteriam quidem & venam, velut qui in masculis sunt, pampinoformiter sibi insertas habentes: vas verò seminale ad utrumque cornu finiens. Necessarium itaque est utrumque latus diffindere, si quis

Musculi constitutio.

Tendo.

Ligamentū.

Visceribus

universis esse

per vos indicatos.

Carnosa omnia esse ex

sanguine orta.

Membranosa omnia à

semine oriri.

Genita ex

sanguine regenerari posse.

Genita ex semine

regenerari posse.

Nutritio uni

versis ex familiari

illius portione sanguinis.

Sanguinis in semen de-

generatio.

Vasis seminarij inesse

sim generatricem seminis

Semē ex sanguine gigni.

Venas amputatas, regene-

ratasq; vidit Galenus

Arteriam, nervum & amputatū, cui regenerari non licet.

Testes privas

facultate gignendi semē

Testicularis

vena

Epididymis

Seminalis meatus.

Peritonæi perforatio.

Seminarij vasis insertio in pudendum.

Spadonibus omnem utilitatem perire.

Scrofæ castrata.

Castratorum carnes suaviiores existere.

Testium ablatio in fœminis periculosa, & quare.

*Castratio
qua accidit.*

*Castrati sunt
aliud quippiam
magis,
quàm animal.
Testes quoque
mine præstent
cordi.*

*Testes alterant
universum corpus.
Carnes non castrati
re-dolere quippe
am græve &
virosum.
Testes quid
præstent.
Cor vivendi
principium
tantum.*

*Testes bene
vivendi prin-
cipium.*

*Testium
varia.*

*Essentia eni-
usque parti-
cula dici se-
cundum cor-
porum solido-
rum substan-
tiam.*

*Testium cor-
pus nutriti
ab humore
seroso, quem
continent.
Testes confi-
cere semen.*

*Testes cur ce-
lerrimè toti
corpori semi-
nis qualitate
comunicent.
Facultates
fortes corpus
suam natu-
râ mutare.*

quis excindere velit: atque in hoc sanè majus pe-
riculū est, quàm in maribus. Porro quibus exe-
cti sunt testes, ij virili robore destituuntur, per-
frigeranturque, ceu virium fomite: alteroque infici
caloris principio privati, neque ampla illis est ve-
na, neque floridus sanguis, neque validè pulsant ar-
teriæ, suntque glabri universum corpus, neque vene-
rea appetunt, aliud quippiam magis existentes,
quàm animal. Quare hac parte testes etiam i-
pso corde sunt præstantiores, nempe qui præter
hoc, quòd caliditatem ac robur animalibus ex-
hibent, amplius etiam generi conservando præ-
sunt. Quam eorum facultatem insignem, haud
scio quomodo neglexerint veteres, conferant-
ne, an non conferant semini, disceptantes. Alte-
ratur enim totum corpus per ipsos testes. Nec
solum insuavior est caro victimarum non castra-
tarum, sed & qualitas ipsa carniū simile quid-
dam testiculorum qualitati habet, grave nem-
pe, & virosum. Testes itaque præsentia sua, tum
calorem, tum robur, atque adeo coeundi appe-
tentiam ipsi animali conciliant. Cæterum ter-
tium hoc, neque cor ipsum exhibere potest: qua-
re illud quidem vivendi tantum, testes verò be-
ne vivendi principium fuerint. Quanto autem
melius est bene vivere, quàm simpliciter & so-
lum vivere: tãto in animalibus testes corde sunt
præstantiores. At in senescentibus & debilibus,
testes ipsi sunt laxi, contrà quàm in juvenibus,
fortibusve. Nonnullis ex quadrupedibus substri-
cti quidem sunt testes, ut suibus: volucris autem
omnibus intra peritonæum prope spinam
firmantur. Iam verò unaquæque animalis pars
humorem ad se loco alimenti influentem, in sui
ipsius naturam permutat. *Est autem propria u-
nicuique particulæ essentia haud quidem secun-
dum humorum, qui in ipsis sunt, naturam, sed
secundum corporum solidorum substantiam, à
quibus contentorum humorum fit alteratio.
Quod quidem si sic se habet, continetur autem
serosus humor in testibus, ab huiusmodi utique
ipforum corpus nutritur. Unaquæque autem pars
familiarissimum sibi alimentum conficit: qua-
re testes semen etiam conficiunt. Sed operantur
ipsum tum arteriæ, tum venæ, quamvis paucum
longo tempore: at testes non solum multum at-
que id brevi tempore, sed exactissimè elabora-
tum: syncerissima enim exactè est ipsis seminis
qualitas: ac proinde omnibus animalis parti-
bus quâ celerrimè illam cōmunicant. Fortes si-
quidem facultates in naturam suam alterant to-
tum corpus. Pauxillum quippe deleterij humo-
ris corpori animalis illapsum, totum ipsum trās-
mutat quam brevissimo tempore. Similiter au-
xiliaria medicamenta corpus universum alte-
rant, alteratione venenosis contraria, non sub-
stantia ipsoꝝ totum corpus persolvente (quod
utique impossibile esset tam brevi tempore) sed
qualitatis facta distributione. Quid igitur mi-
rum est, ex testibus in totum corpus facultatem
quandam distribui, qualis nervis quidem sensus
& motus ex cerebro, arteriis verò pulsandi fa-
cultas ex corde? Atque ea quidem facultas in ma-
ribus, roboris & virilitatis, in fœminis verò ef-
fœminationis existit causa. Ob idque fœmineum

animal excutis testibus, castrato masculo assimi-
laturque, relique verò omnes partes easdem facul-
tates in utrisque habent. Trahunt itaque serosum
humorem testes, quem ipsis antè præparant va-
forum involutiones. Deinde ubi qualitatis ex i-
pso fructum ceperunt, eamque ceteris communi-
carunt partibus, id quod superfluum est, in mea-
tus seminarios deponunt, hi verò foras in coi-
tu excernunt. Idcirco per immoderatam qui-
dem venerem, omnia spermatica organa, vacua
& exhausta redduntur:urgentia verò, ubi adest
vitæ ratio castissima. Trahunt itaque violenter
semen ab ipsis venis testiculi: venæ rursus à su-
pra positis: atque hæ rursus ab his quæ deinceps
sunt sitæ: qui tractus non cessat, donec ad o-
mnem corporis partem transumptio ipsa perve-
niat: quo fit ut totius animalis partes omnes
proprio alimento priventur, donec omnium for-
tissima expleatur. Neque verò solam serosam hu-
miditatem ab omnibus animalis partibus sic au-
ferri contingit, sed etiam vitalem spiritum. Qua-
re mirum non est, immodico utentes coitu im-
becilliores reddi: videlicet à toto corpore, utro-
que humore syncerissimo ablato, accedenteque
ad hæc voluptate, quæ ipsa per se est sufficiens,
ut firmitudinem vitalem dissolvat, adeo ut jam
quosdam ex nimia voluptate constet animam
exhalasse. Igitur omnes solidæ corporis partes
ex semine generantur atque nutriuntur. Quip-
pe quæque pars, ex qua primum facta est substan-
tia, ex eadem semper nutritur, quòd nutritio ex-
pletio sit substantiæ defluentis. Quapropter e-
tiamnum generari licet, quacumque à principio ex
sanguine sunt concreta: non generari autem
præterquam alicubi venam quandam, atque id
rarò, quibus sua ex semine generatio à princi-
pio contingit. Ut autem de vasis seminariis rur-
sus aliquid dicam, sciendum est, ipsa esse plena
semine, vel eo tempore quo animalia venere
non utuntur: id quod fieri potest trahentibus
ipsis genituram à testibus, & ipsis testibus etiam
ad illa eam relegantibus: idque per epididymi-
dem maximam, per quam scilicet mediam, con-
nectuntur ipsi glandulosi testiculi seminariis va-
sis. Imò verò si licet fateri quod verum est, e-
pididymis ipsa est principium & radix vasorum
seminarium, quæ ex toto testiculo semen in sei-
psam haurit.

*Excellens fœmi-
na, castrato
masculo assi-
milatur.
Testes trahere
humorem
serosum.*

*Vitalem spi-
ritum etiam ra-
picum humo-
re seroso à se-
minariis or-
ganis.*

*Coitu immo-
dico utentes,
eum imbecil-
iores reddan-
tur.*

*Voluptas vi-
talem firmi-
tudinem potest
dissolvere.*

*Solidas par-
tes ex semine
generari &
nutriri.*

*Nutritio est
expletio sub-
stantiæ deflu-
entis.*

*Spermatica
vasa esse sem-
per referta
semine.*

*Epididymis
est radix se-
minarium
vasorum.*

GAL. DE SEMINE LIB. I.

de Semine, lib. I I.

Porro testes muliebres adjacent quidem u-
tero, utrinque singuli, consimilem vasorum
involutionem, veluti ij qui in maribus sunt, su-
scipientes. Non procedunt tamen in eundem
locum hæc vasa, propterea quòd neque foras,
quemadmodum marem, sed in ipsos uteros o-
portebat fœminam emittere semen. Ideoque
veluti seminali meatui obviam euntes uteri, à
lateribus prælongos exortus extendunt, per
quos semen susceperant. Maximè verò plenum
est vas seminale in animalibus venerem appetē-
tibus: sicuti vicissim vacuum à recenti coitu. Ha-
bet etiam idem aliquando non modicam co-
piam,

*Fœminas non
emittere fo-
ras semē, sed
in ipsos ute-
ros.*

piam in ijs quæ ex lōgo temporis intervallo imprægnantur: in quarū sanè prælongis illis exortibus, quæ cornua appellantur, videbis manifestè humorem seminariū crassiusculum. Ad huc enim locum farciminalis membrana pervenit, nec non genitura crassa. Admirari autem subit etiam hic eos, qui dicunt vas seminale extra uterum habere ad aperta oscula, inferique in collum vesicæ, eodem quo in maribus modo, ac proinde fœminarum semen effluere. Cujus opinionis fuit assertor Herophilus. Neuter siquidē seminalis meatus, in ullo aliquo * fœmineo animali in ipsum vesicæ collum inseritur: imò neque in ipsius uteri collum: verū à lateralibus uteri partibus adnati, alter hinc, alter inde, ad summū perveniunt uterq; apicem, sine cornu, à sua parte situm: ibidem intra uterum effundentes semen, quod gravidis acervatur circa eū ipsum locum. In profusionibus autem seminis quæ per somnum fiunt, primum quidem in uterū ipsum illabitur, postea verò foras vacuatur.

Herophilus.

Seminales meatus in fœminis aperi-ri circa cornua, intra uterum, inibiq; suū semen effundere.

Fœtus formatio.

Itaq; in fœminis, tum vasa seminaria plena sunt semine, tum etiā testes. Quod si in utero ipsum muliebri semen cum virili misceatur cogaturq; & crassescat, tunc formatio fœtus continget, ut pulchrè Hippocrates tradidit. Potest etiam natura, ex solo muliebri semine farciminalē membranam gignere. Potest & alimentum familiare & primum, subornare masculo semini. Possē au-

Semen muliebri quid possit prestare.

Semen unū perfectū posse ex virili et muliebri conflare.

Pollutiones contingere fœminis vel absque mare.

tem ex utrisq; mistis unum fieri semen perfectū, Hippocrates opinatus est. * Sed quæ obsecro possibilia essent, si hæc forent impossibilia? Quod etiam fœmina ad venerem incitetur, vel maxime possibile est. In eis siquidem seminarii meatus pleni semine, excernunt ipsum, citra ullum congressum cum masculo: quin & seminis effusiones per somnum similiter ut mares patiuntur. Iam verò quod opificis opus sit, similem aut dissimilem alterutri ex parentibus fœtum effici-

Similitudo liberorū ad parentes consideratio.

cero, nemo ignorat. Pueros autē matri similes, ob alimentum illis assimilari, sunt qui contendunt, idq; producentes omnes alterationes, quæ tum animalibus, tum plantis, ob alimentū contingunt. Non intelligunt tamen, quod nullam earum alterationum, quas dicunt, possunt speciem alterantem ostendere. Neq; omnino præterea quicquam immutat forma ex specie animalis, sive plantæ: sed ex seminibus omnia tale principium habent. Quinetiam similitudo ipsa ex partium sit formatione, non secundum communem speciem, sed juxta insitas differentias ipsarum, Generantur autem omnia animalia ex semine & sanguine menstruo. Quandoquidem igitur fœtus utrisque parentibus assimilantur, commune habent principium, quod eos parentibus ipsis assimilat. Quippe fœtuū similitudo ad parentēs, secundum principium contingit. Quod si sic res habeat, aut ex semine, aut ex menstruo, similitudo fœtuū ad parentes oritur. Sed non ex menstruo, quum substantia eius utrique

Similitudo unde oritur.

Animalia omnia gigni ex menstruo, & semine.

parenti non sit communis: à semine igitur proficiscitur. Si verò ex semine oriantur fœtuū similitudines, necessarium utiq; fuerit fœminam semen emittere, quod multi pueri matri simillimi appareant. Scrutemur autem nos jam, an

Similitudinem oriri à semine.

quæ tandem sit causa, ob quam species animalis magis fiat secundum matrem: juxta alterutrum parentem ipsa similitudo: hoc tamen præmissio, quod natura quidem corpus præparat animæ moribus & facultatibus aptū, * sed quod mores & facultates habet, ex temperamento secundum substantiam insitos, unde etiam prima ipsorum est generatio. Contingit igitur ex his suppositis, tanquam fulcris, concludi, species animalium, ad subjectas generationi substantias, hoc est materias, cōsequi: & esse ipsum animal, aut equū, aut bovem, aut hominem, juxta substantiam ex qua factum est, & non secundum facultatem illius substantiæ motricem, formatricemq;. Cæterum nec semen ipsum facultas solum est, sed & materia quædam: nec menstruum materia solum, sed facultas. Ut enim semen ad materiale principium animalis inaximè cōfert, sic menstruum ad potentiale conducit. Est autem semen sanguis accuratè percoctus, à vasibus continentibus ipsum: unde sanguis non solum materia generandi ipsius fœtus fuerit, sed & semen potentia. Quod igitur ex materia simul & facultate unumquodque gignatur animal, omnibus in confesso est. Quod verò tum semen, tum menstruum habeat utraq; principia, nō tam æqualibus viribus prædita, sed tamen quidem effectivum fortissimū, materiale verò modicæ molis: menstruū autem materiale quidem plurimum, potentiale verò sive effectivum, maxime debile, id etiam est confitendum. Si ergo materiale gignendi principium, juxta quod species animalis absolvitur, in solo menstruo esset situm, fœtus utique exactè eiusdem speciei cum matre generaretur: quemadmodum etiam, si effectivum solum in semine esset, semper utiq; similis foret patri. Quando verò utrumque ambo ipsa principia habet, ac prædominatur in menstruo quidem materiæ copia, in semine autem facultatis, aut roboris: merito (opinor) speciem animalis à matre potius ipse suscipit fœtus, quam à patre, etiamsi ipsius semen ad materiale principium conferat. Similitudinem verò non magis juxta matrem, quam patrem, refert: quamvis quod ad robur quidem seminis attinet, fœtus patri magis assimilari oportebat. Verum genitura muliebris etiam ad valetudinem conferens, quum facultatem ex menstruo per novem menses prodeuntē assumpserit, tanto exuperat, quanto circa primum congressum exuperabatur. Propriū enim muliebri semini est, suā ipsius substantiā ac facultatem magis quam masculini, augere, atque corroborare. Non desunt qui, si fœmina non solum materiæ, sed etiam facultatis principium sit, supervacaneos esse masculos dicant. Quidam verò gallinarum hac parte mentionem faciūt, quæ subventanea & favonina appellata ova pariunt, citra mixturā masculinā. At Empedocles futuri fœtus partes divisas esse contendit, easq; partim in masculo, partim in muliebri semine contineri, atque inde etiam ipsius venerei complexus appetentiam oriri animalibus, nimirum divulsis partibus inter se uniri appetentibus. Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest. Quæ vero sit

Natura præparare corpus animæ moribus aptum. Mores generatio prima ex temperamento.

Species animalium ad subjectas generationi substantias cōsequi.

Semen effectivum facultatem materiam atq; materiam.

Menstruum autem materiale effectivum facultatem.

Semen quidem sanguis effectivus semen potentia.

Animal omnibus in confesso est.

Menstruum autem materiale quidem plurimum, potentiale verò sive effectivum, maxime debile, id etiam est confitendum.

Species animalis absolvitur in solo menstruo esset situm, fœtus utique exactè eiusdem speciei cum matre generaretur: quemadmodum etiam, si effectivum solum in semine esset, semper utiq; similis foret patri.

Quando verò utrumque ambo ipsa principia habet, ac prædominatur in menstruo quidem materiæ copia, in semine autem facultatis, aut roboris: merito (opinor) speciem animalis à matre potius ipse suscipit fœtus, quam à patre, etiamsi ipsius semen ad materiale principium conferat.

Similitudinem verò non magis juxta matrem, quam patrem, refert: quamvis quod ad robur quidem seminis attinet, fœtus patri magis assimilari oportebat.

Verum genitura muliebris etiam ad valetudinem conferens, quum facultatem ex menstruo per novem menses prodeuntē assumpserit, tanto exuperat, quanto circa primum congressum exuperabatur.

Propriū enim muliebri semini est, suā ipsius substantiā ac facultatem magis quam masculini, augere, atque corroborare.

Non desunt qui, si fœmina non solum materiæ, sed etiam facultatis principium sit, supervacaneos esse masculos dicant.

Quidam verò gallinarum hac parte mentionem faciūt, quæ subventanea & favonina appellata ova pariunt, citra mixturā masculinā.

At Empedocles futuri fœtus partes divisas esse contendit, easq; partim in masculo, partim in muliebri semine contineri, atque inde etiam ipsius venerei complexus appetentiam oriri animalibus, nimirum divulsis partibus inter se uniri appetentibus.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ vero sit

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest.

ro sit causa ob quam quū ipsum fœmineum animal etiam semen emittat, masculum tamen sit generatum: aut cur generato masculo, etiam adhuc servatum sit ipsum semen fœmineum, cōsiderandum. Præstabilius enim erat ipsum fœmineum animal habere excrementū conferens ad fœtus generationem. Quippe semē fœmineum, ex quo diximus gigni fœciminalem membranam, proprium ac familiare alimentum masculo semini existit, quum sit illo tū humidius, tum frigidius, necnon magis tenue. Quare perperam faciunt, qui frustra ipsum generatum esse pronunciant, impossibileq; esse fœminam utraque coacervare excrementa, contendunt. Melius siquidem eos modicè castigato sermone erat dicere, impossibile esse fœminam & sanguineum habere excrementū, & etiam semen prolificum, ut cui frigidi temperamenti ratione, superfluous sanguis accumuletur: fortiautem caliditate opus sit ad generationem seminis exacte elaborati & percocti. Est enim humidior atq; frigidior fœmina: calidior autē & siccior masculus. Unde meritō alteri quidem deest quid, ad exactam seminis concoctionem: alteri verō impossibile est sanguineum excrementum habere, præ caliditate & siccitate id ipsum totum siccante. Ob id igitur & animalia quę sicciori temperamento prædita sunt, ova generare solent citra convariationem masculi. Deest tamen his quippiam ad perfectionem, si non assumant ex illo caliditatem. Itaq; possibile est animo concipere tale temperamentum corporis, quod * imperfectum animal generet absq; alterius miscella. Perfectum verō in seipso id concipere, sanè difficile, & fortassis etiam impossibile est. Porro tale debet esse generativum semen, ut statim simulatq; est diffusum, substantia ipsius partim in membranam abeat, partim in vas distendatur, partim deniq; pulset. Quod igitur in plantis est terra, hoc est in conceptibus mater, alimentum suggerens, donec totum animal perfectè absolutum fuerit. Et quemadmodum plantarum semini largus ex terra humor, sic animalium semini, materia in maternis venis insitum alimentū existit. Dicere autem quis possit: Si juxta prædominans semen similitudinem particularum natōrum ad parentes fieri cōtingit, omnes partes alteri parentū necessariō futuras similes, cujuscunq; tandem semen prædominabitur: id quod secus apparet. Cæterum (ut discutiamus hætationem hanc) quum semen ipsum similarium partium existat, si fœmineum quidem in utero semini virili misceatur, possibile sanè est ipsa circa effingendos fœtus invicem prædominari, juxta partes diversas. Imò verò, etiam si dissimilarium partium ipsum semen existeret, posset tamen ex omni sui ipsius particula, pro ejaculationis modo alterata, omnes animalis partes efficere. Prædominatur autem juxta mixtionem in aliquibus quidem partibus semen masculum, in aliquibus verò fœmineum. At ubicunq; ipsum præpolleat, ea pars dominanti sit similis. Etenim in omni particula materię opifex simul adest, semenq; semper movet atque concinnat seipsum. Nihil itaq; miri est, utriq; parenti natos assimi-

lari circa diversas partes. Num igitur etiam sic de genitalibus partibus eandem assignabimus causam? quod ex ipsis hæc quidem masculina fiat, hæc autem prorsus fœminea? & quod masculus toto corpore à fœmina in universo animalium genere differat? Barba nanq; & cristæ, & calcæia, dentesq; exerti, necnon universa cornua, ut in cervis, masculorum sunt partes: secundum quas fœminæ maribus longè inferiores sunt. Differunt etiam ab illis secundum alias. Arteriarum tamen omnium atque venarum numerus, formatio, & positio, eadem est, per totum masculorum & fœmineorum animalium corpus. Opinari autem, masculum animal, ubi prævaluerit masculum semē, & fœmineū juxta fœminei seminis gigni excellentiam, satis probabile est: pugnat tamen cum hoc, quod fœminæ sæpenumero simillimæ patri gignantur, & ex masculis non pauci matri. Quod igitur masculus aut fœmina generetur, mihi sanè videtur causam ipsam tribui debere qualitatū activarum (quæ caliditas & frigiditas sunt) temperamento. Apparet siquidem masculus non solum calidior fœmina, sed siccior etiam statim à principio esse: atq; ob id, quàm illa tempore breviori ipsum formari traditur. Est autē siccior, quod citius accipit formam, quod nimirum ea quæ præ maximo humore diffuunt, vix effingi, aut formari queant, nisi prius cōpagem firmam habuerint. Ad hæc amplas arterias, & venas, & thoracem, & omnes partium cavitates habet quod est inflatū, * quandoquidem hoc à spiritu exuberanti & calido effici maxime solet. Quare & arterias majores & fortius pulsantes habet, ac totum corpus concitatum & vegetum ad motum aliaque id genus, quæ omnia non solum in jam æditis, sed in his etiam quæ adhuc gestantur in utero, signa sunt caliditatis prædominantis. Idcirco in dextro utero fere semper masculi gestari videntur, sicuti in sinistro fœmellæ. Sic etiam testiculus dexter magis succulentus, quàm sinister existit: priusque in pubertatis tempore inflatus, generatores masculorum efficit: sinister verò macrior, & posterioris tumescere incipiens, fœminarum genitores ostendit. Si igitur dextræ partes sinistris sunt calidiores fuerit utique hoc signum, masculū calidiorē existere, quem etiā esse sicciorē ostendimus. Quod verò ad calidum & siccum temperamentū consequatur actionum robur, omnibus est in confesso. Cur autem eiusmodi temperamento præditus, extrā pendentes habeat testiculos, & juxta ipsos pudendum prælongū, atq; ex nulla parte uterum, contra verò humidior frigidiorq; fœtus, testiculos intus habeat reconditos itemque uteros, atq; adeò totum pudendum intrinsecus, impræsentiarū venit nobis considerandum. Est enim proportio maxima inter genitalia masculi & fœminæ. Omnia siquidem genitalia membratum masculus, tum fœmina habere eadē videntur, positione tamen ac magnitudine differentia. Quin & vasa testes nutritia, utriq; sexui ex ipsdē venis & arteriis procedunt. Eandem etiā proportionem sortiuntur principia vasorū nutritiorum, cum ijs quæ sunt in scroto virorum.

Natos posse esse similes utrique parenti secundum diversas partes. Masculorum & fœminarum discriminem.

Generatio masculi & fœminæ, quæ caliditas & frigiditas sunt, temperamento. Qualitates activæ caliditas & frigiditas. Masculus tempore breviori formatur, quæ fœmina siccior est, quod citius accipit formam. Caloris prædominantis signa.

Masculi in dextro utero, fœmina in sinistro gestantur. Testiculus dexter masculos, sinister potius fœminas gignit.

Robur actionum consequi ad calidum & siccum temperamentum.

Genitalia masculi & fœminæ præportione sibi correspondere.

Semen fœminæ in utero masculi ali-

Fœminæ esse frigidiorē & humidiorē masculo.

Animalia siccioris temperamenti, solent ova gignere absq; mercede masculi.

Concipi ali quid perfectū animal absque alterius miscella, per difficile esse.

Semen prolificum, quale nam esse debet.

Semen, similarium partium existere.

rum. Nec verò nervorum principium utriusque; diversum est, sed ab ipsa medulla spinalis regionibus in maribus feminisque; procedit. Omnia ergo quæ genitales partes constituunt, in utroque; sexu existere apparet, in nulloque; penitus femininam à masculino, aut masculinam à femina, superari: sed uno solo differre, quod altera partes intus, altera foras existat. Quare si animo volutabis, quod in formatione animalis, quod hæret utero, genitales partes primam declinationem, & quasi adumbrationem intra peritonæum accipiant, postea verò emergant, sic utique; masculi animalis generationem didiceris. Atque in hunc sanè modum natura circa unamquamque; genitalium partem omne extrinsecus lineamentum, veluti septum munus effingit. Postquam verò opificij speciem delineavit, acervato spiritus impetu utens, simul & quod effectum est, propellit, & quod continet, & ambit, simul perumpit. Si verò aliquando circa ultimum opus debilitetur, ipsum quod moliebatur imperfectum relinquit: quemadmodum profectò circa totum talparum genus apparet, quibus lineamenta quidem oculorum intus expressa sunt, verum foras emergere non potuerunt, natura debiliore effecta, quam ut id efficere posset. Canes porro, cæcos catulos parere præ festinatione, in proverbio est. Satiùs tamè est ipsos recens editos catulos, imperfectos quam cæcos, dicere: utpote post paucissimos dies visuros. Nihil igitur mirum est, quemadmodum talpæ oculos intus habent, quos natura extra producere non potuit, eodem modo & genitales partes feminis intus effigiatas esse, & extrinsecus emergere non potuisse, propterea quod tota natura ipsarum debiliore, & imperfectior sit. Verum tanto sanè femineorum animalium natura perfectior est quam talparum, in quantum talpæ nullo cæcitatibus commodo fruuntur. Non parum verò ad generis propagationem femineum animal confert: nam & humidius & frigidius productum, recrementa secum connutriturum erat, ad alimentum foetibus ipsis idonea. Quum enim primi & recentis foetus compages liquidior sit & frigidior, tunc & principium formationis serius accipit, & finem adeò tardum & debilem, ut hæ partes foras emergere non possint. Et quum circa partes quæ postremum effigiantur, naturam delassari & debilitari contingat, absolvuntur etià aliis imbecilliores. Expellitur autem semper excrementum supervacaneum à fortioribus ad imbecilliores partes. Quia verò omnium feminearum particularum debilissimæ sunt genitales, ob id sanè in has supervacaneus sanguis pervenit, qui salubris quidè purgatio fit feminis, priusquam concipiant: tempore verò gestationis in utero, idonea materia in alimentum ipsis existit foetibus. Manifestum igitur jam factum est, in calidiori & ficiore temperamento masculinam generari: in frigidiori verò & humidiori, feminam. Speciem autem, sive animalis genus, hominem videlicet, leonem, atque equum, ad naturam materiam, in animalis generationem subjectam, consequi: quemadmodum sanè & formæ similitudinem ad utrumque; parentem, effigiantis ac formantis facultatis esse,

quæ in semine continetur. Quare trium similitudinum, tria principia habebimus: similitudinem nempe generis animalis juxta substantiam ex qua generatum est, fieri dicentes: formæ verò, juxta motum ex semine, ut eam quæ est, aut masculi, aut feminae, secundum utrorumque; principiorum temperamentum. Utraque; autem principia appello menstruum & semen. Ac de his hætenus. Deinceps aliquid & de astitibus glandulosis: quos quidem qui semen & continere & generare existimant, hallucinantur. Cur enim, si & hi seminis vasa sint, animalibus quibus testes execti sunt, deperit penitus coeundi appetentia? Impossibile quippe est, organa seminis generandi viribus prædita habere, ipsorum verò usum non habere. Natura etenim, quæ neque; inutilem, neque; supervacaneam aliquam particulam fecit, insitas facultates omnium corporis organorum, animalibus dedit, easque; nulla institutione edoctas, ad proprias actiones obeundas. Astites itaque; glandulosi ex testium castratione nihil perpeffi, castratum animal ad venereum consortium non excitant, ceu quidvis aliud potius existentes, quam organum seminale, & alterius cujusdam utilitatis gratia geniti. Porro duplicem omnium glandularum utilitatem esse, Optimus Marinus tradidit. Aut enim fulciunt vasa sublimia, quæ findi solent, & divulsionis periculum circa vehementiores motus sustinere: aut ob humorum generationem partes madefacere possunt, quæ humectatione viscosa, & ex natura dispersa indigent, ne facile resiccatae, pigre ad motum reddantur. Atque in hoc secundum glandularum genus, quod viscidorum humorum est productivum, inferi arterias & venas ait, & quasdam in vasorum mesenterii glandulas desinere. Duplex namque & harum glandularum genus esse, quod & utilitas duplex existat: densas quidem & siccas, quæ vasa quæ findi solent, fulciunt: raras verò & humectas, in quas vasa inferuntur. Si igitur & oris amplitudinem, & gulæ summum, & universum intestinum certæ quædam glandulae humectant, nihil sanè mirum est etiam collovesicæ simile quoddam auxilium præparatum esse, ne resiccatum aliquando, ægre mobile fiat. Ac multò magis verisimile est, hujusmodi auxilium ipsi virili pudendo à natura præparatum fuisse, propterea quod memorabilis magnitudinis in viris hæ glandulae existant. Periculum enim est, ne quum prælongum & nudum sit constructum pudendum, aliquando resiccatum obtorqueatur, & obstructus meatus ejus coniveat. In feminis sanè ipsum uteri collum nec prælongum nec nudum est: sed intus situm, & ex ambientibus ipsum & circumfictis multà humectationem suscipit: imò ex ipsis menstruis etiam irrigatur. Poterit fortassis & natura verita mordacitatem urinæ, hunc humorem veluti linimentum huic pudendi meatui præparasse. Si autem in astitibus glandulosis generaretur semen, castrata animalia ipsum utique; excernere appeterent: at qui appetere non videntur: palam igitur est, quod neque; generatur: id quod incussum debet nobis servari.

Similitudinem trium principia tria.

Astites glandulosi.

Natura in hi fecisse supervacaneam.

Glandularum duplex utilitas.

Glandularum duplex genus.

Pudendum virile.

Astites glandulosos constructas fuisse ad lenendam humorem suopenis aditatem.

Semen non generari in astitibus glandulosis.

GALENI PERGAMENI

de foetuum formatione, lib. unus.



Non est unus limitatus ac certus terminus foetibus. manifestae formationis, aut motionis, aut partus. Ceterum qui libellum de natura foetus conscripsit, sive is Hippocrates, sive

Polybus fuerit, genituram quam ubi sex diebus in utero mansit, foras prolapsa est in quadam muliere ait similem fuisse ovo crudo, cui adempta sit testa externa, & in cujus interna membrana pellucescat inclusus humor. At liquor ipse in ea genitura (ut autor ille recenset) ruber atque rotundus erat: in membrana aut ipsa fibrae quaedam albae crassaeque videbantur inesse, cum cruore crasso & rubro obvoluta, ac circa membranam foris etiam cruenta vestigia. Juxta cujus medium, tenue quid eminebat, instar umbilici, per quod sane extra & intra spiratio primum fieri apparebat. Quin & membrana quaedam genituram ambiens complectensque, tota ex illo protendebatur. In qua descriptione membrana genituram complectens, erat quae secunda appellatur. Albas vero atque crassas fibras, quas cum cruore crasso & rubro in se videbatur habere, generationis venarum & arteriarum lineamenta fuisse putandum est. Costat enim membrana ea ex numerosis arteriis & venis, conjunctis tenui & membranoso corpusculo. Principium autem generationis horum vasorum, ex arteriis & venis uteri existit. Quarum extrema, in internam uteri regionem oscula aperta habent, & per haec vasa sola

Foetus per quae vasa aligetur utero
Secunda quae parte continetur
Secunda vasa in duas venas & totidem arterias coire.

foetibus ad impraegnatas communio existit. Ex nulla enim alia parte secunda perforata est, imò neque contingit uterum, praeterquam juxta haec sola vasa. Reliquum vero spatium interjacentes, subtenditur quidem utero intrinsecus, at citra concretionem. Ipsa porro secunda vasa, angustissima quidem principia habent, per quae unita sunt osculis vasorum uteri. Secedentia autem ab ipso, in idem inter se mutuo remeant, veluti plantarum variae ac tenues radices, in principium trunci coeuntes. Sic siquidem totus ille partialium vasorum congressus in duas amplas arterias, ac totidem venas absolvitur. In quarum medio, meatus quidam appellatus uragus, hoc est, ductor urinæ, gignitur, in fundum vesicae ipsius foetus perforatus. Cujus pori alterum osculum, ubi à quatuor vasis segregatur, paulatim dilatatur, tenuem membranam farcimini similem generans: quae forinsecus alteri agninae nominatae membranae, in qua foetus continetur, praetenditur. Atque haec quidem extra foetum existunt. Partium vero quae ipsi foetui sunt propriae, prima omnium est cutis, ad tegendum corpus producta. Deinde consequenter sub ipsa, continua his quatuor vasis intra cutem partes, quarum nullam prius possibile est generari, quam omnia secunda vasa, per quae foetui nutritio contingit, in praedicta quatuor sint congregata. Impossibile siquidem est, in foetu aliquam generari particulam, citra substantiam sanguinis. Non tamen quae albae & exangues sunt partes, gigni ipso ex sanguine possunt, veluti generatur substantia hepatis. Celerrima enim generationem hoc viscus ex sanguine habet, utpote quod substan-

Vragus.

Farciminalis membrana oriri ab urago.

Agnina membrana foetus obvoluit.
Cutis.

Partem nullam in foetu gigni posse citra substantiam sanguinis.
Hepar celerrime ex sanguine generari.

tiam ipsi quae similima possidet. Reliquae partes omnes sanguineae longiori tempore indigent, ut gignantur. At venarum, arteriarum & membranarum corpus omnino ex angue quum sit, merito à semine primam habet generationem, nimirum praedito glutinosa substantia. Facta autem prima vasorum radicatione in osculis eorum quae in uterum tendunt, verisimile est ipsorum opificem, videlicet semine, alimentum ipsis suppeditare, trahendo ex utero sanguinem: paulatimque sic primum genita dilatari, in longum extendere, augereque: & sensim in idem coagmentare tenuiora, ad ampliorum generationem. Apparet autem ex his quatuor vasis, quae juxta umbilicum & porum qui ad uragum est, coagmentantur, statim ubi cutem foetus ipsius penetrarunt, alterum par vestigio uniri, atque sic unam magnam venam produci, eamque inseri in hepar. Nec vero existimandum est, quod praexistenti hepati haec inseratur vena, sed quod hujus ipsius venae rursus divaricatae & scissae, ubi introrsum penetrat, alteri quidem ejus fissurae, jecoris substantia innascatur: alteri vero, quae mesenterium gignit, adjungatur venter, splen, omentum, & intestinorum volumina, quum nihil horum antea extiterit, sed ad fissuram venarum coepta & congenita sint. Non tamen sic ipsae arteriae, ubi primum permeaverunt cutem, statim aut adnascentem sibi aliam substantiam habent, aut in multas partes scinduntur, sed quam diutissime duae permanent, & vesicam foetus perreptant, ibique firmatae, tum aliorum, tum ad corporis profundum feruntur, donec in ossa sacrum perveniant. Juxta quod duae arteriae apparent, quarum singulae ab utraque parte deferuntur in crura, maxima nimirum quae in spina est, & quae sinistro cordis ventriculo annexa cernitur, in ipsas divaricata. Cordi porro generando materiam, ex praegnanate, aut per arterias, aut per medium hepar suppeditari est necesse, idque secundum venam, quae ex ipso subliminis fertur ad supernarum hujus visceris partium generationem: id quod longum tempus desiderat. At vero in abortibus foetuum supra triginta dies, propè inter se sita manifeste apparent tria haec animalis membra, hepar, cor, & cerebrum: atque majus quidem utrisque, aliis hepar. Itaque possibile est invenire, quando cor principium suae formationis sortiatur. Quum igitur liberos de semine scripsi, cor similiter ut hepar circa primos gestationis in utero dies, veluti fundamentum quoddam generationis dixi obtinere, ex usu ipsius, qui in perfectis animalibus maxime insignis existit, ad hanc ratiocinationem productus. Ubi vero reliqua omnibus tum medicis, tum philosophis complacitum esse reperi, foetum usque ad manifestam effigiationem similiter gubernari ut plantas, mihi probabilius est visum, nullam generationis ipsius in principio utilitatem haberi, imò penitus hepate posterius ipsum formari: ex duobus his alterum necessarium judicans, aut ex emergente ab hepate sanguine, unam cum hepatide venam etiam cor ipsum gigni: aut per magnam arteriam, quae non solum spiritum, sed etiam sanguinem habet. Qui autem in commentariis de respirationis & pulsuum usu à me conscriptis exercitati fuerint, cognoscet foetum in principio generationis, quandiu ab unica anima, hoc est, à natura regitur, neque arteriarum,

Partes à semine ortae

Naturalium membrorum ortus.

Arteriarum secunda in foetum progressus.

Hepar videri majus aliis visceribus in prima generatione

Palinodia Galeni.

Cor hepate posterius formari.

Cordis generatio.

Foetus, dum à sola natura

regitur, nec arteriarum,

nec cordis formatione egere.

Fœtus comparatio ad stirpes.

neq; pulsuū, neq; cordis functione necessario e-
gere, quemadmodū neq; plātas. Porro quemad-
modum ubi plantæ semen in terram moderatē
calidā & humidā est coniectū, ex ipso statim du-
plex exortus videtur nasci, alter infra terrā, alter
supra terrā, qui progressu tēporis & crassescunt,
& in alios atq; alios exortus scinduntur, quos nu-
triri & augeri in dies cōstat, ferreq; tandē fructū
in extremitatibus suis, planta jam absoluta &
perfecta: sic fœtus primosūæ formationis tēpo-
re exiguū augmentum habet: quando verò ma-
nifestē in articulos digeri incipit, uberius: quē-
admodum maximū & uberrimū, ubi totus fue-
rit articulatus. Terminus igitur primi tēporis, in
quo fœtus nondū corde habet opus, mihi vide-
tur is esse, in quo jam universa fissura venarum
circa hepar est facta. Etenim ipsius magnę venę,
quā videmus per umbilicum ferri, universæ alię
corporis venę, tum partes, tū germina existūt: al-
tiore quidē porta (est enim duplex fœtibus) gra-
tia generationis omniū, quę circa hepar sunt, fa-
cta: inferiori verò, causa productionis illarum,
quę in ventrem, splenem, omentum, intestinaq;
disseminantur. Cōpleto autē hepate, ex venis qui-
dem juxta gibbū ipsius, veluti ex radicibus qui-
busdā stipes, coacervatur maxima totius corpo-
ris vena, quam cavam ob excellentiā nomināt.
Cujus venę altera quidē pars infra fertur juxta
spinam firmata, in renes ac lumborum regionē
quādā germina emittens: altera sursum per me-
diū thoracē in collum tendit, primò quidē obi-
ter in septū transversum, postea in membranas
succingentes thoracē, inq; tunicam cordi obvo-
lutam, ac deinde in dextrum cordis ventriculū,
inq; ipsum thoracem varios faciens exortus. Ex
quibus pars spinę & thoracis supra septū trans-
versum materiā generationis suscipiūt: quo tem-
pore etiam cor ipsum formatur. Eodē verò tem-
pore verisimile est etiam venas ex inferiori por-
ta in omnes partes circa ventrem fissas, his ipsis
fieri causam generationis. Formato corde, in i-
psū inferi potest prædictū par arteriarū, jam
coactū in unā, quod in media spina firmatū cer-
nimus, donec prope cor perveniat. Quū autem
duo cordis ventriculi sint, in dextrum quidē san-
guis ex hepate accedit calidus moderatē: in sini-
strū verò multò calidior, & tenuior eo, per dictā
arteriā fertur. Quare & ventriculos, & utraq;
materias jam habens cor, pulsabit utiq;, & arte-
rias eodem suiipsius motu movebit, adeò ut non
amplius veluti plāta, sed quemadmodū aliquod
animal, fœtus gubernari videatur. Inest autē pul-
sus corporibus calidis. Cæterum ut nullū exan-
gue animal est manifestē calidū, sic nec manife-
stē calidū, est exangue. Cor itaq; est inditū anima-
libus, veluti focus ignis: ex eo siquidē animalis
corpus majorem caliditatē acquirit ea, quę insi-
ta est à natura venis ac hepati, & sanguini in i-
psis contento. Quemadmodū autē cor posterius
hepate generari, consentaneum rationi erat, ob
idq; prægnātis utero est propinquius ipsum he-
par locatū: sic cerebrū adhuc longius quā cor
ab utero locari expediebat, utpote quū etiā stru-
ctura ipsius posterius sit producēda, propterea
q; neq; indiget fœtus qui in utero gestatur, cor re-

bro, quū nec voluntario motu aut actione, nec
sensu ullo aut exteriori aut interno habeat o-
pus. Posterius itaq; circa tertium temporis ordi-
nem, tum cerebrū, tum omnia circa faciem sunt
efformata, quo tempore universæ partes ad per-
fectionem suiipsius structuræ pervenerunt. Ma-
nifestum est autē, quod capitis os posterius om-
nibus aliis ossibus cōgelatur, confirmaturq; &
ob id juxta sinciput adeò tenue & imbecille est,
ut in recēs æditis puellis motū cerebri nō solum
tactu, sed visu etiam deprehendamus. Et jam
quartū tempus adest à primo conceptu, in quo
partes juxta motū posterius formatæ corrobo-
rantur: quam ob rem sanē infantes actiones ani-
mę nutritivę robustissimas possidēt. Secundam
in illis sibi vendicāt sedem actiones profectæ à
corde. Debilissimæ verò sunt quę procedūt à ce-
rebro, quū nec moveri, nec stare firmiter valeāt,
tantū abest ut ratiocinari. Postremum omniū os
capitis ipsis corroboratur, & enascūtur dentes,
& calva pilosa redditur. Postea verò unā cū or-
ganis absolutæ animæ facultates, actiones suas
obeūt. Arterias igitur & venas, necessum est pri-
mas omniū ex semine generatas esse. At circa fa-
cultates vitæ nostræ administrātes & gubernan-
tes, ratio ipsa postrema omnium & fit, & absolvi-
tur: quę quidē feliciter dispēsat res hominū, ubi
universa anima juxta naturam habet: infeliciter
verò, quū præter naturā emota fuerit. Jam verò
unde nam corporis actiones oriātur, facile ex di-
gnotionib; liquet. Prima igitur dignotio ex præ-
cisis, aut laqueo interceptis arteriis & nervis est,
in quibus partes quidē ex altera laquei parte, vi-
dentur pprias obire actiones, ex altera verò eas
prorsus amittere: ut si medulla spinalis (exempli
gratia) circa aliquem spinę locū fuerit dissecta,
nervi qdem supra regionem spinę, ipsi medullę
incumbentis, sauciata oriuntur, tum motū, tum
sensum cōservare videntur: q; verò infra, omnes
utrumq; amittūt. Unde liquet, eas facultates ipsi
spinali medullę supernè ex cerebro influere. Si-
militer quū arteria quocūq; aliquo vinculo exce-
pta, id qdem quod ex ipsa supra laqueū cōtinuū
cordi est, pulsare, veluti antea, appareat, altera
verò pars infra laqueū statim pulsū privetur: cō-
spiciū sanē etiam hinc est, arteriis principiū mo-
tus ex corde esse. Ad hęc, medullę quidem spina-
lis ac nervorum, per omnia eadem, quę cerebri,
substantia existit: quemadmodum & continen-
tium ipsa tegminū eadem etiā est cū involucris
ambientibus cerebrū. Arteriarū verò substātia,
nihil, ne ppē quidem, cordis habet: quemadmo-
dū neq; venarū, hepatis. De origine autem hepa-
titidis venę, dubitat sectoriæ artis periti. Ratio-
nabile autem est cōjectare, principia venarū in u-
tero, similia esse extremitatibus radicū planta-
rum: stipiti verò cuiuspiam, venam per umbilicū
in hepar procedentem assimilari: atque omnes
deinde venarum extremitates, quę in animali
videntur, ramulis, & non radicibus, consimi-
lem proportionem habere. Semen igitur opifi-
cis rationem habet, à quo vasā, per quā sanguis
ē prægnante attrahitur ad viscerum generatio-
nem, omniū prima generabuntur. Secunda au-
tem ab his, hepar, & cor, veluti fundamentum
domus:

*Calvariam post alia omnia ossa cō-
pingit.*

*Infantibus inesse robu-
rissimas na-
turales actio-
nes: anima-
les autem ad
modum imbe-
cillas.*

*Arteria &
vena prima
omniū ex
semine oriū-
tur.*

*Ratio, postre-
ma omnium
& fit, & ab-
solvitur.*

*Ratio quan-
do fœtus
suo fungitur
munere.*

*Actiones cor-
poris unde
orientur, di-
gnotio.*

*Cerebrum de-
mittere mo-
tricem facul-
tatem spina.*

*Cor esse prin-
cipium mo-
tus arteri-
æ substantia
cerebri, ner-
vorū, & spi-
nalis medul-
lę eadem.*

*Hepatitis
vena conside-
ratio.*

*Semen habe-
re rationem
opificis.*

*Generatio
quibus prius
& quibus po-
sterius acci-
dat.*

*Vena porta
duplex.*

*Vena cava
unde orta.*

*Vena cava
divisio.*

*Spina supra
septum unde
gignatur.*

*Cor quo for-
metur tem-
pore.*

*Ventris par-
tes unde &
quando gignuntur.*

*Cordis ven-
triculi duo,
quid et unde
recipiant.*

*Cor quando
pulset.*

*Pulsus inest
corporibus
calidis.*

*Ex angue nul-
lum esse ma-
nifestē cali-
dum.*

*Cor esse indi-
tū anima-
libus veluti
focus ignis.*

*Cor posterius
hepate gene-
rari par erat.*

*Cerebrum po-
sterius gigni
ipso corde.*

*Fœtus in u-
tero non in-
digere cere-
bro.*

domus: quo tempore & alia quædā finguntur: tum his vicina, tum inter hæc & uterum sita.

Substantiam partium non permanere, sed fluere, atque mutari. Quando verò neq; juxta quantitatem, neq; juxta qualitatem, substantia partium permanet, nimirum defluxu ipsarum magno quotidie fiente, & qualitate item multiformiter variante, auxilio utiq; inter se mutuo opus habent, quo & evacuat

Cor privatum spiratione moveri cessat. rigatur. Cor igitur postquam respiratione fuerit privatum, ipsum moveri cessat, & cum ipso totum animal perit. Privatur autem respiratione,

Respiratio à quibus causis inhibetur. non solum strangulatis, aut ob inflammationem partium circa asperam arteriam summam, obturato meatu respirationis, sed & nervis thoracem moventibus male affectis, quorum omnium principium est medulla spinalis, veluti cerebrum illius.

Nervi moventes thoracem à medulla spinali oriuntur. Quemadmodum igitur cerebrum cordi utile est, per nervos thoracem movens, quo distento quidem inspiratio contingit, contracto autem

Inspiratio ex piratioq; quo modo fiant. expiratio: eodem modo cerebro cor usum aliquem præstat, necnon his hepar. Cæterum propter hepar generati sunt renes, & vesicæ duæ: quarum altera bilis susceptrix in ipsum viscus ad-

Hepar gra-tia fuisse conditas renes atque vesicæ duas. nata est: altera verò, quæ lotium excipit, juxta renes locatur. At fæculenta hujus visceris excrementa repurgat lien. Quod verò & venter hepatis alimentum præcoquat, & intestinorum obvolutio gratia distributionis sit facta, admodum est perspicuum. Porro simul ut nata sunt animalia, ipsi

Lienis munus. partibus corporis suus usus adest. Apparet autem unumquodque animal illa corporis parte sese ad vindictam parare, quæ aliàs supereminet: ut vitulus quidem fronte impetere, priusquam cornua innascantur: pullus equinus calcitrare, nondum solidis ungulis: id quod videtur ostendere, animam utentem particulis, nosse ipsarum utilitatem, ut quæ ipsa illas construxit, & non ab alio factis utatur. Unum tamen solum est, quod mihi videtur artem opificis nostri manifestè indicare: quam ipsam artem si quis ingenuo & libero intueatur animo, impossibile est ut brutæ ac rationis experti fortunæ eam deferat. Quum enim sint in corpore nostro muscoli multo plures, quam à quibus partes circa voluntarias actiones moventur, unusquisq; ipsorum & figuram decentem habet, & magnitudinem, & caput & finem, & positionem, & nervi, venæq; & arteriæ insitionem, ita ut pro magnitudine & loco insitionis, hæc ipsa quadrent. Atqui si trecentarum partium structuræ singulæ, decem habeant scopos, appareantque omnes partes ritè absolutæ, omnes utique scopi ter mille numero fient. Quum autem æqualis etiam sit numerus musculorum in sinistris partibus ad eos qui in dextris sunt, veluti etiam arteriarum ad arterias, & venarum ad venas, ac deniq; nervorum ad nervos, utiq; ipsi ter mille scopi geminabuntur. Idem etiam in ossibus est, pluribus existentibus ductis. Nam & in his, singulorum scopi plures quam quadraginta fiunt: quos geminatos palam est plures futuros octonis millibus. Eadē ars & circa omnia viscera existit, & omnino circa quancunq; partem: ut si quis structuræ scopos numeret, in aliquot decies millenarios, numerus ipsorum excreseat. Hos itaq; scopos haudquaquam

Ossa corporis plurimam ducentia.

Natura scopi circa corpus fingendum.

ipse crediderim citra sapientissimum, eundemq; potentissimum opificem factos esse. Quis verò hic sit, pronunciare non audeo, præ consilij inopia obmutescens. Supremam enim video in formatione sapientiam & potestatem: neq; animam in semine plantatitiam quidem ab Aristotele, appetitricem verò à Platone, ab Stoicis denique appellatam naturam, foetum ipsum formare existimo, quum non solum non sit sapiens, sed & penitus bruta & rationis expertus: neq; rursus discedere ab hac opinione valeo, propter natorum ad parentes similitudinem: apparet enim animam corpus formantem, ex parentibus in ipsum foetum transfundi, ceu contentam in semine. A rationali verò anima, quæ post partum per omnem vitam se ostendit, recedo, propterea quod ante corporum dissectionem non cognoscamus, neq; partes corporum, neq; ipsarum actiones. Itaque dubitare me, consilijque inopem esse fateor, de opifice foetus causa, non secus quam de substantia animæ, quum de his nullam opinionem scientificè demonstratam repererim. Hoc verò ut possibile pronuciare potero, videlicet universum corpus, ubi jam efformatum est, per omnem vitam tribus principiis motuum gubernari atq; regi: eo quod ex cerebro est, per nervos & mulculos: quod ex corde per arterias: quod ex hepate, per venas. Ex quibus autem principiis hæc fiant, hæcenus nihil habeo quod pronunciare intrepide possim.

GALENI PERGAMENI de Septimestri partu, Liber unus



EX seminis cōceptionibus (sine quarum observatione fieri minime potest, ut idoneum pariendi tempus quis ritè inveniat) plerasque mulieres gravidas in medio temporis spatio, intra centum nonaginta dies, & ducentos, peperisse animadverri: paucas tempestivius, aut tardius: nullas planè celerius centesimo & octogesimo secundo die cum dimidio, & quibusdam horis, vel post exactum quartum supra ducentessimum. Jurè igitur septimestris partus ædendi, primus terminus esse censetur dimidij anni tempus: quum nimirum tempestivius nulla partum ædiderit, sed tardius omnes. Tempus autem id centesimo & octogesimo tertio die, minus quibusdam horis absolvitur. Atque ego unam semel mulierem reperi, quæ centesimo & octogesimo quarto die completo peperit. Diem impræsentia appello, intervalum vigintiquatuor horarum æquinocetialium. Sic enim & anni trecentis & sexaginta quinque diebus, & quarta insuper diei parte constare dicunt: tempus verò menstruum, circiter viginti novem cum dimidio. Nimirum mensem appellari spatium id, quod ab uno lunæ congressu cum sole, usque ad alium mox sequentem interest, omnibus in confesso est. Si enim triginta diebus quilibet mensis constaret, non imestres foetus exactè usque ad ducentessimum septuagesimum diem utero gestarentur, quod non fingit. At annus dicitur tempus illud, quod

Coditoris magnifica commendatio

Animam plantatitiam esse brutam, & rationis expertam.

Rationalis anima non formatur.

Gaenus fatetur se dubitare de opifice foetus causa, & de substantia anima.

Principia motuum trium corporis regentia.

Septimestris partus ædendi primus terminus.

Dies quid.

Annis quatuordecim constet.

Menstruum tempus.

Annus quod tempus dicatur.
Signū quid.
Hippocratis de septimestri fuerit sensum.
 ab uno signo solem in idem signum restituit. Signum autem ipsum impræsentiarum pro puncto capitur. Porro Hippocrates, septem quidem menses septimestri fœtui constituit: ex quibus quinque esse integros ait, qui inter primum & septimum medij habentur: duos autem deficientes, nempe primum & septimum: at non ita deficientes, ut supra dimidium eis deficiat. Mensis enim dimidium, est dierum quatuordecim cum dimidio, & quarta adhuc diei parte: 10 quamobrem primi mensis & septimi tempus, prædicto hoc erit majus spatio. Si igitur primi mensis tempus à conceptu vicesimum diem excedat, sitq; verbi gratia dierum viginti trium, quum sequentes quinque menses centum & quadraginta septem dies supra diei dimidium contineant, tempus sanè id, quod ex utrisq; conflabitur, dierum erit 170. cum dimidio. Septimester autem fœtus ab eo tempore, quindecim, ad 20 minimum, actis diebus, in lucem produci poterit. Necesse quippe est, ut si sextum mensem partus debeat excedere, septimi plus quam dimidium attingat. Qua ratione omnes hi in universum dies erunt 185. cum dimidia adhuc diei parte. At sicuti citius his præscriptis diebus septimester infans ædi non potest, ita neq; omnino tardius ducentis. Si enim centum & septuaginta diebus cum dimidio vigintinovem adicias, omnes simul centum & nonagintanovem cum dimidio erunt. Fingamus rursus mulierem 30 prioris mensis dies 28. gessisse utero: qui sanè dies si adjiciantur quinque subsequentium mensium diebus 147. cum dimidio, atque his insuper septimi mensis dies 29. accedant, universum hoc tempus quatuor & ducentis diebus ac insuper dimidio constabit. Quia verò in maximis distantis primus & septimus extiterunt menses, infantem hunc non esse vitalem, Hippocrates proficitur. Quod autem ad mensem lunarem pertinet, in minori etiam tempore quam sit anni dimidium, fœtus septimester ædi posset: quod jam ostendam. Qua enim ratione necesse est ut septimester partus anni saltem dimidium attingat, ea nimirum ante centesimum & octogesimum secundum diem, & 15. horas, vel circiter, vitalis nullo pacto existet. Quatenus autem si dies ad menses lunares exactè computentur, prius etiam eo tempore liceat fœcundum partum existimare, nunc declaro. Fingamus enim primo mense mulierem sexdecim dies utero gestasse: post 50 quinque autem subsequentes menses, pariter sexdecim dies: quippe hac ratione tempus id omne 179. dies cum dimidio explebit. Verum in minori intervallo quam sit anni dimidium, septimestres fœtus vitales ædi negat Hippocrates. Atq; idcirco tum primi, tum etiam septimi mensis plus quam dimidiam partem fœtum attigisse est necesse, priusquam ædatur in lucem.

LIBRI DE FORTUM FORMATIONE FINIS.



On modo perceptionem odorū, *Olfactus de*
 sed etiam facultatē, cujus est odor *quibus dicatur.*
 rem percipere, medici olfactū appellunt. Secundum autē utrunq; significatum, unum est instrumentum * olfactus, quo facultas ea sibi sensibilia apprehendat. Porro si ipsos nasi meatus aliquo odorato unguento repleveris, nunquam prius senties, quam aërem inspiraveris: & ob id nonnullis videtur nasum viam esse olfactilium: id *Nasus est via olfactilium.*
 verò corpus cujus est odores percipere, interiorius esse situm. Scire autem oportet, quod quum nasus septum medium habeat, & duos hos omnibus patentes meatus, utraque nare alterum, supra mediam nasi regionem uterque *Nasi meatū utriusq; bipartiti.*
 eorum bipartitur, ita ut pars quidem altera, in interiores oris partes declinet, altera vero rectā se ad cerebrum conferat. Nam sunt ibi duo quoque ipsius exortus oblongi, & cavi, qui ex *Cerebri exortus versus radicem nasi.*
 anterioribus cerebri ventriculis suam ducunt originem. Hi in eam calvaria partem descendunt, unde exoritur nasus: ibidemque ea ossa habent sedem, quæ colatoria vocantur. Sed & crassior *Colatoria ossa.*
 membrana, qua parte hæc ossa attingit, exilibus quibusdam foraminibus est pertusa. Unde per eam primum, dein per jam dicta ossa in meatus illos excolantur crassiora excrementa cerebri. Nam quæ similiora vaporibus sunt, per calvarie futuras vacuantur. Extensa insuper est universis illis *Nasi tunica.*
 nasi meatibus exanguis quædam tunica, crassior quam sit membrana: atq; ea quidem illi continens est, quæ ori, linguæ, gutturi, faucibus, asperæq; arteriæ, & gulæ subternitur. In hanc autem tunicam à cerebro nonnulli nervi inferuntur, parvi quidem omnes, præter illos qui deferuntur in linguam. Satis quippe crassi sunt, hi, quæ *Lingua nervi.*
 ea particula copiosiori etiam egeat sensu, utpote genita ut existet gustus sensorium. Ob hoc ipsum natura oculis impertita est nervos, eosque longè crassiores illis, qui ad linguam attinent: & secundum hos, auribus, atque ori ventriculi, quod & ipsum sensu egebat quamplurimo. Oculus itaque visus est instrumentum: auris, *Sensus instrumenta.*
 auditus: lingua, gustus: appetentiæ verò cibi & potus, ventriculus, & præsertim os ejus. At verò tactilem facultatem, quod ad cognitionem spectat, natura cæterarū crassissimam fecit: quam *Tactilem facultatem esse crassissimam omnium.*
 uni definito loco, sicuti alias omnes, minimè adscripsit, sed per corpus universum disperfit: ac *Tactilem facultatem esse per corpus disperfam.*
 proinde plures illi nervos exiliores, durioresq; & qui magna ex parte ab spinali medulla oriuntur, indidit. Eis verò quas recensuimus particulis, utpote quibus ampliori sensu erat opus, majores, & molliores, & omnes à cerebro prodeuntes, dedit. Jam igitur instrumentum visus, ad *Visus instrumentum lucidum.*
 quod solum pertinet luminis atque splendoris sensus, quammaximè effecit lucidum: aëreum *Auditus instrumentum aëreum.*
 verò auditus, cujus erat eos percipere sonos, qui cum aëre feruntur. Linguam præterea ex humidiori corporis specie construxit, ceu instrumentum futurum, quo succi omnes discernentur.

facile sensibile
facile
substantia
*in-
strumentum*
terrestre
Odoratus
sensorium
et a-
rosam exi-
ere.
Olfaciendi
sensorium neq;
esse nasi pellic-
ula neq;
os
item eius.
Inspiratio
modum.
Olfaciendi sen-
sum in ante-
rioribus cere-
bri ventricu-
lis situm esse.
Nigellam o-
leo intritam
et inspiratam
commodè ster-
nutamenta
movente iis
qui laborant
coryza.
Cerebrum in
calefcere con-
tento spiritu.
Odorem refri-
gerantis con-
ferre capiti
exusto.

At verò sensibile id quod sibi olfactus ascivit, inter aërem humoremq; & ignem est medium. Nam id quod à singulis corporib. diffluit, ipsa est olfactilium substantia. Quum autem pro suorum sensilium similitudine, instrumentum unum quodque à natura paratum sit (instrumentum quippe visus, humidum ac pellucidum est, tactus verò, terrestre & durum) sensorium sanè quo percipiuntur odores, opus est ut vaporosum existat. Quare neq; os nasi, neq; item mem-
 brana illa cuius nuper mentionem fecimus, sensorium esse possit olfactus, quum & dura corpora sint: neque tantus eis insit aut talis nervus, quantum & qualem olfaciendi facultas postulat. Nervus etenim qui visui inservit, quamvis ad crystallinum tantum pervenit corpus, eo longè major est, qui defertur ad os ventriculi. Extrema & interior pars illius auditorij meatus, ubi situs auditus est, quanquam brevissima sit, crassum tamen est nervum adeptum. Nec
 lingua quoq; exiguorum nervorum, ex iis qui à cerebro oriuntur, esse videtur particeps. Quàobrem haudquaquam verisimile est, facultati olfaciendi tributum esse à natura tam exiguum sensorium, ut est ea nasi pellicula. Nam quod pertinet ad os nasi, tantum abest ut sit odoratricis facultatis particeps, ut tactrice etiam careat. Sed ex hoc etiam, quòd eo tantum tempore quo spiritum introducimus naribus, ipsos odores percipimus, planè constare videtur, neque ossa, neque tunicam nasi, neque eam quæ palatum, guttur, ac fauces vestit, sicuti nec colatorium meatum, esse odoratus sensorium, sed aliquam aliam particulam interioris sitam, atque in penitioris corporis sede delitescentem. Porro ubi pectus à musculis dilatatur, pulmones sequuntur ipsum: quos subinde externus aër per asperam arteriam, guttur, os, atque etiam nares, continuatione quadam, subsequitur. Potest autem cerebrum, quum inspiramus aërem, & ipsum sua actione, & suis etiam quibusdam quasi germinibus, pectus dilatans, aliquid in suos sinus attrahere. Fieri etiam potest, ut ipsum quod alia movet, sibi quoque levem aliquem motum, tum in seipsum, tum verò ex se præstet. Coarctatur enim dum sese contrahit: quum verò undique se dilatat, funditur: atque ita externus aër, ex continui ratione, illud, quum se retrahit, subsequetur: sicuti etiam dum diffunditur, efflabitur. Quòd igitur olfaciendi sensus in anterioribus ventriculis cerebri situs sit, multis rationibus sum adductus ut credam. Primum, quòd illos qui capitis gravedine, ob cerebrum crassis vaporib. oppletum, tenentur, atq; inde obtusius olfaciunt, sternutamenta præcipue jument: qualia ex nigella oleo intrita inspirantibus ægris, & capite resupino instillare naribus soleo, idque prius ore aqua repleto. Ad hæc quum cerebrum contento spiritu repleatur, incalescatq; consentaneum rationi videtur, expirationem ad ea quæ noxia sunt excutienda, inspirationem verò ad refrigerium illi summè conducere. Tertiò autem, quòd in eis quibus exustum est, aut excalfactum caput, tum rosarum, tum aliorum refrigerantium odor, manifestè remedium

calori adferat. Instrumentum itaq; olfactus, minime in illa nasi pellicula, sed interius reconditum est: ita tamen, ut foraminum nonnulla eò perveniant, quæ neq; etiam perpetuò ad aperta sunt, sed habent opércula quædam membranosa & tenuia. His igitur * per inspirationes violentia spiritus referatis, patet rei sensibili aditus ad eam particulam, cui vis illam dignoscendi indita est. Quare non quemadmodum palpebrarum motus pro nostro sit arbitrato, sic meatus illi opera nostra aperiuntur, quum nullum habeant voluntarium motum, imò nec naturalem, nec dilatentur etiam ab instrumentis quæ inspirationi deserviunt, sed à solo per inspirationem insiliente aëre. Nisi autem per inspirationem cerebrum dilatetur, expellaturq; ab eo antea contentus spiritus, fieri non potest, ut aër ad ipsum per dictos meatus irrumpat, quamvis sit is vehementissimè illatus: licet ipsius aëris occursum, tunica in qua ij meatus descendunt, facile sentiat. Quare si secundum nares meatus olfactorij consisterent, aperirentur utiq; in maximo aëris impulsu: quibus adaperitis, subinde odoris sensus subsequeretur. Non subsequitur autem, ergo nec secundum nares meatus olfactorij consistunt. Ad hæc, si meatus ullos secundum nares ad odores percipiendos extruxisset natura, utiq; non obstruxisset illos: quemadmodum neq; eos qui in auribus sunt: quum longè præster quencunque sensum semper esse ad sua sensilia apprehendenda promptum, quam solum eo tempore quo fit respiratio. Neque ob eam causam natura oculis operimenta palpebrarum apposuit, quòd melius non sit eos usquequaque operari: sed quòd molles illi sint, ac proinde expositi, facile possint à rebus extrinsecus occurrentibus lædi. Juvant etiam palpebræ ad capeffendum somnum. Nemo siquidem in aëre lucido reclusis oculis potest dormire. Quare & illis animantibus, quibus nullæ sunt palpebræ, foveas quasdam natura indidit, quæ totos oculos, ubi somnus urgeret, quasi in cubiculo receptos, admitterent. Est enim id naturæ institutum, ut in suis functionibus perpetuò sensus versentur: etsi rei cuiuspiam utilioris oblata occasione, interquiescere aliquantisper cogantur. Nequit autem animal dormiens, sensus integrè sentientes servare. Nam quæ simul esse non possunt, ne Dij quidem omnes, etiam si velint, conjungent. Quòd si eodem fuerint extructi modo ipsi olfactorij meatus, quo ait Aristoteles, erunt potius damno non levi, tantum abest ut allaturi sint nobis ullam utilitatem: nimirum nos per maius vitæ spatium sensu olfactus privantes, quod in nullo alio factum fuisse unquam vidimus. Porro sternutamenta, capitis gravedini auxilio sunt. Fiunt autem, quum maximas inspirationes progressas, quam celerrimè efflatio subsequitur. At efflatio nem voco * cōfertim factam expirationem. Unde si per sternutamenta nihil excernatur à cerebro non solum non levant ipsa capitis gravitatem, sed magis etiam repletionem eius accumulunt. Cæterum ægrotis ad solem conversis, proripimus sternutationem: quia vaporosus in cerebro spiritus ab eo funditur. Exturbant porro

Olfaciendi ra-
tio.

Palpebrarum
usus.

Palpebras in-
tere ad ca-
peffendum som-
num.

Aristotelis
sententia de
olfactoris
meatibus co-
sutatur.

Sternutamen-
ta auxiliari
gravedini.

Efflatio quid

Sternutatio
provocatur
ad solem.

Sternutamentorum usus. Odores & heuiores caput replere. crassiores & lentos de cerebro mucos sternutamenta, eos unâ cū spiritu excusso explodentia. Quod autem ab odoribus vehementioribus caput continuò lædatur, repleaturq; , atque reddatur gravius, ac nonnunquam excitetur delirium, id rectè argumento est, portionem aliquā substantiæ illorū eò insilire: alioqui ex sola qualitatis cōmunionē nunquam ab effectibus ad eò repentinis & validis caput arriperetur. Si igitur respiratio uniuersa à cerebro ea de causa æditur, ut in corde seruetur quidam caloris modus, cur sibi quoq; non administrabit id ipsum, quum suapte natura facillimè à rebus tam calefacientibus quàm refrigerantibus lædi possit? Aut cur natura congenitam quandam motionē cerebro non tribueret, qua inspirando se ventileret atq; excitaret ad pulsū: expirando verò pituitosa & mucosa excrementa à se abigeret?

GALENI PERGAMENI

de ossibus, ad Tyrones, Liber unus.



Osium natu- ra & munus. Osium differe- rentia. **X** ossibus singula, qualia sint, & quam inuicem structuram habeant, nota esse medico debent, si rectè ea vel fracta, vel dimota sua sede, sit curaturus. Quare in omnibus quæ ad medicinam pertinent, id quod secundum naturam est, tanquam scopum semper habere conuenit. Sunt autem ossa inter animantis partes durissima & aridissima, necnon terrestria maxime: quæ quidem ceu fundamenta quædam, totam molem corporis sustinent, atque stabiliunt. Eorum tamen quædam grandia & ampliter cōcava, medullosa quæ sunt: quædam parua, & solida, ac sine ulla medulla. Grandibus magna ex parte in extremo, aliorum ossium appendices adnascuntur: ut puta, humero superius, cubito inferius, radio verò ac fœmori, itemque tibiæ ac suræ, infra supraque. Maxilla inferior medullosa est, adnascensque appendicis expers. Sed ex ejus extremis partibus, quæ infra est, unitur per symphyisin, hoc est, coalitum. Suprà in duos processus, in coronem videlicet, quæ in acutum tendit, ac cervicem tantum, definit. Porro compactio humani corporis ossium, sceletos appellatur. Cæterum alia per articulum, alia per symphyisin ossa junguntur. Articulus enim naturalis ossium est compositio: at symphyisis, naturalis unio eorundem. Articuli differentia sunt duæ: diarthrosis, & synarthrosis, 50 Dicitur quidem diarthrosis, ossium structura, quorum motus est evidens. Synarthrosis verò ossium quoque compositio est, quæ obscurum invalidumq; habent motum. Diarthroseos est triplex species, Enarthrosis, Arthrodia, & Giglymos. Enarthrosis, quum excipiens cavum, admodum altum est, caputq; quod in id inseritur, oblongum. Arthrodia verò, quæ cavum leniter & in superficie, & capitulum etiam depressum habet. Ex cavis capitula ipsa excipientibus, 60 quod altius descendit, cotyle, hoc est, acetabulum: quod in superficie situm est, Glene à nonnullis appellatur. Giglymus est, dum ossa sese inuicem ingrediētia, conjunguntur: quemadmodū vertebrae inter se, ac humerus cubitusq; alligantur. Sy-

throseos quoq; triplex habetur species: Sutura, harmonia, & gomphosis. Sutura compositio quædam est, ad consutarum rerum similitudinē. Harmonia verò ossium structura est per simplicem lineam. Gomphosis, quum instar clavi ossa infigitur. Symphyisis dupliciter differt. Nam alia inter se inuicem ossa, ut molliora: alia aliorū interventu, ut duriora, coalescunt. Hujus differentia ultimæ, tres sunt species, Synchondrosis, Syn- 10 neurosis, & Syssarcosis. Quia verò ipsa occasio se obtulit, nonnihil & de nervis dicamus, quorū tres sunt species. Qui enim ex cerebro, & dorso medulla oriūtur, voluntarij nervi: qui ex muscu- 20 lis, tendones: qui ab ossib. ligamēta appellantur.

DE CAPITIS OSSIBUS. CAP. I.

Capitis ossis considerati- Capitis natu- ralis figura. **O** Scapitis calvaria dicitur, estq; futuris distinctū: quarū numerus posituraq; , pro capitis figura variatur. Naturalis capitis figura, ad oblongæ sphaeræ similitudinē structa est: habetq; priorem & posteriorem partem prominentiorem. Ac tali quidem capiti tres insunt futurae: duæ quidem transversæ, quarum altera in occipitio est labdoeides, ad similitudinē Λ literæ sic appellata: in sincipite altera, quæ coronalis vocatur: ac tertia, quæ à posterioris medio, per capitis longitudinem, ad mediam usq; anteriorem, extenditur. Harum futurarum figura H literæ præcipuè similis est. At quæ figura fastigatio est vertice, ea quidem vituperatur. Atq; ubi in ipsa quidem posterior eminentia perit, futura labdoeides aboletur. Si anterior nō adsit, coronalis etiam futura deperditur: sitq; utraq; remanentium futurarum figura T literæ similis. Harum autem utrinq; eminentia deperdita, geminæ quæ servantur futurae, ad rectos se inuicem angulos interfecantes, X literæ similitudinē referūt. Nanq; altera quidē transversa per medium potissimū caput extēditur: altera à parte posteriori per longitudinem in priorem, uti in ceteris calvariis omnibus, tendit. Hæc quippe semper servatur: reliquæ cum totius capitis figura variantes interci- 40 dunt. Duæ quoq; ab hac æquè distantes lineæ super aures feruntur, duobus inter se ossibus, non per futuram, sed per appositionem, squamarum instar, cohærentibus: ob idq; lepidoeides vocantur. Quo fit, ut quinque peculiares futurae sint capitis: Labdoeides, coronalis, & quæ recta per longitudinem fertur, ac duæ illæ ab hac æquè distantes, quas lepidoeides appellant. Sunt & duæ alia communes superiori maxillæ, necnon ossi sphenoeidi, quod cunei similitudinē referat, appellato. Id autem os apophyses quasdam sortitur, quas ab alarū similitudine pterygoeides vocant: eaq; utrinq; sunt concavæ. Alia autē futura capitis, quæ ipsum à superiori maxilla dividit, ex cavis temporis initiū sumit: inde ad oculorū sedes procedit, perque eos medios tendens, juxta mediū superciliorū sibi ipsi jungitur. Sex itaq; in universum sunt totius capitis ossa, idēq; sphenoeides excepto: duo scilicet sincipitis: duo itē petrosa, unūquodq; videlicet ad suam aurem: quintū os occipitis: sextum deniq; frontis. Sunt porro sincipitis ossa quadrilatera: quæ verò juxta aures hærent, trium laterū sunt. Os occipitis, maximum omnium quæ sunt in capite, foramen juxta pri-

*Ossium capi-
tis differentiæ*

tra primam vertebram habet. Horum aut sex
que diximus, incipitis ossa rarissima & infirmis-
sima: occipitium densissimum, firmissimumque;
medium inter hæc ipsa, os frontis habetur. Re-
liqua utrinque; ad aures posita, multifariam se ha-
bent. Namque; horum pars, quia petrae speciem re-
fert, lithodes vocatur: id os, protensis labdo-
dis futurae finibus terminatur. In eo stylocides
(quia columnæ est similis) processus inest, in eo-
demque continetur auditorius meatus. Altera
deinceps pars, iuxta eos exortus habetur, quo-
rum unus mamillaris dicitur: alter ossis jugalis
est. Præter hanc tertia quoque pars à tempori-
bus occupatur.

*Columnaris
processus.*

*Mamillaris,
exortus.*

*Jugalis ossis
consideratio.*

Zygoma.

*Maxilla su-
perioris su-
tura.*

*Maxilla ossa
terna.*

*Nasosium
consideratio.*

DE OSSE JUGALI. CAP. II.

Temporis musculo præpositum est os, quod
transversam in medio futuram habet: eiusque;
posterior pars omnis, cum capitis osse quod iuxta
aurem habetur: anterior, cum parte supercilii ex-
trema, ad parvum oculi angulum continua-
tur. Id os totum Zygoma, à nostris jugale ap-
pellatur.

DE OSSIBUS SUPERIORIS MAXIL- LÆ. CAP. III.

DE futuris quæ in Maxilla superiori continen-
tur, dicamus: quarum prima sub osse jugali exor-
itur, cujus pars posterior tendens, sub eiusdem
ossis concavo desinit, ibique; cum communi sphe-
noide ossis futura committitur. Altera partim
rectè, partim oblique sursum ad oculorum se-
des procedens, per medium illorum ambitum
inferiorem fertur. Mox ibi tripartito scinditur.
Altera enim pars, magnum prope angulum, ex-
teriore in parte ad medium superciliorum pro-
cedit. Quæ deinceps huic succedit, per concavum
sub eodem angulo ad communem capitis futu-
ram pertinet, eademque; angulum ipsum compre-
hendit, & illi quoque; naturale foramentum subje-
ctum, quod omnium quæ sunt in eo loco fora-
minum maximum est. Sub dictis duabus futu-
ris, tertia pars antedictæ scissuræ, inferiorem in
sede oculi ambitum inscendens, interius ad imum
tendit, ibique; communi capitis futurae jungitur.
Quare terna maxillæ ossa ab utraque; parte censen-
tur. Quorum habetur maximum, quod iuxta ju-
gale situm est. Deinceps situ & magnitudine os
illud in oculo ipso habetur, quod nervos ad su-
periores maxillam continet. Minimum omnium,
iuxta magnum oculi angulum est locatum. His
tribus ab utroque; latere os unum insigni magni-
tudine subjacet: cuius os mali, dentiumque om-
nium, exceptis incisoriis, alveoli, partes sunt.
Hæc autem ossa discernuntur futuris quatuor.
Adjacent verò & his maximis ossibus duo alia
exigua, quæ scilicet nasi foramenta ad palatum
tendunt.

DE OSSIBUS NASI. CAP. IIII.

Nasi quoque; ossa duo sunt, quæ futuris à medio
superiliorum descendentes, discernuntur. His
ossibus inferiore in parte cartilaginea tenuiaque
corpuscula (alas vocant) ab utroque; latere adna-
scuntur. Omnis in Maxillæ superioris extre-
mo, os unum, in quo dentium, qui secant, radices &
alveoli continentur, id quod nonnulli simplex,
nonnulli compositum esse tradunt: quemadmo-

dum in superiori maxilla, alii quindecim, alii
tantum ossa octo numerant.

DE DENTIBUS. CAP. V.

Dentes in ossium numero habendi sunt, qui
sexdecim in utraque; maxilla existunt. Eorum au-
tem priores quaterni, quod secant, *canines* appella-
ti, nituntur radicibus singulis. Deinceps illis ca-
nini hærent utrinque; quibus singulæ quoque; radi-
ces insunt. Ultra hos maxillares, quini ab utroque;
latere: sed qui maxillæ superiori infiguntur, ter-
nis: qui inferiori, binis radicibus majori ex par-
te adhærescunt. Nonnullis autem non utrinque
quini maxillares, sed quaterni senive oriuntur.
Eos non maxillares modò, sed molares etiã ap-
pellant, quod iis cibi atterantur. Caninis nomen
inditum est, quod canum dentibus quæ simili-
mi existant, Omnes in suorum ossium concavis
infiguntur. Ex ossibus dentes tantummodo mol-
lium cerebri nervorum participes sunt, ob idque;
evidentem sentiendi vim possident.

Dentes in utraque; maxilla sexdecim. Incisoriij dentes. Canini dentes. Maxillares dentes.

Dentes tantum recipere molles nervos à cerebro.

DE OSSIBUS MAXILLÆ INFERIO- RIS. CAP. VI.

Ossis maxillæ inferioris, quod elixum in sum-
ma menti extremitate laxatur, pars quæ quasi
capitulata est, duobus seu cornibus terminatur:
quorum alterum in Mucronem desinens, ten-
donem à temporis musculo descendente recipit.
Alterum capitis ossi sub eo exortu, quem
maxillarem vocant, annectitur: ibique; in parvu-
lum sinum rotundo quodam quasi tuberculo
se se inserit.

*Maxilla infe-
rioris ossium
consideratio.*

DE SPINA. CAP. VII.

Spina ex vertebra quatuor & viginti constat:
quæ si plures paucioresve sint, præter naturam
sunt. Harum contextus omnis in cervicem, dor-
sum, umbos, & os sacrum dividitur. Cervix ca-
piti annectitur. Huic dein dorsum, cui par inest
quæ & pectori longitudo: quod subest reliquum,
lumbi appellantur: cuius pars ultima sacrolato-
ve osse finitur. Septem in collo vertebrae, duode-
cim ad costas, ad lumbos quinq;

Spinae vertebrae ex vertebrae.

DE VERTEBRIS COLLI. CAP. VIII.

EX vertebrae colli, primæ quidem duæ inter se
undique; colligantur. Reliquarum verò quinq; an-
terior pars coalescit nexu constricta firmissimo,
idque; interventu eius membranæ, quæ geminas
spinalis medullæ tunicas ambit: qua ratione
vertebrae omnes se habent, duabus primis ex-
ceptis, quæ ut capitis obsecundent motioni-
bus, paulò laxius coherent. Prima vertebra la-
tissima & tenuissima est. Secunda angustior, va-
lidiorque; ac reliquæ deinceps eodem modo se ha-
bent. Quò enim spinæ medulla in gignendis ner-
vis consumitur, attenuaturque; magis, eò inferiorum
vertebrarum minuuntur foramina. Quum
autem capitis duplex sit motus, atque alter an-
nuendo, abnuendoque fiat, alter in altera: illum
quidem vertebrae secundæ processus potissi-
mum præstat, hunc verò ipsius summæ verte-
brae, & capitis transversæ partes efficiunt. Poste-
riorem processum, quem spinam vocant, omnes
habent vertebrae, prima excepta, quæ duntaxat
in parte anteriori exiguum quendam processum
exigit. In ceteris cervicis vertebrae transversif pro-
cessus semper sunt perforati, septima eademque

Colli vertebrae brachii collis.

Vertebrae foramina ad gustari parata.

Capitis duplex motus.

Vertebrae processus.

35

ultima excepta, cui interdū etiam, sed raro, à lateribus foramina insunt. Hos ipsos processus solæ cervicis vertebræ leniter quasi bipartitos gerunt, præter duas primas, in quibus simplices planè habentur: in sexta verò duplices manifestè apparent, & cæterorum omnium maximi: sicut & ea ipsa maxima est: quorum internus, latus admodū est. Pars cuiuslibet vertebræ anterior, qua inter se coalescunt, earum potissimum quæ in cervice sunt, prima excepta, oblonga est. Nervis autem ab spinæ medulla orientibus, ac juxta vertebrarum compages prodeuntibus utraq; vertebra parem primæ quasi operam confert. In cæteris superior aut magna ex parte, aut omnino id præstat.

DE VERTEBRIS DORSI. CAP. IX.

Dorsi vertebrarum consideratio.

THoracis vertebræ, quæ majori ex parte sunt duodecim, omnes ad decimā usque processus habent permagnos: tum eos qui sursum, deorsumque versum spectāt, tum etiam transversos, quibus costæ annectuntur.

DE LUMBORUM VERTEBRIS.

CAP. X.

Lumborum vertebrarum consideratio.

Lumborum vertebræ quinque, & omniū crassissimæ sunt: quibus sanè perangustum inest foramen, tenuisq; medulla. Earum autem processus spectat sursum: atque ab ea tantum vertebra, quæ præposita est, semper nervus erumpit. Habent singulæ lumborum vertebræ interiore in parte foramina nullo disposita ordine, in quæ se inferunt venulæ, satis manifestæ & conspicuæ, cum in cæteris vertebris, vel nullæ usquam, vel perexiguæ spectantur.

DE SACRO OSSE. CAP. XI.

Sacri ossis consideratio.

ID os vertebris, qua parte cum superiori alligatur, proportionē respondet. Ipsius autem transversī processus grandes patentēque sunt, quibus in exteriorē parte sinus inest quidam leniter cavus, in eūque ilium ossa ingrediuntur. Id ipsum os ex tribus particulis constat, harūque extremitate os aliud quartum, quod coccyx nominatur, additum est. Nervi autem, qui à spinæ medulla per sacri ossis foramina prodeunt, juxta suarum veluti vertebrarū compages, sicuti per spinam totam, profiliunt: non tamē ab utroque latere, sed intrinsecus quidem, atque extrinsecus: hique omnes tria constituunt paria.

DE COCCYGE. CAP. XII.

Coccygis ossis consideratio.

AT coccyx ipsum ex tribus particulis constat, quæ plus Cartilaginis, quam latum os, habet. juxta earum compages nervi posteriore ex parte prodeunt. Gemini priores ex ea oriuntur parte, qua coccyx latū os attingit. Insequens par inde ortum habet, ubi prima huius ossis pars cum secunda committitur. Duo alii inde egrediuntur, qua secunda eiusdem pars, cum tertia coniungitur. Juxta tertiæ huius extremitatem, quod reliquum est ex spinæ medulla, simplex nullique associatum profilit.

DE THORACIS OSSIBUS. CAP. XIII.

Thoracis ossium consideratio.

Costa utriusque duodecim Pectoris ossa septem.

OS pectoris, costæ, itemq; ex spina dorsi vertebræ, thoracis sunt ossa. Costæ ab utraque parte duodecim, singulæ cum singulis vertebris cōnectuntur. Ossa pectoris per synarthrosin invicem alligantur. Sunt autem numero septem, sicuti

veræ costæ, quæ cum eo alligantur. Nam quinque inferiores costæ, quæ nothæ dicuntur, in cartilagineum parum firmam degenerant, & cum diaphragmate, non cum pectore conglutinantur. Imò pectoris ossi cartilago triangula adnascitur, quam ensiformem appellant. Costis omnibus non par longitudo est, sed superne inferneque mediis breviores sunt.

Costa vera septem, mendosa quinque. Cartilago ensiformis.

DE SCAPULIS. CAP. XIII.

SCapulæ post thoracem sunt sitæ, gibbæ quidem exteriorē ex parte, intrinsecus autē firmæ: adhuc in ima basi tenues, oblongæque, in summa verò crassæ parvæque existunt. Os scapulæ majori ex parte cartilagine, sed in imo uberius, contegitur, à spinæque tenue inchoatur, & paulatim plenius efficitur, donec ad acromij locum pervenerit, ubi jugulo annectitur. Hanc enim compactionem, nonnulli acromion appellant. In ea parte, scapularum ossi processus quidam subest, quem scapulæ cervicem nominant: isque in acetabulum definēs, cum humeri capite colligatur.

Scapularum consideratio.

Acromion.

DE JUGULIS. CAP. XV.

JUGula, hoc est, claves, ab utroque latere summe pectoralis ossis extremitati annectuntur: eaque fistulosa sunt, figuraq; & crassitie inæquabili. Pars namque eorum inferior, quæ pectoris ossi alligatur, crassior cæteris, rotundiorque est. Huic succedens, longè gracilior est. Quod reliquum est, totum rotundum, inæquabileque est, quoad cum scapularum osse committitur, ubi quasi latiusculum est. Mediæ juguli totius partes exterius gibbæ sunt, præsertim quæ ad scapulas tendunt.

Jugulorum consideratio.

DE HUMERO. CAP. XVI.

MAXimum omnium os humeri (scemore excepto) est, idque utrinque supra infraque alligatur: summa eius pars grandiusculum habet caput, parvæ quidem cervici coagmentatum, adnatumque. In eo juxta anteriorem partem sinus quidam est, ceu alicui patulæ scissuræ similis, qui totum ipsum caput in duo quasi tubercula bifariam dividit. Pars autem inferior, in tubercula definit inæqualia: quorum ei quod extrinsecus situm est, capitulum radii annectitur. Cum eo verò quod est in interiori parte, nullum os prorsus committitur. In ima humeri parte sinus per similis est concavis troclearum orbitis. Cubitus hunc circum movetur. Ubi autem sinus hic definit in extremis utrinque lateribus, duo præterea sunt sinus, quorum anterior posteriore est minor. Ii coronas cubiti, hoc est, acutos processus excipiunt: horumque anteriorem, quum cubitus omnino flectitur, anterior sinus: quum tenditur, posterior posteriorem recipit. Cæteræ humeri partes gibbæ quidē anteriore atque exteriorē in parte: in posteriore, atque interiorē, simæ sunt.

Humeri consideratio.

DE CUBITO. CAP. XVII.

PARS omnis quæ inter humerum & carpum sita est, eiusdemque etiam partis os gradius, cubitus appellatur. Is alteri subest ossi, quod radium nominant. Huiusque pars extrema superior leniter cava, exterius humeri tuberculum recipit, eiq; alligatur. Cuius quidem cōnexionis

Cubiti consideratio.

Cubitus radio subest.

Cubiti processus duo.

est munus, modò in pronũ, modò in supinum, totam manum adducere. Cubitus duos habet processus: quorum anterior minor est, alter verò grandior: ab ijsq; cubiti ipsius sinus sigmæ literæ similis comprehenditur. In hunc sinum, humeri orbita inferitur. Huius autem nexus, tendendi, curvandiq; totam manum officiũ est. Radius suprà infraq; validis ligamentis cubito illigatur: media inter se omnino dehiscunt. Uterq; adnatam appendicem juxta carpi habet partes: sed extrinsecus gibbam, intrinsecus autem cavam: cubitus quidem juxta minimum digitum, radius verò juxta maximũ. In sinũ eiusmodi sese carpus insinuat, annectiturq;. Inest autem cubito, ex abundantia quadam, processus quem columnarem appellant, isq; brachiali etiam nectitur. Ad hũc quidem nexum pertinet carpus in obliquum ducere: ad alterũ verò, in rectum, cuius opera summam manum extendimus, inflectimũsq;

DE CARPO. CAP. XVIIII.

PRima pars palmæ carpos dicitur, ex ossibus octo, duplici distinctis ordine, constans. Dura omnia, & parvula, nec medullosa, multiplicisq; figuræ sunt. Cuncta nerveis cartilagineisq; nexibus inter se per synarthrosin constructa, non cognata cernuntur: exteriore quidẽ in superficie, leniter gibba, sinuata intrinsecus. Pars carpi superior ex tribus ossibus constat, quæ in rotundam quasi formam constructa, cum cubito, radioq;, & columnari processu annectuntur: hoc tamen excepto, quod carpi os, quod minimum digitum respicit, exiguo leniq; sinu, columnarẽ cubiti processum admittit. Ex his autem mediũ, ibi potissimũ sedem habet, ubi cubitus radiusq; inter se copulantur. Tertium, quod bipartitum est, à radio comprehenditur. Pars carpi inferior, quatuor ipsius ossibus metacarpio alligatur. At quintum, iis carpi partibus insidet, quæ juxta cubiti processum columnarem sunt sitæ.

DE METACARPIO. CAP. XIX.

INTER digitos & carpum ossa quæ palmam explent, metacarpium appellant: id quod per synarthrosin carpo, digitorum autem priori phalangi per diarthrosin alligatur. Pollicis tantummodo prius internodium, ex transverso ipsi metacarpio est annexũ. Singuli autem digiti ex tribus ossibus constant, priori semper internodio in subsequenti sinum subeunte. Iureq; dicendum est, pollicem ipsum ex triplici osse constructum esse: ac primum ipsius internodium, cum metacarpio minimẽ cõnumerandum. Unde rectẽ dixerit quispiam, ex quatuor duntaxat metacarpium, ipsos autẽ digitos ex quindecim ossibus constitutos esse.

DE OSSIBUS QUÆ CUM SACRO osse committuntur. Cap. xx.

RECTIS ab utroq; latere magnisq; lati ossis processibus duo quædã ossa appolita adstructaq; sunt: quibus integris nullum nomen est inditum. Nam latæ ipsorum superne partes, ilium ossa, exteriores post fœmoris ingressum, inferioresque, coxendicum: quæ inde in anteriora protensæ, tenuisq; & foratæ, atque inter se in extremo cognatæ sunt, pectinis ossa appellantur. U-

trique coxendici prægrande acetabulum inest, cum fœmoris capite nexu validissimo copulatum, cognatũmq;.

DE FOEMORE. CAP. XXI.

OS fœmoris magnitudine cunctis animantis ossibus præstat: id suprà, coxendici: infrà, tibiæ alligatur. Superiori in parte rotundissimum caput habet, proluxæ quidem cervici ad interiora inclinatæ adnatum. Infrà leniter patefcens, in duo tubercula desinit, adeò quidem grandia, ut capita appellari possint: quæ sanẽ tibiæ annectuntur, non modò membranosis ligamentis, sed tribus quoque aliis validis, rotundisq;: quorum unum ab exteriori totius connexionis parte, ab interiori alterum, à medio posterioris interiorisq; tertium porrigitur. Totius aut fœmoris forma, anteriori in parte exteriorẽque, gibba: in posteriori interiorique sima est. Sub huius cervice sunt duo exigui processus (trochanteres vocant) quorum exteriorem, qui est major, appellant natem.

DE TIBIA. CAP. XXII.

TOTA pars cruris, quæ inter talum genũque posita est, eiusdemq; etiã partis os grãdius tibia, appellatur. Hæc interiore in parte sita est, eique tantummodo fœmur ipsum annectitur. Os autem quod extrinsecus locatum est, sura nominatur: quæ crassitudini tibiæ admodum cedit, nec adeò protenditur, ut genu ipsum contingat, verũ suprà infrãque tibiæ per synarthrosin alligatur: media inter se penitus dehiscunt. Tibia, quæ fœmori copulatur, magna quidem adnata, coagmentatãque appendice, duplicem in se sinum habente, capita fœmoris sese insinuantia recipit. Tibiæ quicquid anteriori in parte tenue & carnis est expers, Crea dicitur: imæ ab utroque latere tibiæ, suræque partes, malleoli nuncupantur. Hallucinantur autem qui eos talos appellant: nã sub his utrinque talus consistit, ac unum de quaq; contegitur, ut ne eum tangere quidem possis. Malleoli verò extremæ tibiæ suræq; processuum partes sunt: gibbæ quidem exteriore ex parte, intrinsecus cavæ.

DE PATELLA. CAP. XXIII.

QUA fœmur tibiæ annectitur, os extrinsecus cartilagosum, rotundũmq; appositũ est: quod gibba subjectorum ossium, aptis finibus comprehendit: paulumq; intumescẽs, quod inter fœmur, tibiãque spatiũ patet, complectitur. Id ipsum os patella & mola appellatur.

DE PEDIS OSSIBUS. CAP. XXIIII.

TALUS ab imis tibiæ suræque processibus comprehenditur. Eius pars quam πτεργον vocant, sursum vergit. Posteriores lævigatæ omnes, modicæque orbiculatæ sunt, & ad superiora potius spectant: anteriores rotundo quidem capite oblongæ cervici adnato, cum osse connectuntur, quod scaphoeides dicitur. A dextro & sinistro latere, in duo extantia supercilia id desinens, sub tibiæ suræque cavis excipitur. Ipsi quoq; pars interna lævorem ferẽ habet. Huic subest os pedis maximum, quod calcem vocant: idque ipsum & rotundas partes ex talo recipit, & geminos quoque habet excessus, in sinum eius percommodẽ inierit. Pars verò qua ingredimur, leniter ro-

Fœmoris consideratio.
Fœmoris os omnium aliorum maximum.

Trochanteres.

Tibia consideratio.

Sura.

Crea.

Malleoli non rectẽ vocantur tali.

Patella consideratio.

Mola.

Pedis os maximum consideratio.

Scaphoeides os.

Calcem.

terrotunda & latiuscula est. Posterior quoq; rotunda est, eaq; tibiæ rectitudinem excedit admodum. Ex partibus ejus anterioribus, quæ è regione magni digiti sita est, ipsius tali capiti subjacet, nec cum altero copulatur osse. At eius extremitas quæ minimo respondet digito, cum cyboeide osse per synarthrosin nequitur. Cyboeides autem à parte exteriori juxta scaphoeides positum est. Verum hoc, quia cum talo jungitur, sinuatum, cyboeides verò gibbum existit. Tria deinceps ossa parvula inferiori scaphoeidis parti per synarthrosin copulantur: cū quibus etiam exteriori ex parte cyboeides pariter porrigitur.

*Cyboeides os
Scaphoeides*

Post hæc quatuor ossa, prima pars pedis quam tarson vocant, finitur.

Tarson.



DE PLANTÆ OSSIBUS.


CAP. XXV.

PLanta inde inchoatur, quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti siti sunt, qui ex ternis internodiis omnes constant, pollice excepto, qui ex duplici tantū cōflatur. Horum dearticulationes membranosis: quæ verò in talo calceq; habentur, validioribus ligamentis coarctantur. Satis autem sint hæc tyronibus, prima de ossibus rudimenta addiscantibus.

*Plantæ pedis
ex quinque ossibus constat*

LIBRI DE OSSIBUS FINIS.





GALENI PERGAMENI

de dissectione venarum & arteriarum, liber unus.

Cava Vena
consideratio.Cor omnium
arteriarum
origo.
Aorta consi-
deratio.Mesenterica-
rum Venarum
consideratio.Pancreas.
Pylorus.

Quæ in ventrem intestinaq; deferuntur venæ, veluti radices arboris sunt. Ea verò quam cavam appellant, quidam ceu truncus existit, omnium quæ toto corpore sparguntur venarum. Eadem ratione arteriæ, quarum origo omnium est cor, quæ quidem pulmones petunt, imaginem radicū ostendunt. Quam autem Aristoteles aortam nominavit, ea caudicis in arbore proportionem subit. Igitur ab ea vena, quam juxta cava jecoris, portas appellant, ceu ab uno principio prodeuntes, septem venæ in regionem ventris descendunt. Quarum prima, brevis quidem illa, atque interdum sola, interdum aliis associata minutulis, ad dodecadactylum intestinum descendit, carne quadam grandulosa, quam pancreon dicunt, suffulta. Secunda autem, exigua etiam, ad pyloron, imani ventris partem, assurgit, atque in eam regionem ventriculi, quæ circa & ante pylorum est, disseminatur: idq; præter alios duos insignes ramos, qui à portæ vena orti, in ventriculum & lienem se expandunt. Tertia similiter, ex magna vena

enascitur, quæ versus sinistram descendens, extremum magnorum intestinorum mesenterium, ad sedem usq; complectitur. Quarta post hanc vena, à dextris partibus ex eadem magna vena, versus pylorum descendens, ad gibba ventriculi effertur. Quinta deinceps, ex eadem magna nascitur vena, in ipsius latere dextro, quæ coli mesenterium, numerosiori propagine venarum invadit. Sexta similiter orta, ad spatium pervenit, quod inter duo jam dicta mesenteria jacet. Id enim plurimas venas habet, & in jejunum primum, deinde in omne deinceps tenue intestinum fissura multiplici dividitur. Postrema verò eius venæ pars, tum cæcum intestinum complectitur, tum quandam exiguam coli partem, qua ipsum cæco annectitur. Ad hunc sanè modum venæ illius quæ à portis prodit, in intestina, splenē, & ventriculum, digestio perficitur. Quin etiam omnes omēto intextæ venæ, ab iisdem ipsis venis propagantur. Igitur per omnes jam dictas venas, cibus ad hepatis portas suggeritur. Hinc verò per venas ad ipsius fibras pertinentes, in totū jecur permanat. Inde q; rursū in alias assumitur venas, per gibbā quidē partem dispersas, cæterū à maxima alia vena ortas, q̄ ob id cavā nominat. Ab ea et alia propagantur, quæ in omnes corporis partes sanguinē rivat. A jecore enim utrinq; prolapsa

Omnes venæ
a mesentericis
oriuntur.
Distributio-
nis alimentum
consideratio.Cava Vena
dissectio.

prolapsa, sursum quidem per septum transversum, ad cor attollitur: deorsum verò in spinam dorsi contorquetur, atque inibi super magnam defertur arteriam. Iam verò ab ea quæ sursum tendit, oriuntur primò quidem conjugatio ad septum transversum: dein capillorum modo tenues permultæ, in membranas intercipientes thoracem, moxq; in pericardium tunicam. Post illas alia magnitudine insignis, in dextram cordis aurem fertur, atq; inde ad dextrum ventriculum. Ab hoc alia duplicē, ut arteriæ, tunicam habens, in pulmone progreditur. Quinetiam alia quædam exigua per exteriorē cordis superficiem, in totū eius visceris corpus spargitur. Quū autem cor ipsum præterijt vena cava, jamjam festinans ad jugulum, obiter quoddam sui germen diffundit in omnes thoracis partes, præter prima duo, interdum verò etiam tria costarum intervalla. Deinde alias quasdam prætenues venulas, ad membranas mittit thoracem interse-

10 pientes, necnon ad thymum vocatum, Quum verò propè jugulum pervenit, in duas diducitur partes: atq; ita obliquè in latus utraque pars inclinata, à media paululū regione divertit. De quibus, dum ad sibi vicinam utræque ascendunt claviculā, in media latione, quæ ad thoracis anteriora perveniunt, radices sparguntur. Præter has, magnarū venarum multiplici se fissura scindentium cōjugatio, intercostalia superioris thoracis alit spatia, & quæ circa scapulas sunt loca, 30 tum nonnullos etiam ex interioribus colli musculis. Ab his ipsis venis etiam illæ nascuntur, quæ ubi ad sextam colli vertebam pervenerūt, in ipsa se foramenta insinuantes, ad caput usque efferuntur. Quicquid aut ex eis superest, ad axillas porrigitur: ac dein fissura multiplici, per manum excurrit totam intimis magni muscoli partibus, in ipso brachio exporrecta. Ex eius autem propaginibus una, per interna hæc quoq; percurrentes, circa brachium in orbem complicatur, 40 posteriorēque ipsius regionem ita perreptat. Mox in exteriorē partē, eandemq; anteriore, subit ad cutem, atq; illinc deorsum tēdit, donec ad brachij cōmissuram perveniat. Postrema verò ejus pars, aliquando exteriorē brachij nodum excedit paululum: nonnunquā multò ulterius progreditur, sub cute secundum os cubiti deorsum tendens. At omne quod de magna vena reliquū est, ad medium pervenit cubiti articulum, unā cum viciniore nervo ramos expandens 50 ad intimas musculorum ejus loci partes, usq; ad interiorē brachij caput, nihiloq; minus per profundum ad posteriores, anterioresq; musculos. Sed enim priusquam in cubiti flexum ingrediat, in venas scinditur complures, è quibus multæ in superficie extant: omnium maxima profundius demergitur. Atque magna ex parte una quidem vena, à magna propagatur, ad inferiora magis obliquè declinās: ac subinde altera ex inferioribus cubiti partibus, multiplici sparsa 60 bole, ad carpū pervenit: ac tertia deinceps, circa medium maximè cubitū. Cæterum earū fines juxta carpum miscentur. Elatissimus autem simul & maximus ramus, qui ab ea vena de quo modo institutus est sermo, propagatur, in medium

pervenit flexum, quā cubitus cum brachio coit: quò etiam obliquè cōfluit alterius venæ, quæ per brachij anteriora sub cute sita est, nō exigua portio. Duæ enim hæ totius sunt manus venæ: tum ea quæ per axillam in manum fertur, tum ea quæ per claviculam, quam humerariam appellant. Verum nō semper idem harum venarum positus, sicuti nec par crassitudo est. At secundum naturam maximè est, ut utriusq; venæ pars in interiorē cubiti flexum quadantenus deferatur: quæ partes posteaquam coierint, venam producunt, quæ omnium in cubito extantium fertur amplissima. Secundum hanc præcipua magnitudine humeraria est. Ea hinc profecta, quā cubitus cū brachio coarctatur, perq; radiū porrecta, ad extremi cubiti tuberculum, quod carpo adhæret, pervenit: atq; inde mox infimæ, eidemq; extimæ carpi ipsius parti distribuitur. At illa, quam ex cōfluxu duarum venarum omnium in superficie extantium maximam fieri dixi, ab interioribus cubiti partibus incipiens, primum conscendit radium: deinde in extimam evadit partem, ubi in ramos scissa duos, altero ad radii extremum procedit, altero ad summum pertingit cubitum, quā & ipse cohæret carpo: atque inibi venam contingit, quam ab humeraria propagari retulimus. Iam verò quænam modū quæ in interiori cubiti parte sunt venæ, ferè juxta carpum in multas exiles venas, & inter se cōmixtas scinduntur, sic etiam, multosq; his magis venæ quæ per exteriorē cubiti partem feruntur. Porro quæ altius per cubitum manumq; extremam venæ immerguntur, à duabus magnis oriuntur, hoc modo. Qua parte ab utraq; magna propagari quasdam ostendimus, quæ ad flexum brachij tenderent, duo rami, ab utraq; singuli, in profundum procurrunt, ibiq; similiter mutuo complexu junguntur. Ex quibus rursus alia duæ insignes venæ exoriuntur, quæ tandem suis germinibus musculos totius manus penetrant. Quæ autem ad interiorē thoracis regionem feruntur venæ, ad hunc constant modum. E medio duarum venarum in quas cavam memoravimus findi, vena oritur, quæ ad dextram ossis pectoris tendit: ab sinistra autem cavæ partæ, altera. Hæ igitur per totum feruntur thoracem, ossi pectoris subditæ, usq; ad radicem cartilaginis ensiformis: & ad singula obiter intervalla costarum, ramulum ex se mittunt, quo junguntur extremis eius venæ, quæ spatia intercostalia perreptat. Harum venarum portio extra thoracem emergit, ad substratos illic reficiendos musculos. Quæ verò ad mucronatam cartilaginem pertinent, tum in mammas assurgentes, tum in reliquū pectus dispensatæ, deorsum procedunt, rectis subnixæ musculis, in quos partem aliquam mittūt. Quā porro claviculæ adjacent cavæ venæ * partibus, in quas secari ipsam diximus, subjecta est venæ radix maxima, utrinque una. Quæ quidem confestim assurgens, bipartitò scinditur, duas ædens magnas venas: quarum altera per anteriorem, averfamq; colli partem, ad interiora magis recedens effertur: altera in partem anteriore deorsum quadantenus subsidens, mox sursum sublata, claviculā ipsam ample-

Arteriosa
Vena.
Coronaria
Vena.

Thymus.
Iugulares
Vena.

Axillaris
Vena.
Humeraria
Vena.

Media vena
consideratur.

Venarū al-
us perrept-
tium cubi-
considerantur.

Venarū p-
scindentium
interiora
thoracis,
sideratio..

Cubiti vena
rum confide-
ratio.

amplectitur, ad modò commemoratam venam contendens extrinsecus. Et confluentibus, seseq; cōmiscantibus, gignitur in summo eminaēs jugularis utrinq; una. At non eodem semper aut modo aut loco miscentur. Duo autem hīc hujusmodi venarum solent esse conjugia: obliquum alterum coeuntium ipsarum, & sese invicem contingentium in cavo juguli: alterum autem minimè coeuntium. Declinant enim quasi in extimā colli partem obliquā. Tres autem conspicuæ venæ oriuntur ab ea quæ circa claviculā cōtorquetur. Una quidem quæ humeraria dicitur (quòd obliquè deflectat ad humerū) & sepe eadem visitur crassitudine, cum vena ad collum subeunte. Reliquæ duæ, radices utrinq; humeraria minores habent: quarum altera ad summum ascendit humerū, ac in proxima quæq; corpora transfrens, ita occultatur: humilior altera, per profunda magis surreptans, secundum magnū musculū ab osse pectoris exporrecta, ad caput brachij pervenit. Cæterum axillaris vena multò humerali est major, & numerosiorē quàm illa in brachio sobolem habet prodeuntium ex se ramorū. Porro quantum reliquum est de magnis illis venis, in quas vena cava diducitur sub claviculis rectà per collum, gulam habēs ante se positam, sursum effertur, producens interim varia germina, sed ab ipsa colli superficie remota: quæ nimirum nutriūt musculos altius delitescentes. Nam venæ ab extantibus in superficie jugularib. propagatæ, plurimæ & tenues sunt, quæ per totum ambitum colli, faciei, & capitis, vario plexu disseminantur. Quin & lingua magnas accipit ab intimis jugularibus venas, posteaquàm eæ per ramos cum extimis se conjunxerunt. Reliquū autem omne ex internis jugularibus ad cerebrum assurgens, in calvam excedit per extremam suturæ labdo-dis partem. Coniunguntur autem venarū omniū extrema circa ipsum caput, ipsiusq; cum prima vertebra commissuram. At verò earum venarum quæ in partes corporis inferiores sanguinem rivant, cava in lumbis sita, est origo. Hæc enim vena simulatq; è jecore primum se exprompsit, priusquàm in lumbos cōsidat, elatior adhuc exiitens, parte quidē dextra, in dextri renis tunicam ac circumjecta corpora, varios spargit ramulos. Sinistra autem, notabili magnitudine venam, quæ & ipsa in ramos scissa, corporibus inibi existentibus distribuitur. Ac sæpè numero à cava ipsa ad renem proficiscente, propagines mittuntur, quæ in renis tunica intextūtur, ac vicinis in ambitum locis: eaq; nunc filorum araneæ similes sunt, nunc parvæ. Nam quæ à cava inferuntur in renes, facile sunt omnium amplissimæ. Deinceps post has ad testes deferuntur venæ. Ad sinistrū siquidem, ramus mittitur ab ea vena quæ in sinistrū præfertur renem. Quæ aut in dextrū testem inferitur vena, ea quidē ab ipsa cava producitur. Quāquam hæc vena mihi semel observata est initia duo habere, sicuti ea etiam quæ in sinistrum testem se insinuat, per sæpe. Hæ igitur venæ ad testes deferuntur, sive mas sive foemina animans fuerit. Habet quippe etiā foemina, ad uteri latera testes multò minores & densiores, quàm visuntur in maribus. Secundum,

eas venas, de singulis vertebris ad ilia venæ mittuntur, quarum postrema ad musculos qui abdomini præteriti sunt, attolluntur. Qui autem supra hos muscoli extra thoracem jacent, alimentum accipiūt à vasis circa claviculas exilioribus: tum etiam ab iis quæ per pectoris os ad mammās tendunt, sicuti etiam ab iis quæ sunt in spatiis intercostalibus. Quin etiam per singula foramenta spinæ, singulæ venæ in medullā ipsam à cava lumbos perreptatē inferuntur. Porro in ultimis lumborum vertebris non amplius videre est arteriam venæ subiectam, sed elatior quidem arteria supra venam ceu provehitur, vena autē per ipsas vertebra. Hac igitur parte & sese contingit utrinq; vas, & in duo membra divaricatur, instar literæ A. Utraq; autem cohærentiū vasorum pars ad sibi subiectum crus obliquior descendit: prius tamē ipsorum vasorum quibusdā ramulis, ad alendas lumborum carnes, atq; interdum etiam ad eam peritonæi partem, quæ ad lumbos spectat, revulsis. Utriusq; autem venarū conjugationis extrema, ad exteriores lati ossis partes se promūt, inq; musculos eam regionem consternentes, distribuuntur. Deinde ad uteri partes inferiores, aliæ venæ feruntur, quæ in cervicem ipsam disseminantur, & quadam sui parte amplexantur testiculos, altera usq; ad uteri fundum pertinent: indeq; aliæ subeūt vesicam: aliæ per pubis os ad exteriora cum ejus nervo extenduntur, atq; per inferiores illius regionis musculos disseminantur: aliæ per rectos ascendūt musculos, extremisq; coniunguntur venarum, quæ per thoracem ad subcartilaginea descendūt. Ab eadem radice venulæ utrinque singulæ in uterum perferuntur, per quas mammis cum utero maxima necessitudo existit. Insuper aliud extra musculos est conjugium earum, quæ ad utriusq; sexus pudenda pertinent. Ab his autem statim alia est vena utrinque, quæ ad internos fœmoris musculos tendit. Post has verò aliæ ab inguinibus ortæ, visuntur per ilium regionem ascendere. Aliæ etiam obscuræ, à mammarum venis deductæ, has quas nuper dixi, finibus suis contingunt. Reliqua magna vena in crus dividitur, priam juxta inguina emittens propaginem, quæ cum parva arteria in musculos anteriores spargitur: secundam utrinq; venam, quæ ex internis partibus ad genu usq; subter cutem disseminatur, ac alias non paucas ad profundiores fœmorum partes. Cæterum paulo altius quàm fœmur cum tibia articulo jungitur, in tres partes dividitur: quarum media, quæ maxima est, per ipsum deorsum ad poplitem fertur, atq; inde per profundum suræ procedens, non modicam in musculos ejus sobolem ramorum spargit. Altera autem parte quæ in superficie eminet, per anteriorem partem alterius tibiæ ossis porrecta, ad pedis pertingit articulum. Tertia verò quæ interior est, ad anteriorem tibiæ partem procedit, ac inde ad malleolum pervenit, ad ipsum tibiæ extremum, ut sanguinē mittat, quàm commodissima. Enimverò maxima quæ per profundum musculis distribuitur, duo cum arteria, extrema fiunt, quorum alterū quidem majus, à tibia fertur ac interiora: alterum verò, per mediā duorū

Abdominis
Vena.Thoracis mus-
culi externi
a quibus ve-
næ alantur.

Præterea Vena.

Pudendorū
Vena.

Crurū Vena.

Jugularium
Venarum cō-
sideratio.Humeralis
Vena.Axillaris ve-
na humerali
est maior.Lingua un-
de Venas ac-
cipiat.Cava vena
lumborum,
est origo Ve-
narum quæ
ad inferna
descendunt.Emulgentes
Vena amplis-
sima.
Seminariū
Vasorum ori-
go.Testiculi fœ-
minarū qua-
les.

*Padum venæ
quatuor.*

*Arteriarum
origo, sinister
cordis ventri-
culus.*

*Arteria ve-
nosa.
Aorta.*

*Tertium cor-
dis ventri-
culum mini-
mè reperiri
Arteria ma-
gna divisio.*

*Carotides ar-
teria.*

*Plexum reti-
formem pro-
ducit ab arte-
riis carotidi-
bus sub cal-
varia.*

*Iniugem ar-
teriam mitti
singulis dis-
scrib. unam.*

tibiæ ossium regionem, ad interiora pedis per-
ducitur, ac propagini alterius venæ immiscetur,
quæ ab exterioribus tibiæ partibus per fibulâ di-
xi descendere. Ita fit ut sint venæ quatuor, quæ
ad pedes descendunt: una quidē omnium extima,
per gibbosum fibulæ extremum: altera per par-
tes ipsius interiores: tertia per anteriorem ti-
biæ extremi regionem: & quarta, quæ ex interio-
ribus partibus extuberâtes tibiæ processus com-
plexa est. Hoc igitur tibi dissectionis venarum
principium esto. Deinceps de arteriis dicendum.
Harum origo est sinister cordis ventriculus. Hinc
autem in pulmones, gratia trahendi spiritus, de-
rivatur radice instar, una tenuis simplici; tuni-
ca constans: tum altera etiam hac multo crassi-
or, quæ veluti truncus omnium arteriarum exi-
stit. Habet præterea cordis ipsius corpus circun-
fusus in ambitum arterias duas: alteram quidem
majorem, quæ maximam ipsius partem ample-
ctitur, alteram ea maximè regione distributam,
ubi tertium ventriculum esse existimavit Aristo-
teles, quum tamen nusquam is reperiatur. Has
igitur arterias, simulatque maxima de corde se
prompserit, ab ea produci videas, ipsamque; mox
in membra haudquaquam paria diduci. Et ho-
rum quidem, quod minus est, sursum ferri, i-
psamque; cõfestim in partes rursus inæquales fin-
di, ac subinde ipsarum maiorem, ad jugulum ten-
dentem obliquam, de sinistra ad dextram thora-
cis partem porrigi, alteramque; oppositum habe-
re situm. At verò arteriæ pars major, quæ ad ju-
gulum tendit, ubi prope thymum pervenerit, pri-
mum quidem ad sinistram jugularem emittit ra-
mum: postillum, alterum ad dexteram. Dein
de quicquid ipsius restat, ad scapulam axillamque;
sinistram tendit. Quinetiam quædam ad pecto-
ris os, alia ad primas thoracis costas, alia ad spi-
nales musculos, alia denique per foramina sex
primarum colli vertebrarum deducta, una cum
vena, ad spinalis medullæ membranas, descen-
dit: alia ad summum humerum, scapulam, axil-
lamque; dextram extenditur. Quæ quidem, sicuti
& aliæ omnes, dividuntur una cum adjacenti-
bus venis: quemadmodum & quæ arteriæ ca-
rotides appellantur: ex quibus una cum jugula-
riis internis, ascendit quædam arteria. At quæ
in superficie extat jugulares, ex sine arteriis con-
spiciuntur. Omne autem quod ex carotidibus
reliquum est, sursum recta procedens, in calvam
penetrat, inibi; plexum retiformem producit: de-
inde in duas rursus coiens arterias, subit ad ce-
rebrum. Porro arteriæ quæ à corde se promit,
pars major ad spinam deflectitur, quintamque; tho-
racis vertebram ascendit: & inde per totam spi-
nam, usque; ad latum os, descendit, primum pro-
paginem quandam tenuem emittens in eas tho-
racis partes, quibus pulmones adjacent. Extre-
ma autem ipsius ad arteriam usque; ascendunt: de-
inde per singulas vertebrae rami tum in spatia
intercostalia, tum ad spinalem medullam exo-
riuntur. Ubi autem egressa est magna arteria tho-
racem, primum duas in septum transversum arte-
rias mittit: deinde in venter, lienem, ac; cur in-
jugem unam. Interdum ex una radice bi-iriâ di-
ducta, ventriculo quidem, & lieni, & hepatis al-

tera pars: altera intestinis distribuitur per duo
mesenteria, tum id quod ad dextram situm ha-
bens, primum est coli partium: tum id quod
est omnium intestinorum medium. Nam terti-
um mesenterium, quod propè sedem pertingit,
in sinistra situm, nullam inde assumit arteriam:
sed de imis partibus in ipsum quædam inseri-
tur, quæ propter renes à magna arteria in jugis
& ipsa nascitur. Atqui inter hanc & modò com-
memoratas, duæ magnitudine præcipue ad re-
nes tendunt. Cum venis etiam quæ ad ilia & te-
stes feruntur, arteriæ etiam ad eundem procur-
runt modum. Cæterum arteriæ magnæ pars ex-
trema, quum ad latera lumborum pervenerit,
suprà positam venam transcendit. Quod postea
quàm factum fuerit, haud aliter quàm vena scis-
sa, bipartitò arteria partem utranque in sibi sub-
jectum crus mittit: à quarum utraque obiter
singuli propagantur ramuli, qui conceptibus
per umbilicum inseruntur: in perfectis autem
animantibus, ipsi ad os latum excurrunt. At i-
psa cruris utrinque arteria ad intimas distribu-
ta partes fertur cum magna vena. Nam iis ve-
nis quæ in cruribus, manibus, abdomine, dor-
so, & collo per summam superficiem visuntur,
ne una quidem subest arteria. Sed enim arterias
in solo capite juxta cutem inveneris, tum eas
quæ post aures, tum eas quæ ad utraque tempo-
ra extant. Porro in conceptibus venæ arteriæque;
intexuntur, ab extremis venarum osculis pro-
deuntes, quæ ad uterum pertinent. Quibus
ter se coeuntibus, concurrentibusque iis, quæ ex
coitu sunt factæ, arteriis & venis, contingit ex
ipsis fieri conjugium illud utrorumque; vasorum,
quod inseritur in umbilicum. Arteriæ siquidem
vesicæ foetus complexæ, ad arterias illas tendunt,
quæ à magna per spinam porrecta mittuntur.
Venæ autem, simulatque ex umbilico se proje-
cerint, coeunt, unam magnam perficiunt quæ
ad concavum jecinoris tendit, haud procul ab
ea vena, quæ ad portas est. Hæc igitur vena si-
ne arteria est, ac post illam tota cava, donec ad
spinam pervenerit. Sic nec septi transversæ ve-
na, nec illa quæ alit thoracem, nec humeraria
item, nec axillaris (præterquam ubi altius coar-
ctantur, ut in cubiti articulo) habet ullam arte-
riam adjunctam. Omnes siquidem quæ per cu-
biti superficiem expansæ sunt, carent arteriis,
sicuti & quæ tum jugulo, tum collo in superficie
sparguntur. Omnibus denique superficialiis,
aut quæ per dorsum, latera, totum thoracem, in-
ferioremque; ventrem sub summa cute expandun-
tur, nullam invenias arteriam subditam. Quæ
autem ab iis quæ profundius absconduntur, or-
tum habent, si quidem ex sublimi deorsum ten-
dant, adjacentem habent arteriam: si verò ex
uno subeuntes, supernè descendantibus veni-
jungantur, sine arteriis ad glandia quædam e-
vadunt. Sed ne illæ quidem venæ cum arteriis
coeunt, quæ in exteriores pudendi musculos in-
seruntur. Arteriæ autem sine venis eæ sunt, quæ
vesicæ foetus amplexantur in utero, propa-
goque; ea, quæ à magna arteria procedens, in con-
ceptuum venam arteriosam se insinuat, non
substantia modò corporis, sed usu etiam &
functione

*Mesenteria
triplex.*

*Arteria lumbi
bi in cruribus
divaricata.*

*Vena quibus
nulla subest
arteria
Arteria sin-
perficiales in
bi cernantur
Venarum ar-
teriarumque;
in conceptibus
cor
ratio.*

*Vena absque
arteriis quæ
sunt.*

*Vena adiacen-
tes arterias
habentes.*

*Arteria absque
venis.*

functione existens arteria. In perfectis autem animalibus, sine venis arteriæ visuntur, primum magnæ illæ quæ ex corde prodeunt: una quidē quæ ad quintam usq; thoracis vertebrā descendit, altera, quæ prima omnium effertur ad jugulum. Post has ea etiā quæ ad scapulam & axillā sinistriorem se inclinat. Jam arteria sine vena est, ex carotide propago una, quæ ad textum retiformem ascendit, quod etiā rete sine vena est. Tum verò, quæ ad septum transversum, earum nulla cum vena jungitur priusquam in extrema inciderint venarum, quæ à cava exoriuntur, quemadmodum nec primæ illæ propagines: quæ ad jecur, & ventrem, & lienem, & intestina mittuntur. Nam ne illis quidem adjacent venæ, priusquam incipiant conjungi.

GALENI PERGAMENI

de nervorum dissectione, lib. unus.



Uod nulla particularum animalis nec motum arbitrium, nec sensum sine nervo obtineat: quodq; si incidatur nervus, immobilis confestim, insensibilisq; reddatur particula, inter omnes constat medicos. Quod autem origo nervorum atque spinalis medullæ sit cerebrum, quodque alij nervi ex cerebro, alij ex medulla spinali oriantur, jam demonstrandum aggredior. Anteriores ventriculi cerebri in priorem procedentes partem, sensum leviterque in angustum coarctantur, donec ad principium pertingant nasi, sese contingentes perpetuò, tenui tantum membrana distincti. Horum autem finem, ad partem utranque, unus dextra, & alter sinistra, nervus est crassitudine insigni, & aliorum ferè omnium nervorum mollissimus, ex ipso quidem prodiens cerebro in oculos extracalam, per foramen æquè patens ac latum, quantæ est ipsius nervi crassitudo. Videtur porro nervi ipsi, ceu quædam oculorum radices. Uterque siquidem in sibi adversum oculum sese quamlatissimè explicat, ipsumque qui in oculo est, vitreum humorem, in orbem, sphaeræ modo, ambit, inibi etiam naturam cerebri retinens. Sed in solis his nervis, antequam in oculos inseratur, sensibilis quidam meatus inest. Ac prima quidem hæc conjugatio est nervorum qui à cerebro oriuntur, longè aliarum omnium mollissima. Altera post hanc est conjugatio in musculos qui oculos movent distributa, durior multò & tenuior ea quam nuper memoravimus. Huic, dum per calvam procedit, non etiam quum primum nascitur, adjacet conjugatio nervorum tertia. Sunt autem molliores isti, tum secundæ, tum quartæ, atq; aliarum deinceps conjugationum nervis, multiq; circa primam statim radicem apparent. Paulò iis durior, nervorum ex cerebro prodeuntium quarta conjugatio, statim post exortum, cum tertia miscetur, ac perreptat primum quidem crassum involucrum cerebri, deinde etiam ipsum capiti obductum os: tum rursus ad palatum recedit. At tertia conjugatio ubi secundam attingit, variè scinditur, atque desinit. Primum igitur singulæ ipsius partes, per commune cal-

væ foramentum, ad inferiorem capitis partem descendunt. Intelligere autem convenit, nullum nervum aut à cerebro, aut ab spinali medulla emitti non conjugatum: sed semper alterum ad dextram, ad sinistram alterum, eadem prorsus utrinque magnitudine, situm obtinere. Igitur pars exigua tertiæ conjugationis statim quæ maxilla jungitur, ante aures erumpit. Quod autem veluti truncus est omnium indidem prodeuntium particularum, bipartitò scinditur primum, deinde membrum utrunq; in multas rursus partes: & alterum quidem tum in temporum ac superioris maxillæ musculos dispensatur, tum in gingivas, dentes, & cutem, quæ faciei prætenditur: alterum verò in radices dentium inferioris mandibulæ, gingivasq; & labra inferiora, necnon linguæ tunicam disseminatur. Quamobrem conjugationem hanc nonnulli gustatoriam appellant. At quarta conjugatio nervorum, à tertia recedens, sese in palatum insinuat. Est & quinta conjugatio, cujus nervi non prodeunt ex una radice, sed sibi invicem sunt vicini. Sub hac enim auditoriis nervus, in priori magis parte ad auditorium meatum descendit, unà cum dura membrana, quæ indidem, unde nervus, emergit: cum qua in latitudinem sese effundens, meatui leviter obducitur. Alter verò, ex parte adversa in alterum quoddam ossis petriformis cæcum foramen inseritur. Coit autem mox nervus hic cum eo qui progreditur foras, quæ maxilla jungitur. Quod autem ex ipsis duobus conflatur, in latum musculum scinditur, qui subjectus cuti, buccam si-ve maxillas movet. Ad hunc itaque modum quinta digeritur conjugatio, quam duplicem esse constat. Sexta autem nervorum ex cerebro ortorum conjugatio, foramine usa est, quod ad futuræ labdoæ extremitatem inferiorem interpatet. Principia autem statim è cerebro prodeuntium trium nervorum obtinet: quæ ubi è calva emerferint, multifariam cum inter se commiscuntur, tum etiam cum adjacentibus aliis. Superest septima nervorum cerebri conjugatio, cujus pars maxima in linguæ musculos dispensatur. Exigua verò quæpiam particula ad musculos provenit communes cartilaginis in gutture scutiformis, & inferiorum laterum ejus, quæ appellatur labdoæ, atque in alios quosdam non semper. Commiscuntur autem inter sese nervi ad inferiora capitis tendentes, tum is qui à tertia conjugatione, tum is qui à duabus novissimè memoratis oritur. Ac sanè nervorum qui à spinali medulla nascuntur: prima secundaque conjugatio sæpius societatem init cū hisce nervis. Et tibi quidem persæpe videbitur, quod de altero in alterum traicit, ceu vinculum aliquod duntaxat ambobus esse commune: id verò alterum auget, alterum exiliorem reddit. Porro ignorarunt universi anatomici, quomodo propriis laryngis musculis nervi è sexta conjugatione distribuantur, terni utrinq; prodeuntes, ut sex numero omnes sint. Laryngis etenim musculi, ab illo nervo quædam accipiunt germina, qui per foramen ad extremam labdoædem futuram interpatet exoritur: qui si laqueo quidē intercipiat,

Nervos omnes coniugatos produci.

Coniugatio nervorum quinta.

Latus musculi.

Coniugatio mollium nervorum sexta.

Coniugatio mollium nervorum septima.

Laryngis nervi omnes sex Musculi animalis quo nervo intercepto reddatur.

statim mutum animal redditur. Aliorum porro duorum, alter ad utroq; faucium musculos, linguæq; radicem, pertingit: alter ad scapulæ musculum, & ad eum qui latus est, aliosq; quosdam illius loci musculos.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus,
Liber I.

Ossium substantia.



Simia cur sit quam simili-
lima homini.

Formam corporis esse ossibus similem.

Anatomica methodus.

Actionis musculorum cognitio maxime ex usu est.

Musculorum sectione molendam esse pro fibrarum ductu.

Transversas musculorum sectiones actionem dissolvere.

Musculi octo à veteribus ignorati.

Uod pali in tentoriis præstant, & in ædibus muri, id nimirum in animalibus ossium substantia: ad cuius imitationem cætera in animæ solent effingi, formariq;. Idcirco & simia, inter universa animantium genera, tum visceribus, tum musculis, tum arteriis, & nervis (quandoquidem & ossium forma) homini similima est. Quoniam igitur corporis forma ossibus similis est, quibus etiā natura aliarū partiū respondet, operæ precium fuerit in primis exactam humanorū ossium indispici peritiā: eamq; haud quidem ex libris tantum, sed oculata inquisitione venari: id quod licebit tibi, si assiccata cadavera contempleris accuratissimè, aut etiam earum simiarum ossa, quæ homini quam similimæ existunt. Quanquam præstiterit in utroq; animali, & in simia & in homine, cognitionem ossium investigare, post quā mox ad concisionem musculorum est properandum. Deinde licebit quidvis discere primum, sive arterias, sive venas, sive nervos. Atq; in horum confectionibus versanti, viscerum & reliquorum omnium natura innotescet. Ac sanè positura ossium, seorsum nobis exposita est, sicuti & musculorū anatome. Quare si in illis commentariis te exerceas priusquam ad hos accingaris, haud inutile fuerit. Quum autem per chirurgiam musculos ipsos propter abscessus altiores, incidere interdum cogamur, actionis ipsorum cognitio maxime ex usu est, ut tum perdiscere, tum prædicere possis, omnem abigendo calumniam, functionem in magnis vulneribus, ubi musculus totus transversim dissectus fuerit, abolituram. Taceo qui musculorum actiones norit, cum chirurgum alios quidem musculos cautè, alios autem incisurum audacius. Præstat tamen pro fibrarum ductu, ipsorum divisionem moliri. Nam incisiones transversæ, quæ utique ad angulos re-
ctos fiunt, actionem dissolvunt. Necesse autem est interim, partes quasdam vulneribus angustis altioribusq; confectas, adhuc amplius dividere, alias ob alios usus: quo in opere, fibrarum posituræ, musculorumq; actionum intelligentia, omnium maxime desideratur. Hanc qui ambit, ne pigeat ipsum vel propriis manibus pellè auferre cadaveris. Nam octo statim musculos ignorarunt, qui ante me simias aliis excoriandas traderunt. Sunt verò horū octo musculorum, duo ad buccarum motum à natura formati: alij autem duo, brachia lateribus adducentes. Porro quatuor reliquos reperi, duos quidem sub illis glabris pelliculis, quæ vestiunt internū manuum: alios autem duos, sub illis quibus plantæ pedum teguntur. Ad hæc verò, quum simiæ cui

piā, quā in aqua extinxerā, detraxissem olim extremam cutem, inveni in illa etiam musculum tenuē & membranofum, costis omnibus incumbentem: qui habebat inferius principium, subter universam illam cutem expansum. Ut igitur exordiamur à manibus, singuli in singulis digitis ad extremum usq; extenduntur musculi fibras quasdam exiguas, & telæ araneæ persimiles, in ossa post articulorum iuncturas sita, immittentes. Similiter se habent hæc & in summo pede.

Primum itaq; totam cubiti atque digitorum cutem exteriorē detrahemus, ab ea solum quæ manum intus cooperit, abstinentes. Dein, quæ in carpi articulo sunt, studiosè adimere oportet, si fortè quæpiam membrana ex detracta cute reliqua sit. Verum huiusmodi avellendis, scalpellus acutior est commodus: quemadmodū musculis invicem separandis, retusior. Jam verò membranis adēptis, primoq; post ipsas, mediū cubiti sub cute summa, musculo, videbis ligamenta cōpagibus articulorū iniecta, posita in utraq; membri parte, foris & intrinsecus transversa: quibus capita tendinum subiacet, interna parte digitos ipsos flectentiū, externa intendentīū. At ex utraque ligamentorū, quæ dixi, parte interna quidē, duo sunt musculi flectentes carpū, quorū hic recto tramite versus parvū digitū, alter versus indicē est porrectus: externa verò, unus in cubito, qui carpum extendit, duo in radio, carpum utrique moventes. Alter ipsorum etiam magni digiti motor est, quem duos esse potius quam unū, existimandum. Cæterum omnium aforis musculorum, de quibus verba fecimus, capita, ligamina habent transversim circumdata. Jam alius quidam musculus desuper toti radio incumbit, nequaquā in tendinē aliis quos recēfui similem cessans, sed inferius ipsius extremum, quo ad interiora convertitur, paulò membranofius atque carnosius obtinet. Qui musculus quanquā mediam videtur habere sedem, externis potius cubiti partibus, quā internis, ascribendus venit. Extrat sub cute in superficie internæ partis manus, medius inter radium & cubitum musculus, qui in latum tendinem desinens, depili manus parti subnascitur, mediūq; interiorum musculorum apparet. Tendo autem ejus paulò ante carpi nodum manifestè emergit: quare hinc probè ipsius dissectionem incœperis: nempe scalpello obtusiori tendonis caput in sublimē elevans, incidensq; ipsum sursum versus ad cubiti iuncturam, ex qua originem duxit. Ubi autem transversum ipsum incideris, partem inferiorem attolles, divellesq; ipsam non modò à subjectis particulis, sed à cute etiam cui adhærescit. Sic enim cognosces, quòd ex tali musculo is tendo ortus sit, quòdque internæ omnium digitorum parti tendatur. Post hunc tendinem dilatatum, vasa & nervi inibi distributi se ostendunt: quibus etiam membranę incumbunt, quæ cum ipsis tollendæ sunt. Nam subsunt tendines qui digitos flectunt, à binis prodeuntes capitibus, illic maxime siti, ubi & ligamenti, & tendinis super illud dilatati caput, positum est. Horum autem subjectorum capitum, alterum quatuor producit tendines, digitis omnibus, præterquam

Musculus costis uni-
versis incumbens.

Musculi digitorum.

Dissecandi modo.

Ligamenta.

Tendines.

Musculi carpi flectentes.

Vola manus musculus.

Tendines moventes digitos.

perquam magno, juxta secundi internodij principium insertos, à quibus secundus eorum articulus flectitur. Alterum quod huic subjacet tendinum caput in quinque discretum particulas, in extremam usque digitorum aciem pertingēs, inibi inseritur. Tendines autem universos valens aliquod munimentum, singulos privatim ambit, multò sanè ipso tendine durius, atq; membranz crassiori simile. Porro si post caput in ramos scissum, tendines singulos unà cum prædicto involucro attrahas, flecti per eos, qui subiecti digitorum ossibus insident, primum ipsorum tertiumq; articulum cernes: hunc quidem, tanquam inibi tendine inserto: illum autem, per circumjacens ligamentum, quod ossibus adhærescit. At pollicis nihil neque ex sublimioribus illis tendinibus, neque ex communi eorum capite accedit, sed aliunde quidam tendo in tertium ipsius articulum exporrigitur, illumq; similiter: illis movet. Nam internodium secundum, per tunicam quæ ipsum tendinem ambit, movetur. Cæterum aliorum duorum musculorū, qui carpum flectunt, confectionem, paulò supra articuli commissuram exordieris. Quippe secernens ipsos à circumjacentibus partibus, adusque superius inferiusque extremum, tendines quidem inferioribus articuli partibus insinuari videbis: capita autem ipsorum, cubiti atque brachij nodum adire. Unus itaque tendinum in carpo juxta parvi digiti rectitudinem, ossi cartilagineo columnarive inhærescit. Alter tendo statim ab articuli junctura profundius mergitur, ut in carpi os aliquod putes eum inseri, quum inferatur tamen juxta principium illius ossis, quod in metacarpio consistens, digito præponitur indici. Hi ergo quinque musculi totam anteriorem cubiti occupant regionem, quibus ademptis, apparebunt radij motores. At externorum dissectio sic administranda est. Sub cute, vasa nerviq; superficialij extant: quibus cum membranis exemptis, quatuor ligamina transversa clarè cōspicis: unum cubiti radiiq; extremum constringens, alterum in cubito duntaxat priori subjacet: reliqua duo soli radio inhærent. Sed primum quidem ipsorum, recta linea incidendum est. Dein divisas particulas, ad suam quamque radicem revellere, aut penitus præcidere, oportet. Post hoc aut, primum caput quatuor tendinum digitos, præter magnum, tendentium, in medio aliorum situm, hamo in altum attollere: mox id quod exiguos duos digitos ab aliis deducit in latera, in binos scissum tendines. Postea reliquum tertiū similem motum grandioribus tribus digitis suppedians, similiter attollere expedit. Primum itaq; tendinum caput, sicuti & secundum, ex uno musculo prodit. Tertium bifariam tibi incidere licet. Nam quod duos digitos, indicem & mediū movet, caput ex uno procedere musculo deprehendens: quod verò magnum, ex altero. Atq; hac ratione quatuor musculi prædictis ligamentis suberunt. Hic succedit qui carpum, juxta parvū digitum, extendit tendine unico, metacarpij ossi, quod ex quo digito præponitur, inserto. Continet ipse haud valens ligamentum, quod ex solo cubiti tubercu-

lo oritur. Prope magnum autem digitum, alterum hic quoq; validum ligamentum caput duorum constringit tendinum, quorum unus in os, quod ante magnum digitum in carpo collocatum est, coniicitur: alter in ipsum magnū digitū, statim à primi articuli junctura, ingreditur. Quos duos tendines è duobus musculis invicem coeuntes genitos dicere, haud inconueniens fuerit. Reliquus exteriorum cubiti musculorum, qui extendens carpum bifido tendine metacarpio se ante indicem mediūq; digitū inserit, caput tendinis in radio fixum, juxta carpi juncturā exigit. Porro in exteriori brachij nodo, tria musculorū capita invenies: ejus sanè qui digitos quatuor extendit, elatissimum: qui juxta parvum digitum, carpum reflectit, humillimum: mediū verò inter illa, quod digitos duos minores abducit à cæteris. Sub his interius in uno, duotrium digitorum musculi reconduntur, qui ex toto osse cubiti invicem coeuntes originem ducunt: qui quidem duobus digitis servit maxima ex parte: qui verò magni digiti est, prope superius extremum. Incumbit huic alius, carpi coherens musculo, qui majoris digiti caput extollit. Idem verò totā profunditatē regionis, quæ inter utrūq; os radij & cubiti habetur, occupat. Cujus musculi dissectionem, quemadmodum & aliorum omnium, à carpo auspicari cōvenit. Sub eo autem, ubi ipsum à ligamine atque à cohærente musculo avulseris, occurret quidam alius obliquus, exilisq; de cubito in radium perveniens. Prius tamen adoriere musculum prædicto adnatum, qui cubitum superiori ipsius extremo attingit leniter. Dein elatiorē hoc musculum incidere oportet, qui in metacarpium ante indicem & medium digitum bipartito tendine inseritur. Hujus musculi finis superior, juxta sublimem exterioris brachij nodi regionem, quadantenus jam quoque conscendit ad superpositam nodi brachij partem. Qui verò & huic & radio supernè expansus, totam manum reddit supinā, ac simul cum alterius exortu suas etiā mittit propaggines, is musculus secundū extremitatem sui in tenues membranas degenerans, seseq; in musculos brachij insinuans, incisionis confundit opus: ejus tamen caput ossi brachij alligari comperies, ubi hujus musculos dissecueris. Exteriores itaq; cubiti musculi, talia quædā habent capita. Ex interioribus autem, qui quidem carpum juxta parvum inflectit digitū, à nodo brachii interno incipit, attingitq; cubitū: qui verò juxta magnū, ex eodem nodo ducit originem. Cæterum inter utrunque caput, exortus habetur musculi in manus cutem elabentis. Atq; hic rursus subsunt capita duorum musculorū, qui digitos movent, & mediam cubiti, radiique totā regionem implent. Verū omnibus quos recensui exemptis, radii peculiare musculi apparent, per quos supina pronaque tota manus efficitur. Quatuor autem sunt universi: duo ad primas radii partes, duo ad propria carpi extrema pertinent. Ex iis qui ad carpum spectant, alterum ipsorum scito esse obliquum, radiū ac cubitum intercedentem: per ipsumq; nempe agentem extrorsum, fieri supinam manum. Alter verò qui radium intrò cir-

cūducit, eam efficit pronā. Reliqui duo musculi radium in superiori parte moventes, & ipsi quodammodo invicem opponuntur, obliquum situm habētes: unus ab interna parte situs, ex brachij nodo prodit, capitq; flectentis carpum ad magnum digitum musculi adhæret: alter externus quidem est, sed hoc minor, atq; ideo transversum magis fibrarū sitū obtinet. Constat autē omnib. interiore tenso pronā manū constitui, supinam exteriore. Ac dicti mihi jam sunt omnes musculi, qui cubitū radiumq; in orbem ambiūt. Post quos tu summę manus exiguos aggredere.

Manus extrema musculi.

Digitorum musculi.

Etenim reperies exiles quosdā musculos, tendinibus tertium articulum digitorum movētib; adnatos. Quatuor autem ut tendines ipsi, ita & digitorū musculi, hi sunt: parvi nēpē, annularis, medij, & indicis. At magnū, alij movēt duo musculi: unus enim illū longissimē ab omnibus digitis abducit, ex primo carpi osse profectus: alius, indicē versus agit. Alius præterea musculus parvū digitū a cæteris plurimū removel, ex primo ossiū carpi, quod secundū illū consistit, procedēs. Hi igit septē musculi meritō anatomicos nō latuerunt. * Aliorū autē singuli, ipsis quatuor tendinibus metacarpij in uno sitis quū adhærescāt, haud mirū si non ita facillē conspiciātur. Ex quibus bini ad priorē cujusq; digiti articulū intrinsecus perveniunt, ac ipsius latera jam quoq; attingunt: reliqui omnes ex carpi ac metacarpij ligamento juxta ossiū ferē commissurā processerunt. At pollicis musculi elatiorem his processum exigunt, & ipsi ex ligamento nati, non quidem ossium dictorum, sed quod musculorū maximorum bina capita, unde moventur digiti, cōstringit. Porro ligamen hoc ex carpi ossibus utrinq; prodit, nec cubiti extremum attingēs, nec initium ossium quæ in metacarpio habētur. His ablatis musculis, neq; in extrema manu, neq; in cubito superest ullus alius secandus. Post quos ligamēta scalpello acuto omnia sunt abscinden-

Ligamentorum triplex in corpore est nescim.

Humeralis musculus.

da. Quorum ligamentorum triplex in corpore est usus: ossa quippe cōnectunt: munimēto sunt corporibus subditis: ac deniq; indumenta his ipsis tendinibus extrinsecus circundantur. Apparebit autem caput musculi qui radio incumbit, quum anteriorem musculum brachij detexeris. Cæterum sectio ipsa prope venam humerariam, quæ per totum fertur brachiū, declivis administratur, tota quæ inibi adhæret, cute ablata, & universis musculorū membranis. Sectionem vero quæ in superiori humeri parte facienda est, ad ministrabis, fibrarum similitudinem dissimilitudinemq; observans. Ex quibus etiam totam humeralis musculi circumscriptionem, ad unū cacumen pervenientem cognosces: cujus processus tanquam triangularis, in brachium coniicitur. Qui musculus peculiaris est humeri articulo. Verū solus ex moventibus ipsum, necessario nunc is aufertur, ut anteriores musculi, brachij caput biceps appareat. Brachij interior musculus, duo habet suspensa capita: unum ad scapularum cervicis supercilium, alterū ad processum anchoræ similem. Ligamen utriusq; apitis abundē trahens, est paulō minus moto rot. indū. Quapropter hæc duo capita ipsius deorsum pro-

currētia, sequēris: quippe quæ in idem cōeuntia, hunc musculū generāt, qui alteri, sed minori musculo, subdito (a quo etiā cubitus flectitur) juxta cubiti articulum insidet, radioq; validō tendino adnascitur, ac totū flectit articulum. At verō ut duo musculi anteriores sunt qui cubiti articulū flectunt, sic tres alij connexi invicem, extendūt hunc ipsum. Ubi igitur musculum internis partibus brachij injectum sustuleris, duo principia musculorū totam manum extendentiū considerato: quorum alterū ab humili costa scapularum non tota, sed ex dimidio ferē ipsius partis superioris prodit: alterum verō ex posteriori brachij regione, subter caput. Hæc jā procedentia, in brachio cōeunt: deinde per tendinē latum, cubiti tuberculū ingrediuntur. Jam verō si disjunctā utrāque musculi partem attrahis, totam extendi manum ab utroq; videbis, hoc discrimine inclinationis ad latus facto, quod prior in exteriora, secundus intrō obliquē deflectat. Cæterū sub hoc, alius delitescit totus carnosus musculus, brachij os ambiens, qui secundo adunitur adeo, ut particula ipsius esse planē putetur. Quem si tendas musculum, interim recta & indeclinabilis circa cubiti articulū intensio fieri videbitur: nonnunquam intrō paululū emergere. Dicti itaq; mihi jam sunt, omnes totius manus musculi.

Musculorū totam manum extendentiū principia duo.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus.

Liber II.

Quod veteres nihil scripserint de sectionibus administrandis, vertendum illis vitio non est: quandoquidem erat eis tam frequens, tamque in communi usu ipsa anatomie, ut domi apud parentes etiam ab ipsa pueritia, in illa omnes olim exercerentur. Postea verō tam præclaro illo exercitio intermisso, opus certē nobis fuit commentariis, quæ anatomicam disciplinam, chirurgicæ medendi rationi maximē necessariam, integram conservaret. Quæ quidem quod ab aliis hæctenus non usque adeo accuratē tradita sit, ob id nimirum ad conscribendos hosce commētarios me accinxi. Ignorantia quippe eorum quæ per exquisitam anatomem inveniuntur, in reb. quidem securis timidus, in periculosissimis autem, maximē audaces quotidie reddit. Totius autem anatomes utilissima pars, circa musculos, nervos, arterias, & venas extremarum partium versatur. Atq; ob id ipsum manuum & crurium anatomicas administrationes aliis præposui omnibus, quod ad ea, quæ tū usui hominū necessario, tum arti maximē cōducant, ire primum juvenes operæ precium sit: deinde verō, quod eundem ita disciplinæ ordinē commentarij de usu particularum observē. Quū igitur superiori libro, quo modo musculorū q in manibus sunt, sectio administrari debeat tradiderim, hic simili modo & de cruribus verba facere est animus. Ergo priusquam exactē cognoscas musculos, disseccare nervos aut vasa, neque ipse poteris, nec aliū item docere. Quare & hic cutis auferēda est: attendendumq; diligēter, ne in primo plantę exortu juxta calcis initium unā cum cute tendinē subjectū eo loco avellas: cuius explicari

Anatomie terribis fuisse familiaribus man.

Anatomes pars præcipua circa qua versatur.

explicati interventu, cutis depilis rigidaq; membro subtenſa eſt, Hac igitur cute intacta, oportet reliquam omnē adimere, ac ipſos fœmoris muſculos omniū primos incidere: mox qualeſcūq; velis. Ac facile quidem ſecundum differentiā fibrarū muſculus unusquiſq; cognoscitur. Omniū itaq; primus tendo, paulatim in carnem verſus, ſub cute ſumma apparebit, qui tibiæ infra genu innasſitur. Superius aut huius muſculi initiū, carnoſo exortu ex media maximè ilium offis ſpina procedit. Cæterum poſt nervoſam huius muſculi exilitatem, etiam alius quidā ex amuſſi tendo, ab offe pubis descendens, figurāq; teretē repræſentans, in anteriore partē offis tibiæ inſertatur. Atq; hi duo numero muſculi, in utroq; crure unus, ſeſe mutuò juxta primos exortus cōtingūt. Quibus ſanè vel tuis manibus tractis verſus muſculorū exortus, in animali extincto, tibia ipſa elatius ſimul & interiùs attollitur. Porro tertiā duabus prædictis inſertio lati tendinis eſt, nominatē in anteriore tibiæ parte cōtigua. Cuius exortus & caput inferiori exterioriq; coxæ offis parti debetur. Muſculus itaque hic ab externa coxæ parte descendens, obliquè in internā tibiæ inſertatur. Neceſſum aut eſt tibiā hac tractā anſa, retrorſum, ſuſumq; ferri, atq; * omnino in orbē cōvolvi. Quare nō ſimplex, ſed compoſitus is motus erit. Sciendum verò eſt, rectos muſculos rectū motū miniſtrare perpetuò: ſicuti obliquos obliquū. Hi ergo tres muſculi, tibiæ tendinibus innasſuntur, quos auferre oportebit, ſi tibiā prius q̄ fœmur, diſſecare inſtituas. Eſt & alius quartus muſculus, qui ab extrema offis coxæ parte procedens, in externā tibiæ regionem inſertitur: ſolūſq;, quantū ad loci rationē attinet, aliis tribus opponitur. Cuius quidē eſt munus, tibiā totā ſimplici motu in externam partem abducere. Iam poſt quatuor dictos muſculos, quintus alius exiſtit, ad inferius fœmoris caput, & muſculi tibiæ principiū, à parte interna descendens, ſimiliter à coxæ offe ortus. Atqui ſi nunc exemeris omnes fœmoris muſculos jam expoſitos, adhuc magnitum in priore, tū in poſteriore, internaq; univerſa fœmoris parte reſtabūt: ex quibus anteriores prius diſſecabis. Omnes aut extendunt articulū genu: nō tamen vel ſitū eundem habent, vel etiā ſimilia capita: quæ quidē in totū quatuor exiſtūt. Elatiſſimum quidem ex ſpina ilium offis pcedit, è directo muſculi omniū primi dicti, idq; parte ipſius inferiore. Huic verò ſuccedit aliud multo majus priore & humilius, quod in extrema potius fœmoris regione, propter natis proceſſum, eminent: à quo maximus anteriorū fœmoris muſculorū exortus eſt. Hiſ aut reſectis, alia muſculorum capita duo ſubjecta, manifeſtò in conſpectum veniunt: atq; eorū quidem alterum, primā grandioris in fœmore proceſſus (Græci trochantera vocant) originem attingit, & præterea capitis fœmoris cervicem: reliquum verò huius, infra ex anteriore offis fœmoris ſede emergit. At quod omnium muſculorum qui genu articulū movent, valiſſimā functionem obire credūtur hi, qui extendunt, cuius notum eſſe arbitror. Nam poplitis flexura, inter leves infirmasque ejuſ actiones refertur. Quamobrem natura nec

magnis, nec multis muſculis ipſam cōmiſit, ſed uni ſoli ex cōmemoratis, qui in caput interioris ſuræ muſculi inſertitur: quiq; non magis tibiā flectere quam abducere ad internā regionem videtur. Sed hunc cernere nō eſt, priuſquā tibia muſculos ademeris ſurā cōſtituentes. Fœmoris muſculis præter magnū reſectis, licebit tibi & coxæ articulū moventes, necnon circa tibiā univerſos deinceps incidere. Maximus igitur ille fœmoris muſculus rectis & poſterioribus fibris ſuis coxæ articulū flectit. Iſ aut quæ in lateribus ad pubis os perveniūt, obliquū ad interiora totius fœmoris motū adminiſtrari deprehendes. Hunc itaq; à toto pectinis offe reſecans, abſtineto ab eo qui in illius foramē inſertitur: necnon ab alio humili muſculo, quē in hiſce animalibus ſemper lividū vidimus, orientem ex inferioribus pectinis offis partibus, à quo obliquus intrò motus coxæ præſtatur. Præter hunc eſt & alius muſculus ex ſuperiorib. lumborū, illūmq; offis partib. ortus, atque descendens. Quocirca ſolus lumborū muſculus cōſpicitur triplex. Quippe interna ſui parte, per validū tendinē, in illam partē descendit, ubi pectinis os coxæ cōmiſſum deſinit. Externa aut, altero tendine breviorē & tenuiorē, ilium offi inſinuatur. Alia deniq; ipſius pars, quæ media inter nervea filamenta deſcēdit, tendinem quendam producit exiguo trochanteri adhærentē: qui tendo manifeſtè intrò flectit fœmur, erigitq;. Profectus aut ad exteriores muſculos, univerſos comperis, q̄ fœmoris caput ambientes, in magnū trochantera immittuntur. Quorū primus ſub cute ſumma poſitus eſt, ex tota ilium offis ſpina rectā procedens: ac partim quidē carnoſus, partim in membranā quandam degenerans. Incumbit hic muſculus iſs offis iliū partibus, quæ magis eminent, & obliquè retrorſum ſpectāt: cæterum ſpinalium muſculorū extremo cōnexus eſt. Ubi verò hoc eius membraneum deſinit, alius exortus carnulentus occurrit, è regione primi, qui ex iliū offe emergere dictus eſt. Auferendus igitur iſ obtuſiori ſcalpello eſt, ſed ita, ut deorſum verſus, fibras ipſas ſequaris: ſimiliterq; circumpoſitæ carnes circuncidendæ: ſic enim fœmoris caput detoges, & bipartitū muſculi finē invenies. Muſculus igitur hic, retrorſum abducēdo, fœmur extēdit, per inſertionem quæ è directo fit capitis, tum ex coccygis offe, tum ex coxarū offe enaſcētis, idq; fœmur ipſum paulum in exteriora declinās. Verū altero eius extremo dilatato, in latus magis fœmur ſuſum vergit. Ambob. autem ſimul tenſis, perfectiſſimā totius membri extensionē conſpicias. Ubi hunc ſuſtuleris muſculum, alius valens & omnino carnoſus occurrit, qui ex tota propemodum ilium offis ſede progrediens, vicinis etiam offibus ſimul incumbit. Cuius tendo vertici magni trochæteris inſertitur, adeoq; ulterius adhuc ad anteriora procedit. Cave aut dum hunc muſculū incidis, ne cū eo confundas quendam alium exiguū, qui ab externis inferniſq; lati offis finib. ortus, fœmur retrorſumerigit, cum levi ad interiora flexu. Porro alius inibi muſculus, colore livido, deliteſcens, grādi quoq; muſculo ſubjacet, ex interiorib. ſimul & lateralibus lati offis partibus ortus. Atq; hi ſanè tres muſcu-

Fœmoris motus obliquus ad interiora, à quibus muſculus fit.

Lumborum muſculus ſolus conſpiciatur triplex.

Muſculi extendentes articulū genu

Muſculorū qui genu articulū movent, valiſſimā functionem obire qui extenduntur. Poplitis flexuram ab uno muſculo diſpenſari

*Musculi tres
in magnum
trochantera
inserti.*

li in magnū trochantera ingrediūt. Ab his alii duo cōditi planē, introrsus fœmoris caput detorquent, p̄ validos tendines in grandioris trochanteris sinū inserti: quorū uterq; ex osse pubis procedit. Numerosus aut̄ musculorū exortus à foramine quod in pectinis osse est, ad vicina loca ex porrigitur. Porro exteriorē musculū faciliē ab ossibus ipsis dissolves. At interiorē, si totum voles contemplari exquisitē, ossium pectinis cōmissuram, quæ cartilaginea est, valenti prius scalpello dirimes. Nam ossibus à se invicem dissolutis, musculus innotescet. Ceterū ambo hi musculi fœmoris caput introrsus circumgūt: unus per totius articuli anteriora, alter per posteriora. Ac talis quidem est musculorū coxæ articulum moventium cōsectio. Iam verò adeptis iis, qui ex fœmore in tibiā descendunt, musculis, duo musculorū capita in tibiā cōspiciuntur manifestissimē, quæ ex posteriori fœmoris regione, illa potissimum, quā nodorum radix habetur, ducūt originem. Dein aut̄ poplitem prætergressa, eo in loco qui sura dicitur, miscētur invicē, unū gignentes musculū: in quem etiam hand exigua capitis exterioris portio propagatur, quæ musculus per se efficitur, in tendinem latū paulatim cessans, qui subhærescit pedi. Nec minus ex utroq; musculi nuper in sura geniti capite producitur tendo, qui memorato cōtiguus incumbit, posteriorique calcis extremo inseritur, quod ad seipsum est trahere idoneus. His recitatis musculis alij etiam cohærēt, qui ex lateribus tibiæ internis exorti, omnes ad pedem infimū porriguntur. At ubi tendines primū generant, ibi ligamentum ipsis extrinsecus est injectum, ex tibiā ad calcem pertinens: quo recta linea diviso, si tendines deinde sequare, digitis ipsos insertari cōperies, ambōsque movere primū, secundū, atq; tertiū articulum, si magnū excipias digitū. Nam ad secundum ac tertiū, tendo, qui ipsum movet, porrigitur. Tertius verò alius tendo tibiæ fini adhærescit: eiq; innixus, ligamēto iterū peculiari cōstringitur: qui & ipse pedē universum, sicuti qui calcē ingrediuntur, retrorsum flectit. Verū ipsius extremum in primū tarso os interius cōiicitur. His singulatim recisis, divertendū est ad exteriores tibiæ musculos, qui quantū sanē ad superiores exortus attinet, tres existūt: sin aut̄ tendines, motuumq; differentiā spectes, plures. His itaque membranas adimens, hic etiā sub cute ligamentum situ obliquum conspicias, robustius longē, eo quod in manibus cernitur. Oportet autem & hoc incidere juxta longitudinem membri, mox partes ad originē suam erigere, capitibusq; tendinum subjectorū detectis, hinc totorū musculorū cōsectionem auspicari. Ac primū sanē cōtueberis musculū usque ad superius caput porrectum: cujus extremum ligamentis cōtinetur, & tarso ante digitum magnū innascitur, paulū in interiorē atq; inferiorē pedis regionē excedens. Secundum dein musculum aliū spectabis, huic adeo vicinū, ut pars ipsius esse putetur. Verū tendo eius in caput primi majoris digiti interno dijinsinuat. Huic aut̄ cohærēt alius musculus gracilis, medio inter tibiā fibulamq; loco situs, qui totius pollicis latus ingreditur. Porro post

*Tibiæ exteri
ores musculi
tres.*

musculos quos nominavi, tendinū caput, ligamento subjectū, contemplator. A quo deorsum versus incipiens, tendines quatuor, quaternos digitos extendentes, invenies. Sursum verò, musculū illū videbis fibulæ adusque superius caput adnatū: cuius extremū, tarsum, p̄pe digitos majores ingreditur. Hi igitur musculi in prioribus magis totius tibiæ partibus consistunt: alii tres ab uno capite in exterioribus. Habēt etiam & hi præpositum ligamentū ex fibula ad calcē ipsam pertinens: quo soluto, tres nervosas musculorū spectabis exilitates, quæ cognatas invicē propagines obtinēt. Quarum prima, quæ ex supernis fibulæ partibus ad infimum pedem pertingit, ex tenuibus ligamentis carni connexis efficitur. Secunda, ubi eius quæ prius dicta est, caput definit: & ipsa nō multū post principiū in tendinem rotundū degenerat, gracilis tota existens. Tertia verò quæ totum pedem efficit simū, ex reliqua fibulæ parte procedit. Hęc itaq; pedē elevat, simul & extrorsum declinat. At prior illa, quæ & in magnum descendit digitū, introrsum ducit. Verū utroq; simul tensæ, indeclinabilē pedis elevationem moliūt. Hoc modo etiā ex musculis qui pedē retrorsum agunt, uterq; in latus sensim declinat: ambo aut̄ simul directē pedē ducunt retrorsum. Alius verò incognitus musculus in articulo poplitis delitescit, quē invenies ablatis posterioribus musculis ad surā porrectis: cuius caput si tēdas, tibiā flectitur. In pede quatuor musculorū sunt genera: tria quidē infra pedem, unū supra, in adversa tarso parte, quod duos cōplectitur musculos, qui obliquos motus quatuor digitis subministrāt. Qui sub pede habentur, septem & hi, cum septenis qui in manu visuntur, conveniunt, singulos digitos in obliquum moventes. Quorū duo enati à tarso ossib. magnū & parvū pedis digitos plurimum ab aliis abducunt. Alii quatuor in inferioribus partibus parvi sunt musculi, qui ex tendinib. digitos flectentibus, priusquā exactē scindantur, procedūt: quorū munus est, medium uniuscujusq; digiti articulum flectere. Septimus musculus is est, qui pollicem indici adducit. Duo alii musculi subter pedem ossibus adhærescunt, atq; cuiusq; digiti primo præpositi articulo, leviter ipsos flectunt, simul quidē pariactione functi, privatim aut̄ uterq; in latus sensim declinās. Cōsectis his musculis, nullus præterea ex ijs restat, qui in toto crure cōsistunt. Cōsiderare aut̄ oportet omniū articularū, quos detexeris, ligamenta. Etenim coxarū articulus unū in orbem ambiens possidet ligamentū, quale articuli omnes sortiuntur. Aliud aut̄ in imo reconditum, fœmoris caput coxæ sinui cōnectit, veluti nervus cartilagineus existens. At genu articulus unum ligamentū habet in imo, ac præter id, alia duo in lateribus: unū videlicet internū, atq; externū alterū. Quinetiā ab his alia cartilaginosa ligamenta in ipso genu cernuntur, utriq; tibiæ sinui orbiculatim circundata. Ad hæc sunt ligamenta nonnulla in pedibus, quæ nihil juvant ossi articulos, sed in aliqua ossis particula proveniētia, tendinū capita firmāt & roborāt. Quæ verò ab osse in os perveniūt, ut quod à tibiæ extremo in calcē definit, aut quod fibulæ tibiā vertit,

*Pedis mus
culorū ge
nera quatuor*

*Coxarū
articulis in
se ligamen
tum dupli*

*Genu art
iculis tria li
gamenta for
tur.*

ea sanè unà tendines subjectos cōstringunt, atq; ossa ipsa committunt. Sunt quatuor ligamenta alia, quæ veluti nervi quidam cartilaginei, talem ipsum ambientibus ossibus colligant, eandem proportionem habentia cum ijs, quæ coxæ & genu articulum in imo conjungunt. Ita siquidem & in pede talo quatuor ossibus confirmato, ligamen cartilagineum creatum est, extrinsecus ad fibulæ os, intus ad tibiā, inferius ad calcem: sicuti in priori etiam parte ad os scalpho-
 10 des. Atq; in universum omnia tarsi ossa valido ligamento in imis comprehenduntur. Nunc verò superest, ut de unguibus aliquid etiam dicamus. Ungues igitur ossi, nervo, cuti, & carni adnascuntur: haudquaquam ex his ipsis eorum substantia conflatur, quod nonnulli putarunt. Nam singulæ partes similes, ex materia quæ animanti subjecta est, tales à natura finguntur, quales sunt. Neque enim ex brachio cubitus, perinde ut nervus ex cerebro, oritur. Quippe non parum differunt, coherere cuipiā, & ex illo oriri. Nam quod ex aliquo nascitur, ceu propago quadam substantiæ illius à quo nascitur, similis speciei esse oportet cū origine sua. Sic igitur nervi ex substantia cerebri propagantur. Ungues autem non existunt extremi internodii digitorum soboles, sed diversa essentia species est. Conjunxit autem natura illos extremis terminis digitorum, valido ligamento: idq; ipsorum radici, extrinsecus quic-
 20 cutim apponēs, intrinsecus autem carnem subdens. Cæterum in radices ipsorum, non modò nervus, sed arteria etiam & vena porrigitur, unde sensum, vitam, & alimentū, sicuti aliæ partes, accipiunt: quarum nulla ex trium horum variorum temperie aut coitu conflata est.

GALENI PERGAMENI
 de anatomicis administrationibus,
 Liber III.



Ota artuum natura cōstat ossibus, ligamentis, musculis, arteriis, venis, & nervis, communiq; omnium velamento, cui nomē est cuti. Quorum cognitio exacta desideratur, ad commodè curandos affectus. Quippe ob eorum ignorance, contingit inter medendum medicus quamturpissimè hallucinari, quemadmodum illis methodicis accidit, qui insensibilibus cuiusdam digitis frustra adhibebāt omnem medendi rationem, tanquā in ipsis esset affectus: quem ægrum postea ipse restitui medicamentis quæ digitis admovebantur, ad dorsi principium (nimirū ex casu collisum) juxta radicem nervi qui in digitos privatos sensu porrigebatur, trāslatis. Cæterum advertendum est, non ex iisdem nervis sensum & motum singulis digitis dispensari. Interdum siquidem ob inscitia chirurgi, sensus, interdum motus, sicuti aliquando utraque actio perit. Quamobrem operæ precium fuerit, quemadmodū de musculis fecimus, sic etiam in præsentiarum nos, quo modo vasorum, nervorumq; confectionē administrare cōveniat, exponere, ab ipsa nimirū tota manu auspicatos, quæ ab humeri articulo incipit, nō secus quā ab ar-

ticulo carpi ipsa manus extrema. In primis igitur cutim ipsam per se solam acutiore scalpello à subdita membrana, quā venæ cutem nutriētes permeant, separare oportet, ubi prius eius pilos abaseris: promptius siquidem depilem, quā pilosam, incidēs. Detracta cute, venas, nervosq; membranæ intextos expendas: nervi tamen in macilentis quā in obesīs evidentius apparent: sicuti & venæ in ijs qui sanguine abundant. Semper autem radicem nervorum, atq; lationis modum, meminisse conator, ut si quando cogaris incidere, juxta longitudinem ipsis lationis sectionem ducas, à radicibus quamlongissimè abscedens: hoc enim pacto, vel unum, vel nullum nervū interfecueris. Sin autem transversum scalpellum admoveas, multos simul divides. Exteriorum igitur nervorū qui in brachio sub cute summa versantur, hi quidem à nervo, qui musculum, à litera Δ, quam imitatur, Deltoedem dictum, juxta caput brachii intercūrrit, veluti à radice quadam oriuntur, atq; ex imo prodeuntes, pilorumque modo prætenues, vario plexu, per summa brachii, paulò ultra cubitū disseminantur. Hi autem, qui illinc usq; ad extremā manum procedunt, à maximo nervorum omnium pertinentiū ad brachiū, qui & posteriores musculos intertextit, & ad anteriorem membri regionem permeat, cubitiq; articulo inseritur, propagantur. At verò anterior cutis, nervulos accipit, superiori quidē parte, ex primo ortu secundi nervi, inter eos qui de spinali medulla in brachium porriguntur: inferiore verò, ante cubiti articulū ex alio quopiā spinali. Sed internam, posterioremq; brachii cutē universam, ad usq; scapularū, quæ ibi sunt extrema, alius quidam nervus interreptat, ex secundo intercostali intervallo per axillam, sicuti & alii omnes, in brachium ipsum porrectus. Ac oportet eum qui clarè ipsos contueri velit, masculum parvū anatomicis prætermis-
 40 missum, prius incidere. * Iam verò glandibus etiam, membranis, vasisq; ab axilla exemptis, amplæ magnitudinis per profundum exporriguntur nervi. Initium porro sectionis facies propter venā humeralem, eūmq; musculū qui inter brachii lacertos anteriores, duo quidem habet capita, nerveā verò propaginē in radii principiū immittit. Ubi igitur duo huius musculi capita in unū coitura sunt, primū nervū brachii os conscendere invenes: eodēmq; in loco posterior axillæ
 50 musculus magnus in brachiū lato tendine inferitur: quò dein protendit etiā tendo maximi musculorū, qui mittuntur à pectore: post hūncq; rursus tendo deltoedis musculi, qui supernā humeri partem cōplectitur. Porro quū in unū coaluerint illius jam dicti musculi capita, scinde separāque directā lineā utriusq; musculi partē: nam juxta eam nervus quoque unus deorsum mittitur. Dum hoc agis, alius quoq; nervus multò hoc inferior, in conspectū occurret, ascensum molitus
 60 in brachiū, in horū nervorum processu, interim ab altero. Interim ab utroq; in caput minoris ex brachii anterioribus musculi, propagines transmittuntur. Deinde secundus nervus primo tantū de se rānum impartit, quantum illic primi reliquū fuisse apparet. Unus aut ex duobus nervus conflatus

Manus extrema.

Señto quo modo administranda.

Nervorum brachij exteriorum origines.

Artuum natura ex quibus constat.

Sensum & motum non ab iisdem nervis dispensari singulis digitis.

Manus tota.

conflatus, ad cubitum, per mediū ipsius articuli cubiti flexū, porrigitur. Secundus nervus humilior situm habet, insidetque ibidem brachii nodo, ubi planissimus est. Præter duos illos prædictos, tertius quidam maximusque nervus insequitur, ferè propè secundum, profundius tamen, brachiū ipsum ingrediens, unā cum grandibus vasis, arteria nempe, ac vena, quæ per axillam ad brachium etiam perveniunt. Qui nervus cū ipsis vasis in magnos brachii musculos propagatur, à quibus extenditur articulus cubiti, atque magnos sui ramos utrisque transmittit, obliquus in externam partem emergens. Ubi vero effertur paulò supra articulum cubiti, ibi pars quædam ipsius ad cutim elabitur, ut prius est dictum. Reliquum per cubiti musculos disseminatur. * Detectis porro multis jam brachii partibus, reliquos duos nervos prope internam ipsius regionem, in qua etiam prædicti tres inseruntur, conspicis paulò inferiores quàm situs sit tertius 20 nervus: quorum alter summa sub cute omnium primus apparet. Idem nervus in brachio ante cubiti commissuram in ramos propagari incipit, ferrurq; per totū ipsius flexum, scissa jam numerosiore ramorū serie. Insuper quintus alius nervus restat, ex ijs qui de spinali medulla brachiū adeunt. Hic per intimam ipsius regionem aliorū modo fertur, sed nulli brachii particulæ aliquam sui portionem communicat. Iam verò ad cubiti confectionē accedens, secreta cute à membrano 30 sa substantia, nervorum quidem primum principium videbis eius esse, qui in narratione eorum qui in brachio sunt, quartus est dictus nervus. Quod principium internam cubiti regionem ferè totā occupans, inferiori universæ & exteriorum nō paucis inseritur partibus. Quantacumq; verò cubiti pars ad radium eminet, utrinq; tum exterius, tum interius, aliorum nervorū processus exigit: interna ab omnium primo dicto, exterior à tertio nervo mutuatur. At fines magno- 40 rum nervorum, qui per nodum quo brachium committitur cubito, ad cubitum ipsum feruntur, quinque numero sunt. Sed horum unus in solam ipsius cutem spargitur. Ex aliis quatuor, primus in mediū se articulum cubiti insinuans, ramum sui postea externis cubiti partibus usque ad carpum ipsum transmittit. Secundus hoc humilior, super interiorem inferioremq; nodum brachii ingreditur: ac dein aliū in eam partem dispergit, qua caput musculi bicorni tendine extendentis 50 carpum, ascendit. Atq; huius quidem nervi propago una, totam summæ manus exterioris partem dimidiam amplectitur, sub cute extrema ad summos procurrens digitos: parvos sanè totos, medii autem dimidium: reliqua verò soboles, musculo quatuor digitos extendenti, eiq; etiam qui duos parvos in obliquum agit, sicuti & illi qui carpum propter parvum extendit digitum, insertatur. Qui autem reliqui sunt alii duo nervi, internis omnibus cubiti & digitorum musculis distribuuntur. Quos incidens diligenter, assequeris nervos in ipsos disseminatos. Invenies quippe ab utrisq; nervis processus, musculis qui digitos flectunt, & carpum communicatos. Musculus autē ne unus quidem in exteriorē

Nervorum magnorum in cubitum descendentium fines quinque numero.

summæ manus regione, sicuti in interiore, habetur. Cæterum una arteria, duæ autem venæ, propagantur in totam manum. Ex venis igitur, illa quidē quæ in superficie extat, quæque juxta interius latus musculi Deltoeidis excurrens, ad extremū ipsius proficiscitur, humeraria vocatur: quæ quidem juxta articulum cubiti, radij musculū oblongum conscendit, inibiq; in pares ferè tres ramos scinditur: quorum unus in altum demergitur, alter ad ipsius articuli flexum pertendit, unitus parte alterius venæ, ex ijs quæ in totam manum excurrūt. Reliquus tertius ramus, paulatim in exteriorē cubiti regionē declinat, ibiq; in ramos diffunditur. At vena per axillam procurrens, quum humerali multo sit major, simul cum huius loci arteria, quæ axillam perreptat, per totū brachium in ramos finditur. Ac prædicti nervi in singulos musculos aditi, utrorumq; vasorum, arteriæ dico & venæ, propaginem sibi cognatam habent. Quæ quum brachiū perreptaverint, in totum cum majori ex anterioribus musculis, parte interna delatæ, arteria quidem penitus ad cubiti musculos tendit: vena autem bifariam scissa, paulò ante articuli commissuram, altera parte in profundum dilabatur, ubi arteriā contingit, unaque in ramos cū ipsa propagatur perpetuo: altera obliquè sub cutem producta cernitur. Huius igitur venæ soboles prima, deorsum ad cubiti os, obliqua ferri videtur: at ubi cubitum superaverit, reliquā ipsius partem oberrat. Secunda propago aliquatenus elatius defertur, mox bipartitò dividitur. Cuius pars demissior, versus eam quæ ad os cubiti porrigi dicta est, defertur. At elatior, obliquè paulatim tendit, longiusque porrecta, interim ad eam venam pervenit, quæ cū cubito porrigitur, quæque ad extrema usque ipsius pertingit cubiti. Iam verò omnium quos retuli terminorū ora coeunt, & ex unoquoque duorum coitu, vas unum confluit, ita ut quot unita coiērint, præ multitudine & parvitate ne quidem numerare queas. Cæterum quod vas ex humeraria & magna vena conflatur, in altiore radii partem ascendit, ac dein per exteriorem ossis radij sedem binis ramis expanditur, ut duo hæc vasa Y literā repræsentēt. Quippe alterum vasorum directè ad magnum extenditur digitum, alterum versus parvum declinat: in manu autem uterque ramus vario modo divaricatur. Illius tamen quæ versus parvū digitum tendit, exigua quædam propago mediam 50 digiti medii & annularis regionem ingreditur. Quam venam nonnulli in sinistra manu secantes, sinentesq; sanguinē ex ea fluere quousque ultro sistatur, lienem ex tali vacuatione juvari assentunt. Conspiciuntur autem facilius omnes id genus venæ, in calidiore cōstitutione aeris ambientis, ac præcipuè si membro ipso tū demisso, tum loto, eas laqueo intercipient. Quū igitur universas venas, quas in hominibus ante concisionem 60 conspicis, in simia dissecta videre liceat, consulerim te prius in simia exerceri, ut si humani corporis disseccandi quandoque copiā sis nactus promptè singulas partes detegas. Porro ubi sanguinem mittere est animus, in iis sanè qui totam manifestò venam habent conspicuā, quàm longissimè

Musculum nullum in anteriori manus extremitate regione haberi.

Humeraria vena

Axillare Scenam esse locum humeraria maiorem.

Vena media consideratione

Vena inter annularē & mediam digiti sita, in sinistra manu sectione, opistulari lienis.

Vena qua ratione conspiciantur exactius. Confectione prius mollienda in simia. Venas secantes quæ longissime recedendum esse ab arterijs.

gissimè recedendum est ab arteria. In quibus autem id solum quod arteriæ incumbit, in tumorem attollitur, reliquum verò totum, conspectū effugit, nunquā venam ipsam loco inflato secueris, sciens arteriam subditam, quæ lata & valida est, ubi intumescit plurimū, simul secum extollere, atque undequaq; circūtendere incumbentem venam. Accidit enim inde, venā in gibba arteriæ parte elevatam, adeo penes regionem qua circūtenditur inaniri, ut scalpellus mediocriter injectus, eam quidē subito penetret, subjectā verò arteriam convulneret. Quare consiliū est recedere ab hac, ad vicinā aliquam, maximè ex ijs, quæ ad cubiti os deferuntur. Si autē ex his quoque nulla cernatur, eam adibis quæ in flexu ex venarum coitu facta, ad radii superiora pervenit. Si hæc occultatur, illam feries, quæ ab humeraria ad cubiti flexum porrigitur. Quod si hæc non appareat, eam divides quæ ab ipsa in flexum deducitur. Si nec ipsa, illam quæ sursum ad radium obliqua expanditur. Si nec illa se ostendit, venā ab axilla ad cubiti flexum procurrentem incidēs: quæ accommodatissima est ijs qui partibus infra claviculas sitis laborant: sicuti & humeraria ijs qui in superioribus. At commemoratæ, secundū tertiumque ordinem post ipsos obtinent. Communis autē utrique est, quæ ad radii superiora conscendit: quare tertium quoque ordinē in ambabus manibus ei attribuimus, Atq; hæc nus de superficialiis usq; ad digitos totius cubiti venis: quibus adeptis, videre licebit tibi & profundiores, primò quidem mutuò coeuntes, mox ubi congressæ fuerint, iterū in binos ramos dissolvi: quorum demissior quidem, per os cubiti: elatior, per radium unā cum arteriis in musculos propagatur: atque uterque tandē in propagines varias diffunditur, nonnullæ quarū paucis postea germinibus exteriorum venarum miscentur. Porro arteria una duntaxat in manum proficiscitur, vicina venæ quæ ad illam permeat. Utraque autē thoracem elabitur cum nono pari nervorum à spinali descendentiū medulla, & brachium illic ingrediuntur, quò tertius pervenit nervus. Inde omnibus brachii musculis processus notandos mittentes, declives ad flexum articuli, quò brachium jungitur cubito, excurrūt. At vena in brachii extremo in duas divisa est soboles, quarum altera usque ad cutē effertur, ut antea declaratum est. Quantum verò ipsius per profundiora cum arteria deducitur, id tertiam humerariæ partem assumens, bifariam scinditur, & cum utraque parte arteriæ, quæ & ipsa bipartitò divisa est, simul tum porrigitur, tum in universos, usque ad digitorū initia, musculos ramorū serie dispensatur. Itaque elatiorem arteriam quæ ad radii usque os decurrit, prope commissuram carpi tangimus, pulsū exploraturi. Sensibilem etiam in macilentis motum arteria quoque ædit, quæ mediam indicis & magni digiti regionē perreptat, originem ab hac ducens. Humilioris verò motū, haud facillè discernere possis. Iam verò in extremis convexisque manibus nullā reperire est arteriā, quòd ne musculū quidem unū. At interna regio, quoniā multis septa est musculis, ideo multas quoq; arterias singulis

ipforum porrectas obtinet. Verū universas arterias internas carpi, unā cum venis conjugibus spectabis, lato amputato tendine. Arteriis autē ipsis & venis, pro ratione magnitudinis virtus inest, non item nervis omnibus: sed alicubi exiguus nervus haud exiguam obtinet potestatem, ut qui musculos motores magni digiti & indicis, intercurrunt: qui soli si servantur in naturali habitu, cæteris abolitis, nō utique mancus homo in totum evaserit. Rursus, si quatuor existant incolumes, musculus autem qui magnum flectit, vel tendit digitum, laborarit, omnia manus officia interibūt. Pariter enim musculorum qui sibi invicem sunt oppositi, altero resolutō, utriusque semper actio vitiatur. At verò juxta principiū fœmoris, separata prius cute à mēbrana subdita, quatuor radices nervorum in cutem excurrentium apparent, pares numero principis grandium nervorum, qui in musculos disperguntur, unde scilicet processere. Proinde una est, quæ ab anterioribus musculis deorsum versus, in totam cutem ipsis vicinam fertur. Hæc alia interior per inguina longo angustoque musculo vehitur. Tertia autē juxta os quod coccyga Græci vocant, minus cōspicua cæteris. Quarta denique adhuc magis cōdita, in pectinis foramine delitescit. Cæterum exiles superficialiōsq; cutis nervos intuitus quum fueris, incidito omnes fœmoris musculos, quibus invicē separatis, grandium nervorū distributiones planè apparent. Sunt igitur tria nervorum initia magnitudine sibi invicem cōqualia, quæ primū exquirar. Quartū verò aliud maximū, bifidum ipsis succedit, quo de posterius agam. Itaque ex tribus principiis unū in anteriores musculos solos diffunditur: alterum simul cum magnis vasis porrigitur, ipsisque vasis ramos telæ aranearū modo prætenues, ut musculis cōtiguīs, impartit. Quod restat tertium nervorum initium, amplum ossis pectinis foramen permeat, duosque parvos musculos id amplexos, unum utrinque a foris alterū intrinsecus reliquum. Hæc jam tria principia intuitus, ad quartum duorum ramorū grandium, qui in crus deferuntur, mittuntque ad extremos usque digitos propagines quasdam, descendas. Evadet autē & hoc conspicuum, musculis natum incisus, cum quibus incidantur etiam capita fœmoris musculorum, qui numero quatuor, ex coxendicis osse exoriuntur. Quippe grandes nervi illis subjecti apparent, qui foras ab interiore latissimis parte cum nervulis tenuibus ex eo productis, emergunt. Verū illi in omnes articuli juncturæ musculos exteriores disseminantur: primū ex universis in ipsum superficialiū, qui articulum retrorsum agit. mox in carnosum sub ipso magnū: deinde in parvos infra hunc latentes. Nam grades soli per fœmoris regionem postremam excurrentes, apparent: qui in varios inde musculos disperguntur. Porro in tibia etiam, duo soli grandes nervi, descendentes per fœmoris posteriorem sedem, sub unico lato musculo cōspicui visuntur, qui ad tibię principium excurrunt, atque ibidem primū separantur invicem: alter qui minor est, exterioribus ipsius musculis distribuendus: alter, puta major, interiori-

Arteriæ & Venis pro ratione magnitudinis, virtus perpetua inest: nervis aut non semper.

Nervorum radices quatuor, in cutem fœmoris disperforum.

Nervorū in musculos fœmoris disperforum, initia quatuor.

Fœmoris musculi quatuor.

Tibiæ nervi.

*maque se-
nda.*

*axillaris ve-
sectionē,
accommoda-
tissimam esse
qui parti-
bus infra cla-
vas laborat.
humeralis
vene sectio
conducit par-
ticulā sup-
ra claviculas la-
borantibus.*

*Arteriā u-
nam duntaxat proficisci
in manum.*

*Arteriā car-
pi tagi a ro-
bis pulsū
exploraturi.
Arteriā in-
ter indicē &
pollicem me-
diam, sensibi-
liter in maci-
lentis moveri.
Manus con-
texa caret
arterijs.*

terioribus. Sed externus tibiā subter fibulā caput ingreditur: interior juxta surā initium profundius emergitur. Atq; huius nervi pars reliqua non mediocris in pedis inferiora porrigitur. Alterius autem tenuia extrema supremis tarfi partibus dispensantur. Portio quādam ipsius etiam ad nervum alterum pervenit, qui per surā, prope inferiores tibiā partes defertur. Cæterum infimam pedis sedem nervus unus subit haud exiguus, ex altero grandium, quem in posteriores tibiā musculos digeri commemoravimus, propagatus. At in supernam partem pedis, exiles nervuli quatuor porriguntur, ab ijs quos recensuimus, exorti. Ad hæc verò, exigua quādam vena crus per os pectinis adit, modicam ipsius partem nutriēs. Una autem alia maxima vena in totum crus ab interiore parte per inguina disseminatur. Cuius ramus unus statim in priorem, internāmq; fœmoris regionem perfertur, multifariam summa sub cute in ipsum distributus. Ab hoc, aliæ tenues propagines in cutem tres quatuorve disseminantur. Dein alius primo similis ramus in fœmore prope musculum angustū cernitur, post eūque aliæ duæ aut tres perpusillæ. Ab his alia insignis genu interius subit: quam sequitur alia duas in partes divaricata, cui succedunt aliæ complures. Atq; hæc quidem subter cutem summā omnes consistunt. In imo aliæ quādam sic se habent. Prima enim post inguina anterioribus duobus musculis dispensatur. Mox alia* penitus grandis satis intra maximum omnium musculū, & ex anterioribus internū porrigitur: à qua plures venarum propagines in omnes propemodum fœmoris musculos disperguntur. Post has alia quāpiam deinceps in grandem ex anterioribus musculum ingreditur, elatius ad externam fœmoris regionem emergens. Insuper post illam alia notatu digna profundius in maximum musculum eique vicinos inseritur. Atq; post has, in superficialiū enumeratione prædicta, quæ ab intima genu parte ad usq; tibiā extremum multiplici ramorum serie cutem subit. Iam verò, præter alias quasdam propagines, quæ interdū in tibia visuntur, etiam ipsi fibulæ bipartita venæ soboles apponitur: quarum altera in superficie externis partibus fibulæ ad malleolū usq; ramorum seriem spargit: altera, per ima exteriorum musculorum ducta, ramos communicans singulis, intra tibiā fibulamq; juxta inferiorem huius finem pervadit, in imāmq; pedis regionē disseminatur. Ab hac autem procedunt duæ aliæ venæ, propè extuberantes tibiā fibulæq; terminos, conspicuæ satis: quarum interior sanè miscetur ei, quæ juxta genu descendens, intrinsecus supra suram tibiāmq; totā ad malleolos est porrecta: at exterior societatem init cum venis ab illa exporrectis: quæ per exteriores fibulæ partes declivis fertur. Verum ab ijs quæ ad tibiā fibulæq; extrema invicem coeunt, exiles, quædam ad tarsum, digitosque pedis excurrunt, majores autem ipsis ad imas partes evadunt, ex quibus tota pedis regio inferior alimentum accipit. Nam posterior pars, quæ ad calcē habetur, à proximis intus, forisque ramos invicē coeuntes suscipit. Vena igitur per inguina excurrentis,

Pedis nervi.

Vena in cutem cruris disseminata.

Vena cruris interiora invadentes.

Pedis inferior regio unde alimentum accipiat.

hunc in modū propagatur. Quæ verò pubis os perreptat, solis indidē partibus (qui tres musculi sunt) distribuitur, easque nutrit. Porro arteria maxima cruri per inguina inseritur, eo nimirum loco, quo vena magna. Utrunque autem vas per interiora protendit fœmoris, arctiori ipsius musculo incumbens. Ac venæ quidē arteriis in musculos insertis cohærent: non tamen arteriæ superficiarias venas unā conscendunt, verum altius semper musculos ingrediuntur. Id autem inde liquido constat, quod carnosus nusquam in crure pulsus appareat, nisi in tarso rectè ad secundum digitum post maximum. Tangimus itaque subinde arteriam inibi sitam, quum eam quæ carpo inest, percipere non potuerimus. Arteria autem quæ per ossis pubis foramen in fœmur pervenit, perinde ac vena, iisdem tribus musculis distribuitur.

Arteria cruris distributio.

Arteria si tangere esse ubi carpi colatur.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber IIII.



Aud temerè in his commentariis à manibus sumpsi exordium, quod nimirum has partes videre in solis hominibus liceat. Neq; absurdum fuit statim de cruribus commentari nonnulla, quandoquidem beneficio eorū, solus homo ad amussim rectus incedit. Nunc verò de faciei & capitis partibus, opportunum videtur dicere. Porro duo musculi tenues simul & lati in buccā & labra descendūt, à colli spina orti: unde membraneum, fibrosumq; ligamentum procedens, substantiā ipsorum constituit. Complures etiam fibræ ex scapularum spinæ regionibus, quemadmodū & ex universa claviculæ sede, in buccā terminantur. Atq; oportet hosce musculos, quum usus aliquis postulaverit, pro fibrarum natura incidere. Nam si experiantur magnam incisionem transversam, buccas ad alterā partem revellunt. At musculosa compages, quæ fronti subiecta est, & à qua supercilia attolluntur, & motus frontis perficitur, suas fibras habet deorsum versus tendentes: quas transversim etiam chirurgi imperiti secantes, in causa sunt, ut frontis cutis tota delabatur ad oculos. Iam verò alii musculi masticatores dicti, expansis inferioris maxillæ lateribus sunt subiecti, qui variis totam ipsam modis circumagunt. Nam temporales musculi, nō circumagere, sed dum mordemus, vel edimus aliquid, aut os claudimus, adducere maxillam sunt nati. Etenim animalia omnia præter crocodylum, inferiorē maxillā movere, superiori immobili, natura voluit. Universi autem motus ipsius tres sunt: unus in mandendo, alter in ore claudendo, tertius in aperiundo peragitur. Atq; ab his secernitur labrorum atq; buccarum motus, qui sunt immota maxilla: ut quinq; sint in ore functiones, quina verò musculorum genera. In simia igitur intra aquam extincta, ubi pilos abstuleris, levissimè cutem incidas scapello acutissimo, rectā ducens lineam à mento usq; ad pectus, juxta cervicis ipsius longitudinem: statim siquidem sub cute ostendet latus tenuisq; divatio

Manus viri in hominibus.

Homo solus ad amussim rectus incedit.

Labiorum scissura una.

Frontis musculus habet fibras deorsum versus tendentes.

Musculi masticatores. Temporales musculorum usus.

Maxillæ inferioris, superius ore immobilis, movere animalia omnia, præter crocodylum. Maxillæ superioris tres motus.

Oris functiones musculorum. Lati musculi in genere.

*Lati muscu-
li inveniendi
ratio.*

*Lati muscu-
li fibrae a qui-
bus initium o-
riatur.*

*Animalia
quae sint apta
ad anatoma-
m administran-
da.*

*Maxilla ho-
mo sortitur
brevissimam.*

*Animalia
duobus ince-
dentia cruri-
bus.*

*Labiorum
substantia.
Labiorum
motus.*

*Labiorum ner-
vi.*

*Dentium &
gingivarum
nervi.*

*Narium mu-
sculi quales.
Latum mu-
sculum inveni-
it Galenus.*

*Masseteres
musculi.*

tenuisq; musculus, una cum numerosa serie ner-
vorum, talem utrinq; situm habentium, qualem
fibrae quibus adnascitur. Quippe omnes ad la-
bra definunt, ex variis procedentes initiis. * Si-
quidem ab universis colli vertebrae incipiunt quae-
dam, aliae a scapulis, aliae ab utraque clavicula.
Quae igitur a scapulis ducunt originem, oblique
omnes per buccas in oris latera porriguntur: quae
a vertebrae, transversae magis: quae vero a clavi-
culis emergunt, propemodum rectae sunt. Hae
autem omnia quam commodissime discernun-
tur in iis animalibus, quae praesens senio extenuata
sunt. Quare ad propositum opus talia sunt deli-
genda: post quae, recens nata praestant magnis
& pinguibus. Cognoscas autem ex ortu singu-
lorum nervorum, si ubi laqueo illos exceperis
proxime ad ipsam maxillam, abstulerisque o-
mnes fibras utrinque eis adjacentes, jam nudos
ipsos reducas ad propria principia. Posterius ita-
que musculus huius initium ex spina omnino
procedit: inde ad occipitij ossis basim defertur,
mox sub aurem, deinde musculus masticato-
rium dictum totum ascendit, ossisque superioris
maxillae committitur. His igitur omnium primis
ademptis musculis, licebit vel occipitio, vel fa-
ciei adhaerentes, ostendas. Jam vero ex omni a-
nimantium genere, homo brevissimam, pro to-
tius nimirum corporis proportionem, maxillam for-
tissimus est. Mox simia: dein lynceae & satyri: post-
ea cynocephali. Hae autem omnia & collum ita
prolixum, & claviculas hominis modo possi-
dent. Ac quaedam ipsorum magis insistant, quae-
dam minus. Insistant igitur recta, gradiunturq;
alia peius, alia melius. At certe gradiuntur omnia
binis innixa pedibus. Aliud autem nullum (quod
scimus) animal, duobus cruribus incedit. Labra
itaque naturam singularem eximiamque obti-
nent, adhaerescuntq; ossi maxillae, tertia quan-
dam in se, eandemq; fungosam substantiam sor-
tita, ita ut tota ipsorum natura, ex illa ipsa sub-
stantia, cute, & tribus lati musculi terminis, con-
flata sit. Proinde latiorum musculorum beneficio,
in latera secundum transversas ipsorum fibras
moventur. Deorsum vero, sursumq; versus, mo-
tum, tota ipsorum substantia suppeditat. Atque
hos ob motus, nervos ipsis natura, tenuissimis
foraminibus perforans maxillam, transmisit.
Per quae foramina elabuntur etiam reliquiae ner-
vorum, qui dentium sedibus adhaerescunt: a qui-
bus gingivae, dentes, & etiam membranae ambi-
tes, ipsum sensum accipiunt. Trahuntur porro
deorsum labra, beneficio nervorum qui ex imo
sursum versus feruntur. Contrahuntur autem
ab extremis utrorumque musculorum, graci-
lium, & latorum, ipsis insertis. Sicuti autem his
nervi ab inferiore maxilla, sic superioribus la-
bris, a superiori subministrantur. At vero mu-
sculos qui narium alas movent, tales natura ef-
se pronunciare palam oportet, qualem & latum
musculum, quem nos invenimus. Hinc paulatim
usq; ad malas descendes, cutem a vicinis illarum
partibus auferens. Hoc enim confecto, bini mu-
sculi masseteres dicti, singuli proprio ex capite,
in extrema inferioris maxillae profecti, clare cer-
nentur: nervis ipsos intercurrentibus, qui ad buc-

cas definunt, quique hamulis ad initium proprium,
quod post aures oritur, sunt reducendi, prius-
quam masseteras, hoc est, masticatorios, inci-
das. Ex horum musculorum capitibus, alterum in-
malis, ut vocant, alterum juxta os jugale consistit. *Oris musculi*
Post hos musculos, eos qui intra maxillam in ore
habentur, adibis: tum temporales ipsos. Quae tria *Temporales*
musculorum paria maxillam movent: temporales *musculi*
quidem, cum interioribus sursum convellentes: ma-
sticatorij, in latera circumagētes. Osse jugali ab-
lato, evidenter totus musculus temporalis conspi-
citur, dictorumq; simul trium musculorum socie-
tas: quorum duo quidem simplices, masticatorius
autem duplex existit. At vero inferior maxilla, *Maxilla infe-
rior ex duo-
bus ossibus
constat.*
ex duobus ossibus circa infimam partem coeun-
tibus constat: quae diducenda sunt, ut recte oris
partes cernantur. Porro universa capitis cute ab-
lata, delineamenta quaedam musculorum circa au-
res conspicias, quae in reliquis animalibus non de-
lineamenta solum, sed perfectos etiam musculos
spectabis. Habetur enim unus in utroque spinae la-
tere musculus. Neuter tamen usque ad aurem pro-
currit, sed tantum uterque abest, quantum ab occi-
pitio procedit. Jam vero scapulae magnis agunt
motibus, nec minus ipsis caput. Ceterum muscu-
lus ille duplex cervicis, qui in scapulas ipsas in-
feritur, non capitis, sed scapularum gratia est a na-
tura conditus, ut illas ad caput contrahat. Siquidem
si transversim in cervice scindatur, confestim
convelluntur, deorsum versus, scapulae: sursum au-
tem non amplius moveri queunt, idque capitis mo-
tu minimè resolutum. Sunt tamen alij musculi, qui
caput agunt in latera. In illum autem scapularum
musculum, a cerebro quidam nervus descendit,
quem ignoravit Lycus, perinde ut par illud mu-
sculorum maxillas moventium, quod intra os est
situm. Secundum musculorum par est, quod prae-
dictis, quibus subiectum est, longitudine respon-
det. Nam ex eadem occipitij ossis regione proce-
dens, sublimi scapularum basis angulo iniicitur.
Verum latitudo ipsis aequalis non est, sed multo
minor. Hi etiam scapularum basim seu ad occi-
put (unde transversim oriuntur) retrahunt. Priores
vero musculi, non modo basim, sed totas ipsas
sursum revellunt. Utrique autem, a media occipiti
ossis regione incidendi sunt. Quibus sublatis,
alia pleraque musculorum conjugia comperies, *Capitis mo-
tus.*
quae carnosae ansulis caput ad posteriora refle-
ctunt, totius colli longitudini injecta, sunt & al-
ij musculi, sic ab occipitij osse orti, ut oblique i-
psorum fibrae ad spinam sint inclinatae: a quibus ca-
put in obliquum convertitur. Ab utrisque autem
ipsis incumbētibus, de obliqua hac inclinatio-
ne, ad rectitudinem aequalem, quae naturalis est
figura, reducitur. Exordiens igitur tria horum
musculorum paria ab occipitij osse, cui inhae-
scunt, diffecare, perges usque ad extremum in-
ferius. Quibus ablatis, circa articulum capitis al-
ia quatuor exilium musculorum paria cernun-
tur, quae retrò habentur, absque parvis in articulo,
juxta latera primae vertebrae, reconditis. Succe-
dit aliud quartum par musculorum obliquum,
tertio obversim respondens. Hi musculi primam
cervicis vertebrae secundae connectunt. Eo-
rum vero extrema ad laterales primae processus, &

secundæ spinam, evadunt, Porro tria hæc paria, nempe, primum ex omnibus quæ recensuimus, tertium, & quartum, triangulum æquis lateribus tibi constituere videbuntur. Itaque in reflexione capitis, occipitios cum ipsis primæ vertebræ finibus innititur, atque secundā præterea cōtigit maximè: ipseque extremus in renuendo capitis reflexus, hos ipsos terminos obtinet. Annuentibus rursus, in priora caput recedit, & super anteriorem primæ vertebræ processum innititur. Verum extrema sinibus laxa insidēt, à posterioribus partibus disiuncta: * alioqui primam caput vertebram ad anteriora transcenderet, & musculis & propria gravitate decussum, nisi in processu anteriori ipsius primæ vertebræ, sic constituto à natura, accuratè innitens cōfirmaretur. Verum hinc exiguam securitatē, maximam verò inde, qua prima cum secunda committitur vertebra, natura molita est. Nam quum particulam quandam turbini similem, rectam ex hac produxisset, inferiora anterioribus constabilivit, primā vertebram leviter excavans, ubi maximè in anteriora processus ædit. Posteriorē quippe ipsius partem, secundæ vertebræ processus acclivis, extremū ingreditur, ligamentumque validum è vertice ipsius ortū, capiti inseritur: itē aliud quoddam transversum ex ipsa prima vertebra profectum, secundæ extremum turbinatum ad amussim constringit. Obliqui autem musculi in latera caput convertunt. Jam verò qui torquent caput ad anteriora, ij musculi ad pectus & primas claviculæ partes protendunt, ex duplici ortu principio, altero post aurem, altero in ipsismet auribus sito: quapropter duplici extremo etiam in prius nominatas particulas inseruntur. Quod autem & pectus & claviculas cum ipso thorace circūducunt, simul & sursum versus ad capitis latera, aut caput ipsum in priora circumagunt, cuiusvis notū esse existimo: sicuti & ipsos hoc pacto non posse movere thoracem. Quare caput ab ipsis prorsum circumverti necessum est. Nam qui musculi rectam posituram obtinent (ut qui ad scapulas & cervicem porriguntur) ij omnes simplici motui præsumt: qui verò non rectam, composito. Quare musculi qui à regione aurium ad claviculas & pectus descendunt, quum obtineant situm non recto tramite, situi similem motum sortiuntur. His musculis amputatis, ad eos qui in scapulis habentur, digredi licet. Duo sanè juxta spinā hærent, quos solos scapulas retrorsum agere dicimus. Alius tertius, à prima vertebra oritur, & in extremo scapularum juxta summum humerum desinit. Quartus gracilis, longusque, ab osse initio laryngis præposito, quod hyoides dicitur, originem ducens, ipsas illi connectit. Sunt & alij duo musculi utrinque per spinam dorsi exporrecti, à quibus scapulae spinam versus tendi videntur. Ab elatiore siquidem leniter ad cervicem inclinari: ab altero ad inferiores dorsi partes deduci: ab utrisque verò simul tensis, totas scapulas retrorsum, nullam in partem inclinant, deferri ad primas septem thoracis vertebrae, ad quas protensi sunt, videbis. Atque hi sex musculi peculiare scapularum existunt. Alius autem humerorum articu-

lo communis est, scapulas deorsum versus deprehens: quo de suo tempore agetur. Musculis quos retuli ademptis, apparebit is, qui maxillam inferiorem aperit, incipiens à capitis osse petroso, sursum autem ad summam maxillam protendens: ut uterque musculus, & qui à dextris, & qui à sinistris pergit, eodem coeant, ac medio itinere, ipsorum pars in nervosa ligamenta degeneret. Quod par solum nervorum, tribus ori claudendo creatis natura opposuit.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus,
Liber II.



Ute quæ pectus contegit à subditis liberata, musculum inibi spectabis in aliorum superficie extantem, qui ex mammarum regione incipiens, sursum versus ad humeri articulum

obliquus porrigitur. Ipsum itaque à subjectis partibus dirimens, hamo quidem primum ipsius fibrarum finem elevans, dein usque ad humeri articulum totum musculum separans, post hunc ad alium eo majorem accedis, qui ad eundem nimirum articulum pervenit, ex toto pectoris osse oriens, mammeque subjectus. Qui musculus bipartitus quodammodo est, fibris ipsius in similitudinem X. literæ, mutuò sibi incumbentibus:

aliis ab humiliori ossis pectoris sede ad articuli eminentiorem porrectis, aliis ab elatiore ad demissiora inclinantibus, omnibus autem sese interfecantibus invicem. Porro ipsa axillæ concavitas à duobus gignitur musculis: uno certè, quo de hic agimus, altero ad costas porrecto. Quæ igitur prædicti musculi fibræ ab elatiore pectoris ossis sede incipiunt, brachium thoraci adigunt, non deorsum revellentes: nam ab humilioribus fibris, os brachij unà cum obductis ei carnibus ad thoracem adductum, deorsum leviter declinatur. Jam verò alius his tertius succedit motus secundum primi musculi functionē, quem à regionibus propter mammam oriri diximus. Ad hæc alius quartus, quo brachium ad thoracis costas expanditur. Post confectionem illius qui sese interfecat musculi, alius tertius nobis se ostendit musculus, qui ex pectoris osse ducit etiam originem, qua secunda, tertia, quarta, quinta, & sexta costa cum ipso coarctantur, ejusque beneficio brachium elatius thoraci admove-

tur. Secundum hunc sequitur, qui juxta eminentiorem scapularum costam, evidenter jam brachium attollit. Omnes autem illi dicti tres musculi, in tendines latos, brachio sese inferētes desinunt. Postquam igitur tres hosce musculos ad usque articuli juncturam secueris, scapula à pectoris partibus separantur. Verum duo adhuc musculi ab imo sursum procurrētes, ipsas ad thoracis latera continent: quorum alter quidem in superficie tenuis, ex membranis quibusdam gignitur ilium cuti connexis: alter verò inter musculos, qui ab imo sursum feruntur, magnus, initiumque sumens ex spina vertebris, præcipue quibus spuria costæ coarctantur, cum scapularum basi haud mediocriter consortiū obtinet. His verò musculis

usque

Maxilla inferior à quo aperiatur musculo.

Humeri musculus.

Axilla cavitas à duobus sterni musculis.

Brachij motus & musculi.

Musculi scapulas admove-
ntes thoraci.

usq; ad brachiū cōfectis, *adhuc scapulæ unius grandis muscoli, ipsarum partibus cōcavis subnati, interventu, costis: & osse claviculæ intercedente, pectoris ossi continentur. Primum igitur à claviculæ osse musculus, superiorem humeri partem amplexantem, amputato: dein claviculam à pectoris osse tollito, membranosa circa articulum ligamina interfecans, donec musculus ab interna infernaq; ipsius parte in primam costam obliquè insertum, evidenter conspicias. His ritè peractis, scapulisq; revulsis, vasa axillam perreptantia, & nervos cum membranis præcidito. Porro functio illius muscoli qui scapularū concava ipsis costis cōnectit, est thoracē universum revellere. Sunt aut alij duo muscoli, in utraq; thoracis parte unus, hic videlicet in anteriori regione, ille in posteriori, costas etiā revellens: adeo ut tres hi muscoli sint ipso thorace elatiores, prior scilicet, posterior, & medius. Quippe medius musculus est ille de quo nuper differui, medio amborū collocatus. Ac thorax solo hoc mediorum musculorum conjugio motus, abundè satis animanti subservit. Altera priorum musculorum conjugatio ex secunda cervicis vertebra incipit, sed ab omnibus aliis consequentibus orta, in quinq; thoracis costas pervasida ligamenta inseritur: quemadmodum & reliqua conjugatio musculorum subtilium, incipit quidem à spina extremarum trium colli vertebrarum, & primæ simul dorsii, ac supernascitur tertiæ costæ, in quartam, quintam, sextam, & septimam insertata. Quod si caput ipsius prehensum in se attraxeris, costas sursum convelli, distendiq; thoracem, videbis. Idem & in medio prioreq; molitus musculo, paria ipsorū magnitudini intervalla thoracis fieri conspicies. Hæ igitur tres sublimium thoracis musculorum conjugationes, sunt respirationis opifices. Quarta deinde, quæ in primis costis consistit. Nam ad pristinam sedem ejus attollens musculos, priorum sanè costarum ossa retrahi sursum versus deprehendes: partem verò thoracis quæ hic est, distungi. Cæterum alia duo musculorum paria, thorace detecto, juxta longitudinem apparebunt: hoc quod carnosius est, spinæ omnibusq; illi adjacentibus costis: illud quod membranosis, pectoris ossi expansum. Hujus muscoli tēdo, recto abdominis musculo continuus est, omnibus costarū terminis, qui ad pectus pertinet, incubens. Etenim musculus hic in omni animantium genere, ad primam usq; costam pertendit, ubi & carnosus visitur, & tenui carni supernutrita tendini, latitudinē quandam accipit. Jam verò alius musculus huic similem habet functionem, qui per spinam porrigitur, & cum thorace simul incipit, definitq; orbiculata circūscriptio ne. Cæterū finis ipsius inferior, spinæ cohærescit musculo, obliquus, in posteriora vergens, ut tēsus costas intrò contrahat, stringatq;. Superest aliud unū musculorum p extra thoracē, bifidū, quod in extremis costis, thoracis inibi finem deorsum versus detrahit. Cujus quoq; caput, uni inter abdominis musculos admiscetur. Musculis omnibus quos percensui ablatis, situs fibrarum manifestè apparebit obliquus, si omnes mu-

sculos intercostales respicias. Examen autem ipsarū, à spinalibus auspicaberis musculis & cujusque fibræ extrema contuebere: altius propter spinales magis situm, demissius inde longius remotum: tanquam singulis fibris obliquè in priora, non recto tramite, deorsum versus procurrētibus. Spinalibus præterea exemptis, fibras quoq; similiter obliquas ibidem ipsis subjectas spectabis, nonnunquam cum costarum conversione situm suum variantes. Non enim ut unūquodq; costæ os à spina prodiit, ad pectoris os obliquum porrigitur, ab elatioribus animantis partibus ad humiliores inclinans: sed ubi prope os pectoris jam cartilago vice ossis creata cernitur, alium obtinet situm, priori cōtrarium, obliquè rursū, sed circulatim quodammodo, ad pectus cui coarctatur, protendens. Similiter itaq; fibræ ex imo sursum obliquius, platæ, subcontrariam posituram recipiūt. Hoc etenim in costis omnibus cernitur, si spurias duntaxat exceperis, quarū extrema, pectoris ossi non committuntur. Uniformis liquidem harum costarum ab initio ad usq; finem latio existit. Desinūt porro ipsæ non in os pectoris, sed in cartilagine quandam, quæ exortus septi transversi existit. Ab externis itaq; partibus fibræ musculorū intercostalium obliquum situm sortiuntur, quatenus dictum est. Quæ verò in partibus internis habentur, contrariò modo juxta X. literæ figuram exteriores secant. Conspiciuntur autem & hæ faciliè, costis ipsis ad spinam reflexis. Unus igitur adhuc thoracis musculus superest minimè cōtemnendus, nempe septum transversum: cujus munus existimavit Plato, distinguere duntaxat animosam à concupiscibili animæ facultate: quum præter id etiam maximè sit ex usu ad respirandi functionem. Ligamenta complura tenuiaq; ex ossibus prodeuntia, quibus simplex circunducitur caro, hoc septum habet: cujus centrum, exiguus quidam circulus & membranosis existit. Verum totam ipsius naturā manifestò prius contemplari nō licet, quam octo abdominis musculos disseccueris, ad quorum confectionem nunc divertendum est: quanquam tū ipsorum, tum viscerum omnium, quæ in imo ventre consistunt, primò omnium solitus eram confectionem moliri, ne videlicet diutius asservata computrescerent: dein verò aliorum anatonem persequi. Nunc autem disciplinam prædictis succedentē nō deserēs, costas à pectoris osse revulsas, rursus ad pectoris os reducas oportet. Dein de quod ex abdominis cute adhuc reliquum est detrahas: sub ea quidem, primi & maximi duoq; tibi muscoli occurrēt, obliqui, atq; aliis omnibus abdominis musculis superstrati, unus quidem à dextris partibus, alter à sinistris porrectus: quorum musculorū suprema, maximo thoracis musculo circa sextā costam cōmunicantur. Nec tamen à sexta costa duntaxat, sed ab aliis etiam spuriis, quæ in cartilaginem magnam degenerant, hæc prima abdominis musculorum conjugatio oritur, obliquis fibris ad ventris anteriora protendens. Cujus uterq; musculus tum ad ilium ossa, tum ad inguina cōtraria procedit, ac pubis ossi, per membranē, sed validū tendinē,

Costarū spuriarū extrema ossi pectoris non committuntur, sed desinunt in cartilaginem.

Fibræq; musculorū thoracis internas habere latitudinem contrariam externarum latitudini. Septi transversi consideratio.

Anatonem cur Galenus ordiri soleat ab inferiori ventre.

Abdominis musculorum consideratio.

Obliqui musculi abdominis.

ante inguina ortum, inferitur. Hoc interdū tendine relaxato (qui & peritonæum, & ea quæ ab ipso ambiuntur permeat) aliquod intestinum, aut omenti pars, propriam sedem egreditur, ac per ipsam laxitatem elabitur. Qui morbus cele atque ramex dicitur. Pars autem horum musculorum, quæ ad ventris anteriora porrigitur, in tendinem tenuissimum definit, rectis extrinsecus musculis superpositum. Pari modo & secundæ conjugationis musculorum abdominis (qui obliquum fibrarum situm primis contrarium possident) tendo in membranam degenerans, anterioribus musculis insidet. Uterq; verò horum os ilium osse ducit carnosam originē. Hinc deinde obliquē sursum protēsi, musculis trāsversis insident: postea quatuor notharum costarū finibus, coronosa intercedente substantia, iniiciuntur. Tendo autem ipsorum tenuis, mediis inter rectos musculos, & prædictorū tendinem, pergit: uterq; ab ea regione ortus, quæ circa externa rectorū musculorum latera posita est. Porro ipsi recti muscoli, qui tertiam coniugationem constituunt, tota substantia carnosī, a supernis deorsum versus descendūt, atq; in pubis os carnis interventu insertantur: qua in parte exactē invicē coeunt. Nā elatior ipsorum portio adjacet quidē, nō aut accuratē adiungitur. Quarta & ultima cōjugatio tū ex recta iliū ossis linea, tū ex lateralibus vertebrarū, q in lumbis visuntur processibus, exoritur. Verū nō statim simulatq; uterq; enascitur, efficitur musculus: sed mēbranosum ligamē valens ex cōmemoratis ossibus productū, deinde in processu fibris adauctū trāsversis, in musculi figurā degenerat, partibusq; internis cuiusque spuria costæ finiū subhærescit, necnō rectis miscetur musculis. Cujus tendo curiosē a peritonæo avellendus est, cui vel maximē adhæret. At peritonæum latis araneorum telis simillimum est simplex & tenue insigniter. De octo igitur in abdomine musculis, juxta primam anatomicā ipsorum administrationis speciem, quæ longē facilior & aptior est, abundē satis disputatum existimo. Ita verò & conjugationes ipsorum voces licet: primam sanē maximorū obliquorūq; qui a sexta thoracis costā incipiunt: secundam, his subcontrariorum obliquorum: tertiam, rectorum & quartam, transversorum. Potēris etiam ab ipsis musculis anatomē auspicātus, ubi recta linea universum abdomen in dextram & sinistram regionem distinxeris, ab eoq; ipsam cutem detraxeris, a rectis musculis separare primum superficialium maximi musculi tendinē: deinde secundum ab ipso, qui a secundo nascitur. Ubi verò utrunq; utriq; connexum ostenderis, rectorum musculorum confectionem aggredere, ac dein eorum, qui subditi sunt, semper fibrarum continuitatē usq; ad ipsum musculi caput sequutus. Sic enim totum opus tibi clarum evadet, ut nihil confundatur. Atq; hætenus de præcordiorum musculis. Intestinis exemptis, primum septi ex spuris costis processum indicare expediet: dein quo modo spinæ inseratur, patefacere: postea particulas ipsius distinguere. Etenim medium ipsarum est musculus, qui in tendinem latum omni ex parte a carnosīs comprehē-

sum definit. Ex utraque autem ipsius parte, superiori puta & inferiore, tenuis membrana adhærescit: quarum elatior, quæ duplex est, totum thoracis cavum sublinat, a dextra parte altera, a sinistra quoq; altera. Non enim una quædam est intra thoracem spaciōsa laxitas sibi cōtinua, sed a prædictis membranīs intercipitur, quæ recta linea ad pectoris longitudinem mutuo sibi cohærent, nisi quantum ea in parte abscedunt, quæ cor situm est. Hoc enim inter se medium capientes propria inclusum membrana, quæ pericardium dicitur, ita ad mucronatam usque cartilaginem porriguntur. Totam itaq; utranq; thoracis regionem internam, membranæ quædam succingunt, natura simplices, telæ araneorum persimiles. Basis ipsarum supernis septi partibus obiecta est: quemadmodum inferioribus alia quædam membrana similis huic substrata, quæ peritonæi vertex jure optimo nuncupatur. Cæterum hæc membrana sibi continua totam inferiorem septi transversī regionem sublinat: ac ubi illud usus necessarii gratia foratū est, ibi eis ipsis quæ permeant, circumhæret, simulq; expanditur. Sunt enim duo foramina septi: alterū grande, quæ vertebris via exhibetur, stomacho & magnæ arteriæ præparatum. Reliquum verò minus, venam cavam supernis animalis partibus sanguinem derivantem, excipiens: quæ vena prius cæteris partibus dissecanti occurrit, & in sublimi suspensa, & nihil ante se cōtinens, musculis sublatis. Detectis quæ infra septum habentur, nihil mali fuerit membranam lumborum carnibus superstratā detrahere. Est autem hæc, peritonæum lumbis cohærescens, quo avulso carnes ipsorum clarē conspicies: singulos nempe utrinq; musculos exactos per spinæ longitudinem sibi mutuo connexos, de superq; totum lumborum longitudini expansos. Qui quidē quum prope os sacrum pervenerint, dirimuntur invicem, internis ilium adhærescentes: iu quibus quidem musculis duo tēdines reperiuntur, quos anatomici nervosam musculorum propaginem nominant. Prædictæ itaq; duæ lumborum carnis partes tensæ, deorsum flectunt tum eam partē spinæ, quæ per lumbos totos habetur, tum eam quæ dorsi continua est. Pari modo musculi stomacho subditi superiorem spinæ partem inflectunt. Verū lumborum carnes in seipsis caput obtinēt tendinis, qui ad femoris trochætera pertinet. Jam verò post prædictos omnes musculos, spinaliū totorū processus diligenter cōsidera. Incipiūt etenim ex secunda cervicis vertebra, singuli duo capita invicem disjuncta obtinentes. Semper autem magis ac magis corpulenti evadunt, quāvis a tenuibus oriantur capitibus. Nā ex unaquaq; vertebra processus aliquis ipsis miscetur, ac inibi collum permeātes, tum magnitudine, tum robore insignes sunt. Et primum in colli extremo in idē coeunt musculi, inibi utraque spinæ parte nati, hic dextra, ille sinistra, ut omnia amborum musculorum capita, quatuor numerētur. Fibræ autem ipsorum obliquæ sunt: quædam a spina ad priora inferioraque decurrentes: nonnullæ contrā, ex lateralibus orientes processibus, quæ retrō, deorsumq; vergāt. Qui-

Membrana
sublinente
thoracem.

Thoracis ca-
pacitatē esse
in duas laxi-
tates disjunctā

Pericardii
involvens cor.

Peritonæi
vertex.

Septi forami-
na duo.

Vena cava

Lumborum
musculi duo

Spinæ partes
a quibus fle-
ctantur mus-
culi.

Spinalium
musculorum
processus.

Spinaliū mus-
culorum ca-
pita qua-
tuor.

Spinalium
musculorum
obliquæ fibrae

Cele.
Rumex.

Recti muscu-
lū abdo-
minis.

Trāsversī
abdominis
musculi.

Peritonæum
araneorū te-
lis simillimū

Abdominis
musculorum
quatuor con-
jugationes.

Septimū trās-
versum nas-
ci ab spuris
costis.
Septi trās-
versī partes.

bus diligentem adhibe curam, dum utroq; musculo dissecto, ad lumbos devenieris. Ibi siquidē musculi ex ligamēto quodā membraneo, quod à locis spinæ prodiit, gignuntur, ex ima parte ad postremas thoracis costas sursum paulatim oblique tendētes. Atq; hi musculi extremas costas detrahunt, ab anatomicisq; sunt prætermissi.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus
Liber. VI.

Simiam homini simillimam esse.



Imia igitur homini simillima est, præcipuè pedibus atque manibus. Quam si conspexeris aliquādo currentem figura erecta, statim ex longinquo eā similem homini deprehēdes. Quēadmodū ergo præstat, simiarū homini quā fieri poterit simillimarum dissecare artus, quū te in exemplo exercere studes: ita satius est in talis simiæ inopia etiā dissimiliū aliquā capere: sicuti etiam si in totum simia desideretur, cynocephalū, vel satyrum, vel lyncem, summatimq; ea animantia, quibus artū extrema in digitos quinq; discreta sunt. His animantibus succedunt, ursus, leo, & quæ ferratos dentes sortiuntur. Ex actionibus autem quas obeunt, & figura particularum, quam singula animantia extrinsecus habere videntur, nonnulla & de structura ipsorum tibi indicatio sumetur. Nam quæ animalia similem actionem obeunt, similemq; figurā exteriorē repræsentāt, iis similis nimirū & interna tota particularū natura existit. Quippe natura cuiq; animanti corpus animi affectibus idoneū cōdidit: atq; huius gratia simulatq; nata fuerunt omnia particulis utuntur, tanquam à magistro edocta. Quare aliquod animal antea nō visum, intuitus, sepe equidē judicavi, qualem nam sub cute structurā haberet, non aliunde ejus cognitionem atq; peritiā indeptus, quā ex firma persuasionē, quod singula animantia corporis structurā animi moribus facultatibusq; propriā haberent. Quinetiam voce animantis audita, de illius instrumentis conjecturā aliquā sumere poteris. Sed de his alibi latius dicturi sumus. Nunc verò de cibi instrumentis differere animus est. Quum igitur unus sit usus communis animantibus cunctis, cuius gratia alimento indigeant, reperies instrumenta in singulis ipsorū generibus triplicia. Quēdam prima ratione à natura facta, ad concipiendum alimentum, conficiendumq; & in totum corpus distribuendum. Alia secunda ratione, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas alias particulas tertia ratione extruxit, quæ horum excretionibus subseruiunt. In quam itaq; particulam cibum animantia recipiunt, ventriculus nominatur. In hoc lectum quandam & primā subeunt mutationē ingesta, ac præparantur jecinori, quod maximam cibi in ipsum permeantis alterationem molitur. Hinc venæ confectū ipsum, in totum corpus derivāt. Ut autem ex jecinore purum, nulliusq; superflui particeps, alimentū universo corpori dispēsetur, natura instrumenta ad id accommoda cōdidit: idq; secunda ratione, nō primaria, sicuti

Animalia se actioni apta, dum simia copia non datur.

Animalia que similia dicantur.

Naturā cuique animanti corpus animi affectibus congruum fecisse.

Animalia omnia partibus utuntur simul ac natura sunt.

Cibi instrumenta triplicia.

Ventriculus cibis excipiens conditus. Lecur maxime cibi alterationem molitur, quem postea per venas digerit.

nuper commemoravi. Ex his instrumentis, alia quod subtile & leve in ipso habetur, expurgat: ut bilis meatus, vesicaq; bilis exceptrix: alia quod terrestre est & grave, ut lien, & ima pars intestini recti: alia quod inter hæc duo consistit, aquosum, serosumq; ut urinarij meatus, renes atq; vesica. Cæterum ut pro arbitrio animantis superfluatorū excretio fieret, musculos natura terminis vasorum ea continentium affabricata est, qui tertia jam ratione inter cibi instrumenta habentur. Itaq; necessariò tria hæc instrumentorum genera in omnibus animantibus ad alimenti distributionem natura condidit. Atq; hoc est commune & idem in universis. Quoniam verò nonnulla animalia validis aluntur cibis, quædam imbecilibus, eò natura respiciens, particulares ventris differentias est machinata. Quare si aliquando videris animal tibi nunquā cōspectum, quod alimētum ligneū & spinosum edat, magnum huic & asperum noris esse constructū ventriculum. Si autem etiam superiores dentes non habeat, ventriculos ei necessariò plures existere, ut in primū statim pabulum ingerat: mox ex hoc ruminans, ore conficiat, ac deinde in alium atq; item alium ventrem deglutiatur, est judicandū. Contra verò quibus superior dentium acies concessa est, ea animalia nec ruminare possunt, nec ventres plures habēt. Jam cornigeris magna ex parte superiores dentes abesse novimus, ut quibus terrestre capitis partiū recrementū in cornua absumatur. Itaque instrumenta quæ cibum conficiunt, tantam magnitudinē possident, talemq; formam, qualis alimento ingerendo requiritur. Omnes igitur venas quæ per intestina, ventriculum, lienem, omentumq; (quod veluti congenitū operculum, caloris gratia conditum est) intercurrit, porrigi ad hepatis portas videbis. Porro musculos universos inferioris ventris mucronota cartilagine usque ad pubis ossa dividens, in corpus quoddam tenue, & latæ araneorum telæ simile incidēs, cui ob id nomen inditum est peritonæo, quod simplex & simile existens, prætendatur omnibus tum visceribus, tum intestinis, tum vasculis, cæterisq; alijs corporibus, quæ inter septum transversum & crura habentur. Ipsum autem separare incipies invento loco, ubi per se consistit, nulli musculorū incumbentiū adhærens: nempe nō multo post regionē umbilici, ubi primū à transversis secernitur musculis, atq; solum relinquitur. Etenim quum grande satis animal fuerit, licebit faciliè peritonæum sibi continuum & integrum ad costas spurias usq; servare: ubi transversis musculis desinentibus, alius excipit musculus, nempe septum transversum. Siquidē huius quoq; substantia, musculus exactus: figura, circularis existit. Quod in medio ipsius habetur, totum nervosum est. Quod autem in orbem hoc ambit, universum carnosum existit. Peritonæum itaq; carnosæ septi particulæ oboritur, à qua eodem modo detrahēre ipsum convenit, quo & à reliquis musculis avulsum fuerit. Studiosè autem incumbētib; operi, faciliè liberatur, quousq; ad cavā venam perventū sit, propter quam gibba hepatis septo transverso adjacent, & connectuntur. Ab hoc cōnexu versus sinistram regio-

Vesica bilis exceptrix. Lien. Intestinum rectum.

Renes Vesica

Ventris differentias pro differentia ciborum esse à natura constructas.

Animalia carentia superioribus dentibus, habere Ventriculum geminum.

Cornigera cur magna ex parte superioribus dentibus careant.

Omentū caloris fovendi gratia conditum est.

Meseraicas Scas omnes porrigi ad hepatis portas. Peritonæum prætendi omnibus nutritionis organis.

Septi transversæ substantia exactus musculus figura, circularis existit.

Septi transversæ connectiones.

nem, peritonæum humiliter cum ore ventriculi coit, deinde toti capacitati crassius seipso facto obducitur, sic tamē ut non magno negotio possit ab illa seungi. Quanto autem inibi crassius est, tanto tenuius jecori obtenditur, omnesq; ipsius particulas, ceu tunica quadā peculiaris, cōtegit. Quod verō adhæret ventriculo, germinibus venarum, quæ in illum descendunt, involucrem, vallū, firmanentumq; efficitur. At quemadmodum exiguæ grandium vasorum propagines in ventriculum demerguntur, ita in primum, ceu ad umbilicū, aliæ parvæ, magnarū soboles, ex alto deferuntur, duabus peritonæi partibus compræhensæ. Et hoc corpus ex duplici peritonæi, ceu plexu (intra quem continetur vasa) cōflatum, dicitur tum omentum, tum epiploon. Oportet autem venam utrobique gibbum ventriculi intercurrentē persequi accuratissimē. Siquidem per dextram animantis partem deducet te ad processum, quo tenue intestinū ex ventriculo oritur: altera parte ad lienis concava, in sinistra positi. Cujus visceris gibba pars ad extrema notarum costarum conversa est, & quicquid his ad sinistra ilia contiguum est. Concava autem ad dextram partem inclinat, contra jecur & partes inibi sita. Mittit itaque à se vena illa ramos quosdam exiguos, partim in lienem, partim in omentū. Non tamen vas in lienē absumitur, sed quod ex eo restat, unā cum arteriæ sibi junctæ reliquo, deorsum versus, per sinistra ilia pertendit, fitq; omēto generationis principium, penes hanc partem. Eodem modo in dextris ilius omenti portio descendit, cum illius loci vasis, quæ in ventris gibbo sese contingunt. Quapropter & hic illud, tanquam indicem sequutus, ad amissim ipsius originem, præter jam dictas, conspicias. Porro inferior omenti portio, pauciores venas & numero & magnitudine obtinet. Enascitur autē ex ventris finis, unde & vasa habet, reliquias quasdam simul ipsi deorsum verius abundantia. Omnes autem hæ particulae sibi mutuò continuæ sunt, corpusque unum, nempe omentum, constituūt, idq; figura marsupij, quod orificiū quidem ex ventriculo exortū superius & inferius obtinet: totū verō ejus spatium, quatenus ex dictis cōsistit principiis, deorsum versus procedit. Adnascitur autē interdū omentū ipsum ali cui fibræ jecinoris, lienis, atq; etiā colo. Sed quale nam sit omentum, & unde oriatur, si ad prædictum modum confectionem moliaris, haud ægre invenies. Quum autē multæ sint conjugationes ex arteria, vena & nervo, in singulis orbibus intestinorū: insuper multa inter eas spatia, in quibus duplex peritonæum habetur: ex his omnibus constare mesenterij substantiā, ipsi omēto persimilem, intelligito. Hoc siquidē corpus, quod mesenterium, mesaræum, & lactes dicitur, medium inter intestina habet sitū, & omnes venas ex jecore in ipsum descendentes, unā cum vicinis arteriis & venis, in orbem complectitur, quemadmodum ipsa intestina singula. Ubi igitur vasis & intestinū obtenditur, simplex est: ubi verō ipsis medium interjacet, nō amplius indumenti usum, sed copulæ exhibet, nimirū duplex quum sit. Quod si obesum abundē animal fue-

rit, eatenus augeri mesenterij pinguitudinē accedit, ut interdum vasa conscendat. Quanquam in hujuscemodi animantibus etiā alias pleraq; peritonæi partes pinguedinē habere conspiciamus, præcipuē in quibus non grandia vasa habentur, & viscera longius absunt: quippe à calore liquefcit, à frigore conservatur: atq; ob id semper in nervosis consistit partibus, & iis qui otiosam vitam agunt, abundat. Talis sanē peritonæi, & eorum quæ ex eo gignuntur, natura est. Porro mesenterij arteriæ ac venæ invicem coeunt, ceu in arboribus ipsis radices, ad principium unum omnes perveniunt. Iam verō ea quæ intra peritonæum consistunt, præstat singula per se, ex corpore exempta, inspicere. Licebit etiā, post exempta intestina, glandulas mesenterij unā cū vasis, quæ ad ipsas perveniunt, ab illis orta, quæ ferebantur ad intestina, intueri. Ventriculo igitur, atque singulis intestinorū, duæ tunicae insunt: unica autē cum vesicæ, tum vulvæ, Habet autē interior ventriculi tunica, fibras rectas, exterior orbiculares. At intestinis, pleraq; circulares insunt fibræ, quibus pauculae rectæ superpositæ sunt. Omnia igitur hæc cunctis animalibus sanguine præditæ insunt: quibus omnibus etiā & jecur inest. Quæ verō jecur habent, iis & lien omnino est, & meatus qui bilem excipiant, etsi fellis vesica nonnulla careant. Cujus situs idem ipsam sortitis animalibus, sub maxima fibrarum jecoris perpetuò est. Non tamen jecoris fibræ pares numero, vel genere, vel specie, vel magnitudine, in animalibus cunctis habentur. Gulosis enim & timidis inest magnum jecur, multifidumq; diversum autem, contrario modo affectis. At quibus magnum est, in plures majoresque fibras, quàm hominibus, scissum est: quanquā in hominibus universis, nec magnitudo, nec fibrarū numerus similis visatur. Occupat autem interdum paucis in hominibus partem sinistram jecur, sicuti & in multis animalibus aliis. Intestinorum natura, quatenus intestina sunt, omniū eadem habetur: magnitudine autem & numero anfractuū evariat. Primum igitur intestinū est, quod exortum, siue ex pueri vocant, pyloro continuū. Ab hoc secundum, quod à duodecim digitorum longitudine, dodecadactylon dicitur: jejunum autē, quod cibo semper sit vacuum, Tertium tenuius intestinū, est substantia huic simile. Differt autem, quod neq; reperiatur vacuum, nec tot vasis scateat. Quartum est, quod cæcum appellant. Quintum, quod colon. Ab hoc in extremo relictum intestinum ad sedem usque porrectum est. Sic & lien in sinistra parte consistit, concavo ipsius in dextram converso. Atque vena quædam ex jecinore ad ipsum pertinet, cujus processus in ventriculū derivat. Porro jecur venas ex mesenterio ad concavā ipsius partem pertinentes, excipit. Vocant autem hunc locum, in quē omnes venæ meseraicæ se colligūt, portas. Hic enim reperies maximū venæ os, in quam aliquo specillo immisso, per singulas fibras leviter ipsum propellēs, substantiā incumbētē scalpello præcides, donec ad eam venam, in qua latet specillum, perveneris. Hac detecta, sic ut ipsam nō dissecueris, carnē visceri circumdatā vasis inde procedentibus,

Omentum
quid.
Epiploon.

Lienis positi.

Omenti figura.

Mesenterij
substantia
ex quibus
constat.

Mesenterij.
Lactes.
Mesaræum.

Pinguitudinē
nem à calore
liquefcere, cō
servari à fr
gore.
Meseraicæ
vena.

Ventriculi
singulisq; in
testinorum
duæ tunicae
insunt.

Vesicæ & S
va unica tun
nica inest.
Fibrae Senu
tris & inter
sinorum.
Sanguine
præditæ quæ
insunt.
Vesica fellis
situs.

Jecur magnū
multifidumq;
quæ inesse gu
losis & timi
dis.

Jecur nonnullis
hominibus
in sinistra
parte locatum.

Intestinorum
natura, &
ordo.

Exortum in
testinum.

Dodecadactylon, siue
jejunum.

Tenuius inte
stinum, siue

ilcon.

Cæcum inte
stinum.

Colon inte
stinum.

Rectum in
testinum.

Lienis sinis
tra parte locatus.

Vena à lienis
in ventricu
lum.

Porta Senu

cedentibus intermediā adimito. Siquidē à por-
tis in singulas fibras, quotquot fuerint, venam
unam grandē porrigi deprehēdes, quia in exiles
multas diffusa, sicuti & illis in alias, quantū vasa
interjacet, totū visceris carne repletum est, quā
tuismet digitis eximere poteris, ut vasa ipsa nu-
da cernere liceat. Quod aut in una tibi fibra con-
spectū fuerit, id comperies in omnibus. Quod si
exactē portarū regionem sequaris, spectabis e-
tiam meatū ex bilis vesica, ad intestinorū produ-
ctionis initium pervenientē, nō multò inferius,
quā pylorus habetur. Qui meatus, quā huic inse-
ritur, ramulū de se paulò suprà pylorū emittit.
Omnia itaq; hæc accuratē intuitus, deinde hepa-
tis gibbū accedes, illā ipsius fibrā incidens, cuius
concava in parte venas detexeris: quippe venas
similiter in gibba sine arteriis propagari cernes:
Constat aut vena ex una duntaxat tunica, sicuti
arteria ex duabus. Sed jam ad renes ire tempesti-
vum videtur, quorū dexter in omnibus animan-
tibus elatior eminet, nonnunquā grandem jeco-
ris fibrā attingens. Porro à spinæ vasis, arteria
nempe & vena, inseruntur in eos haud exiguæ ma-
gnitudinis vasa, sinis quidem singula utrinque:
aliis autē quibusdā animalibus, bina. Insuper cō-
cava in sese renes cōversa obtinēt: gibba verò ad
animantis latera adversa. Evidenter aut renis si-
num cernes, corpore quodā membraneo circun-
dato: cui quidē haud pculā vasorū insertionē, al-
terum quoddā corpus in utroq; rene adnascitur,
concavū & oblongū, q̄ à deferēdo lotio, urete-
ra, hoc est, urinariū meatū nomināt: qui una tan-
tū tunica cōstat, crassiori tamen q̄ quæ inest ve-
nis. Hi igitur duo pori, substantia quidē vesicæ si-
miles, obliquē simul in eam inseruntur, in cuius
regione interna, tale sortiuntur operculū, quale
in columbariis scyphones dicti. Est siquidē tam
sapienter constructū, ut ab ijs solum recludi pos-
sit, quæ p meatū deferuntur. Mox aut deprehen-
des, quū meatus urinarios peritonæo (quo ob-
volvuntur) nudaveris, & arterias & venas simili-
ter suspensas, ad peritonæi foramina obliquas
deduci: has quidē ut testes nutriant, illas ut gene-
rationi subserviant. Superest aut ut tertiā tibi in-
strumentorū differentiam commemorem, quæ
nimirū musculi sunt, alii in abdomine, nō excre-
mentis tantū egerendis, sed ad efflationes quoq;
& voces ædendas, commodi: alii in sede ad strin-
gendū, claudendūq; meatus extremū, accōmo-
dati: à quibus etiā revellitur sedes, si quando per
dejectiones crebras, plapsa fuerit. Ubi igitur pu-
bis ossa, cartilaginis interventu coeuntia, didu-
xeris, in exteriorēq; partē utrūq; iliū os detor-
seris, conspicias sanē ligamentū quod tum ex la-
to osse, tū ex pectine oritur, in unū musculi cor-
pus degenerare, magni quidē, sed membranosi,
latiq; ad sedis utrāq; partem producti. Eo igitur
tempore, quo animal alvū exonerat, octo abdo-
minis musculi pariter cum septo, pro cōmuni om-
nium musculorū functione tenduntur: orbicu-
lari musculo relaxato, qui circulatim sedē com-
plectitur. Reliquo omni tempore circularis hic
musculus constrictus, sedis os claudit. Similiter
dum vesicæ termini musculus, ubi primum i-
psius cervix oritur, detexeris, haud dissimilē eū

esse ab illo sedis orbiculari comperies, tum fun-
ctione, tum usu: quippe & hic, sicut ille, orificū,
cui præpositus est, constringit.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus,
Liber VII.



Hoc libro quomodo spiritalium in-
strumentorū consecutionē admini-
stres, explicare proposui. Pulmo igitur, cor, & thorax, principaliora spi-
ritus instrumenta sunt. Mox arteria-
rum genus duplex: unū à sinistro cordis ventri-
culo in universum corpus propagatū: alterum
quod carū est arteriarum, quas asperas vocant.
Quarū quidē in cervice una maxima existit, quæ
frequenti ramorū serie pulmones adit. Cuius su-
periori extremo, veluti caput quoddā, incumbit
particula larynx dicta. Hæc itaq; universa, prima
ratione natura condidit: quædā necessarij ad
vitā ipsam usus gratia: quædā utilia, non tamen
animantibus necessaria, iam verò aliā quandam
cōstruxit particulā, quæ & substantiæ peritonæo
similis compos est, & eundē usum omnibus spi-
ritus instrumentis, veluti illud cibi, exhibet. Est
aut particula hæc, ipsa costas succingēs membra-
na, quæ omnibus inter thoracem instrumentis
obducitur, quemadmodū peritonæum vasis quæ
infra septū habentur. Ex ipsa aut, membranæ tho-
racem intercipientes nascuntur. Atq; hac sola re,
structura ipsius à peritonæo evariat, quod vide-
licet duplex omnino sit, non una, quemadmodū
illud. Porro naturam ipsius accuratē perdisces,
si os pectoris, ubi detectum prius fuerit, secundū
longitudinem disseccueris, usq; ad cartilaginem
ensiformem, ac dein utranq; pectoris partem le-
viter in exteriora reduxeris, ita ut pericardium,
q̄ ambit cor, minimē vulneretur. Quod si id fie-
ri nequeat, membranæ tamē thoracē intersepiē-
tes, ab effectu immunes permaneant. Sic siqui-
dem utraq; mēbrana, tam quæ dextras, quā quæ
sinistras succingit costas, quæq; supernis parti-
bus, ipsiq; pulmoni obducitur, sibi cōtinua appa-
rebit. At cordis tunica peculiaris, pericardios no-
mine, diversa ab utraq; harum existit, in medio
ambarū sita, & utrinq; ab ipsis cōprehensa. Non
tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tuni-
ca annexa est: * verū circa alias quidē omnes
ipsius partes, haud parva quædā regio interme-
dia existit, motui cordis accōmodata: ad basim
verò eius, quæ orbiculata est, prodeuntibus ab il-
lo vasis, à quibus trahit ortū, connectitur. Porro
quemadmodū pulsans viscus, omnes appellant
cor, sic etiā pulsantia vasa, arterias nuncupāt. Ce-
teras igitur omnes arterias pulsantes, quotquot
toto insunt corpore, sensu dignoscere, nullius
est negotii: & omniū ipsarū cum majore arteria
continuitas, idem hoc indicat. Verū in pulmo-
ne pulsantes, sensu admodum evidenter depre-
hendere nemo potest: inde tamen quod sinistro
ventriculo sint continuæ, conjecturam aliquis
fecerit. Etenim quod vās ex sinistro cordis ven-
triculo in pulmones defertur, tametsi corporis
quidem substantia, sit vena, hoc est, venæ tuni-
ca constet, usu tamen venosa arteria vocatur.

Spiritus in-
strumenta
principalio-
ra quæ.

Arteriarum
genus du-
plex.
Aspera arte-
ria.

Larynx.

Membrana
costas succin-
gens est du-
plex.

Pericardium
ambire cor.

Pericardium
suum.

Cor pulsans
corpus.

Arteria va-
sa pulsantia

Arteria ve-
nosa fertur
in pulmones
à sinistro cor-
dis ventricu-
lo, unica tuni-
ca costans.

*Vena arterio-
sa duabus tu-
nicis constans,
producitur
ad pulmones
ex dextro cor-
dis specu.*

*Venas totius
corporis con-
stare unica
tunica: arte-
rias ex dua-
bus.
Arteria tu-
nica quales.*

*Arteria ve-
nosa.
Vena arte-
riosa.
Arteria a-
spera compo-
sitio.*

*Ossium tho-
racis confide-
ratio.*

*Cor inter &
traq; thora-
cis spatia me-
dium consti-
tere.
Spiritus rece-
ptaculū esse
sinistrum cor-
dis ventricu-
lum.
Costarum
lationes.*

Quod verò ex dextro procedit, tametsi duas for-
tiatur tunicas, perinde ut arteria, quia tamen nō
pulsat, appellatur vena, sed arteriosa. Optimum
quippe fuerit, pulsu, atque eius defectu ipsa vasa
discernere. Verum quum hoc sensibus nō adeo
clare distingui queat, à cōmunionē quam cum
utroque cordis ventriculo habent, indi nomen
debet: appendix verò, à corporea substantia. Cæ-
terum juxta corpoream substantiam arteria qui-
dem est illud vas, quod ex dextro cordis ventri-
culo oritur: vena autem, quod ex sinistro. Con-
trà, usus ratione, quod ex sinistro prodit, arteria
est: quod ex dextro, vena. Totius igitur corpo-
ris venæ, ex peculiari una tunica constant: arte-
riæ verò, ex duabus: quarum exterior quidem,
qualis venæ tunica existit: interior autem, cras-
sitie huius ferè quintupla, duriorq; & trāsversis
fibris distincta: quæ interna superficie habet a-
liam, ceu cuticulam quādam araneorū telæ per-
similem. At exterior, quam etiam venæ obtinet,
rectis fibris, & quibuscūq; mediocriter obliquis,
trāsversis nullis, contexta est. Ex tribus itaq; va-
sis pulmonem intertextentibus, quod à sinistro
cordis ventriculo proficiscitur, nūcupetur arte-
ria venosa: quod à dextro arteriosa vena: tertiū,
arteria aspera, ex cartilaginibus quæ imaginem
C. referunt, fabrefacta. Quæ cartilaginee circu-
lares, tum in grandi arteria, quæ in collo caudi-
cis rationem obtinet, tum in parvis, quæ ab illa
in pulmones insertæ sunt, in priori parte situm
habent: in collo quidem, vicinæ œsophago: in
pulmone autem, venæ quam paulò antè voca-
vimus arteriosam. Porro vasorum intercapedi-
nes, peculiari pulmonis substantia replentur. Li-
cet autem pulmonem thorace exemptū, sicuti
& cor ipsum, incidere, nō tamen ita societatem
ipforum, quam cum membranis ineunt, cogno-
scere. Iam verò ossium thoracis naturam simili-
ter speculabere, quæ evidenter quidem, corde a-
nimali exempto, in conspectū prodit: quanquā
& insito adhuc ipso, palam cernatur. Præterea in
tali administratione, præter jam commemorata,
hoc conspicias, nempe cor, inter utraq; tho-
racis spatia medium, consistere. Motus autem
ipsius indicat, quasi in parte sinistra sit colloca-
tum: id quæ duplici de causa. Primum, quia spi-
ritus conceptaculum hic consistit: deinde, quia
vertex eius ad hanc magis regionem inclinat.
Porro costæ singulæ deorsum versus simul &
prorsum oblique feruntur, ex spina ducentes or-
tum. Nam duplicibus inibi articulis cum una-
quaque dorſi vertebra committuntur. Ubi verò
ad pectoris regionem perveniunt, cōtrario mo-
do, sed oblique etiam ad os illius attolluntur: ubi
cartilago vice ossis genita, diversam naturam
obtinere, facileq; acuto simul & valenti scalpello
potest incidi. Rectam itaq; utraq; parte lineam
deorsum versus per totius thoracis regionem
ducens, eam pectoris partem attollas, quam ut-
trinq; ductæ lineæ diffiniunt: postea verò didu-
cas latera, robore maximo adhibito, ad reflecten-
das eas partes costarum, quæ vertebriſ vicinæ
existunt. Sic enim omnes thoracis partes pa-
lam intueri licebit, ac multò magis septo à co-
stis abscisso: insuper hoc magis adhuc, si duabus

costis diremptis invicem, omnē carnem inter-
mediam præcidas. Sic igitur & venam cavā ma-
nifestè ad jugulum usq; recto tramite percurren-
tē cernes, & cordis processus, quos aures nomi-
nant, peculiarem naturæ sortientes substantiam,
quæ in alia nulla particula habeatur, quemad-
modū profectò & cordis ipsius essentiam. Quod
autem corporea cordis substantia, permultum à
musculo differat, ex illius sanè constat actione.
Est enim cordis motus non arbitrarius, nec ces-
sare, quo ad animal vita fruitur, potest. Muscu-
lorum autem functo subinde quiescit, ac rur-
sus excitatur, animantis arbitrio subserviens.
Actiones verò imitantur proprietatem substan-
tiæ. Huius rei gratia, quæ quidem particula
eandem speciem substantiæ possident, similiter
operantur, etsi diversis permultæ animantibus
insint: quæ verò non habent, diversa harum est
functio, quamvis unius animantis particula exi-
stant. Quapropter nec musculi eandem cū cor-
de functionem habent, quoniam neq; substan-
tiam. Etenim si quis cor & musculū quemlibet
pariter coctum, utrunque gustarit, haud medio-
crem ipſorum gustu differentiam persentiet: id
quod substantiarū differentia maxima nota exi-
stet. Hallucinantur igitur qui cor musculum esse
existimant, aut nervus id ad suam functionē ege-
re: nō intelligentes actionis ipsius excellentiam,
ex sua visceri substantia necessario inesse. Cui si
quidem thorace exemptū, diu moveri videntur:
quare nervis ad eum motum non indiget, Qui si
similem motū præstare possent, cur cetera par-
tes cui nervi insunt, non similiter pulsare viden-
tur? Porro omnes nervos utranq; facultatem ha-
bere, sensitricem nempe & motricem, ratio est.
Verum molles ad sensum aptiores, duri ad mo-
tum existunt. Ab eadem tamen radice pluries di-
scissa, apparent quidam nervi in musculos, alii
in alias particulas inseri, quemadmodum & in
tertia ipſorum conjugatione, & sexta nihilo mi-
nus, habere novimus, à qua cor exilem quendā
nervum accipit: unde etiam pulmo, jecur, ven-
tricularius, & mensenterii insuper totum, unā cū
intestinis, nocnō universi laryngis musculi, suas
excipiunt propagines. Iam verò cordi, quod a-
nimosæ virtutis initium est, ac veluti fons qui-
dam nativi caloris, aures quædam annexæ sunt,
nervosiores ac magis cuticulares ipsa cordis
substantia. Quæ particula & colore nigriores
sunt, & corpusculis cuticularibus manifestò si-
miles, sinus cuiusdam ante cor efficiendi gratia:
ob quam rem, ipsas natura & cōcavas & cuticu-
lares condidit. Duæ verò hæ sunt, in utroq; vaso
rum materiam invehentiū singulæ. In dextra
quidem parte, qua vena in cordis sinum inseri-
tur: in sinistro verò, qua arteria venosa. Has
aures quum aperueris, tum ipsum cordis corpus
in conspectu erit, tum ex dictis orificiis utrunq;
deinde membranę insertioni ipſorū incumben-
tes, tres quidem in sinu dextro, duæ verò in sini-
stro: quarū structuræ figura, similis telorū cuspi-
di existit. Sed hæc quidē & corde thorace exem-
pto licet accuratè intueri, sicuti etia reliqua duo
orificia vasorum, quæ materias ex dextro qui-
dem ventriculo in pulmonem educunt, ut veræ
arteriosæ:

Cordis aures

*Cordis sub-
stantiam per
multū differe-
re a musculo
Cordis motu
esse non arbit-
rarium.
Musculorū
functio arbit-
rio animantis
subserviens.
Actiones imi-
tantur proprie-
tatem substantiæ.*

*Gustus differe-
ntia, differe-
rentes esen-
tiam substantiarū
gustant.*

*Cor nec intus
sensibile est,
nec eget nervis
ad obediendum
functio-
nes.*

*Nervi om-
nibus sensu-
endi & mor-
vendi faculta-
tas insunt.*

*Nervos mol-
les ad sensum
duros ad motum
se ad motum
aptiores.
Viscera & n-
ervi o s reci-
piant.*

*Cor animosæ
facultatis in-
itium esse.
Cordis auri-
cula.*

*Cordis auri-
culariū no-
merus.*

*Cordis auri-
culis incum-
bentium me-
branarum
numerus &
figura.*

arteriosæ : ex sinistro autem in totum animantis corpus, ut grandis arteriæ. In quibus iterum tres utrinque; membranas ad C. literæ similitudinem factas comperies, extra cor tendentes, veluti trifurcas intro. Prius verò quàm cor ex animante auferas, cavæ venæ ramos considera : ad hæc glandium magnum, quod Græci thymum vocant: rursusque cordis panniculi radicem. Insuper examina, quo modo à dextro sinu vena quædam ad spinam portendat, quintâ dorsi conscen-
dens vertebrâ. Etenim quæ venæ ipsum cor nutriunt, perpetuò in omnibus animantibus, ex illo etiam sinu prodeunt: ac vocant ea vasa, cor involventia : quoniam bina numero totum ipsum perreptant: quemadmodum à læva parte duæ arteriæ majoris soboles, post primû extra membranam processum, in ipsum cordis corpus perveniunt. Reperitur autem os unum in corde animalium omnium, quanquàm non exactum, sed cartilaginis instar. Cæterum quantò animantis genus fuerit corporis mole vastius, tanto plus ossæ substantiæ cartilago illa sortietur. Quare in maximis, ubi plus ossæ substantiæ gignitur, convenit ipsam tunc appellare cartilagineum os, minimè cartilaginem ossæam : quale nimirum os, ipse haud magno negotio reperi, in illius elephanti corde, qui Romæ nuper fuit jugulatus. Suspenduntur autem ex tali esse ipsæ membranarum radices, vasorumque; arterialium processus, ibidem suspensi corroborantur: quem scopum sibi in illius generatione proposuit artificiosa natura. Cæterum qui me administrantem non vidit, sed edoctus libris ad confectionem accedit, detecto quidem sinistro sinu, aperto autem in longum toto aortæ processu, si studiosè radices aortæ & membranarum sequatur, ex facili os ipsum inveniet : siquidem huius radix & venæ arteriosæ, membranarumque; ipsarum, in osse cordis habentur. Quod verò Aristoteles ait, triplicem sinum inesse cordi, merum esse somnium videtur. Toto corde nudato, videbis sinisteriorem eius ventriculum ad summum patefcere verticem: dextrum inferius multò cessare, & circumscriptione subinde propriam habere. Omne autem animal, vel elephante grandius, vel alaunda minutius, quod aërem inspiret, similem cordis structuram obtinet, vel potius specie eandem. Similiter et pulmonis: cuius fibræ in omnibus animantibus, de quibus verba fecimus, duæ quidem in dextra ipsius parte habentur, duæ verò in sinistra: præter has in dextra thoracis parte alia quædam quinta fibra exigua, veluti alterutrius soboles, cernitur. Licet autem cor ipsum, adhuc vivente animali, citra thoracis sinuum convulsionem, detegere, si pectoris os à subjacentibus liberans, te confestim ad involucrum ipsius cordis dissecandum convertas, membranis quæ thoracem intersepiunt, minimè vulneratis. Quæ quidē si, ut dixi, corde detecto illæse permaneant: omnes ipsius cordis functiones incolumes in vivo animali servantur. Siquidem & respirare similiter, & clamare animal vides: ac si à vinculis ipsum liberares, currere, ut prius consuevit. Quod si vulnus vinculis adhuc comprimas, etiam cibum assumere, si esuriat, conspicias: atque si sitiatur, bibere. Et quid oportet

mirari, quum Marylli Mimographi puer curatus sit, vivatque; adhuc, etsi cor illi aliquando fuerit detectum? Ubi igitur cor citra thoracis perforationem detectum est, vasorum exortum fune excipere minimè possis: cordis autem basim possis, verum animal statim comoritur. Porro alterutra, vel utraq; capacitate thoracis forata, omnia quæ respirationi subserviunt, destruuntur. Antè verò quàm perforata sit una, vel altera pars thoracis, non licet ipsum pulmonem cernere, nisi fortè costæ excisæ, succingentem membranam cōserves integram. Si verò animus sit utranque; thoracis capacitatem scindere, duas lineas per costarum flexus ad animalis longitudinem ducito, quibus ossa reflexa dirimes. Deinde aliam transversam lineam tertiam per mucronatam cartilagineam incidēs. Post hæc toto pectoris osse reflexo sursum, pericardioque divulso, ambos cordis sinus æquè pulsantes videbis. Cæterum evidenti-
us adhuc quàm antea cernes arterias, aut vicissim, aut eodem tempore & numero per totum animal elevari, submittiq;. Hæc igitur confestim ipso detecto innotescunt. Procedente tempore, breves utrinque; ventriculi motus, longis intervallis intercipiuntur. Iam dextri sinus elevatio, peculiari ipsius natura perficitur. Huiusmodi autem spectabis potissimum, ubi ipsi ventriculi immobiles propè evaserint. Primum etenim, utraq; ipsorum, quæ ad verticem consistunt, moveri cessant: mox quæ his proxima sunt: atque hoc fit perpetuò, donec solæ bases in motu versantur. Quibus cessantibus, languidus brevisque motus ex longis intervallis in cordis auribus cernitur. Enimverò qui pollicentur se ostensuros arteriam sanguine vacuum, inania illi, & minimè probabilia pronunciant.

Marylli puerum curatum fuisse, cui detectum cor fuerat.

Cordis utriusque sinum pulsare.

Arterijs inesse sanguinem.

GALENI PERGAMENI

De anatomicis administrationibus.

Liber VIII.



Horacem porro nominant, quod à costis cōprehenditur. Sunt autem hæc omnibus quæ prius retuli animantibus, in duodenum numerum exporrecte. Rarissimè siquidem decimam tertiam costam visitur: atque hæc ita rara sunt, ut inter mille vix unum tali costarum numero invenias. Elatior autem thoracis finis, ipsæ claviculæ existunt: quemadmodum demissior omni animantium generi, septum transversum, quod phrenas & diaphragma nominant. Sedes omnibus costis duplex: prior, pectoris os: posterior, vertebræ sunt, quæ totidem numero planè, quot & costæ habentur. Pectoris os, unum quidem apparet, ob structuræ concinnitatem. Membranis autem derasis, quod & plura ossa sint, & numero totidem, quot cum eo costæ cōmittuntur, palam innotescit. At verò septem priores thoracis costæ, cum pectoris osse coarctantur. Octava verò ad radicem cartilaginis ensiformis consistit. Reliquæ quatuor in thoracis latera desinunt, tantum priori parte deficientes, quanto etiā alii breviores sunt. Minima inter ipsas est quæ postrema habetur. Omnes igitur retrò cum dorsi vertebra coarctantur, idque duplici

Thorax dicitur quod à costis continetur. Costarum duodenus numerus.

Clavicula.

Septum transversum. Phrenes. Diaphragma.

Costis omnibus duplex sedes.

Pectoris ossa tot, quot costæ cum eo cōmittuntur.

Costarum septem priores cum pectoris osse coarctantur.

*Costas omnes
vertebris
dorsi alligari
duplici nodo*

*Septi trans-
versiorigo.*

*Respirationē
(quæ putatur
essenaturale opus)
a solo septo
transverso
suppeditari.
Septum trans-
versum est
musculus.
Musculorū
intercostalium
fibra.*

*Costarum sin-
gulis in pro-
pinquo esse
arteriam, ve-
nam, & ner-
vum.*

*Fibris utro-
rumq; mu-
sculorū inter-
costalium dis-
sectis perire
vocem.
Suum ma-
gnū esse apri-
simū ad spiri-
tualium or-
ganorum a-
natomem.*

plici nodo: altiori quidē ad ipsum vertebræ cor-
pus: humiliori, ad lateralem ipsarum processum
declivem. Hinc aut in priorem, inferioremq; regio-
nem longius obliquæ procurrunt, & quum jam
anterius fuerint, ab hac latione cessant: ubi natu-
ram cartilagineā sortitæ, sursum ad pectoris os,
cōtra priorem motū moventur: quarū finis car-
tilago exquisita censetur. Ab huius aut cartilagi-
nis partibus intimis, septū transversum oritur.
Elatior, anteriorque ipsius pars, cartilagini mu-
cronatæ subnascitur: quæadmodū posterior atq;
demissior, ipsi spinæ cohærescit. Verum superior
pectoris ossis finis cū prima semper costa com-
mittitur, necnō cū claviculis, in quibus hæ nimi-
rum habentur. Cæterum nō omnes muscoli, qui
thoraci quocunq; modo cohærescunt, motus i-
psius gratia sunt cōditi. Nam quidā à pectore &
costarū spuriarū sedibus sursum tendentes, hu-
meri subserviūt articulo. Quidam ad abdomen
descendentes, suos usus habēt, & thoracē paulu-
lū detrahūt. Quemadmodū qui costarū extre-
mis a foris objecti, juxta pectoris os prorsum, &
vertebras retrorsum, juncturas constringunt, &
thoracē leviter cōprimūt. Totū verò ipsius mo-
tū manifestē gubernat inferius septū ipsum tras-
versum, dum intenditur, laxaturq; vicissim: dila-
tans, cōprimēsq; indidem terminū, ac attrahēs
ab ima parte per mucronatā cartilaginem pecto-
ris os: costas aut spurias sursum leviter & prorsum.
Iam verò respirationē (quæ naturale opus, nō
animale putatur esse) septū transversum dū-
taxat suppeditat: quod nō modò substantia, sed
usu quoq; musculus est. Utaut ad intercostales
musculos nos convertamus, eorū fibras superfi-
ciarias ab elatiore costa ad humiliore leniter ob-
liquæ in anteriora pertinetes cōspicies. Paulatim
verò has dissecans in animali cōmortuo, tūc in-
ternas accedes situ his adversas, ut ambo ad X. li-
teræ similitudinē habitū inter se exigāt, quæ us-
que ad cartilagosas singularū costarū particu-
las cōservari videbis, in illis aut variari. Etenim
in his exteriores fibræ talem haud dubiē situm
occupāt, qualem interiorē sortitæ erāt: cōtra in-
teriores, qualē possidebāt externæ. At in muscu-
lis costarum, quas nothas vocant, ad finem usq;
ipso, eadem fibrarū natura cōsistit: quoniā hæ
nullo flexu incurvātur. In ipsis porro intercosta-
libus musculis, proximè ad ipsius costæ os, arteriā,
venam, et nervum, in ima cuiusq; ipsorum parte
cōperies: propius tamē ipsum nervum. Quare di-
ligentiam adhibeas oportet, corporibus quæ fi-
bris incidendis subjacet: nam hæc tria mutuò se
vidētur cōtingere, nempe arteria, vena, atq; ner-
vus. Cæterum medio inter summas altasque fi-
bras situ nervum cernes, si fibras ad amussim se-
quaris. Plures tamē superficiariæ fibræ ijs quæ in
alto habentur, esse apparebūt. Porro animal am-
plissima voce præditū, apriusimū est ad cōsectio-
nes, in quibus vox quædā læditur. Utrisque igitur
fibris dissectis, vocem simul & efflationem ani-
malis perire, ipsa res persuadebit. Quare præstat
in huiusmodi administratione suæ magnū adhi-
beri. Valens enim ei mēbrana costas succingens
ineff, quā ne perfeces, sedulò curandum est. Hac
enim secta, dum thorax attollitur, nō parum ac-

ris ambientis, in mediā thoracis pulmonisq; re-
gionem trahitur. Dum autem submittitur, hoc
ipsum rursus per vulnus egreditur. Notum ve-
rò est, ex aëre qui per inspirationem attrahitur,
tantū necessario ob vulnus perire, quantū vide-
licet in ipsum thoracē influit extrinsecus. Quan-
tò autem per os minus quàm ad necessariū sibi
usum inspiraverit animans, tantò etiam minus
efflabit. Cæterum quantò efflatio ipsa decreve-
rit, tantò vocem sequi breviorē necesse est. Iam
verò in quocunq; musculorum intercostalium, si
incidatur costas succingens membrana, idq; li-
nea notabili, animal semispirans protinus & se-
mivocale redditur. Sin autem in altera thoracis
parte æquè secta fuerit, spiratio & vox aboletur.
* Quemadmodum si in contractione thoracis
vacui aëre, qui per vulnera elapsus est foras, pla-
gas obturaveris ipsas, respirabit confestim ani-
mal, vocemq; emittet. Quod autē utrisq; fibris
sectis in omnibus musculis intercostalibus, non
vox modò, sed efflatio quoq; intereat, nostrum
inventum est: quemadmodum etiam, ubi solis
nervis præter dorsi medullam sectis, inoffensæ
quidem musculorum fibræ servantur, actio au-
tem deperditur. Licet verò circa spinā dorsi ner-
vos omnes, qui in musculos intercostales perve-
niunt, lino excepto attollere, non tamen vincu-
lo astringere. Clamat enim sic percussum ani-
mal: Deinde subito obtumescēs, ob nervos lino
cōstrictos, spectatores reddit attonitos. Nam mi-
raculum esse videtur, nervis exiguis in dorso la-
queo interceptis, vocem perire. Complures ta-
men in huiusmodi indicationibus tibi subser-
viant oportet, ut quàm celerrimè laquei omni-
bus nervis circumponantur. At magnitudo offen-
sæ haud æqualis in totum omnibus intercosta-
libus obvenit: sed ijs qui costas spurias attingūt,
tantò minor, quāto musculi earum elatioribus
minutiores existunt: quanquā musculus, qui ad
primam pertinet costam, oblatus, minimā etiā
offensam adfert. Porro in elatioribus costis, ner-
vus ipsis porrectus altius invenitur: recedens au-
tem paululū ad imam regionem, in humilio-
ribus. Cavendum itaq;, ne quum fibras dividis,
nervum subditum lædas, cuius offensionem im-
mobilitas musculorū intercostalium, cohibitio
efflationis, atq; abolitio vocis sequitur. Ad hæc,
nervi propter arterias carotidas transcurrentes,
si noxa aliqua momentanea afficiantur, animal
reddunt mutū: non aut ijs similiter, qui interco-
stalia excurrunt. Quippe raucus quidā strepitus
in ijs relinquitur, qualis in somno stertētibus fie-
ri apparet. Hic strepitus musculis intercostalib.
resolutis oblitteratur. Resolvuntur aut cōfestim,
aut fibris ipsorum cōsectis, aut costis excisis, aut
nervo ad radicē vitato, aut tota spinali medulla
propter dorsi initiū incisa: qua sectione potissi-
mū raucus strepitus aboletur, simulq; omnes in-
feriores particulæ, quæ ad musculos intercosta-
les, atq; imū ventrē spectant, cum eisq; etiā & se-
dis musculi, pudendorū, vesicæ, & crurū, subito
resolvūtur. Verum diaphragma, licet infra mu-
sculos intercostales habeatur, non resolvitur ta-
men, quod videlicet ipsius nervorum origo, to-
ta sit elatior thorace. Neq; etiam illi musculi sex,
qui

*Spiratio &
vox quam
pereant.*

*Mutuum quod
ratione su-
a reddi po-
sit animal*

*Mutū red-
animal, si
gniter læ-
nervis ex-
currunt
propter ar-
terias carot-
idas.*

*Intercostales
musculi
ratione no-
vi solentur*

qui ex cervice descendunt, attollentes supernā thoracis regionem, quicquā inde offenduntur: etenim & in hos nervi deferuntur à medulla spinali cervicis. Utitur aut animal septo transverso solo in parvis respirationibus. Quū verò majoris respirationis usus ipsi oboritur, aut ob exercitia, aut febrim, aut vehementem aëris calorem, necessitas quidem est, functioni diaphragmatis etiam intercostales musculos subvenire. Sin autem magis usus respirandi increverit, vel ipsis elationibus musculis illā functionem obit. Commune autem hoc de omnibus musculis sciendū est, quod si nervos ipsorum læseris, si amputaveris fibras omnes transversas, totos statim musculos suo motu privabis. Quare necessarium tibi admodum fuerit, principia nervorum, qui in ipsos distribuuntur, & fibrarū situm, pernoscere. Etenim costę cuiusq; os, juxta inferiorem circumferentiam nudare oportet. Ubi autem jam apparuerit nervus, unā cum eo venit inspicienda vena, & arteria, quæ in superficie magis quā nervi extant, humilius tamen paulatim sitæ. Igitur ab elationi parte juxta costę circumferentiam hamulo exiguo subdito, licebit tibi nervum excipere, citra adjacētia verba, præcipuè citra ipsam arteriam: quoniam ea, vehementiori sanguinis profluvio, nervum obscurat. Si verò ipsam quandoque vulneres, scalpello statim prehensio, transversam totam disseca: hæc nanq; communis est omnium vasorum sanguinem mittentium prohibitio. At spinalem medullam totam transversim incidēs, nihil integrū ex ipsa relinquens: nisi fortè ex industria dimidium eius tantum velis resolvere. Iam verò spinalis medulla, quum juxta longitudinem deorsum versus per medium ad rectam secatur lineam, nullum ex intercostalibus nervis resolvit: neq; eos qui lumbis vel cruribus insunt. Transversim autem quum dimidia duntaxat pars eius divisa fuerit, siue sinistra ea sit, siue dextra, omnes nervi, juxta rectum incisæ partis tramitem, ordine resolvuntur. Quum itaque semivocale animal voles reddere, in hūc secabis modum. Ubi autem mutū subito, totam spinæ medullam transversam divides. Quoniam verò costis etiam excisis, tum efflatio, tum vox animalis offenditur, quemadmodum ob musculorum nervorūq; sectionem: dum animal vocem edit, transversam aliquam costam disseca, usq; ad succingentem membranam, ita tamē ut illam nec convellas, nec vulneres. Ubi verò costam à subdita membrana deraferis, facillimum erit partes eius divisas, ad utrumq; terminū, nempe ad os pectoris atq; spinam, reflectere, ac sic læsionem deprehendere. At si musculi alterutra in parte, aut dextra, aut sinistra, resolutionē experti fuerint, dimidiata efflationis ac vocis portio aboletur. Sin autem alterutrius dimidiata, tum ambarum functionum pars quarta vitiabitur. Nam pro musculorum qui resolvuntur numero & magnitudine, semper noxa voci succedit. Verum fibris musculorū intercostalium sectis, vel excisis costarū, ossibus, musculi quidā relinquuntur ex ijs, qui thoracem comprimūt, tum qui costarū extremis porriguntur, adeoq; eorum qui in imo ventre consistunt, primū atq; teriū conju-

gium. Quum autē thorax modicè ab his compri-matur, modica etiā efflatio gignitur, cui vox ipsa proportionatur. Ac sanè intercostales musculos, per nervos qui de spinali medulla ad ipsos pertinent, motu destitues, in quē dixi modū: diaphragma verò, ubi huius nervorū principia similiter ut reliqua affeceris. Descendūt enim in thoracē hi nervi per cervicis latera inter duas grandes colli venas, deorsum versus obliqui, musculis collo subditis inhæretes, tres quidē utraq; ex parte, qui plerūq; in suis habentur: in simiis verò plurimū duo. Tertius aut rarò in his videtur, ut in suis quartus. Origo ipsorū omniū est cervicis spinæ medulla. Ex quartę siquidē & quintę vertebrę intervallo, prima conjugatio procedit: & quintę & sextę spacio, secunda: ex origine post sextā vertebrā, tertia, quæ etiā exigua admodum est: quemadmodū si quarta quandoq; accedat, eius quę post septimā vertebrā habetur conjugationis, propago per pusilla existit. Igitur omnibus ijs incisis, diaphragma motus fit expers. Pari modo si musculorum singulorū ex cervice ad thoracem descendentiū, qui sex numero habentur, nervos affeceris, actionē vitias. Affectus autē est duplex: vel dum secatur, vel dum intercipiuntur. Hoc itaq; in universum de omnibus musculis intelligito, qd dissecto ipsorum capite, nō amplius functionem obibunt. Quia verò in quibusdam musculis capitum numerus ne deprehendi quidem potest, quū ex pluribus incipiat ossium processibus, tutius fuerit illic ipsos secare, ubi capita in idem primum conspirat. Atq; hoc quidē in anterioribus musculis facitare consuevi, in quibus profunda sectione opus est, ut qui penitiorem sitū occupent, ubi capita ipsorū coierint. Nam in posterioribus expeditissima divisio est, adeo ut vel unguibus possit administrari. At verò si in regione media tertię quartęq; vertebrę, persecueris totam spinalem medullā, spiratione cōfestim totū animal destituitur, nō solum thorace, verum etiam infra sectionem toto corpore resolutio. Atqui perspicuum est, quod si post secundam aut primam vertebram, aut in ipso spinalis medullę principio sectionem ducas, repente animal corrumperetur. Verum si post sextā vertebram, medullā spinę transversam totam secueris, universi quidem thoracis musculi statim motum amittent: solius autem diaphragmatis beneficio animans respirabit. At inferiores hac vertebrę sectiones spinalis medullę, permultis, ipsius partibus thoracem moveri concedunt. Et quanto magis ad humiliores vertebrae sectio ipsa inclinaverit, tantò plures thoracis musculos actione obeunt habebis. Non tamen sexta nervorū à cerebro conjugatio, respirationis muneri subministrare videtur: quia ne vel particula quæpiam ipsius in ullum thoracis musculū propagatur. Quod verò ad pulmonum situm spectat, costa excisa, atque unā cum membrana quæ illam ambit, quæq; *pericostion* vocatur, ablata, succingens costas simplex solaq; relinquitur, * quæ adeo transparentem per se inspectionem efficit, ut omnes facillè cernat illos, pulmones dico, in vivo animali esse thoraci conjunctos. At manifestior adhuc fit speculatio * per diaphragma nudatum

Diaphragmatis nervi unde proficiantur.

Nervorum affectus duplex. Musculi non obibunt functionem, si capita eorum dissecentur.

Spinalis medulla secta inter tertiam & quartam vertebram, spiratione cōfestim destituit animal.

Sexta nervorum conjugationis nullam particulam in aliquem thoracis musculum propagat.

nudatum, ubi peritonæi vertex avellitur. Sic si-
quidem admodum conspicua diaphragmatis ner-
vosa pars redditur, ut omnes palam fateantur,
pulmonem semper thoraci appositum esse, sive
inspiret, sive etiam expiret animal. Cæterum vel
si etiam id suffocaveris, pulmonem à septo plu-
rimum sejunctum videbis: ne secus à thoracis
lateribus: unde liquet colligere, spiritum in ipso
contentum, in regionem eius & thoracis mediā
vacuari. Omnino siquidem in animalibus quo-
modocunque extinctis, pulmo à thorace distare
videtur: quod fieri non posset, nisi spiritus ali-
quid per substantiam pulmonis transfluens, in
amplam thoracis capacitatem transfret: id quod
certè Erasistrati opinioni adversatur.

*Pulmo à tho-
race distare
videtur in
animalibus
quomodocum-
que extinctis*

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus,
Liber IX.



Uonam pacto ea quæ in cerebro &
spinali medulla per confectionem
apparent, optimè queas intueri, tū
mortuo, tum vivo adhuc animan-
te, hoc libro indicabimus. Quū au-
tē anatome quæ in cadavere celebratur, cuiusq;
particulæ naturā & situm indicet, in vivo aut, in-
terim functionē ostendat, interim autē ad inven-
tionē huius, ratiocinationes exhibeat, manife-
stum utiq; est, mortui animantis confectionem
præcedere eam oportere, quæ in vivo admini-
stratur. Igitur ossibus calvariae exemptis, mēbra-
nam quæ cerebrū in orbem contegit, quæq; du-
ra sive crassa appellatur, ad amissim inspicies,
juxta mediā ipsius longitudinem multò crassio-
rem seipsa apparentē. Pari modo sub futura quæ
à Græcorū literæ Λ similitudine appellatur labdo-
des, crassam ipsam membranā, duplici stru-
ctam plexu, cerebrūmq; aliquatenus ingredien-
tem, cernes. Venæ porro per ipsam utrinq; singu-
læ juxta futuræ labdo-des latera excurrunt. Ubi
verò hæ in idem mutuò coiverint, altissimus is
ferè est locus, eorum qui in orbem circumjacēt:
quam regionem Herophilus vocat lenon, à tor-
cularis similitudine. Non autem æqualis ab ea
tum prior, tum posterior cerebri pars existit, sed
anterior est multò major. Verum ad id quod ela-
tissimum habetur, alter etiam crassæ membranæ
implexus accedit, necnon tertia quædam alia ve-
na, præter duas prædictas, ad longitudinem por-
rigitur in anteriora excurrens. In superficie ve-
rò alius venarum exilium, quæ leno incumbit,
cōgressus est, juxta illā partē, ubi futura labdo-
des ossibus squamatis connectitur. Quapropter
venas has superficiarias prius secabis ad leni us-
que summitatē. Dum autē secas, primum vacua-
bis, si grumus quispiam in ipsis coaluerit: deinde
internā membranæ superficiē intueberis, quo-
modo substantiæ speciē, et si non tenuitatē, venis
habeat simillimā. Inde tenues venas ab utraq; le-
norū parte orientes spectabis, nonnullas quidem
admodum graciles, quasdam verò ampliores. Cer-
nes aut has quidē à parva leno, quæq; in superfi-
cie est, in propinquas cerebri particulas superfi-
ciarias disseminari: illas verò ab altitudine ma-

gna, tum in posteriorē totā cerebri partem, quæ
à nonnullis cerebellū: sive parencephalis dicitur,
tum in priorē propagari regionē. Cerebello igitur
venæ se inferentes, & ab ijs quæ per futuræ
labdo-des latera in lenū perveniunt, & ab ipso
leno exactam venæ tunicā habent. At in ipsum
cerebrum, quod nonnulli antè cerebri vo-
cant, per crassam membranā, mediā exactē
sitam, secantēmq; cerebrū in duas partes æqua-
les, sanguis derivatur. Cæterum & hinc venæ fre-
quentes omnino per totam longitudinem, in u-
tranque cerebri partem, sinistram & dextrā distri-
buuntur, omnes tamen exiguæ, duabus tantum
exceptis, una quidem ad lenum, in anteriora pe-
nitius procedente, ad totius capitis longitudi-
nem, altera verò multò majore, neq; propinqua
admodum leni regioni, neq; remota, sed in me-
dio totius cerebri sita. Hæc vena in altū declivis
descendit, unde & multifariam propagatur. Spe-
ctabis igitur omnia hæc, priusquam cerebrū ali-
qua ex parte diviseris, in sola membrana crassa.
Nudabis autem ipsam tribus in locis, quoniam
& triplici plexu totum cerebrum secuit. Deinde
juxta sectiones tuis mer digitis attolles seorsum
partē ipsius sinistram, atq; seorsum dextrā, qui-
bus cōtegebatur antè cerebrum: seorsumq;
similiter reliquā, qua nimirum posterius: omnesq;
venarum processus in tres totius cerebri partes
disseminari conspicias, nonnullas quidem ram
superficiarias, ut ipsarum rami in conspectum
prodeant: quasdam verò altè penetrantes: om-
nemq; tenuē membranā, quā barbari piam
matrem appellant, & quæ enumeratas venas
colligat, & cerebro extrinsecus circumdatur, cū
venis ipsis in ventriculū illius descendente.
Hæc itaq; secundam, qua involvitur foetus ute-
ro referens, cerebro semper, etiam in profundo,
cohæret: crassa verò, ab illo plurimum distat.
Ubi ea fueris intuitus, quæ cerebrum ambiunt,
opportunitate jam erit cerebrum consecare, ana-
tomen ipsius exorsus à meninge illa tenui, bifa-
riam anteriorem partem secante. Unde abse-
ctis vel avulsis venarum exortibus, à priori au-
spicatus termino, sursum tuis ipsius digitis illam
attollito, donec ad grandem venam perveneris,
ex ea procedentem, quā in penitiora declivem
ferri retulimus; atque hinc rursus in altum subla-
tam alteri tenendam dabis: mox ipse juxta lon-
gitudinem dissolves, utranque cerebri partem à
mutuo connexu leniter tuis secernens digitis,
quousque ad venam in lōgum inibi porrectam
veneris, quam prius magnitudinis esse notandæ
commemoravimus. Postquam verò declivem il-
lā venam, de qua facta est mentio, videas, atque
ipsius usum simul inspiciendo* cognoris, venā
ipsam à subjectis corporibus adimes, regionem
interim quā detexeris, diligenter inspiciens, quæ
calli imaginem refert, ita ut naturalis quædam
inibi cōcavitas esse videatur, quæ ex circunstan-
tibus partibus portionem alimenti non integrè
elaborati recipit. Cæterum leviter avellere per-
gens, effigies etiam meatuum tenuium, qui ad
medium usque perveniunt ventriculum cerebri,
invenies. Notitiam porro assequeris ventricu-
lorum cerebri, callosam illam portionem con-
spicatur,

*Parenceph-
alis.*

*Cerebro f-
guis quæ
influat.*

*Meninge
crassam
re tribus
locis cere-*

*Meninge
nuiores
venis per
trare ad
triculos co-
bri.*

*Meatus
venientes
medium
triculos
cerebri.*

*Confectio a-
nimantis mor-
tui debet præ-
cedere illam,
qua admini-
stratur in vi-
vo.*

*Membrana-
rū cerebri cō-
sideratio.*

Lenon.

spicatus, quæ manifestâ adeo differentiâ à disse-
ctis cerebri particulis obtinet. Cernes autem in
his etiam plexus, secundarum modo efforma-
tos, cum quibus quidem ascendunt tum arteriæ,
tum venæ, atq; in varios ramos disseminantur.
Quare plexus hos inviolatos servare conaberis.
In prima igitur utriusque ventriculi consecutio-
ne, plexuum dictorum, atque adeo callosi cor-
poris in cerebro aspectus, tibi index fuerit. Mox
verò corpus illud, quod dextrū ventriculū cere-
bri à sinistro dispescit, inspicito: quod eandē cum
toto cerebro substantiam possidet. Atq; hoc jam
facile abrumpitur, si vehementius extendatur. At
si hinc quoque totum ipsum simul cum unitis
particulis auferas, & ventriculū evidentius, & ve-
na declivis circa corpus quoddam turbinatum
discindi apparebit. Cujus venæ propagines, te-
nuis quædam membrana, quemadmodum alias
omnes venas, connectit: quæ à membrana subti-
li, nec substantia, nec continuitate evariat. Atq; 20
huius membranæ interventu, corpus illud turbi-
natum, cui venæ incumbunt, absconditur: neq;
fieri potest ut prius ipsum videas, quàm mem-
branas aliquatenus divulseris. Quod si à basi il-
lius propter verticem lineam rectam duxeris, ac
postea utrinq; tunicam incisam detraxeris, facile
corpus ipsum detexeris. His peractis sic, jam li-
cet antequam mediam turbinati & ventriculorū
sedem detexeris, utraq; venas considerare cum-
plexu ipso, circa turbinatum tendentes. Siqui- 30
dem ubi corpus intermediū detexeris, manife-
sto illinc ipsas prodire condisces. Contegitur au-
tem ab illo corpore, præter jam dictos, quidam
alius tertius ventriculus cerebri. Itaq; illis potis-
simum locis ipsum nudabis, per quæ venæ, tan-
quā foramina quædā irrumpentes, priorib. ven-
triculis incidūt: nam media regio simul cum an-
terioribus patescit ad ipsa foramina. Vocatur
porrò illud corpus *ventriculus*, ob fornicis simi-
litudinem. Quod si ipsum defeces, callus occur-
ret tibi, ut in ventriculis anterioribus. Ad basim
ipsius affirmatæ sunt venæ, quæ concavitatem
fornicis permeant. Extrinsecus siquidem gibbū
habetur, intrinsecus autem cavum, quemadmo-
dū fastigiū fornicis. Cæterum si perpendas quo-
modo in animali vivente omnes crassæ membra-
næ partes, calvariæ adhæreant: cerebro autem
soli, quæ ad ipsius implexus est: credes utiq; ver-
ticem cameræ, sive fornicis, sursum versus ten-
sum servari, ventriculū sub se magnum effici- 50
entem. Sic autem quum priores etiam ventricu-
li grandiores existant, totum septi caput in subli-
me simul cum continuis corporibus attolli ne-
cesse est. Ex quo igitur corpora quæ superjacent
sublimia & suspensa sunt, latam intus trium ven-
triculorum capacitatem efficiunt, quam in conse-
ctationibus perire necesse est, corporibus quæ su-
perstrata sunt delabentibus. Insuper meatus qui-
dam maximus tertii huius ventriculi basi subja-
cet, qui ex prioribus superfluitates recipit, nec 60
non ex * suprapositis partibus. Omnibus igitur
quæ hîc propositæ sunt particulis probè dete-
ctis, tertium videbis ventriculū, inter duos prio-
res, & quartum posterio-rem, mediū. Etenim mea-
tum cui pars turbinata insidet, ad mediū ventri-

culum pertingentē cernes, ut foramina haud e-
xigua duo videantur, unum ad cerebellum, alte-
rum ad medium ventriculū pertinens. At præ-
dictus meatus, qui ex medio ventriculo ad po-
steriorem pertinet, inter carunculas quasdam,
nates & testes cognominatas, quæ cerebri partes
sunt, consistit, peculiari velatus tunica, qualis ni-
mirum est tenuis membrana cerebri. Quinetiā
alia particula cerebri tali meatui incumbit, eūq;
contegit, quæ ob similitudinem quam habet cum
verme, excrescētia vermicularis vocatur. Cujus
duplex spectabis extremum: alterum in priori
parte corpori turbinato exporrectum: alterum
retrò, ab elatiore cerebelli parte occultatū: quo
quidem ab anteriora reflexo, nudari prorsus cō-
tingit quartum ultimumq; ventriculū cerebri.

*Nates cere-
bri.*

*Vermicula-
ris excrescen-
tia cerebri.*

GALENI PERGAMENI

de usu partium corporis humani,

Liber I.



Orpora, quæ nec undequaque pro-
priam habent circumscriptionem,
nec undequaque conjuncta sunt ali-
is, ea omnia particula vocitantur. Particula.
Quod quidem si verū sit, multæ erunt animalium
particulæ, aliæ sanè majores, sicuti & aliæ mino-
res, atq; aliæ etiā omnino in aliā specie indivisibi-
les. Utiles autē hæ omnes ipsi animæ sunt, quippe
cujus organum corpus existit: & propterea mul-
tum differunt à se invicem animalium particu-
læ, quoniam & ipsæ animæ. Omnibus verò a-
ptum est corpus animæ moribus & facultatibus.
Equo siquidem fortibus unguis & juba est mu-
nitum: etenim velox, superbum, ac generosum
est animal. Leoni autem, utpote animoso & fe-
roci, dentibus & unguibus validum. At cervo
& lepori, animalibus timidis, velox quidem est
corpus, sed nudum omnino, & inerme. Timidis
quippe, velocitas: arma verò audacibus expe-
diebant. Neque igitur timidum aliquod arma-
vit natura, neq; audax quidpiam nudum desti-
tuit. Homini autem (sapiens enim hoc animal
est, & solum inter terrestria omnia divinum) pro
omnibus simul defensoriis armis, manus largita
est, instrumentum ad omnes quidem artes per-
necessarium: paci verò, non minus quàm bel-
lo, idoneum. Non igitur indiguit cornu, aut un-
gula sibi innata, quum meliora illis arma, quan-
docunq; volet, manibus possit accipere. Sed ve-
locior est homine leo. Quid hoc tandē est? Ho-
mo sanè equum domuit sapientia & manibus,
velocius leone animal: quo utens, & subterfu-
git & leonem persequitur. Quin & sedens ex al-
to, humilem illum percutit. Non igitur est nu-
dus, neq; inermis, neq; facilis vulneratu, neq; cal-
ciamentorum expers homo, quum & thoracem
ferreum, & multiplicem cum armorum, tum e-
tiā calceamentorū atq; operimentorum species,
inter quæ sunt domus, turris, & murus, sua sibi
parare possit industria. Si autē innatum ei esset
cornu in manibus, minimè posset eis uti ad earū
rerum omnium compositionē. Iisdem manibus
homo vestem, rete, nassam, velum, & sagenam

*Animæ or-
ganum exte-
rius corpus.*

*Moribus a-
nimæ esse a-
ptū corpus,
in omnibus.*

*Equi natu-
ra.*

*Leonis na-
tura.*

*Timidis ex-
pedire velo-
citatem.*

*Audacibus
expedire ar-
ma.*

*Homo sapiens
animal, &
solum inter
terrestria di-
vinum.*

*Manus ho-
mini tribu-
tas esse à na-
tura, pro o-
mnibus si-
mul defensori-
is armis.*

*Equus velo-
rior Leone.*

*Homini præ-
rogativa.*

contextuit. Quare non solum iis quæ in terra sunt animalibus, sed eis etiam quæ in mari & aëre, dominatur. Ac talia quidem homini ad fortitudinē arma sunt manus. Attamen pacificum & politicum animal homo, manibus & leges scripsit, & aras, & simulachra Diis erexit, & universa artium instrumenta construxit, commentariosq; etiam speculationis eorū scriptos reliquit. * Ut aut sapientissimum omnium animalium est homo, sic manus sunt organa sapienti animali convenientissima. Non enim, quia manus habuit, propterea est sapientissimum: sed quia sapientissimum erat, propter hoc manus habuit. Non siquidem manus ipsæ hominem artes docuerunt, sed ratio. Manus quippe ipsæ sunt artium organa, sicuti lyra musici, & forceps fabri. Ut igitur lyra non docuit musicum, nec forceps fabrum, sed est uterque ipsorum artifex, per eam, quæ præditus est, rationem: agere autem nō potest ex arte absque organis: ita & unaquælibet anima, facultates quasdam à sua ipsius substantia obtinet. effi-

Manus esse organa sapienti animali convenientissima. Manus esse artium organa.

Animam habere facultates quasdam à sua ipsius substantia ortas, non posse tamen operari sine organis. Particula nō impellunt animam ad agendum.

Animalia præsentire suæ animæ facultates absque ullo doctore.

Animalium natura à nullo sunt doctæ.

Animalia cetera natura potius quam ratione nonnullas exercent artes.

Homo ut corpus nudum, sic animam artibus destitutam habet.

Manuum esse organa ante organa.

Rationē esse artem ante alias artes.

Apprehensio organi optimè constituti, primum caput quod. Manus curvis.

cere autem ea quæ nata efficere, sine organis nequaquam potest. Quod autem corporis particula animam non impellant, aut timidam, aut strenuam, aut sapientem fieri, manifestè videre licet, si animalia recens genita consideres, quæ quidem prius agere conantur, quam perfectas habeant particulas. Etenim si ova tria acceperis, unum aquilæ, alterum anatis, reliquum serpentis, & calore modico foveris, animaliaq; genita rupto putamine excluderis, illa quidem alis volare conantia, antè etiam quam volare possint, hoc autem revolvī videbis, & serpere affectans quamvis molle adhuc & invalidum fuerit. Omne siquidem animal suæ ipsius animæ facultates, ac in quos usus partes suæ maximè polleant, nullo doctore præsentit. Naturæ quippe animalium (ut ait Hippocrates) à nullo doctæ sunt. Quapropter cetera quidem animalia mihi natura magis quam ratione artē aliquam exercere videntur, ut tum formicæ, tum apes. Homo autem sicuti corpus armis nudum, ita & animam artibus destitutam habet. Proinde pro corporis nuditate, manus: pro artium imperitia, rationem accepit: quibus fretus, corpus quidem armat, & omnibus modis tuetur: animam autem universis artibus ornat. Ut enim si innata sibi aliqua haberet arma, illa ei sola semper adesset, ita & si aliquam artem natura sortitus esset reliquas sanè ignoraret. Pulchrè igitur Aristoteles, manum veluti organum quoddam esse ante organa, dixit: quem ex nostris aliquis imitatus, rationem etiam, veluti quandam artem esse ante alias artes, haud invenustius asseveravit. Homo igitur animalium omnium solus, quum artem ante artes in anima habeat, nempe rationem, optimo sanè jure organum ante organa in corpore manum possedit. Cujus quidem constitutio, si aliter constructa fuisset quam est, fuisset ne felicior ad actiones futura, considerandum. Porro unum, primumque caput organi apprehensorii optimè compositi est, si omnes figuras, atq; omnes eas magnitudines, quas movere homo potest, probè apprehendit. Ad quod munus præstandū, multiformiter dividi manū fuit melius.

Nam si indivisa mansisset, contingere tantummodo sibi æqualem corporis cujusque admoti magnitudinem posset. At in multas partes divisa, moles seipsa multo majores facile amplectitur, & minimas quasque res exactè etiam venatur, colligitq;. Quum autem eadem circum corpus sphericum possit in orbem contrahi, rectum autem & cavum fideliter etiam amplecti, manifestè utique omnem comprehendit figuram: quæ nimirum omnis ex tribus lineis constat, aut curva, aut cava, aut recta. Ceterum quoniam corpora non pauca majori mole sunt prædita, quam quæ manu una comprehendī queat, adjutricem alteri, alteram natura æqualem manum adjunxit, ut ambæ ex oppositis partibus ea corpora complectentes, una manu maxima nihilo sint inferiores. Nec verò ad firmiter comprehendendum sat erat manum esse divisam, nisi etiam digitis unus, aliis quatuor oppositis fuisset, ut cum eis actionem ipsam absolveret: quum nimirum aut undique circulo, aut omnino ex duobus locis contrariis integra fiat comprehensio. Quinetiam digitos ipsos tum molles, tum rotundos, tum unguibus juxta summitatem munitionis * esse expediebat, si ad omnem corporum magnitudinem & consistentiam firmiter comprehendendam erant futuri ex usu. Etenim qui immodicè prolixi sunt ungues, ac propterea mutuo sese supergrediuntur, tamen ad excoriantum, aut radendum sint utiles, minuta tamen corpora ægrè apprehendere possunt. Qui verò propter parvitatem ad fines usque digitorum non extenduntur, naturam carneam firmitate privantes, eam ad apprehendendum admodum invalidam reddunt. Qui autem summitatibus digitorum æquantur, ii omnium soli, utilitatem cujus gratia sunt conditi, perfectissimè complent. Pulchrè igitur monet Hippocrates (sententia cujus nobis est divinum oraculum) particulas corporis universas sibi invicem consentire, hoc est, conspirare in ministerium unius operationis. Manifestum namque est, manus apprehensionis gratia constructas esse. Quod verò omnes earum particulae & tales & tantæ sint, ut in unam organi totius actionem conspirent, hoc nondum omnes cognoscunt. Porro ipsa particularum constructio, earum actionibus juncta, optimæ habitudinis, veræque pulchritudinis discernendæ regulam, mensuram, judiciumque præstat. Vera siquidem pulchritudo, aliud est nihil quam constitutio optima, quæ actionibus exploratur: non albedine, non mollitie, vel id genus aliis, per quæ nec nativa, nec vera, sed fucata pulchritudo ostentatur. Deinceps itaq; omnē manus fabricam persequamur: quæ tamen corporibus insunt obiter distinguentes. Insunt autem primū & maximè temperamenta: quippe quæ propriā particularū substantiam complent. Nam singulis id esse quod sunt, ob quatuor qualitatū primarum certam quandam temperiem contingit. Hæc igitur eis secundum substantiæ rationem insunt. Consequuntur autem necessario odores, sapor, colores, durities, atque mollities. Alia verò necessario accedunt, ut positio, magnitudo, connexio, confirmatioq;.

Manus omnem comprehendit figuram.

Figuram omnem constare ex linea curva, aut cava, aut recta.

Manus cum bina.

Pollex curvatus postus quatuor reliquos digitos.

Comprehensio integra quomodo fiat.

Ungues apti ad apprehendendum, debent summitatibus digitorum æquantur.

Particulas universas sibi invicem consentire.

Manus apprehendendi gratia condite.

Pulchritudo vera, est compositio optima, quæ actionibus exploratur.

Temperamentum complent particularis substantia.

Essentia singulis à temperie quatuor qualitatū primarum accedere.

tu contumax omnis articulatio ossium est facta.

Ut verò longè adhuc tutius articulus omnis in-

*Ligamenta articulo-
rum in digitis.* concussus custodiretur, ligamenta quædam ex-
utroq; osse produxit, ab uno videlicet in alterum

pervenientia: maxima quidem crassissimaq; ad

præcipuos articulos continendos: minora verò,

*Labia ossium
in digitis.* ad minores. Cæterum labia ossium, extrinsecus

quidem majora sunt, intrinsecus verò minora,

*Digitorum ossa
qualia, &
quare sint ta-
lia.* tum propter firmitudinem extensionis, tum pro-
pter flexionis diversitatē. Sunt autem dura, den-
sa, medullæq; expertia digitorum ossa: quia nuda

sunt omnia, & propterea faciliè patibilia. Nō po-

test tamē rectè inveniri utilitas partis, antequam

*Nervorum
principiū est
cerebrum, &
spinalis me-
dulla.* eius actio noscatur. Quòd igitur principiū ner-
vorum omnium cerebrum sit, atq; spinalis me-
dulla: & quòd ipsius rursus spinalis medullæ ce-
rebrum, arteriarū verò omniū cor, ut hepar ve-

narum: & quod nervi quidem à cerebro anima-

lem virtutem, arteriæ autem à corde pulsatilem,

*Cor est omni-
um arteria-
rum princi-
pium.* sicuti venæ ab hepate vegetativam accipiunt, de-

monstratum alibi à nobis est. Erit itaq; usus quē

præstant nervi, facultates sensus & motus à prin-

cipio in partes deducere. Arteriarum autem, cu-

*Hepar est ve-
narum om-
nium princi-
pium.* stodire * naturalem caliditatem, & nutrire ani-

malem spiritum. Sanguinis autem generandi, si-

mul & in omnes partes ferendi gratia, factæ sunt

*Nervi dedu-
cunt faculta-
tem sensus et
motus.* venæ. Quum igitur digitorum ossa ex se moveri

motu voluntario non possent, natura ex cubiti

musculis productos tendones, secundum recti-

*Arteriarum
munus.* tudinem digitorum deduxit, eosq; inservit in ar-

ticulos singulos, hoc est, in caput secundi ossis,

quod nimirū movendum erat. Quorū generatio

tendonū, ex nervis & ligamentis in musculos di-

*Tendones mo-
ventes digi-
tos procedere
à cubiti mu-
sculis.* spersis, rursusq; invicē coeuntibus, est. Sentiant

itaque & moventur motu voluntario tendones,

ratione nervorum ex quibus constant: colligant

autem musculos ossibus, ob ligamenta quæ in

se recipiunt. At ligamentum ipsum album, exan-

*Tendonū ge-
neratio est u-
sa.* gue, & concavitate expers quum sit, nervus es-

se videtur. Verum non est natum ex cerebro, ne-

que ex spinali medulla, sed ex ossibus ad ossa trā-

*Ligamentū
ab osse trans-
ire in os, ef-
fectus insens-
ibile penitus,
nec posse quic-
quā movere.* sit, nervoq; multò durius, ac penitus insensibile

est, nec movere quicquam potest. Ossa igitur o-

mnia, quæ sublocantur, circa prælocatum sibi ip-

sis os immotum manens, mota, extēduntur qui-

dem, quando exterior trahit tendo: flectuntur

*Extensio ar-
ticuli fit ab
externo ten-
done.* autē, quando interior. Ne verò per longam viam

& nudam carne, faciliè colliderentur tendones,

membranis vestivit illos natura, eosq; à muscu-

lis usque ad articulos, ut paterentur ægrius, ex-

*Flectuntur
articuli ab
interno ten-
done.* quisitè rotundos creavit. Nam quā applicantur,

ibi unusquisq; ipsorū expanditur, ut facilius mo-

veat, trahens apprehensionibus pluribus. Sed

*Tendones cur-
vestiti mem-
branis atque
rotundi sint.* quoniam quatuor motibus, unusquisque digito-

rum moveri debebat, uno quidē, flexis, alio ve-

rò extensis, duobus item ad latera: quadrifa-

riam illis applicantur tendones, orti partim à cu-

biti musculis, internis quidem flectentes, exter-

nis verò extendentes, moventibus autem ad la-

*Digitis qua-
drifaria mo-
vendis, qua-
drifaria ap-
plicantur tē-
dones.* tera, deducentes ad parvum digitum: partim à

parvis in manum musculis, qui reliquum ex ob-

liquis motum, pollicem versus operantur. Atq;

is sanè maximus digitorū, internum quidem ha-

bet unum tenuē tendonem, duos verò externos.

*Pollicis ten-
dones & mu-
sculi.* eosq; robustos admodum: at ex lateribus, parte

quidem quæ est versus indicem, parvum & te-

nuem habet musculū: altera verò parte, ubi ma-

nus assurgit, hoc multò majorē. Reliquos omnes

quatuor digiti, intus quidem duos tendones ma-

gnos, foris verò unum fortiuntur, alteri illorum,

scilicet minori, æqualem: tenuiorem autem hoc,

eum qui ad latera exteriorū partium pervenit: re-

liquum verò omnium tenuissimū ad latera par-

tium interiorum attinentem. Ac sic quidem re-

ctè natura, molem ipsorum tendonum, actionis

& utilitatis excellentiæ respondentem constru-

xit. Quum enim quatuor digitis flexis plurimas

& vehementissimas actiones obeamus, non ma-

gnos tantum ipsos tendones internos, sed etiam

duplices erat nobis opus habere. Contrà res ha-

bet in magno digito. Ad nullā enim aliam actio-

nem nobis flectendus est, nisi quando aliis jam

curvatis illum desuper injicere oportet. Quia ve-

rò primus eius articulus otiosus est, ad eum nul-

lus interna parte tendo applicatur, sed ad secun-

dum & tertium duntaxat eius articulum, unus

exiguus pervenit. Porro duo illi tendones qui

extrinsecus apparent in magno digito, si ambo

quidē tendantur, digitū tendunt exactè, si verò

alter eorum, partem alterā sibi proximā ad latus

trahit. Atq; actionem quidem tendonis ad indi-

cem perducantis, musculus parvus suscipit, ad

hoc ibi locatus. Contrarium verò, magnus, qui

in palmæ altiori parte, quam thenar vocant, con-

sistit. Atq; unusquisq; tendo ad suum caput tra-

here particulam natus est, quæ à seipso movetur.

Tendo igitur qui magnum flectit digitum, ab ea

denervationis, quæ in carpo est, parte, ducit ori-

ginem, à qua nimirum oritur etiam, qui ad me-

diū pervenit digitū. Vectus enim super hunc

multo spatio, & colligatus membranis fortibus,

tum primum decedens recedit ab eo, quum ad

manus cavitatem accessit, modo persimili jugo-

rum habenis, quæ per aliquos annulos super ju-

gum locatæ excedunt. Et quemadmodū exterior-

um tendonum illi quidem qui ad alios digitos

pertinent, in superficie locantur, subjacent verò

ipsis qui ad magnum spectant, sic è converso, qui

interni ad digitos quatuor perveniunt, per pro-

funditatem manus feruntur: supervehitur au-

tem qui ad magnum defertur digitum. Semper

enim natura, in profundo quidem id quod præ-

cipuum est, in superficie verò id quod non est

præcipuum, collocat. Porro musculorū dener-

vationes apparent duplices, quo maximè loco

ipsum carpum flectimus, sibi invicem superposi-

tæ: major quidem ea, quæ est in profundo: mi-

nor autem quæ in superficie, idq; divisā planè ea

quæ subjacet quidem, in quinque tendones: quæ

verò supergreditur, in quatuor: & omnibus ip-

sis rectā perlatis ad digitos, supervehuntur qui-

dem minores majoribus, membranarum verò for-

tibus quælibet quatuor conjugationum per to-

tam viam munitur. Quando autem descende-

runt ad primos digitorum articulos, ibi quisque

subjacentium tendonum diffusus, caput primæ

aciei flectit, per ambiens eum membranosum li-

gamen. Reliquū verò omne in unaquaq; conju-

gatione fertur ulterius, secundum viam à princi-

pio coeptā, rectā ad digitorum extremitates. Ubi

verò

*Digitorum
nervi
tendones.*

*Flectendi di-
gitis cur ma-
gni duplices
que tendones
sint dati.*

*Pollicis ten-
dones cur ta-
les.*

Thenar.

*Natura pro-
videntia.*

*Musculorum
deneratio-
nes duplices.*

*Tendonū im-
articulos di-
gitorum in-
sertionis ra-
tio.*

verò ad secundos articulos pervenerunt, ibi rursus tendo superior bifariam divisus, & utraque parte amplificata circa subjectum tendonem involutus, internis partibus capitis secundæ aciei inferitur. At ille qui subditus est, solus inde ad tertiam articulationem ascendens, ad caput tertii & ultimi ossis digitorum, etiam ipse implantatur. Flectitur quidem unusquisque qui juxta ipsos est articulus à dictis tendonum implantationibus: extenditur autē ab externis carpi tendonibus. Sed tendones interim, qui per profundum feruntur, primū & tertium articulum uniuscujusque quatuor digitorum movent. Qui autem per superficiem, hoc est, exigui, ad unum, nempe mediū, implantantur duntaxat. Quia verò nulla caro ex se ipsa sensum habet, & absurdū erat apprehensorium organum insensibili tegi particula, non parvam nervorū portionem in carnes manuum natura disseminavit. Ex quibus sic factis musculis, produxit tendines, lateralibusque uniuscujusque digiti partibus eos implantavit: dextræ quidem manus, his partibus quæ versus sinistram sinistræ verò, eis quæ versus dextram sunt sitæ. Reliquos verò tendones, qui ad lateralem uniuscujusque digiti partem perveniunt, à cubiti musculis generavit. Cæterum oriuntur ipsi tendones ab eodē principio, quod juxta carpū est, omnes: feruntur autem ad digitos secundum rectas lineas, æquales angulos ad caput ipsum efficientes. Quare principium ipsum, summitates tendonum flecti ad seipsum cogit. Nam si cessantibus motibus iis qui sunt ad latera, potius extenderis, vel flexeris digitos, extendente quidē te, distabunt, flectente autē, in idem mutuo coibunt. Ad hæc, tensos eos conjungere possumus, si dextri quidem digitorū eū, qui est in lateribus, sinistrū tendonē, sinistri verò, dextrū tendamus. Rursus plurimū à se invicē abducemus, si ipsius quidem dextri, dextrū, sinistri verò sinistrum similiter distenderimus. Si verò neutro lateralium tendonum agamus, sed externis tantum, mediam prædictarum constitutionē habebunt digiti. Enimverò in unoquoque articulo, unica quidem nobis figura est indolens, media videlicet: aliæ verò omnes utrinque dolent, sed magis quæ longius à media recedit. Omnino autē dolorificæ sunt extremæ figuræ, post quas nimirū nec flectere, nec extendere licet. Merito igitur inter omnes figuras ea est maximè dolorifica, quā dux quidē motionis musculus, extrema contractione, huic autem oppositus, perfecta extensione cruciatur. Figuram verò mediam utrinque circumstantes operantur, aut ambo musculi, aut alter omnino: potest tamen aliquando in ipsa neuter eorum operari. Cæterum parvorum tendonum motus non poterit unquā magnis agentibus apparere. Nulla autem ex parte offendetur digitorum flexio aut extensio, etiam si abscondantur laterales tendones: quorum is quidem imbecillior est, qui est interior: uterque autem operatur tensis digitis, quiescit verò flexis. Quum autem in utriusque manus digitis articuli triginta habeantur, quorū unusquisque in locis quatuor implantationes tendonū habet, præter primum magni digiti articulum, qui secundū quidē latera, extrinsecusque ap-

plicationes tendonum recipit, intus verò nullā: erunt utique omnes applicationes ad digitos pertinentes centum & duodeviginti. Porro simiæ, utpote secundum animam animali ridiculo, ridiculū quoque corpus natura tribuit: id quod maximè licet cernere in formatione pollicis, qui & parvus & ridiculus est, parumque ab indice distans. Quod aut si pauciores digiti essent, multæ actiones imperfectius absolverentur: pluribus autem ad nullam rem indigeamus, id adeo perspicuum est, ut demonstrari non debeat. Quare pulcrè quidem natura quinq; in utraque manu digitos fabrefecit: quæ ut est ne quid deficiat sollicita, ita nihil frustra operatur. Cur autem inæquales digiti omnes sunt facti, atque medius omnium longissimus? Sanè quod eorum summitates ad æqualitatem venire melius erat, quum magnas aliquas moles in circuitu comprehendunt, & quū in seipsis humidum vel parvum corpus continere conantur: ad quod quidem inæqualitas digitorum utilitatem præstat manifestissimam.

GALENI PERGAMENI de usupartium, Lib. II.

U Numquemque autem musculum, ex iis qui radius & cubitum circulo comprehendunt, adeo adornavit natura, ut ne constructio quidem melior ulla possit excogitari. Porro musculorum omnium cubiti & manus numerus, ad viginti tres pervenit. Septem namque parvi sunt in manu: alii totidem magni totam interiorem regionē cubiti, ut reliqui novem totam exteriorem occupaverunt. Parvi itaque manus extremæ musculi, duces sunt alterius obliquorum motuum. Eorum autem qui sunt intra cubitum, duo quidem maximi, digitos flectunt: magnitudine autem his secundi, duo etiam numero, totum carpum: obliqui verò duo, primum quidem radius, cum eo autem & totam manum, ad pronam figuram circumagunt. Reliquus eorum septimus, qui minimus est eorum, qui in longum extensi sunt, nullum digitum movet, sed alterius utilitatis gratia factus est, quam procedente sermone enarrabo. Ex iis verò novem musculis qui in cubiti externa parte consistunt, unus quidem digitos omnes, præterquam magnum, extendit, duo autem alii eodē quatuor digitos ad transversum abducunt. At quartus alius musculus, solum magnum digitum movet, altero motu externorum duorū, scilicet obliquiori: alius item unus reliquū magni digiti motum præstat, moderateque carpum totum extendit. Fortiter autem hoc circa carpum efficiunt alii duo musculi: reliqui verò duo convertentes ad figuram supinam radius, cum eo & totam manum, ad eandem ducunt figuram. Cæterum in tres magnas partes tota manus dividitur: quarum una brachium, alia cubitus sive ulna, tertia appellatur * extrema manus. Sed de brachio quidem nunc sermo non est futurus. Cubitus dicitur totum membrum, quod est inter articulationem carpi & anconis medium. Ancon autē est pars illa cui innitimur, & quam etiā totius nominæ, appellant cubitum.

*Implantatio
nes tendonū
ad digitos,
centum &
duodevigi-
nti.*

*Simiarum ri-
dicula ani-
ma ridiculū
corpus tri-
butum.*

*Naturam nō
hīl frustra o-
perari.*

*Digitorū in-
æqualitas ad
quid condu-
cat.*

*Musculi cu-
biti & ma-
nus viginti
tres.*

*Musculorum
manus usus.*

*Musculorū
cubiti usus.*

*Manus toti-
us divisio.
Brachium,
Cubitus.*

*Extrema
manus:
Ancon.*

*Radius.**Processus cu-
biti.**Digitorū sin-
gulis propriū
adesse mu-
sculum.**Manus mu-
sculi septem.**Tangēdi vim
in manu a
quo perficia-
tur tendine.**Carpī motio-
nes quot, &
a quibus pro-
fecta tendo-
nibus.*

Ceterum ossium cubiti, alterum quidem majus, cuius pars est ancon, specialius vocatur cubitus, quod in media manus figura, ossi alteri, nempe radio, subjacet. Gibbi verò processus ossium radii & cubiti, qui carpo inseruntur, vocantur quidē & id ipsum quod sunt, processus, & interdū capita, & tuberanda. Unicuique igitur digitorū proprius unus parvus musculus inest: duo autē alii maximi in manu thenara generant, per quos tum carnosā pars manus alta, media verò cava efficitur: tum digitorū uterque maximus & minimus, plurimū abducuntur ab aliis. Qui autē inter magnū & indicē consistit musculus, eā partē replet, pollicemque adducit ad indicē. Inferuntur tamē in ipsum pollicē alij fortiores tendones, à musculis ulnæ producti. Quare quā quatuor quidē sint qui quatuor digitis insunt, duo autē circa magnum, alius verò unus ad parvū digitum, rationabiliter omnes manus musculi septem sunt facti, à quorū singulis haud ab re unicus est tendo productus. Jam verò duo illi musculi, qui intra cubitum siti ipsos digitos flectunt, mediā exquisitē regionem obtinent: quoniam & capita tendonū flectentiū digitos, ad mediā regionē pervenire erat melius. Utrinq; verò unus est flectēs carpū. Alii autē duo intrinsecus in ulna cōsistunt, eam ad obliquū ducentes. Reliquis extensorū secundū longū musculorū intra ulnā, tenuissimus omnium, in superficie consistit, à quo quidem unus tendo productus, sub interna cute manus disseminatur, nullū quidem articulum movens, sed ipsam perficiens tangendi vim, quæ ad apprehensoriam requiritur. Exteriorū verò cubiti musculorum, qui quidem extendit quatuor digitos, in superficie sub ipsa cute locatus est, mediā maximē totius membri regionem obtinens. Alii autem post eum, obliquē ad mediam descendentes regionem, tribus quidem majoribus digitis, duo: reliquis verò minoribus, reliquas explantationes mittit. Reliquorum verò trium, unus quidē qui in ulna est, carpum tendone simplici extendit: qui autē sunt in radio, alter quidem condylum eius transcendens, obliquus, in duoque divisus, extendit simul carpum, & magnum, digitum abducit ab aliis: reliquus autem extrinsecus, ad pronum circumducit extremam manum, atque ipsum carpum extendit. Sunt & alii duo in ulna, ipsam circumvercentes: obliqui quidem, quoniam & motus quē efficiunt, obliquus est: pervenientes autem ad radij os, quoniam hic motus est actio dearticulationis hujus ossis, quæ ad brachium consistit. Apparent itaque novē quidē externi, septem autē interni musculi, si annumeres duplices illos musculos, qui circumagunt obliqui ulnā. Nam qui manus gratia sunt conditi, septem quidem externi, quinque interni habentur. Quum autē quatuor sint motus carpi, extensio, flexio, ad pronum circumductio, & ad supinum: duo quidem tendones & musculi sunt duces flexionis, duo autem alii extensionis. Hi verò ipsi etiam conversiones laterales concinnant ad pronā figurā, simul adjuvante quippiā eo musculo, qui in externa ulna locatus, definit in medium potissimū metacarpium, per tendonem duplicem. Flectentiū igitur carpum tendonum, alter quidem ad

eam quæ supra parvum digitum, alter autem ad eam quæ supra magnum est, regionem internam pervenit. Ad eundem verò modum extendentiū uterque, hic quidem supra parvum, ille autem supra magnum digitum, superna parte implantantur. Ac si utriusque sanē tensi fuerint, flectūt quidem interni, tendunt externi manum: tenso verò alterutro ipsorum, altero quidem qui ad magnum digitum, parte interna, altero autem qui ad parvum, parte externa est, ad pronum sensim quodammodo manus circumducetur: eo verò qui ad parvum digitum, tenso intrinsecus, vel eo qui ad magnum est, extrinsecus, ad supinum. Si verò simul tensi fuerint, & qui ad magnū digitū intrinsecus est, & qui ad parvū extrinsecus, non amplius sensim, sed quamplurimum sic ad pronum circumagitur manus. Ita etiam & eo qui ad parvum digitum intrinsecus est, & simul eo, qui ad magnū extrinsecus, tenso, admodum manus supina fit. Distinguere autem oportet carpi motus, à motibus totius ulnæ. Sunt enim & huic quatuor motus, proportionē quatuor motibus respondentes, qui ab iis, quæ ad brachium sunt, dearticulationibus fiunt. Etenim extensam, & flexam, & circumductam ad pronū & supinum, videbis totam vlnam, quiescētē manu. Sed extensionē quidē & flexionē, ulnæ dearticulatio, quæ est ad media brachii, efficit: circumductionem verò ad latera, articulatio brachij ad externum eius caput. Ac duo quidem musculi ad pronum circumducunt, duo autem ad supinum convertunt radium: nam satius fuit duobus musculis, quā uni talem motū committere. Eorum autem musculorū, hic quidem in supernas partes, quæ juxta brachium sunt: ille in infernas, juxta carpum inseritur: fertur verò ultra amplius uterque, neque in ipsas solum inseruntur extremitates, propterea quod carnosīs partibus immittuntur, antequam in tendones desinant. Ab eis siquidem nullus tendo producitur, quum impossibile sit ita propinquis sibi ossibus, incipientem ab ulna musculus, in nervosam tenuitatem mutatū, inseri radio. Nervis quippe & ligamentis in carnes musculi disseminatis, postea paulatim in idē acervatis, generatio fit tendonibus: paulatim autem illud longiori eget via, & maximē quando ex magno musculo acervatio fit. Verum autem esse id quod dicitur, ostendit qui radio incumbit supernē musculus, à quo solo inter quatuor prædictos musculos, quod minimus & longissimus sit, membranofus juxta finē explantatur tendo, enatus à partibus ratio internis, prope carpum. Collocavit autē natura, eos quidem, qui ad pronam figuram membrum circumducunt, ex internis partibus, omnium primos securitatis gratia, quum plurimas & maximē necessarias, & vehementissimas, in hac figura, actiones obeamus: eorum verò qui ad supinū abducunt, alterū quidam occultavit in regione inter ulnā & radicem media, eum ab ulna in radiū producens. alterū verò imposuit de super ipsi radio, longissimum faciendo hunc omnium, qui circa membrum hoc sunt musculorū. Pervenit itaque eius superior quidem extremitas ad externam brachii partem: inferior autem,

per

per quam movet radium, in membranosum tendonem definens, applicatur intrinsecis ejus partibus, prope ipsam cum carpo articulationē. Porro ubi quis viderit, quando nervum aut tendonē aliquem præterferri opus est magnam ossis convexitatē, unum horū trium fieri, aut cavari particulam, aut perforari, aut omnino circa basim ejus nervum involvi, nusquam autem nudum, aut non munitum vehi per convexitatem, intelliget omnino tunc quantam artem in securitate singularum partium ostendit natura. Ac tendones quidem ipsos trium externorum manus musculorum carpum moventium, radix, & ulnæ cavata excipiunt. Mox autem & ligamenti latis, & fortibus, & duris, quæ ossa ipsa suscipientia producunt, induuntur omnes ejus loci tendones, ut neq; ab incidentibus extrinsecus promptè patiantur, neque à duritie ossium lædantur. Jam verò imbecilliores quidē actiones, parvis cōmisit natura musculis: ad vehementiores autem, non magnos solum, sed etiam binos fecit. Quod pertinet ad carpi compositionem: is concavus quidem intus, convexus foris, octo ex ossibus constat, quæ unum putabis esse, nisi prorsus membranas abstuleris ea cooperientes. Habet autē ad anteriorem sui finem, quatuor cavitates exiguas, quæ inarticulantur cum metacarpij ossibus, numero nimirum quaternis. Cartilago autē non has modò, sed etiā eas quæ in ipso sunt carpo commissuras omnes oblinir: easque foris cōprimunt membranæ fortes, quæ sunt ligamenta simul ipsis articulis & operimentum, totis ossibus circumpositæ. Quatuor verò metacarpij ossa sibi invicem propinqua usq; ad digitos protenduntur. Distant tamen à se invicem, nec sunt conjuncta, sicuti ossa carpi, quia plurimum invicem distantibus digitis debebant articulari. Sed & figura, convexa foris quidem leviter, intus verò sima magis facta sunt, ut post ossa carpi locata, illorū speciem imitarentur. Tām igitur carpi, quām metacarpij ossibus robur colligationū auxilio est, ut minus laxentur in manus vehementi extensione. Extendimus autem organa quæ in carpo & metacarpio sunt, ut cavitatem quidem manus repleamus. complanemus autem convexitatem. At concavam effecturi manum, prorsus contraria facimus, prius tenta flectentes. Quibus motibus minimè obsequeretur carpi & metacarpij ossa, si essent omnia unum simplex. Jam verò si inter digitos & ulnam unum simplex os esset, ubi semel confringeretur, mox totum præter naturam haberet, utiq; unum existens: id quod minimè accidere possit carpo, nec metacarpio, vel si aliquod eorum os confringatur. Quinetiam ut omnino nihil patiantur, melius fuit ex multis componi, & potissimū ita duris. Cedentia enim occurrantibus ad suas articulationes, exolvunt ipforum violentiam. Sagitta siquidem, tensa coria facilius quām laxa penetrat. Ad hæc, multiformis figurarū varietas, ad eam, quæ communis est, patiendi difficultatē conducit incredibiliter. At verò primus articulus pollicis, ossi carpi propinquo inarticulatur. Nam si alicui ossium metacarpij cōmitteretur, parva utiq; esset ei distantia ab indice. Constat autē metacarpium ex quatuor

ossibus, quoniam quatuor tantum digiti in ipsum articulari debebāt. Cæterum quia in carpo multa fieri ossa fuit melius, componi verò fines eorum cum ulna non similiter ut cum metacarpio, in duos ordines ea digessit natura. Quum igitur necessario sint quatuor metacarpij ossa, adiaceat autem eis in uno ordine primum magni digiti os (quod sanè nonnulli propter hoc ipsum metacarpio attribuunt) & hic universus ordo inarticuletur inferiori parti ipsius carpi, convenienter ex quatuor quidem hæc pars, altera autem quæ ulnæ inarticulatur, ex tribus ossibus facta est. Quum itaque tres sint ordines inter ulnam & scissionem digitorum medij, qui quidem est ad ulnam, ex tribus ossibus quam arctissime junctis: qui verò deinceps est, ex quatuor laxius compositis: tertius deinq; huic inarticulatus, ex quinque compactus est, quorū unum quidem est magni digiti, alia verò quatuor, metacarpij. Videbitur itaq; sic quidē carpus septē omnino constare ossibus, præter quæ est aliud prælongum, quod vehitur per internas ejus partes, in quibus & inarticulatur ad tenuem ulnæ processum. Quoniam igitur carpum oportebat inarticulari ulnæ, ac radij finibus, convenienter horum os utrunq; epiphysim habuit, gibbam quidā & rotundam extrinsecus, concavā verò intrinsecus: sed epiphysis quidem radij, undiq; labium habet circumpositum. à quo exactè stringitur is terminus carpi, qui ad ulnam spectat: ulnæ autem epiphysis, nō amplius similiter, sed interna quidem sua pars, & quæ spectat ad radiū, est similis: alia verò extremitas, quæ secundum longitudinem & rectitudinē totius membri extat, in rotundū caput finit, quo circumdatur locatum ibi os carpi, concavitate leviter profunda, ut duplex sit articulatio in carpo: altera quidem finium ipsius carpi ingredientium cōcavitatem inter epiphysim radij & ulnæ mediā: alia autem parva, ossis circumplectentis parvam apophysim ulnæ. Atq; hæc quidem gratia versionis manus ad primum & supinum facta est: propter aliā verò magnam extenditur & flectitur carpi articulus. Ob hæc sanè, gibbositates factæ sunt finium ulnæ & radij. Quia tamē extrinsecus quidē magna erat altitudo ipsi extremitati ulnæ, internæ verò partes imè & demissæ, propter apophysim ejus parvā extrinsecus & internè locatā, posuit hic natura, veluti quoddam vallum, prælongum os, intrò nutans rectum, à quo ea quæ ibi sunt sita, muniuntur. Atq; hoc est os carpi octavum, de quo disse-rere distuleram. Cujus finis quidē inferiori subtilis & cartilagineus est, validisq; quibusdā membranis alligatur circumjacentibus ossibus, atque in ipsum tandē inseritur ille tendo, qui carpum flectit. Quinetiam aliam quandam epiphysim ossis parvi cartilaginosa natura creavit, per colligationes fortes copulati, partim huic nunc dicto ossi ipsius carpi, partim ei quod est post ipsum, articulatio ad primam aciem magni digiti, ut & ibi cōtingat parte altera tendonem, à quo magnus digitus atq; carpus moventur. Nam aliquis poterit hoc os numerare, sed non est numeratū ab anatomicis, sicuti nec aliquod eorum quæ σπονδοειδῆ vocantur, quæ multis manuum & pedum

Carpi os octavum, quæ dicitur. Epiphysis radij & ulnæ, quæ committuntur carpo.

Carpi articulus duplex.

Carpi ossis octavi finis.

Σπονδοειδῆ

*Tendones ex
tendentes at
que flecten-
tes carpum.*

articulis natura velut auctariū circumposuit, securitatis gratia. Jam verò ex quatuor tendonibus extendentibus & flectentibus carpum, qui quidē extrorsum sunt, manifestē apparēt obliqui, & perveniunt, hic quidē magis ad externas partes aciei, quæ est ante parvū digitum: ille autē ad internas aciei, quæ est ante magnū. At interni, obliquiores quodammodo sunt, ut non solum extendant, & flectant, sed etiam circumducant manū ad latera. Ad hæc positio ipsius radij, obliqua meritō fuit, quemadmodum ulnæ positio recta: hæc siquidē extensionibus & flexionibus, illa verò conversionibus ad latera subservit. Ob eam causam ad brachiū utriusq; ossis dearticulatio, dissimilis fuit. Porro superiorem extremitatem radij, ad caput brachij externum produxit natura: inferiorem ad magnum extendens digitum, quod videlicet talis obliquitas multo paratior sit, ut motibus ad primum obediat, qui ac plures ac magis necessarias actiones sunt utiles.

*Ulna positio
recta.*

*Radij dearti-
culationes.*

*Radius cur-
vatus incur-
bat.*

*Radij & ul-
næ, quod per-
tinet ad figu-
ram & con-
stitutionem,
discrimina.*

*Coronæ.
Ulnæ extre-
mitatis figu-
ra.*

*Brachij epi-
physes.*

*Brachij
capitulum.*

*Brachij capi-
tulum.*

*Brachij ossis
figura.*

Cur autem incumbit ulnæ radius? quia hoc illa longior est, & plurimum articulationis ad brachium ipsa obtinet. Sed cur utriusq; partes, quæ in medio quidem sunt, tenuiores: quæ in cubito autem & carpo, multo crassiores existunt? quia illas musculis locū præbere oportebat, has crassescere per epiphyses. Curex ipsis finibus, ille quidem ulnæ, qui in cubito est, crassior: radij verò, is qui ad carpum consistit? an quod utriusque est ad carpum dearticulatio? In ea verò dearticulatione quæ est ad brachium, tantum superet ulnæ radius necesse est, quanto ulnæ dearticulatio cunctis manus actionibus commodior existit. Sunt sanè hoc loco quidam processus ipsius ulnæ duplices, gibberosique quidem foris, cavi autem intus: unus ex posterioribus & internis ipsius partibus, qui certè & major est alter ex anterioribus & supernis, multo minor priore. Converteris autem ad se invicem eorū concavitatibus, una ex ambabus conficitur magna cavitas, similis literæ græcæ *S. quos quidem exortus vocant *κορύναι*: atq; hæc ulnæ extremitas talem habet figuram. Brachij verò extremitas hoc modo secundum laterales partes capituli epiphysin habet: hanc quidem foris, illam autē intus: quarum in medio cavitas quædam est, lævis & rotunda, similis rotularum vocatis cavitatibus, circa quam ulnæ coronæ moventur. Ubi autem ipsa definit, utrinq; *βερμίδες*, hoc est, brachij cavitates consistunt, quas extendentibus totam manum, & flectentibus, ulnæ *κορύναι* ingrediuntur, suntq; hæc extreme extensionis & flexionis terminus. Quæ dearticulatio tuta simul & accommodata actionibus facta est. Porro brachij capitulum, alterum quidem externum & minus, ob radij ad ipsum dearticulationem est factum: alterum verò majus, quod intro spectat, nullum os sibi conjunctum habet, sed nodus prominens, vasa munit, quæ illac perreptant, in ipsumq; annectuntur capituli musculorum ulnæ internorum, qui secundum rectitudinē ejus sunt siti. Non solum autē radius & ulnam brachio, sed etiam radius ulnæ validis ligamenti natura conjunxit, ut omnia quam firmissimè cohærerēt. Os igitur brachij rationabiliter quidem extrinsecus magis est gibberosum:

internis verò partibus magis simū, ut ad se invicem converterentur manus, id quod longè erat melius. Talis etiam constructio brachia effecit aptiora, ad comprehendendū convexa corpora, præparando simul locum vasis, quæ ad totas manus feruntur. Quum autem ulna duobus prædita motibus esset extensione, & flexione, necessariū erat interna quidē ipsius brachij parte flexionis ducem musculū, externa verò extensionis, locari, ut tum ipsam motionē ulnæ, tum brachio tegumentum præstarent. Ne autem regio illa quæ inter ipsos musculos media futura erat, superna nempe & inferna, omnino nuda relinqueretur, aut otiosa vestita carne, fortiores simul ac tutiores motus natura ædedit, duplicata multitudine musculorum. Ex utraque siquidem parte duos obliquos musculos in ipso membro produxit, figura simili X. græcæ literæ, sese mutuò secantes, prope dictas regiones: positione quorum tecto esse undiq; brachio contigit. Hoc autē est dignū admiratione, quod binis obliquis motibus, unū rectum cōficiunt, quemadmodū carpum moventes tendones. Atq; unus quidem musculorum flectentiū ulnam, ortū habet ab internis partibus loci, qui ad humerū vergit: inde autem perfertur ad anteriores brachij partes: alter autem minor, explantationem quidem ab internis brachij partibus habens, intro illinc paulatim sese convertit. Majori porro musculo agente, manus tangit internas regiones articuli, ad humerum spectantis, minore verò, externas iis oppositas. Eodem modo & posteriores brachij musculos reperies factos, oppositum scilicet utrumq; utriq; internorū, idq; pari servata similitudine. Ambo nanq; inseruntur cubito, sed hujus quidem maxima pars, ad internas cubiti regiones: illius autem, ad externas: & prioris quidem dictorum supernæ explantationes, in internis brachii magis; alterius autem, in posterioribus. Ergo musculi duo interni, secundum rectitudinem quidem exactè tendunt ulnā, si ambo tendantur. Sin autem alter quidem eorum agat, alter verò quiescat, parum à rectitudine versus alteram partem deflectunt. Eadem ratio est habenda in extensione quam moluntur his oppositi musculi. Jam verò laxiora & cavernosiora, magisque concava semper sunt ossa majora cunctis minoribus; ne maximo gravent onere. Sed intra cavitates eorū medulla reposita est familiare ossibus nutrimentū. Enim verò in cubiti & carpi articulis, non crassa modò, sed etiam dura quædam ligamenta undiq; contranitentia, prohibentia, ne articulorum ossa plurimum à mutuo connexu resiliant, ac distent, sunt facta. Quapropter etsi sæpe violenter moveri cogantur, minus tamen quam in humeris, articulorum luxatio accidit. Non enim fieri potest, ut os aliquod suo articulo aberraret, nisi plurimum à reliquis distet. Non autem omnes articulos natura firmos construxit: quoniam pugnam habebat necessariam varietas motuum, cum securitate constructionis, nec poterant in idem convenire ambæ. Sequitur enim illa quidem laxitatem dearticulationis, hæc autem stabilimentum, & omni ex parte constructionē. Quare cū duo sint quæ stabilitatem

*Musculi
flectentium
atq; exten-
dentium
nam quod
sunt.*

*Musculi
qui in bra-
chio.*

*Rectum
tum fieri
musculis
liquis
chio, dū ob-
quo simul
tu move-
tur.
Musculi
nam flecten-
tes unde ori-
antur.*

*Ossa majora
cur semper
cavernosiora
minoribus.
Medullam
esse famili-
re ossibus
nutrimentum.*

*Motum &
rietatem pu-
gnare cum
structionis
curitate.*

tem articulorum efficiant, fortitudo videlicet ligamentorum, & exacta compositio, utraq; quidem est in cubito & carpo, altera verò in digito: in humero autem neutra exactè invenitur.

GALENI PERGAMENI
de usu partium, lib. III.

MANUS homo omnium animalium solus habuit, organa animali sapienti convenientia. Bipes verò ipse solus inter pedestria factus, & erectus, quia manus habuit. Cur autem non habuit quatuor crura, & præterea etiam manus, sicut centaurus? Quoniam primò quidem impossibilis est ipsi naturæ, corporum adeò differentium mistio. Neq; enim si coitus quidam venereus homini cum equa fiat, perficient matricēs sperma. Quare quod de centauris fertur, omnino fabula est. Equa siquidē asini, & asina equi poterit sperma recipere, perficereq; ad animalis mixti generationem. Ita & lupa masculi canis, canis verò ipsa non lupi solum, sed & vulpis, sicuti & vulpes canis. Equa autem humanum semen fortè ne receperit quidem in sinus matricis: longiori enim pudendo opus fuerat. Quòd si quando id suscipiat, corrumpet utique ipsum vel mox, vel non multò post. Jā verò si homini quatuor adessent crura, esset ineptissimus ad universas humanas actiones, ac ne sedere quidē posset. Etenim ut solus homo erectus stare, sic etiā solus sedere potest. At animalia cætera, quæ destituta sunt manibus, oportuit hæc quidem anterioribus tibiis cibū admoveere ori: alia verò, inclinata sumere. Cæterū quæ herbis vescuntur, alia quidem solidas, alia verò bifidas habent ungulas: carnivora autē, habitu feroci quū sint, nō solum habent multifidos pedes, sed etiā curvos ungues, firmissimosq; sortiuntur. Porro quæcunq; omnino sunt timida, his neq; solida ungula, neq; cornu, vice propugnaculi, inest, sed ungula tantum tenuis bifida: atq; hæc quidem inclinata pascuntur. Carnivora autem anterioribus pedibus pro manu utuntur, & ad retinendū animal quod venata fuerint, & ad cibū ori afferendum. Quæcūq; verò animalia exanguia, ea sanè frigidiori temperie sunt: quapropter imbecilliora omnino, & ad motus pigriora, parvis & multis utuntur tibiis. Quædam autem etiam ob id prælonga totis corporibus facta fuerunt, sicuti & julus, & scolopendra, copiosæ tibiæ productioni natura locum suppeditante. Omnibus sanguineis pedestribus, quæ maximè hominibus assimilantur, quatuor sunt pedes tributī. Tutius siquidem erat ipsis, quatuor ambulare tibiis, quam rectis stare super duabus. Nam sic ambulantes, uti ambulant, partes ventris, quæ sunt offensas magis obnoxie, occultantur, & custodiuntur à superiacentibus: expositæ autem sunt, quæ sunt paribiles minus. Erectis verò accideret prorsus contrarium. Neq; enim manibus & ratione utentia, quemadmodum homo, oppositura erant ventri externum aliquod propugnaculum. E contrario autē horum, homini melius fuit esse bipedi, ut qui ea velocitate, quā extibiæ multitudinem habent animantia cætera, nequam indigeret, & ad multa, nisi bipes fuisset,

deterior futurus erat. At bipedes quidem & aves sunt: rectus tamen solus animalium est homo. Soli enim ipsi secundū rectitudinem crurū spina est, ceu corporis quædam carina existens: ad quam crura ipsa, in avibus quidem, ut & quadrupedibus, angulum rectū efficiunt: solis autē hominibus, instar rectæ lineæ extenduntur. Quare eorum animalium nullum unquā stare potest. Sed nec sedere, quòd ad sedendum oporteat crura coxis copulata, in fæmoris ad tibiā dearticulatione, retrorsum flecti, id quod fieri in illis non potest, quum omnia nimirum antrorsum posteriorum crurum habeant flexiones: quemadmodum priorū retrorsum, contrā quā in hominibus cernimus. In eis siquidem manus ad anticam cubiti partē flectuntur, quòd melius sit, eas ad se cōverti: crura autem flexionē in genu retrorsum obtinēt, nam hoc solo modo pulchrè licet sedere. Ubi igitur unam rectam lineā efficit spina cū cruribus, ad tres differentias figurarum agi animal potest: quū si ipsam quidem spinā humi reclinaverit, supinum omnino fiat: si ventrē, pronum: si firmetur pedibus, tum exactè stet rectū. Si verò aliquem angulum crura ad spinam fecerint, constat nullam earum figurarum exactè esse rectam. Solus igitur omnium animalium homo & rectus stare & sedere potest: etenim omnes manuum in opificiis actiones, duabus iis egent figuris: hæc nanq; erecti, hæc sedentes conficimus manibus. Nemo autem aut pronus, aut supinus molitur quicquā. At opinari ob id rectè stare hominem, ut promptè ad cælum suspiciat, hominum est, qui nunquam viderūt æγανος πόντον piscem: hic nanq; vel inuitus semper cælum aspicit: quū homo, nisi collum reflexerit, cælum nunquam videre possit: qui reflexus etiam asinis inest. Id autem non est sursum aspicere, quum quis supinū seipsum reclinarit oscitās, sed quando mente naturam rerum considerat. Postea igitur quā ut manus apprehensionis, ita crus ambulationis erat futurū organum, præstitit non rotundos & duros, sed oblongos, latos, molles, multifidosq; subiaci ipsis cruribus pedes: quum videlicet talis constructio, ad omnes locorū difficultates, & sicubi oporteat sublimes muros, aut arbores, aut petras scandere, maximè opportuna videatur. Etenim equis & bobus, aliisq; id genus animalibus, quibus duri & vestiti sunt pedes, melius fuit quovis modo ad patiendi difficultatē eos cōparasse, ut quæ nec manus, nec artes habeant: homini verò (qui idoneū sibi calceamentū invenire potuit, sæpe etiam nudis pedibus uti opus habuit) præstitit esse eos tum detectos, tum molles. Porro ambulatio fit, altero quidem crure in terra firmato, altero autem circumlato. Sed firmari quidem, pedis: circumferri autem, totius cruris est actio. Nec verò ambulantibus tantum, sed currentibus etiā, alter quidem pedū in terra firmus est, alter verò simul cum toto crure profertur. Cæterum mutare quidem loca, beneficio cruris quod movetur cōtingit: quòd verò non cadamus, hoc pes in terram fixus efficit. Jam stare quidem possunt, duobus mutilis pedibus homines, moveri autem non possunt. Vidi etenim quosdam, quorum digiti soli à nive mor-

Bipedes sunt
aves.

Rectus est
solus homo.

Spinam esse
ceū quādam
carinam corporis.

Crura in
solis hominibus
ad rectam lineam
subtendi spina.

Quadrupeda
cur neque
ant sedere.

Figurari
posse tripliciter
animal si
rectam lineam
efficiat spina
cū cruribus.

Homo solus
& rectus
stare, & sedere
potest.

Actiones
omnes manuum
fieri aut
stare
tibiis aut
sedentibus
nobis.

Ὀγανος πόντος
piscis per
petrā aspi-
cit cælum.

Sursum
aspicere, est
mente naturam
rerum
considerare.

Crus
ambulationis
organum.

Pedum
constructio
valde
opportuna.

Pedes homines
præstitit
esse tum
detectos
tum molles.
Ambulatio
quomodo
fit.

Stare
posse
homines
duobus
mutilis
pedibus:
moveri
autem
non
possunt.

tificati exciderant: sed hi quidem, neque stando, neque ambulando, neque item currendo, in planis saltem & laevibus, vincebantur à sanis, inutiles tamen & impotentes, ad pervadendum aliquem præcipitem locum. Quibus autem non solum digiti, sed quæ ante digitos est, etiam planta com-
putruit, fallax his gressus est, etiam in planis locis. Si verò tarsus etiam corruptus fuerit, non solum hi non possunt ambulare tuto, sed ne stare quidem constanter. Constat igitur hinc ad firmam stationem amplos & oblongos pedes esse appositos: quibus accessit multiplex illa fissura, necnon conspicua in medio cavitas, ad securitatem in gibbosis locis utraq; maximè congruens. Humanus itaque pes, quam maximè fieri potest, manum imitari videtur. Quare si apprehensoriū organum manus fuit, fuerit utiq; & pes ipse, alio quodam modo, huiusmodi. Non autem habet oppositum aliis digitum magnum, sed in uno deinceps ordine constitutos omnes: nam sic ad firmitudinem expediebat. Jam verò quod in humano pede *ταρσος* dicitur, carpi manus similitudinem: metacarpij autem, *μηδίοι*, hoc est, planta: nam digiti in pede, digitis manus sunt similes. Hæ igitur tres partes pedis sunt, quales & manus, digiti, tarsus & planta. Subjacens verò ipsi tibiæ pars pedis, ex tribus ossibus constat, talo videlicet, calcaneo, & naviformi osse. Atque iis quidem solis nulla est in manu particula, quæ proportionē respondeat, sed sunt simpliciter basis solius instrumenta. Aliæ verò omnes particulae, basis simul & apprehensionis. Quæcunq; igitur pes, ut apprehensorium instrumentū, manui similia est sortitus, ea ad sermonem de manu habitum, remittenda sunt: quæcunq; verò, ut ambulatorium, hic enarrare oportet. Quod itaque ex multis ac variis ossibus constituti sint, invicem quidem multifariam dearticulatis, per membranosa verò ligamenta cōnexis, id ut apprehensionis instrumentis, pedibus accidit. Quod verò & minores quam manibus, digiti, similiq; omnes serie positi eis insint, hoc proprium est pedibus, tanquam firmationis organis. Tutoris autem apprehensionis ambulationisq; gratia, altiores & magis cavæ factæ sunt pedum partes internæ, externis: quæ quidem si fuissent æquales versus crus elevati pedis, alter semper pes inclinaret, ac sic ambulando facile everteremur. Internæ autem pedis concavitationis gratia, calcanei anterior pars, tenuior est & angustior, magisq; recedere ad digitum parvum videtur. Propterea astragalus, sive talus, intrò magis vergere apparet, licet ejus partes postremæ, ad medium sint calcaneum firmatae. Quæ autem junguntur his ossa, quod calcaneo quidem cohæret, cubiforme vocatum, ab externis partibus pedis firmum in terra statuitur: quod verò astragalo, scaphoides dictum, similiter ipsi astragalo sublimè est, & sublatum à terra, interna regione pedis locatur. Pari autem modo tria tarsi ossa huic conjuncta, & ipsa sublimia apparent, & internis pedis partibus posita sunt: quibus externa parte firmum ac humile os cubiforme appositum est. Sed calcaneum quidem ad exteriora pedis maximum quidem est factum, quoniam ad perpendiculum subja-

cet toti membro: læve autem partibus inferioribus, firmationis stabilis gratia: rotundum, ut non facile pateretur. Porro astragalus altus, alto naviformi conjungitur, fornici similem perficiens figuram. His deinceps adjacent ossa tarsi, tria quidem naviformi conjuncta: quartum verò calcaneo. Post hæc sunt plantæ ossa, terram post astragalum contingentia, & naviforme, & continua huic tria ossa tarsi. Deinde sunt digiti, quorum maximus est nō amplius ex trium ossium ordinibus, ut reliqui, constitutus, sed ex duobus. Cæterum os quod magno digito præpositum est, duo videntur subjecta esse inferiore parte, veluti sustentacula quædam, & stabilimenta. Ac planta quidem, proportionē omnino metacarpio respondet. Verum in pede, ceu uno ordine omnibus jacentibus digitis, quantus est illorum numerus, tantus meritò est & ossium plantæ, quæ proponuntur illis. Sed nec carpi quidem ad tarsum proportio constructionis obscura existit. Siquidem ex quatuor ossibus tarsus conflatus est, ex duplicatis autem carpus, ceu ex duobus ordinibus constans, Nam ex pluribus & minoribus componi particulis apprehensorium instrumentū erat expediens: ut ex majoribus, sed paucioribus, ambulatoriū. Anteriores igitur partes pedis adamussim persimiles comprehensoriis, ex æqualibus illis numero ossibus constant. Posteriores verò, quæ instrumenta omnino sint gressus, nullā habent in manu proportionē respondentē particulā. Reliqua pars media ambarum, qualis existit tarsus, utriusq; imitatur naturam. Os itaq; quod ab externis ipsius partibus est locatū, quod sanè & cubiforme dicitur, inarticulatur cavitati calcanei, ad finē adiacenti. Reliqua verò tria tres cubis naviformis ossis obequitant. Hoc autem ipsum rursus circum ambit caput astragali, qui jacet inter adnata tibiæ & fibulæ, supernè à lateribus, & præterea à tergo ab ipsis comprehensus. Superiacet autem calcaneo duabus eminentiis, ibi in duabus cavitatibus ejus firmatus. Atque extendere quidem & flectere pedem, supernæ astragali dearticulationis est opus: ad latera verò circumferre, opus est dearticulationis quæ fit ad os naviforme. At pedē & crus firmari, sicuti & sustinere universum corpus, ad ipsum præcipuè calcaneum pertinet: quod os, ea de causā nō solum cætera ossa, sed ipsum etiam astragalum magnitudine superat, cū quo etiā habet articulationes firmissimas. Ut autem firmitus dearticuletur, in medio ipsius & tibiæ astragalus est locatus, cohærens illi validis ligamentis cartilagineis. Duræ porro calcanei naturæ, dura cutis subducta est, ut occurreret violentis occursibus. At cavitas pedis, triū gratia constructa est, nempe internæ altitudinis, apprehensionis, & levitatis gratia. Ad hæc, in femore quidem est unicum os, quemadmodum & in brachio: duo autem in tibia iis similia, quæ in ulna cernuntur: quorum unum quidem vocatur tibia, alterum verò fibula. Maximum omnium corporis ossium famur meritò fuit. Primum namque hoc, si matum est cavitare, primumq; omnem corporis molem superiacentē vehit: curvum quidem, priore & externa parte: resimum

Stationi firmæ amplos et oblongos pedes esse appositos.

Pes hominis imitatur manum.

Pes etiā apprehensoriū organum.

Tarσος equi paratur carpo.

Πηδίοι, sive planta, est quid metacarpio simile.

Talus. Calcaneum Naviforme os Basis instrumenta.

Pedum constructio.

Pedum partes internæ, cur altiores & magis cavæ externis.

Astragalus. Talus.

Cubiforme os.

Scaphoides.

Tarsi ossa tria.

Calcaneum sub acere ad perpendiculum tori cerni.

Astragalus conjungitur naviformi ossi.

Plantæ ossa.

Pedis magnus digitus ex duobus tantum articulis stat.

Plantæ proportione metacarpio spondet.

Tarsus proportione spondet po.

Cubiforme os.

Naviforme os.

Astragalus.

Pedis motus a quibus articulationibus præciseantur.

Calcaneum esse maximum os, firmius, magis dearticulatione.

Calcanei cerni durissimum.

Pedis cæritas trium modorum gratia efformata est.

Tibia, Fibula Famur est os maximum.

est ad ge-
nui fiant.
poris par
epernam
fede ischi
lem foris

poris stru-
ra idonea
fessiones
lit.
ia stru-
ra.

gitorum
u maris.

tendonum
identium
tos pedu,
tantum
era pro-
untur a
sculis si-

tendonum
i inferun-
r pedibus
plicatio-
s.

resimum verò, partibus his contrariis. Quibus enim fœmur fuerit natura rectius, quàm convenit, blæsi fiunt omnino ad genu. Superiori ipsius fœmoris parti, ischii cotylem præparavit natura sedem. Ejus autem collum, statim ex cotyle obliquum foras abscedit, ut relinquatur locus internis fœmoris vasis & musculis: postea autem intrò rursus revertitur, versus genu. Ad hæc, magis quidem sima retrorsum, antrorsum verò magis curva quum sit structura fœmoris, ad sessiones idonea existit. Quin & tibiam ipsam circa supernas partes magis curvam extrinsecus natura fabricata est, firmitudinis & velocitatis ratione. Nam inferiores partes illius, quæ sunt ad malleolos, intrò sese reflectunt. Quemadmodum igitur singuli in manu digiti, à duplicibus quidem maximisque flectuntur tendonibus: ab aliis autem simplicibus minoribusque extenduntur: atque ab aliis adhuc minoribus ad parvum digitum abducuntur: ac denique ab aliis illis minoribus reliquus motus internus ad pollicem oblique agitur: ita dicamus etiam, & in unoquoque pedum digito hos quatuor motus merito inesse, quum à maximis quidem tendonibus digiti pedum flectantur, à minimis autem parte interna convertantur oblique. Porro media inter utrosque est magnitudo extendentibus, & parte externa circumagentibus. Non tamen æquè magni sunt in pedibus flectentes, ac in manibus: quia non itidem ut manus, pedem constituere oportebat instrumentum apprehensorium, sed basis firmandæ organum. Quanto igitur pes manu est major totus tota, tanto hujus digiti, illius digitis, & tendonibus sunt minores. Non ergo fuit æquum quatuor genera tendonum moventium digitos pedum à musculis tibiæ produci, quemadmodum in manu à musculis ulnæ: sed duo sola, nempe alterum, quod eorum extensionem efficeret: alterum, quod flexionem primi & tertij eorum, qui sunt in quatuor digitis, articulorum. Motus itaque cuique articulo digitorum pedis molita est quatuor natura, & quinque principia ipsorum, ut in manu: non tamen omnia ex locis proportionem respondentibus prodeunt. Tria siquidem ab ipsis pedibus motus principia oriuntur, duo verò deferuntur ex tibia. Etenim in ipso qui ad plantam est loco, musculos obliquo motui interno præituros constituit: in reliqua verò ipsius parte tota usque ad calcaneum eos locavit, qui secundum articulum cuiusque quatuor digitorum flectunt, magno digito excepto, qui à majoribus tendonibus germinationem insertam secundo sui ipsius & tertio articulo habet, ut is qui est in manibus. Pariter & ex superioribus pedis partibus alios posuit musculos, motui externo obliquo infervientes. Quare supernè quidem ex tibia, duo principia motus descendunt: inferiore verò parte prodeunt ex pedibus tria. Tendones in pedes inserti, modo quodam simillimo nervis à spinæ medulla colli in tota brachia productis, implcantur, commiscunturque inter se, ut offensionibus multò fortius resistent. Ob id ipsum namque, vel ubi magnitudo intervalli magna fuerit, vel locus periculosus, ibi missionem hujusmodi machinatur natura. Musculi autem valde parvi, ab anatomi-

micis non animadversi, primum articulum cuiusque digiti flectunt, pariter in manibus, pedibusque. Jam verò finestibiæ, fibulæque simul inter se uniti & conjuncti, fœmori exactè in genu ipso adaptantur. In tibia porro tredecim capita sunt tendonum, retrorsum quidem sex, antrorsum autem septem, moventque pedem secundum omnes convenientes eis motus. At conveniunt toti pedi absque digitis, motus quatuor, ut carpo. Etenim à musculo tibiæ supertenso antrorsum, enascitur quidam tendo robustus, qui in duas partes divisus, partibus circa magnum digitum pedis inseritur. Ab eo verò musculo qui fibulæ circumtenditur, prodicens tendo alius, iis inditur partibus, quæ ante parvum digitum sunt. Qui duo si utrinque tensi fuerint, attollunt, resimumque reddunt pedem universum: altero verò actionem obeunte, motus ad obliqua fiunt. Quin etiam ex posterioribus partibus, proportionem eorum qui sunt in manu, opposuit natura duas musculorum germinationes, quæ contrarios dictis motus pedis efficiunt. Quarum minor à musculo, qui per profundum fertur, orta, in eum, qui est ante magnum digitum, locum infernè implantatur. Altera verò major est, conspicuus ille tendo, qui in calcaneum, fortissimum omnium pedis ossium, & principalissimum ambulationis instrumentum, retrorsum supernè inferitur: qui vel si solus aliquando patiatur, pes necessario claudicat. * Is tendo solus, ex tribus aliis in ipsum venientibus, atque à maximis musculis ortis, conflatur: ut si vel unus ipsorum, aut etiam duo afficiantur, reliqui, aut reliquus ipsam actionem obeat. Ubi enim hic tendo calcaneum ad se ipsum trahit, sic membrum universum obfirmat, ut si altero pede stare aliquando velis, non possis facile everti, neque labefactari. Meminisse autem in universum convenit, obliquos quidem in membris musculos, obliquos motus præstare: rectos autem exactam flexionem, aut extensionem moliri. Quum igitur tres suræ musculi ipsum calcaneum moveant, & debilem pedis partem constituent: post illos autem, tres alij digitos flectant, & in pede convenientem motionem ædant, jure optimo posterioris tibiæ partis sex omnino musculi fuerint, unusquisque secundum rectitudinem particulæ quam est moturus, locatus. Quin etiam anteriores musculi tibiæ, sex aut septem censentur. Nempe unus, qui quatuor extendit digitos. Ex utraque verò ipsius parte, rursus alius unus, qui in triplicia tendonum capita desinit. Quibus tum ipsis, tum ipsorum utilitatibus, si quis intendat animum ipsos sex, aut septem universos statuet. Quod autem unguibus pedes proportionem respondeant manibus, quodque eis hoc ut apprehensoriis organis insit, verbis nihil est opus. Cutem ipsam, non laxam, aut subtilem, aut mollem, sed constrictam & mediocriter duram, sensilemque, ut non facile pateretur, subdidit pedi sapientissimus ille conditor noster: cui commentarios hos ceu hymnos quosdam compono, in eo veram esse pietatem existimans, non si taurorum inatropas, ei plurimas quispiam sacrificarit, & casias, alique sexcenta unguenta suffumigarit: sed si noverim ipse primus, deinde exposuerim alius, quænam sit ipsius sapientie.

Musculi par-
vi in pede
ab anatomi-
cis ignorati.

Tibia inesse
tredecim ten-
donum capi-
ta.

Pedi conve-
niunt motus
quatuor.

Calcaneum
fortissimum
omnium pe-
dis ossium et
principalissi-
mum ambu-
lationis orga-
num.

Tendo in cal-
caneum in-
sertus, ex tri-
bus alijs ten-
donibus con-
flat.

Obliqui mus-
culi obli-
quos motus
præstant.

Recti mus-
culi, exactam
flexionem aut
extensionem
moliuntur.

Tibia poste-
rioris parti
musculos sex
in esse.

Tibia ante-
rioris, mu-
sculi sex aut
septem.

Cutis pedi
qualis subdi-
ta.

Commenta-
rios hos Deo
cei hymnos,
quosdam co-
scripsit Ga-
lenus.

Pietas vera
que.

Impietas summa qua sit.
Bonitatis diuina specimen perfectissimum.
Virtutis in cetera opus.
 tia, quæ virtus, quæ providentia, quæ bonitas: ignorantia quorum, summa impietas est, non si à sacrificio abstineas. Quod enim cultu cōuenienti exornarit omnia, nulliq; bona inviderit, id perfectissimæ bonitatis specimen esse statuo. Invenisse autē quo pacto omnia adornarentur, summæ sapientiæ est: at effecisse omnia quæ voluit, virtutis est invictæ. Ne igitur mireris, universa cœlestia corpora summo esse artificio disposita, neve eorum ordo vel pulchritudo adeo te attonitum reddat, ut si inferiora hæc comparaveris, parva tibi esse videantur, & omni ornatu carere: siquidem sapientiā, virtutem, & providentiam, hic quoque invenies. Nam tamen si ex sanguine menstruuo & semine, immortale animal, aut impatibile, aut semper mobile, aut splendidum & pulchrum, æquè ac sol est, non potuerit constitui, in ipsa tamen vilitate materiæ, conditoris ars splendescit. Attonitum enim facit, idiotam quidem, materiæ artificem autem, pulchritudo artificij. Etenim sol & luna, divina quidem & cœlestia sunt corpora: nos autem terreæ statux: opificis tamen industria in utroq; æqualis. Parvam & abjectam esse partem animalis pedem, quis inficietur? magnum verò & pulcherrimum omnium quæ sunt in mundo esse solem, ne hoc quidem ignoramus. Neutrum tamen corpus commodius potuisset locari, q̃ est locatum. In mundo enim medium esse solem inter errantia sydera, infimum autem in animali pedem, necesse fuit. Maximum & pulcherrimū rerum omnium esse mundum quis tandem negat? Sed & animal, veluti parvū quendā mundū esse, aiunt veteres naturæ periti: eandem nanque in ambobus invenies sapientiam Creatoris. Quod si solem quidem ostendere in corpore animalis non liceat, licebit certè oculum, organum lucidissimum, & quam simillimum soli. Sed neq; oculo, nec cerebro deterius est pes cōstructus, si utraq; pars ad actiones cuius gratia fuit facta, se habeat optimè. Neq; cerebrum sine pede se probè haberet, neq; pes sine cerebro: eget enim, opinor, illud quidem vehiculo, hic autem sensu. Vehiculum enim cerebri est pes, ac totum corpus reliquum: sensum autem ipsis cerebrum præbet. Etenim illius tendonis triplicis qui ad calcaneū descendit, superficialis portio ad inferiorem partem pedis prætergressa, cuti ad intrinsecum vestigium subducitur: profunditati autem pedis, quæ est sub cute, in qua etiam duo parvi musculi sunt, distribuuntur parva germina eorum nervorum, qui à spinali medulla oriuntur. Per quæ organa pars pedis inferior facultatem sentiendi suscipit. Ut autem neq; admodum sensibilis sit, neq; promptè patiatur, excessus utrosq; vitavit natura, mediam exactè fabricata infernam pedis cutem, inter mollem & duram. Porro fibula extrinsecus tibiæ est attentā, tenue admodū os, & multò minus quam tibia. Atq; una quidem fibulæ utilitas est, dearticulationis ad astragalum, à qua extrahitur pes, atq; flectitur. Altera autem, quod omnia vasa & musculos tibiæ custodiat ab iniuriis extrinsecis. Tertia utilitas est in externo femoris capite, quod tibia sustinet. Ad id enim loci adfirmata, firmitudini & securitati non pa-

rum confert. Cæterum quum tibiā portandi famoris gratia præstaret esse majorem, ut autem ipsa moveretur facilè, minorem, essetq; necessarium alterum eligere, quum ambo simul convenire non possent: ratio quidem fuit eligere quod utilius, alterum verò non omnino negligere. Propterea igitur minorem fecit femore tibiā, non tamen usq; eo minorem, ut non posset jam tutò ipsum portare. Ad hæc, si absq; articulis fuisset constructum crus, nec extendi posset, nec flecti: in multas autem articulationes divisum, lubricum ac fallax esset adeo, ut nunquam constanter uno crure stare possemus, quin confestim circumverteremur, & caderemus. Quare ipsa prudens natura, tantum ex utroq; accepit, quantum neq; motus facilitatem, neq; firmationis securitatem vitiatum erat. Jam verò adnata ossis ipsius femoris, adeo congruentes in tibia cavitates sortiuntur, ut neq; latus sit incessus ipsorum, neq; motu difficilis propter loci angustiam. Circumposita quoq; ligamenta continent articulationem, adeo ut flectentibus nobis aliquando, aut extendentibus plurimum, femur à tibia non excidat. Patella quoq; vocata, os cartilaginosa, anteriores partes articulationis omnes coercet, prohibens quidem & ipsum femur prolabi ad anteriora, atq; ne nos cadamus haud modicam præbens utilitatem. Quatuor enim quum sint regiones circa articulum genu, anterior, posterior, dextra, & sinistra: anteriori quidem, ceu magis fallaci, cæterisq; magis laboraturæ, apposuit patellam: externæ, quæ periculis magis obnoxia est, quam interna, unum ligamentum rotundum, validumq; simul cum sine lati cujusdā musculi applicuit: interne aliud indidit ligamentum. At posteriori, plus nimirum laboraturæ, quam passuræ, neq; os neq; insigne ligamentum apposuit, præter lata illa & tenuia, quibus omnis articulus copulatur. Omnes porro musculi in femore, senario numero ambiuntur. Tres quidem maximi, qui in anteriori sunt femoris parte, recta ad genu feruntur: quorum unus quidem implantatur patellæ, duo autem reliqui, unum maximum gignunt tendonem, qui dilatatus, inhæret etiā toti patellæ, constringens ipsam prorsus, & conjungens subjectis. Postea verò, prætervectus articulum, inseritur anterioribus partibus tibiæ, ipsam, si tensus fuerit, attollens sursum, & totam extendens genu dearticulationē. Alij verò duo musculi utraq; prædictorum trium parte, hic quidem externus, ille autem internus, ad laterales tibiæ inseruntur partes, obliquæ motioni uterq; præfectus. Qui nanq; externus est, foras abducit: alter verò, crus intrò adducit. E nascitur autē hic quidem, ex commissura ossium pubis: ille, ab extremis partibus coxæ. In medio inter hos spatio, aliæ tres sunt musculorum explantationes, ordine positæ, parvis motibus ipsum genu moventes. Flectit enim genu, & ad interiora adducit tibiā is, qui est interiori continuus. Abducit aut foras simul flectendo, is qui tangit externum. Reliquus verò, qui & medius omnium est, in femoris caput internum insertus, flectit quidem totum quoq; femur, cum eo autem simul & tibiā attrahit. Qui superest aut novem

Conditoris artem splendescere etiā in vilitate materia.

Idiotā reddit attonitū pulchritudo materia.

Artificem reddit stupidū pulchritudo artificij.

Homines esse terreas statuas.

Solem esse pulcherrimū omnium quæ sunt in mundo.

Solem esse mediū inter errantia sydera.

Mundū esse maximū & pulcherrimū rerum omnium.

Animal esse seclusū parvū mundū.
Oculum esse organum lucidissimū, & quam simillimum soli.
Pes est vehiculum cerebri.

Cerebrum præbet corpori sensum.

Phantasia pedis unde facultatem sentientem suscipiat.

Fibula extrinsecus tibiæ est attentā.
Fibula utilitates.

Tibiā se minorem femore.

Adnata ossis.

Ligamenta femori sunt articulationis.

Patella sus.

Genu reguntur quatuor, quibus prædictis fulcitur.

Femoris musculi sex.

novem musculorum articulationē ipsius genti
moventium, strictus & longus ex osse ilium or-
tus tollit sursum tibiā, in illa maximē figura crus
totum statuens, in qua emollientes & subigen-
tes sursum ferimus pedem ad inguen alterius
cruris. Præter hos omnes, est parvus musculus
poplitis, qui flectit genu. Porro prima actio cru-
ris, cujus gratia factū est, ambulatio est: ad quam
tribus illis magnis musculis ipsum crus exten-
dentibus (quibus debetur robur totius ferē mo-
tus qui fit in genu) maximē nobis est opus, quū
nimirum toti cruri extensionem rectam suppe-
ditent. Tribus autē his tres opposuit retrorsum
natura, non æquē robustos tamen, neq; in tendo-
nes, ut illi, validos desinentes, quum non sit æ-
qualis dignitas extendentis genu motus, & fle-
ctentis. At motus cruris ad latera, ex abundan-
tia est. Descendunt aut musculi femoris semper
ad caput tibiā, præterita articulatione. Nam quē
admodum qui per quosdam funiculos lignea si-
mulachra movēt, ultra articulos ad caput mem-
bri movendi, eos applicant, ita & natura multo
prior quēq; articulum fabricata est. Ex dictis
igitur constat liquidō, eandem cōvenientes ani-
mi moribus & potentiis universas corporis par-
ticulas cunctis animalibus construxisse.

GALENI PERGAMENI
de vsp partium, Liber IIII.

Quandoquidem nutriri necesse erat ani-
malis particulas: ingressus verō cibariis
in corpus, unus adest per os: communis
sanē & maxima, primaq; omnium via est, quæ
ab ore ipso fert ad vētriculū, quasi ad promptua-
rium quoddam, omnium particularū commu-
ne, in medio animali positū. Cujus viæ, nomen
quidē propriū, œsophagus, seu gula est: commu-
ne aut, stomachus: aut promptuarium ipsum, ali-
mētum universum excipiens, illud accuratē ela-
borat, quod in eo quidē reperitur inutile, atq; re-
crementitium, infernē pellens: quod verō beni-
gnum, utileq; per venas quæ tum ad ipsum ven-
triculū, tum ad intestina perveniūt, distribuens.
Porro venæ alimentum ipsum, prius in ventricu-
lo elaboratū, & suscipiūt avidē, & ad aliquem cō-
coctionis locū communem totius animalis de-
ferunt, quem nominamus hepar. Ingressus autē
in locū hunc, multis angustis divisum viis, unus
est, quem appellamus portas. Nec verō solum
deducunt ex ventriculo nutrimentum venæ, sed
attrahunt etiam illud ad hepar, præparantq; mo-
do, quo ipsum, simillimo: quippe quæ natura
sint illi similes, & primum germen ex illo du-
cant. Ipsum autem hepar, postquā id nutrimen-
tum acceperit, a famulis jam præparatū, obscu-
ramq; sanguinis speciem referens, inducit ei po-
stremū ornatū, ad sanguinis exacti generatio-
nem. Ac velim impræsentiarum intelligas, distri-
butū a ventriculo ad hepar chylum, a visceris ca-
liditate, veluti vinum in dolio musteum, ferve-
re, concoqui, alterariq; in sanguinis boni gene-
rationem: in ebullitione autem hac, ex ipsis ex-
crementis, quod sæculentum quidem ac cras-
sum est, subsidere: innatare verō, quod tenue

ac leve existit, & veluti spumam quandam in su-
perficie sanguinis fluitare. Quorū excremento-
rum, huic quidem quod flavum & leve est, exci-
piendo, natura ad hepar vesicam quandam ap-
posuit: illi autē, quod crassum & limosum existit
lienem in sinistris ventris partibus subdidit, &
quendā veluti stomachū ex sima regione ipsius
splenis productum, venosum vas, ad portas ex-
tendit, ut nihilo minus hepar certē purgetur, q̄
si propē ipsum esset splen locatus. Postquam igitur
humor, qui in cavis hepatis ad animalis nu-
trimentū paratur, prædicta duo excrementa de-
posuit, & ab innata caliditate coctionem exactā
indeptus est, ruber jam & purus sursum ad gib-
bas hepatis partes ascendit. Excipit aut ipsum il-
lic una vena maxima, ex gibbis hepatis orta, quæ
veluti aquæ ductus sanguine plenus, ad utraq;
animalis partē fertur, superiorē simul & inferiorē:
unde per totū corpus, in ramos scissa varios
diffeminatur. At in hac quoq; vena, multo adhuc
humore tenui & aquoso, qui vehiculū nutrime-
ti existit, plenus est sanguis. Eundē, quē ille, usum
præstat animalibus aqua. Siquidē ex ea nutriri
nulla particula potest: distribui verō ex ventre,
quod nutriturū est, non poterat, nisi deductum
fuiſſet a quopiā ita liquido. Has igitur tenues hu-
miditates, postquā suo officio perfunctæ fuerint
expurgāt renes, instrumenta cōcava, stomachis
aliis quidem trahentia, aliis aut eas emittentia.
Adjacēt enim utraq; ipsi venæ cavæ (quā paulo
antē diximus maximā) paulū sub hepate, ut quic
quid in ipsam sanguinis assumatur, confestim
purgetur, solusq; postea is purus eat per totū cor-
pus, pauca omnino ipsi aquosa humiditate per-
mixta. Inſeritur autē ipsius venæ superior pars,
ad cordis ventriculū dextrū, saltē in quibus is
ineſt. Porro ventriculo ineſt facultas quēdā pro-
pria qualitatis attractrix: ineſt & quædā alia re-
ceptorum retentrix: & rursus alia excretrix su-
perfluorum: sicuti & ante has omnes, alteratrix
quædam, propter quam illis quoq; ventriculus
eguit. Sed aliis quidem omnibus animalis parti-
culis, quanquā easdem facultates habeant, non
indidit natura sensum eorum quæ defunt: sed in
plantarum modum nutriuntur hæ, assidue ex ve-
nis alimentum haurientes. Soli verō ventricu-
lo, & maximē ejus partibus, iis quæ ad orificiū
pertinent, sensum indigentia cōtulit, ad sumen-
dum cibum animal excitantem. Quum enim to-
tius corporis partes nutrimentum ex venis a ca-
va prognatis trahant, ipsa rursus cava ex venis
hepatis, hæ rursus ex iis quæ sursum ad portas
feruntur, illæ rursus ex ventriculo & intestinis:
certē ubi nulla jam supersit amplius particula, a
qua ventriculū capere oporteat, necessum est
animalibus, extrinsecus ipsum replere: in eo quē
differunt jam animalia a plantis. Siquidem his,
etſi quam maximē illas quatuor facultates, pau-
lō antē memoratas, habere cōtigerit, eis tamen
sensus eorū, quæ sibi defunt, nō ineſt. Non enim
per os nutriendæ erant, promptuariū copiosi ali-
menti subjectā habentes terram, cui cohærenti-
bus atq; unitis semper alimenta adfluūt. Ipsi ve-
rō substantiæ animalū, præterquā quod mul-
tum a terra differt, insuper etiam motus volan-

Vesicam fel-
lis sanguis:
repurgare a
bile.

Lienem si
nisi in loca-
tum eximere
melancholi-
cum succum
a sanguine.

Vena cava
dissecatio.

Serū esse ve-
hiculum san-
guinis.

Aquā baud
quaquā nu-
trire, dedu-
cere tamen a
limētum per
corpus.
Serum expur-
gant renes a
sanguine.

Vena cava
fertatio in
cordis ventri-
culum dex-
trum.

Ventriculo in-
esse quatuor
naturales po-
tencias, seu
facultates.

Ventriculo so-
li sensum in-
digentia cō-
tulisse natu-
ram.

Animalia a
plantis quo
differant.
Plantis non
inesse sensū
eorum, quæ
sibi defunt.

Animalibus
adesse arbi-
trarium mo-
tum.

Particulum nullam ex se habere sensum.

Nervorum par unū disseminari in ventriculū.

Thoracem esse inter os & ventriculū.

Fundum ventriculi consistere in dextra animalis parte, inibiq; fo-

Veri ab hepate.

Lienem sinistris subtendi ventriculi partibus.

Ventriculus cur rotundus.

Figura rotunda qua insit.

Figura omnium maxima.

Ventriculus cur oblongus.

Ventriculi orificium superius, cur inferiore latius.

Gulam esse partem ventriculi.

Tunicis ventriculi & gulae quae fibrae adsint.

Intestinorum ambas tunicas habere villos transversos.

Intestina non indigere facultate attractrice.

Tunica ventriculi gulae, ore ciborum, tum ut lingua deorsum trahatur & omnium quae in ore consistunt, cur sit una continua.

Intestina esse ad distributionem condita.

tarius adest, & loci ex loco mutatio: unde impossibile fuit ipsis, plantarum ritu, sugere humorem ex terra. Opus igitur erat unūquodq; familiaribus sibi nutrimentis nutrirī, eaq; id temporis edere, quo ventriculus indigentiam perciperet. At quum nulla animalis particula ex se sensum habeat, affluere ventriculo huiusmodi facultatē aliunde oportebat, veluti per canales à principio sensifico. Cujus rei gratia ad eum par nervorum haud mediocriter supernè defertur, & disseminatur: contextitq; maximè quidem os ejus, & partes ipsi continuas, & in reliquas usq; ad ventriculi fundum protenditur. Positus est autem ventriculus non statim post os, sed quem vocamus thoracem, & quæ in ipso sunt viscera, præposuit natura, ut ille quidem in inferioribus partibus effluvia habeat superfluatorum: hic autem per os attrahens, & rursus emittens aërem, vocis & respirationis fiat cōditor. At verò fundum ventriculi in dextra animalis parte cōsistit, quod jecur in regione similiter dextra superioriq; amplexatur, septum transversum contingens. Lien autem sinistris ipsius ventriculi partibus inferioribsq; est protensus. Ac meritò sanè rotundus simul & longus factus est ipse ventriculus: rotundus quidem, quod hæc figura minimè omnium existens læsioni obnoxia, etiam capacissima sit. Omnium siquidē figurarū, æqualē in ambitu mensurā habentiū, planarū quidem, circulus: solidarū autem sphaera, maximæ sunt. Oblongus autem, quoniam infernè quidē explantatio ejus ad intestina est: supernè autem ad œsophagum ipse idem progreditur: quæ verò incubit vertebris, cōprimitur: ob idq; ipsum vitiata est ejus convexitas. Jam verò superius orificium ventriculi est inferiore latius, quod illud quidē moles duras, magnas, & integras aliquādo transglutiat: hoc autem nihil exire permittat, non in chylum & lavorem conversum. Atq; est quidē gula ipsa pars quædam prælonga ventriculi, intestinū autem nequaquā. Quare tunicarū natura, ventriculo quidem & gulae adsimilis est, intestinis autem dissimilis. Interna nanq; tunica in ventriculo simul & gula, membranosiore, villos rectos supernè deorsum tendentes habet: externa verò, & carnosior, transversos, quales habent ambæ intestinorū tunicæ, idq; meritò. Siquidem ventriculus trahat ad seipsum per stomachū cibum & potum, tanquam manibus, rectis his villis oportet, propellat autem transversis. Intestinis verò (attractrice enim facultate non indigebant) soli ad propellendum idonei sunt facti villi. Quinetiam continua est interna ventriculi, stomachi, & omnium quæ in ore consistunt, tunica, quum ad attractionem contentorum in ore ciborum, tum ut lingua deorsum trahatur cum musculis qui sunt ad tonsillas, à quorum omnium tensione, sublato larynge, & currente sursum ad epiglottida, obturatoq; ab ea, repente ac simul humor influere in pulmonem prohibetur. Ac duriora quidem & densiora sunt interna horum, quam intestinorū: quia intestina sanè, ad distributionē: ventriculus verò, & stomachus, & os, ad patiendi difficultatem sunt cōparata, ob magnitudinem, asperitatem, atq; duri-

tiem eorum quæ transglutiantur. Ob id ipsum tunica quæ communis ori, stomacho, & ventriculo existit, rarior & mollior fit paulatim, usq; ad fundum ventriculi. Neq; ob aliam rem quam plurimæ quidem ad singula intestina immittuntur venæ: paucae autem ad inferiora ventriculi, paucae etiam ad ejus oris partes: & omnino obscuræ quædā ad œsophagū: hic siquidem via erat ciborū tantum: ventriculus verò, coctionis organū: ut intestinū, distributionis. Ambit autem ventriculū hepar, amplexaturq; quibusdam lobis ceu digitis, ut ille quidem ab hoc, cibaria verò ab eo calefiant. Habet etiam ventriculus ut ex sinistris longum lienem protensum, à quo sinistram illius partes calefiunt, sic retrorsum spinā & spinales musculos: illam quidem ceu propugnaculum quoddam densum: hos autem veluti substerniculum molle, à quibus ejus calor foveatur. In reliqua verò ipsius anteriori parte, calefactionis gratia, generavit natura omentum, corpus densum, simul & leve, ac præterea calidum: cuius argumento est, quod facillè in flammam vertatur. Nihil siquidem frigidū promptè comburitur. Id igitur corpus, ex duabus quidem tunicis densis atq; subtilibus, sibi ipsis incumbentibus, quamplurimis verò arteriis & venis, pinguitudineq; non pauca conflatu, per totum ventrem extenditur, ut illius caliditatē foveat. Quare quibus pars hujus, ob vulnera, adempta est, omnes infelicitè concoquunt, plurimiq; fomentis egent. Est & alia membrana peritonæos dicta, quæ viscera omnia, quæ in regione ventris sub septo transverso sunt, contegit, ab eisq; musculos incumbentes distinguit, citatq; excretionem aridorum excrementorum, ac breviter impedimento est, quo minus facillè flatibus (quorum tamen pars ructu, pars crepitu ventris solet sæpe vacuari, sicuti & halituosior pars concoqui, ubi viscera sunt valentia) distendantur intestina & ventriculus, singulis privatim firmum tegumentum existens. Siquidem anterioribus ipsorum omnium partibus est prætensum: procedit autem illinc ad dextram & sinistram per ilia, usq; ad lumborū vertebrae: quo fit, ut singulis intestinis ac visceribus, præterea tum arteriis omnibus, venis, & nervis circuntendatur. Quod verò ad reliquas ejus extremitates pertinet, superior quidem septo transverso infernè adhærescit: inferior autem ossibus pubis, & præterea ilium. Porro instrumentorū in illis duabus sitorū partibus, quæ superiori quidem parte sunt (cujusmodi est ventriculus atq; hepar) à peritonæi portione septo transverso infernè adnata: quæ verò inferiori (ut tum vesica, tum intestina) ab ea quæ ossibus pubis hæret, vestiuntur. Quod autē à septo transverso adnascitur ori ventriculi extrinsecus, unitur iis quæ utrinq; à dorso ascēdūt: estq; id principium generationis tertiæ tunicæ ventriculi, extrinsecus ipsum undiq; ambientis: quæ sanè operimentū quoddā ac propugnaculū secundæ tunicæ carnosæ circūposuit natura, eaq; existente crassa pro ligamento utitur, ad ventriculum totum cum corporibus quæ juxta spinam sunt, colligandum. At verò omentum oritur ab eis peritonæi partibus, quæ à dorso utrinque ascendunt,

Venarum multisericarum distributio inæqualis.

Ventriculum cur amplexatur hepar.

Lien. Spina.

Omenti natura.

Frigidum nihil promptè comburi.

Omentis confusio & usus.

Peritonæi cōstitutio & usus.

Peritonæi cōnexio.

Ventriculi tertiæ tunicæ.

Omenti origo.

ascendūt, sibi invicem occurrentes ad altissimā partē ventriculi. Quum enim ex illa dorsi regione produxisset natura venas & arterias quamplurimas ab utroque magno vase, simul produxit cum eis utrinq; peritonæi particulas, vniuscujusq; prædictorum vasorum partem ad sese atinentem, circumvestientes & colligantes. Mediam autem inter vasa regionem contexunt peritonæi portiones, veluti filamenta quædam, sibi invicem incumbentes, ibiq; plurimum adipis congerūt, quod fovet simul ventrem, inungitq; membranas, ac per inediam calore nativo suggerit alimentum. Talis itaque constitutio omenti, sive epiploei existit, quod quidem etiam spleni inferitur, corporiq; πυρξία vocato. Pari modo exortui, qui fit in tenue intestinum, & mesenterio, & colo, & ipsius deniq; ventriculi simæ parti alligatur. Est autem id, quod veluti hepatis caro existit, primum sanguinis gignendi organū, atque venarum principium. Quare natura ipsius, sanguini esse videtur proxima. Etenim si hoc quidem agit caro hepatis, ut sibi chylū assimilet: nihil autem contrarias, aut omnino multum differentes qualitates potest recipere, nisi per media prius iter fecerit: medium utiq; utriusq; erit sanguis, tantò à hepatis relictus, quanto superat coctum in ventriculo chylum. Caro itaq; hepatis, quæ ipsius corpus atque substantia est, primum sanguinis gignendi organum, & venarum origo existit. Quapropter & venis quæ ad ventriculum & universa intestina pertinet, inest facultas quædam effectrix sanguinis, qua succum, qui ex cibis distribuitur, in sanguinem mutare sunt aptæ, prius quam is ad hepar perveniat. Poros verò qui sunt in vesica bilem recipiente, perspicuum est gratia separandæ bilis constructos esse. Membrana autem exterior veluti cutis quædam hepatis est. Nervus in ipsum inferitur, ne omnino viscus sit sensus expers: quemadmodum ceteris & arteria distributa cum venis, ut caloris nativi moderationem ipsi conservet. At verò multas venas illas quæ à ventriculo & intestinis omnibus ferunt sursum cibum ad hepar, quum semel univisset natura ad portas, rursus intra substantiam hepatis in quamplurimas angustissimasq; divisit, ut diutius hærens ac morans alimentum in viscere, in sanguinem perfectè trāsmutaretur. Ubi enim diutius natura voluit immorari materias, ibi transitum ipsis est molita difficilem. Venæ autem illæ quæ sunt in hepate, omnium quæ sparguntur in totum corpus, longè tenuissimæ sunt, ceu nulli patiendi periculo expositæ (tutissimā enim habet sedem in viscere) & melius ita sanguinem elaboraturæ. At pori attrahentes ad se flavam bilem, post venas alimentū ex ventriculo sursum ferentes, priores locati sunt aliis venis id excepturis, ut videlicet sanguinem opportuna horum vasorum positione purgatum, cōmodo vena cava suscipiat. Etenim his solis venis quæ in simis hepatis sunt, subjecit natura arterias, haud ignara gibbis illius continuum esse motum ex septi trāsvēsi vicinia. Jurè autem & parvæ admodū fuerunt, ut quæ refrigerationem solum simis visceris suppeditarēt. Minimum autem nervum hepati dedit natura, utpote neq; ad

motum, neque ad sensum futuro ex usu animalis: quare eum aut non omnino in viscus, aut non in totum inservit. Ejusmodi siquidem facultatis hepar principium est, eaq; actiones sunt tum ipsi, tum ejus venis concreditæ, cujusmodi & plantis insunt. Non licet autem rectè invenire usum ullum cujusvis particulæ, totius organi actione ignorata. Porro hepar facultatis nutritoriæ principium, copulari oportuit duobus principis aliis, sicuti & illa sibi invicem. Hepar siquidem, pecus quoddam (ut inquit Plato) est agreste, ipsumq; nutrire colligatū necesse est, si modò hominum genus sit duraturum. At ratio, quæ homo est, sedem in cerebro habens, veluti famulam quandam atq; adjutricem irascētiā accersit, quæ sibi adversus hoc pecus auxilio sit. Quo fit, ut ipsa principia tria, per processus, utputa, nervos, venas, & arterias, cōjuncta, cōditor noster sit machinatus, ut sibi vicissim obsequerentur. Ad hæc verò hepar, ventriculo, intestinisq; omnibus per venas, & colligantem ipsa tunica junctum, proprio etiam tegmine membranoso, quod oritur à peritonæo, proximis corporibus colligatur. Omnia siquidē tunica hac obvolvuntur. Magno præterea alio vinculo, septo transverso: atque aliis quibusdam membranosis & parvis, costis nothis connexum est. Copulatur etiam & cordi hepar intercedente septo transverso, utpote medio inter utrumq; viscus. Quippe vena cava, septum transversum permeans, ab hepate ad cor ascendit. Cujus venæ indumentū crassum, tum venam ipsam, tum totum viscus, ad septum transversum alligat. Quum autem venæ ipsius eo in loco læsio, omnibus quæ in toto animali sunt venis, esset futura communis (vulnerata enim ea, aut divulsa, subito velox sequitur mors) haud ab re natura, in anterioribus quidem ejus venæ juxta dictam regionem partibus, ad majorem securitatem, crassissimum indumentum: in posterioribus autem tenuissimum, apposuit. Illæ enim his facilius læduntur. Quia verò septum transversum non solum à naturalibus distinguit viralia, sed etiam organum nec minimū respirationis existit, utrumq; vicinorum viscerum, ne videlicet illud comprimerent quantū fieri potuit abduxit cōditor noster. Porro lien limosos & melancholicos succos in hepate genitos trahit per venosum meatum: attractos autem, non protinus in ventriculum excernit, sed ipse prius per multum ocium cōficat atque immutat, utens ad hanc actionem potissimum ipsis arteriis, quæ certè multæ & magnæ per totum viscus feruntur: quarum assidua motione simul & innata caliditate, frangi & elaborari crassi illi succi possunt. Quicquid igitur eorum in succum huic visceri maximè convenientem translatus fuerit, alimentum spleni efficitur. Quod autem prorsus inutile elaborari non potest, hoc ad ventriculum per alium venosum stomachum splen eructat. Est autem splenis corpus rariū admodum atq; laxum, spongiæ instar, sic ut crassos & melancholicos succos facile trahat, excipiatq;. Cæterum splenis caro, tametsi laxa sit, à pulmonis tamen carne magno spatio relinquitur. Laxissima siquidem ea est, & le-

Hepar cuius facultatis principium. Vsus partis inveniri non potest actione illius ignorata.

Hepar agreste est pecus.

Ratio (quæ est homo) in cerebro collocatur.

Principia animalis tria, cur inter se sint conjuncta.

Hepatis cum cæteris colligatio.

Septum transversum interiacet cordi et hepati.

Vena cava indumentum.

Septi transversus.

Lienis usus.

Lienem elaborare melancholicos succos.

Lienem nutriti succo melancholico a se elaborato, atq; mitiori reddito.

Lienem mittere quod elaborari non potest ad ventriculum & stomachum.

Lienis substantia.

Pulmonis carnem la- xissimā, nutri- riri ex puris- simo sangui- ne.
Lienem nu- triri tenuio- ri, quā he- par, portione sanguinis.
Sanguinis qui ad splenē attrahitur, crassior est il- lo qui consi- sit in hepate

Splenis caro rarior & le- vior est illa, quā hepar cō- stat.
Hepar beni- gno & crasso nutritur san- guine.

Arterias cō- tractione sua expellere ex- crementa sple- nis.

Lieni arte- rias multas esse, atq; ma- gnas tribu- tas.

Hepar cur parvis indi- guit arteriis.
Alimentum coqui etiam in intestinis.
Sanguinem coqui in ve- nis.
Venis inesse sanguifican- di vim.

Intestinorū substantiā nō multū à ven- triculo dif- fert.
Alteratrice vim inesse singulis ani- malis parti- culis.
Intestina cur variē involu- ta.

Gulosa & in- explebilia es- se, quibus u- nicum inte- stinum est re- ctum.

vissima, *parumque abest quin albæ, utpote ex spuma quadam veluti coagulata. Nutritur enim ex purissimo sanguine, flavo, subtili, & spirituo- so, tanquam delato à corde. Splenis autem cor- pus, quū tanto rarius hepate sit, quanto est cras- sius pulmone, meritō ex tenuiori sanguinis par- te nutritur. Consentiens quippe est ex arteriis quidem, tenuius: ex venis autem crassius nutri- mentū transumi, quum tunica arteriarū quā venarum sit densior, & sanguis subtilior & va- porosior. Atq; ex tali præstitit laxam carnem nu- triri, veluti ex crassiori densam. Cæterum qui at- trahitur ad splenem sanguis, crassior est eo qui est in hepate. Quia tamen elaboratus ab arteriis quæ illic sunt, atque adeo venis, multo densio- rem tunicam habentibus, quā quæ sunt in he- pate, non affatim, neq; crassius, carni splenis, sed subtilis, & paulatim mittitur, ob id caro quidē huius visceris rarior & levior est, quā hepatis, non tamen rubicundior aut flavior. Nam melā- cholicus eratis, quem purgavit humor, à quo elaborato nutrita est. Hepar verò benigno simul & crasso nutritur, tū propter subtilitatē tunicæ venarum quæ sunt in hepate, tum propter ma- gnitudinem foraminum. In summa igitur, he- par ex rubicūdo & crasso sanguine: splen ex sub- tili, sed nigro: pulmo ex elaborato ad unguem, flavo, subtili, spiritali, ac puro, alimentum capit. Præstant etiam spleni maximum usum arteriæ, contractione sua illius expellentes excrementa fuliginosa. Ut enim pulmo refrigeratione vehe- menti, quam dilatata arteriæ conciliant, sic splē insigni indiget purgatione, quæ contractis illis paratur. Quare illi arteriæ multæ, & magnæ tri- butæ sunt. Hepar verò nec tali egens purgatio- ne, nec refrigerio magno, jure optimo parvis in- diguit arteriis. Conversa autem sunt ad hepar atq; ventriculum, ipsius lienis sima, quæ quidem venarum & arteriarū immissiones, & quæ ad o- mentum pertinet, insertionē continent. Coqui- tur porro alimentū, & in ipso per intestina tran- situ: ut in venis omnibus, sanguis: quum tamen neq; intestinorū ullum coquendi alimenti, neq; venæ sanguinis gignēdi gratia exstiterint. Quem admodum igitur venis (quū eas instrumenta di- stributionis ipsa natura fecisset) facultatem san- guinis generatricē indidit, ne dum per illas ferre- tur, tempus ipsi alimento periret frustra: ad eun- dem opinor modū & intestinis (substantia quo- rum haud multum à ventriculo differt) distribu- tionis tantum in venas gratia institutis, facultas quædam concoctrix ciborum inest: quod fieri omnino non posset, nisi singulæ animalis parti- culæ virtutem quandam haberēt alteratricem. Sunt autem convoluta intestina plurimis cōver- sionibus orbiculatis, ne alimentum ocys elabe- retur, inexplabilemq; vorandi semper necessita- tem inducens, à philosophia & Musis nos revo- caret. Nam quæ animalia à ventriculo intestinū simplex & rectū usq; ad anum sortiuntur, infa- tiabilia omnia & gulosa sunt, plantarumq; mo- do cibo assiduē inhærent. Quæ circumvolutio- nes intestinorum quum innumerabilem venarū multitudinem ex hepate sibi ipsis habeant infer- tam, omnē in ventriculo coctum succū sursum

mittunt. Unde fieri nequit, ut humoraliquis ani- mali nutriēdo idoneus, ab animali labatur, quā- do saltem naturaliter se habent corpora. At ve- rò orificia arteriarū, quæ in intestina se aperiūt, modicum etiam nutrimenti assumunt, quemad- modum plurimum venæ. Naturaliter quippe continetur sanguis & in arteriis. Porro ut attra- ctices potentia, rectorum villorū motu, sic ex- pultrices, transversorū actione constant. Quem admodum igitur ventriculo utrosq; villos forti- to, duabus opus fuit tunicis, contrario inter se modo habentibus: ita & intestinū quodq; unam speciem motus propultricem quum habeat, u- nam pariter tunicæ speciem, in transversos & cir- culares villos dissolutā, obtinuit. Habet autem et si similem, duplicem tamen tunicam, quodq; intestinum, partim ut facultas ipsorū expultrix valentior sit: partim ut ipsa instrumenta, ab inju- riis omnibus sint tutiora. Nonnullis verò inte- stinorum, præcipuē in animalibus iis, quæ subti- les ipsorum tunicas possident, quidam villi re- cti obtenduntur extrinsecus, ad transversorum tutelam. At quod peritonæum ipsum (à quo tu- nicæ omnium viscerum sub septo transverso su- munt originē) hanc secundam vestiatur tunicam intestinorū, colligetq; omnia intestina, tum quæ ad spinam sunt corporibus, tum aliis, quodq; ab eo & septo transverso, veluti à duabus compres- sa manibus, supernè quidē unitis, infernè autem distantibus, excrementa explodātur, liquidò cō- stat. Ne autem assiduē egererent, mejerentvè a- nimalia, ut humidis quidem excrementis vesica subiacet, sic siccis intestinum, quod crassum dici- mus: principium cujus cæcum intestinum exi- stit. Ubi enim tenue intestinum definit, illinc ad dextra quidem ilia, cæcum: ad sinistra autem co- lon emergit, per sinistra prius ilia sursum ductū. Porro cæcum prorsus veluti venter quidam est crassus, excrementis recipiendis appositus, cui ad portionem colon respondet. Atq; plurimis sanē avibus propter actionis robur, cæcum intesti- num est duplex. Nam si quid in transitu per te- nue intestinum distributionem fefellerit, id om- ne, diuturna in cæco mora, planè exugitur. Utrif- que autem tam humidorum, quā siccorum ex- crementorum effluviis, muscoli quidam incum- bunt instar claustrī cujusdam, ne cōtinenter aut intempestivè excernantur. Siquidem vesicæ col- lum musculosum existit: recti autem intestini o- ra inferior, à musculis in orbem circumfusis con- stringitur. Muscoli nanq; omnes quum sint mo- tus voluntariū instrumenta, non sinunt foras fer- ri excrementa, antequam ratio jusserit. At verò ad perfectam intestinorum & ventriculi nutri- tionem, toti mesenterio & omento natura plu- res intexit venas, nutriendis illis dicatas, haud quaquā ab eis traicientes ad hepar. Quanquam reficiuntur etiam interdum ea, cremore illo quē ex cibis cōficiunt: necnon in longiori inedia, per quas venas prius distributio ad hepar facta est, per easdem rursus aliquando sanguis benignus ad eorum nutritionem retrahitur. Colligens er- go natura ut in arboribus exiguas radices, ita in animalibus vasa minora in majora, & illa rur- sus in alia majora, idq; semper agens usq; ad he- par

Arteriae de- scendentes in- testina.

Arterias cō- tinere natu- rali ter san- guinem.

Attractionē fieri per vil- los rectos.

Expulsionem fieri Villis transversis.

Ventriculū habere duas tunicas inter se differentes.

ratione di- versorum Vil- lorū.

Intestinorū singulis inef- se duplicem

tunicam u- transq; Villis transversis consistam.

Peritonæum esse originem tunicarum o- mnium. Cif- cerum sub se- pro transver-

fo.

Vesica usus.

Crassi intesti- ni usus.

Caci intesti- ni figura, & usus.

Musculi re- tentioni ex- crementorū dīcati.

Musculi sūt motus solū- tarij instru- menta.

Vena, intesti- norum Ven- triculiq; nu- tritioni dica- ta.

Sanguinem re- geri ad in- testina & cō- triculi per me- sericas

Venas, in lon- giori inedia.

Mesericas Venas desine- re in portā,

par

par ab intestinis, in unam omnia venam coëgit, quæ ad portas est sita: à qua etiam, vena quæ tum ad ventriculū, tum ad splenē fertur, enascitur. Similiter & arterias omnes in unā magnam dorso incumbētē, pari modo cōtraxit. Ne autē venæ ipsæ longo ductu perrumperētur, à tunica colligante ac vestiente intestina, similem peritonæo membranā, hoc est, mesenterium, produxit quæ vasorum singula induit. In spatius verò inter vasa inanibus, eandem hanc tunicam, sed jam duplicem, applicans, ad angulosq; vasorum, quæ in unum coeunt, carnosam quandam naturā, quas glandulas appellamus, apponens, quod ea nimirum regio injuriis magis obnoxia sit, validissimum sic vinculum, præsidium, & munimentū ipsis vasis constituit, quod sanè totum mesenterium vocatur.

GALENI PERGAMENI
de usu partium, Liber IIII.

Longè autem fuit satius, unam venam portæ ab hepate ipso produci, ac deinde in varias meseraicas discissam, quemadmodū dictum est, in nutritoria membra disseminari, quā si statim à multis partibus hepatis multæ venæ ortæ, in illa tandem deducerentur: id quod maximè obesset, quum ipsarum venarum, tum etiam integritati jecinoris. Ut verò æqua quidam venarum distributio esset omnibus nutritiis organis, vas autem id descendens ab hepate, sedem haberet stabilem, inter ventriculū atque intestina ipsum oportuit * ductum, incumbere ea parte subjacentibus vertebris. Cum ipsis autem venis per totum mesarē arterias divisit etiam natura, nec non nervum unum. Quum igitur oporteret venā, arteriā, nervū, & quartū cum eis bilis meatum, pervenire eò loci, sanè ad fulciendā & roborandā regionem illam, in qua primum divaricantur & dividuntur prædicta vasa, utpote periculo expositā, glandulosum quoddam corpus, quod *παγκρέας* appellatur, fabricata natura, substravit simul illud, atq; in orbem omnibus circumposuit, divisionesq; omnino replevit, ut nullum ipsorum facile jam findatur, aut concussum possit labefactari. Quin etiam membranas fortes tum privatis singulis vasis, tum communiter ipsis omnibus circumdedit, vestientes ac jungentes ea circumfusis omnibus instrumentis. Ad hæc autem peragenda capax spatium requirebatur: quare primū omnium intestinum, quod ventriculo conjunctum est exortusq; dicitur, natura quidem minimè in circumvolutiones reflexit. Quod autem hoc consequitur, circumvolvitur atq; flectitur: vocaturq; jejunum, quod semper reperitur inane, nec tantillum quidem in seipso alimenti contineat. Tertium autem est intestinum, quod vocant tenue: quartum cæcum: quintum *κόλον*: sextum deniq; rectū, in cuius fine sunt muscoli, qui constringunt ac retinent excrementa. Porro exortus ipse ex ventriculi fundo descendens, per dextram partem ad spinam deducitur, atq; supra illam firmatur. At verò initio jejuni ex his est, quæ nullum præstāt usum, sed alia necessario sequuntur, quæ propter ali-

quam utilitatē sunt facta. Siquidem & quod primum omnium intestinorum jejunum, ipsum chylum excipiat, & quod situm juxta hepar sit, vasorum in sese multorum orificia continens, & quod etiam bilis meatus paulò supra implantetur ad ipsum ventriculi exortum: ob has inquam causas, inane semper ac vacuum cernitur. Nam præter cætera quæ citissimam ex ipso distributionem faciunt, etiam bilis ipsa nondum excrementis permista, sed sincera & pura in id intestinum confluens, sua mordacitate illius tunicas ad celerem excretionem excitat. Oportuit autem sic insinuari talem bilis meatum, quia brevior illi via erat commodior, ceu eorum etiam futuro participi, quæ natura ad tutelam vasorum eò pertinentium construxerat: & quia talis etiam ejus positio expediebat excepturis bilem omnibus instrumentis, in quibus necessario ac naturaliter indies maxima pituitosorum excrementorum copia colligitur: quam dividere, incidere, comminuere, atque abstergere est opus. Merito itaq; natura excrementis id genus præsidium maximum est molita, acrem atque absterforium hunc succum, quem omnino oportebat vacuari e corpore, non in intestinum aliquod ano proximum, sed in primum exortum demittens, ne quod inferiorum intestinorum, externo aliquando indigeret auxilio: quam certè ubi ex pravo corporis habitu, copiosius pituitosum excrementum colligitur, ileos, lenterias, tinesmosq;, omnium qui ventri contingunt morborum gravissimos, inducere solet. At verò nullam bilis portionem in ventriculum immisit natura, quamvis & ipse non pauca gignat pituitosa excrementa: quia vitium quidē id adeo est exile, ut præsidio externo abundè corrigi possit: mala verò quæ in ventriculum confluens bilis induceret, essent tanta, ut functiones ipsius funditus deturbarent. Flava siquidem bilis, acrem, mordentem, atque omnia abradentem, obtrinet facultatem. Cujus succi vomitum copiosius, morsus intestinorum, cardialgiæq;, solent semper præcedere. Ventriculum itaq;, quā jejunum, sensu exactiori prædictum, bilis in ipsum confluens, cogeret alimentum prius deorsum trudere, quā planè concoctum esset. Siquidem ventriculi propria actio est concoctio: postulant autem quæ concoquuntur, temporis diuturnitatem, quā sanè biliosus humor non patitur. Rectè igitur veteres medici, vomitus à cibis in singulos menses repeti præcipiebant, alii quidem semel, alii verò bis: omnes tamen ij, qualitates ipsas comedendorū in eum usum acres & absterforias deligere consulentes, ut pituita omnis e corpore purgaretur. Nam quæ mordent & abstergunt cibaria, biliosa omnia sunt & cacochema. Quod autem bilis ab intestinis in corpus naturaliter sese habens non transmutatur, ipsa indicat excrementorum varietas. Siquidem in ictericis, comestorum colorem referunt, bile videlicet minimè deorsum subeunte, sed sursum in totū corpus perlata. In sanis verò, quod humor eis biliosus in intestina cōfluat, flavo colore sunt tincta. At melancholicum excrementum in ventriculum excrevit natura, ceu nullam

Meatum bilis implantatur in ventriculi exortū.

Bilis crassius excrementis excernendis aptissima.

Pituitosum excrementum collectum copiosius, quæ inferat. Bilis nullam portionem demisit natura in ventriculum.

Bilis flava facultas. Bilis vomitū quæ præcedere soleant. Ventriculi propria actio est concoctio. Concoquenda egent tempore.

Vomitū quæ ratione olim singulis mensibus veteres prævocabant. Mordetia et abstergentia cibaria, esse biliosa, cacochema. Interiorū excrementa cur rem ciborum excrementa sanorum, flava. Melancholicum excrementum in ventriculo excrevit natura.

Atra bilis noxam illi allaturum. Acerba siquidem, acidaque, quum sit atra bilis, contrahere ipsum, constringereque, non ut flava, subvertere, est nata. Quare non modo non lædit, sed actionem ipsius etiam juvat. Nam ventriculum intendit, contrahitque; in seipsum, ut cibos ad unguem circūplectatur retineatque, quousque fuerint percocti. Porro ad discernendam urinam, natura etiam renes prope hepar construxit: quibus veluti quandam cisternam, ipsam vesicam subdidit, ad cuius finem musculum fabricata est, custodem, ne superflua intempestive effluerent. Renes autem ipsi vesicæ connectunt meatus quidam prælongi, validique, quos *Græci*, nos urinarios vocamus. Sic igitur urina vi renum segregatur à sanguine, & illinc per ureteras ad vesicam demittitur, indeque excernitur, quo tempore ratio iusserit. Cæterum quum arteriæ, pari magnitudine qua & ipsæ venæ, inserantur etiam in renes, indicium certè est sanguinem similiter in eis contineri, qui nimirum purgari postulet. Atque alter quidem renum superiorem, alter inferiorem positione sortitur. Nam quum serum trahendo, ita demum purgent sanguinem, certè si adversum haberent situm, alter tractu suo in contrarium, alterius tractui moram adferret. Nunc autem uterque agit liberè, solusque attrahit, quum nihil sibi è regione habeat oppositum. Est itaque, dexter quidem ren, superior ac primus, sinister verò inferior ac secundus: quia viscus ipsum quod purgatur, in dextris locatum erat, & plurima cavæ venæ germina in dextram partem suis orificiis definunt, ex gibba hepatis ad eam venam sanguinem derivantia. Omne autem trahens, expeditius ex directè oppositis attrahit. Sed neque locus pariter vacuus in sinistris erat sinistro reni, ob splenem hepate inferius locatum. At verò serosa humiditati expurgandæ, natura duo instrumenta construxit: aliorum autem excrementorum singulis, unicum tantum: nam paucissimum quidem est melancholicum excrementum: copiosius autem ipso, biliosum: utroque aquosius, multò cumulatius. Sed & crassissimum quidem melancholicum: tenuissimum verò serosum: atque amborum mediū, biliosum existit. Jam verò ipsius renū spissitudinis sunt causæ duæ: facilis scilicet huiusmodi humiditatis attractio, atque ex ipso necessaria renum nutritio. Siquidem orificiorum angustia, stipatioque, in causa est, ut familiaris succus, syncerus, impermixtusque, ad partes, quibus talia orificia insunt, trahatur. Quanquam nec lien, nec renes, accommodatum sibi duntaxat eliciunt succum: verum splen quidem, cum illo trahit etiam aliquid sanguinis: renum verò uterque sibi plurimum bilis conciliat: multum etiam tenuioris & humidioris sanguinis. At biliosi quidè excrementi, quicquid non admodum crassum fuerit, cum urinis permeat: sanguis verò, carni ipsi renum aspergitur, instar facis cuiusdam. Inde jam vaporis modo paulatim in totam ipsam dispergitur, adhærescitque, atque demum alimentum fit renibus. Ne igitur cum urinis, per aliquod foraminum quæ habentur in renibus, quemadmodum tenue biliosum, ita & sanguis elaberetur, densum esse eorum corpus præstiterat. Eis autem ad sui nutri-

tionem tertio quoque alio vase opus non fuit, præter duo magna, quorum alterum oritur ab arteria, quæ spinæ incubat, alterum à vena cava. Verum utraque bilis & urinæ vesica, purum atque ab aliis secretum quam attrahant sibi familiare excrementum, vasa alia, alimentum sibi suppeditantia, jure optimo flagitarunt. Quum autem copiosius multò seorsum excrementum, quam ipsum biliosum, esset, majori certè receptaculo indiguit, cui ob id venis, arteriis, & nervis, multò majoribus haud injuria fuit opus. Vesicæ igitur quæ urinam excipit, nervos à spinali medulla, qua parte situm latum os est, inseruit natura: venasque & arterias, à propinquis ipsi vasis. Alteri verò vesicæ, quæ ad jecur positionem habet, arteriam quidè & nervum, ab iis quæ in viscus ipsum inferuntur, deducens, parvum utrumque, admodum, ac vix conspicuum: at sensilem atque conspicuam venam ab iis quæ sunt ad portas, producens, hæc tria juxta collum ejus infixit: unde usque, ad fundum perveniunt. Pari modo & in vesicâ aliâ majorè, ad collum ipsum vasa sex, utrinque, videlicet tria inservit: quæ quidè tutelæ gratia membranæ quibusdā tenuibus obvolvitur, ac per easdem ita sibi mutuo conjungitur. Eorum autem in ipso statim primo ingressu diversorum bifariâ, pars quidem in totam vesicam disseminatur: pars verò aversa fertur deorsum, secundum collum, exiguum quidem in foeminis, magnum verò in masculis, quod hi particula quadam insigni, ad extremum collum vesicæ sita, exuperabant, quæ dicitur coles. Alia itaque per ea vasa, quæ excrementa secernunt, nutriuntur, ut lien & renes: alia aliis quibus alerentur, eguerunt, ut ipsa vesica. Habent autem & renes ipsi, nervum quantum hepar, lien, & bilem excipiens vesica: quibus omnibus exiles omnino sunt nervi, in suis ipsorum tunicis conspicui extrinsecus, sentiendi gratia. Tres namque scopi naturæ ipsi in nervorum distributione extiterunt: primus quidè, ut sensoris instrumentis sensum impertiret: secundus, ut motoris motum: tertius, ut omnibus aliis facultatem daret, qua sibi infesta dignoscerent. Porro sensus causa, linguæ, oculis, auribus, maximi sunt nervi tribut: necnon partibus manuum internis, atque adeo ipsius orificio ventriculi. Sunt enim quodammodo & hæc sensoria. Siquidè per manus ex tactu est dignotio certissima. Orificium autem ventriculi sensum habet animali deficientis ipsi animali, quæ fames nuncupatur. Secundo autem loco, in musculis, motus voluntarij instrumentis, reperire est nervos maximos. Ad discernenda verò quæ dolorem adferunt, nutritoriis organis aliis quidem liberalius, aliis autem parcius, pro cuiusque nimirum constitutione nervos largita est natura. Nam si quibus afficiuntur injuriis, eas non sentirent particulæ, animalia utique brevissimo everterentur tempore, facile ab acerbis excrementis exesa. Ob id in singulas circumvolutiones intestinorum, singuli disseminantur nervi, perinde ac vena, & arteria. In hepar autem, nervus insertus est minimus, ut quod musculorum ritu haudquaquam moveatur, neque ut intestina, sensu exquisitiore egeat: hæc quippe acrimonia tetrimentorum exasperantur: unde dysenteria, si ab atra bile inciperit, letalis est.

Renes ad suam nutritionem non egere aliis vasis, præterquam ex mulgentibus Vesicæ utraque, cur ad suam nutritionem alia vasa desideret.

Vesicæ utriusque vasa, unde exierint.

Vesicæ urinariæ sex vasa.

Coles.

Nervi ex libris, in quibus prædicta.

Scopi naturæ propositi circa nervorum distributionem, sunt tres.

Nervi quibus gratia sensus tribuitur.

Tactum fieri per sola manus exquisitissimum.

Famæ sensus.

Nervi ad percipiendam infestantiam.

Dysenteria incipiens ab atra bile, letalis.

est, ut inquit Hippocrates: hepar verò à quatuor instrumentis purgatur, duobus quidem renibus, tertio autem splene, atque adeò quarta ipsi inhaerente vesica. Quæ instrumenta quatuor, quod à propriis excrementis nihil acceptura essent incommodi, sensum majorem non postularunt. Neque enim trahere huiusmodi excrementa potuissent, nisi qualitatibus communitas quædam cum excrementis ipsis intercessisset. Nihil autem ab eo quod cognatum & familiare est, dolore aliquo afficitur. At majori vesicæ, quæ lotii receptaculum est, nisi lotiū id, quod biliosius acriusque est, repente excernatur, magnas sepe noxas adferret. Quare ut sensu prædita esset maiore, plures, & eos quidem majores nervos, ipsi natura tribuit: sicuti & validiorē quàm aliis tunicam, quod passim distendenda & evacuanda esset. Porro tunica quæ prædictis omnibus instrumentis extrinsecus sunt circumjectæ, nonnullæ quidem tenuitate ipsa, omnes tamen simul figura existunt araneis similes: quandoquidem earum nulla in fibras instar internarum dissolvitur, quæ ipsorum instrumentorum sunt propriæ. At internæ, quæ corpora ipsa particularum constituunt, in ventriculo quidem ac stomacho duæ, fibras quidem orbiculatas externa, expellendi videlicet gratia, & obliquas interna, gratia attrahendi retinendique habuerunt. Intestina autem (ut quibus nec attrahere, nec retinere necessum erat, sed cōtractis undique prorsum pellere) quum simplici egeret motu, simplices quoque fibras sortita sunt. Cæterum vesicarum tunica, rectos, & circulares, & obliquos possident villos. Una enim quum sit utriusque vesicæ tunica, ut omnes species motus consequeretur, omne genus fibrarum obtinuit. At verò in ventriculo tunica duæ constructæ sunt, triplicis usus gratia: variarum scilicet actionum, patiendi difficultatis, & crassitudinis. Quippe ad concoctionem ciborum, oportuit crassum esse atque carnosum ventriculum. Quæ causa sanè est, cur quibus corpus ventriculi est gracile, id deterius concoquant, quàm quibus corpulentum. Ergo utrique vesicæ, durities adversus injurias data est, quæ tunicarum tenuitatem pensaret: coquendi verò instrumentis, crassities, quæ mollitiem emendaret, ac cibos calore foveret suo, obtigit. Jam ut meatus bilis, eam suscipienti vesicæ, sic pori ureteres, substantia corporis, majori vesicæ sunt similes. Et quemadmodum ille quidem in intestinum, ita hi oblique intro in laxiorē sinum vesicæ inserti, veluti membranam quandam ab interna parte succidunt, quæ ab excrementorum quidem intro irrupentium impetu evertitur, ac patefit: reliquo verò tempore omni concidit, ac cōtrahitur, meatuique operculum tam exquisitum efficitur, ut non solum humoribus, sed etiā flatibus, reditus omnis sit interclusus. Etenim prima & principalissima nutrimenti instrumenta sunt, quæ concoquunt, utileque alimentum aliis transmittunt. Secunda verò quæ purgant, quæ deducunt, & excrementum excipiunt. Tertia, quæ excernendis excrementis sunt destinata: quorum alia quidem effluvium intempestivum ipsorum cohibet, ut musculi sedem constituentes: alia verò tem-

pestivum incitant, ut musculi epigastrii omnes. Eorum igitur qui sunt ad anum, unus quidem est sine pari, transversus extremæ ipsius oræ circumfusus, ut rectum intestinum ad amussim ac fortiter claudat. Cuius musculi substantia est inter cutem ac muscolum media. At reliqui duo musculi obliqui, utrinque unus, supra ipsum rotundum siti, sedem sursum revellunt, ubi in conatibus ipsa magnis prolabitur. Cæterum octo abdominis musculorum, recti quidem duo, sibi ipsis simillimi, per medium omnem ventrem rectas fibras ferentes, ab ossibus pectoris ad pubis ossa extenduntur, ibique sese mutuò contingunt. Alii verò duo transversi, & ipsi per omnia similes, universum peritonæum circumtegētes, rectum cum antedictis efficiunt angulum. Reliqui quatuor sunt obliqui, super hos incedentes: quorum duo quidem, fibras ab hypochondriis ad ilium ossa extensas habent: alii autem duo, hos in speciem X. græcæ literæ interfecantes, ab ilibus ad hypochondriorum partes descendunt. Omnes tamen in rectos ac medios musculos desinunt, suis tenuitatibus nerveis, producentes semper æquales ac similes fibras. Ergo quum fibrarum positiones omnino sint quatuor, musculi quoque utrinque totidem merito fuerunt, à quibus operantibus simul, alvi excrementa, ceu manibus quibusdam cōpressa, fortiter expelluntur, conferente ad id plurimum septo transverso, musculo magno, & rotundo, qui spiritus instrumenta, à naturalibus membris distinguit. Siquidem his superior est omnibus: illis autem subijcitur, existens etiam respirationis organum. Hic musculus, ab ipsius pectoris ora inferiori (unde etiā capita musculorum rectorum abdominis pendent) superioris exortus initium ducens, atque hinc ad fines costrarum notharum utrinque descendens, posteriori parte ac inferiore obliquus admodum fit. Sine hoc igitur musculo, aliorum octo, qui in abdomine sunt, cōpressio, non magis ad inferiora, quàm ad superiora ventris excrementa propelleret. Eius autem cōtractione illorum compressioni accedente, necessum est retrimenta ipsa, veluti duabus cōpressa manibus, applicatis quidem sibi ipsis ad carpum, distantibus verò infernè plurimum, ita deorsum trudi, ut ne tantillum quidem ipsorum sursum ad stomachum remeet. Ne autem unicus existens hic musculus ab octo abdominis multis & magnis in thoracis sinum magnū evertetur, natura in subsidium eius, musculos intercostales construxit, qui thoracem ipsum cōtendere, atque intro contrahere possent. Ne verò inter comprimendum: efflationes contingerent, nimirum larynge aperto, musculos non paucos circumposuit laryngi, quorum alios quidem claudere ipsum, alios verò aperire instituit. Abutitur autem natura ipsis abdominis musculis (quos, ut propugnaculum subjectarum partium existerent, excretionisque instrumenta, construxit) tum ad magnæ efflationis ac vocis generationem, tum ad partem edendum, atque adeò ad spiritus cohibitionem. Porro musculus qui extrinsecus in vesicæ collo consistit, priori quidem ratione, ubi constringitur, pellit quicquid in meatu continetur: posteriori autem, eum claudit: quanquam

Sedis musculi tres.

Octo abdominis musculi. Recti abdominis musculi.

Transversi abdominis musculi.

Obliqui abdominis musculi.

Excrementa alvi à quibus exterminantur musculi.

Septem transversum distinguere spiritus instrumenta à naturalibus membris, existens respirationis organum.

Musculorum intercostalium usus.

Laryngis musculi.

Abdominis musculorum varij usus.

Musculi ad collum vesicæ locati, usus duplex.

Vesicā claudī posse absq; musculo. Vreterū obliqua insertio nis usus.

Fibra quā quibus actio nibus servi-ant.

Collū vesicae situs.

vesica ipsa claudī etiā sine musculo possit, quum prāterquam quōd meatum habet angustum, omnis etiā ei fibrarū species insit, ut ventriculo atq; matrici. At verō, ne quid denuō à vesica sursum ad renes remeet, facit ipsorum ureterū obliqua in vesicam insertio: ne verō continua fiat urināe excretio, prāstat fibrarum ipsius vesicā varietas, sed obliquarum prācipuē. Quum enim omnes intendit, undiq; circum ea quā continet, vehementer astringitur, donec supra modū referta, gravetur pondere. Quum verō excretioni accingitur, cēteras quidem fibras laxat, solas autem intendit transversas. Quo tempore musculi quoq; suppetias ferunt: is quidem qui ad meatū est urinarium, suum ipsius principium, quo vesicā adnectitur, laxans: tensi verō omnes abdominis musculi, ut intrō propellant vesicam, & comprimant: contractusq; postremō vndiq; ille idem qui circum collum est, premensq; foras id lotii quod in meatum subierit, atq; ipsam deniq; excretionem accelerans. Subest autē vesicę collum, ipsius pubis ossibus: subjacentq; ei infernē, rectum intestinum, os sacrum, atque in fœminis collum similiter uteri: quo loco omni, secundū animalis longitudinem fertur deorsum, quousque extra ossa emicuerit. Inde aut secundum peritonæū fertur sursum, usq; ad virgā virilis exortum: post, hinc rursus per ipsam virgam, instar S. Romanæ literæ, obliquum. Sed in mulieribus unicam habet meatus hic in collo vesicæ flexionem: in viris autem secunda, veluti auctuarium, accessit. Ne quid igitur in ipso subsisteret, musculus ille multis transversis prāditus fibris, circumfusus est, qui simul urinam à vesica ad pudendū usq; deducat.

GALENI PERGAMENI de vsv partium, Lib. VI.

Thorax quid.

Pisces esse omnes mutos, quod careant pulmone.

Pulmo vocis & respiratio nis est instrumentum. Respiratio cordis causa est inventa.

Inspiratio nis usus.

Expiratio nis usus.

Cor dilatātū trahit.

Vocis materia.

Pulmonis usus.

Quod à costis utrinq; circūscribitur, pertinetq; anteriore quidē parte ad pectus, ac septū transversum, decumbit verō posterio ad spinā, hoc omne spatiū medici appellant thoracem. In cuius amplo sinu, piscibus quidem cor solum continetur: ob eamq; causam genus ipsorū universum est mutū, quod pulmone ad vocis generationē necessario instrumento careat. Nam omnibus, quā aērē inspirant, animalibus, ac rursus ipsum ore expirāt, pulmo implevit thoracis capacitātē, ut qui vocis simul ac respirationis instrumentū existit. Cāterum à thorace illi motus initiū accedit. Porro usus respirationis in animalibus, cordis causa est inventus, & quod ipsum aëris substantiā requirat, & quod simul etiā calore effervescens, uti refrigerio desideret. Ac refrigerat ipsum inspiratio quidem, frigidam ei qualitatem affundens: expiratio verō, quod in ipso fervet & quasi combustum & fuliginosum est, ex eo profligans. Atq; attrahit quidem dilatatum, inanitur verō, contractum. Ipsum autem quod ceu inutile expirandum erat, materia vocis efficitur. Trahit igitur cor aërem externum, non protinus per fauces: sed utriusq; medium pulmonem, quasi spiritus promptuarium quoddam statuit natura, qui ambabus si-

mul actionibus servire posset. Nam si cor dilatatum ex faucibus traheret, rursusq; astrictum in illas aërem emitteret, eundem esse concentum respirationis, & pulsus cordis, esset necesse: id quod certē nō solum ad perfectē vivendum, sed ad vivendum etiā incommodaret. Nam nec verba diu continuare possemus, nec mergi in aquam, metu suffocationis, nec deniq; sine inspiratione fumum, aut pulverem, aut pestiferā aliquam aëris qualitatem percurrere. Unde necessum esset, vel aērē pestilentē intempestivē inspirare, vel omnino nihil inspirantes, suffocari confestim. Quocirca natura cor ipsum, nō tantummodo respirandi instrumentū fecit, sed ipsi extrinsecus pulmonem ac thoracem circumdedit, qui spiritum illi simul appararent, & vocē animanti efficerent. Quum autem ex pulmone cor spiritum ducat, eumq; rursus in pulmonem redat, licitum est nobis aliās voce uti, & quidem diutissimē: aliās etiā nihil omnino spirare, cor de nihilo impedito. At verō pulmonem quidē, veluti subsultus cordis molitudine sua excepturum, thoracem autem, tanquā septum prāvalidum tutelæ gratia, nō cordi modō, sed pulmonibus circumdedit natura. Cor autem in medio omnino thoracis sinu, secundum omnes dimensiones ad æquilibrium consistit, loco quum ad securitatem aptissimo, tum ad æquabilem ex toto pulmone refrigerationem opportunissimo. Existimāt tamen id ad lævam regionē situm, ob sinistri ventriculi pulsationem, quā circa scutistram mammam sentitur. Verū ad eius dextram, ventriculus etiam alius existit, ad venam cavam atq; hepar conversus. Totus autem thorax secundum mediam sui longitudinem, à validis quibusdam membranis (quā anteriori quidem parte, ossi pectoris: posteriore verō, spinæ vertebrae inferuntur) in duos ventres distinguitur: ut si fortē magno vulnere in alterutram eius partem accepto, respirationis munus eius partis perierit, reliquus venter incolumis, dimidiū saltem actionis retineat. Nam si uterque venter confossus fuerit, voce simul & respiratione planē destituetur animal. Ad hæc verō, arteriæ quæ in ipso thorace sunt, & venę, & nervi, & œsophagus, ac deniq; totus pulmo colligantur toti thoraci, tegunturque omnia, hisce membranis obducta. Ne autem vena cava (quam necesse erat per medium septum transversum sursum ad cor ascendere, atque inde rursus ad nuncupatum jugulum) à respirationis organis, quæ in assiduo motu versantur, quicquam collideretur, dictę etiam tunicę prāstant, quæ tum illam, tum germina illius, adjacentibus particulis colligant, ac totam tunicę molem robustiorem efficiūt, ipsam venam sursum veluti manu dicentes. Auxilium autem eius venę partibus singulatim paratum, est triplex. Nam in medio quidem thorace, cor porrigit illi fortem productionē atq; nervosam, tanquam dextram quandam. Parte verō inferna quintus pulmonis lobus (qui in dextra parte consistit, quiq; propter eam duntaxat venam, quæ per dextrum latus ascendit, excogitatus est) sensum illi excavatus subijcitur. Superna deniq; maximum & molliissimum adena, quem vocant thymon,

Respiratio nes et pulj non servan eundem concentum.

Cor respiandi instrumētum.

Cor trahit ex pulmone spiritum.

Thorax luti murus est cordis pulmone situs.

Cor in thoracis medio æquilibrium locari.

Cordis & sinistri b.

Thorax in duos ventres distinguitur.

Vene cave securitas.

Pulmonis quintus lobus cuius gratia comditus.

mor.

e cave
ressus
superiorandulis
qua uta-
natura.phagi si-
fus.teria ma-
progres-teria ma-
nam ori
sinistro cor
ventricuteria ma-
e inferio-
ram
superiora
ierem.omachi si-
esophagi
scens.esophagi
plantatio
ventricu-
m.is ventri-
li situs.or in medio
nsistens. a
ulmonis lo-
is compre-
endi.

thymon, ipsi natura subdidit. Porro duo magni lobi in utraq; pulmonis parte existunt: quintus verò ille parvus, in dextris, venæ cavæ gratia, à transverso septo usq; ad cordis aurem pertingit. Hinc autem altera quidem pars venæ cavæ in ipsum cor inferitur: altera verò, eademq; major, rectà ad jugulum fertur, deducta quadantenus à productionibus cordis, deinceps adene, quem thymon vocant, invecita. Id verò naturæ est perpetuū, ut quoties sublime vas aliquod dividit, ibi mediam glandulam, divisionē oppleturam, interferat. Sunt autem hoc in loco venarum germina maximarum, ad scapulas, & brachia, & mammas pertinentium: quibus ad munimentum & firmitudinem, ex prædictis glandulis natura commoditatem maximam conciliavit. Cavæ autē venæ, opposita ductus via, œsophagus descendit, per quem ad ventriculum cibus ab ore delabitur. Ipse igitur spinæ vertebra junctus & colligatus, totum ita permeat thoracem, quodammodo oblique positus, tutissimamq; sedem sortitus, ut neque ipse spiritus instrumentis aliquod negotium facessat, neq; ab illis etiam quicquam lædatur. Per medias enim ad perpendicularum quatuor vertebrae dorso extensus, ubi ad quintam pertingit, deerat quidem à recto cursu, digrediturq; ad dexteram, ut sedem præbeat meliorem, ac cedat instrumento magis præcipuo, maximæ omnium arteriæ: quæ ut firmitudinem nanciscatur, per viam omnium brevissimam, à corde ad illum spinæ locum se recipit. Hanc enim, ex sinistro cordis ventriculo exortam, in totum autem animantis corpus distribuendam, æquum fuit primum quidem in duas partes impares dividi, earumq; esse multo maiorem, quæ deorsum fertur, quod totius animalis partes, quæ subijciuntur cordi, multo plures superioribus sint, ac majores: deinde per optimam vertebrarum partem ferri. Atq; invehitur quidē ipsa arteria mediis vertebra: non tamen imperiose admodum, ne superflue stomachum deprimat, sed paululū quidem & ipsa cedens, ipsum recipit & admittit socium vertebrarum sedis. Ventriculi itaq; stomachus, quatuor quidem thoracis primis spondylis præteritis, propter reliquos octo, ad dexteram fertur. Cum primum verò septum transversum contigerit (quod est sanè ora inferior thoracis) membranis fortibus admodum sublimē elatus, supra magnam rursus arteriam transit in alteram partem: quo loco præter lapsus septum transversum, ori ventriculi inferitur: sublimis quidem, ne in asperiores ciborum transitu arteriam comprimat: in lævam verò declinans, quod eo in loco satius fuit constitui os ventriculi. Adde huc, quod nervis, qui à cerebro in ventriculum juxta stomachum deferuntur, obliqua via multo tutior futura erat, quàm recta. * Molles enim quū sint hi, & tenues, si longo intervallo secundum rectitudinem tenderentur, habentes ventriculum à seipsis suspensum, quē subinde impleri cibo oportebat, utiq; disrumperetur facile. Cōstat igitur jam ex dictis, cor in medio thorace oportuisse locari, pulmonesq; ei undiq; circumfundi, suis lobis, ceu digitis quibusdā in orbem id cōplectentes: utriq; ve-

rò extrinsecus circumdatū esse thoracem. Est autem cor non rotundum, sed turbinatum, ex basi cuius, ceu parte aliarum omnium principalissima simul atq; tutissima, ipsa vasa exoritur. Quæ verò ex utraq; parte cōsequuntur ad inferiorem finem, quasi latera quædam, ventriculorum generationi sunt destinata. At ipse finis inferior, processus quidam est fortis & densus, qui veluti operculum ventriculorum, propugnaculumq; totius cordis existit. Atque hæc quidem cordis pars, si cum aliis eam conferas, longè abjectissima est. Etenim quum triplex sit partium utilitas: aut enim refertur ad vitā ipsam, aut ad comodiorem vitam, aut ad horum duorum conservationem: quæ sanè ad vitam ipsam particulæ conferunt, & principes sunt habendæ: reliquorum verò duorum generum, à primi generis præstantia discedentium, & minus aliis discere sunt putandæ, quibus hæ principes facile compatiuntur. Quum igitur cor caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons quidam ac domicilium sit, omnis eo modo ipsius pars princeps dicenda fuerit: at magis hæ, quarū usus toti animali vitam conservat: id quod faciūt duorū vasorum orificia in sinistro ipsius ventriculo, quem medici spirituosum appellant. Horū enim duorum orificiorum, per minus quidem cor ijs, quæ in pulmone sunt, arteriis: per majus autem, omnibus quæ in toto animali habentur, continuū est. Minus autem his præcipua sunt ea quæ in altero ipsius ventriculo, quem * sanguificum vocant, insunt. Sunt tamen quàm alia hæc quoq; præstantiora: quorum alterum quidem, sanguinem in ipsum cor intromittit: alterū autem, ex ipso in pulmonem deducit. Atq; ob magnitudinem duorum vasorum, cor ea parte fuit adeo magnum, & in media regione thoracis situm. Cor autem ipsum est caro dura & ægrè patibilis, multiplicibus fibris conflata: quo nomine à musculo differt. Musculis siquidē unū tantum inest fibrarum genus, rectarū scilicet aut transversarum. Utrasque autem cor, & præter illas, etiam obliquas soritur, duritie, contentione, & patiendi difficultate plurimū ab aliis omnibus differentes, ob actionis continuitatem, & vehementiam, in qua semper cor ipsum versatur. Porro singuli musculi, singulos habent ac simplices motus, ob idq; multiplici fibrarum varietate nō egent, quemadmodum cor, ventriculus, matris, atq; vesica utraq; Quippe horum singula, rectis quidem fibris attrahunt, excernunt transversis, retinent autem simul omnibus cooperantibus. Quarum omnium actiones in corde ipso, vel jamiam ab animali avulso, ac pulsante adhuc, vel detecto per anteriore regionem pectoris, contemplari licebit. Nam quū rectis quidem fibris contrahentibus se, reliquis autē diductis & laxis, contractior sanè fuerit facta longitudo, laxior verò universa ipsius latitudo, hoc statu cor totū videbis dilatari. Contra autem relaxantibus se ijs quæ sunt secundū longitudinem, contractis autem quæ sunt secundum latitudinem, eo casu rursus contrahi ipsum perspicies, ac de primi. Medio porro inter has moriones intervallo, exigua quædam quies intercedit, corde quidem

Cordis figura.

Cordis vasa ori ab illis us aliarum partium principalissima.

Cordis partes.

Utilitas partium triplex.

Particula principes quæ dicantur.

Cor esse caloris fontem.

Sinister cordis ventriculus.

Sinistri cordis ventriculi orificia duo.

Dexteri cordis ventriculi orificia duo.

Cordis caro qualis.

Musculis inesse unum tantum fibrarum genus.

Cor sortiri omnia fibrarum genera.

Musculis singulis inesse singulos & simplices motus.

Fibrarum actiones varias.

Cordis dilatio quado fiat.

Cordis contractio quando fiat.

Cordis quies accidit, obliquis operantibus fibris.

dem circa ea quæ continet, undiq; ad unguè astricto, fibris autem tunc agentibus omnibus, & earum maximè obliquis. Adjuvant autem, imò totam ferè contractionem efficiunt, quæ in intimis ipsius cordis ventriculis nitidissima ligamenta tenduntur, desinentia in illud, quod interjacet inter ipsos ventriculos, septum. Ob eam igitur causam, tum fortia ligamenta, tum omne fibrarum genus cor habuit, ut facile dilatetur, quando quod naturæ suæ est accommodatum, trahere appetit: astringatur verò undiq;, quando ijs quæ traxerit, frui tempestivum fuerit: contrahatur deniq;, quando superfluis excernendis sese accinxerit. Iis ergo quæ aërem per fauces, nares, & os inspirant, pulmo, & dexter cordis ventriculus inest. Reliquis verò omnibus neque pulmo est, neq; ad dextram cordis partem latitudo ulla. Duo enim hæc necessariò unà cū pulmone intereunt, animalis vox, & cordis dexter ventriculus. Nam dexter quidem ventriculus, gratia pulmonis est factus: pulmo verò, respirationis simul & vocis est instrumentum. At utilitas vocis piscibus rectè nulla est, ut qui in aqua degant: sed nec respirare ipsis quidem licet per fauces, quomodo ne nobis quidem ipsis, si in eam mergamur: respirant tamè per branchias aëri & vaporibus pervias, constructio quarum ipsis vice pulmonis est. Natura etiam frigidiores sunt pisces, quàm ut ipsorum cor magna refrigeratione indigeat: utpote exiguo sanguine præditi. Cæterum quæ aquatilia multum sanguinis possident, ut delphinus, vitulus, balæna, hæc omnia aërem inspirant quodam incredibili modo, quem aliquando exponemus. Iam verò pro eo spiritu quem cor à pulmone recipit, in illum per arteriosam venam à suo dextro ventriculo etiam sanguinem mittit, mutuam ei gratiam referens. Commutavit autem in pulmone natura ipsorum vasorum tunicas, venam quidem faciens arteriosam, venosam autem arteriam. Siquidem in solo pulmone arteria quidem venæ, vena autem arteriæ habuit tunicas. Etenim in toto animalis corpore satius fuit sanguinem quidem, utpote crassum & gravem, tenui ac rara: spiritum autem, nimirum tenuem & levem, densa & crassa concludi tunica: ut videlicet hic quidem facile efflueret, ille autè æquè distribueretur. In pulmone autem diversa ratione construxit vasa natura. Quum enim pulmo ex se omnino motus expers, moveatur ad ipsius motum thoracis: ac venas quidem ipsas, quod sint veluti promptuarium cibi, non conveniat eo motu moveri, sed pulmone largiri purissimum sanguinem: arterias autem, ceu receptacula spiritus, omnino necessum sit, facile quidem repleri, inspirantibus nobis celeriter verò vacuari, expirantibus, & loquentibus: ob id sanè commodum fuit, his quidem molle, illis verò durum corpus efficere: siquidem has promptè obsequi utriusq; thoracis actionibus, illas verò prorsus nihil eis obedire, præstiterat. Qua ex constructione contingit, ut quum pulmonis corpus leve ac rarum existens sanguine vaporoso & tenui nutriri indigeat (non autem, quomodo jecur, limoso & crasso) foveriq; exuberantissimo spiritu: per angusta quidem ora i-

psius venæ arteriosæ, quam tenuissimum sanguinem: per laxa verò venosæ arteriæ, copiosissimum recipiat spiritum. Quare nutriendi ratio pulmone planè contraria est, ac cæteris omnibus partibus, quemadmodum & substantia corporis. Maximas autem venas in eo natura construxit, ut quantum propter tunicæ crassitudinē justæ nutritioni detrahitur, id magnitudine ipsarum expleatur. Arripit autem violenter pulmo dilatione sua, vel ex densissimis instrumentis, etiā aliquid nutrimenti, quod vehementi calore suo in minimas partes comminuit. Porro quum venæ illæ arteriosæ, ob tunicarum diversitatem à cava oriri non possent, sicuti neq; ipsarum adnata: reliquum fuit, ut à dextro cordis specu orirentur, unde sanguinem elaboratum à corde ad ipsos pulmones transvehunt. Enim verò ut à thoracis motu non vinceretur vena arteriosa, consonū fuit illius ori membranas quasdam adjunctas esse, quot, & quales nunc sunt: sine quarum præsidio, in contractione pulmonis, ille sanguis semel ad ipsum missus, rursus reflueret ad cor, ne liceret sic arterijs & venis ex se invicem sanguinem spiritumq; transumere per anastomoses ac oscillorum adaptiones, quæ lex in corpore universo observatur. Nunc autem reditu ipsius sanguinis, per os magnum venæ intercluso, dū undiq; ipsa vena cōprimatur, destillat quipiam per exigua illa orificia in arterias. Quamto, igitur thorax contendit vehementius, sanguinē per contractionem versus cor exprimens, tanto membranæ exactius os ipsius venæ claudunt. Quippe ab interiore parte extrā emergentes, totumq; orificiū in orbem ita obsidentes, ut si tensæ omnes atque erectæ simul fuerint, unius magnæ totum orificiū obturantis speciem referant, ab ijs quidem quæ ab internis extra erumpunt, eversa, & extrorsus ad tunicas ipsius venæ decedentes, transitum ipsis, adaperto ac plurimum diducto orificio, facile dant. Quod si quid extrinsecus intrò feratur, hoc ipsum cogit ita membranas in unū, ut ex eis quandam veluti portam ad amissim clausam cōstituatur. In omnibus itaq; vasorum à corde proficiscentiū orificiis membranæ aliæ alias ascendentes existunt, ut ea, si fuerint tensæ, obstruentes, materias remigrare prohibeant. Proprium autem ipsarum est, educentiū quidem è corde materias, ne amplius ad ipsum remeant: inducentium verò, ne cōtra ex ipso effluant. Cæterum quū sint omnino orificia quatuor, bina in utroq; ventriculo: alterum quidem inducit, alterum verò educit. Quum igitur vena cava simul & arteriosa, in dextrum cordis ventriculum desinant (qui pulmonis gratia fuit factus) per illam quidē trahitur sanguis, per hanc autem emittitur. At verò quæ animalia pulmone carent, ijs solus ille ventriculus inest, qui motum arterijs largitur. Nam ut venæ ab hepate, ita arteriæ à corde originem ducunt. Porro prima agendorum causa, scopus actionis existit. Nam quum plura causarum sint genera, primum quidem ac potissimum illud est, cuius causa aliquid fit: secundum verò, à quo fit: tertium, ex quo: quartum, per quod: & quintū, si vis, secundum quod. Quibus quidem utens opifex, ad optimam

Pulmonis maxima na insint.

Venas arteriosas oriri à dextro cordis specu.

Vena arteriosa oriens membranas quasdam adiacens.

Vena arteriosa adnata membranas tres, intrinsecas & emergentes.

Vasorum membranas propter orificia quasdam membranas efficitur.

Cordis ventriculi dexter fuisse gratia pulmonis factum.

Pulmone carentia animalia habere sinistram tantum cordis ventriculorum.

Genera causarum quinquaginta.

mam specie singula quæ fiunt, effingit: arterias quidem pulmonis, raras: venas autē densas efficiens, propter eam quam diximus causam. Quorum vasorum efformationi, ceu materiam quandam subiecit humidi & sicci miscellam, usus calido & frigido invicē temperatis, tanquā instrumentis efficientibus circa ipsam materiam. Quam in mistione, partim quidem materiæ exiccari a calido constituit, partim autem frigido concre-
 scere, atq; ex horum deniq; mistura, spiritū optimē temperatū gigni: quem postea flatu in latum extendens, diducensq; materiam, cavuum vas ac prælongum effecit, copiosiore quidem materiam affundens, cui melius erat esse crassiori: partem autē, cui tenuiori. Noster siquidem conditor in efformandis particulis, hunc perpetuū scopū sequitur, nempe ut quod melius est, semper eligat. Quum igitur quatuor in corde sint orificia, tres quidem singulis aliis insunt membranae, duæ autem duntaxat arteriæ venosæ. Oriuntur sanè omnes ex orificiis ipsis: unde profectæ, aliæ quidem intrò progrediuntur in cordis ventriculos, ad quos etiam ligamenti fortibus annectuntur: aliæ verò foras vergunt, quæ primum utrunq; vas è corde emergit. Sunt itaque in vena arteriosa, quæ alit pulmonem, membranæ tres intus foras spectantes, quas à figura literæ *α* *α* *α* figmo^{des} appellant. In ea autem vena quæ sanguinem introducit, tres quoq; foris intrò pertinentes insunt membranæ, sed quæ multum crassiores, robore, ac magnitudine illas anteeant. Præterea etiam orificio illius maximæ arteriæ, quæ à sinistro ventriculo orta, principium est arteriarum omnium, tria quoq; membranarum *α* *α* *α* intus foras vergentium adnata insunt. Reliquum verò arteriæ venosæ, quæ in pulmone distribuitur, orificium, duarum membranarum foris intrò pertinentiū, habet adnata. Corde igitur dilatato, omnia ipsius ligamenta pertensa, trahunt ad seipsa, & veluti resupinant membranas ad corpus cordis: membranas inquam vasorum inducentium materias. Quibus membranis reflexis, vasorum orificia patefiunt, ut facillimè possit cor materias ipsas attrahere, nimirum causis omnibus, à quibus celerrima fit materiarum attractio, eodem aspirantibus. Nam quod suo loco transfertur, aut trahi ipsum oportet, aut mitti ab aliquo, aut deduci. Quæ omnia simul adsunt materiis, si cor dilatetur. Cor siquidem trahit: mittunt præpositæ ad aures cavitates, atq; ipsa vasa deducunt. Quorum omnium unum est motionis principium, cordis ipsius dilatatio. At aures (quæ sunt adnata quædam nervosa & cava, ante orificia) laxæ quidē reliquo tempore sunt, & idcirco concavæ: quum verò cor dilatatur, eodē quo membranæ modo tenduntur, & contrahuntur, ob idq; materias ex seipsis expressas præmittunt cordi, spiritum nempe ad refrigerationem, sanguinem ad nutritionē illius. Etenim quia vasa quæ materiam cordi suppeditant, si dilatato eo tracta violentius fuissent, quā tenues ac molles habeant tunicas, facili negotio divellerentur: ob id aurium concavitates extrinsecus ad orificia singula excogitavit natura, ut ex illis, veluti ex promptuariis quibusdam,

cor ipsum traheret, citra ullum vasorum discrimen. Utriusq; autem auris substantia tenuis facta est, & nervosa, ut & contrahantur facilius, & etiam tutiores sint ab injuriis extrinsecis. At verò membranarum ipsarum, eas quæ vasis adjacent materias introducentibus, tantò fortiores & majores oportuit esse ijs, quæ inducentibus insunt, quantò major in dilatando, quàm in contrahendo vis est. Ut autē pauciores membranæ tribus minus exactè ac tardius orificia vasorum clauderēt: sic etiam si plures fuissent, imbecilliorē actionē æderent. In solo tamen arteriæ venosæ orificio, meritò sunt duarum tantum membranarum adnata. Solius siquidem huius orificii intererat, ne ad amissim clauderetur, propterea quòd solum ipsum oportebat esse transitū à corde ad pulmones, excrementis fuliginosis, quæ in illo ob copiam innati caloris necessario gignuntur: quanq̃ etiam & per reliqua trium vasorū orificia, aliquid retrò fertur & effluit. Nam quæ ad modū in ipsa aspera arteria fieri non potest, quominus transglutientibus nobis exiguum quiddam humidum transcoletur, sic membranæ illæ non possunt adeò accuratè occludere illorū orificia vasorum, quin ultro citroque aliquid sanguinis & spiritus permeet. Sunt enim omnia in omnibus atque arteriæ quidem tenuem & purum & vaporosum continent sanguinem: venæ autem paucum, eundemq; caliginosum aërem. Simili ratione per stomachum spiritus transglutientibus atq; inspirantibus nobis ad ventriculum permeat: nihilq; est syncerum in corpore, sed omnia commercium habent cum omnibus. Etenim ipsius cordis ventriculus pulsare quidem uterq; videntur, non tamen pari mensura utriq; sanguis & spiritus adest. Copiosior quippe est, in dextro quidem sanguinis, in sinistro autem spiritus substantia: vacuatur tamen sanguis per vulneratas arterias, quem à venis per communionem orificiorū exugunt: ad apertio quorum hic etiā efficit, ut respirationis atq; pulsus utilitas, venis communicetur. Porro cordis sinistra pars admodū crassa est & dura, ut quæ ventriculi spirituosius tegumentū esset futura. Dextra verò tenuis & mollis, simul quidem ut materiis utrobique esset consentaneus locus, simul autem ne cor in alterutram partem propenderet. Quare cor ipsum, in medio illius duræ tunicæ (quam *περικαρδιον* appellant) rectè firmiterque libratur. Quæ tunica ex capite ipsius amplissima exoriens, postea secundum figuram eius paulatim in mucronem contrahitur, veluti vallum quoddam ac domicilium ei circumjecta, tantumq; inter seipsam & cor spatii circumscribēs, quantum cordi dilatato suscipiendo erat satis. Est autem substantia ipsius tunicæ mediocriter crassa & robusta, ut neq; collidatur, neque etiam pulmones lædat. Cæterum quo tempore cor dilatatur, membranarum radices trahens, aperit quidem orificia vasorū intromittentiū materias, claudit autem educentiū. In universum autē leviora omnia expeditius obsequuntur trahentibus. Iam verò quæ in corde apparent foramina, pertinentia potissimum ad medium ipsius septum, prædictæ communionis gratia extiterunt. Est autem animalis

Aurium cordis substantia.

Arteria venosa orificio cur duarum tantum membrana adnata.

Omnia esse in omnibus.

Syncerum nihil in corpore.

Cordis ventriculus uterq; pulsare videtur.

Venis communicari pulsus & respirationis usum.

Cordis sinistra pars cursu crassior et durior dextra.

Pericardij substantia.

Leviora expeditius obsequuntur trahentibus. Septi cordis foramina.

Animalis spiritus est exhalatio benignissimi sanguinis.

Arteriis cur tunica duplex.

Cordis vasa quæ maiora minoraq.

Cor egebat crassiori alimento, quam sit spiritus.

Similibus unumquodq; nutriti.

Cor à qua & na alatur.

Nervus nullus in cor distribui, neq; in hepar, renes, lienemq.

Cor nullâ actione animalem sortitur.

Hepar animalis appetitoria sedes.

Cor principium irascibilis facultatis.

Cordi quale os insit.

Cordis os ad quid utile.

Fœtus in utero dispensatio.

malis spiritus, exhalatio quædam benignissimi sanguinis. Quare merito sanguis purus & tenuis continetur in ipsis arteriis, utpote qui animalis spiritui sit alimento futurus. Ob cuius tenuitatem spiritus, necnon propter motum perpetuum, valida & duplici tunica fuit ipsis arteriis opus.

Ad hæc, quæ vena in cor infigitur, major ea est, quæ ab eodem in pulmones inseritur, quum nimirum vehat sanguinem, qui per hanc defertur in illos, & qui in sinistrum cordis specum ad gignendos spiritus vitales transmittitur. Ad eundem autem modum arteria etiam, quæ ex pulmone ad cor perducit spiritum, multo minor est magna arteria, quod hæc quidem à dextro ventriculo aliquam sanguinis portionem assumat, omniumque arteriarum, quæ toto animali insunt, sit futurum principium. Quia verò corpus

ipsius cordis crassum erat ac densum, alimentumq; egebat crassiori, ob id sanguinem ducit à vena cava, quo nutriatur, priusquam ea ad cor immigret. Cor itaq; pulmoni alimentum præparat, sibi autem nequaquam. Quum enim quale est

unumquodq; tali ipsum nutriri alimento oporteat, jure optimo cor quidem crasso, pulmo autem vaporoso sanguine indiguit. Quæ causa est, ut cor non alatur ex seipso, sed priusquam vena cava dextro inferatur ventriculo, pars eius tanta, quanta cordi nutriendo erat satis, se juncta circa cordis caput, extrinsecus obvolvatur, & in omnes ipsius partes disseminetur: cum qua etiam tanta arteriæ magnæ portio dispergitur; quanta ad prædictam venam refrigerandam, conservandamq; probum temperamentum caloris innati externarum cordis partium, esse videbatur sufficiens. Nullus autem videtur nervus in cor distribui, quemadmodum neque in hepar, renes, lienemq;. Solum namque pericardium propagines tenuium nervorum recipit: à quibus divisus, sensibiles alias ac manifestas in cordis ipsius tunicâ etiam inferi, in majoribus saltim animalibus, constat. Quemadmodum enim musculis omnibus, quod actionis animalis instrumenta essent, magnis nervis fuit opus: ita & cordi nullam actionem animalem habenti, tantis nervis opus fuit, quantis prædictorum viscerum singulis: addam etiam et pulmoni. Communiter enim omnia hæc, ne sensu omnino carerent, nervos etiam habuerunt: privatim autem inter ea hepar et cor, quod illud quidem animæ appetitoria, hoc autem irascibilis esset principium. Ad hæc, in magnorum

quidem animalium corde, os quoddam reperitur cartilagineum: in exiguis verò admodum, corpus ex cartilagine & nervo conflatum: quod quidem tum ad ligamentorum principia tutius colliganda, tum ad totius cordis firmitatem, est constitutum. Hæc igitur sunt in perfectis jam animalibus cordis particula. In ijs autem quæ adhuc formantur in utero, animadvertens natura pulmonem, qui neq; absolutus est, neq; motu præditus, non eandem postulare dispensationem, atq; is qui perfectus quum sit, movetur etiam, unum quidem vas validum, crassum & densum, ad arteriam magnam: alterum verò, imbecillum & tenue, & rarum, ad venam cavam anastomosi applicuit. Quum igitur arteriam magnam, ad

crassum illud ac densum pulmonis vas, ad tenue verò & rarum venam cavam per anastomoses *aperuisset, pulmoni quidem utrasque materias justè largita est, & cor nihilominus à pulmonis servitute liberavit. Quocirca non oportet mirari, si quum in illis nec sanguinem, nec spiritum mittat pulmonibus cor: nec totius corporis arteriis suppediter, ut in perfectis: ad solam propriam vitam quam paucissimo indiguerit spiritu, quem maximè etiam, ut opinor, ex ipsa magna arteria ducere poterat. Quinetiam licuit cordi per id orificium, cui soli tunicas duas foris intro pertinentes diximus adhærescere, ex pulmone sanguinem ac spiritum sibi mista attrahere. Vas siquidem hoc in fœtibus ex cava quidem vena sanguinem per quandam memorandæ magnitudinis anastomosin recipit: quum sanguis aliàs in perfectis quidem, ex sanguineis: in fœtibus verò, ex spirituosius instrumentis sumatur. Etenim si fœtu adhuc utero matris hærente, per ipsius matricem penetrando, arterias quæ in umbilico sunt, vinculo exceperis, quæ in secundis sunt arteriæ omnes, pulsu destituentur, quum tamen quæ ipsi embryo insunt, adhuc pulsant. Quod si venas etiam quæ sunt in umbilico laqueis complexus fueris, haudquaquam quæ in embryo sunt arteriæ amplius pulsaverint: quod videlicet vis illa quæ movet secundarum arterias, à corde ipsius fœtus proficiscatur: à venis autem per anastomoses arteriæ recipiant spiritum, à quo calor natus, saltem aliquantisper, servari potest. Fieri igitur potest in corde, ut ex vase sanguinem continente, commodum aliquod calori, qui in sinistro eius ventriculo est, accedat, cuius causa animalia & respirant, & pulsibus egent. Cor itaque non modo in perfectis animalibus, sed in fœtibus etiam, vim illam arteriis suppeditat, qua moventur: non tamen ipsas ceu utres flatu replet aut inflat. Non siquidem ob id dilatantur quod implentur arteriæ, sed quia dilatantur, implentur. Porro natura, quemadmodum venam illam quæ ab umbilico pertinet ad jecur, & arterias quæ sunt ad spinam, tandem exiccat, & veluti funiculos quosdam tenues efficit, ad eundem modum & prædictas, quæ ad cor pertinent, vasorum anastomoses, in animali jam nato abolent: quæ usui animalibus in lucem æditis futura non sunt, ea ne esse quidem permittens.

GALENI PERGAMENI de usu partium, Lib. VII.

Cæterum quæadmodum hepar, sic etiam pulmo, quæ plurimis est vasis cõtextus: quorum intervalla molli carne replentur. Vasorum porro ipsius proficiscuntur, hoc quidem ex sinistro cordis ventriculo, illud autem ex dextro: tertium deniq; ex faucibus. Deinde illinc progressa dividuntur in quatuor lobos pulmonis. In quintum autem lobum (quum parvus sit, ac veluti substericulum venæ cavæ, in dextra thoracis regione) propagines quædam exiguæ, à vasis in lobum magnum illi propinquè distributis, disseminantur. Ambit autem lobos omnes extrinsecus tenuis quædam membrana, portiones quædam eorum.

Cor in utero accipere spiritum à magna arteria.

Secundariæ arterias matris. Veri à corde fœtus delinquit uterum. Arterias matris per anastomoses recipere venarum spiritum.

Arteria in plethura, quia dilatantur, non dilatantur, quia implentur.

Inutilia animalis naturæ ne esse quædam permittit.

Pulmonis sinus unde oriuntur.

Pulmonis quintus lobus.

Pulmonis tunica.

eorum nervorum, qui juxta stomachum infernè ad ventriculum tendunt, accipiens. Porro tertium illud vas, quod à faucibus in pulmonem descendit, quodq; aspera arteria, ne non bronchus dicitur, ex corpusculis quibusdam cartilagineis circularibusq; conflatur, per totam longitudinem colli optimè inter se ordineq; singulari compactis. At verò, qua parte contactura subiectum erant stomachu hujusmodi corpora, amplius cartilaginea non sunt, sed C. Latinam iteram referunt, ut videlicet cibus qui deglutiuntur cedant. Vestit autem intrinsecus ipsam arteriam asperà, ejusq; partes omnes subungit, quædam unica penitus circularis, densa simul & solida, fibras habens secundum longitudinem rectas: ac breviter, continua illi, quæ ab ore in ventriculū ducitur. Quare per hanc membranā dū animalia deglutiunt, cartilagine cum larynge ad ipsas fauces trahuntur. Extrinsecus etiā alia circumducitur tunica, veluti totius asperæ arteriæ non vulgare indumentū. Per hanc igitur arteriā asperam, quæ in omnes pulmonis partes est distributa cum vasis quæ à corde proficiscuntur, inspiratio & exspiratio, vox & efflatio perficitur. Atque hoc solum in pulmone vas omnino vacuū est sanguine, quandiu animal secundum naturā se habet. Fuit autem instrumento vocis omnino cartilagine opus, quū molliora quàm pro ipsius natura præ imbecillitate aërem remissius percutiant: duriora autem, facile ipsum evertant, sic ut fluere potius, quàm percuti aër ipse videatur. At cartilago est simplex quædam particula, ut aliarum omnium durissima, sic osse duntaxat mollior, ob idque ad elidendam vocem instrumentum aptissimum. Non est autem ex una simplici cartilagine & sola, constituta aspera arteria, sed membranosam quoq; assumpsit substantiā, quæ circulares ejus annulos colligat, ut per animalis inspirationes, expirationesq;, facile possit tum dilatari, tum contrahi, atque etiam longior, & brevior reddi. Siquidē mutationes pulmonis in longitudinem ac brevitatem, à ligamenti cartilagine inter se connectentibus, tensis quidem per inspirationes, per expirationes autem laxis, atq; in se concidentibus, proficiscuntur: incrementum verò in latitudinem & concidentiam, ab iis quæ interrupta annulorum complent, gibbis quidem factis extrorsum per ipsas inspirationes, laxis autem per expirationes, procedit. Ac proinde cartilagine ipsæ, vocis sunt instrumenta: quæ verò eas ligamenta conjungunt, respirationis. At pars illa quæ cum faucibus asperā arteriā connectit, & quæ sursum nobis transglutientibus fertur, cuiq; vocem aspera arteria præparat, larynx vocatur: qui totus cartilagineus existens, primum & principalissimum vocis est instrumentum. Quanquam vocem ab ipso æditam, palatum, veluti refractoriū quoddā, & columella, tanquam plectrum, adaugent. Porro ipsius vocis materia exspiratio est, à thoracis musculis facta. Pulmonis itaq; propria particula est hæc arteria, qua meritò pisces caruerūt, atq; etiam pulmone, quod ne voce quidem egerent, utpote in aquis degentes. Erit igitur ipsa aspera arteria respirationis simul & vocis organum. Artifi-

ciosè autem natura cartilaginofam quidem partem arteriæ, ad anteriora colli: carnosam verò, qua stomachum contactura erat, ad posteriora convertit, ne facile afficeretur, stomachus quidem ab ipsa arteria, hæc autem rursus ab injuriis extrinsecis. Quare quum alio quidem tempore respiratio, alio autē transglutitio fiat, (nunquam enim simul contingunt) mutuis vicissim capacitatibus arteria stomachusq; utuntur: adeò ut tempore exiguo plurima, per utrosq; meatus, feratur propria materia. Ob idq; constructum est rotundum utrunq; organum, ut per locum minimum plurima pervadat materia, utq; utrunq; ab injuriis sit tutius. Enimverò tunica illa (quam diximus) obtenditur internæ parti ipsius asperæ arteriæ, ut destillationes tum cibi tum potus, nec non fuliginosi spiritus, atq; etiam humorū acriū (quorum omnium delapsus prohiberi interdum non potest) excipiens, cartilagine ejus tueatur. Quarum quidem affectus aut insanabiles sunt, aut sanatu quam difficillimi. Ac ipsius tunicæ incommoda facile refarciuntur: nisi fortè aliquando à magna putredine, ipsius portio quædam erosa, cartilagine penitus destituerit nudam. Cæterum tenuis simul & densa facta est illa tunica, ut neque fistulæ capacitatem suā mole angustiore redderet, nec facile defluentes succos imbiberet, vocemq; sic efficeret raucam. Melius enim sonant sicca quàm madida. Quia verò si extremè sunt sicca, iis quæ talia sunt moderatè, vocem deteriore elidunt, ob id tunicam quæ cartilaginibus subest, natura mediocriter siccā efficit, utrunq; excessum declinans. Verū nec aspera arteria habet sanguinis copiam quo alatur, antequam venæ quædam à corde ipsi fuerint connexæ: neq; ipsum cor fructum ullum ex respiratione percipit, priusquàm per alias arterias læves, quæ tenuem, purum, & vaporosum continent sanguinem, nec solius spiritus instrumenta sunt, conjunctum & colligatum huic fuerit. Quarum lævium arteriarum oscula, à natura nihil agente temerè, eò commodationis adducta sunt, ut vapor quidē ac spiritui sint pervia: sanguini verò, & crassis similiter substantiis, invia. Quod si fortè aliquo tempore patula, naturalem comoderationē amiserint, portio aliqua sanguinis ex lævibus in asperas arterias effunditur, quem casum repente tussis cōsequitur, & sanguinis per os profusio. Ipsa porro caro pulmonum non solum divisionem vasorū longè tutissimā reddit, sed etiam quemadmodū hepatis caro ad cibi, sic ad aeris coctionē ea fuit comparata: ob idq; mollis, foraminulenta, & spirituosā existit. Non enim confertim nec repente aër quē inspiramus, nutrimentum spiritus animalis evadit: sed paulatim eum immutari est necesse, diuturnioreq; tempore spiritui inhæto familiarem qualitatem acquirere. Cujus alterationis pulmonis caro primum est instrumentum. Spiritus igitur qui trahitur ab asperis arteriis extrinsecus, primum in pulmonis carne conficitur, dein autem in corde atq; universis arteriis, sed in eis precipue, quæ in plexu retiformi consistunt: at ultimum ac perfectissimè in ventriculis cerebri, ubi utiq; efficitur animalis. Cur autē nos ignorantes

Aspera arte-
ria cartilagi-
num supra.

Deglutitionē
respirationē
que nunquā
eodem tem-
pore fieri.

Aspera arte-
ria membra-
na interna
usus.

Cartilaginū
aspera arte-
ria affectus
sanatu diffi-
cillimos esse.

Aspera arte-
ria tunica in-
terna cur te-
nuis, densa,
& mediocri-
ter sicca.

Sicca quàm
madida me-
lius sonare.

Cor esse colli-
gatum pul-
moni per læ-
ves arterias.

Arteriarum
cordis in pul-
monem oscu-
la.

Tussis quan-
do exciteretur.

Pulmonis ca-
ro qualis, &
quem usum
præstet.

Pulmonis
carnem con-
ficere spiritum
cordis.

Plexus reti-
formis.

Spiritus animalis in ventriculis cerebri. Aspera arteria sita inter venam et laevam arteriam.

planè substantiam animæ, cum animalem vocemus, non est dicendi nunc locus. Fuit autè aspera arteria in medio lævis & venæ locata, quod per mediam quidem lævem, respirationis utilitatem cordi exhibitura erat: à vena autem, necessariò debebat nutriri. Ad hæc, à dorso quidem habet aspera arteria venam: ab anteriori autem parte, arteriam: quia longius à corde producere ipsam arteriā, quæ tenuē atq; imbecillā fortitur tunicā, non erat tutum. Quare illam natura subito à corde ortam, in pulmonem disseminavit. Alterum verò vas quod fortius erat, abduxit longius. Facta est venarum tunica dura, tum quod eas comprimi faciliè ac dilatari in respirationibus non oporteret) ut videlicet ipsa thoracis capacitas spiritus instrumentis esset perpetuò patens: & ne sanguis ad cor ex eis violenter recurreret) tum etiā quod sanguine vaporoso & tenui quàm crasso, pulmonē ali erat melius. Arteriarum contra tunica est rara, ut liberalius pul-

Venis arteriosis cur tunica dura tributa sint.

Arterijs venosis cur tunica rara sint. Respirationis usus.

Arterias laeves insertas esse cordis sinistro ventriculo.

Fuliginē cordis expelli in systole per laeves, & per magnam arteriam.

Pulmo ad thoracis motum movetur.

Pulmonis vas quo ordine proprijs materijs impleantur.

Spiritus trahi à corde in diastole, expelli in systole Cordis motus à natura.

Thoracis motus ab anima.

Respirationem esse arbitriam.

mones foveāt suo tenuissimo sanguine, cordiq; trahenti spiritus, longè facilius cedant. Quum itaq; usus respirationis primus & maximus sit, ut caloris symmetriam conservet: secundus aut nec minor, ut nutriat animales spiritus, tum ad hæc, tum ad vocis generationē, pulmonē accommodavit natura. Applicuit autem omnes arterias læves sinistro cordis ventriculo, in quo caloris nativi est principii, perennē illi refrigerationem hinc comparans. At verò quod fuliginosum ac humidū in ipso corde est, in illius compressionibus per has ipsas læves arterias explodit, multoq; adhuc magis per magnam arteriam ad alias. Pulmo igitur totam implens thoracis capacitatē, ad ipsiusmet thoracis motus movetur. Cōsequutione aut ad id quod vacuatur, prius semper leve quàm grave, attrahentia instrumenta sequitur: quæ pampula orificia multò facilius implentur. At asperarū arteriarū omnium unū est maximum os, pertinens ad pharyngem: lævium autem aliud unum ad sinistrum cordis ventriculū, ut venarum etiam ad dextrum. Sed ex pharynge quidem, aer solus ad arterias asperas, ex dextro ventriculo sanguis solus ad venas: ex sinistro, mixtū quid ex ambobus pervenit. Pulmone igitur dilatato, primò quidem externus aer asperas arterias implebit: secundò autem, quod ex sinistro cordis ventriculo effertur, læves: postremò deniq; ac tertio horum omnium, sanguis implebit venas. Antè verò quam asperæ arteriæ repleantur aère, ad quodvis aliorum nihil transfunditur. Fuerunt enim asperæ arteriæ à natura institutæ, ut pulmonem in maximam distensionē agerent. Ac proinde in inspirationibus aer externus in has solas necessariò ingreditur. At spiritus in cor ipsum attrahitur, dilatato eo: quemadmodum rursus compresso, excernitur. At læves quidem arteriæ, cordis motibus: asperæ verò pulmonis, inserviunt. Verum ut cordis motus à natura, sic thoracis ab anima, perficitur: melius siquidem fuit ipsam respirationem voluntati inservire animalis. Jam pulmo nervis minimis præditus, ut totus faciliè dilatetur & comprimatur, in lobos dissectus est, quibus tanquam quibusdam digitis cor accuratè complectitur. Larynx

porrò ex tribus magnis cartilaginibus constat. Larynx tribus cartilaginibus constat, moveturque à proprijs duobus musculis. Scutiformis & prima cartilago laryngis, quàm tertia est: internis partibus, quæ consistit stomachus, positionem habēs. Cæterum quantum maxima deficit à perfecta figura circuli, hoc ipsa perficit. Etenim ubi definit ultima cartilago asperæ arteriæ, ibi primum quidem hæc secunda incipit, omnibus partibus totam illam contingens: hoc est, anteriore, posteriore, & obliqua. Paulò verò supra anteriores ipsius partes cartilago scutiformis incipit: secunda videlicet retrorsum cedente. Articulantur autem & committuntur inter se partibus obliquis. Atq; etiam paulò superius ligamenta quædam membranosa & nervosa, ex prima pertinent ad secundam. Verum ubi minor quæ intus est, definit, duæ quidam superjacent parvæ convexitates. Incipit autem illinc tertia cartilago, quam arytenoidem appellant ob formam vasis, convenientes ad amussim eminentiis illius cavitates habens, adeo ut commissio harum duarum cartilaginū, duplicem dearticulationem efficiat. Est autem strictior, quàm inferna basis, secunda cartilago: ob eamque causam totius laryngis ora infima, quæ asperam arteriam attingit, amplior est superiori orificio, quod in pharynga definit. Atque etiam tertia cartilago in angustum valde & ipsa definit. Conversa autem est hujus quoq; cartilaginis cavitas ad meatum spiritus, ut veluti fistula quædam fiat, quod ex tribus iis est compositum. Parte verò interna, in ipso meatu laryngis, corpus quoddam incumbit membranosum, adiposum & glandulosum, figuraq; linguæ fistule referens. Quod igitur primum in larynge vox efficiatur, quodq; dilateretur plurimum, & comprimitur ad unguem supernum ejus orificiū, alibi demonstravimus: ob quas nimirum motiones necessarium fuit laryngem non ex simplici una, sed ex pluribus simul commissis cartilaginibus confici, motumq; ipsius non naturalem, ut arteriarum, sed voluntarium existere, ad quem perficiendū musculi instituti fuerunt. In animalibus igitur magnā voce præditis, in quibus homo etiam annumeratur, quatuor sunt musculi, qui cum secunda, cartilaginem primam connectunt. Alij vero quatuor in omnibus animalibus sunt, qui secundā tertiæ: & alij duo, qui primam tertiæ committunt. Derivantur autè ex prima cartilagine scutiformi ad secundam, hoc pacto. Secundum finem inferiorem utriusq; cartilaginū, ubi tracheam arteriā, & se invicem tangunt, ex magna cartilagine perveniunt ad secundam, extrorsum quidem duo musculi, introrsum aut duo, utraq; parte externi externis, & interni internis omnino æquales. Hi igitur exactè coarctāt, angustāq; efficiunt oram laryngis infernam, primam cartilaginem secundæ simul applicantes. Alij verò quatuor, qui secundam cum tertia jungunt, finem

Larynx tribus cartilaginibus constat, moveturque à proprijs duobus musculis.

Scutiformis & prima cartilago laryngis, quàm tertia est: internis partibus, quæ consistit stomachus, positionem habēs.

Laryngis cartilago secunda.

Laryngis cartilago arytenoides.

Ligula compositio.

Vocem primum in larynge formari.

Larynx compositus ex simplicibus cartilaginibus constat.

Laryngis cartilagine connectentes musculi.

*Musculi de-
mocommu-
s tribus la-
ngis carti-
ginibus.*

*Laryngis car-
laginibus
esse dupli-
s articula-
ones & mo-
us.*

*Laryngis
musculi de-
m.
Laryngē ali-
partibus
colligantes mu-
sculi, octonu-
gera.*

*Pharynx
principalis-
simum instru-
mentum vo-
cis.*

*Natura est
prior atq; sa-
pientior ar-
te.*

*Ars imita-
tur natura o-
pera.*

*Vox fieri non
potest, nisi
transitus sit
angustior.*

finem laryngis superiorem aperiunt. Quorum qui parte sunt posteriore, cartilaginem arytaenoidem retrò flectunt: ad obliqua verò plurimum diducunt, qui situm ibi habent obliquum. Porro reliqui duo, iis quatuor actionem & positionem contrariam habentes, claudunt ad unguem os supernum laryngis, ad internam capacitatem, primam cartilaginem adducentes. Decem igitur dicti musculi, trium cartilaginum sunt cōmunes: alij verò duo sunt in basi arytaenoidis. Cæterum alij sunt his multò majores, scilicet; scutiformis proprij: quorum duo quidem, ex inferioribus ossis hyoidis lateribus habent originē, indeq; secundū longitudinē omnē primæ cartilaginis producuntur parte anteriore. Alij verò duo, ab ipsa quidem cartilagine exorti, sed ad pectus tendentes, aliis duobus miscentur. Reliqui duo transversī musculi, ex obliquis scutiformis partibus enati, deinde in orbem stomachum cōplectentes, simul inter se cōeunt. Quoniam igitur duplices genere oportebat ipsis cartilaginibus inesse articulationes & motus, alios quidem, qui eas dilatarent, & comprimerent: alios autē, qui clauderent & aperirent: ad priorum quidem motuum constitutionem, primæ ad secundam facta est articulatio: ad secundorum verò, secundæ ad tertiam. At motus alio tertio genere præterea quā minimē egeret larynx, neque articulatione tertia, & proinde neq; particula quarta indiguit. Illi igitur primi musculi decem, in larynge ipso cōsistunt, cum nullo adjacentium instrumentorū connexi. Alij verò octo musculi, colligantes ipsum cum circumfusi corporibus, alterius motus sunt duces, quo nimirum totius spirationis meatus amplificatur, constringiturq;. Quorum qui ab osse hyoide ad partes anteriores ac superiores pertinet, cartilaginē primam trahentes, ac posterioribus eam cartilaginibus abducunt, meatumq; amplificant. Musculi verò obliqui, contrariam his actionem habentes, ac positionem, qui ex scutiformi cartilagine deorsum feruntur, partes cartilaginis inferiores contrahunt trahuntq; infra, cum hoc leniter asperam arteriam contrahentes, & constringentes. Reliqui autem, qui ex obliquis scutiformis partibus prodeunt, has partes primæ cartilaginis protrahunt, secundæq; applicant, quo meatus constringatur. At pharynx, substantia & figura ab aliis corporis partibus differens, principalissimum vocis est instrumentum, linguam alicujus fistulæ referens. Melius autem sit corpus hoc fistularum linguis minimē assimilare, sed eas huic potius: quādoquidem natura & prior tempore, & in operibus sapiens magis quam ars ipsa existit. Quare si corpus hoc naturæ est opus, illud autem quod in fistulis est, artis inventum, nimirum hoc ad illius imitationem ab aliquo sapienti viro excogitatum fuerit, qui intelligere ac imitari naturæ opera potuit. Cæterū quod absque lingua inutilis sit fistula, res ipsa indicat: sicuti etiā vocē fieri nō posse, nisi transitus sit angustior. Etenim ad adedā vocē, opus est motione spiritus, quæ ab infernis repente simul erūpat: necnō angustiori transitu, eoq; non simpliciter, sed qui paulatim quidē ex amplo adstrictius

tendat, paulatim rursus ex strictiori amplificetur: id quod penitus efficit ipsius laryngis ligula, quam epiglottida vocant: quæ non modò ad vocem est necessaria, sed etiam ad cohibitionem spiritus. Nam particulæ ipsius tum dextræ, tum sinistræ, adeò in idem cōeunt, ut sibi ipsi incidāt, claudantq; exactē meatum. In utraque autem ipsius ligulæ parte dextra & sinistra, natura foramen unum, vel potius rimam ac fissuram quandā effecit, cui parte interna ventriculi etiā unū minimē parvum apposuit. Quare à dextris ac sinistris spiritus intrò præterfluēs, nullam habet causam, cur aut rimam ipsam aperiat, aut etiam ventriculum oppleat. At quū pulsus ab internis quidē violenter spiritus fuerit, sed superne, quo minus rectā feratur, inhibetur, ibi refractus, & facto veluti vertigine, ad latera meatus cōvertitur, quibus magna vi incidens, membranas utriusq; fissuræ, ad subjectas usq; cavitates diducit: totam autem opplet ligulam, atque inflat, quam rem subsequitur necessariò exacta meatus ipsius obturatio. Porro corpus ipsius epiglottidos membranosum quidem existit, ut ne ab spiritu impletum, aut à motibus laryngis commotum, rumpatur. Humidum autē simul & viscidum, & quodammodo pingue est, ut propria humiditate, eaq; non facile dissolubili (qualis est unctiosa & viscosa) madeat perpetuò: id quod maximē ad vocem desideratur. Unde neque ij qui ex ardentissimis resiccati sunt febribus, nec qui per magnos æstus fecerunt iter, loqui prius possunt, quā perfusus larynx eis fuerit. Quū igitur musculi laryngē claudētes, qui ipsam quoq; ligulam comprehendunt, quiq; resistūt musculis universis thoracem ipsum contrahentibus, ex media basis scutiformis emergant, recti verò protendantur, tantum spatij parte posteriori atque obliqua circumscribentes, ut proximē terræ cartilaginis articulationē pertineant, necessariū fuit in partes ejus inferiores aliquot nervos inferi. Siquidē musculis omnibus, aut in ipsum caput nervus infigitur, à cerebro, vel spinali medulla facultatē sensificam ac motricem ad ipsos perferens: aut omnino in partem aliquam, quæ sub caput sunt, aut certē non infra mediū corpus, ad caudam verò nunquā: alioqui principium ea esset musculi, non finis. Omnibus autem commune est musculis, ut ad eam partē divisi extendantur, ad quā vergunt ipsorū fibræ. Necessariū est etiam, reliquis quoq; duabus nervorum conjugationibus, à quibus laryngis os referatur, ex parte inferna nervos immitteri. Non tamen æquales magnitudine, aut æquē pollentes robore nervos postulant duo musculi aperiētes laryngē, & alij duo qui eundem claudūt: hi siquidem omnibus thoracis musculis, in spiritus cohibitione obfistunt: illi autem per expirationes eisde obsequium præstant. At verò quū satis constet nervū omnē manare vel à cerebro, vel à spinali medulla, cæteris quidem musculis omnibus, qui ad caput sunt & collum, motus est facilis. Siquidē in eos qui superne feruntur deorsum, à cerebro nervus manifestē inseritur: in obliquos verò, à spinali medulla colli, ex septima conjugatione, quod & ipsa exortum habeat

*Epiglottis ad
vocem & co-
hibitionem
spiritus ma-
ximē necessa-
ria.*

*Ligula fissu-
ra & ventri-
culi.*

*Epiglottidis
corpus qua-
le.*

*Voci necessa-
rium esse ma-
dorem fau-
cium.*

*Musculi om-
nibus inse-
ri nerū aut
in ipsum ca-
put, aut in
partem ali-
quamque ci-
tra medium
sunt.*

*Musculi ad
eam partem
trahuntur de-
visti, ad quā
vergent ipsa-
rum fibræ.*

*Nervus o-
mnis vel à co-
rebro vel à
spinali me-
dulla oritur.*

*Laryngis
musculi un-
de suos ner-
vos recipiāt.*

obliquum. Videndum igitur est, unde nam sex illi prædicti musculi, qui recti, secundum laryngis longitudinē, à partibus inferioribus sursum tendunt, suos nervos fortiantur. Enim verò à cerebro posteriori nervorum est recta productio per totum collum deorsum, & utraq; asperæ arteriæ procedens: cui parva quædā alia se jungit. Ab hac productione reliqui laryngis musculi (præter sex illos) atq; etiam eorum nonnulli qui in collo sunt recti, distributiones accipiunt. Verum quum sexta hæc nervorum conjugatio sit maxima, non parva etiam ejus propago totum collum præterlapsa, decidit in thoracem: & primam quidem nervorū cōjugationem producit ad thoracem ipsum, & radicē costarū pertinentem. Alias autem præter has multas, partim ad cor, partim ad pulmonem, ac stomachū, partim deniq; ad omnia viscera inferiora, delegat. Dum igitur nervi hi per thoracem deferuntur, propago quædam utrinq; enata, per eandem revertitur viam, qua prius descenderat, ceu cursum reciprocans. Siquidem ubi uterque nervus usque ad regionem cordis processit, sinister quidē longius progressus, circū maximā arteriā, veluti circa rotulam aut metā quandā fortem atq; transversam obvolvitur, potissimum ea in parte, qua primum à corde emergens, sese ad spinam inflectit. Dexter verò, quum nullū haberet in ea thoracis parte, per quam fertur, ascensum similem, circa illam arteriæ partem, quæ obliqua à corde sursum ad dextrā axillam fertur, obducitur. Sed quia flexio hæc erat multò deterior, quàm illa sinistra ad cor, utpote obliqua, partim multitudine productionum nervi in utranque partem, ab eadem regione emissi, partim etia ligamentorū vi corroboravit ipsam naturā, cujus opera non modò laudibus, sed sunt etiam hymnis majora. Nervus itaq; uterq; (quatenus dictū est) circumductus, sursum ad asperæ arteriæ caput recurrit, idem quidem iter conficiens, ac prius: nulli verò amplius musculo, ne minimam quidem sui portionem distribuens, quòd nullum alium musculum principium motionis suæ ex partibus inferioribus necesse erat accipere. Dispergitur autem eorum uterq; in laryngis musculos sibi correspondentes: qui dextra quidē est parte, in tres illi è directo positos: qui autem sinistra, in reliquos tres, ambò verò in sex, à quibus aperiri & claudi larynga contingit. Conciliarunt autem sibi prædicti nervi, robur non mediocre, exitineris longitudine: quum in productionibus primis, nervi omnes sint molles, & cerebro ipsi adsimiles: progredientes verò, magis magisq; seipsis duriores evadant. Jam inter respirandū, in meatum spiritus nō potio modò, sed cibus etiā repentē incideret, nisi natura providē orificio laryngis epiglottida, veluti operculū, admovisset: rectam quidem alio tempore omni quo animal respirat stantem: quum autem quidvis transglutit, laryngi ipsi assidentem. Siquidē ipsum quod transglutitur, ceu primum ipsius radici incidens, post autem dorso inductum, inclinari ipsam cogit, ac collabi, ut cujus substantia cartilago sit, eaq; prætenuis. Figura autem epiglottis rotunda est: at magnitudine, paulò major orifi-

*Recurrentiū
nervorum la-
ryngis consi-
deratio.*

*Natura ope-
ra esse longè
hymnis ma-
jora.*

*Nervos quò
magis digre-
diuntur à
cerebro, eò
magis dure-
scere.
Epiglottidis
usus.*

*Epiglottidis
substantia,
magnitudo,
situsq;.*

cio laryngis. Vergit porro ad stomachum, positionemq; habet tertiæ cartilagini contrariam, utpote ex adversa illi regione exorta. Verum quemadmodum à cibariis epiglottis in laryngis meatum compellitur, ita ab illis quæ evolvuntur, cartilago. Spectat enim & illa in laryngis capacitātē: quo fit, ut eorum impetus, quæ sursum à stomacho suggeruntur, dorso ipsius incidens, totam cartilaginem facile in locum cedentem evertat. Nec tamen ita claudunt meatum laryngis hujusmodi cartilagine, ut nihil prorsus transfluere possit, sed ne multum, neve confertim. Siquidem exiguum quiddam potionis semper in asperam arteriam delabitur, non per mediam laxitatem iter suum faciens, sed in orbem secundum tunicas ejus intinctum, quo nimirum madescit atq; fovetur pulmo. Quin & glandulæ ipsæ quæ laryngi adjacēt, laxiores & fungosiores quum sint, portionem ejus humoris excipiūt, ut eo videlicet partes omnes circumstantes perfundāt. Quòd aut transglutientibus nobis cibos, œsophagus à larynge toto cartilaginoso minimè coarctetur, ob id fit, quia tunc commutatur positio eorum: quippe stomachi initium, ad asperam descendit arteriam, larynx verò sursum ad fauces recurrit. Porro bona pars musculorum linguæ, necnon musculorum laryngis conjugatio anterior, aliique nonnulli qui ad omoplatas feruntur, præterea robustus alius geminus, qui ad os pectoris fertur, postremò alij duo musculi pertinentes ad genas, sicuti & reliqui parvi, qui sunt ad radices propaginū, quos columnares appellat, hi in quā omnes musculi, ab osse hyoide ob similitudinē literæ sic appellato, oriuntur. At musculi ultimò omnium dicti, & qui ante illos sunt, genæ ipsius sunt proprii, quam movent obliquis motibus sibi oppositis. Qui autem ab osse hyoide inferuntur linguæ, illius gratia extiterunt: quibus oppositus simul estis, qui duplex ad pectoris os descendit, ut deorsum hyoides detrahat, si fortè à superioribus musculis violentius sursum tēdatur: existens etiā cartilagini scutiformi propugnaculū quoddā, quemadmodū & ipsum hyoides. Huc adde, quòd is musculus tracheam arteriā simul coercet ac dirigit. Quin etiā & qui ad omoplatas feruntur musculi, tum laryngis, tum ossis hyoidis motum versus collum efficiunt. Invectū igitur gibbis ipsius laryngis hoc os, à multis musculis oppositis sibi invicem & equipollentibus communitur, atq; in medio firmatur. Verum ad majorem securitatem, non solum duobus ipsius ossis lateribus applicuit natura ligamenta quædam robusta, sed etiam cartilaginosa quædā alia & rotunda producens, ea utriq; lateri inferuit. Connectitur autem nihilominus per membranas quasdā, non modò ad laryngem & epiglottidem, verum etiam ad stomachum, à quibus firmiter continetur annexū capiti, his quidem osseum magis, aliis cartilagineū, pro ratione musculorum qui ab eo exoriuntur. Quod pertinet ad thoracem, alibi demonstravimus, multa esse illi motus principia, respiratio nemq; aliam omni carere vi, aliam violentam existere: atque utriq; proprios inesse musculos. Porro

Arytanoides cartilago.

Asperam in arteriam illi semper nonnihil portionis.

Glandulae adjacentes laryngi.

Laryngē recurrere ad fauces transglutientibus nobis.

Musculi ab osse hyoide producti.

Hyoides os existere propugnaculum cartilagini scutiformi.

Hyoidis ossis ligamenta duplicia.

Respiratio duplex.

*Musculorū
tercostaliū
ra qualem
ter se posi-
nem ha-
ant.*
Porro musculorum, qui inter costas sunt, fibræ,
ab una costa ad aliam perveniunt, cum parva ad
obliquū declinatione: quinetiam internæ fibræ,
externis situm contrarium habent: necnon illæ
quæ ad os pectoris in partibus costarum carti-
laginosis consistunt, contrariæ sunt iis, quæ in
osseis sunt, usq; ad vertebra. Propria septi tras-
versi substantia, musculus est: tunica verò ipsi
duæ insunt: inferior quidem, peritonæi tunica
summitas: superior aut, basis tunica succingen-
tis costas. Confert autē diaphragma, non solum
ad pellenda excrementa alvi, sed etiam ad ipsam
respirationē. At cartilago multa notharū costa-
rum extremitatibus circumfusa est, quò tutiores
sint ipsæ ab injuriis extrinsecis, ac per eas subje-
cta corpora. Nā pulsata cartilago minimè cōmi-
nuitur, aut frangitur. Jā verò pectorale os (cujus
ultima pars est cartilago ensiformis, oris ventri-
culi, septi transversī, cordisq; similiter propugna-
culum) ex septem ossibus constat, quod septem
in ipsum costæ veræ inarticulatæ sint: nam reli-
quæ mendosæ sunt quinq;. Quum enim tria es-
sent principia, quæ animal ipsum dispensant, os
quidem immobile sine musculis primo princi-
pio circumjecit natura. Solos autem musculos
tertio elargita est. At medio inter utrunq; posi-
to, & ossa & musculos. Cerebrum nanq; in nul-
los usus indiguit musculis, ceu fons motus vo-
luntarij & principii. Quo fit, ut cranium immo-
bile, quasi murus, ipsi sit circumdatum. Quod
si hepatis aut ventriculo septum ejus generis ali-
quod circumfusum fuisset, ubi cibus & potus ex-
ciperetur? ubi fœtus moles recondideretur? Quæ
deniq; excerneretur superflua, si nullus illis præ-
esset musculus? At thorax motū penitus amisisset,
si ex solis constaret ossibus. Sin verò contrā
ex solis musculis, inciderent hi pulmoni & cor-
di, nemine eos explodente. Ut igitur simul qui-
dem spatium intus esset, simul autem totum in-
strumentū moveretur, musculi alternatim fue-
runt ossibus interpositi. Quod verò ad mam-
mas spectat, quum lac utilis alimenti superfluum
sit, jure optimo quibus animantibus in cornua
& alia id genus, in partibus superioribus copia
superfluatorum absumberetur, in his quidem ad
thoracem non poterat acervari aliud utile recre-
mentum. Unde ad ventrem eorum, ex thorace
natura mammas deduxit: atq; illic numerosam
quidem uno partu prolem ædentibus, multas:
contrariis autem binas tantum apposuit. Porro
quibus animalibus in partibus supernis super-
flui nihil absumitur, his in pectora eas colloca-
vit. Et si unū aut duo concipiant, duas: sin verò
plura, duas quidē in pectore, alias verò inferius
adhibet. At in homine meritò mammarū pecto-
ri adhærent, ubi & cordi tegumēto esse possunt,
utpote glandulosæ existentes, crassiq; indumē-
tis per similes, & multò melius quàm alibi, ex san-
guine in venis elaborato, copiam optimi lactis
conficere. Siquidem ex vena cava, ubi jam pro-
pe claves pervenit, natura duas venarū cōmemo-
rabilium, ac duas item cum eis arteriarū propa-
gines, quatuor simul eas infra per totum pectus
deduxit: eoq; modo binas demū utriq; mamillæ
inseruit, in tā longo isto itinere id molita, ut plu-

rimū in vasis esset sanguis percoctus. Qui quum
fertur sursum, per cor sanè iter facit: rursusque
deorsum tendens, occurrit: exagiturq; semper
quidem à motu thoracis, & in his ejusmodi va-
gationibus incalescit, parti perpetuo motu præ-
ditæ diu immoratus, quæ omnia simul ad per-
fectam ipsi coctionem conferunt. Porro quibus
animalibus mammarū in pectore sunt, servantur
& in masculis: quibus verò in ventre solū insunt
non adhuc servantur, nisi partus similitudinem
corporis cum matre potius quàm cum patre ob-
tineat. In universum autem constat, omnem fœ-
minam esse masculo frigidiorē.

*Lactis elabo-
rationi quæ
conferant.*

*Mamma
quando ha-
reant ad pe-
ctus mascu-
lis.*

*Fœminas o-
mnes esse ma-
sculis frigidi-
ores.*

GALENI PERGAMENI

de vsv partium, Liber VIII.

AT collum fuit constitutū unius asperæ ar-
teriæ gratia, videturq; ob id semper unā
cum pulmone interire. Quam ob rē pi-
scēs omnes, quod pulmonem non habeant, col-
lo carent: contrā autē, quibus animalibus inest
pulmo, ea & collo prædita sunt, & spiritū attra-
hant in pulmonē per arteriā asperā, rursusq; eii-
ciunt per eandē. Ad hæc efflatio, quæ vocis ma-
teria est, ejusdem arteriæ est actio, citra quā nec
vox efficitur. Estq; primum & principalissimum
vocis instrumentum (cui larynx nomen est) finis
superior asperæ arteriæ, quam etiam pharynga
nominant, quemadmodū & ligulā, quæ laryngi
incumbit. Idcirco, si pulmoni aspera arteria est
affinis, tantosque animali usus præstat, ejus sanè
gratia collum formatum extitit: ob idq; priva-
ta collo animalia, sunt muta. Etenim quum in
thorace contineatur pulmo, asperaq; arteria ex
ipso emergens, ad os, magno intervallo semotū,
necessariò pertineat, spatium sanè quod ori &
thoraci interjacet, quum asperæ arteriæ sit tran-
situs, eorum etiam existit via, quæ tum supernè
deorsum, tum infernè sursum feruntur. Ac super-
nè quidem feruntur deorsum nervi, stomachus,
musculi, & spinalis medulla: infernè verò fursū
venæ, arteriæ, atq; ipsa pharynx. At spinali me-
dullæ munimento sunt circumpositæ vertebra:
vasorū verò divisiones glandulæ replent: mem-
branæ item ac ligamenta quædam, muniunt si-
mul prædicta & colligant. Quibus omnibus
cutis commune operimentum existit. Anima-
lia quæ alimentum sibi à terra ore suppeditant,
collum habent longitudine cruribus simile. At
homo, & quæ similia ei animalia sunt, quum
propter pharyngē collū, & illam vocis & respira-
tionis gratia possideāt, magnitudinē etiam col-
li fortiūtur tantā, quanta pharyngi necessaria ad
prædictas actiones erat. Ad hæc etiā, quū opor-
teret partes eas quæ ad humerum, brachium, ul-
nam, extremā manū, ac deniq; septum transver-
sum spectāt, à spinali medulla colli nervos acci-
pere, horum nervorum gratia, in spatio inter ca-
put atq; thoracē medio, alij generati sunt spon-
dyli, ex quibus collum conflatur. Caput autem
plurimis visum est propter cerebrum factum
fuisse, ob eamq; causam sensus omnes in se con-
tinere, tanquam servos quosdam & magni re-
gis stipatores. At cancris & aliis molli crusta in-

*Collum suis-
se factū gra-
tia asperæ ar-
teriæ.*

*Collum na-
sci, interireq;
cum pulmo-
ne.*

*Efflatio exi-
stis vocis ma-
teria.*

*Larynx est
principalissi-
mum instru-
mentum vo-
cis.*

*Pharynx.
Ligula.*

*Collo priva-
ta sunt mu-
ta.*

*Spinalē me-
dullam mu-
niri à vertē-
bris.*

*Glandulas
replere divi-
siones vasa-
rum.*

*Cutis operi-
mentum com-
mune.*

*Colli longi-
tudo in va-
riis anima-
libus varia.*

*Colli verte-
bra quibus
partibus ner-
vos largiam-
tur.*

*Cancros ca-
rere capite.*

rectis, caput quidem non est: particula tamen quæ sensuum dux est, ac motus voluntarij, omnino certè eis in thorace consistit, ubi omnia ipsi sensuum instrumenta insunt. Itaq; quod in nobis est cerebrum, id in illis sanè animalibus erit pars ea, ad quam prædictorum quodq; refertur.

Aristotelis opinio refellitur.

Cæterum existimare, caloris qui cordi inest refrigerandi gratia, cerebrum fuisse constructum (qualis fuit sententia Aristotelis) omnino absurdum videtur, nec absimile, ac si quis dicat, calcaneum cordis causa extitisse. Nam qui obsecro fieri potest, ut cor assidua respiratione aeris commodissime refrigeratum (utpote refertum arteriis & venis, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula) à cerebro quod remotissimum

Cerebrum semper esse calidius aere.

Cranio fracto quid agendum præcipue.

Cerebri refrigeratione in cranij fracturis esse malorum ultimum.

Cerebrum facile ab aere refrigerari.

Calor omnis sublimè fertur.

Cerebrum cordis exiguum, sensuum organum immensam nervorum apophysin mittere.

Aurium nervi.

Naribus demitti portionem cerebri. Oculorum nervi.

Lingua nervi.

Cerebrum est nervorum, sensusq; & motus voluntarij principium.

Cor est arteriarum insitumq; caloris origo.

est, crassissimisq; interceptum ossibus, ac semper ipso aere calidius, aliquod refrigerium desideret? Etenim ubi cranium est fractum, id curamus præcipue, ut quamcitissime ossa fracta excidamus, ne videlicet ipsum cerebrum occursum aeris refrigeretur: id quod certè esset malorum ultimum, illi cui fractum est caput. Atqui si aer cerebro esset calidior, haudquaquam refrigeretur ab eo. Nunc autem vel si ætas fuerit, refrigeratur facile, indigetq; etiam tum foveri citissime, tanquam non solum id non sit frigidum, sed ne citra molestiam quidem occursum substantiæ frigidae toleret. Aut quomodo satis cordi refrigerando esse potest, cor autem non multo magis cerebrum supra se positum possit excalfacere, quum calor omnis feratur sublimè? Cur etiā, ad cor quidem obscura quædā apophysis ab ipso pertinet, sensuum verò instrumenta à cerebro portionem immensam recipiunt? Etenim in utranq; aurem insignis nervus unā cum meningibus infertatur. In utraq; etiam nares portio cerebri pertinet, multo major ea, quæ ad aures pervenit. Similiter in utrumq; oculum, unus quidē mollis nervus in radicem ipsius, unus autem durus, in musculos moventes inferitur. Ad linguā verò, nonne quatuor, duo quidem molles per palatum tendunt: duo autem duri, secus utranq; aurem feruntur? In universum autē omnia cum ipso cerebro communionem habent. Quod qui dem quum longinqua quidem refrigeret, proxima autem non afficiat similiter, monstrū quoddam esse mihi videtur. Fieri autem non potest, ut particulæ alicujus utilitatē ritè exponamus, nisi totius instrumenti actionem prius invenerimus.

Cerebrum igitur principium existit nervorum, sensusq; & voluntarij motus. Cor autem, arteriarum atq; caloris insitum. Porro etsi cerebrum (quod *ἐν κεφαλῇ*, hoc est, in capite situm, dicitur) in animalibus capitis expertibus juxta pectus collocatum cernatur, non ob id tamen aliud quippiam cerebro proportionale, dicemus illis inesse, sed idem ipsum, licet vetus nomen ei non conveniat. Siquidē quod sensus ac motus principium est, unum atq; idem est in omnibus animalibus, etiamsi in locis diversis inveniantur. Quum igitur in animalibus capite destitutis, cerebrum atq; etiam os sint ad pectus: sicuti & aures & nares, manifestum utique est, propter nullam earum particularum caput conditum fuisse à natura. Cæterum eisdem animalibus capite

destitutis, ut cancris, balænis, scarabæisq; oculi sublimes, ut qui duri & robusti futuri erant, recoditi prælongis cervicibus insunt, quod illorum actio locum æditum postularet. Quæ causa etiā fuit, ut qui hostiū aut prædonum longè infestas incursiones speculantur, muros aut turres altas, aut montes quosdam conscendant. Homini autem, cæterisq; animalibus ei similibus, totos oculos molles necessario habituris, prælongis cervicibus oculos imponere erat periculosius.

Quum igitur neq; in imo constitui eos, è re ipso rē esset, natura invenit qua arte faceret ipsis particulam, quæ alta simul esset, & eos tueri satis posset: supra quidem supercilia constituens: infra verò quas malas appellamus, attollens: inter nis præterea partibus nasum applicans: ut exter nis, ossis processum, quod jugale appellamus. Jam verò sensoria omnia nervum postulāt mollem: nervū quidem, quia is sensuum est instrumentum: mollem autem, quia sensorium, ut sentiat, pati & affici debet: verum quod molle est, ad patiendum: quod durum, ad agendum est aptius.

Proinde sensoria quæ motu voluntario aguntur, ut oculus ipse & lingua, duplex habuerunt nervorum genus, non unum duntaxat molle, perinde ac aures & nares. Quod si quando alterum eorum læsum fuerit, ea facultas vitiabitur quam læsus nervus præstabat. Videre namq; sæpe est linguam, alias quidem ad motū, alias autē ad saporū dignotionē, esse impeditam. Oriuntur autem nervi molles, ex mollibus cerebri partibus: duri aut, ex duris. Rursus illi quidē rectā ad sensoria, hi verò per circuitū tendunt. Nervorū itaq; descendantium ad linguam, illi quidem ex inferioribus & anterioribus orti, statim infiguntur in ipsam: hi autē ex posterioribus, obliquisq; emergentes, circum collum prius obvolvuntur.

Cæterum molles quidem, in extimam linguæ superficie ad saporis judicandos, in musculos verò ad motum duri disseminantur. Eadem porro ratio est & in oculorum nervis: duri quippe in ipsorum musculos inferuntur: alii verò in primum & principalissimum visus instrumentum, humorem scilicet crystallinum. Quorum mollium nervorū nullus ultra sensoria progreditur: alioqui facile rumperentur progressi. Ob hanc igitur causam sensoria omnia propè cerebrum esse oportebat. Quod quidem si verum est, constat utiq; cerebrum propter oculos in capite collocatum esse: reliqua autem sensoria omnia, propter cerebrum. Similiter etiam de ore liquet, quod hoc quoque adjacere capiti erat necesse: aut potius in se continere linguā, ut quæ ad judicandos saporis, concinnandum sermonem, ac denique ad masticandos & transglutiendos cibos, neutiquam alibi quā in ore commodius collocari potuisset. Est autem cerebrum substantia quidē nervis simillimum (quorum ipsum principium erat futurū) nisi quod illis est mollius. Nam idē iam illi expediebat, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnesq; imaginationes, & intellectus cōplectitur. Quia verò nervorū oportebat duplicem esse materiā, duplex etiam cerebrum extitit, mollius quidē anterius, ad producendos molles: posterius autem durius, quod

Animalibus capite destitutis quales oculi insunt.

Oculorum sensus longe tenuissimus.

Sensoria patiuntur nervum mollem, sensoria dū sentit, patiuntur.

Mollia ad patiendum aptiora.

Dura, ad agendum aptiora.

Sensoria, quæ voluntariè moventur, duplex nervorum genus inesse.

Nervorum mollium, durorumq; ortus atq; progressus.

Lingua nervi unde oriuntur.

Oculorum nervi.

Crystallinus humor, principalis visus organum.

Cerebrum propter oculos in capite collocatur, propter cerebrum autem sensoria reliqua.

Lingua usus Cerebrum nervi esse simillimum, mollius tamen.

Cerebrum recipit sensus, imaginationesq; & intellectus cōplectitur.

Cerebri pars anterior est mollior, mollior, posterior durior, durior nervis generandis.

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

πνεῦμα φανερὰ

phalida nominant, ad duriorum nervorum generationem. Quum autem mollis cum duro non admodum cōveniens futurus esset contractus, dictæ cerebri partes duplicata dura meninge, quæ cōplexura erat totū cerebrum, dirimuntur, & per meatum solū, qui sub capitis vertice est, et corpora meatum ipsum ambientia, conjunguntur. Ad hæc, ipsius anterioris cerebri, quæ partes duram meningem contingunt, mediis duriores sunt, quum ad patiendi difficultatē, tum ad productionem duorū nervorum: quales sunt qui oculos movent: nam à mediis commodè molles oriuntur. At ex ea parte cerebri posteriori, mollis nervus penitus nullus, pducitur. Igitur nervi omnes consistentia cerebro sunt duriores, optici tantum exceptis, qui cerebro densiores quā sint, duriores eo non apparent, seu soli ex cerebri substantia veluti concreta, non tamen exiccata, conflati. Qui soli etiam sensibiles quosdam poros in seipsis habere videntur. Quum igitur in capite quatuor sint instrumenta sensoria, quæ à cerebro sensus principium habent, etsi hac ratione similia appareāt, inest tamē eis secundum speciem dissimilitudo, nō modò in ipsis sentiendi facultatibus, verum etiam in corporibus, per quæ facultates ipsæ feruntur. Quandoquidem facultatum alia odorū, alia saporum, alia sonorum, alia est colorū dijudicatrix. Viarum autem, ea quidem quæ fert ab utroq; ventriculo ad nares, productio est prælonga, nihil ab ipsis ventriculis discrepans. Quæ verò ad oculos ducit, variat jam quodammodo & dissidet, non tamen planè certus est nervus. Quæ ad linguam descendit, perfectè quidem est nervus, sed mollis. Quæ denique ad aures, nec similiter quidem mollis, nec tamen certè est durus. Quinta verò viarum facultatis à cerebro descendens, fortis simul ac durus est nervus, ad motus quidem, & ad ea quæ crassarum sunt partium sensu tactus dignoscenda, optimè accommodatus: ad exquisitiorem autem aliquam dignotionem, cuiusmodi aliis sensoriis inest, admodum ineptus atque impotens. Quandoquidem omnia hæc, ut sensus fiat, immutentur omnino est necesse. Immutatur autem non à quovis sensibili omne sensorium: sed splendidum quidē ac luminosum, à coloribus: aëreum à sonis: vaporosum, ab odoribus: atque (ut in summa dicam) simile simili est notū & familiare. Igitur nullum sensorium, præterquam visus, à coloribus immutabitur. Solus etiam visus sensoriū habet lucidum, & purum, splendidumq; humorē videlicet crystallinum. At nullum præstaret usum ipsius sensorii alteratio, nisi eam imaginatio, ratiocinatio, & memoria (quæ ad principē animæ pertinent facultatem) perciperent. Producit itaque cerebrum ad humorem crystallinum quandam à sese portionem, ut affectus eius humoris agnoscat: quæ productio sola meritò meatū habuit sensibilem, ut per eum, ad lucidum splendidumq; sensoriū, maxima copia spiritus à principio ipso transmitteretur. Cæterum ea ipsa productio, usque ad viam quidem quæ fert ad oculum, * mollis, rara, pura, & sincera extenditur: ubi verò jam elapsura est cranio, securitatis gratia, durior & compactior effi-

citur. Quum autem in cavitates quæ superciliis subsunt inciderit, amplificatur plurimum, pristina namq; naturam recipit, sic ut cerebrum esse videatur. Postea verò ad pupillam coalescit, eadē ipsa propago quæ oculis inest: ad quam nimirū propaginem cornea tunica (cui humor crystallinus incumbit) tenuis, alba, & pura quum sit, facile colorum externorum alterationem transmittit. Quia verò etiam ad aures propaginē quandam à cerebro erat necessum descendere, exopturam occursum sensibile (quod erat sonus & vox, aut percussio aëris) os purum ac densum auribus oppositum, flexibus obliquis instar labyrinthi natura ipsa pertudit, quo frigidi quidam aëris vires integras, flexuum varietate, sensim exolveret: aliorum autē corporū exiguorū impetum propulsaret. Igitur propter patiendi difficultatē ita constricti sunt auditorii meatus: necnō uterq; auditorius nervus, durior effectus est, quā ut ipsi actioni cōveniat. Linguae autem nervus (etsi quartū hoc sensoriū dixerimus esse) est mollior: & qualem esse oportebat: quia natura illi poterat oris tegumento ad maximā securitatem consulere. Auditorius verò, ad patiendi difficultatē potius quā ad sentiendi promptitudinem, fuit comparatus. At solum sensoriū olfactus intra craniū consistit, nempe in ipsis ventriculis anterioribus cerebri, qui etiam vaporosum quendam spiritū continent. Ad cuius quidē sensibile transmittendum liberè, & cōservandum; oportebat reperire viam tantò rariorē atq; latiorē auditorio meatu, quantò sensibile huius, quā auditus, crassiorū erat partiū. Ferè enim, quantū aër partium tenuitate à luce relinquitur, tantum vapor etiā ab aëre. Quum igitur cerebri ventriculi loco inferiori sint siti, ex partibusq; sibi propinquis necessario etiam excrementa affluentia excipiant, ne melior quidem ulla via excogitari ea potuit, quæ ampla simul atq; declivis esset. Ac talis quidem est narium meatus, per quem intus foras excrementa excernuntur: foris autem intrò, penetrant sensibilia olfaciendi. Quarum utilitatum, altera ad vitam necessaria est, altera ad commodiorem vitam. Sunt tamen & alii canales duo, qui per palatum in os, totius cerebri excrementa eructant: qui duo soli purgando sufficiunt cerebro, quando animal omnino rectè habet. Quare propter odorum dignotionem potissimum atq; hac adhuc antiquiorem, & necessariam ad vitam inspirationem in cerebrum, facta sunt illa in nares foramina. Ex abundanti verò cerebri malè affecti excrementa repurgant. Opposuit autem natura ipsi olfaciendi sensorio, os quoddam variè pertusum, veluti spongiam quandam, simul ne aliud corpus durū extrinsecus incidat, simul ne viribus interis aër frigidus inspirantibus nobis rectè in cerebri irrumpat ventriculos. Quæ ratione etiam, quæ sunt ante meningas ossa id quod à cribri similitudine dicti, spongiarum instar admodum foraminulenta videntur, meatibus tortuosis distincta. Quinetiam & dura meninx, quæ cerebrum con-

Cornea tunica qualis.

Auditus sensibilis, sonus, & vox.

Auditorij meatus utilitas.

Lingua nervus.

Olfactus sensorium solū contineri in ventriculis cerebri.

Olfactus sensibilis esse crassiorum partiū, quā sensibile auditus.

Narium meatus utilitas.

Palati foraminum usus.

Inspirationē in cerebrum esse necessariā ad vitam. Ossis colatorij usus.

id quod ossa.

Meningem duram esse foraminulentam.

Odorum dignotio promogitur ab inspiratione cerebri.

Excrementorum expulsio à cerebro expiratione iuvatur.

Odorum dignotio iuvatur plurimum totam respirationem.

Instrumentum unicum pluribus actionibus sufficit.

Meningis tenuioris usus.

Crassæ meningis usus.

Meninge tenuem inter cerebrum & crassam consistere: crassam inter tenuem & cranium.

Medium natura quid sit.

Pericranium à crassa meningis ortum, cranium illum annectit.

Cerebri anteriores ventriculos inspiratione expiratione, atque efflatione efficiere.

Sensorium omnne esse geminum.

Geminorum utilitas.

Cerebri altero ventriculo vulnerato, fuisse quædam servatam.

vapor ascenderet, qui est sensibile olfactus, nisi utrunq; opus inspiratione simul & expiratione, cerebri natura proveheret. Quare illapsu quidē inspirationis, quæ sit à cerebro, promovetur odororum dignotio: expirationis verò impetu, superfluatorum excretio: nempe vehementia spiritus, unā secum excrementa pertinacia trahente. At quæ in meatu nimis impacta sunt, ea efflatione expurgantur. Ipsa verò rursus odorū dignotio, non parum juvat totam respirationem; non sinens vapores pravos, qui alioqui nos laterent, unā cum puro spiritu ingredi. Porro unicum sæpe instrumentum multis actionibus sufficit: ut videlicet tenuis meninx, quæ secundæ per similes cerebrum stabilis ac tegit, vasaquæ ipsius omnia colligat. Sed in omnes etiam cerebri partes hæc membrana se insinuat, totū ipsum cōtexens, extendensq; se usq; ad ventriculorū capacitatem. Est tamē & tegumentum cerebri crassa meninx, aut potius propugnaculum quoddam, propulsandis oppressiōibus cranij oppositum.

Tenuis autem meninx, naturale operimentum eius existit. Nam crassa certē ab ipso est sejuncta, excidentibus autem vasis cohærens. Quod si tenuem illam meningem non interposuisset natura, cerebri cum crassa meningē vicinitas non vacaret dolore. Sola autem si fuisset illa, adhæsisset haud citra noxam cranio. Quū igitur id natura dicendum sit medium, quod eadem proportionē ab extremis distat, neutra verò meninx ad portionem à cranio & cerebro distet, meritò certē, ne cerebrum aut eius operimentū quicquam afficeretur, prior quidem tenuis meninx, post ipsam autē, crassa locata est, quæ quantò ossē est mollior, tantò tenui membrana est durior; quantò autem hac tenuis est mollior, tantò tenui cerebrum mollius etiam existit. Duobus itaq; medijs & vinculis natura ipsa tutò inter cranium & cerebrū necessitudinē conciliavit. Quemadmodum igitur cerebrum tenuis meninx, sic illam crassa, atq; hanc denique cranium ambit, & cōprehendit, eiq; per multa vincula: annectitur quæ quidē ab ipsa meningē, membranarum instar exorta, extenduntur singula versus partem cranii sibi ē directo correspondentem: inde per futuras progressa, sibi mutuò occurrunt, coaptantur, & coalescunt, cōmunemq; ex seipsis omnibus pericranium procreant membranā, quæ cum cranio duram meningem connectit. Jam verò duo anteriores ventriculi cerebri (qui cerebro spiritum animale prius & conficiunt & præparant) inspirationem, & expirationem, ipsamq; efflationem efficiunt. Eos autē præstitit esse duos quā unum, quod esset infernus canalis duplex, & sensoriū omne, cerebrumq; ipsum sit geminum. Prima tamen, maximeq; communis geminorum instrumentorum utilitas est, ut si alterum eorum læsum fuerit, subserviat reliquum. In Ionia siquidem vidimus quendam adolescentem vulnere in alterum anteriorū cerebri ventriculorum accepto, fuisse superstitē: qui nemōtū quidem temporis potuisset vivere, si vulnus utrunq; simul violasset. Itaq; tutius est, in quibus licet, quod geminum est, quā quod simplex. At in uno animali duas facere spinas

non licuit, quare nec duas spinas medullas: ac proinde nec duplex esse cerebri posterior ventriculus poterat, quum ex ipso spinalis medulla oriatur. Sed quoniam nervi omnes qui sub capite in totum sparguntur corpus, aut ex posteriore cerebro, aut ex medulla spinali oriuntur, ventriculum hūc oportuit maximum esse, à ventriculisq; anterioribus per meatum insignē, animalem spiritū antea in illis elaboratum, excipere: per quem nimirum meatum, procedentem ab extremitate communi anteriorum ventriculorum, quem nonnulli quartum ventriculum vocant, cum cerebro, hoc est, anteriori cerebri parte (quæ postica major est) parencephalis, hoc est, cerebellum committitur. Pars autē cerebri quæ supra communē illam cavitatem est sita, veluti domus tectum, in sphaeræ superficiem cōcavam circumducta, haud ab re appellatur *καμάριον*, & *ψαλλιδόειδες*, quod testudinis aut fornicis instar sit fabrefacta. Quæ quidem partem omnem cerebri incumbentem, sine labore sustinet. Undiq; enim sibi ipsi simillimum est, quod rotundum est, atq; orbiculare: ob idq; omnium figurarū ad patiendum est difficillimum, omniumq; etiam est capacissimū, earum quæ æqualem dimensionem sortiuntur. Est autem commodum id minimē contemnendū in organis universis, quæ ad continendū substantias quasdam fuerunt comparata: id quod re ipsa constat etiā in illo meatu, qui à ventriculo, quem cameratum diximus, ducit ad parencephalida. Omnes etenim meatus corporis, quemadmodum & universi ventriculi, secundum ipsorū medium, omnino sphaerici sunt, quod sic capaciores existant, ac difficilior etiam patiantur. Quum autem ventriculos qui materiales magis substantias recipiunt, expediat esse majores: minores verò, qui materias majorum virium ac facultatis, hoc est, elaboratas magis & absolutas, continent: sanē ventriculus posterioris cerebri, minor meritò fuit anterioribus. Jam cerebellum ipsum minimē quidem ex magnis flexibus tenui meningē interceptis, ut cerebrum, sed ex multis quidem, & his admodum parvis, alioq; modo structis, conflatur. Quia verò nō in solis ventriculis, sed in toto cerebri corpore continetur multus animalis spiritus, existimandum est plurimum etiam in posteriori cerebro contineri, ut quod omnium qui in totum corpus distribuuntur nervorum principium futurū sit: mediāq; illa intervalla, quæ partes eius connectunt, spiritus esse vias. At intellectus sequitur non compositionis varietatem, sed corporis cogitantis, intelligentisq; bonam temperiem. Neq; enim bonitas ac perfectio intellectus multitudini spiritus animalis potius attribuenda videtur, quā qualitati. Ad principium autē illius meatus qui ventriculos anteriores cū cerebello conjungit, appositū est glandulosum corpus, à figura coni *καμάριον* pictum: quod quidem cerebri pars nō existens, divisionē illius magnæ venæ explet ac firmat, à qua omnes ferē anteriorū ventriculorum plexus *χοροειδῆς* cōflantur. Extenditur præterea secundum totum meatū inter ambas eminentias cerebri, quas *γλῆνια*, hoc est, parvas nates, appellant, epiphysis quædam vermi similis,

Ventriculus cerebri posterior omnium maximus, per quem spiritum animale, parencephalis.

Καμάριον, & ψαλλιδόειδες.

Figuram orbicularem, ad patiendum difficillimam, capacissimamq;.

Ventriculus cerebri minor, anterior.

Animalis spiritus, qui non solum in ventriculis, sed etiam in toto cerebro, intellectu temperiem sequitur.

Καμάριον, coni figura.

Γλῆνια, Epiphysis vermi similis.

similis, ex particulis quamplurimis, cōnexis per membranas tenues, composita: quæ quidem cerebri pars existens, altera parte sui, posteriori cerebri ventriculo annectitur. Inde autē paulatim adaucta, ac secundū meatum porrecta, ipsum totum planè obstruit. Ceterū ubi cōtracta reflectitur, idq; transversis flexibus, meatum totum in tantum aperit, in quātum retrorsum cesserit. Etenim cū sic in seipsam confidens rotundetur, quantum minuitur longitudo, tantum latitudo eius augetur. Quare constat ea sic paulò magis amplificata, in solas meatus partes, quæ ad basim sunt, strictissimas, nequaquam ingredi posse fines ipsius inferiores. Semper autem tantum de meatu aperitur, quantum de illis convexitate, in ipsum ingressura, minuitur. Quibus quidem motionibus hoc ipsum corpus transitu spirituum præest, dominaturq;: Alligatur autē eminentis cerebri, ligamentis quibusdam, à quibus utrinq; cōstricta & cōercita, cōtinetur, ne divigiari possit: cuius quidem epiphysis constructione, alia nulla melior potuit excogitari. Nullam siquidem invenias constructionis bonitatem ad actionis perfectionem, meliorem ea, quæ adeo exquisita existit, ut si vel tantillum immutes, tota confestim vitiatur.

GALENI PERGAMENI
de usu partium, Lib. IX.

QUUM autē succi eius quod ad partē confluit, hoc quidē, ceu utile, assimiletur illi: hoc verò, tanquā alienū, omnino excerni conveniat: certē ad hanc excretionē natura meatus opportunos desiderat. Quos nisi nacta fuerit, acervatum ibi excrementum, primum quidem instar oneris gravat, deinde prohibet quo minus succi benigni illuc confluant, illorū vias præoccupans: quo fit ut membrū nutriri nō sinat: sed quemadmodū animalia esurientia, lutum, aut aliud quidvis simile vorant, ita partes accommodato sibi alimento carentes, cogantur aliquid vel ex ipsis pravis succis attrahere. Unde postea in ipsis collecta excrementa, putrescunt tādē, ac sic acriora simul & calidiora reddita, inflammationes, erysipelata, herpetas, carbūculos, febres, innumerabilemq; aliorum morborū turbam exuscitant. Quare magnam semper curam natura adhibuit, ut excernerentur superflua. Quæ cum genere sint duplicia (alia enim vaporosa & fumosa, naturaliter ad sublimia feruntur: alia autem aquosa & limosa, motu suo deorsum decumbunt) vacuandis quidē ijs quæ ad superna volitant, meatus quosdam tenues in altū duxit: declives autē & amplos eis subdidit, quæ suo pondere delabuntur ad inferiora. Cæterum declives cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per corpus nariū, sensibilia excrementa eructant. At vaporosa excretiones, præ tenuitate sensum nostrum effugiunt. Porro in humidis quidem & mollibus corporis partibus, nulla est præscripta recta quædam tali excretioni via, quū humidum omne ac molle corpus, cedere quidem expedire ijs quæ impetu concitatore per ipsum feruntur: transmissis verò his, rursus coire

atq; coalescere soleat. At in duris corporibus, nisi via quædam prius parata sit, transire per eam nihil potest. Idcirco in cranio, quod cerebri ceu galea quædam existit, conspicuas ac sensiles vias natura vaporosis his fuliginosisq; excrementis aperuit: simul quidem ipsum cavernosum efficiens, simul & variis futuris coarticulatū. Alioqui nec potuisset caput ipsum purgari, quod quidem quum à subjectis partibus omnia quæ sursum feruntur fuliginosa excrementa excipiat, largiori eget evacuatione. Ossium autem quæ adaptantur ad futuræ generationem, utrunq; eminentiam habet & cavitatem, non una serie, sed situ alternantes, ut duarumerrarum sese invicem ingredientium instar, mutuò inter se cohaerescant, utroq; nimirum osse cavitatibus suis excipiente eminentias alterius. Quæ structura maximū ad securitatem & firmitudiū videtur habere momentum, præter id, quod etiam per suturas fit transpiratio. Non sunt autem foraminibus pertusa capitis ossa, sed intus cavernulas complures fortiuntur, quod oporteret utraq; eorum superficiem levem & æqualem existere, ne videlicet aspredine sua, quam utiq; forata obtinuissent, colliderent tum pericraniū, tum ipsas meninges cerebri. Crassiora igitur fuliginosorum excrementorū per suturas solas vacuantur: nam tenuioribus, vel cranium ipsum est perviū. Nec verò ad transpiratum duntaxat, sed ad excidentia etiam vasa tenuia futuris ipsis natura est abusa. Non est factum capitis os tenue simul & densum, sicuti neq; densum & crassum, sed rarium, cavernosum, & crassum, quod sic neq; gravatum esset, nec viam in cerebrum brevem, vulnerantibus se; daturum. Meatum porro qui ad palatum descendunt, alter quidē profectus ex fundo medii ventriculi cerebri, fertur deorsum: reliquus verò emergit à meatu qui cerebrum cerebello connectit. Fertur autem obliquus deorsum, versus alterum. Quum verò primū simul in idem convenerint, locus quidam cōmunis, constitutus à tenui meninge, utrosque excipit, cavus ac declivis, veluti quædam lacuna, cuius labrū supernū absolutus est circulus. Inde magis ac magis arctatus descendens in subjectū adenē, manifestam cavitatem habentem, excrementaq; transcolantem, immittitur. Excipit autem hūc, os cribro simile in palatum desinens. Quum igitur locorum omnium quæ in toto sunt corpore, longè tutissimus sit, qui circa adenem prædictum versatur, inter cerebrum & os palati constitens, meritò retiformis plexus, omnium quæ illic visuntur maximè admiranda particula, inibi collocatus est, complectēs quidem in orbem & ipsum adenem, pertingens autem retrò longissimè. Toti siquidem cerebri basi propemodum hic plexus subijcitur, ex maxima portione earum arteriarum quæ à corde sursum ad caput feruntur, contextus. Est autem non simplex rete, sed cuiusmodi vulgaria hæc piscatorum retia, si plura alia aliis cumulata superinjicias. Reliqua porro arteriarum pars, quæ rectā ad caput ascendit, ubi cranium sunt prætergressæ, medio inter hoc & crassam meningem loco, primum quidem dividuntur in crebras, easq; admodum

Cranio inesse meatus sensiles per quos fuliginosa excernantur.

Suturis cranij qualia ossa desiderantur

Cerebri excrementa crassiora, per suturas expelli.

Cranij crassum, rarium, & cavernosum.

Cerebri meatum ad palatum descendens.

Lacuna cerebri.

Aden subiectus cerebro.

Os colatorij. Locus omnium tutissimus.

Retiformis plexus ubi locatus.

Retiformis plexus ex plurimis arteriis, contextus.

tenues

tenuēs arterias : quarum aliæ in capitis anteriora, aliæ in posteriora, aliæ ad lævam, aliæ ad dextram feruntur, inter se mutuò cōplexæ. Postea verò ex ipsis, veluti radicibus in truncum suum coalescentibus, conjugatio alia arteriarū enascitur, ei quæ initio à corde sursum ferebatur, æqualis : eoq; modo jam per crassæ meningis foramina subit ad cerebrum. Etenim ubi natura vult exactè materiā conficere, diuturnā ei moram in coctionis instrumentis comparat : id quod licet planè videre in flexibus illis variciformibus, qui ad testiculos pertinet. Venæ siquidē & arteriæ in primis flexuū partibus sanguinem syncerū continent, qui certè in ultimis flexibus ad ipsos testiculos, nō amplius ruber est, sed jam quodammodo albicat, exiguū adhuc requirēs ad substantiæ seminis generationē, quod ei à testiculis cōciliatur. At quanto spiritus animalis cerebri exactiorem semine concoctionem desiderabat, tanto plexus retiformis flexuosior variciformi existit, ut in eo immoratus diutissimè, pro dignitate coquatur. Generatio aut animalis spiritus, materiā propriam spiritū habet vitalem. Quū igitur anima ratiocinatrix resideat in cerebro, per quod quidem nos ipsi ratiocinamur, necessum fuit in eo contineri plurimū animale spiritū, qualitatis proprietatē ex sui ipsius concoctione adeptū. Quare totū cerebrū ijs arteriis multipliciter divisus contextum est, multeq; ipsarum divisiones, à basi in ipsius ventriculos desinūt, quemadmodum & venarum, ex eius vertice descendunt. Verū ut hæ quidem in illos excernunt superflua, sic arteriæ largiter spiritū ipsum respirant. Fruitur autem universum cerebri corpus, tum ipso venarum sanguine, tum arteriarum spiritu. Siquidem partes omnes facultatem habent, propriam sibi materiā trahendi. Porro in cæteris corporis partibus adeo propinquæ sunt semper vena & arteria, ut mutuò sese contingant, ac vena semper arteriæ incumbat. At in cerebro, quod satius esset ex locis diversis, aut potius omnino contrariis, vasa in ipsum inferi, à corde sursum per collum venæ atque arteriæ ad ipsum usq; captus simul productæ, inde hæ quidem ad plexum retiformem, illæ autem ad summum capitis verticem diverterūt, cōmunitæ crassa meningē, quæ quidem duplicata, venas in seipsam mediam recepit : idq; vasis tutissimam præbens viam, simulq; utraq; sui parte, altera quidem cerebrum, altera verò cerebellum complectens : ac deniq; ex sui ipsius duplicatione hac, valida ligamenta producēs, quibus calvariæ annectitur. Quia verò ligamenta ea mergere per suturas erat necesse, natura illic suturam à specie ^A græcè literæ labdo^{dem} dictam, adhibuit. Postquam autē facta hæc fuerunt, quamplurimis, in transitu sanguinis per crassam meningē, foraminibus factis, per ea venas, alias quidem magnas, alias, verò parvas produxit : sursum quidem, ad craniū duplicationem, quæq; * ex ea oritur, pericraniū membranā : infernè autem, ad subjunctam tenuem meningem. Coeuntes autem in vertice capitis, quæ sanguinem deducunt meningis duplicationes, in locum quendam vacuum, quasi lacunam, quem torcular appellat, Herophilus,

ibiq; relinquentes bonam portionem sanguinis, inde veluti ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, quæ innumeræ sunt, rivos numerosissimos mittunt. Reliquū verò sanguinis, rivulus ex ipsius crassæ meningis confectis partibus, in regionem anteriore deducit, à quo quidem medium accedente ventriculū, magnæ exoriuntur venæ, quæ in plexus tenuis meningis disseminantur : cum quibus etiā securitatis gratia adnata semper glandulosus extenditur. Quod reliquū est, recta secundum longitudinem, ut initio cœperat, prorsum longissimè fertur, multas producens venas, quæ in totum cerebrū disperguntur. Atq; huic quidem crassæ meningis portioni, quæ prædictum sanguinis rivum efficit, cerebrumq; in binas partes dispescit, aliam quoq; suturam natura addidit, quæ à vertice ad frontem recta per caput medium fertur. Ipsius autem ad frontem pertinentis meningis, pars illa quæ meatui distinguenti antè cerebrum à cerebello, necnō epiphyssi vermiculari incumbit, cū sursum ad se ipsam tendit propinqua corpora, impedit quominus ab eis productio meatus premuntur. Pari modo & duplicatio illa quæ inest suturæ labdo^{di}, corpora posteriora incumbētia ventriculo, sursum trahit. Nec minus tertia & coronalis sutura, quæ per medium anteriorum ventriculorum transversa fertur, ab omni compressione subiectos ventriculos liberat, incumbētia corpora in sublime revellens. Igitur ex productionibus cerebri, maximæ quidē sunt quæ ad naves pertinent : quarum parte utraq; pori sunt oculorum, juxta quos sunt nervi, qui eorum musculos movent. At poris opticis coeuntibus prius quàm ex crassa meningē excidant, * ac separatis rursus post eam, qua parte quidem uniuntur, est pelvis, quam arteriæ utrinq; tangunt. Cæterum lingua duplex quū sit, quemadmodū & reliqua omnia sensoria, partemq; omnem dextrā sinistrem habeat æqualem (qua ambæ tam molendi translutendiq; cibi, quàm etiā loquendi gratia coaluerunt) meritò in utranq; eius partē, à posteriori basi ipsius cerebri, natura propriū nervum deduxit. Quū autem omnibus quoq; oris partibus ab iisdē locis sensum gustatoriū esset melius tribuere, & ad has etiā nervos illinc produxit, vicinitatis atq; situs ratione observata : quibus etiā adjunxit comitem, ipsam tenuem meningem, ut simul illos nutriet ac tegeret. Ut verò crassa meningē has productiones admitteret, in modū fistulæ dilatavit ipsam usq; ad ossa anteriora, quæ illic perforavit, & cum utraq; meningē, partem quidem ipsorum nervorum in ipsam linguam, partem in superiorem, partē in inferiorem maxillam infixit. Ante quorum distributionem, obiter quendam nervum utriq; productum musculo temporali inservit, duriorē certè illis omnibus, quod non ad gustum, sed destinatus ad motum esset. Verū quod nervi maxillæ inferiori, necnō * linguæ infixi, declives ducantur, earum partū positio fecit. Qui autem in superiore maxillam feruntur, eos natura versus anteriora deducēs, nō per oculorū foramina (sic enim offendisset mollissimos opticos nervos, propter quos totus factus est oculus, ut in quibus præcipua

Concoquēdis exacte humoribus procurat natura mora diuturnitatem in vasis. Variciformes testiculorum flexus.

Animalis spiritus generatur ex tali.

Anima rationalis habet sedem in cerebro.

Arterias effundere animale spiritum in ventriculos cerebri.

Partium singulis inesse facultatem propriam materiam trahendi.

Crassa meningis usus.

Labdoidea sutura.

Torcular.

Sutura etia.

Coronab.

tura, per

diu ant

rum Sc

culorum

rebrī fē

transver

Cerebri

producti

sunt m

ma, quæ

nares pe

nent.

Pelvis jux

congressu

optico

Sorum co

stans.

Lingua

plex.

Lingua

traq; pars

posteriori

ipsius ce

rebrī nerr

possidet.

Oris partes

unde nerr

ad sapores

scernendos

recipiant.

Temporales

musculi qu

les nervos

stantur.

Maxilla su

perioris ner

vi, qua part

te in eam in

ferantur

Oculus est fi

ctus propter

opticos ner

vos.

cupua pars consistat) sed per aliud tertium prælongum, nec usque adeo rotundum, quod juxta magnum oculi cantho est, per quod nervi oculorum musculis inseruntur, trajecit. Plura namq; fecisse foramina, firmitudini ossium non expediebat. Ubi igitur prædicti nervi ad oculorum cavitatem perveniunt, uterq; eorum ad nuncupatum malum fertur, perforatis rursus illic, quæ sub oculis sunt, ossibus, transitumq; ei præbentibus, ne contingens musculos, aut offendar illos, aut ab eis collidantur: ac sic deniq; in regionem sibi è directo correspondentem dispergitur. Ergo si exortus illos, qui ad nares feruntur, non numeremus, ceu à quibus nullæ nervorum productiones oriantur. Prima conjugatio erit, mollium nervorū qui ad oculos tendunt. Secunda, eorum qui oculorum musculos movent. Tertia de qua nuper differebamus, quæ illinc oritur, ubi pars cerebri anterior, cum posteriori connectitur. Quarta nervorū conjugatio, paulò posterius his est locata, magis quidem quam priores à basi emergēs. Propagines autem eius omnes sunt sibiipsis propinquæ. Ac cōmiscetur quidem statim nervis tertiæ coniugationis, cum quibus fertur longissimè: postea tamen sejungitur, totique palati tunicæ inseritur. Exigui porro admodum sunt hi nervi, nervisq; tertiæ coniugationis paulò duriores: quia tunica quæ os vestit, durior est, non lingua modò, sed etiam aliis propemodum omnibus faciei partibus. Ob id etiā producuntur ex paulò duriori regione cerebri, quam nervi tertiæ coniugationis. Quanto enim magis retrò progredimur, tanto seipso durius effectum cerebrū cernimus. Atq; etiam partes quæ ad basim ipsius pertinet, aliis duriores existunt. Quinta mollium nervorū conjugatio, productiones eas continet, quæ à lateribus capitis, versus ossa lapidea extenduntur. Earum autem utraq; dividitur in ipso per ossa trāsitu, in duas partes: quarum major quidem in meatū auditorium inferitur: minor verò extra craniū in cæcum nuncupatum foramen, quod tamen cæcum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Est & sexta alia nervorum conjugatio, à basi cerebri productorū, qui nondum etiam sunt duri: omnibus tamen prædictis tanto duriores sunt, quanto spinali medullæ propiores. Hæc enim durorū nervorum principium est, ob idq; cerebro est multò durior: et quo magis deorsum progreditur, eo durior semper seipsa evadit. Descendunt autem hi nervi usq; ad os latum, quæ spinæ extremitas est, in omnia ferè intestina & viscera distributi, quòd nimirū ea, mollia quum sint, voluntarioq; motu privata, molles nervos desiderent, ne omnino sensus maneat expertia. Ventriculo tamen præcipuè tales erant ex usu, ut cui adesse exactissimum sensum deficientis cibi, & potionis, maximè conveniebat. Quare horum nervorū pars maxima in ipsum distributa videtur, & potissimum in partes ori eius circumjacentes, quæ ob id sensu acutissimo prædictæ sunt, atq; ijs qui vehementer esuriunt, cōtrahi & convelli sentiuntur. Ne autem nervi hi, molles quū sint, per longum iter deducti, periclitarentur atq; in discrimē veniret, membranis for-

tibus ipsos obduxit natura, corporibusque propinquis connexuit, quæ multa descenditibus illis occurrunt. Quæ connexio plerunq; illis etiam corporibus cōmodum adfert non contemnendum: quemadmodū & septimæ coniugationis nervis, quos quidem copulatos illis qui à sexta cōiugatione oriuntur, simulatq; capitis osse excesserūt, membranis fortibus circumdedit natura, ad unguemq; undiq; cōmunivit, utrisq; cōmuue hoc cōmodum machinata. Quippe nervi conjuncti, copulatiq; quàm simplices, multò tutiores ab injuriis existūt. Porro verò quàm nervos septimæ coniugationis ab ipsis (ubi paululum erant unā cum illis progressi) sejungere ad linguā esset necesse, rursus eos cum arteriis carotidibus junxit, per totumq; cum illis collum traduxit, cōmunihus colligatos membranis. At in thorace, quū arteriæ ad sinistrum cordis ventriculum tenderent, rursus eos separavit, ad dextrū quidem in lævam, sinistrum autem in dextram ventriculi partem, utrunq; obliquo ductu insertavit, id quod longè erat tutius, quàm si rectā descēdētes, postea in ventre divisi fuissent. Porro illinc nervi septimæ coniugationis oriuntur, ubi & cerebrū desinit, & spinali medullæ est initium, progressi quadantenus unā cum nervis sextæ coniugationis. Post autem ab ipsis sejuncti, parte quadam sui, eademq; minima, rectos laryngis contexunt musculos: majori verò, in totam linguam disseminantur.* In universum autem, ex nervis hi existūt primi, qui exquisitè sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorū, nullus similiter durus est ac hi nervi. Jam verò in musculos oculorū, etsi prorsus minimos, magni tamen nervi inseruntur, quòd cōsistentia ij sint molliores, quàm motoris conveniat. Utriq; etiā musculo temporali, tres infiguntur nervi: duo quidem à tertia coniugatione (de quibus loquuti sumus) tertius autem durior, de quo mox verba faciemus. Musculi quoq; genarum, narium, ac labiorum, ut mole, sic etiam duritia, mediocres nervorum productiones recipiunt. Quum enim per ossa longius ferantur, ex viæ longitudine ipsis durities accedit. Nervi igitur qui linguam movent, neq; produci aliunde cōmodius potuissent, nec via uti opportuniore, quàm qua nunc utuntur. Etenim sensifici nervi, simulatq; inseruntur, amplificati, tunicā linguæ externam contexunt, subjectos musculos ne attingentes quidem.* Hi autem motorij, qui ad septimam coniugationē pertinent, tenues quidem, sed validi, atque in multas fibras soluti, omnes linguæ musculos texunt, idq; meritò. Illis quippe saporis dijudicat, his autē lingua movetur: quas actiones duas non poterat altero genere nervorū præstare. Quum igitur quinta illa (quam memoravimus) nervorum copula, ex obliquis capitis partibus in ossa lapidea emergens, à duobus foraminibus inæqualibus duplex facta excipiat, eiusque grandior portio per foramen latius rectā ad aures feratur: minor verò, in angustius, quod cæcum vocant, illapsa per foramen quoddam, quod juxta aures est, penetret, viaq; omnis media inter huius nervi principium internum, atq; finem externum, variè instar labyrinthi tor-

Septima coniugationis nervos, cum illis qui à sexta oriuntur, copulavit natura.

Arteria carotides.

Nervorum sexta coniugationis in ventriculum obliqua implantatio.

Septima coniugationis nervi unde exoriantur, & in quas partes disseminantur.

Septima copula nervi, sunt primi exquisitè duri.

Temporali musculo utriusq; tres nervos infigi.

Lingua nervi sensifici.

Lingua motores musculi à septima oriuntur coniugatione.

queatur

Lapideū os.
Nervorum
mollisiei ac
durisiei a-
stimanda
methodus.

Nervos du-
ros, ad motū:
molles ad
sensum esse
optimē com-
paratos.

Cerebrū est
nervorum o-
mnium mol-
lium origo.

Labiorum
nervi unde.

Dentes om-
nes à tertiā
nervorū con-
jugatione ac-
cipiunt pro-
pagines.
Gingiva.

Latus mu-
sculus.

Frontis cutis

queatur, sanè per hunc labyrinthum, durum il-
lum nervum produxit, qui maxima quidem sui
parte latum buccarum aperit musculum: exigua
verò, quæ reliqua est, nervis à tertia conjugatio-
ne, ad temporales musculos pertinentibus, opi-
tatur. Ad cuius quidem generationem & de-
ductionem, os illud lapideū fuit maximè & op-
portunum, & aptum. Duos porrò mihi nervos
conciplas, unum quidem omnium durissimum,
alterū contrā mollissimū, ac deniq; tertium in-
ter utrunq; medium ad æquilibrium. Qui igitur
inter medium hunc sunt & durissimum, omnes
simul duros: reliquos verò alios, qui ab eodem
medio sunt usq; ad mollissimū, appelles molles.
Ac duros quidem ad motū esse optimè compa-
ratos, ad sensum contrā ineptissimos, iudices.
Rursus mollibus esse ad sensum aptitudinē ex-
actiorem: sicuti imbecillitatem ad robur actio-
nis. Nervorum igitur omniū durorum principiū
est spinalis medulla: durissimorū autem, eius fi-
nis inferior. Cerebrum verò est omnium nervo-
rum mollium origo: ut mollissimorum, quod in
medio anteriorum eius partiū consistit. At sub-
stantiæ mediorum nervorum principium ea re-
gio est, quæ cerebrū & spinalis medulla jungun-
tur. Cæterum mollium nervorum, alii quidem
procedentes siccescunt, ob idque motorū eva-
dunt: alii verò perpetuò propriam naturā reti-
nent, ut qui ad ventriculū deferuntur, quos sen-
sificos semper manere oportebat. Rursus, ner-
vorum tertiæ conjugationis, qui ad ossa quidem
maxillæ inferioris * descendunt, magnosq; den-
tes * prætergrediuntur, ij exiccati, & duriores
effecti, juxtaq; dentes caninos elapsi, in labiorū
musculos disperguntur. Qui verò per oculorum
cavitates ad malarum ossa pertinet, adeo etiam
duri sunt redditi in trāsitu, ut eos musculos mo-
veant, qui in superiori maxilla, & in narium alis
consistunt. At gingivæ, dentesq; omnes, nec non
tota cutis faciei, cum tunica narium interna, à
tertia nervorum conjugatione recipiunt propa-
gines, * sed molæ quidem conspicuas & magnas,
per eam viam, quæ per genam deducitur: gingi-
væ autem & reliqui dentes, tenues & vix conspi-
cuas. Ab his verò nervis, qui ex regione oculo-
rum ad musculos temporales ascendunt, palpe-
bræ, & quæ circa supercilia sunt omnia, & frons
tota nervos recipit. A nervo autem qui ex cæcis
foraminibus excidens, temporalibus obscuram
mittit distributionem, feruntur quædam propa-
gines ad glandulas & partes illas quæ juxta au-
res sunt, atque adeo ad partes maxillarū tenues.
Maxima tamē eius nervi pars maxillarū motum
ad latera efficit per latum musculum, de quo po-
stea dicendum est. Ipsa verò cutis pilosa, sensus
gratia duntaxat, propagines paucas & tenues,
instar araneæ filorum, ex omnibus subjectis re-
cepit partibus. At cutis frontis, quod motus vo-
luntarii sit particeps, coeatque cum subjecta illi
musculosa natura, eodemq; cum illa motū mo-
veatur, fibras nervorum conspicuas adepta est.
Porrò labiorū cutis adeo coalescit cum muscu-
lis, ut nec musculum, nec cutim vocare queas,
quod ex utrisq; conflatum est: quæ constructio
ad illorum exactam conniventiam & diductio-

nem requirebatur. Iam verò per foramen illud
quod cernitur in majori oculi angulo, nervus,
haudquaquam exiguus ab oculorū cavitate ena-
tus, in internam narium membranā, atq; in pala-
tum etiam (cuius tunica crassa meninge prola-
psa, per foramina oris & narium orta quum sit,
ori ac narium membranæ est cōmunis) dissemi-
natur. Porrò crassa meninx, tum futuris, tum for-
tissimis ligamentis, cum supernis cranii parti-
bus atq; obliquis connectitur, ut minimè cere-
brum comprimat. Partibus verò anterioribus
per exigua quædam ligamenta, atq; imbecilla co-
hæret: ubi nullam membranam producit, qua-
lis partibus superioribus est pericranios tunica.
Ad basim autem, ubi crassior est, paucis etiam il-
li & imbecillis ligamentis fuit opus, quum suo
pte nutu deorsum semper feratur. Cæterum in
eadem basi portionē quandam à se productam,
retiformi plexui substravit, ne scilicet à subje-
ctis ossibus cōprimeretur. Conflatur aut ex mul-
tis ossibus cranium, ut si quando confractum
fuerit, rupturæ eius per totum non progredian-
tur. Verum cum caput veluti prælonga quædam
sphæra sit, jurè una quidem sutura recta per me-
dium ipsius à posterioribus ad anteriora est ex-
tensa: duæ autē transversæ hanc excipiunt: qua-
rum posterior quidem labdo^{des}, anterior cor-
onalis vocatur. Fitq; ex illis tribus futuris figu-
ra * T. literæ similis. In acutis ramē & turbinatis
capitibus, non omnes ex futura cernuntur. Sicut
autem in universum tres capitum acutorum fi-
guræ. Prima est, ubi caput anteriorem simul &
posteriorem eminentiam amisit. Duæ verò aliæ
figuræ sunt, quarū altera quidem in fronte, alte-
ra rursus in occipitio nullā eminentiam habet.
At futura capitis rotundi & sphærici, X. græcæ
literæ sunt persimiles. Ubi caput in occipitio nul-
lum habet tumorem, perit labdo^{des} futura, re-
cta & coronali manente, ex quibus constat fu-
tura instar literæ T. Similiter cum frontis emi-
nentia perierit, dispungitur coronalis, relictis re-
cta & labdo^{des}, quæ literam J. reversam con-
stituunt. At verò quæ à media futura æquidi-
stant, & ad utranq; aurem constitutæ, secundum
capitis longitudinem deferuntur, rectè squamo-
sæ agglutinationes vocantur: quum non hîc ut
in futuris ossa sese mutuò ingrediantur, sed ex-
tenuata in subtiles quasdam squamas, ad majorē
firmitudinē earum partium, supra ossa descen-
dentia applicentur. Ossium autem in tempori-
bus compositiones atq; structuræ, sicuti & quæ
in superiori maxilla cernuntur, futura mihi pla-
nè esse videntur.

GALENI PERGAMENI de usupartium, Lib. X.

Quod autem in parte corporis anteriore,
in quam movemur, præstitit oculos col-
locari, eosq; geminos esse, nemini obscu-
rum existimo. Cæterum non insunt oculi poste-
rioribus etiam capitis partibus, quia ab illis ori-
ri nervi molles non poterant, quales in utrunq;
mittuntur oculū: ad quos quidem dum per os-
sa contendunt, densantur & compinguntur. Ubi
verò

Crassam
ningem e-
connexa
nio.

Retiformi
plexum
pere produ-
ctionē qu-
dam à cra-
nium
meninge
Cranii
ex plurib
ossibus co-

Sutura ce-
bri.
* *

Capitū an-
terioris fig-

Squamosæ
agglutinationes

Opticorū
nervorum pro-
gressus.

verò ad illos pervenerint, amplificati denuò, in orbemq; humorẽ vitreum complexi, sese in crystallinum humorem inserunt, qui existit primũ videndi organum: id quod planè suffusiones ostendunt, quæ inter humorem crystallinũ & corneam interjacentes, impediunt visum, quoad deprimantur. Humor autem crystallinus, qui albus est atq; splendens (hac enim sola ratione, à coloribus immutatur) ab humore vitreo nutritur, qui quanto crassior & candidior est sanguine, 10 tãto à crystallino humore relinquitur humiditate & albedine. Hic enim albus est planissimè, ac mediocriter durus: vitreus verò, humidus quidem est, instar vitri cujusdam fusi: albus autem, albedine quadam adulterata. Quum igitur in neutro horum humorum sit vena, verisimile est utrunq; per transumptionem nutriri: crystallinũ quidem à vitreo, vitreum autem ab amplificata illa retiformique productione, quæ ipsum ambiens, duos usus præstat: primum, ut crystalli 20 ni alterationem persentiat: secundum, ut plurimis arteriis & venis (quas ducit portio tenuis meningis) referta, vitreo humori alimentum adferat. Ipsa autem productio choroidis tunicæ, nõ solum corpus illud retiforme alit, sed quibusdã filamentis tenuibus à se productis etiam tegit & colligat. Cæterum ubi primum nervus in oculum ipsum inferitur, natura ab eo utraq; productiones membranarũ abducens (quod nusquam in alijs nervis molita est) easque crassas ac duras 30 efficiens, duram quidẽ meningem ossibus alligavit, choroidem autem solam divagari permisit. Quæ quidem tunc destituta suis vasibus, ac paulò post, à supernis omnibus locis, quamplurimas vasorum immissiones recipiens, revertitur tandem, immensam quandã vasorum tenuium, sibi ipsis propinquorũ, copiam, veluti ex foro adferens: cum quibus omnibus rursus in superiorem productionem inferitur. Ubi autem productio 40 ipsius nervi in humorem crystallinum se inseruit (cujus nimirum gratia descenderat) neutiquam amplius progreditur: quandoquidẽ illic hærens, affectuũ illius verax crebro esse nuncius potest. Verum enimverò quum ipsa insertio in medium crystallinum humorem (qui sphaericus est) undiq; facta sit, necessariò maximus in crystallino circulus describetur, illum in duas partes 50 dividens. Omnium siquidẽ quæ rotundis corporibus connectuntur, sed maximum in ipsis circuli connexio est tutissima. Ad hunc igitur circulum consentaneum erat humorem vitreũ motu ulteriore inhibere. Quocirca medius * in ipso vehitur crystallinus humor, quasi semisecta quæpiam sphaera in aqua. Ab altera etiã interna parte ipsius crystallini humoris, quæ illius veluti hemisphaerium existit, firmitatis gratia * humores ipsos circulus unus maximus omnium conjunxit: qui quidem utrique terminus existens communis, ligamentũ his ipsis efficitur, & præterea corpori retiformi, & quarto ipsi choroidi tunicæ: 60 quæ etiam ut ægrius afficeretur, à crassæ meningis tunica, ut in cerebro, ita hic quoq; circumvestitur. Nam quũ hæc ab ea in alijs omnibus partibus, præterquam in vasorum productionibus, distet, cum illa tamẽ in hoc memorato circulo

jungitur. Quæ quidem quinta conjunctio præter illas quatuor in uno loco prædictas, subjectas partes munit, tegit & roborat. Dura igitur meninx tutò choroidi est applicita: hæc verò retiformi: retiformis deniq; vitreo & crystallino humoribus: illi quidem, per totum ipsum: huic autem per solam iridem. Itaque per corpora media humor vitreus illi tunicæ omnium extimæ, durissimæq; est unitus. Propè ad illum eundem 70 circulũ extrinsecus alia quædam tunica accedit, quæ se in duram illam membranã insinuans, sextam insertionẽ facit, ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ (hoc est, dissolutione nervea) musculorũ oculos moventium, existens. Septima autẽ præter has omnino est alia, scilicet periostrii insertio, quæ totum sanè oculum cum ossibus colligat, simulque moventes ipsum musculos operit. Ac cernitur quidẽ membrana hæc, candida: definit verò in circulum, cui alix omnes subjectæ sunt, ubi albũ nigro conjun- 80 gitur: qui locus tum iris, tum corona appellatur. Quod si hæc dissecueris probè, circulos videbis hic septẽ, sibiipsis deinceps mutuò insidentes, crassitie tamen & colore discrepantes: ut ne si velis quidem, locum hunc aliter quàm irim appellare queas. Ac primum quidẽ circulũ circa mediũ crystallinũ, vitreus humor facit. Secundum, retiformis membrana. Tertium, choroides tunica. Quartus circulus est, qui illa simul comprehendit & colligat. Quintum addit tunica orta ex crassa meninge. Sexum, quam diximus aponevrosim esse. Septimũ deniq; circulum circum- 90 scribit tunica, quæ à periostrio deducitur. Jã verò ipsam meningem duriorẽ, quæ choroidem (ut dixi) complectitur, ad anteriorem crystallini humoris regionem ipsa natura producens, partem eius maximè mediam, longè tenuissimã ac densissimam fecit, cornibus extenuatis persimilem: unde ea ceratoeides, hoc est, corniformis vocatur, existens instrumenti visorii fortissimum propugnaculum. Tenuis igitur, dura, & densa cum 100 esset facta hujuscemodi ceratoeides tunica, protinus utique erat futura splendida, ad splendoremq; transmittendũ opportunissima, perinde ut cornua ad amussim polita & derasa. Quod summum artificium naturæ, ut cunctis admirari licet, sic imitari nemini. Quamquam multò facilius est invenire aliquid, quod animadversum non fuerat, in iis quæ facta jam sunt, cavillarique, quàm inculcata omnia à principio construere. 110 Quia verò periculum erat, ne ipsa tunica cornea laboraret alimeti penuria, aut duritie sua humorem crystallinũ collideret: aut deniq; immissam oculis supernè visoriam facultatẽ (cujus substantia est splendida) suo splendore discuteret, his incommodis omnibus natura perfidio unico occurrit, quod declarabimus postea. Quod autem vehementi splendore oculi nostri offendatur, docuerunt id quidẽ milites Xenophontis, qui per multã nivem iter facientes, vehementer læsi oculis fuerunt. Experti sunt etiam id illi miseri, qui ex obscurissimo carcere in splendidissimam domum, calceq; illitam, & lævigatam, à Dionysio tyranno repente ducti subito occæbantur, minime repentinum illum occursum splendidæ lucis ferentes. Quare meritò sanè pictores, quum

Oculi humoribus quæ productiones incumbant.

Απὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ musculorum moventium oculos.

Periostrii insertio.

Iris. Circuli ad irim oculi, septem, quem servant ordinem, & à quibus oriuntur.

Ceratoeides tunicam gigni à crassa meninge tenuiori redita.

Natura artificium admirari, non imitari possumus.

Oculi offenduntur à vehementi splendore.

Xenophontis milites.

Dionysii tyranni inclamentia.

Dictores fuscis & cæruleis coloribus recreare atque reficere usum.

Ophthalmia laborantes offendit lux & couergit.

Astra videri à nobis per defectus solis insignes: quæ etiam cernimus ex profundissimis puteis.

Flammula sub ardenti sole marcescit, extinguiturq; prope maiorem flammam.

Choroidis tunica origo & colores.

Choroidis tunica usus.

Palpebras cur claudamus, ubi splendor nos laesit.

Ragoides tunica.

Choroidis tunica foramen.

Splendorem oculi internum, cum externo misce-ri.

Albuginæ humoris usus.

Suffusionum purgandarum ratio.

Oculo uno clauso, amplificare al-terius pupillam.

Mortuo animali cur sit laxa pupilla.

pingunt in coriis albis, à quibus visus offenditur, colores fuscis ac cæruleos opponunt, in quos subinde intuentes, recreant atque reficiunt oculos. Similiter ophthalmia laborantes offendit lux & * redarguit: qui tamē fusca & cærulea sine dolore intuentur. Percipere etiam clara nos à longinquo cupientes, ad supercilia manus ob- tendimus. Quare in magnis solis defectibus stel- læ nobis apparent, quas cernimus etiam ex pro- fundissimis puteis, potissimum quando non est sol in meridie. Quod si solem ipsum explicatis oculis intueri velis, illos celeriter perdes: quem- admodū contingit multis, qui post eclipsim so- lis, fixis oculis ipsum quū intuerentur, nosse affe- ctum eius cupientes, prorsus sunt occæcati. Ete- nim si flammulam quandam exiguam in sole lu- culento constituas, marcescet: imò extinguitur etiam, si eam propè aliam maiorem flammam lo- caveris: quum minor lux à maiori vincatur sem- per, ac dissipetur. Ne igitur crystallini & vitrei humoris splendor, à splendore corneæ discute- retur, natura ipsam choroidem tunicam, à tenui meninge ortam, ex iride unā cum cornea pro- movens, multis partibus illam tum nigram, tum fuscā, tum cæruleam, extrinsecus autem den- sam effecit, quo videlicet tres prædictos usus præ- staret: nimirum corneam sibi vicinam alens, ean- demque ne humori crystallino incideret, prohi- bens: ac visui deniq; affecto spectaculum medi- camentosum existens. Quæ causa est, ut omnes natura duce, quum lucis splendore offendimur, palpebras repente claudamus, properantes ad naturale remedium. Cæterum humida & mollis instar spongiæ quum sit, qua parte humorē cry- stallinū cōtingit, ipsa choroides tunica impedi- mento est, quo minus asperitas retiformis mem- branae, aliqua ex parte illi noceat. His omnibus admirabilior est tunica huius cæruleæ (quæ ra- goidem etiā, hoc est, uniformē appellat, idq; aci- no uveæ levitatē eius externam, & asperitatem in- ternam, haud perperam comparantes) pupillam versus, formam. Ea siquidem in centro sui est pertusa: & quā hoc duntaxat foramen consistit, nulla tunica alia est inter corneā & crystallinum media: sed veluti pertenuē admodum & candi- dum cornu, splendor internus cum externo cō- municat, commisceturq; Ut autem quā foramē, hoc est, cornea tunica ne utiquam humorem cry- stallinum contingeret, portionem ipsius natura longius foras abduxit: simul autem humorem quendam syncerum & tenuem (cujusmodi inest ovis) crystallino ipso obduxit: spirituq; aëreo & splendido, omnem pupillæ locum opplevit. Id quod ex suffusionum compunctionibus discas. Nam quum suffusiones omnes loco inter cor- neam & crystallinū medio consistent, instrumen- tum quod deducturum eam per externū angu- lum oculi immittitur, in orbem & quoquo ver- sum circumactum, neutrum illorum corporum tangit, tanquā magna à se invicem distent inter- capedine. Porro si alterū oculorum clausimus, alterū aperientes, amplificatā & dilatatā, ac ve- luti inflatā pupillā cernemus, quod illuc major copia spiritus confluat. At in mortuo animali, vel si humor tenuis evacuatus non sit, laxa tamen

pupilla videtur, quod nimirū spiritus quidē ipse levior & tenuior existens, facile ante anatomen evacuetur: humor autem adhuc remaneat, sen- sibilem evacuationem postulans. Iis præterea qui maximē sunt ætate provecti, ob spiritus su- perne affluentis inopiam, adeo cornea tunica corrugatur, ut alii quidem prorsus nihil, alii ve- rò malē, ac vix adhuc videant. Affectus autem quem φθίσιν appellant, quiq; alteri oculorum * ut pluri- mum accidit, solius est imminutæ pupillæ, nihil cornea privatim affecta. Spiritus igitur ipse, lu- cidus omnino quū sit, ad oculorum etiam actio- nem confert: humor verò, præter dictum à no- bis usum, hoc etiam præstat, ne crystallinus hu- mor ac portio uvæ interna exicceretur. Siquidem crystallini exiccatio γλαυκωσιν morbum inducit, à quo cæcitas vel maximē oritur. Propria ipsius crystallini humoris tunica, & quæ partem illius anteriorem vestit, araneis tenuibus est subtilior & albior: in qua quidem ipsius pupillæ imago, veluti in speculo quodam conspicitur: quan- doquidem levis est hæc tunica & fulgens, supra omnia specula. Quod verò naturali huic crystal- lini operimento est proximum, venosum, mol- le, nigrum, atq; pertusum est. Venosum quidem, quò corneā abundē nutriat. Molle autē, ne con- tactu suo humorem crystallinum afflicteret. Ni- grum, ut splendorem colligat, atq; ad pupillam transmittat. Pertusum deniq; ut quem transmi- sit splendorem, foras emittat. Quod autem om- nium est extremum operimentum ac propugna- culum, tenue, album, ac durum est, quasi cornu. Tenuē quidem & album, ut splendorēs prom- ptē transmittat: durum, ut tutò conseruet. Porro crystallinus humor nō fuit factus omnino sphæ- ricus, ut & circulos coalescentes in iride facile admitteret, & per violentas plagas aut motus, minimē exturbaretur à vitreo. Conexiones quip- pe ac sedes in absolutē rotundis, sunt fallacio- res, quā in planioribus. Quia verò cornea tu- nica maximē exposita erat injuriis extrinsecis: ob id illam natura, quamvis ex se robustissimā, palpebris, ciliis, circumjacentibus ossibus, atque etiam cute munivit. At cilia quidē, quasi vallum quoddam pilorū propulsandis exiguis corpori- bus, ne facile oculis apertis inciderent, primo lo- co constituit. Palpebras verò ipsas, tanquam scu- ta quædā, ut simul coirēt atq; cōplicarentur, ocu- lumq; clauderent, si quid fortē majorū corporū in ipsum illaberetur, apposuit. Porro adversus majorū ad hoc molū incursum, supernē quidem supercilia locavit, infernē autē malas: ad mayo- rem angulum, nasum: ad minorem deniq; pro- ductionē ossis jugalis. A quibus omnibus ocu- lus in medio comprehenditur, atq; illæsus serva- tur, cutis motu ad patiendi difficultatē non me- diocriter conferente. Quum igitur ex dura qui- dem omnino substantia, sed quæ moveri facile, & cum cornea versari sine eius noxa posset, palpe- bras fieri esset consonū, atq; etiam connecti ossi- bus: membranā quam αἰθρία vocant, à superci- liorū labiis natura abducens, in longitudinemq; tantam producens, in quantam palpebras exten- di oportebat, rursus eam per partes palpebrarum infernas, internāsve reduxit, illamque non ad principium

Phthisis oculi.

Spiritus oculi.

Γλαυκωσιν Arachne des tunics.

Choroides tunica natura & usus.

Cornea causa.

Crystallini humor non sit factus omnino sphericus.

Conexiones in exquisitis rotundis fallaciore: quā in planioribus.

Ciliorum usus.

Palpebrarum usus.

Superciliorum usus. Mala. Nasus. Os jugale.

Palpebrarum constitutio.

Αἰθρία.

principium unde emerfit, sed ad subjectos tali principio musculos, qui utique oculos movent, applicuit: indeq; ad iridem usque produxit, ubi ipsam in corneam tunicā insertavit. Spatium verò inter duas portiones perioestii corporis medium, viscosa atque unctiosa occuparunt, cum membranis quibusdam à masculis ipsis extensis: quo loco quas vocant *υδαϊδας* gigni contingit. Ad portionē autem hujus constructionis, palpebræ inferiores conflantur, à malarū perioestio, quadantenus quidem extenso, revertente autē rursus ad corneam. Qua parte verò hæc perioestios remeare incipit, substantia quædam membrana durior adtensa est, quam *πύκνον* nominant, constringens quidem & comprehendens, quod convexum efficitur ex ejus duplicatione: sedem autem atq; extensionis rectitudinem palpebrarum pilis suppeditans, propter innatam sibi duritiem. Nam quemadmodū superciliorum pilos, utpote excepturos quod à fronte atque à capite defluit, sibi ipsis incidere mutuò præstiterat, ita hos & rectos, & tenso, pariq; & convenienti intervallo dispositos, nec non antrorsum vergentes, semper conservari expediebat, ut qui pulverem, & animalcula volitantia, ut minus illaberentur oculis, essent prohibitori. At quā oculi nō ex quavis positione visibilia omnia cernere possint, sed illud duntaxat cernant, quod ipsi pupillæ est directum, ob id natura sic disposuit eos, ut possent plurimum circumagi: & cum ipsis totum collum ad motū habile fecit. Qua de causa etiā, non unū, sed geminos oculos cōdidit. Postquam igitur oculorum motus voluntarii sunt quatuor: unus quidem quo sursum, alius autem quo deorsum, ac duo etiam quibus adducuntur ad latera: consentaneū fuit, & musculos, qui motum illorum duces essent, totidem esse numero: duos quidē à lateribus, nempe unum utrinq; consistentem: alios autem duos, quorum unus est infernus, alter supernus. * Dissoluti nanq; hi omnes in nervosa filamenta, circulum unum efficiunt lati tendonis, in iridem desinentis. Quum verò oculū circumagi esset melius, natura duos alios musculos, positione obliquos effecit: singulos in singulis palpebris, versus minorē angulum supra atq; infra extensos: quorum beneficio oculum, quoquo versus torquemus. Est & alius quidam musculus magnus circa eorū radicem: constringens quidē ac muniens nervi illius mollis immisionem, ne disrumpatur: oculum autē attollens sursum, ac deorsum contrahens, non nihilq; etiam convertens. Cæterum quum partes omnes quæ motu voluntario sunt præditæ, duobus ut minimum egeant musculis sibi ipsis oppositis, altero scilicet extendente, atq; flectente altero (nō potest enim ab uno uterq; motus præstari) superiores autem palpebræ motu voluntario moveantur (inferiores quippe ne moventur quidē) natura duos exiguos musculos singulis eorū applicuit, sub membrana quæ cuti subjacet, atq; à nervosis tenuitatibus tarfi extenditur, delitescentes. Quorum sanē musculorū, alter quidem in majori angulo apud nasum constitutus oblique, ad tarfi partē dimidiam, quæ illic est, pergit: alter verò totus & ipse obliquus, & ad mi-

norem extensus angulum, ad reliquam tarfi partem dimidiam sibi propinquā prorumpit. Dum igitur prior musculus agit, quum caput eius ad majorem angulum constet, partem palpebræ sibi continuam deorsum trahit. Dum verò alter, reliquā sursum attollit: ut cuius caput ad supercilium spectet. Trahunt enim musculi versus proprium principium. Quod si uterq; eodem tempore tendant, oculus non magis erit apertus, quàm clausus: quā eversionem palpebrarū in morbis, Hippocrates *ύλασι* nominat, illam dicens esse signum perniciosissimum. Fit autem affectus in utroq; musculorum convulso, partemq; tarfi continua ad seipsum trahente. Cæterum si alter quidem musculus agat, altero prorsus cessante, aperiri & claudi totam cōtingit palpebram, quum pars altera tarfi, quæ movetur, semper unā secum trahat & reliquam. Cuius causa est durities quam illi dedit natura, durum ipsum & cartilagini notum efficiens, in omniq; utriusque musculi finem inferens. At palpebra inferior minor superiori est constructa: nam si major fuisset, compleretur, atq; in seipsam recideret, plurimāq; excrementa colligeret. Non indiget autem motu, quia pusilla & exigua est. Porro ad utrumq; foramen, quod iuxta magnum angulū est, per quod oculorū excrementa expurgantur in nares, natura carunculam quandam veluti operimentum apposuit, cuius beneficio contingit, ut excrementa oculorum minimē quidem vacuentur per angulos, ad proprios autem impellantur meatus. Confluunt siquidem per foramina illa, in ipsum os atq; in nares ab oculis excrementa. Unde medicamenta ocularia, non multo post inunctionem, alij quidem expuerunt, alij verò emunxerunt. Quam ob rem qui carunculam illam nervosam, quæ juxta utrumq; angulum est, pharacis acribus colliquantur, aut resciderunt, ii chirurgi effluxum excrementis ea parte aperuerunt: quem affectum vocamus *ποιάδα*. Sunt in palpebris paulò extra majorē angulum, tenuia quædam alia foramina, pertinentia usque ad nasum: quæ quidem tenuem humorem dant vicissim, accipiuntq;, ad symmetriam naturalem servandam, duæ motuum præstat agilitatem: ad quam similiter perficiendam, glandulæ etiam quæ in utroq; extiterunt oculo, altera infernis, altera supernis partibus hærens: quæ meatibus non obscuris, humidū in illos effundit, perinde ut glandulæ, quæ linguae radici adiunctæ, salivam in os derivant. Humectandi etiam eos gratia, pinguitudo est oculis circumfusa. Jam ipsi nervi sensibiles (quibus solis viæ spiritus conspicuæ ac sensibiles insunt) ex diversis quidem locis cerebri proficiuntur: progressi verò (essem enim in divinis instrumentū iniquus, impius aut in conditorem ipsius, si hæc prædictis non adderem) sibi mutuò cohærent: ac postea rursus à se invicem digrediuntur, & instar literæ X. separantur, idq; minimē cōmutati, aut intersecti à se invicem sed cohærentes primò, ac post uterque ad regionem propriam diducti, sic, ut ob aliud nihil cōvenisse videatur, quàm vt meatus suos coniungerent. Ut autē modū quo fit visio percipias, intelligito circulum ab oculo tantum oculorū cer-

Palpebrarū motus.

Musculi semper trahunt versus proprium principium.

Ηύλασι quo pacto fiat.

Palpebra inferior cur superiorem miretur, motusque expers.

Oculorū excrementa qua parte expurgantur in nares.

Ποιάδα.

Glandularum oculorū usus.

Glandula linguae adiacens.

Opticis nervis solis inesse meatus sensibiles. Opticorum nervorū conspiratio in unum, diductioque.

Visionis modus.

*Circulus
quid.*

Centrū quid

Conus.

Axis.

*Lave, medi-
um esse inter
convexum et
concavum.*

*Visionem fie-
ri per rectas
lineas.*

*Visionem so-
lis radijs as-
similari.*

*Videri nihil
solum, aut
nudum.*

*Visus hallu-
cinaciones.*

*Pupilla alie-
rius oculorū
compressa, ap-
parere dupli-
cia, quæ an-
tea simplicia
erant.*

*Optici nervi
cur intracra-
nium quidē
iungantur,
postea autē
divaricen-
tur.*

ni. Est enim circulus figura quæ à medio undiq;
distat æqualiter. Ab eius autem puncto medio
(quod centrum dicitur) usq; ad pupillam viden-
tem id, rectam duci lineam existima, quemad-
modum plures alias & similes duci à pupilla ad
ipsam circumferentiā. At figuram quæ ab his om-
nibus rectis lineis circuli circumscribitur, conum
nomina: cuius verticē pupillā: basim esse circulū
tene. Lineam verò rectam quæ à pupilla ad cen-
trum circuli extensa est, totius figuræ axem ap-
pella. Dum autem intelligis convexum & con-
cavum, intelligis etiam amborum medium, vi-
delicet lave ac planum, cui nihil nec cavitatis,
nec convexitatis inest: cuius superna pars, plana
superficies existit. Quemadmodum igitur si ex
axe ipsius coni, qui à pupilla ad centrum circuli
per aërem protenditur, milii granū aliquod pen-
deat, conspectū centri pupilli eripiet, ita quod-
vis corpus, quod in medio visus & rei videndæ
positū fuerit, phantaturū est, quo minus id, quod
ante oculos est, amplius cernatur. Quandoqui-
dem ut aliquid conspiciatur: opus est id careat
omni caligine, nullumq; inter se & pupillam ha-
beat impedimentū. Siquidē per rectas lineas fit
visio: quæ haud dubiē ipsius solis radijs exciden-
tibus per angustum foramen, prorsumq; semper
recta & citra flexionem tendentibus, assimilatur.
Sciendum autem est, unumquodq; corporū quæ
videntur, nec videri solū nec nudū: sed quippiā
circum ipsum etiam omnino cerni: quum visio-
nes quæ corpus id complectuntur, accidunt in-
terdum iis, quæ ultra corpus videndum sunt. Se-
cundò etiam disce, corpus quod à solo dextro
oculo cernitur, id si propius sit, in sinistris ma-
gis partibus esse putari: sin longius absit, magis
quodammodo in dextris. Quod verò à sinistro so-
lo conspicitur, in dextris situm videtur esse, si id
est propinquius: magis autē in sinistris, si est re-
motius. Quod autem ab utroq; in medio. Ter-
tium præter hæc tibi discendum venit, alterius
oculorū pupilla compressa, sursumve aut deor-
sum adducta, apparere duplicia, quæ antea sim-
plicia apparebant. Cæterum si deorsum quidem
fuerit pupilla detracta, humilior id apparebit,
quod intuebere: contrariū autē, si sursum subla-
ta fuerit. At dum pupillā ad maiore aut minorem
canthum adducimus, facimus ut quod cernitur,
sinistrum magis, aut dextrū appareat, nō tamen
duplex. Est autē necesse axes conorū visoriorum
in uno eodemque plano positionem habere, ne
quod est unum, duplex appareat. Verū prædi-
cta axiomata tametsi rationibus philosophicis,
mathematicisque facillimè comprobari possint,
quia tamen experientia ea omnia constant, bre-
vitatis gratia ab illorū accurata demonstratione
superfedebo. Jam verò quod pori illi optici intra
cranium quidem iungantur, atque in unum con-
spirent, postea autē divaricentur, utilitates duæ
in causa extiterunt: quarum prima ac maxima
necessaria est, ne quod extrā intuemur, appareat
duplex. Secunda, ut si quando alter oculorum sit
clausus, aut omnino mutilus, in alterum, per il-
lum porum communem, universus spiritus con-
fluat. Quippe facultate visoria duplicata eo mo-
do, longè acutior futurus est visus. Quum igi-

tur quæ videntur, secundū rectas lineas videan-
tur: ante humorem autem crystallinum: fora-
men uvæ sit situm, per quod cum suis objectis
erat habiturus commercium: perspicuum certē
jam est, quod figura exactē rotunda, paucioribus
sui partibus, plana autē pluribus, cum suis obje-
ctis communicabit. Quocirca divinus ille archi-
tectus, rotundū ipsum, sed paulò oblongius, cry-
stallini corpus compegit, ut tutior ab ipsis inju-
riis esset, ac simul pluribus sui partibus, species
rerum videndarum exciperet.

*Crystallini
humor cu-
rundus sit
& oblon-
gitus factus.*

GALENI PERGAMENI de usupartium, Lib. XI.

Porro musculi temporales, quum gratia in-
ferioris maxillæ à natura sint constituti, se-
cundum magnitudinē cuius, atq; in mor-
dendo robur, suam magnitudinē atq; structurā
contrahunt: meritò in animalibus quidē iis, quæ
serratos dentes sortiuntur, maximi simul & for-
tissimi habentur: quandoquidem nō solum ma-
gnā, sed validam etiam maxillam obtinent. Ma-
ximi autem, sed nec nervosi, nec in agēdo præpo-
tentes, in asinis, bobus, & suibus, ac breviter in
iis omnibus, quibus magna quidem inferior
maxilla inest, minimè tamen robusta ad morden-
dum. Homini verò, ceu genam parvam haben-
ti, dentesque ad solum esum idoneos (non enim
in morsu, hominis fortitudo consistit, nec denti-
bus domiturus est animantia cætera, sed ratio-
ne & manibus) musculus temporalis, haud inju-
ria, debilis simul & minimus extitit: nimirum
ipsa natura non modò inveniēte quæ oportet,
sed ea etiā cuiq; pro dignitate tribuente: id quod
divinæ justitiæ est propriū. Lynces etiā, sicuti &
cebi, & simia, similiter habent musculos tempo-
rales, exiles simul & imbecillos. Est autem simia
homini quam simillima, illiusq; veluti imitatio
quædam ridicula: ut quæ rotundissimam habet
faciem, dentes caninos parvos, latum pectus,
claves longiores, minimum hirsuta, quæ recta
etiam stat bellè, ut & gradiri sine errore, & cur-
rere celeriter possit. Jam verò quæ animalia pro-
na ore cibū assument, ea ut collū majus, sic pro-
lixiorē habent inferiorem maxillam. Verum-
enim verò quū inter omnes musculos, si tempo-
rales potissimum læsi fuerint, convulsiones, fe-
bres, sopores, deliria, symptomataq; letalia in-
ducant, utpote cerebro existentes proximi (neq;
enim reperitur ipsis quicquam propinquius ce-
rebro, sicuti neq; ullus musculus, qui per plures
nervos ipsi cerebro hæreat) meritò natura eos
propemodum totos, ne faciliē afficerentur ab in-
juriis extrinsecis, in capitis ossibus abdidit, ossa
quidem ea quibus ipsi incubant, excavās admo-
dū, exculpensq; alia aut dura, ac præcipuē quæ
illis præposita, *εὐρυπρόβη* nominantur, rigida, &
medullæ expertia, in orbē quasi septū quoddam
eis circumjiciens: ita & exigua quædam eorum
pars tantum, ad finem frontis emineat. Uterque
autē musculus temporalis in unum tendonem
definens, curvo maxillæ inferioris acumini infi-
gitur: qui si tensus fuerit, sursum eam trahit: ac
sic os animalis clauditur. Sunt tamē alii duo mu-
sculi

*Tempora-
li musculus
gratia inferi-
oris maxillæ
conditi.*

*Tempora-
li musculus
quibus sint
maxillæ.*

*Homini
tudo
consistit
dentibus
in ratione
manibus.*

*Homini
lis & ma-
mus tem-
poralis mus-
culus inest.*

*Iustitia di-
na quid p-
prium.*

*Simia est
minis im-
tio ridicul-*

*Collum q-
prolixiorē
habeant.*

*Tempora-
li musculus
quæ sym-
ptomata ma-
cant.*

*Tempora-
li musculus
nihil propi-
quius cer-
ebro.*

*Tempora-
li musculus
suis, secur-
tanq;
εὐρυπρόβη*

*Os qua
tione clau-
ditur.*

illa in- sculi in inferiori maxilla, utrinq; unus, ambo ve-
 ris mu- rō nuper dictis oppositi. Qui quidem ex poste-
 rioribus oriuntur capitis partibus, quo loco sunt
 quos vocant columnares processus. Maxillæ au-
 tem inferiori infiguntur statim post flexionem,
 ad eum usq; pervenientes locum, qui est ad men-
 tum: unus utrinq; ex internis partibus adhære-
 scens. Qui certē si tensi fuerint, os recludūt, quē-
 admodum temporales claudunt. Alii autē qui-
 dam duo muscoli, ad mandibulę in masticationi-
 bus circumactionē à natura fuerunt comparati,
 qui carnosam quoq; genarū partem constituunt.
 Quorum utrunq; nonnulli non simplicē muscu-
 lum, sed triplicē esse existimant, quod tres ipso-
 rum in maxillam sint insertiones, instar princi-
 piorum quorundam. Uterq; enim triangularis
 existit, habens verticem juxta vocatam malam,
 ubi nervosior est: atq; ex lateribus ipsis, hoc qui-
 dem ad zygomaticis extremitatem hinc exporre-
 ctū, illud autē versus inferiorē mandibulam: ter-
 tium nanq; veluti basis quædam, prædicta late-
 ra partibus inferioris genæ conjungens, secun-
 dum longitudinem ipsius extenditur. Movet
 autem ac circumagit maxillam, alias alias fibris
 & insertionibus, ut motibus aliis alios vicissim
 excipientibus, multiplices fiant actiones in ma-
 sticationibus. Quare haud ineptē hi muscoli ma-
 sticatores vocantur: tamen si ad musculos tēpora-
 les hæc quoq; appellatio pertineat, quod dentes
 inter se vehementer committant, ut si quid inter
 eos fuerit, cōminuatur. Cæterum cibū lævigari,
 atq; in partes minimas redigi à molaribus, qua-
 si à molis, masticatorum musculorum est actio:
 ad quam etiam lingua nō minimum confert, in
 ore cibos assidue volvens, & transferens, quō
 pars ipsorum omnis itidem conteratur. Maximo
 etiam ad eam rem ei sunt auxilio fines buccarum
 inferiores: qui cutacei sunt, spectantq; ad labia,
 ad quos perveniūt tenues ac lati muscoli: utraq;
 parte unus, toti collo circumjecti. Moventur e-
 nim ab his buccæ, cum labiis: etiam si gena im-
 mobilis omnino fuerit. Temporales porro mu-
 sculi, quiq; eis infra oppositi sunt, os aperientes,
 omnibus aliis musculis hac ratione sunt dissimi-
 les, quod ex ipsis quidem temporalibus mediis;
 tendo ille nascatur: qui in coronē sublimem in-
 ferioris maxillæ inseritur: oppositorum autē il-
 lis musculorum partes, carnosæ in principio ac
 fine existentes, nervosæ in medio cernantur: quod
 in nullis aliis reperias musculis. Etenim quū me-
 dium temporaliū musculorū, coronæ quæ mo-
 tū indigebat, esset directum, tendonē jam hinc
 emergere fuit necesse. At quod pertinet ad os
 aperientes musculos, quum ab eo loco produci
 deberent, qui multis instrumentis refertus esset;
 eorum uterque tendo ex carnis circa tonsillas est
 factus. Quandoquidem si crassiores essent, pe-
 netrare præ locorum angustia non possent. Ubi
 verò natura eos extra angustias deduxit, tunc
 jam paulatim ipsos carne circumvestiens, mu-
 sculos rursus effecit. Tria itaq; hæc musculorum
 genera, natura ad os movendum adhibuit: quo-
 rum alii quidē aperiūt, alii claudūt, alii variē cir-
 cumagūt. Suntq; claudentes quidē, maximi om-
 niū: aperientes autē, minimi: magnitudine verò

medii, qui mediam etiam positionē sortiuntur. claudentiū
 Alii muscoli duo ex internis genæ inferioris par-
 tibus, qua ipsa est maximè cava, situm habentes;
 fursum extensi versus os capitis, musculis tem-
 poralibus adiutores sunt dati; ut qui etiā genam
 fursum trahere queant. Cæterum nervorū prin-
 cipiū omnibus faciei musculis, aliisq; propemo-
 dum omnibus ipsis partibus, tertia nervorum
 est coniugatio, qui à cerebro proficiscuntur. Quo
 rum sanè distributio tam recta, sicuti & aliorum
 omnium æquissima dispensatio, non fortunæ
 aut casui, sed arti ac providentiæ deberur. Quod
 verò ad dentes pertinet, duos & triginta in uni-
 versum habeamus, uno ordine, in utraq; maxilla
 sexdecim collocatos: partē quidem anteriore,
 quos incisores appellāt, acutos ac latos, qui mor-
 su possunt incidere. Proximos autem iis cani-
 nos, inferiori quidem basi latos, parte autem su-
 perna acutos: ut si quid propter duritiem ab inci-
 foris minus scindi potuit, id possint ipsi confrin-
 gere. Hos maxillares sequuntur (quos etiam mo-
 lares appellant) asperi & lati, duri ac magni: ut
 incisa ab incisoriis, ac fracta à caninis, lævigare
 plane ac terere queant. Ad hæc inter eos, parvis
 quidem una, duæ autem aut tres majoribus,
 quatuor verò maximis insunt radices. Quorum
 omnium si unum quidvis mente immutaveris,
 utilitatem repentē eorum cernes labefactatam.
 Præterea ipsorum molarium dentium, medii
 quidem maximi sunt: qui autem utraque ipso-
 rum parte locantur, minores existunt: quod mi-
 nimè congruū videatur, angustis quidem oris
 partibus magnos; amplis verò dentes exiguos
 inferi. Quinetiam quum linguam ad radicem ef-
 se oporteret ampliorem, magnos illic dentes mi-
 nimè locari præstiterat. Habet autem utraq; ge-
 na tentes quosdam processus, quorum singuli
 cavitatibus suis, singulos dentes excipiunt, eosq;
 validis ligamentis adeo constringunt & conti-
 nent, præcipue circa illorum radices, quibus etiā
 nervi inseruntur, ut nō faciliē concutiantur. Por-
 rō quod inferni supernis dentibus omnino æ-
 quabiles sint, quodq; dexteri sinistris, ac cavitates
 quidē cavitatibus, quodq; numerus utrorumq;
 sit idem dextris ac sinistris utriusq; maxillæ par-
 tibus, nonne id est etiam æquitatis cuiusdam spe-
 cimen, artisque potius quam fortunæ opus? Ad
 hæc, quod fortibus animalib. acuti multi dentes,
 ac fortes sint comparati, quemadmodum etiam
 ungues: nihil aut in timidis sit huiusmodi, sed ut
 fragiles dētes, ita lati, molles atq; obtusi ungues,
 hoc est magis adhuc admirandū. Verum quum
 leones, canes, & lupi, utrinque multos habeant
 caninos dentes, homo certē unicū partē utra-
 que caninum dentem produxit: cogitante nimi-
 rum natura, se animal civile atque mansuetum
 effingere, cui robur ac vires essent ex sapientia,
 nō ex corporis fortitudine. Quantū igitur ad frā-
 gendum quippiam duriorem videbatur necesse,
 id ipsum duo satis erant præstituri: proinde inci-
 fores plures numero duplo effecit, quod ipsorū
 utilitas latius patebat: & his adhuc plures mola-
 res, q. ipsorū usus pateret latissime. Horum tamē
 dentium numerus definitus non est: sed qui lon-
 giores quidem habent genas, iis quinque insunt
 minimis.

*Molariū den-
tium nume-
rum definitum
non esse: ut plu-
rimū tamen habe-
ri utroque in
latere quinq;*

*Lingua di-
visa serpen-
tibus, cur co-
ierit homi-
nibus.*

*Linguam in
omnem par-
tem moveri
liberè: esseq;
geminam, ut
sensoria re-
liqua.*

*Lingua ar-
teria, vena,
atq; nervi.*

*Musculi uni-
versi trahūt
partes ver-
sus propriū
principium.*

*Glandularū
lingua adia-
centium u-
sus.*

*Lingua & im-
muli inferni
usus.*

*Naturā sar-
cire errores
& vitia co-
rum qui nos
procreant.*

*Genitura
principiū vi-
tiosi ob ge-
nitorum in-
temperan-
tiam.*

*Generatio-
nem primam
negligenter
tractari ab
universis ho-
minibus.*

utrinq;: qui verò minores, quatuor. Maxima ta-
men ex parte, sunt utroque latere quinq; inferior-
es superioribus semper magnitudine & nume-
ro æquales. Porro lingua, quum animalium non-
nullis, utputa serpentibus, sit divisa, in homine
partes eius coiverunt, quod tum ad sermonem,
tum ad comestionē, id esset longè commodius.

Moveretur autem in omnem partem, idque liberè:
quod requiritur ad perficiendas oris actiones li-
beras. Quod si ipsa est gemina, quemadmodum
& reliqua instrumenta sensuum, non alienū fuit
utraq; ipsius parte numero ac magnitudine mu-
sculos esse æquabiles. Pari modo enim & duas
habuit in seipsam insertas arterias, utrinq; vide-
licet unam: duas itidem venas, ac nervorum con-
jugationes duas: unam quidem mollem, alte-
ram verò duram: atque illam sanè in extremam
ipsius pelliculam distributam, hanc autē disper-
sam in musculos: quandoquidem illa conjuga-

tione sapes discerneret, hac motu voluntario
moveri ipsam oportebat. Porro quod sedis ac
firmitudinis gratia, magna ac fortis ad basim
fuit: celeris verò motus causa, ad extremitatem
tenuis: quodq; ab aliis quidē musculorū sursum,
ab aliis deorsum, ab aliis deniq; trahatur ad late-
ra, musculis universis partes ipsas versus propri-
um principiū trahentibus, mihi certè hæc quoq;
cujuspiam esse providentiæ videntur. Sed ne ip-
sa fortè aliquando exiccata, ad motus tardior
efficeretur, quemadmodum ad laryngem, sic na-

tura illi glandulas spongiis similes, unam utrin-
que apposuit. A quibus meatus ducti per obli-
quas atq; inferiores partes, in eam humorem pi-
tuitosum eructant, non ipsam modò, sed omnia
etiā quæ infra illam, in eiusq; lateribus sunt, hu-
mectantes. Superiora siquidem à meatu descen-
dente à cerebro perluuntur. Jam illius ligamenti
quod partibus eius infernis inest, quodq; ipsam
linguā, veluti quoddā frænū, coërcet & tempe-
rat, ne aut nimis cōvellatur à musculis, aut plus

quàm par sit soluta divagetur, quis non admire-
tur symmetriā, atq; cōmodationē? Adeo enim
mensurata est, & certa ipsius cōnexionis cōmo-
deratio, ut si vel tantillū adjeceris, aut ademeris,
totius instrumenti actionem vitiaveris. Est verò
& hoc summè in natura admirandū, quod pecca-
ta & vitia eorū qui nos procreant, ipsa sua in-
dustria resarciat. Ebrii siquidē cū ebriis coeunt:
& qui præ crapula, ubi terrarum sint, nesciunt,

cum mulieribus ita affectis consuescunt. Quo
fit ut genituræ principium, statim ea ratione vi-
tiosum sit: postea verò ob omnimodam intem-
perantiam illius quæ concepit mulieris, in ute-
ro longè deterius reddatur. Attamen adversus
tot errores natura obstitit, eosq; plerunq; corri-
git, sic ut partus mentis compos ædatur. Etenim
quum universi agricolæ primum quidem, cu-
juscumque terræ sua committant semina, diu mul-
tumq; provideant: postea autem admodum e-
tiam caveant, ne multo humore demersa putre-
scant, aut extabescant, frigore, nullus sanè ex ho-
minibus eam in serendo diligentiam adhibuit,
neq; in eo quod conceptū jam est, educando, sed
quemadmodum in omni vita aliis rebus omni-
bus seipso ducunt: posteriores, alii quidē insatia-

bilibus voluptatibus, abdominiquè inservientes:
alii divitias, aut magistratus, aut denique poten-
tiam ambientes: ad eundem modum & ipsam
posthabuerunt primam generationem. Tunica
quæ omnis oris partes subjungit, à cerebro
etiam recipere nervorum molliū momentaneā
portionē, ut quo modo lingua ipsa sit etiam diju-
dicatrix saporū, jam diximus. At verò uva, quam
gurgulionē & columellam vocant, ad magnitu-

dinem atque elegantiam voci auxiliatur. A qua
quidē aer ingrediens, inciditur prius, impetusq;
ipsius violentia, & frigiditas frangitur. Unde
nonnulli quibus ad basim usq; illa fuit amputa-
ta, non modò deterius loquuti sunt, verum etiam
frigidiorē senserunt respirationē. Pleriq; eiuf-
modi, pulmone & thorace nimis refrigerato, pe-
rierūt. Ac proinde nunquā ita temerè abscinden-
da est, ut pars quædā basis non relinquatur. Scri-
psimus autem prius & de foraminibus narium,

quo pacto mirificè ea os quoddam excipit, ven-
triculis cerebri prælocatum: tum & de ipsorū in
os perforatione, quæ est in palato. Quæ quidem
extitit, ne inspirationis initium sit secundum re-
ctitudinem tracheæ arteriæ, sed quædā deflexio
habeatur, ac veluti ambages, priusquam spiritus
ad arteriā perveniat. Proinde fit, ut spiritus qui-
dem obiter per hunc flexum contemperatus, ul-
terius tandem feratur: hæreant autem corpuscu-
la exigua, aut si quid fortè ad os usq; permearit,

sistatur etiam circa palati columnam: sic namq;
uvam ipsam appellant. Hinc fit, ut qui in multo
pulvere colluctati fuerint, hi paulò post emun-
gant pulverem, expuantq;. At nisi prius quidem
nasi pori rectā ad caput sursum ferrentur, postea
autem obliqui ad palatū reverterentur, uvamq;
ibi sese excipientē haberent, quid obstaret quo-
minus in arteriā hæc omnia delaberentur? Nam
id etiam accideret, si quis per os inspirarit, magna

indigens inspiratione. Caterum ubi sani homi-
nes sunt, ore ad respirandum nihil est opus, ni-
si quis asthmate multo ac vehementi urgeatur.

Quare nasus, primum ordine respirandi instru-
mentum est: os verò, si nullus affectus infestet
animal, nullo pacto respirandi instrumentum
existit. Quum autem nudæ ac eminentes parti-
culæ, quæque externis injuriis expositæ sunt, ex
ea oporteret esse substantia conditas, quæ neque
contundi, neque frangi faciliè posset, meritò qui-
dem aures ipsas natura cartilaginofas effecit.

Nam si duræ penitus ut ossa exitissent, faciliè
frangerentur: si molles ut carnes, contunderen-
tur parvo negotio. Nunc verò mediocriter mol-
les quum sint, eoque faciliè incidentibus cedant,
vim illorum exolvunt. Caterum prominent au-
res, ut meatui auditorio operimentū ac murus
existant, simulque & ipsæ aliquem sonum refun-
dant. Quippe Hadrianus Romanus consul,

quum haberet læsum auditum, manus cavas,
quò audiret facilius, à posterioribus ad ante-
riora spectantes, auribus obtendebat. Aristote-
les etiā dicebat, animalia grandes aures haben-
tia, semper eas agitare, ac circumvertere ad so-
nos & voces, usum partiū à natura edocta. At in
hominibus, quū parvas eas esse oporteret, nihil
aut certè parū juvare poterant, si mobiles ac ver-

satiles

*Oris tunica
dijudicare
pores, quæ
admodū lin-
gua dijuda-
cat.*

*Uvam cornu
re ad Sc
concinnita-
tem.*

*Gurgulion
siue colum-
lensus.*

*Gurgulio
non esse
scindendum
radicibus.*

*Nasū for-
mina, cur
liquè in-
detorquea-
tur.*

*Sani ad
spirandū
non esse opus.*

*Aures cur
sint cartila-
ginæ.*

*Aures cur
promineant.*

*Hadrianus
Romanus con-
sul, quò an-
dret faci-
lius, manus
cavas à po-
terioribus*

*ad anteriore
spectantes
obtendebat
auribus.*

*Aures homi-
nibus cur in-
mobiles.*

fatiles fuissent : ac proinde immobiles sunt , aut obscuro motu moventur. Porro quod extrinsecus quidem convexæ , intrinsecus autem cavæ extiterint, factum id propterea est, ne quid meatui incideret, neve ipsæ facile afficerentur. Utraque autem est flexuosa, ut complicari, ac in seipsas replicari facilius possint. Jam verò quemadmodum boni artifices, præter opus institutū, artem suam ostentant, sic natura ex abundantia tum aures ipsas, tum omnia humana membra exornavit, ita ut primò quidem actionibus, utilitibusque partium incumberet: postea verò cohonestaret illas, in eisque veluti operis additamenta, ac ludicra quædam faceret, ut in ipsis natium carnibus constaret. Evidenter quippe partis ipsius turpitudinem, si nuda carnibus fuisset, sumiam conspicatus agnosces. Obscurantur tamen ornamenta particularum, à splendore ipsius utilitatis. Pro nihilo siquidem ducitur oculi pulchritudo, sicuti & nasi, & labiorum ornatus, quod ipsorum utilitas valde sit admiranda. Cæterum partis actio, ut constructione ac generatione prior est, sic dignitate quam ipsa utilitas est posterior. At vera pulchritudo, ad utilitatis successum, & bonitatem refertur: primusque partium omnium constructionis scopus, utilitas est. At pili qui in mento oriuntur, non modò genas operiunt, verum etiam decus mari, ornamentum, & severitatem conciliant. Malæ autem & nasus destituuntur pilis, pulchritudinis gratia. Etenim mulieri, totum corpus molle atque depile, puerorum instar habenti, ipsius faciei glabrities plurimum ad pulchritudinem addit. Nam quum mores non habeat æquè venerandos ut masculus, nec forma quidē ei veneranda opus erat. Semper quippe natura, moribus animæ, formam corporis aptam & congruentem effingit. Præterea quum ex humoribus ipsis halitus semper quidem sursum ad caput feratur, crassioribus excrementis illius, ad pilorum alimentū præcipuè natura abutitur, pilorum inquam, ornatum & tegumentum capiti conciliatium. In viris autem, quantò hi mulieribus sunt calidiores, tantò hæc quoque excrementa sunt plura: proinde duplicem iis natura invenit evacuationem, alteram ex capitis, alteram ex genarum pilis. Pilos non habet frons, quod tegi possit à pilis capitis, quantum volumus: quodque si eos produxisset, tondere ipsam nobis assidue fuisset necesse, quod oculis nimirum incumbat, propter quos etiam motu voluntario movetur. Motus siquidē cutis undique oculis circumfusæ, ad oculos exactè aperiendos & concludendos, maximè opitulatur. Porro quum pili capitis & maxillarum augeri ac minui plurimum possint, secundum sexus, ætatis, temporum, & locorum naturam: qui superciliis & palpebris insunt, eandem semper magnitudinem servant: utpote quorum hi quidem, ne quod corporum exiguum oculis patefactis incidat, veluti vallum quoddam, ipsis appositum sint: hos autem instar muri cuiusdam, propulsare oporteat, ac primos omnia, quæ à capite defluunt, excipere. Si igitur eos aut minores, aut ariores, raut longiores, aut densiores effeceris, tantundem eorum utilitatē vitiaveris. Postea verò quam ejusmodi

facere pilos constituit Deus, his quidem durum corpus subjecit, illis autem cutem duram, cartilagini per superiora connexam. Non enim saturat, eos duntaxat velle tales esse. Neque enim si lapidem repente velit facere hominem, efficere id poterit. Atque in hoc opinio nostra & Platonis à Mose diffidet. Omnia enim ipse Deum facere posse arbitratur, etiam si ex cineribus equum aut bovem facere velit. Nos autem non ita sentimus, sed confirmamus quædam naturam neutiquam facere posse, eaque Deum ne aggredi quidem omnino: sed ex iis quæ facere potest, quod melius est eligere. Etenim quum pilos in palpebris satius esset æquales semper esse magnitudine ac numero, non ipsum id quidem voluisse affirmamus; illos autem mox factos fuisse (neque enim id facere potuisset) sed contendimus potius eos, etiam si millies voluisset, nunquam tamen tales futuros, si ex cute molli producti fuissent: quum nec recti quidem stare possent, nisi in duro fixi essent. Utraque itaque attribuimus Deo: tum eius quod est melius, in ipsis opificiis electionem, tum etiam materiæ delectum. Quod si substantiæ cuiuspiam molli & carnosæ pilos eos infixisset, non Mose modò, verum etiam aliquo malo duce videretur inertior, qui murum in palude, aut vallum jaceret. Nam quemadmodum herbæ ac plantæ, quæ ex terra humida & pingui proveniunt, altissimè crescunt: quæ verò ex petrosa, squallenteque, parvæ ac duræ, nulliusque incrementi permanent: ad eundem, opinor, modum & pili, qui ex humidis ac mollibus emergunt partibus, plurimi sunt incrementi, cuiusmodi apparent in capite, axillis, pudendisque: qui verò ex duris & aridis, exiles atque incrementi nullius. Quocirca duplex ipsis origo existit, quemadmodum herbis ac plantis: alia quidem à conditoris providentia, alia verò à loci natura. Ordo autem æqualitasque ortus ipsorum, discrimen facit. Atque à loci quidem natura oriuntur pili tum axillarum, tum aliorum membrorum, nullis certis lineis descripti (quemadmodum sunt ij, qui in palpebris sunt, superciliis, & capite) sed inæquales habentes terminos, nulloque projecti ordine: quandoquidem à loci humore proveniunt, neque sunt ipsius opificis opera. Quo fit ut calidis quidem naturis sint plurimi, frigidis autem nulli omnino, aut perpauci gignantur. Quorum autem opifex curam habet, ij in omnibus naturis insunt, calidis, frigidis, humidis, siccis, nisi quædo prorsus fuerint intemperata, cuiusmodi est petrosa atque arenosa terra. Nō defluunt aut palpebrarum, aut superciliorum pili, nisi in magnis partium affectibus. Sed neque à capite defluunt, nisi etiā in ejus affectibus quidē, verum quam prædictorum, minoribus. Nam plantæ quæ in terra dura aridaque proveniunt, ut generationem habent difficilem, multamque providentiam requirunt, ita non facile intereunt. At eundem utique modum & Aethiopum capita, parvos, quidem, nulliusque incrementi habent capillos, præ siccitate cutis: verum calvescunt ægrè. Quæ omnia quum opifex provideret, in palpebris quidem & superciliis satius esse ratus exiguos quidem & nullius incrementi pilos, verum stables, gignere, in cute dura &

Mosaica sententia relucet Gale.

Nature non esse possibile omnia.

Deo quæ attribuat Galenus.

Pilorum origo duplex, quemadmodum herbis & plantis. Pili orti à loci natura.

Pili naturæ calidis plurimi, frigidis nulli, aut perpauci gignantur.

Los à conditoris providentia ortos, singulis naturis inesse.

Alopecia quando accidat.

Aethiopes ob siccitatem cutis habent pilos parvos, & incrementi nullius calvescunt tamen ægrè.

Palpebrarum cutis curdura cartilaginea.

cartilaginosa radices eorū, quasi in lapidosa qua-
dam atq; argillacea terra, defixit. Jam verò & cir-
cum pudenda pili quoq; necessario proveniunt,
Pudendorū pili cuius gratia oris. (calida enim & humida sunt hæc loca) operimē-
Frontis cutis tumq; ac ornamentū ejus loci partibus præbent,
ut nates ano, atq; præputiū pudendo. Frontis cu-
tis cum musculosa quadā & tenui substantia, quæ
illi subdita est, unitur: ut partes manuum internæ,
& plantæ pedum, cū tendone coalescunt. Tertia
Quis totius animalis. verò præter has differentia cutis est, quæ in toto
animali videtur, substantiæ quidē subjectæ hære-
scens, non aut coalescens cum illa. Quarta dein-
Labiorū cutis. de est labiorū, cui musculi per totum miscentur.
Quod aut frons à subjectis, quidem ossibus per
membranam periostiū distincta sit, solaq; ex dua-
Periostion est membrana cranio adha- rescens. bus cutibus mobilibus constans, ac breviter to-
ta in se laxa, ob id certè motu voluntario move-
Labiorum substantia. tur. Cæterum labiorū substantia, quam moveri
etiam motu voluntario oportebat, ejusmodi exi-
stit, ut eā, aut musculū pro cute, aut cutē muscu-
Labii infer- torum mu- sculorū prin- cipia quatuor. losam meritò voces. Quatuor aut sunt musculo-
rum ad labia pervenientium principia: perspi-
cua quidē anteq̃ cuti misceantur: obscura verò,
& quæ à substantia illius separari nō possunt, ubi
semel in unum coiverunt. Quare totidem etiam
erunt musculi, utriq; scilicet duo: unus quidem,
qui ad lævam: alter autem, qui ad dextram, ipsa
circumagat. Capita autē sunt appensa, alijs qui-
dem superne, versus malas, ut qui motus obli-
quos utriq; labij parti essent præbituri. Inferio-
Labiorum motus rectos fieri à duo- bus obliquis. rum rursus obliqua quoq; positio est, quoniā &
obliqui sunt motus. Ac per hos quidē quatuor
musculos opifex octo motus instituit: quatuor
sanè obliquos, in utroq; labio duos: ac totidem
etiam rectos: duos quidem omnino rectos, quū
labia plurimum à se tum distant, tum etiam in se
committuntur. Nam quemadmodū in carpo &
brachio ostēdimus ex obliquis motibus rectos
fieri, sic & in labiis accidit. Quare si musculus so-
lus utriusvis labij agat, motus fit ad obliquum.
Sin verò tensi utriq; fuerint, eo modo jam totū
simul labrū sursum quidem à musculis superio-
ribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus.
Atq; etiam tensis fibris externis, labia foras de-
flectere: intrò autem cedere & complicari, ab in-
ternis accidit: ut si duos hos motus, iis qui planè
sunt recti, adnumerēs, octo omnino labiorū mo-
tus reperias. Ut autem maximi non solum hi, sed
cum eis etiam illi qui in genis sunt, motus effice-
Labiorum motus in uni- versum sunt octo. rentur, musculum latum ac tenuē natura extrin-
Lati muscu- li origo. secus subdidit, unum in parte utraq; usq; ad colli
spinam pertinentē, ex omnibusq; ferè colli par-
tibus nervorum maximā vim recipientem. Qui
musculus ad sermonem & masticationem val-
dè confert. At verò quum ad spirationes pau-
Nasalarum utilitas. lō majores & subitas, item ad efflationes, nasi
alæ non parum conducant, oportuit certè eas
mobiles esse, idq; pro voluntatis imperio. Car-
tilaginosa autē fuerunt, quod ea substantia non
facile contundi nec rumpi possit. Verum mu-
Nasalarum musculi & nervi. sculi in illas inserti, subtus malas oriūtur exigui,
juxta principia musculorum qui ad labia descen-
dunt. Cum quibus quadantenus conjuncti mu-
sculis, semper magis magisq; obliqui digrediun-
tur ad nasum, recipiuntq; à nervis qui per maxil-

lam superiorem feruntur, exiguas quasdam pro-
pagines. Interna autē ipsius nasi tunica fuit con-
structa, tum ut illum intus succingeret, tum ut
illi sensum tribueret: quandoquidem neque os
ejus, nec cartilago, sensum habere poterat. Por-
rò cōstructio ossium, aut motus gratia, aut per
spiratus, aut transitus cujusdam, aut partiū di-
scriminis, aut securitatis, & patiendi difficultatis,
exitit, ut liquet in ipsarum particularū propo-
tis nobis exemplis. Ubi os medullam habet in
se, ejus finibus utrinque caput instar operculi
cujusdam, ut plurimum videmus adnasci. Nul-
lum tamen parvum os habet medullam, quod
sinum nullum habet cōmemorabilem, sed caver-
nulas angustas & exiles. Nam si exiguum & cavū
fuiſſet, careret robore: quemadmodum si quod-
vis magnorum densum fuiſſet ac sine sinu, gra-
vissimum foret, ac gestatu difficile. Omnibus au-
tem imbecillioribus animantibus ossa sunt laxio-
ra & concava magis: fortioribus verò densiora,
magisq; compacta. Quin & leo, qui omnium est
ferocissimus, ac fortissimus, ossa omnia medul-
læ expertia habere creditur. Natura quippe, mu-
sculorū imbecillitatem atq; robur intuita, ad i-
psorum portionē, ossium pondera effecit. Quum
igitur ad propriam securitatē, durities: ad ani-
malis verò motum levitas ossium requireretur,
(nec adesse simul duo hæc esset facile) id opor-
tebat eligere, quod erat commodius. Commo-
dior porro animalibus motus est, ut qui sit ex
ipsorum substantia. Non enim quatenus est ani-
mal, omnino ab injuriis est tutum: at ex seipso
moveretur. In quibus tamē propter musculorum
robur, ac totius corporis fortitudinem, utrūq;
comparare erat licitum, his omnibus densa ac
dura, instar lapidum quorundam, ossa cōope-
git, ut in leone. Quia verò homo non est æquē
fortis ac leo, jure optimo, quæ ossa in eo sunt ma-
xima, ea non cava modò, verum etiam laxa exti-
terunt, plena tamen medulla, quæ proprium ali-
mentum est ossibus. Nam quibus cavitas nul-
la inest, iis ossibus tale quid in eorum cavernu-
lis continetur. At capitem processus (quos Græci
vocat *επιφύσεις*) non protinus omnia quæ me-
dullam habent sortiuntur. Quandoquidem ma-
xilla inferior medullæ quippiam in seipsa conti-
net, ac processum nullum sortitur, quum sit den-
sior, quàm ut processu indigeat, atque ita facile
possit medullam sibi sine ulla externa epiphyſi
claudere. Causa autē cur sit hoc os brachio & fa-
ciore densius, est nuditas. Ubi verò laxitas simul
& cavitas adsunt ossibus, eorum capitibus ossa
densa ac dura, cartilaginis glutinosa interventu,
adeò fuerunt accuratè apposita, ut commissio eo-
rum non facile cerni queat, nisi ossa ipsa conco-
cta, aut exiccata fuerint. At superior maxilla o-
mnino medullæ fuit expers, quod prorsus non
moveretur, ob idq; illi necessaria non esset levi-
tas, quemadmodum inferiori. Quare ad solam
patiendi difficultatē, ex ossium multitudine fuit
cōpacta. Nam quū utilitates haberet diversas,
ex diversis quoque substantia ossibus manifestè
cōflatur. Malarū siquidem ossa, crassissima sunt:
nasi tenuissima: reliqua verò durissima. Quum
enim ossa nasi, si læsa fuerint, minimam animali
adferant

Nasi tunica interna, quem usque facta.

Ossium structura, cui gratia.

Ossibus medullis imbutis sunt utrinque capita.

Ossa parva carere medulla.

Leonum omnia medulla expertia.

Ossa sunt appensa, musculorum imbecillitatem, robur.

Motum ex substantia animalium.

Ossa humana qualia.

Ossium nutrimentum medulla.

Επιφύσεις.

Maxilla inferior nullum processum sortitur, tamen in seipsa continet.

Maxilla superior cur sit destituta medulla.

Malarum ossa crassissima.

Nasi ossa tenuissima.

adferant noxā, multum ab aliis principalioribus duritie & crassitie vincuntur. Reperitur autem futura una secundum longitudinem in utraque maxilla, quod nimirum utraq; corpus sit geminum. Obscura tamē ea in densissimis ossib. est: cuiusmodi est occipitis, frontis, palati, & summæ maxillæ. Quum igitur ossa quæ ad verticem capitis pertinent, nec plagis similiter essent obnoxia, ut ossa frontis & occipitij, necnon quæ in lateribus sunt, evacuationeq; indigerent copiosa: hæc autem vulnera sæpenumero exceptura essent, vacationemq; non postularent: natura rectē illa quidem rara simul & cavernosa, hæc verò dura & densa cōstruxit. Palati autem os durum etiam ac densum exitit, q̄ ad basim capitis sit: quodq; ab excrementis, quæ per ipsum transfluunt, brevius extabuisse, si fuisset laxum. Ossium porro alius similitum productio, ex ipso facta est, sedem simul atq; operimentum musculis oris à lateribus exhibitura. At ossa bregmatica (quæ duo laxa sunt capiti desuper incumbentia, ac undique à duris ac densis ossibus circumdata) parte quidem posteriore ab osse occipitij, anteriore verò frontis, utrinq; verò ab ossibus temporum, merito lineis fuerunt distincta. Septimum est os palati, quod nonnulli superiori maxillæ, nonnulli capiti attribuant. Reliqua omnia maxillæ superioris novem sunt numero: duo nasi: tertium, cui hærent incisores dentes: utrinque autem duo, quæ molares ac reliquos dentes excipiunt: supra quæ alia duo sunt, quæ ad anteriorem zygomaticam productionem, atq; internā oculorum cavitatem spectant. Reliqua duo sunt iuxta nasi in os meatus. Porro articulo inferioris maxillæ, alteri quidem, qui *σφαγν* dicitur, zygoma circumposuit natura, maximumque musculi temporalis tendonem, à quo nimirum os clauditur: alteri verò mamillares capitis productiones apposuit, ne quando in violentis motibus, à subjecta cavitate elaboratur. Aperiant autem os ipsum tum posterior articulus, qui est ad mamillares eas productiones: tum musculi articulum moventes, oppositi temporalibus musculis.

GAL. DE VSV PARTIVM LIB. XII.

Sunt autem partes collo & capiti cōmunes, per quas caput in omnē partem movemus: id quod sine articulis, ligamentis, ac musculis agere nobis non licet. Porro articulatio, ossium est compositio, propter motū voluntarium comparata. Cæterum quæ componuntur, pauciora duobus esse non possunt: oportetq; ut musculi ab uno osse producti, inserantur in alterum. Motus autem fieri non potest, nisi ossa articulentur simul, ac per musculos cōnectantur. At ligamenta, quū ossa in suis articulationibus exactē contineant ne excidant, ad rectē etiam movendum conferunt: adeo quidem dura existentia, ut in motibus vehemētiorebus minimē distumpan-
tur: in tantū autem mollia, ratione cuiusdam humiditatis viscidæ, quæ articulis innutritur, ut tractis ossibus facili & obsecundet, & cedant. Quū igitur cartilagine, ligamento, & nervo, corpo-

ris machina indigeat: ac cartilago quidem fit durior, nervus autem mollior: medium verò sit ligamentum: mirabiliter sanē natura singulis utitur in omnibus animalis partibus, nunquam loco unius constituens alterum. At verò cartilago subjungit quodammodo articulos: nervus, quantum habet mollitiei, tantundem & sensus habet. Verum imbecillior est, quā ut totos artus movere & transferre queat. Ligamentū autem valdē colligare potest, nec impedit quo minus membra moveantur, motorium tamen instrumentum esse non potuit, quum nec sensum, nec motū habeat, nec ex principio animal movente, sed ex osse exoritur. Convenienter igitur, ubi membrum solo vinculo indiget, ibi solum est ligamentū: ubi verò sensu solo, nervus: ubi motu voluntario est opus, utrinq; ibi reperias: nervum quidem, qui missum ē ratione imperium perferat, motusq; principium præbeat: ligamentum verò, quod robur ad ea quæ à nervis moventur gestanda suppeditet. Proinde missum quoddam instrumentum motus ex ambobus, primum quidem in tenues fibras solutis, postea verò coalescentibus, intercapedinesq; medias molli carne repletas habentibus, efficere oportuit, quod omnino nervo quidem durius, ligamento autem mollius existens, reliquarū etiam contrariarum affectionum quæ illis insunt, medium locum teneret. Atq; hoc quidem instrumentum est tendo, qui ex iisdem illis fibris inter se commistis conflatur. Tendo igitur primum instrumentum est motus. Musculus autem, ad constituendum ipsum fuit comparatus, carnisq; coagmentatæ & compositæ animali contra injurias extrinsecas præbet utilitates. Porro articulus capitis adeo magni est momenti animalibus, ut omnium solus, non dico luxationē magnā, sed ne deflexionē quidem, vel temporis momento ferre queat. Repentē siquidē respiratione ac voce, motuque simul & sensu, totum privatur animal, ipsa nimirum nervorum radice affecta. Est enim principium omnium nervorum cerebrum, in ipsumq; veluti in arvū quoddam anima ratiocinatrix semen mittit: germen verò inde, veluti truncus quidam in arbore exurgens, medulla spinalis existit: à quo trunco per totam spinam extenso, deducti nervi quamplurimi, instar ramorum quorundā, in sexcentas propagines distribuuntur. Corpus autē universum, per eos sumit primum quidem & maximē motū: dein verò, sensum. Cæterum articulus capitis tutissimā omnium constructionem sortitur, quod seipso radicē nervorum omnium, partes inferiores moventium, contineat. Accedit ei hæc securitas à ligamentorum crassitie, musculorum multitudine, & ossium exacta compositione. Fortissima enim ligamenta ossa ipsa cōnectunt: quorum unum maximum ac latum, in orbem totam articulationem complectitur. Alia autem sunt duo mediocriter, instar nervorū, rotunda: quorum alterum quidem, finem productionis prælongæ, vertebræ secundæ, cum capitis osse cōnectit: alterū verò transversum, veluti angulum rectum efficiens, à partibus primi spondyli detrahit, ad lævam pertingit. Octo autem musculi

Corporis machina qua desideret.

Cartilaginis usus.

Nervus quantum mollitiei, tantundem sensus sortitur.

Ligamentū nec sensum, nec motum possidet: oritur autem ab osse.

Tendonis generatio, ex ligamento & nervo.

Tendo primum est instrumentum motus.

Musculi usus.

Articuli capitis luxatio, quæ infert mala.

Cerebrum esse omnium nervorum principium. Spinalis medulla veluti truncus arboris.

Nervos largiri corpori motum & sensum.

Articuli capitis constructio & securitas.

Capiti articulo octo incumbentes musculi.

ex

*Capitis toti-
us duo motu
um genera.*

ex ipsis duntaxat partibus posterioribus, articulationi incumbunt, ipsam tegentes simus atque moventes. Quum igitur capitis totius motus duos genere esse oporteret: unum quidem, dum deorsum inclinamus, ac sursum attolimus ipsum: alterum verò, dum ad latera circumagimus: nec ex duobus simplicibus motibus rectus unus illic effici posset, utrisque privatim præstitit musculos atque articulationes efficere. Quocirca de articulationibus ipsarum, duplices, musculorum autem moventium ipsarum, genera duplicia extiterunt, quatuor differentiis comprehensa. Alij enim caput attollunt, alij deprimunt: alij ad dextram, alij ad levam circumagunt. Igitur motum in utranque partem gratia, primo spondylo natura duas cavitates indidit, alteram in sinistris, alteram in dextris, capitis convexitatibus, quæ ibidem sunt, prorsus æquales. Nam tametsi potuisset natura unum maximum processum, atque rotundum undique, in primi spondyli maximam cavitationem inferens (quemadmodum in humeri articulo fecit) capiti omnes motum differentias præstare, quia tamen sine laxa articulatione & fallaci fieri id non

Humerus omnium maximum articulationum cur luxationi est obnoxius.

Capitis motus sursum deorsumque, et in obliquum, unde proficiantur. Dentiformis processus.

poterat (ob quam nimirum omnium maxime articulationum, luxationi humerus est obnoxius) maluit paucissimos capiti motus, eosque tuto tribuere, quam varios simul, atque periculosos. At verò secundo spondylo utrinque unus dentiformis processus inest, acclivis atque prælongus, qui robustissimo ligamento capiti connexus est. Atque

Vertebrae spinæ totius esse viginti quatuor.

Musculos caput ambiens esse octo & viginti.

eius quidem beneficio caput attollitur, deprimiturque, quemadmodum per articulos cum primo spondylo ad obliqua movetur. Quum autem ex partibus anterioribus secundæ vertebræ, ille dentiformis processus exortus, invehiri deberet secundum supremam sui oram partibus primæ vertebræ anterioribus atque internis, merito natura, vertebræ partem eam excavavit, dentemque ipsum ibi indidit, validum ligamentum atque transversum extrinsecus ei circumdans, quod simul ipsum à spinali medulla abduceret (ne videlicet illam collideret) simul autem ad primæ vertebræ cavitationem alligaret. Quinetiam supernis primæ vertebræ cavitatibus, quæ capitis eminentias excipiunt, aliæ quædam cavitates parte inferna consimiles subjacent, quæ ejusdem primæ vertebræ complectuntur convexitates. Quarum beneficio neque vertebræ secundæ cum capite connexio (cujus actio erat caput sursum attollere, deprimereque) à prima quicquam habet negotij: neque reliquus motus ad latera, propter articulationem cum prima, impeditur quicquam à secunda. Verum quum quatuor & viginti totius spinæ sint vertebræ, quod in nulla quidem alia ejusmodi ligamenta, qualia in prima, cernantur, neque in hac etiam secundum aliam partem, quam sit expediens, sint facta, nemo opinor audebit dicere id accidisse fortuito. Musculi qui caput movent sunt octo & viginti, aut plures, ipsum in orbem circumvestientes: quorum alius aliam habet actionem. Sunt autem ipsorum, octo quidem partibus anterioribus, quatuordecim autem posterioribus, ex diametro sibi ipsis oppositi. Alij verò, utraque parte duo, quorum hi quidem ex dextris, illi autem ex sinistris, oppositi & ipsi inter se, primum

quidem & maxime collum ad seipsos trahunt, cum illo autem & totum caput, natura semper singulis motu præditis musculis opponente alios contrarij motus autores. Musculorum caput attollentium & inclinantium, octo quidem, idemque parvi, retrò, circum articulum ipsum sunt sita: quibus majores alij in toto collo extensi, per primas quidem fibras, solius capitis motibus inservientes, eos obeunt, qui ad primam sunt atque secundam vertebram: per proximas verò, movent quinque reliquas colli vertebrae. Cæterum ex octo musculis, quos parvos esse diximus, quatuor sunt recti motus autores, qui ex osse occipitis exoriuntur, paulò supra articulationem: inseruntur autem in secundi spondyli posteriorem processum, atque in partem primi proximam. Reliquorum verò quatuor, duo quidem, quo modo prædicti, ab osse occipitis nati, foras tamen obliqui digredientes, obliquis primi spondyli processibus inseruntur, motum totius capitis obliquum præstantes. Reliqui autem duo, primum spondylum secundo conjungentes, obliqui, positionem habent duobus prædictis contrariam, ac motum oppositum. Illi enim caput habentes obliquum, una cum eo secundam vertebram ad primam adducunt: hi autem in rectum & naturalem statum, inclinatum caput reducunt. Attres musculorum magnorum conjugationes, eundem cum dorsalibus musculis habent motum, quem paulò post explicabo. Movent autem per primas quidem fibras (quæ in prima & secundo spondylum inseruntur) solum caput: per reliquas verò, primum quidem reliquos colli spondylos: simul autem cum eis, caput retrorsum agunt. Obliqui tamen, sensim motus obliquos efficiunt. Anteriorum verò, qui stomacho quidem subjacent, per primas fibras (quæ in primum ac secundum spondylum defixæ sunt) caput duntaxat flectunt, ac simul obliquis fibris, ad obliqua deducunt: per quas musculorum etiam parvorum propriam habent circumscriptionem, per reliquas verò collum flectentes, simul cum eo caput cogunt nutare. At reliqui sex, non rectum, ut hi, capitis nutum, sed sensim obliquum efficiunt: cum quo etiam caput in anteriora convertunt. Quatuor autem alij musculi robusti & magni, utraque parte duo, dextra, & sinistra, locati, collum ad latera cum parva declinatione movent: atque antrorsum, anterior ipsorum conjugatio paululum inclinans, reliqua autem retrorsum: illa sanè ex perforata secundæ vertebræ apophysi productionem habet, hæc autem ex primæ obliqua eminentia nascitur. Fit autem omnium musculorum actio pro fibrarum positionis modo, quas ut plurimum habent secundum sui longitudinem exporrectas: raro autem obliquas, ut spinæ musculi, qui quidem recti secundum spinam extensi, fibras in obliquum producant. Securitas itaque articulis capitis, ex iis quæ diximus, accessit: motuum autem detrimentum, quod eam sequebatur, musculorum multitudine, magnitudine ac situ vario natura ita pensavit, ut nullus capiti desit motus. Cæterum omnium musculorum sunt minimi, posteriores, ut qui soli exactè articulationem comprehendunt.

Aequè

Musculi moventes singulis motibus esse contrarios autem autem

Capitis musculorum actiones

Musculorum actio fit pro fibrarum positionis modo. Musculis mori ex parte inesse fibrarum secundum longitudinem exporrectas.

Aequè autem opportunam cum his positionem habet prima portio musculorū stomacho subje-
ctorum, quæ ad flectendum caput est compa-
rata. Verum quod ipsorum est reliquum, pro-
grediturq; usq; ad quintam thoracis vertebra-
m, flexionē rectam efficit, non modo vertebri-
bus subditis, sed etiam cum eis universo capiti. Postquā
verò ex musculis octo exiguis & posterioribus,
qui caput ad obliqua inclinant, rectam quidem
erectionem efficiunt, quum conjunctim ac bini
agunt, obliquam autem, quando alter eorum so-
lus agit: similiterque etiā qui majores ipsis incum-
bunt, usq; ad collum extensi: ob idque necessum
erat quosdam illis parte anteriori opponere mu-
sculos, obliquam flexionem ædentes: ideo mu-
sculi sex qui ad clavem & pectus perveniunt, fue-
runt comparati qui caput possunt flectere, atque
etiam antrorsum circumagere. Pari modo, &
musculorum quatuor qui collum flectunt ad la-
tera, si unus solus egerit, ad illum inclinatur. To-
ta verò anterior conjugatio, exiguum quiddam
flectit antrorsum, nusquam præterea flectens ad
latera: quemadmodum & quum posterior a-
git, paulatim quidem attollitur, in neutram par-
tem se inclinans. Omnibus verò quatuor simul
agentibus, in nullam omnino partem propen-
sum perstat, Quum autem nusquā alibi tantum
alterum os, alterum superet, quantum capitis os
primorum spondylorum ossa, quibus jungitur,
magnitudine superat (præter enim inferiorem
maxillam sedecim insunt capiti ossa) certè opus
fuit multis ac robustissimis musculis qui pen-
dentes omnino à capite, insererentur, non om-
nes quidē in primas vertebra, sed illi tantum
quibus licitum esset. Erat id autem tantum lici-
tum iis, qui motum rectum ad unguem suppedi-
tant capiti, aut alicui eorum, qui ad obliquū de-
flectunt. Merito igitur nō omnes qui caput mo-
vent, in primos spondylos infiguntur muscoli,
sed parte quidē posteriore, parvi soli, anteriore
verò, prima portio musculorū stomacho subje-
ctorum: à lateribus parvi alij muscoli, qui capiti
vertebram primam conjungunt: ac proinde par-
vas vertebra nō oportuit esse majores. At verò
spinam natura animalibus veluti carinam quan-
dam corporis ad vitam necessariam, non ex uno
simplici osse molita, intus ejus omnes vertebra
excavavit: viam hanc præparans opportunam
portioni cerebri, quæ per ipsam erat descensura.
Non construxit autem eam simplicem (quanquā
ad sedem tutam, & patiendi difficultatem, talis
structura erat longè cōmodior) quòd multis ac
variis motibus animal esset usum, quibus spi-
na ex unico formata osse, minimè obsecundaret.
Quare natura quidem rectè utrunq; scopum si-
mul considerans, judicansque, priorem quidem
dignitate, actionem: post illam autem, securita-
tem: sicuti rursus, ad sanitatis diuturnitatem, se-
curitatē esse quidem priorē, posteriorem autem
actionē: utriusq; scopi, actionis scilicet & incolu-
mitatis, in spinæ vertebri, exquisitam fecit mi-
scellam. Quòd autem necessum fuerit spinalem
medullam veluti fluvium quendam ex cerebro,
tanquam fonte, manantem, locis omnibus quæ
præterit, nervum semper immittere, tanquam

sensus ac motus rivulū: longeq; melius sic in uni-
versas corporis partes transmitti eas facultates,
quàm si nullius interventu, à cerebro pertenuem
aliquem nervum dispergerentur, neminem opi-
nor latere. Ad hæc verò, spina, quòd sit veluti
quædā carina, totiusq; animalis stabilimentū, ex
duris ossibus est conflata. Quòd autem medul-
læ spinalis sit via, ob id intus est cava. Quia ve-
rò ipsi, & visceribus instar muri est, ea de causa
multis propugnaculis in orbem est communita.
At quia motus est instrumentum, ob id ex pluri-
bus & parvis ossibus per articulos commissis in-
ter sese constitit. Conflatur enim ex quatuor &
viginti ossibus, præter os latum, quòd extremā
ipsi subjacet. Maximæ igitur partes spinæ sunt
quatuor in universum: collum, dorsum, lum-
bus, & sacrum os. Ex quibus collum quidem se-
ptem spondyli, dorsum duodecim, lumbi quin-
que, os deniq; sacrum aut latum, quatuor ossibus
constat. Jam verò læso spondylo, motus simul &
sensus omnium partium, quæ illi subditæ sunt,
læduntur. Quare, ut rectè monuit Hippocrates,
si multi quidem spondyli ordine sese consequen-
tes, emoti fuerint, malum id est. Sin verò unus-
quis ex cæterorum harmonia & compage exi-
lierit, exitiosum: quòd illa quidem prima, spi-
nalis medullæ sit circularis, hæc autem secunda
angularis perversio, qua maximè ipsa medulla
comprimatur, sustinere magnam simultaneāq;
flexionem non potens. Quia igitur per magnos
ac laxos articulos, multumq; diffitos, moveri
spina sine molestia non poterat, melius fuit ex
multis, parvis, singulis paulum conferentibus,
totam ipsam conflari, ut secundum circuli cir-
cunferentiam, citra angularem medullæ perva-
sionē, tota flecti & moveri posset. Quum itaq; ne-
cessum sit plures esse in spina spondylos, consen-
taneum etiam rationi fuerit, cuiq; ipsorum mo-
tum inesse proprium: id quod fieri non posset, si
duo illi muscoli à capite usq; ad os sacrum exten-
si, haberent fibras secundum longitudinē expor-
rectas, quæ nimirum omnes itidem traherent.
Nunc verò, quum obliquæ in quoq; spondylo
fibræ fuerint, tum ad latera circumagere, tum fle-
ctere, atque erigere, nunc hanc, nunc illam spi-
næ partem possumus. Sed quum movere ipsam
spinam sigillatim possumus, poterimus & to-
tam simul movere, sibiisq; musculorum omni-
bus simul agere. Quòd si fibras secundum spinæ
longitudinem tenderemus, simul quidem totam
promptè moveremus, singulos tamen spondy-
los non item. Melior igitur habenda est constru-
ctio, quæ utrunque simul probè præstare potest,
necnon conversiones ad latera, quàm quæ alte-
rum tantum. Quòd autem propter instrumen-
torum copiam, quæ locanda ibi omnino erant,
primi spondyli magni esse non poterant, non ob-
scure existimo. Sicuti neq; etiam, quòd expe-
diebat subjacentibus quidem semper superio-
res esse minores: siquidem quòd gestatur, mi-
nus esse oportet eo quòd gestat. Quæ causa fuit,
cur natura omnium spinæ ossium infimum, fe-
cerit maximum, ipsum veluti fundamentum
quoddam, ossibus omnibus subdens. Secundum
magnitudinis locum habet spondylus illi secun-
dus

Spina usus
consistens,
& construc-
tio.

Spina con-
stat ex qua-
tuor & vi-
ginti ossibus.
Spina extre-
mum, os la-
tum.

Spina maxi-
ma partes
quatuor: col-
lum, dorsum,
lumbi, & os
sacrum.

Luxationis
spina, qua
pessima.

Circularis
perversio.
Ang. laris
perversio spi-
na.

Spondylorū
singulis fi-
bras inesse
obliquas.

Gestata ossa,
minora esse
debere iis, à
quibus gesta-
tur.

Os latū, cur
omnium spi-
næ ossium sit
maximum.

*Vertebrae
primum
cur latitudo
sit omnium
maxima.*

*Spinalem
medullam di-
stribui in ner-
vos quinquaginta octo.*

Annulus

*Spondylus
medius in to-
ta spina, cur
productione
posticam in
neutra incli-
net partem.*

*Productio-
nes spondylo-
rum trans-
versa.*

dus conjectus. Reliqui autem, quantum situ ab
 infimo discedunt, tantum & magnitudine di-
 stant. Veruntamen quum spinalis medulla trans-
 iens per primas vertebrae, longè corpulentior
 existat, quàm ubi ulterius progreditur: consonum
 fuit rationi, eorum spondylorum latitudinem esse
 omnium maximam. Quod si laeves etiam debe-
 bant esse, ut omnibus aliis incumberent, perspi-
 cuum est, quod eas tenues etiam esse par erat. In
 hoc tamen videtur natura summè admiranda,
 quod tantà à cerebro produxerit spinalem me-
 dullam, quanta maximè partibus omnibus in-
 fernis suffectura esset. Siquidem quum in nervos
 octo & quinquaginta spinalis medulla dividen-
 da esset, tantam ex cerebro produxit, ut distribu-
 tionem in nervos planè esset æqualis, neq; in ipsa
 quicquam deficeret, nec redundaret. Cæterum
 loca unde emergunt, adeò omni ex parte sunt tu-
 ta, ut neq; lædantur quicquā, nec in tot, ac ejus-
 modi spinæ motibus, afficiantur. Moles verò
 cuiusque est tanta, quantam pars recipiens po-
 stulat. At via omnis quæ est inter primam produ-
 ctionem, & insertionem ipsius, mirabiliter ad
 cuiusque securitatem est comparata. Quum igitur
 spinalis medulla veluti alterum quoddam ce-
 rebrum, partibus sub capite sitis futura esset: &
 spina ipsi via simul indivertibilis, necnon firmum
 præsidium, destinaretur: ob eam causam tum alia
 multa in spondylis est machinata, tum quam
ἀννύων, hoc est, spinam vocant, ex mediis postre-
 misq; eorum produxit partibus, quæ esset veluti
 vallum quoddam ante spinam totam opposi-
 tum. Quantum autem os ipsum quod hic spinam voca-
 mus, versus posteriores partes extenditur, tan-
 tum illi, tegumenti gratia, cartilaginis circundu-
 citur. Huic autem rursus cartilagini ligamenta
 nervosa, crassa, lata, fortia, & mediocriter du-
 ra natura indidit, servatura simul, ac totam spi-
 nam colligatura. Productionum autem spinæ,
 quæ quidem situm supra habent, deorsum: quæ
 infra, sursum spectant, ut ipsarum figuræ forni-
 ces aut testudines referant: quarum forma figu-
 rarum omnium ad patiendum est difficillima.
 Non debet autem esse mirum, si soli spondylo
 qui in medio est spinæ, productio posterior, quæ
 acantham efficit, in neutram partem inclinet: hoc
 est, neque in collum, neq; in lumbos, sed omnino
 sit recta: quandoquidem non potuisset natura
 similem fornici totam spinam construere, nisi pro-
 ductiones omnes tam infernas, quàm super-
 nas, in terminum quendam communè rectum,
 ac nusquam inclinante junxisset, qui veluti for-
 nicis summities quædam esset futurus. Jam verò
 quum in thorace cor esset locatum, magnaq; ar-
 teria spinæ incumberet, natura longissimas fe-
 cit illic productiones, quæ spinam constituunt:
 in aliis autem partibus, omnibus quambrevissimas.
 Quemadmodum verò productione cuius-
 que spondyli parte posteriore, quæ spinam effi-
 cit, propugnaculi usum ostendebamus præstare:
 ita & alia productiones transversæ spondylis sunt
 duæ, quæ simul quidem lateralibus ipsorum par-
 tibus simile præbent præsidium, simul etiam ve-
 luti sedes quædam sunt, musculis spinæ internis
 atq; externis subditæ. Prædictarum autem pro-

ductionum, fines, quemadmodum & acanthæ to-
 tius, sunt ad mediam spinam conversi. Cur au-
 tem crassæ sunt productiones laterales spondy-
 lorum thoracis, tenues autem in spondylis lum-
 bi & magni ossis, in colli verò spondylis crassæ
 & bifidæ? An quod in thorace quidem, quum
 costæ non solum eis essent inarticulatæ, verum
 etiam per totum incumberent, consentaneum
 fuit, firmas atque stabiles facere productiones?
 Lumbi autem & ossis magni productionibus, quum
 vasa solum ac muscoli incumberent, nihil erat ro-
 bore opus? Quæ verò sunt in collo, meritisimè
 extiterunt bifidæ & crassæ; ut quod securitatis,
 propter acantharum brevitatē ejus spondylis
 deerat, id ex transversis compensaretur? Porro
 spondyli omnes, præter duos primos, partibus
 quidem anterioribus tuto inter se colligati, po-
 steriorem verò, articulati, firmitudinem simul sunt
 atq; ad motum facilitatem indepti. Atq; ob eam
 causam antrorsum quidem plurimum flecti pos-
 sumus, retrorsum verò non item: quemadmo-
 dum certè expediebat ad omnes humanas actio-
 nes. Siquidem facile rumpentur multa & præ-
 stantia vasa: si extensa plurimum ac refracta, dum
 spinam totam retorqueremus, essent.

GAL. DE VSV PARTIUM LIB. XIII.

Quum autem spondylorum locus posterior,
 in tres dividatur partes: primam, quæ exa-
 ctè posterior est, quo loco sunt spinæ: du-
 as, quæ utraq; hujus parte sunt, quas productio-
 num transversarum radices terminant, merito
 ex utroque harum duarum posteriori loco, in-
 ter se articulantur ipsi spondyli: quandoquidem
 aliunde id fieri nec licebat, nec erat expediens.
 Cæterum quum ipsorum spondylorum quisq;
 parte superna & inferna, iis qui utrinq; regio-
 ne sunt, committatur, merito duæ quidem accli-
 ves, totidem autem declives productiones eis
 extiterunt: hæc siquidem omnibus sunt commu-
 nes. Ex abundanti autem, veluti cumulus, ma-
 gnis spondylis alia duæ declives insunt. Quum
 enim ex declivibus productionibus, acclivibus
 invecitis, spondyli articulantur, ad securita-
 tem majorem natura alteram declivium totam
 articulationi subjecit, ligamentumq; validum ex
 ipsius fine productum, sub acclivem totam sub-
 misit. Verum si prædictis tribus productioni-
 bus (quarum una est omnium maxima, quæ spi-
 nam constituit, ac duæ transversæ) duas quidem
 acclives, quatuor autem declives adjunxeris, no-
 vem omnino ipsas reperiēs, quot sanè & qua-
 les in lumbi spondylis cernuntur: quemadmo-
 dum in collo undecim, præter mediā illam quæ
 antrorsum consistit. Porro dorso spondylis sin-
 gulis, productiones septem extiterunt, tamen
 non omnes formam habent similem, quod spon-
 dylorum ejus, novem superni, productionem
 superiorem habeant maximam, transversas ve-
 rò crassissimas, tum acclives ac declives, crassas
 simul ac laticas. Decimus autem qui hos sequi-
 tur, cætera quidem est similis, non tamen produ-
 ctionem posteriorem, ut illi, habet longam, de-

*Spondyli
quæ partem
articulationis
mutuam*

*Productio-
nes spondylo-
rum quæ habent
tur.*

*Lumbi spon-
dylorum pro-
ductiones
sem.
Colli spon-
dylorum pro-
ductiones uni-
cim.*

*Dorso spon-
dylis singulis
prem produ-
ctiones in-
se.*

clivem & tenuem: neq; etiam ipsas quatuor, per quas cum aliis utrinq; spondylis articulatur, habet similes: sed supernæ quidem duæ, prælocatorum novem spondylorum productionibus acclivibus: reliquæ verò duæ declives, reliquis sunt declivibus similes. Huic enim soli spondylorum omnium id est eximium, quod utraque articulatione propinquo sibi spondylo utrique invehitur. Reliquis verò omnibus qui sub hoc decimo sunt locati, id inest, quod acclives quidē productiones sint cavæ, declives verò convexæ. Ob id convexis quidem, subjectis spondylis invehuntur: acclivibus autem, superiores excipiunt. Qui verò supra hunc in dorso sunt & collo, hi omnes recipiunt simul, ac declivibus productionibus ambiunt acclives, quæ sensim fiunt convexæ. Postremi autem duo dorso spondyli, productiones duas reliquas declives ex partib. infernis ad tutandos articulos summillas, atq; ab aliis se junctas habent: qui soli spondylorū omnium obliquas utrinq; productiones, quas appellavimus transversas, non possident: pro quibus declives illas habuerunt. Per decimum igitur illū dorso spondylum, qui immotus in medio manet, natura totā spinā in partes omnino æquales divisit, mole spondylorum æstimata, nō numero. At verò superioribus ipso medio spondylis fecit productiones natura, convexas quidem acclives, cavas verò sensim declives: inferioribus autem contrā, cavas quidem effecit acclives, convexas autem declives. Quæ structura tum ad flectendam spinam, tum ad erigendam requirebatur. Est autem utriusq; figuræ terminus, ut quum flectimur, spondyli, quā possunt longissimè, à se invicem digrediātur, perinde ac si spina tum longior esse deberet. Quum verò erigimur, contrā, ut cuncti coeant, ad medium spondylorum accedentes, ac si spinam expediat esse breviorē. Quod autem cavitates quæ circū ossium inter se dearticulatorū convexitates utroq; vertūtur, sint ad motus obliquos aptissimæ: quodque motus ex duobus obliquis, parum à motu medio partem utroq; simul circū agentibus constitutus, necessario unus rectus fiat: nec non quod in spina satius fuerit, ex obliquis rectos efficere motus, ex dictis facile constat. Porro primus colli spondylus posteriorem productionem non habet, quod recti muscoli & breves, qui caput totum erigunt, omnem ipsius regionem occupent. Cui soli primo spondylo non insunt obliqua foramina, per quæ nervi à spinali medulla excidūt, & qualia omnibus aliis colli spondylis natura insculpsit, qua parte inter se conjunguntur, sic ut ex ambobus unum foramen instar semicirculi, nervo aptum, oriatur: ita enim non modò foramina ipsa, sed nervi etiam, qui per ea emergunt, sub productionum acclivium ac declivium radicibus (ubi primū ipsorū spondylorū latera desinūt) sita, adeò comuniuntur undiq;, ut alibi melius ea minimè collocari potuerint. In lumbis autem, si alteram productionū declivium accuratius consideres, non ad ligamenti firmandi duntaxat usum reperies utilem, sed multò etiam magis, primæ nervi productionis gratia comparatam. Siquidem

exporrecta post nervum, murus revera efficitur, & propugnaculum adversus ea quæ illi quoquo modo incident. Hanc igitur productionem in lumbi spondylis videas magnam (quod ipsi maximi sint) & duobus postremis thoracis similem. In aliis verò spondylis decem, eandem utilitatem nervis præstant productiones laterales, quibus costarum ossa invehuntur, atq; inarticulantur. Reliqui etiam, præter primū, colli spondyli, nervorū productiones ab utriusq; spondyli finibus lateralibus prominētes, habēt à transversis productionibus (quas bifidas esse diximus) tectas atq; stipatas. Etenim in lumbi spondylis, apertè nervus lateribus partium infernarum invehitur. In spondylis autem dorso, invehitur etiam hic quidem fini superni spondyli evidenter, sic tamen ut infernum attingere spondylum videatur. In colli verò spondylis, quod omnium minimi essent, uterq; spondylus æqualem portionem ad viam nervi contulit. Quum autem spondyli singuli, primum constructionis scopum haberēt duplicem, sedem scilicet tutā spinæ totius, atq; etiam motum, aliorum quidē omnium qui sunt sub collo spondylorum usus in securitate est major: superiorum verò, in motione. At quia nec inferni spondyli, alij alijs incumbere tutò poterant sine lata basi, ac forti ligamento: nec superni moveri facile, sine longo processu, aut ligamento laxiori, utrique spinæ parti natura congruente structura consuluit, prælongas quidem infernæ, cavas verò supernæ colli vertebrae faciens, non modò ad motum facilem, sed ad tutum etiam obeundum: alias aut omnes in planum, lævem, atq; undiq; æqualem, solidumq; circulum, terminans. Quæ ubi primus spondylus crassissimus est, ibi ipsum prope supernas articulationes foraminibus pertudit tenuissimis, quibus omnibus rebus potuit, patiendi difficultatem tum ipsi spondylo, tum nervo producendo comparans. Cui spondylo crassities illa ob tutam perforationem fuit comparata, & ut parte quidem inferna, secundi spondyli convexitates, superna verò, capitis eminentias excideret. Quæ enim ipsius spondyli partes maximè erant laboraturæ, has præter cæteras, satius fuit fortes efficere. Utrunque autem excidentium nervorū, in musculos ipsi primo spondylo incumbētes, natura distribuit. Verum quū prima conjugatio sit tenuis, ob idq; ex ipsa portio capiti distribui nequeat, ex secunda conjugatione natura id effecit. Nam per supernos musculos nervus uterque perlabitur, qui obliquus quidem primò in partem posteriorem ac superiorem tendit: obliquus autem rursus post hæc, prorsum ac sursum progressus, in caput totum demum dispergitur. Quod autem ex secunda ipsa conjugatione infra supererat, in propinquos omnes musculos est distributum, à quibus primorum spondylorum motus, tum inter se, tum cum capite fiunt. Cæterum egreditur secunda hæc conjugatio, ab utraque ipsius acanthæ parte, ex regione inter primum & secundum spondylum media. Tertia verò nervorum, qui à spinali medulla oriuntur, conjugatio, ex comuni foramine secundi & tertij spondyli emergit, musculisq;

Colli utrinq;
spondylum,
æqualem por
tionem ad se
am nervi co
ferre.

Natura indu
stra circa
formandas
vertebras.

Prima conju
gatio nervo
rum à spinā
li medulla or
torum.

Secunda.

Tertia.

genas moventibus, & illis qui collū totum cum capite retrò erigunt, distribuitur. Pars verò ipsius quæ prorsum fertur, secundæ & quartæ conjugationi miscetur. Nam tertia & quarta conjugatio, nervos communibus colli & capitis musculis suppeditat, ac præterea musculis genas moventibus, quemadmodum certè & partibus omnibus quæ sunt post aures. Quinta conjugatio productionem habet, qua quartus spondylus cum quinto conjungitur. Distribuitur autē quemadmodum & prædictæ. Pars tamen ipsius quædam retrò per profundum fertur in communes colli & capitis musculos: alia verò pars antrorsum in musculos genas moventes, & caput inclinātes: sicuti alia & tertia, in medio prædictarū partium, sursum, versus scapulæ summitatem, fertur. Juxta radicē autem nervorū, pars ejus utriq; vicinarum conjugationum, sextæ videlicet & quartæ, miscetur: & qui nervus à quarta ad ipsam descendit tenuis, is manifestò cernitur parti ejus misceri, qua maximam portionem ex ejus loci spondylis, nervus diaphragmatis colligit, utrinq; unus, qui sub membranas thoracem sepientes fertur. Sextæ post hanc conjugationis, sub quinto spondylo excidentis, missio fit magna cum propinquis utriusq;, sed plurima ejus pars ad sima scapularum extenditur. Auget autem quodammodo partibus anterioribus & diaphragmatis nervum, quemadmodum & aliis omnibus ejus loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit. Septimæ conjugationis, quæ ex communi sexti & septimi spondyli oritur foramine, magna fit permissio cum proximis. Ea tamen partem sui maximam extendit ad brachium: quemadmodum certè & ab octava conjugatione, quæ post septimū spondylum oritur, maxima pars in ulnam pervenit. Sic à nona conjugatione, quæ post octavū spondylum præcedenti miscetur, pars non exigua ad manus extremas pervenit: qui nervi circa primum intercostale spatium minimum locum occupant, quod primæ etiam costæ sint minimæ. Ob idq; post septimum spondylum natura cepit thoracem effingere, quod ea conjugatione, quæ est post octavum spondylum, ad utraq; uti poterat, ad primum scilicet inter costas spatium & manum. Ad diaphragma etiam mirabiliter admodum nervos ex spinali medulla colli, & ad musculos intercostales ex singulis propinquis spondylis, deduxit. Est autem septi transversi figura rotunda, situs verò obliquus, partibusque anterioribus ac superioribus ad pectus pertingit: inde retrò semper ad dorsum fertur, donec spinam contingat, cui adhærescit ad lumbum. Caput autem ejus, ad quod annectuntur fibræ, & in quod ipsi nervi descendunt, in medio ejus consistit. Quam ob rem diaphragma solum, earum partium quæ sunt sub clavibus, nervos ab spinali medulla colli recipit, membranis thoracem dispescentibus, stabilitos: aliarum verò inferiorum nulla. Melius siquidem fuit spinalem medullam thoracis, nervorū propagines ex propinquo omnibus quæ illic sunt, suggerere. Ob eamque causam à nervis qui singulis insunt spatiis intercostalibus, portio nō exigua per mus-

culos ad externa excidit. * Juxta radices autem costarum, in instrumenta quæ sunt ad spinam, dispergitur. Post verò, prope convexa maximè singularum costarum, in corpora thoraci circumfusa, veluti & prope pectus, partibus quæ illic sunt, disseminatur. Homini igitur, ac similibus, collum ex septem spondylis jure est compactum: quum ejusmodi magnitudo laryngi, primo instrumento vocis, conveniat, ex eoq; partes omnes, quas à spinali medulla colli præstiterat nervos recipere, recipiant quod satis est. Quum aut nec respiratio, nec vox possit sine thorace fieri, cujus præsidio indigent cor ipsum atq; pulmones, in illius certè structura hos quatuor scopos sibi natura proposuit, vocem scilicet, respirationem, ac tum cordis, tum pulmonis magnitudinem. Sequitur quippe ut arteriam asperam generatio pulmonis, sic magnitudinem hujus, magnitudo thoracis. Quin & cor positionē & magnitudinem in thorace sibi congruentē fortitur. Nec minus thorax, qui quidem ex duodecim vertebrais constat: quæ verò has deinceps sequuntur quinque spinæ vertebrae, eadem ratione sunt factæ, quæ illæ quæ sunt in collo. Nam quum nervi qui à spinali medulla proficiscuntur, in spinales atq; hypochondrij musculos dividantur, primas quidem productiones oportuit ad eas partes mitti: post autem, & ad crura: ac tum os sacrum oriri, quod simul quidem veluti fundamentum quoddam spinæ futurum esset, si autem ossa coxendicum atq; ilium incumbētia sibi, excepturum: sine quibus nec pubis ossa consistare poterant, crurūq; ad ischion dearticulatio omnino non fuisset. Horum enim primorum gratia, tum autem uteri, vesicæ, atq; intestini recti os latum, sive sacrum molita est natura. Per cujus quidem foramen primum qui nervus excidit, ijs qui ad crus feruntur, miscetur. Proinde conjugatione quæ sunt sub diaphragmate, nervorum à spinali medulla proficiscentium, qui ad musculos prædictos & crura feruntur, quinque quidem spondylis eguerunt: sexta verò quæ eas excipit conjugatio, primis ossis magni foraminibus. Sunt autem & aliæ tres in eo conjugationes, quæ in partes superiores distribuuntur. Constat itaq; collum meritò ex septem spondylis compingi, thoracē ex duodecim, lumbum ex quinque. Porro os sacrum cum ultimo articulatum lumbi spondylo, ad finem cartilaginis habet quandam epiphysim, ut multò difficilior patiatur. At verò validum ligamentum anteriores omnium spondylorū partes validissimè colligans, desinit posteriore quidem parte in tunicam meningas spinalis medullæ ambientem: anteriore verò, paulum progressum, utraq; sui parte inferitur in cartilaginem, quæ spondylos jungit. Cæterum spondyli omnes ab ea connexionione, quam parte anteriore habent retrò progressi, paulatim à se diducuntur, locum omnem medium refertū habentes humiditate crassa & viscosa, quæ ad motionis facilitatem conducit. Meninges autem vestientes spinalem medullam, cerebri involucra similitudine referunt, nisi quod crassa medullæ spinalis meninx, undique tenuem tangit & comprehendit. Sunt enim cōmunia spinali medul-

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Nona.

Costæ primæ sunt minimæ.

Septi transversus figura, & situs.

Collum ex septem spondylis constare. Larynx primum instrumentum vocis.

Thoracem se necessarii vocis atq; respirationis scopi quæ proposuit sibi natura thoracis generis.

Thorax duodecim vertebrais constat.

Ossis sacrum.

Pubis ossa.

Lumbi quinque spondylis constatur.

Vertebrae ligamenta.

Humiditas vertebrae.

medullæ cum cerebro, quod corporis substan-
tia sit illi hæc similis, & nervorum etiam princi-
pium existat. Propria aut, quod quæ cerebrum pul-
set ac moveatur, quanquam osse immobili deli-
tescens, ipsa tamen non moveatur, tamen si a mo-
bilibus vertebriis contineatur. Non ab re igitur
duæ meninges ipsis similiter fuerunt datæ: alte-
ra quidem ad vasa quæ ipsis insunt, colliganda,
totamque eorum substantiam, quæ mollis est ad-
modum, constringendam: altera verò quæ te-
gat, & adversus ossa circumfusa muniat. Ossa
etiam ipsa extrinsecus sunt attributa, veluti pro-
pugnaculū atque murus, contra injurias extrinse-
cas. Privatim verò utriusque, quod cerebrum qui-
dem pulsabat, crassa meninx tantum ab eo dis-
cessit, quoad ipsi, dum dilataretur, suscipiendo
esset satis. Quod verò spinalis medulla non pul-
saret, crassa meninx cum tenui undique se conjun-
xit. Quod etiam capitis ossibus conspicuus nul-
lus motus inesset, spinalis autem medullæ ossi-
bus vehemens, cerebro quidem nullum extra
crassam meningem aliud operimentum fuit cir-
cundatum: spinali autem medullæ, tertia illa for-
tis atque nervosa tunica: cui etiā viscidus ille hu-
mor est circumfusus, ne assiduū motū exiccetur.
Singulari autem spinæ partibus ab adjacentibus
vasis, per foramina quæ nervos ipsos deducunt,
propagines natura suppeditavit, unam singulis
spondylis conjugationem tantæ magnitudinis,
ut in corpora omnia spondylo circumjacentia,
dividi planè queat. Sed quoniam conjugatio
nervorum una ex singulis spondylis enasceba-
tur, planum est, quod ipsorum numerus, vena-
rum & arteriarum numero æqualis erat futu-
rus. Cæterum parvis quidem spondylis prædi-
cta duo foramina satis esse possunt, per quæ in-
trò quidem venæ & arteriæ, foras verò nervi fe-
rantur. Magnis autem, non hæc modò, verum
etiam quæ vasis nutrituris servirent, natura de-
center est machinata. At verò scapulas ipsas, pri-
mò quidem propter humeri articulationem, de-
in autem ex abundanti, propter partium thora-
cis, quæ illic sunt, custodiam, excogitavit natu-
ra. Thorax siquidem respirationis est instrumen-
tum, non minus quam pulmo: cor autem vitæ
principium. Quia igitur thoracis partibus po-
sterioribus non aderat nobis oculi, quibus præ-
videre nocitura liceret: ne omnino negligeren-
tur, natura regionem illam vallo quodam spon-
dylorum, atque productionum spinæ, munivit,
quibus sursum porrectis, primum quidem sca-
pulas utrinque applicuit, dein carnis copiam ap-
posuit. Ad hæc leviter superiorem spinæ finem
adaugens, rectumque illum attollens, atque ibi
clavi conjungens, *ἀκρωτιον*, quod vocant; effe-
cit, tum humeri articulationi, tum brachij, ca-
piti, atque adeo scapulæ ipsi præsidium, & fir-
mamentum futurum. Quod si inter os pecto-
ris & spinæ finem, quæ ad scapulas est, conne-
xa clavis non fuisset; nihil utique prohiberet,
quo minus os latum scapularum, nusquam sta-
bilitum, thoraci incideret, coarctaretque ibi hu-
meri articulum, multosque motus brachij impe-
diret. Non temere autem natura in homine qui-
dem humeri articulum longissime à thorace ab-

duxit: in quadrupedibus verò, proxime colloca-
vit: quod in illo quidem manus ad varios usus
servientes, spatiosum locum desiderent: in bru-
tis autem nequaquam, quod in eis anteriores
artus tantum ambulationi subserviant. Meri-
tò itaque homo, ne si velit quidem ambulare qua-
tuor artibus queat, quod in ipso scapularum ar-
ticuli longè sint à thorace abducti. Meritò etiam
simia, ut in cæteris est hominis imitatio ridicu-
la, ita & in artibus. Cæterum quemadmodum
simia, quod animam habet ridiculam, corpus
ob id habuit ridiculum: ita homo, quod animam
rationalem haberet, ob id etiam corpus solum
inter ea quæ sunt super terram, habuit divinum.
Porro juxta jugulum ipsum est clavis, convexa
quidem foris, intus verò cava: quod videlicet lo-
cum iis instrumentis præbeat, quæ per illas par-
tes feruntur. Ubi verò à jugulo cœpit discede-
re, tantum paulatim antrorsum redit, usque ad
humeri summitatem, quantum finis particulæ
ipsius clavis intumescens, retrò secesserat. Col-
ligat autem ibi ipsam spinæ, os parvum & car-
tilaginosum scapulæ. Quum autem manus tota
ad multos ac varios motus comparata esset, ca-
put quidem brachij rotundum habere ipsam o-
portuit, cavitatem verò ei subditam, nec magnò
perè profundam, nec in magna supercilia finien-
tem. Quia quidem structura ad varias motiones
apta, quum constet humeri articulus, parū abest
quin assiduè brachij caput luxetur, quippe quod
cavitate adeo exigua vehatur, ut pars ipsius ma-
gna extra sit, nulloque innixa sublimis pendeat.
Cui discrimini occurrens natura, tria ligamenta
valida, os brachij cum scapulæ cervice jungen-
tia, præter commune omnium articulorum, ro-
tundum est machinata: duos præterea scapulæ
processus recurvos, qui articulum muniunt, atque
ex utraque horum parte, musculos ipsum maximos
constringentes. Quorum trium ligamentorum
duo quidem prorsus sunt rotunda, tertium ve-
rò leviter latum. Enascitur autem primum qui-
dem ex finē apophyseos, quæ anchoram refert;
internisque brachij attenditur partibus. Alterum
verò, quod hoc est majus, ex cervice scapulæ,
qua parte supercilium cavitatis illius est altissi-
mum: atque hinc caput brachij sedem præbet fir-
missimam, sua lata fissura. Reliquum denique &
tertium, ex eodem loco, quo secundum, oritur:
obliquum autem sub eo inseritur & ipsum in
primum capitis brachij initium, quo modo la-
tum ligamentum, quod in orbem articulum to-
tum complectitur. Quæ ligamenta duo, ad mu-
sculum brachio incumbente perveniunt, quem
roborant. * Munitur humeri articulus, à scapu-
læ etiam processibus superioribus, nempe ab il-
lo qui est ad summitatem humeri (quæ cornifor-
mem appellant) & ab externo, qui anchoræ est
similis: necnon à maximis musculis tendoni-
busque, qui totam movent articulationem, con-
stringitur undique: quorum musculorum fines
ossi brachij insiguntur. Cæterum ad pectus bra-
chium adducit, leviterque trahit deorsum, is mus-
culus qui juxta mammam oritur, magnitudi-
ne mediocris. Alius autem contra, ex æditis ena-
tus pectoris partibus, adductionis sursum est

*Humeri arti-
culus cur in
homine quæ
longissime à
thorace ab-
ductus.*

*Simia est ho-
minis imita-
tio ridicula.
Simia, quod
animam ha-
beat ridicu-
lam, corpus
sortita est ri-
diculum.*

*Homini soli
inter anima
lia terrestria
cur distinctum
corpus tribu-
tum.*

*Clavicula
colligatio.*

*Humeri arti-
culatio cur
luxationi ob-
noxia.*

*Humeri liga-
menta tria.*

*Scapula pro-
cessus recur-
vi.*

*Brachij mus-
culus qui
a quibus
oriatur mus-
culis.*

autor. Tertius præter hos geminus, aut ex duobus coalescens, à toto pectoris osse exortus, æquabiliter ad illud totum brachiū adducit, si uterq; tendatur. Nā altero solum agente, aut deorsum, aut sursum, modicè motus brachij inclinabit. Porro musculus ille, qui à sublimi pectoris parte juxta claves oritur, duo habet capita, inter nis quidem partibus epomidi insertus, externis autem adhærescens infernis scapulæ partibus. Ac solius musculi hujus tensi actio, brachiū extrorsum extendit: alterius verò, qui ad clavē per venit, versus interiora convertit. Tensis autem æquè fortiter ambobus capitibus, brachium rectam planè ac mediam extensionem assumit. At que alij etiā duo musculi, utraq; spinæ, quæ est ad scapulam, parte, similem prædicto habent actionem. Octavus verò alius ultra prædictos est musculus, qui ortus * à maxima parte inferioris, qui in scapula est, lateris, brachium extrorsum abducit, iis qui sunt ad pectus, oppositus, qui brachiū sursum attollunt. Duæ sunt post hanc musculorū motiones, brachium extrorsum ac deorsum circumagentes: verum amplius quidem extrà abducit musculus, * qui ab inferiori ora lateris, quod in scapula est, proficiscitur. Nam qui scapulæ partem simam complectitur, minus qui dem extrà, sed deorsum magis brachium circum agit. Reliquus verò alius unus est musculus, qui deprimit, ipsumque retrò agit: cui prædictus musculus parvus succedit, qui efficit ne brachiū dum deprimitur, ullam in partem inclinet. Contenta autè fuit hoc natura, tametsi omnium minimo, propter naturalem manus ad inferiora impetum. At qui musculi brachiū attollunt, actione indigent vehementiori, ob idque tum ipsi, tum qui brachia circumagunt (est enim hic motus violentissimus omnium) in omnibus articulis robustissimi sunt, ac tendones maximè nervosos fortiuntur. Verum scapulam deorsum trahit musculus, ex inferiori quidem thoracis spondylo enatus, inferioribus autem partibus scapulæ insertus. Trahit autem eam sursum musculus latus ac magnus, qui à spina enatus, sursum ad os occipitis pervenit. Trahit etiam sursum & musculus tenuis, qui ab iisdem capitis ossibus ortus, ipsi ad spinæ basim inseritur. Retrò autem alij duo musculi abducunt ad totam animalis spinam: quorū editior ipsam inflectit sursum, ad colli spondylos: reliquus autem abducit ad spondylos dorsi. Tensis verò ambobus simul secundum proprii situs rectitudinē, fertur ad * dorsum. Quum autem tensus est is musculus, qui ex laterali primi spondyli apophysi exoritur, scapulæque finibus, qui sunt ad summitatē humeri, inseritur, maximè quidē ipsum humerum trahit: cum eo autem & scapulā totā, ad partes colli laterales, ut ad anteriores musculus tenuis, qui à labdoide oritur, convertit. Quin etiam ex musculis qui è pectore ad eā sursum feruntur, qui est editior, non solum mihi videtur caput brachij trahere, sed etiam scapulā, ut qui ligamento articulationem totam continenti inseratur.

Brachiū attollentes & circumagentes musculos esse robustissimos omnes.

Scapularum motus à quibus proficiscantur musculis.

Quum ipsarum animalis partium, nonnullæ quidem ad vivendum sint necessariae, ut cerebrum, cor, & hepar: aliæ ad vivendum commodius, ut oculi, nares, & manus: atque aliæ deniq; ad instaurationem generis, ut pudenda, testes, atque matrices: de his quidem ultimis hoc libro agendum est, quando quidem superiores illas jam explicuimus. Ergo natura, si fieri potuisset, maximè optasset suum opificium esse immortale. Quod quum per materiam minimè illi liceret, subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata, sapientis cuiusdam urbis conditoris exemplo. Quamquam nulla civitas comperitur adeo floruisse, ut non ipsa exedens vetustas, memoriam conditoris deleverit. Naturæ verò opificium jam multis annorum milibus constitit, atque stabit perpetuo. Nam mirabilem quādam rationem invenit, qua in demortui animalis locum, novum aliud sufficiat. Omnibus siquidem animalibus natura concipiendi instrumenta congruentia tribuit: ipsisque instrumentis eximiam quandam vim voluptatis efficitricem: animæ verò ipsis usuræ, incredibilem utendi cupiditatem conjuxit: à qua animalia incitata, stimulataque, etiam si rationis expertia, ætateque tenera sint, provident tamen non secus, ac si prudentissima essent, ut genus suum sit superstes. Porro in fœmineo sexu matricēs ventri subjecit, qui locus est tum ad usum veneriorū, tum ad recipiendum sperma, necnon ad incrementū fœtus, & perfecti enixum, opportunissimus. Et enim collum matricis, in pudendam muliebrem definit: quod quum animal concepit, adeo ad unguem clauditur, ut ne minimum quidem aut intus foras laxet, aut foris intrò recipiat. In coitu autem eo usque patet ac tenditur, ut semen per latam viam progrediens, facile in matricis sinū perveniat. Plurimum etiam & in partu distenditur, sic ut totum embryon facile ea via expellatur. Quare meritò à natura factum est nervosum simul ac mediocriter durum, ut citra noxam plurimum contrahatur & dilatetur, dirigaturque ad excipieudum semen. Nam si præ mollietate in seipsum concidens, plexus quosdam efficeret, ab ijs semen prohiberetur, quo minus ad sinus matricis perveniret celeriter, ac sic humor spiritusque à se mutuò separarentur, quos tamen coire est necesse, hunc quidem ut motus principium, illum autem ut materiam ad fœtum generationem appositam. Cæterum sanguis menstruus nequiquam prima est materia, atque gignendi animalis propria: sed quum seminis humiditas à calore infuso * ducta, tunicis matricum incidit, non secus ac pinguitudo facile agglutinatur. Atque inde uno temporis momento multa fiunt, eaque; admirabilia naturæ, circa animalis generationis principium, opera. Nam matrix ipsa quam celerrimè undique semini adhæret: collum autem totum connivet, & eius maximè opificium internum. Qui igitur humor matricis asperitates illinit, tori superficiei internæ subtenus, membrana tenuis efficitur. Interea autem spiritus

Particularia generis

Natura animalis

Concipiendi instrumenta

Generis cupiditas

Universis animalibus

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

Matricis collum

tus undique ad unguem retentus, non elabitur, sed motus naturales primus orditur. At verò quo tempore nec semen intrò, nec fœtus extrà fertur, matricis collum in flexus & contorfiones concidit: quæ ne matricis regio perfrigeretur, plurimum habent momenti. Neq; enim alia ratione in menstruis purgationibus partubusq; mulieres refrigerantur, quam quòd tunc matricis collum sit rectum, reſeratumq; Porro in animalibus numerosos fœtus gestantibus, natura fecit sinus matricis plures: in homine verò, ac ejusmodi, quemadmodum corpus totum est geminum, ita & matricis sinus est duplex, alter quidem in dextris, alter verò in sinistris locatus. * Si quidem quæ ob corporis imbecillitatem, brevioris vitæ futura erant, aut etiã præda fortioribus, iis animalibus omnibus assidui interitus remedium excogitavit natura, fœcundam scilicet generationem: semper receptaculorū matricis numerum, æqualem numero mamillarum præscribens. Mammis autem lac tunc accedit, quo tempore jam absolutus est fœtus. Nam quum tenera adhuc sint atq; imbecilla recens nata animalia, nec possint solidos cibos conficere, alimentū ob id natura eis comparavit, perinde ac si utero adhuc gestarentur. Quibus verò animalibus propter corporis siccitatem superfluis humoribus subnutriri non poterat, ut volucribus omnibus, iis natura præcipuum quendam amorem in ea quæ procrearunt, ingeneravit: quo impulsu, bellum pro pullis cum ferocibus animalibus, quæ antea declinabant, suscipiunt intrepidè, victumq; illis convenientem suppeditant. Ut igitur matricis duæ mulieribus in unum collum desinentes sunt factæ, ita & ubera duo, utrunq; suæ matrici, instar ministri boni, subserviēs. Unde Hippocrates ait: Si mulieri geminos gerenti, mammarū altera gracileſcat, si dextra quidem, masculi: sin sinistra, fœminæ abortum faciet. Si quidē mares in dextris, fœminæ in sinistris majori ex parte locantur. Etenim exiguæ, dum fœtus augentur, sunt mammæ, quo modo etiam matricis. Quum autem perfecti fuerint, & pariendi tempus institerit, simul cum matricibus, quod satis est intumescunt. Matricis itaq; partes sunt, sperma recipere, atque fœtum absolvere: mammarum verò, quod jam natum est educare. Quòd si animalia attentius dissecueris, reperies in iis quidem quæ adhuc augentur, vesicas matricibus multò majores: in perfectis autem, matricis vesicis. Vesica namq; ad portionem omnium aliarum partium augetur, ut quæ omnibus ætatibus æqualiter serviat: matrix verò, nec dum augentur adhuc animalia, nec quum jam consenscunt, ritè actionem suam potest obire. Siquidem alimento benigno abundantiq; fœtibus opus est, cujusmodi in solis florentibus abundare potest: quum in declinantibus quidem, alimentum non ritè coquatur: in iis autem quæ augentur, quamvis rectè concoctum sit, in nutritionem & autionem totum id absumatur. Est autem fœmina mare imperfectior, una quidem & prima ratione, quia frigidior. Siquidem in animalibus calidum est magis activū frigidum. Cæterum omnes quæ viris insunt partes,

in mulieribus etiam reperias, eo discrepantes duntaxat, quòd in mulieribus quidem ipsæ intus sunt conditæ, in viris autem extrà pendent, juxta nuncupatum perinæum. Quòd si muliebres quidē partes evertas extorsum, viriles autē intrò revertas, replicesq; inveniēs omnes inter se similes: cujusmodi & in talparū oculis sumere licet exemplum. Hæ enim vitreum & crystallinum humorem, & præterea tunicas his circumdatas, nō minus habent, quàm animalia quæ utuntur oculis. At neq; eis aperti fuerunt oculi, ne foras prodierunt, sed imperfecti fuerunt relictī. Sunt enim animalium naturæ variæ. Alia quippe non longè recesserunt à plantis, suntq; ea animalium omnium imperfectissima, sensu unico tactus prædita: ut ostreorum plurima. His recesserūt amplius, quibus gustus inest: his adhuc amplius, quæ odoratus instrumentum sortiuntur. Quibus adhuc multò magis, quæ instrumentum audiendi sunt prædita. At perfectis proxima sunt, quibus præter hæc omnia, adest visus. Solis autem hominibus ratio inest, qua divinius nihil mortali animali est concessum. Sicut igitur homo animal est perfectissimum omnium, sic tantò est fœmina imperfectior mare, quanto frigidior. Genitalia autem eius, formata intus fuerūt, dum ipsa utero adhuc gestaretur. Quum enim extare & foras propulsari præ caloris imbecillitate non possent, ipsum quidem animal quod cōformabatur, imperfectius eo, quod undiq; est absolutum, reddiderunt: quàm imperfectiōne tamen consequuta est utilitas nō aspernanda, ad instaurandum humanum genus. Nam quum fœtus ipse materiam copiosam postulet, tam ad primam sui constitutionem, quàm ad omnem incrementum, si calidissima quidem ipsa fœmina esset, utiq; discuteret talem materiā, nec sineret coacervari eam: quemadmodum si impensè frigida, ne humorem quidem ipsum concoqueret. Frigidiorē igitur eam eousq; fieri satius fuit, quoad alimentum quod concoxisset & cōfecisset, discutere totū non posset. Hæc itaque est frigiditatis fœminæ utilitas, quam mox sequutura erat partium imperfectio, quum ipsa præ caloris imbecillitate prorumpere foras non possent. Quod commodum ad instaurandum genus, est secundum ac maximum. Nam si extrà prodissent, scrotum utiq; extitisset: quod quum intus jam delitescat, matricum substantia est factum instrumentum semini recipiendo, ac retinendo, fœtui præterea alendo, ac perficiendo, aptissimū. Statim autem & testiculos fœmina erat habitura minores, imperfectioresq;: ac sperma in ipsis, tum parcius, tum frigidius, humidiusq;. Sequuntur enim hæc quoq; necessariò caloris penuriā. Non igitur semen ejusmodi, generando animali satis esse poterat, licet in eam rem fuerit & ipsum utile. Mas verò quantò est calidior, tantò ipsius testiculi extiterūt majores. Semen autē quod in ipsis gignitur, quum sit summè coctum, principium effectivum est animalis. Ex uno itaq; principio, ab opifice sapienter invento, juxta quod fœmina mare fuit imperfectior, nata sunt omnia, quæ ad animalis generationem pertinent: tum quòd muliebres par-

Muliebres partes pudendi, virilibus esse similes, nisi quod sunt inversæ.

Talparum oculi inclusi imperfecti.

Natura animalium varia.

Animalium omnium imperfectissima.

Ratio inest soli homini, quæ divinius nihil animali est concessum.

Genitalia fœminæ fuisse intus formata, quia in utero præ imbecillitate caloris foras propulsari haudquaquam poterunt.

Frigiditatis fœminæ utilitas.

Testiculi fœminæ & semen qualia.

Testiculi masculini calidiores fœminæ.

Semen masculini esse principium effectivum animalis.

Pudendum virile quale.
Semen virile quale.

Semen quod imperfectius movetur, fit femina: quod perfectius, masculus.

Semen viri & necessario miscendum esse ad fetus generationem. Ova subventanea animalia excludenda inepta.

Animalia absque commercio maris & agnecia.

Molam absque viro concipi a muliere non posse.
Semen masculi esse motus principium.
Vena cava.
Ren sinister dextro inferior.
Vasa emulgentia.

Spermatice Vasa dextra, oriuntur a magna dorsi & vena & arteriosa, raro autem ab emulgentibus dextris.
Spermatice Vasa sinistra a sinistris oriuntur emulgentibus.

Testiculū sinisterum & matricem sinistram in feminis, recipere impurissimum sanguinem.

Partes matricis dextrae cur sint calidiores sinistras.

tes intus reconditæ sint, quatenus dictum est: tum quod virile pudendum, extrâ oblongum promineat, ad venerem, atq; ad semen excernendum aptissimum, quodq; semen ipsum virile sit multum, & crassum & calidum. Quod quidem non alia quadam ratione ad maris, alia ad feminae procreationem movetur (sic enim principium animalis non esset simplex, si motus omnino repugnantes haberet) verum * quod imperfectius quidem movetur semen, fit femina: quod perfectius autem, masculus. Ipsum autem motum perfectum aut imperfectum, inæqualitati quæ in calido & frigido est, jure tribueris, ad quod unum principium, particulares omnes revocabis actiones. Jam ipsum femineum semen gignere per se foetum non potest, sed maris semen omnino flagitat, cum quo oportet misceatur, ita ut utrumq; semen in unum motum conspiret. Nam tametsi gallinae citra gallinacei operam, ova subventanea concipiant, ex illis tamen animalia excludere nequeunt: quandoquidem ut ea perfecterentur, masculi caliditatem desiderabant. Sed ne id quidem in gressilibus animalibus unquam potest contingere. Solum namq; si quod animalis est genus temperatura eo usq; siccum, ut humoris frigidi redundantiam in femineo semine quadantenus possit absumere, id foetum ejusmodi, qualia in gallinis sunt ea ova, sine mare potest efficere. At mulierem nemo unquam vidit sine viro vel molam, vel ejusmodi quippiam concepisse. Quamobrem satius fuerit maris semen motus principium existimare: feminae vero, ad animalis generationem aliquid etiam ipsi conferre. Porro vena cava, quæ primum adhuc ex hepate emergens, sublimis ad spinam flectitur, dextrum habet renem, ad dextram sibi adjacentem: tum deinceps paulo infra ad lævam, sinistrum. Producitur autem ex ipsa vas venosum maximum in utrumq; renem, sicuti & arteriosum ex maxima arteria quæ dorso incumbit. Quoniam verò genitalia organa his vasis subjacent, hinc jugū venarū & arteriarum ad ea proficisci erat necesse. Quocirca vasorum quæ ad ipsa feruntur, quæ ad dextram quidem matricem atq; ipsius testiculum progrediuntur, à magnis ipsis vasis, quæ sunt ad spinam, proficiscuntur, vena quidem à cava vena, arteria autem ab arteria magna: etsi raro à vasis quæ in dextrum procedunt renem, oriatur, ubi dexter ren sinistro propinquus fuerit. Quæ verò ad sinistrum testiculum in masculis, aut ad matricem sinistram in feminis tendunt (sunt autem hæc etiam duo, arteria scilicet una, atq; alia vena) non amplius à magnis vasis, sed ab eis quæ in renes feruntur, emergunt. Ex quo intelligi potest, testiculum sinistrum in masculis, & matricem sinistram in feminis, sanguinem impurum adhuc, excrementosum, humidum, ac serosum recipere. Quæ ex re accidit, ut ipsa quoque recipientia instrumenta, temperamentum habeant diversum. Quemadmodum enim sanguis purus excrementoso est calidior, ita & partes dextræ quæ ex ipso nutriuntur, sinistris sunt calidiores: id quod principio etiā erant, vel ratione hac, quod secundū hepatis rectitudinem locarentur. Quod quidē si verum

est, ac præterea masculus est calidior femina, probabile utique fuerit, partes quidem dextras, masculorum: sinistras autem, feminarum esse generatrices. Eodem pertinent & quæ ab Hippocrate dicta sunt: Si dexter quidem testiculus attollatur, hoc est, si valentior sit, masculum gignet: sin vero sinister, feminam. Cæterum pars aliqua dicitur fortior aut imbecillior altera, bifariam: uno quidem modo, simpliciter: atq; ita cor hepate, arteriæ venis, nervi carnibus, ac deniq; omnia dextra sinistris in omni animalium genere sunt fortiora: alio autem, secundum hujus individui constitutionem. Leoni siquidē potest esse sinister testiculus fortior, si præcipue in prima compactione, dextro aliquis affectus acciderit: quum nimirū quælibet pars, morbida magis atq; imbecillior in omnem vitam reddatur, si quod vitium vel exiguum, in prima cōformatione contraxerit. Cujus vitij culpa, tum in primum maris cum femina coitum intempestivum in gravidæ victus rationem sequentem, est referenda. Quum igitur duplex sit masculorū generationis principium, in feminis quidem dextra matrix, in masculis verò dexter testiculus: consentaneum est masculum in dextra matrice, femina in sinistra majori ex parte inveniri. Fieri tamen potest, licet rarer, ut sinistra matrix à calore feminis victa, pro femina masculum in seipsa gigni permittat. Quemadmodum contingit etiam interdum, ut semen quod feminā erat generaturum, calefactum à dextra matrice foetum efficiat masculum: contra, quod masculum erat geniturum, à sinistra refrigeratum, in contrarium mutetur. Ipsorum autem foetuum causa, existit principium venarum, matricis ipsas nutrientium, ac mammas cum eis colligantium. Sola enim hæc instrumenta per vasa congi expediebat, ut quando in matricibus augeretur foetus, atq; conformaretur, illi soli venæ cōmunes, ex utrisq; partibus alimentum affunderent: quando verò in lucem æditus esset, mammis rursum totum alimentum surreperet. Quæ causa est, cur eodē tempore menstrua bellè procedere nequeant, & femina ipsa lactare. Porro ante conceptum in muliere ætate florente, quicquid sanguinis superflui colligetur, natura singulis mensibus per venas ad uterum pertinentes exercent. Quum autem jam conceperit, ex iisdem vasis foetus trahit alimentum copiosum. Quod verò reliquum est, ad pectoris regionem suggeritur. Itaq; merito dixit Hippocrates, lac germanū esse sanguini menstruo. Cæterum quū foetus imbecillior effectus, sufficiens alimentum non trahit, ante tempus lacte intumescunt ubera: gracilescent autem, quum matricis alimentum penuria laborant: quam constitutionem abortus sequitur. Jam verò non ob id tantum, quod diu voluerint genitalibus quidem voluptatē maximam esse cum usu venereorū conjunctam, florentibus aut insanā quandā atq; immensam veneris cupiditatem ingenitam, protinus voluptas atq; cupiditas animalibus accesserūt: sed ex materia atq; instrumentis ad ea ipsa cōparatis, utraq; affectio exoritur. Siquidem arteriæ & venæ prædictæ, quæ ad partes genitales feruntur, matricum

Dextras partes, masculorū: sinistras, feminarum esse generatrices.

Fortius in altero bis am dicitur.

Principium generationis masculorū duplex.

Vena alena matricē, mīq; ea colligantur, fect gratia cōstructa.

Lactante jmina, menses proveniunt.

Menstrua vacuatio.

Lac germanum esse sanguini menstruo.

Abortus quæ constitutione sequatur.

Veneres voluptatis, appetentia causa, materia instrumentis consistere.

cum quidem fundum prætervehuntur: laterali-
bus verò ipsarum partibus postea invec-
tae, in
duo divaricantur. Tum autem pars alia illinc à
lateribus ad fœminæ testes secedit, qui & ipsi ma-
tricibus adjacent. Altera verò in fundū progres-
sa, multipliciter tota in ipsum distribuitur. Com-
mittuntur autem hic fines vasorum, quæ in sini-
strū sinū matricis divisa sunt, cum finibus eorū,
quæ in dextrum eiusdem sinum sunt distributa.
Quo fit ut dextra etiam matrix assumat serosam
humiditatem, quamvis exiguam. Siquidem non
solum auget in sinistris partibus frigiditatem ea
ipsa humiditas, sed etiam cum spiritu iuncta, ubi
incalcescit, atque evacuari postulat, acrimonia &
mordacitate sua, omnium maximè potest partes
ipsas excitare ad agendum, voluptatemq; incre-
dibilem interim dum agunt, præbere, acrium
humorum exemplo, qui delitescunt sub cute,
maximum etiam pruritum inferunt, ac suo mo-
tu voluptatem non exiguam inducunt. Sunt au-
tem genitales particulæ longè, quàm cutis ipsa,
sensibiliores, ac proinde majori voluptate affi-
ciuntur. Semen igitur (cuius humiditas crassa,
viscosa, spumosa, ac vitali spiritu plena existit)
quando in propriū locum inciderit, principium
fit animalis generationis. Quum autem in alie-
num, exiccatur & cōtabescit: nimirum expiran-
te quidem repente spiritu, confidente autem hu-
miditate viscosa. Causa generationis fœminei
seminis, est huiusmodi. Ex ijs vasis quæ ad ma-
trices accedunt, pars illa quæ fertur deorsum,
involvitur, modo persimilis ijs vasis, quæ in testi-
culos masculorum perveniūt. Itaq; superjacens
quidem vena, subjacens autem arteria, utraq; in-
flexus numerosos atque æquales torquetur: in
quibus plexibus sanguis & spiritus qui ad testes
descendunt, diutissimè concoquuntur. Testes ve-
rò quū sint laxi, cavernosiq; , excipientes humo-
rem qui in vasis coeptus erat concoqui, rursus
eum & ipsi percoquūt: perfectius quidem ad fœ-
tus procreationem, viriles testes, majores & cali-
diores quum sint, genituramq; magis elabora-
tam excipiant: imperfectius autem muliebres,
utpote minores, & frigidiores, excipientesq; hu-
morem non usque adeo concoctū. Quum igitur
omnes particulæ alimentum sibi ipsis assimilent,
mirum non esse debet, si tunica vasorum albæ
existentes, sanguinem in formam sibi ipsis simi-
lem, propter longam moram, immutet. Quum
autem marem quidem semen foras ejaculari, fœ-
minam verò in seipsam oporteret: ob eam cau-
sam & vasa quæ testibus semen exciperent, in
maribus quidem ad pudendum exporrexerit na-
tura, & ad meatū per quē etiam lotium emitti-
tur, orificio adaptavit: in fœminis autem tum in
ipsas matrices inseruit, tum cōstituit, ut in capa-
citatem internam semē excernerent. Ad hæc e-
tiam, virile vas spermaticū, latum ac lōgum exi-
stens, quum jam prope pudendum accesserit,
contrahit veluti quosdam sinus: at muliebre, si-
mul est angustū ac breve, quod nec multū, nec
crassum semen deducturum, ut illud, esset. Ad
excernenda ea quæ continētur in vasis, ipsa par-
tium genitalium veluti convulsio quædam, quæ
in coitu venereo accidit, haud exiguum habet

momentum. Nam quod in morbo comitiali, &
gonorrhœa, contrahantur vasa testiculorū, ob
id etiam coguntur semē ipsum exprimere. Jam
verò muliebre semen, præterquā quod con-
fert animalis generationi, etiam ad voluptatem
in coitu excitandam conducit. Est autem virile
semen membranarum atque vasorum omnium
origo. Ipsum quippe statim concoquitur, atque
initio ex muliebri nutritur semine, tanq̃ id natu-
ra sit familiare magis quā sanguis. Quicquid
enim nutritur, à similibus augeri facilius potest.
Porro qui humor in illis corporibus glandulo-
sis gignitur, quæ utraq; parte colli vesicæ locata
sunt, is in meatum urinarium effunditur: atq; in
masculis quidem, unā cum semine in matricem
delabitur: in fœminis autem, & foras, & in mu-
liebre pudendū erumpit. Utilitates autem eius
in sexu utroque sunt, quod ad venerem exciter,
in coitūque delectet, denique meatum urina-
rium madore suo perfundat, habilioremq; ad
urinæ transitum reddat. Cuius humoris virtute
etiam ipsi spadones voluptate inter coeundū
fruuntur. Effluit autem tunc fœminis, quum ve-
hementer oblectantur in coitu. Quo tempore
qui concumbunt, circa pudendum libi eum ef-
fundi percipiunt. In masculis autem propria &
præcipua eius utilitas est, qualis seminis existit in
fœminis. Sunt enim inter se specie simillima,
muliebre semen, & humor qui glandulosis ma-
riū corporibus inest: quū & robur & calor ma-
sculorum, detentum in ijs partibus humorē ita
concoquat, ut nihil ei ad fœminarum semen de-
sit. Unde & meatus qui ex ijs corporibus profi-
ciscuntur, non dubitant nonnulli vasa sperma-
tica nuncupare, & astites glandulosos: sicuti &
varicosos astites, eos qui à testiculis explantan-
tur. At in fœminis ille humor, tenuis atq; crudus
existit, ineptusq; ad gignendum. Verumenim ve-
rò quū semen matricibus sit succus familiarissi-
mus (cuius recipiendi gratia extiterunt) idq; du-
plex habeatur, ad virile quidem trahendum, ma-
tris collum est destinatum: ad semen autem à
propriis trahendum testiculis, comparata ipsa
cornua fuerunt: quæ propterea sursum ad ilia
spectant, paulatimq; arcata desinūt in angustis-
simos fines, testiculis qui è directo sunt, conjun-
cta. Quod autem eò pertingit vas, marium sper-
maticis vasis quadam proportionē responder.
* Cui insunt etiā & musculosa corpora, quæ ad
testiculos ipsos descendunt, qualia in masculis à
musculis hypogastrii oriuntur. Quū aut ut testi-
culos, sic vasa spermatica, in maribus oporteret
esse majora, ac testes ipsi utrinq; pudendi radici
adhærent, longum quendam viæ circuitum i-
psis vasis excogitavit natura: ea primò ducēs sur-
sum ad ilia: rursus autem per interna deducens,
ad eum usq; locum unde pudendum enascitur,
ubi semen erant eructatura. Quo loco multis fle-
xibus ea contorquens, varicosaq; efficiens, plu-
rimumq; amplificans atq; dilatans undiq; , pro-
ventu seminis sic præparavit quamplurima re-
ceptacula. At fœminarum testiculi, quum parvi
penitus existentes, vasa etiam exigua productu-
ri essent, loco, quē nunc possident opportunissi-
mo sunt locati: utraq; quidem matricis parte po-

*Semen viri-
le est membra-
narum et va-
sorum omni-
um origo.*

*Semen viri-
le à mulie-
bri ali.*

*Humoris ge-
niti in glan-
dulosis corpo-
ribus utrin-
que adhaeren-
tibus collo & e-
sica, usus.*

*Spadones in-
ter coeundū
quaratione
voluptate
fruuntur.*

*Astites glan-
dulosi.
Astites vari-
cosi.*

*Semē esse suc-
cum matricis
familiarissi-
mum
Collum ma-
tricis.
Cornuū ma-
tricis usus,
& situs.*

*Spermatico-
rum vasorū
situs & pro-
gressus in
masculis.*

*Testiculorū
seminis eorum
positio.*

*Mentus à pe-
risonao descē-
dentis usus.*

Vesica situs.

*Matricem lo-
cari inter ve-
sicam et inte-
stinū rectū.*

*Genitalium
nervi, & vene,
arteriaeq;
quales.
Vasorum in-
testes impla-
tiones.*

*Scopi in ner-
vis distribu-
endis tres.*

*Nervis par-
ticipis suis-
se opus ma-
tricihus, &
partib. qua
ad marium
testiculos per-
tinent.*

*Virga virili-
s, & collo ma-
trici, cur
plures nervi
inferantur.*

*Matrix cur
unica tuni-
ca constet.
Intestini
cur duplex
tunica, insit
Vesicae utriq;
unica tuni-
ca est data.*

*Matricis tu-
nica cur in-
sit omne ge-
nus fibrarū.*

*Matrix con-
nexiones ad
vicina cor-
pora.*

siti: paulò autem supra cornua, abducti. Præter-
ea quo meatu descendente à peritonæo, veluti
fistula quadam, nutrientia viriles testes vasa de-
duxit natura, eodē est ad spermatici vasis ascen-
sum abusa, communem tribus vasorū generibus
securitatem, unum hunc meatum inveniē. Il-
linc autem rursus deducens, coxendicū quidem
ossibus, à lateribus: pubis verò, ex anterioribus:
osse denique lato, ex posterioribus, ipsum muni-
vit. Cæterum vesica prima pubis ossibus subja-
cet. Post hanc autem, sunt matricēs in fœminis.
Post matricēs intestinum rectum, tanquam sub-
sterniculum molle. Quum autem masculorū va-
sa spermatica, tendi contrahi; magis quàm fœ-
minarum in ipso coitu oporteat, ob id ea etiam
robustiori tunica constant. Porro ad genitales
particulas, nervi quidem mediocres, venæ verò
& arteriæ maximæ, duplicesq; feruntur. Siqui-
dem alterum jugum earum, ex locis propinquis
renibus in testiculos & matricis fundum (ut di-
ximus) proficiscitur: alterum autem ex vasis,
quæ sunt ad os sacrum, sejunctum, infernis par-
tibus insertatur, ubi primū in fœminis quidem
matricis collum, in maribus autem virga, exori-
tur. Quandoquidē ex hac copula, inferiores illæ
partes nutriuntur. Sed nervorum etiam jugum
quoddam mediocre, ab illa ossis magni regione,
simul cum vasis ipsis natura ad partes easdē de-
duxit. Quum enim tres sint scopi in nervis par-
tibus singulis distribuendis: sensus quidem in
instrumentis sensificis: motionis, in motoriiis: di-
gnotionis doloris in reliquis omnibus: matrici-
bus quidem totis, & partibus quæ ad mariū te-
sticulos pertinet, paucissimis opus fuit nervis,
qui in ipsas distribuētur, ut quæ neq; ad sen-
sum exactiorem, neq; ad motum aliquē volunta-
riū inserviant, nec sint item excrementorū mea-
tus. At virga maris, & collum matricis, cæteraq;
quæ ad pudendum spectant, quod sensum abso-
lutorem postulent, venerorū ratione, meritò
sane sunt plures nervos indepta. Constat autem
matrix una duntaxat tunica, quod sanguine pu-
ro atq; benigno alatur, nec periculū sit, ne exul-
ceretur ab acribus succis, quemadmodū ventri-
culus & intestina, quibus nimirum ob id est tuni-
ca duplex tributa. Quinetiam vesicæ utriq; unica
tunica est data, dura tamen & robustissima, æ-
greq; patibilis, quum videlicet ea instrumenta,
ad excipiēda tantum excrementa sint destina-
ta. Verum genus omne fibrarum tunica matri-
cis est inditū, quò rectis quidem fibris ad sese tra-
here, transversis excernere, retinere aut simul o-
mnibus possit. Quæ verò membrana intrinse-
cus circūdata est matrici, utrunq; illius sinum in
idem jungit. Alligantur aut matricēs corporib.
circumjacentibus per quædam ligamenta ita so-
luta & laxa, ut tensioni quidem ipsarū & conc-
dentia facile cedant & obsequantur, eas tamen
minimè avelli aut deturbari permittant. Jam ve-
rò quum collum quidem matricis, deorsum in
pudendum inclinet, reliquā totam capacitātē in
ventre esse sitam oportuit. Quia autem laxi ad-
modum testes & carnosī & molles, cum sperma-
ticis vasis, densis, duris, & fortibus, coalescer-
turo non poterant, ob id natura, non in ipsos te-

stes, sed invocatam *indididūda*, mediam ambo-
rum spermaticum vas inservit. Epididymides
tamen in fœminarū testiculis maximè sunt ob-
scuræ: quia & testiculi earum, & etiam vasa sper-
matica, admodum sunt exigua: substantiæ quo-
rum inter se nō magno discrimine dissident. Por-
rò marium testes humidiores sunt ac molliores
fœminarum testibus, & vasa seminaria duriora.

*Epididymi-
des.*

*Testes mar-
ium humida-
res sunt ac
molliores fœ-
minis.*

GALENI PERGAMENI de usupartium, Lib. XV.

Quum igitur duo facere animalia quæ p-
crearent, esset melius, quàm unum, pul-
chrè mea quidem sententia, ipsarū par-
ticularum alias quidem ad recipiendum, alias
autem ad cernendū semen, natura fecit accom-
modatas: quarum nulla aut perfectius consti-
tuitur, aut melius usquam locari potuit. Ipsi-
us autem transmutationis tam subitæ, qua pudendū
virile in cōtrarias dispositiones mutatur, quum
venæ in causa esse non possent (sanguinis enim
substantia non potuisset tam celeriter aut reple-
re, aut vacuari, sed aer vel spiritus) nec arteriæ
etiam, ob perpetuam illam dilatationis & con-
cidentiæ necessitatem: nec nervi qui à cerebro
aut spinali medulla oriuntur (nullam enim ha-
bent hi cavitatem conspicuam, nec dilatari aut
contrahi naturaliter possunt) nec denique liga-
menta, aut tendones, aut carnes, aut ossa, aut
cartilagine: necessarium utique fuit illud cor-
pus nervosum, quod à pubis ossibus nascitur,
cavum simul & omni vacuū humore (id quod
cæteris ligamenti nō contingit) ut vicissim tum
intumesceret, tum mole deprimeretur. Quo pa-
cto autem id corpus talem constructionē sit na-
ctum, si nimis anxie scrutaris, convinceris qui-
dem non intelligere, neq; tuam imbecillitatem,
nec tui facultatem creatoris. Oportuit autem i-
psum ex mediis superioribusq; ossium, quæ in pu-
be sunt, partibus, exoriri. Nam sic plurimum ab
ano erit ipsum pudendū diffitum, ad coitumque
locum opportuniorem habebit. Etenim quan-
docunq; pars aliqua caret conjuge, majori ex-
parte positionē mediam requirit. Ubi verò dua-
rum partium conjugium adest, utraque pars æ-
quabiliter vult à media recedere. Porro non so-
lum ipsius coitus causa, per venerem oportet ef-
se exactē tensum pudendū, sed etiam quò meatu
diducto ac directo, semen evibretur longissimè.
Siquidem si cōcideret aut flecteretur ipse mea-
tus, hæreret semē. Quam ob rem quibus ob vin-
culum quod ad virgæ glandem habetur, mea-
tus contortus est, ij generare non possunt. Fœ-
cundi autem redduntur, vinculo abscisso. Cæte-
rū extenditur penis, atq; in tumorem attolli-
tur, dum spiritu nervus ille cavus repletur. Jam
verò in partibus pudendi inferioribus, seminis
meatus secundū longitudinē exporrectus, me-
dius est constitutus. Incubat autem huic nervus
cavus. Utraq; verò horum parte, muscoli duo,
quò meatus ceu à manibus quibusdā in utran-
que partem distractus, quam maximè dilatetur,
toto pudendo stabili permanente. At quum ve-
fica etiam propè constituta esset, non erat opus
ad ex-

*Nervi a
inesse ca-
tem consp-
am.*

*Erectionis
pressionis
pudendi
rilis, nec
nam fuit
generationis
illius nervi
si corporis
quod a pu-
osibus na-
tur.*

*Coninge-
rentur
ticulum
quiere p-
tionē mea-
Tensi p-
di causa.*

*Generare
qui nequ-*

*Penis qui
intendat
Seminari-
meatus p-
ficio.*

*Pudendi
vni cavus*

*Pudendi
sculi duo*

ad excernendū lotium aliū meatum construere, sed seminis uti meatu. Quare meritō collū vesicę totum peritonæū occupat, utpote sursum ab ano (cui incubabat primò) usq; ad pudēdi exortum se extendens. In mulieribus autem, pudendum quidem ipsum ano incumbit: in finem autem eius superiorem, collum vesicę desinit, unde lotium profunditur. Quod verò ad cutis epiphysses, quę sunt in finibus utriusque pudendi, pertinet, in mulieribus quidem tum ornamentū gratia extiterunt, tum ne matricēs refrigerarentur: viris autem, pręterquā quod ornamentū adferunt, carere ipsi omnino ijs non poterant. Cuiusmodi autem pharyngi uva est propugnaculum, tale est matricibus, quam nympham appellant. At fœtui delitescenti in utero, tenuis quędam membrana, quā agninā vocant, undiq; est circumjecta, ipsius veluti sudorem excipiens. Huic autē extrinsecus alia tenuior incumbit, farciminalis dicta, ad vesicā usq; fœtus per-
tusa, quę usq; ad horam partus in seipsa lotium illius colligit. His rursus in orbem chorion, hoc est, secundā, sunt circumfusę, matricē totam intrinsecus subungentes, ut per eas medias fœtus matrici annectatur. In singulis porrò orificiis vasorum, quę intrinsecus ad matricem pertinent, (per quę etiam sanguis menstruus in ipsam deferebatur) quo tēpore utero geritur, aliud vas gignitur, arteria quidem in arteriā, vena verò in venę orificio: ut sint ea quę generantur numero æqualia ijs orificiis, quę intrò in matricē desinunt. Colligat autem ea inter se tenuis quidem, sed fortis membrana, quę extrinsecus vasis omnibus circumhæret, partibus verò matricis internis inseritur. Exiguum sanē est illorū vasorū quodque, quum primū à matrice exoriuntur, cuiusmodi sunt arboris radices extremę, interram defixę. Et tamen progressa paululū, per conjugationem coalescunt, ex duobusq; unum procreatur, rursusq; illorum singula cum singulis eiusdem generis coeunt, fitq; id perpetuò, donec parva omnia in duo magna coalescant, quę veluti stipites quidam, fœtui per umbilicū inferantur. Quatuor itaq; omnino sunt jam hic vasa, duę scilicet arterię, & vesicę totidē, nullis diversi generis inter se cōmistis, sed venis semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem coeuntibus. Quod autē venę ipsę umbilicū prætergressę, in partes hepatis simas, arterię verò in partem arterię magnę, quę ad lumbos est, inferantur, quomodo non sit dignum admiratione? Siquidem venas videre est, statim ut umbilicū superarint, inter sese mutuò coire, unāq; effici, quę postea membranis fortibus cōvestita, vicinisq; corporibus colligata, rectā ad viscus usq; progreditur. Oportebat enim ipsam prius ad venarū principium in fœtu accedere, postea illinc in omnes partes distribui. Arterias autem expediebat & ipsas sanē in arteriarum principium, sinistrum videlicet cordis ventriculum inseri. Verum quum hic ventriculus à locis umbilici sit dissitus quā longissimē, nō erat tutum eas veluti pendentes, tanto itinere sursum ducere. Quare gratia maioris securitatis, primò quidem ad propinquā vesicam produxit illas: dein verò per totam ipsam

(cui vinculis alligantur) tutò ad magnam usque arteriam, quę à corde fuit exorta, deduxit. Quatuor itaq; sunt prædicta in umbilico vasa, duę scilicet arterię, & totidem venę, in medio sui habentes *σφαχθον*, hoc est, urinarium meatum, qui ex fundo vesicę exortus, lotium in farciminalē membranā derivat. Cæterum superioribus ipsius meatus partibus, venę: inferioribus arterię adhærescunt. Per quę vasa, veluti per truncos quosdā, ex matrice trahit fœtus sanguinem & spiritū. Inter hæc verò omnia, & vasa illa exigua, quę in matricem seruntur, media est quędam seu trunci radicatio, quam chorion appellant, existēs prodigiosa multitudo vasorum, quę à membrana tenui quidem, sed forti & duplici, amiciuntur, connectuntur, & colligantur. Est autē utilitas minimē contemnenda illius humoris, qui intra amiculum, hoc est, agninā continetur membranā. Fœtus siquidem in eo quasi innatans, sursum tollitur ac vehitur, ut minus sit gravis ijs vinculis, per quę matrici cohærescit. Ad hæc etiam cū partus instat, eo humore perfusus, facilius collo matricis elabatur. Veruntamen si acetabula, quę sunt ad matricem pervenientium orificia vasorum, mucore referta fuerint, nequeunt fœtum gestare. At verò ut matricis capacitas tota fœtui cederet, ipsaq; grāda pondere premeretur minus, atq; in partu etiam facile rumperetur, iurē natura membranas omnes, quę ad fœtum spectant, efficiendo pertenuēs, & mutua inter se connexione securitatem eis comparavit. Quum autem fiat excretio urinae, dum vesica motu naturali circum humores quos in seipsa continet, undique tota contrahitur: adsit verò infantulo delitescenti in utero ad ipsum collum vesicę urinarium meatus: quid potest in causa esse, cur per eum nihil lotii reddatur, sed totum sursum ad urinaculum dictum ascendat? In causa certē sunt, tum latitudo urinaculi, multis numeris major ea quę collo inest: tum rectitudo maxima eiusdem, quę ad educendam urinā, colli obliquitate est præstantior. Taceo nullum masculū esse extrinsecus urinaculo appositum, qui effluxum excrementorum prohibeat, cuiusmodi reperitur ad collum vesicę. At verò majori mensura, quā pro aliarum partium portione, hepar in primo conformationis tempore excedit: excedit etiam non mediocriter usq; ad partum. Secundum ipsum, cerebrum, & cor, excellunt magis quā pro aliarum ratione particularum. Causa autem eius rei est, quod hepar quidem venarum principium existit. Quia igitur fœtus dum formatur, atq; augetur in utero, magis eo usu indiget, quem venę præstant (ut qui diutissimē plantarū more regatur) principium harum mox à prima generatione natura robustissimum fecit. Cerebro quippe & cordi, & instrumentis quę ab illis emergunt, utilitas quę à venis proficiscitur, necessaria erat, quod ea sine sanguine, nec generari, nec augeri possint. Hepati verò ac venis, arteriarum quidem usus erat exiguus: nervorum autem nullus, antequā absoluta essent. At cur pulmo in ijs qui geruntur utero, est ruber: nō aut ut in perfectis animalibus, albicās? Quia tūc nutritur per vasa un-

Umbilici vasa quatuor. Ovaria & Urinaculi usus.

Chorion.

Humoris contenti in agnina membrana usus.

Acetabula.

Urina excretio quo fiat modo.

Urina fœtus cur per Vesicę collum nō excernatur.

Hepar est venarū principium.

Venarum usus fuisse necessarium cerebro & cordi gignendis. Hepati ac Venis nō fuisse usque adeo opus arteriis aut nervis in prima generatione.

Pulmo cur in ijs gestatur utero, ad modum ruber sit.

eam tu-

Venam cavam in fœtibus in arteriam venosam pertundit atque hanc in magnam arteriam,

Facultatē invenire, quā natura singula efficiat, humani ingenij nō esse. Caput fœtus in ipso partu primū ad matricē; hūc autē contrarias alias pariendi formas, periculosissimas esse.

Animalia adita in lucē, statim docta esse actiones omnium particularū. Lac esse alimentum proprium homini recens in lucem edito. Actiones reliquas sequi in iā editis, post actionē mandendi. Crura duobus hominibus data esse inter pedestria omnia.

cam tunicā, & eam tenuem habetia, ad quæ quidem ex vena cava fluit sanguis: in natis verò, occacatur quidem vasorum reseratio: aer autem copiosissimus tūc incidit, sanguinisque parcissimus, atq; idem tenuissimus. Quinetiam pulmo tunc motu perpetuo agitur, animali nimirum tunc respirante. Quo fit ut sanguis à spiritu incisus, motuq; agitur duplici, altero quem ex arteriis habet, altero quē ex toto pulmone acquirit, tenuior adhuc seipso & mollior, ac veluti ispumofus reddatur, pulmonisq; carnē sibi similem reddat. In fœtibus itaq; vena cava est in arteriam venosam pertusa. Quum aut id vas, nempe arteria venosa, venæ officiū pulmoni præstaret, necessum fuit vas alterum in arteriæ usum accommodari: quo circa id natura id quoq; in magnā arteriam pertudit. Verum quū hic vasa aliquantulum inter se distarent, aliud tertiū vas exiguum, quod utrunq; conjungeret, effecit. In reliquis verò duobus, quum hæc quoq; mutuò se contingerent, veluti foramen quoddam utriq; commune aperuit: tum membranā quādam in eo, instar operculi, est machinata, quæ ad pulmonis vas facile resupinaretur, quò sanguini à vena cava impetu affluenti cederet quidem: prohiberet autē, ne sanguis rursus in venam cavam reverteretur. Quod foramen, quamprimū animans est in lucem emissum, aut certē non multò post, coalescente membranula, conglutinatur. Pari modo id vas, quod magnā arteriam venæ, quæ fertur ad pulmonem, connectit, quum aliæ omnes animalis particulæ augeantur, non modò non augetur, verum etiā tenuius semper efficitur, adeò ut tēpore procedente penitus tabescat, atq; excidetur. Quod igitur hæc omnia natia affabrefaciat, declarat singulorum usus. Invenire autem facultatem qua talia efficiat, humani ingenij nō est. Jam verò quod os matricis, quo tempore fœmina in utero gerit, adeò constrictum sit, ut ne specilli quidem cuspidem in matricis collum immittere queas: quum tempus autem pariendi appetit (nempe quum fœtus jam ita perfectus est, ut possit per os nutriri) adeò aperiatur & dilatetur, ut integrum animal reddat: quoniam pacto id accadat, mirari quidem possumus, intelligere autem non item. Caput autem fœtus in ipso partu natura primū collo matricis indidit, tum per id aliis ipsius partibus viam munivit, intelligens nimirum contrarias huic alias pariendi formas longè periculosissimas esse. Cæterum hoc omnem admirationē superat, quod natura animalia quæ in lucem aduntur, actiones omnium partium docuerit, facultatem quandam sapientiæ ipsi à sese doctam ingeneras, quā instructa, subito ad alimentum sibi ipsis familiare festinant. At homini recens edito proprium alimentū est: in mamillis contentum, ad quas suo pte conatu movetur. Producentur autem postea dentes infantulo, ne is semper matri molestus sit. At quū dentibus mandendi actio accedit, quæ & ipsa à nemine docta est, reliquæ deinceps actiones omnes sequuntur. Sed de musculis articulū ischii moventibus, pauca impræsentiarū dicamus. Natura solis hominibus inter pedestria omnia, duo crura tribuit, quæ essent ambulationis organa.

Simiæ verò quatuor, sed talia dedit, qualia ad sunt infanti, nunc primū eis uti conanti. Etenim quatuor artubus, quadrupedū instar, graditur: & præterea anterioribus tanquam manibus utitur. At ubi homo increvit, non amplius anterioribus artubus, tanquam pedibus, utitur. Simia verò perpetuò inter utraq; ambigit. Ad hæc, quos musculos natium ridiculos ac decurtatos simia sortitur, eosdē homo habet sitos bellissimē, tum ad decus partium necessariarum, tum ne anus contundatur sedendo. Quum igitur articulū coxæ flecti quidem oporteret crure sublato, extendi verò eodem depresso, in ijsque actio eius prætipua constaret, musculo crus extendentes atq; flectentes, fecit natura tum maximos, tum plurimos: secundum illos, magnitudine ac numero, eos fecit qui crus circumagunt. Prima itaq; musculorum differentia est triplex, quarum singule in alias duas dividuntur. Nam flectentes, extendentibus magnitudine & numero sunt minores: sicuti adducentes intrò, foras abducentibus. Porro qui fæmur in orbem circumagunt, quodammodo sunt æquales. Est autem crurū actio, ambulatio, cursus, & statio. Verum ambulatio quidem & cursus, cruribus ipsis contrario inter se modo effectis: statio verò, itidē habentibus, hoc est, fixis in terrā perficitur. Flectitur autem crus ad inguen, quum ipsum attollimus: extenditur, quū id ad terram deprimimus. Sūnt nam verò extensionem & statum ultimū habet, quum stamus. Proinde natura fortibus, multis, ac magnis musculis hanc actionem cōmisit. Primū quidem ei, qui totū articulum ex posterioribus partibus tegit. Post autem illi, qui ipsum excipit, quiq; ab osse ilium exortus, in altissimā magni trochanteris partē inseritur. Tertiò ei, qui post hunc ab externis & inferioribus ossi ilium emergens partibus, in primas internas magni trochanteris partes infigitur. Quartò præter hos ei, qui ab osse lato profectus, inseritur omnibus posterioribus partibus, usq; ad summitatē, magno trochanteri. Sed primus omnium cōmemoratus, inclinabilem extensionē fortem efficit, dum fæmur duobus finibus sursum trahit. Nam si altero tantum agat, paululum deducet ad latera. Secundus extendit simul, & femoris caput intrò retrahit. Reliquorū uterq; sursum quidem tendit paululum, sed alter quidem fæmur extrā circumagit, alter autem intrò paulò magis tendit, quā sursum. Alius præter hos est quintus musculus, omnium qui sunt in corpore, maximus, internis & posterioribus partibus usque ad genu, toti ossi femoris circumhærens. Cuius musculi posteriores fibræ, quæ à coxendice emanant, crus firmum stabiliunt, extendentes articulationem. Porro qui prædictis quinque musculis sunt oppositi, ipsamq; articulationem flectunt, illis sunt inferiores, tum numero, tum magnitudine. Quorum supernus est rectus, unicoq; tendone, ex duplici exortu, cōflato, in summitatem parvi trochanteris inseritur. Sed qui cum eo in ipsum quoque trochanterem descendit, insertatur inferius. Musculus item alius, ex partibus anterioribus ossis pubis enatus, obliquus attenditur, similem actionē cum eo habens. Tum quartus, qui

Infantes quatuor artubus, quadrupedū instar, gradi,

Simia graditur. Natium musculos efficit, simia ridiculos, & decurtatos, homini autē sitos, bellissimē constructos. Musculos qui crus extendentes sunt, plurimos.

Crurū actiones quatuor: ambulatio, cursus, statio, quodammodo sunt æquales. Cruris flectentes, extendentes, adducentes, abducentes.

Musculi qui crus extendentes.

Musculus maximus, qui toti ossi femoris circumhærens.

qui articulationem quæ genu inest extendit per aponevrosin, quæ patellam genu supergreditur. Verum hic quidē per accidens fæmur flectit, utpote movendæ tibie gratia productus; alij verò tres, prima actione. Qui verò intrò fæmur abducunt (sunt enim duo, à partibus ossis pubis anterioribus orti) nō modo crus intus trahere, sed flectere etiam mediocriter possunt. Cui etiā actioni inservit tertius alius prælongus musculus, qui productus ex pubis ossis anterioribus partibus, in caput internū genu insertatur. Quæ etiam actionē præstat, primi quem diximus musculi pars interna. Extrorsum autē fæmur abducit, tum pars altera huius eiusdē musculi qui primus omnium fuit numeratus: tum etiam musculus ille, qui ab osse lato emergens, paululum circumagit fæmur. Reliqui autem alii sunt duo musculi, qui fæmur movent, unus quidem ex internis, alter verò ab externis ossis pubis partibus ortus: qui ambo circa articulum coxæ obvoluti coalescunt. Atque hi omnium prædictorum musculorum soli, uterq; versus seipsum trahens, fæmur invertit, ac circumagit. Nam quemadmodum ex superioribus quidem partibus oportet musculus is descendat, qui crus sursum trahit: eorum verò qui ad latera movent, intrinsecus quidem exoriri est necesse eos qui intrò crus abducunt, extrinsecus autem qui foras: sic etiam qui musculi fæmur torquent & circumducunt, ij in orbem convolvantur est necessarium.

GALENI PERGAMENI de vsv partium, Lib. XVI.

Quum autem cerebrum principiū nervorum, cor arteriarum, ac deniq; hepar venarum esset futurū, atq; hæc quidem instrumenta, æquissimè simul & tutissimè in singulas corporis partes distribui oporteret, satius existimavit natura, nec tot numero producere, quot ipsæ existunt particule, nec prorsus multa, sed ubi maximum unum organū, ceu truncū, ab uno quoq; produxisset principio, tum demū ab eo progrediente, veluti ramos quosdam dispertere in partes propinquas, secundum dignitatem cuiusq; quemadmodum aquam potabilem, qui huius rei sunt periti, in totam urbem distribuūt. Merito igitur vena cava, quæ ex gibbis partibus hepatis sursum ac deorsum procedit, trunco bifido est similis, propterea quod corporis nostri, alia quidem pars hepate est altior, alia verò humilior. Ad eundem modum arteriā, quæ ex corde enascitur, cernes protinus imparibus sectionibus bifariam esse divisam: altera maiore, quæ fertur deorsum, quod ibi corpus sit majus: altera minore, altioribus corporis partibus distributa. Simile quippiam prædictis, à cerebro etiā producitur spinalis medulla, quæ partib. omnibus quæ sunt sub capite, nervos immittit. Nullus tamen nervus neq; in ossa, neq; in cartilagine, neq; in ligamenta, neq; in quasvis glandulas, quarū duplex natura existit, inseritur: quandoquidem supervacaneū erat illis motum voluntarium, aut sensum tribuere. Nec verò adeps quo-

que ulla in re nervos desiderat, quæ ex parte pinguiore sanguinis per tenues venas affusa, partibus animantis membranosis, tenuibus atq; siccis, instar olei pinguis, adhæret: * ut eas videlicet per diuturnas inedia, exercitationes vehementes, atque calores improbos, ocysimè reficatas, nativa sua pinguitudine humectet. Glandulæ verò, quæ sunt veluti stabilimentū divisionis vasorum, nullis sanè ad id nervis indigent, quum nec sensum, nec motum voluntarium ad id desiderent. Quæ autem ad succos animanti utiles fuerunt comparatæ, quemadmodum venas & arterias nonnunquam perspicuas, ita & nervos habuerūt, unius sensus gratia. Siquidem ad voluntarium motum obeundum, natura in animalibus unū genus instrumentorū construxit, quos musculos vocant. Proinde quanquam nervi omnes motū habeant & sensum, nulla tamen pars alia, quæ nervos recipit, motu voluntario est prædita, sed sentit duntaxat: ut cutis, membrana, tunica, arteria, vena, intestina, matrix, vesica, ventriculus, ac viscera omnia & glandularum species altera. Quod verò & sensuum organa, nervos ad sensum flagitabant, quid opus est commemorare? Ceterum quibus sensu exactiori emat opus, ijs nervos molles natura tribuit: ut illis quæ motum voluntarium postulabant, duos omnes: quibus autem utraq; actione erat opus, nervorum genus utrunq; inservit: ad sensum quidem, nervū qui pateretur facilius, accommodans: ad motum autem, qui valentius ageret. At nervus mollis semper in ipsa sensoria inseritur: durus autem, in musculos qui ea movent. Porro inest mollis nervus ventriculo, hepatis, intestinis omnibus, ac visceribus, quemadmodum & ex ossibus omnibus, solis dentibus, tum quod hi, ijs quæ sibi occurrūt, nudi sint expositi, tum q; ipsos unā cum lingua sentire oporteret sapes atq; dijudicare, nō aliter quàm cæteras oris particulas. At verò in cutem ipsam à subjectis partibus fibræ quedam nervorū perveniunt, quæ simul ipsam cum subditis corporibus colligant, simul etiam ei sentiendi facultatē suppeditant. Soli autem oculi, propter utilitatis dignitatem, majores & molliores, quàm ulla alia pars, sunt nervos fortiti, quod videlicet eorū sensus sit aliorum omnium certissimus. Quum igitur sensus quidē in patiēdo sit: motus autē quo nervi & musculi movēt, in agendo: optimo sanè in re ipsi quidem primo videndi instrumento in oculo nervus mollis, moventibus verò ipsum musculis, durus insertus est. Ad eundem modum & linguæ ipsi natura duo nervorum genera tribuit: alterum quidem molle, quo sapes dijudicaret: alterum verò durum, quo multiformiter moveretur. Ad aurem etiam utranque, nervum mollem induxit, aliosq; duos auribus ijs immiscuit, quæ habituræ motum aliquem erant. Mollium quoque nervorum nasus etiam fuit particeps, & dentes, & totū palatum: nam hæc quoq; sensu exactiori indigebant. Rursum nervi optici meatus habent sensibiles, per quos ad cerebri ventriculum pertingentes, ad oculos spiritus sensibilis defluit: quæ etiā causa fuit, cur crassif extiterint. Etenim ubi uterq; anterior ventriculus

Adeps quib. adhæreat.

Adipis usus.

Glandula stabiliunt divisiones vasorum.

Glandula nervis prædita.

Musculi, voluntarii sunt motus autores.

Musculos solos voluntario motu esse præditos.

Nervos molles quib. tribuerit natura.

Nervi duri quibus tributi.

Nervus mollis semper in ipsa sensoria inseritur: ut durus, in musculos illa moventes.

Dentibus cur inter ossa cætera, solis sit mollis nervus tributus. Dentes dijudicare sapes.

Oculos fortiores et molliores nervos quàm ulla alia pars. Oculorū sensum esse aliorum omnium certissimum. Sensus in passione consistit.

Motus in actione servatur. Lingua duo nervorum genera inesse.

Opticis nervis meatus inesse sensibiles.

*Opticorū ner-
vorum ortus*

*Nervi duri
quibus tribu-
antur par-
tes a spinali
medulla.*

*Vox princi-
palissima est
omnium ani-
mæ actionū.*

*Vox cogita-
tionis metus
est nuncia.*

*Laryngis
munus & cō-
positio.*

*Laryngis
musculorum
situs & posi-
tiones.*

culus ad latera desinit, illinc optici nervi exoriantur, ipseque ventriculorum seu thalamus, propter illos nervos existit. Ob vehementiam autem actionis, consistentiæ duritiem, atque situm remotum, cæteris omnibus partibus, quæ sub facie consistunt, suggeruntur nervi duri a spinali medulla, præterquam intestinis, visceribus atque instrumentis vocis. Quorum nonnulla quidem, ut cor atque os ventriculi, cum cerebro colligari oportebat: alia verò, quæ prope ipsum sita essent, soloque sensu indigerent, nervos molles habuerunt.

Porro quod vox principalissima sit omnium animæ actionum (nam cogitationum mentis est nuncia) oportuit eam quoque fieri per instrumenta quæ nervos a cerebro assumerent. Quum igitur larynx sit primum & principalissimum instrumentum vocis, ex tribus quidem conflatum cartilaginibus, habens autem in medio sui epiglottidem atque musculos circiter viginti, ei ferè usui servientes, quorum musculorum nonnulli transversam magis quodammodo, alii obliquam habent positionem, alii denique rectam: sic tamè ut eorum quidam supernè orti, finibus suis infernis partes quasdam laryngis moveant: alii contra, orientur quidem infernè, ac superioribus finibus agant: æquum certè fuit, iis qui supernè deorsum feruntur, nervum supernè immitti: eis verò qui sursum ex inferioribus partibus, indidem esse nervorum principium, quemadmodum obliquis atque transversis, etiam secundum positionis figuram. Ac supernè quidem deorsum feruntur, tum ij qui ab osse hyoide ad cartilaginem scutiformem perveniunt muscoli, tum qui ab ambobus ad pectus proficiscuntur. Ab infernis autem partibus sursum se attollunt, qui arytenoidem cartilaginem movent. Rectè itaque sunt prorsus quatuor, duo ad obliquum inclinant. Quanquam leviter etiam obliqui sunt, qui fines inferiores cartilaginis *Duguesdes*, sive scutiformis, cum cartilagine, quæ nomine caret, connectunt. Quin & ij muscoli qui trium cartilaginum maximam connectunt stomacho, fibras transversas, sed in obliquum spectantes, sortiuntur. Atque his certè natura, à sexta conjugatione nervos immittit, quorum alter quidem ad verticem cartilaginis *Duguesdes*, intro in ipsum laryngem pertinet, alter autem ad transversos accedit musculos: à quo etiam ad musculos ad pectus porrectos, fines quidam percurrunt. Duæ itaque sunt hæ conjugationes nervorum, ad positionem obliquam spectantium. Tertia verò est alia eorum, qui ad musculos cartilaginem sursum tollentes perveniunt: quæ quum altius principium postularet, non potuit à sexta conjugatione produci. Quare à cerebro per totum laryngem utraq; parte duo nervi recti extenduntur, unus ad lævam, alter ad dextram. Quum verò tres supersint in larynge musculorum conjugationes, maximè quidem necessariorum ad vocis generationem, rectam autem positionem habentiū, ita ut capita sint infernè, fines autem ipsorum supernè, quibus necessum erat à cerebro per partes inferiores nervos ipsos immitti: natura ex sexta conjugatione, à qua oportuit cordi & ventriculo & hepatis nervos etiam distribui, nervos

quosdam carotidibus arteriis stabilitos, ad infernam thoracis partem deduxit. Ubi verò pervenerunt illuc, unde germina arteriæ magnæ exoriantur, quum aliquam ipsorum partem reverti ad laryngem esset necesse, duo ab aliis atque se invicem separati & diducti, sinister quidem paulò longius progressus, ad radicem maximæ arteriæ se inflexit, veluti circa aliquam rotulam, atque illinc denuò ad laryngem reversus est. Dextrum autem dorso illius arteriæ impositum, quæ in dextra thoracis parte obliquam positionem tuetur, & à qua acclivis carotis oritur, circa eum angulum natura inflexit, qui sit in ipsius carotidis productione, ac rursus versus laryngem produxit. Quia verò talis inflexio erat lubrica, natura apophysim quandam à sexta conjugatione, ei tanquam manum porrexit. Quæ quidem cum magno nervo eum colligans, flexionem simul & reditum quam tutissimum illi effecit. Portio etiam nervorum quædam à cerebro ad viscera mittitur, exigua quidem ad partes cæteras, magna autem ad os ventriculi, quod natura partem hanc fecerit instrumentum appetitus ciborum, ad portam (ut sic dicam) situm, omnium organorum quæ ad alimenti dispensationem fuerunt comparata. Quare natura in id nervum quandam syncerum, & cum nullo duro mistum deduxit, ex quo portionem exiguam in ipso transitu decidens, stomacho, pulmone, & asperæ arteriæ illam communicavit. Ex eadem etiam conjugatione syncerum nervum cordi & hepatis indidit. Ad alia verò omnia quæ sunt sub diaphragmate, intra peritonæum, ab his quoque nervis pars quædam accedit, non amplius syncera, sed ijs nervis qui à spinali medulla oriuntur, permista. Quare partes in quas deferuntur, robur quidem ac vires, ex spinalis medullæ: sensum autem cæteris exactiorem, à cerebri miscella recipiunt. Porro ubi natura per longum iter nervum est ductura, aut motui muscoli vehementi ministraturū, ibi substantiam eius corpore crassiori quidem, cætera autem simili intercipit: beneficio cuius contingit nervo ipsi crassescere atque corroborari. In primos autem eosdemque latos scapularum musculos, qui ab occipite oriuntur, ac desinunt in dorsum ossium scapularum (quod sursum trahunt) à cerebro magnus nervus inseritur, emergens una cum aliis, quos diximus oriri à sexta conjugatione. Maximo enim nervo erat opus ijs musculis, non modò propter magnitudinem, verum etiam propter actionis vehementiam, ut qui totam scapulam sursum trahant. Post hos autem nervi commemorabiles, musculis à primo quidem spondylo ortis, in sublimem autem scapulæ partem insertis, à natura sunt dati. Primæ verò productioni musculorum circumagentium caput, à nervis ad magnos musculos utriusque scapulæ pertinentibus, propago quædam inseritur: deinceps autem à colli spondylis, ut quodque principium ad seipsum trahens musculum vicatim motum efficiat. Quin & musculis duobus qui sunt ad tonsillas, & ijs qui ad imam partem hyoidis perveniunt, nervus à cerebro datur. Alia præterea nervorum tenuium conjugatio, quæ à sexta oritur, ad linguæ radicem

*Recurrentiū
nervorum or-
tus, progres-
sus & redi-
tus.*

*Os venter
li est in
mentum
perentia
rū, ob
cerebrum
sum si
rissimū
pit.*

*Lati scap-
ulæ mus-
culi unde n. r.
recipiunt.*

tem pervenit. Nullus autem alius à cerebro infra faciem descendit. At à secunda copula eorum qui à collo oriuntur, nervi ad caput ascendunt, duo quidem ex partibus posterioribus, duo autem à lateribus in cutem faciei distributi, atque aurem utranque. Quum autem musculus latus, qui buccas & oris latera movet, multa principia sortiatur, desinatque in buccas ipsas & labia, os aperiens ad latera, idcirco fibras omnes etiam à colli spondylis recipit, ad eas partes tendentes, & cum eis nervos transversos, maximosque & plurimos. Fibris verò quæ in scapulas & clavium sursum feruntur, nervi minores insunt, qui etià cum fibris procedunt. Quæ verò ipsius latus musculi partes ab radice auri per buccas, super musculum manforè natæ, nervis utuntur per foramen excidentibus cæcum, positionem habent fibris, quæ ei parti insunt, similem, & principium propinquius. Quemadmodum autem ad musculos colli nervi ab inferioribus partibus sursum feruntur, quod ii caput antrorsum moveant: ita & duobus musculis qui retrò ad dorsum totam scapulam contrahunt, juxta posticam apophysim, quam acantham vocant, nervorum principium est constitutum. Pari modo & reliquos scapularum nervos, & eos qui ad costas perveniunt, reperias secundum ipsas musculorum fibras disseminatos. Nam iis musculis qui sursum feruntur, ex partibus thoracis intercostalibus nervi excidentibus distribuuntur. Qui verò à collo deorsum ad thoracem descendunt, iis spinalis medulla colli nervos demittit. Quum autem musculi qui ad epomida sunt, totum brachium sursum tollentes, validum nervum desiderarent, à regione inter quartum & quintum colli spondylum sita, ex ipsa spinali medulla duplicem nervum produxit, quem ad partem epomidos externam simul & superiorem extendit, ita profundum utrunque, ut ne appareant quidem. Solet etenim securitatis gratia non solum copulare nervos natura, sed etià per interna deducere, quemadmodum arterias & venas. Sic etiam nervi qui ad extremas manus perveniunt, per internam brachii partem, imò ad ulnam vehuntur, prope ulnæ articulationem prætereuntes. Deinde uterque musculis internis ulnæ occultatus ad carpum extenditur, ac sic tandem in digitos distribuitur. Tertium præter hos nervum ad externam ulnæ partem deduxit natura, musculo carnosissimo, qui illic est, usque vice propugnaculi. Majores enim nervos merito internis partibus manuum distribuit, quod manuum actiones omnes, per eas nimirum obeat. Differunt autem nervi manuum à nervis crurum, itineris quo feruntur ratione, eo quod nervi omnes ad manus per internum brachium accedunt: ad crura verò, omnes, præter paucissimos, per partes femoris posteriores deorsum feruntur, à sacro osse, lumborumque vertebra, propagati: in ipso autem eorum descensu ad poplitem, obiter distribuite nervum natura singulis musculis femoris, prout cujusque ratio postulat. A poplite autem, per suram, quæ tota est carnosissima, alios quidem in externam tibiā, alios in internam duxit, alios per mediam ipsam porrexit, musculis quæ illic sunt, ipsos distribuens.

Eos igitur qui per internam suram feruntur, ad talum ac tibiā occultans, ad inferiorem pedis partem deduxit: illos verò qui per externam, ad talum & fibulam abdens, ad anteriora simul & superiora pedis porrexit. Nullum itaque nervum nec ad curvaturam cubiti, nec ad genu & tibiā anteriorem reperias: sed ubique omnes, in profundo, inter ossium propugnacula, aut cartilaginum, aut ligamentorum, aut denique carniū, delitescunt. At verò per magnum ossis pubis foramen, cum aliis vasibus, nervi quædam propago penetrans, in internos eos femoris musculos, qui ab eodem osse pubis oriuntur, ad ipsorum capita inseritur, atque ad ipsum usque genu descendit. Ab illa eadem propagine, cutis tota quæ illic est, productiones recipit: quemadmodum certe & à foraminibus quæ sunt ad os latum, parvi musculi qui juxta os ipsum consistunt: tum qui ad anum, vesicā, atque pudendum pertinent: ad hæc etiam membranæ quæ illic sunt, nec secus matrix, & peritonæum, nervos sortiuntur. Semper quippe solet natura, nervos, venas, arterias, à partibus propinquis immittere, modò nihil aliud prohibeat. Quum autem de nervis abundè dixerimus, tempestivum jam est ad artiarum atque venarum distributionem transire. Est igitur vas quoddam maximum, quod à sinistro cordis ventriculo, veluti stipes enatum, in totum corpus distribuitur. Cæterum ubi primum à corde emergit, statim in duas partes dividitur: quarum altera quæ major est, ad spinā deflectitur, partibus omnibus inferioribus arterias dispensatura: altera verò sursum ad caput fertur, & ipsa omnibus quæ sunt supra cor, vasorum propagines præbitura. Porro pars illa quæ fertur deorsum, ad locum productioni suæ è directo oppositum, fertur: à quo nusquam declinans tramite, sed rectissima & cōpendiosissima via progrediens, quintum thoracis spondylum conscendit: altera verò pars statim post productionem primam, portionem quandā à se mittit sursum, id sinistram scapulam & axillam: quæ pulmōni injecta, & membranis fulta, sursum usque ad primam costam producit, nusquam divisa. Illinc autem jam quandam à sese partem mittit ad prima intercostalia spatia, dein ad hypochondrion ac mammā mittit alteram, quæ toto pectori est subdita: tum tertiam ad spinalem medullam colli, quæ per sex spondylorum foramina penetrat, mittitque etiam obiter musculis propinquis propagines. Reliquum autem hujus arteriæ, in totam manum sinistram, & scapulam distribuitur. Altera verò major pars totius arteriæ, maximæ molliissimæque, glandulæ præsidio firmata: ubi in dextrum brachium germen emisit, sursum ad jugulum tendit, quæ & ipsa celerrimè ossi medio pectoris jungitur. Per quam regionem vena cava & stomachus transeuntes, hic quidem spinæ spondylis adhæret, illa autem pectori subditur. Ex quo etiam arteriis positio comparatur opportunissima: ut quum per collum divisa feruntur, arteriæ quidem in profundo sint, venæ autem ipsis incumbant. Quum autem arteria magna transit per thoracis partes infernas, obiter mittit portionem maximā in eos qui illic sunt siti, mu-

Arteria magna
origo de
distributione.

sculos intercostales: non exiguam tamen in musculos thoracis externos, quemadmodum & in septum transversum. Sed nec ventriculum, nec lienem, nec hepar, nec intestina, nec renes, præstiterat arterias aliunde recipere, quam ab hac sola maxima, quum primum ad loca, quæ sub phrenibus sunt, pervenerit. * Productio tamen arteriæ, quæ in dextrum renem prorumpit, superiorem habet exortum, quam ea quæ ad sinistrum tendit, quod renum positio sit inæqualis.

Renum positio non esse inæqualem.

Lac & semen ex sanguine exacte cocto gignuntur.

Plexus vasorum circa testes & mamas, cuius gratia sit factus.

Retiformis plexus.

Arteria nutritiva spirituum cerebri.

Arteries subiacet vena circa ultimam spinam spondyli.

Matricis vas.

Inguinis glandula quorsu producta fuerint.

Arteriæ autem quæ ad testiculos deferuntur, eas ordine consequuntur, quæ accedunt ad renes. Nam quæ à partibus sinistris proficiscitur, omnino aliquid perpetuo ex ea quæ fertur ad renem assumit: quæ verò à dextris procedit, semper quidem ab ipsa magna arteria exoritur: interdum autem assumit etiam aliquid ab ea quæ ad renem fertur. Quum autem lac & semen ex sanguine exacte cocto gignantur, quæ absoluta concoctio fieri citra moram sanguinis in vasis ipsis non potest: ob eam causam, non solum à longinquo natura venas & arterias ad testiculos atque mammas porrexit, sed præterea multipliciter eas, prius quam insertaret, involvit: diuturnam, opinor, ex eo, cum vase ferente, consuetudinem ipsi materiæ comparans. Sed venæ quidem in hoc solo loco involvuntur: arteriæ autem, etiam in retiformi plexu. Nutriunt enim hæc spiritum animale cerebri, qui certè multum ab aliis spiritibus distans, elaboratissimo alimento indiget. A magna item arteria, aliæ sunt, post prædictas apophyses, ad musculos epigastrii: aliæque etiam minutorum vasorum propagines, in spinalem prorumpentes medullam. Quarum pars quidem non contemnenda, per commissuras spondylorum penetrat in dextros spinæ musculos, pars autem in sinistros disseminatur. Quæ germina sunt nervis qui ab ipsa spinali medulla oriuntur, numero æqualia, obducunturque tenui meninge, quæ spinalem medullam ambit. Ob has igitur productiones crassitudo semper minuitur arteriæ. Porro ad ultimum spinæ spondylum arteriæ subjacet vena, quæ antea supra eam ferebatur. Postea verò quam peritonæum prætergressæ, in crura dividendæ erant, rursus venæ incubuerunt arteriis, quò tutior esset ipsarum per crura delatio. A quibus vasis transeuntibus, vesica quidem exiguas, magnas verò duplicesque propagines acceperunt matricem, ut quæ non eas solas, sed foetum in ipsis matricibus concipiendum, nutrituræ essent. Quæ igitur à regione renum in testiculos perveniunt, usque ad matricem fundum disseminantur. Quæ verò tum ad partes, quæ ad collum pertinent, tum ad eas quæ sunt infra, post testiculos, perveniunt, à vasis quæ ad crura feruntur, productæ sunt, eodem loco, unde in masculis ad virgam accedunt. Ex iis autem locis rursus vasa venosa sursum feruntur, quæ propter commercium, cū iis copulantur vasis, quæ deorsum à mammis descendunt. Ab iisdem locis una conjugatio exiguorum vasorum, ad ea quæ ad pudendum pertinet, accedit. Ad inguen autem natura magnas glandulas divisionibus vasorum veluti fulcimentum, & adversus inju-

rias externas operimentum, indidit. Ubi igitur arteria magna quæ ad supernas partes perreptat, iis quæ in thorace sunt, distribuit propagines, quod ex ea reliquum est, una scilicet ntrinque arteria, sursum ad caput fertur. Quorum productiones vasorum, omnes faciei & colli partes contexunt. Ex eis autem quæ in scapulas dividuntur, dorsales muscoli suas recipiunt propagines. Ab iis etiam ipsis, quum primum ad collum extra thoracem jam emicuerint, feruntur germina per foramina cujusque sex primarum vertebrarum, quæ sunt ad latera, usque ad caput. Verum qua parte nervis qui à spinali medulla proficiscuntur, exortus est, eadem certè ab arteria & vena, quædam exigua propago in spinalem medullam inferitur. Finis autem vasorum, quæ sursum ad caput usque feruntur, postquam egressus primum est spondylum, bifariam dividitur: atque altera quidem parte ad cerebrum, posterius intro fertur: reliqua verò ad musculos articulo capit circumfusa disseminatur. finibus vasorum quæ in tenui meninge sunt locata, seipsam conjungens. Nam musculos qui sunt in superficie, & cutem, vasorum propagines quæ in scapulis sunt, contexunt. Nusquam enim in corpore ullum reperias musculum, qui vena & arteria careat. Jam verò arterias quæ in axillis ad manus divaricantur, validis quibusdam glandulis natura (ut non facile rumperentur) juxta divisiones corroboravit. Est præterea jugum arteriarum carotidum, quod fertur sursum rectum ad caput, in profundissimis colli partibus abditum. Cuius quidem utraque arteria quum dividatur bifariam, & altera sanè pars retrorsum, altera verò magis antrorsum vergat, rursus harum utraque in duas alias dividitur. Deinde altera pars eius quam antrorsum tendere diximus, ad linguam accedit, & internos maxillæ inferioris musculos. Altera verò magis quidem in superficie, quam illa, est locata: magnis tamen & ipsa glandulis recta, sursum ad interiora aurium, usque ad temporalem musculum, fertur: ibique dividitur, quæ à posterioribus sursum usque ad verticem tollitur. Reliqua verò arteriæ carotidos pars, quam retrò magis ferri dicebam, dividitur & ipsa in duas partes maximas. Quarum minor, retrò magis ad basim cerebelli ascendit, magno ac prælongo ipsam excipiente foramine, quod est in fine futuræ labdoidis. Reliqua verò, anterioribus partibus per foramen quod ossi lapideo inest, sursum fertur & ipsa, ad plexum retiformem, qui toti basi cerebri subjacet, & ex memoratis arteriis textitur. In cerebrum autem ipsum, arteriarum haud exiguum jugum ascendit, ex quo plexus arterialis, qui est in illius ventriculis, gignitur. Ut verò summatim dicam, natura in facie & toto capite, arterias quidem quamplurimas cum arteriis, venas autem cum venis, tum à dextris ad sinistra, tum ex sinistris ad dextra, tum à posteriore parte ad anteriorem, & rursus ab anteriore ad posteriorem, & ab externis intro, & ab internis foras ducens, committit. Commiscentur autem arteriæ venis, & venæ arteriis, & utraque hæc nervis, & his ambobus nervi, in toto animalis corpore. Etenim cujusque;

Musculum destitutum arteria, vena, glandula usque.

Carotidum arteriarum visio, processus.

Retiformis plexus arterialis toti basi cerebri subditum.

Coplicari inter se omnia instrumenta in corpore.

defti- cuiusq; partis arteriæ & venæ sunt omnino fen-
 se ar- sus expertes, five illas frangere velis, five urere
 5 & 6- five incidere: id quod cognoscere, nervis eiusdem
 partis vinculo exceptis. Inferunt autem ea vasa
 in partes sibi circumvicinas, tenues quasdam pro-
 pagines: venæ quidem numero interdum quam-
 plurimas, & magnitudine insignes: arteriæ au-
 tem, tum pauciores, tum mole inferiores: mit-
 tunt tamen & ipsæ. Causa huius est, quod par-
 tes omnes alimento indigent, calidæ, frigidæ, du-
 10 ræ, & molles. Ut autem caloris nativi modis ad
 unguem servetur, non amplius similiter omnes
 postulant. Nam partes naturali temperamento
 frigidæ, vel si ad ultimum aliquando frigiditatis
 pervenerint, sustinent tamen & vivunt, & rur-
 sus sine dolore, pristino calori restituuntur. Qua-
 re sine arteriis venas quasdam reperire licebit: sed
 arteriam nullam sine sua conjuge vena. Conju-
 gem autem intelligo, quæ propter eundem usum
 extiterit. Quum igitur nutriri corpora sit neces-
 20 se, quod ea vacuentur, alimentum sit æquale est
 necesse, copiarum substantiæ effluentis. Defluit autem
 plurimum à calidis, mollibusq; corporibus, & iis
 quæ assidue aut vehementer moventur: minimū
 verò à frigidis, atq; duris, & quæ moderatas ob-
 eunt actiones. Frigus enim corpora densat, cogit,
 constringitq;, ac prohibet substantiæ defluvium.
 Calor autem contrā, corpora rarefacit, liquat, te-
 nuat, & digerit. Rursus, quod ad ipsam substan-
 30 tiam attinet, quæ durior quidem est & lapidea,
 permanens est, nec facile dissipatur: quæ verò
 humida & mollis, celeriter quidē à calore in ha-
 litus solvitur, eoque citò exhalat, ac perit. Pulmoni
 igitur omnia insunt, quæ ad celerem vacuatio-
 nem pertinent: nam & mollissimus, & calidissi-
 mus est, motuq; agitur perpetuo. Ossibus ve-
 rò insunt, veluti ex diametro, cum eo pugnantiā:
 etenim frigida sunt & dura, bonamq; totius vitæ
 partem quiescunt: ob quas nimirum causas per-
 durat ipsorum substantia, neq; solvitur facile. Ne
 40 igitur mireris, si iis natura iustissima exiguas ad-
 deo tribuit venas, ut ne clare quidem cernantur:
 pulmoni verò, vena maxima sit à corde implan-
 tata. Duas itaque partes inter se comparavi, qua-
 rum altera quidem plurimo, altera verò paucis-
 simo alimento indiget. In medio autem harum
 sunt reliquæ omnes, quarum aliæ quidem magis,
 aliæ verò minus vacuantur, nutririq; postulant.
 Nusquam autem vena ab arteria relinquitur, sed
 ubi vas arteriosum videris, ibi necessum est ve-
 50 nam etiam adesse: paucis tamen venis in corpo-
 ra, quæ ad cutem pertinent, sine arteriis divisis.
 Porro quæ vena cava primum fertur sursū à gib-
 bis hepatis, jam inde propagines magnas ad se-
 ptum transversum mittit. Ubi verò ipsum cor at-
 tingit, ibi eam quæ octo coctas utrinq; alit, pro-
 ducit. Quemadmodum autem in cruribus, ita e-
 60 tiā in externis & anterioribus brachii partibus,
 natura sine arteriis proprias disseminavit venas
 per superficiem. Et quemadmodum ipsum bra-
 chium & crus vena una abundat, ita in superfi-
 cie colli altera vena jugularis sine
 conjuge cernitur.

GALENI PERGAMENI

de usu partium, Lib. XVII.

A T verò partis actio, ab eiusdē usu differt: *Actio partis
est motus a-
ctivus.*
 quod actio quidem motus activus sit: u-
 sus verò nihil aliud existat, quam aptitu-
 do ad utendum. Porro dixi actionem esse mo-
 tum activum, quod pleriq; motus fiant patien-
 do, quos sanè passivos nuncupant: qui tum par-
 10 tibus quibusdam accidunt, quum ab aliis mo-
 ventur. Atq; is motus sanè inest ossibus, quæ in
 brachiis & cruribus sunt, sitq; à musculis illa mo-
 ventibus. * Caterum si ad primū movens (quod
 est princeps animæ facultas) ipsos musculos cō-
 pares, rationem instrumenti habebunt: si verò
 ad id os quod movent, non modò hanc, sed opi-
 20 ficis etiam rationem sortientur. Ideirco prima
 utilitas animalibus ab actionibus ipsis accedit,
 secunda à partibus. Nullam siquidem partem
 propter seipsam habere cupimus. Supervaca-
 nea quippe esset, si actione esset orbata, & ab-
 scindenda potius, quam optanda. In omnibus
 autem animalium partibus, unā cum actione i-
 30 psarum, usus etiā adest conjunctus: quemadmo-
 dum, exempli gratia, videre est in elephanti pro-
 boscide, quā parte, etsi aliquando ea mihi visa
 fuerit ociosa, animal tamen ipsum, ceu manibus
 quam aptissimis, utitur: ac per eam etiam, perfo-
 rata quum sit, veluti per nares quasdam respirat.
 40 Sunt igitur in universum opera naturæ admi-
 randa, quæ præter partium omnium æqualita-
 tem, actiones etiam exhibuit, ac præterea statim
 ut fuit genitum animal, ipsum earum usum edo-
 cuit: ac breviter, non solum proportionē omniū
 membrorum extrinsecus, more statuariorū, sed in
 profundo etiam servavit. Siquidē Polycletus ca-
 50 nonem illum suum tam celebrē affabrē faciens,
 naturā est imitatus, in quibus potuit eam imita-
 ri. Potuit autem in solis externis partibus, in qui-
 bus artem consideravit. Sunt itaque opera natu-
 ræ digna quæ suspiciantur: cuius nimirum arte
 & industria, ex multis omnia ferè optimè fiunt:
 quum tamen à fortuna ipsa, ex innumeris con-
 tingat fortè fieri rectè unum tantum, aut alterū.
 Quis igitur ex ortu & structura animalium non
 statim concipit animo, mentem quandam esse,
 quæ vim habeat admirabilem, quæq; terras om-
 nes pervadens, in omnes orbis partes extendi-
 tur? Ubique certè animalia procreari videas, quæ
 60 constructionem habent dignam admiratione.
 Quamquam quænam universi pars ignobilior
 est terra? Attamen mens quædam cernitur ad i-
 psam à corporibus superioribus pervenisse: quæ
 si quis contemplatus fuerit, statim substantiæ
 pulchritudinem admirabitur: primum ac maxi-
 mē solis: post ipsum, lunæ: deinde syderum: in
 quibus par est, quantò corporis substantia eis est
 purior, tantò etiam mentē inhabitare, quam in
 corporibus his terrestribus, & meliorē & perfe-
 70 ctiorē. Quum enim in limo, in colluvie, in pa-
 ludibus, in plantis deniq; ac fructibus putrescen-
 tibus, animalia gignantur, quæ mirificas condi-
 toris vires ostendunt, quid de corporibus supe-
 rioribus est putandum? Licet autem * ratioci-
 natiōem quandam naturam, etiamnum vel in
 80

*Actio partis
est motus a-
ctivus.*
*Vsus partis
est aptitudo
ad utendum.*
*Motus passi-
vus quid.*

*Utilitas pri-
ma ani-
malibus ab
actione acce-
dere, secun-
da à par-
tibus.*

*Parte nullā
propter se-
ipsam habere
cupimus.*
*Partium æ-
qualitatem sem-
per etiam u-
sum esse con-
iunctum.*

*Elephantum
ut probosci-
de tanquam
manibus ac
per eam re-
spirare.*

*Polycletū in
canone suo il-
lo celebri, su-
isse imitatu
naturam.*

*Fortunā ra-
rò quicquam
rectè operari*

*Terrā infu-
sam esse vim
superiorum
corporum.*

*Mentem ha-
bitare in sy-
deribus tan-
tò meliorem
et perfectio-
rem, quam*

*in corpori-
bus his ter-
restribus, quia
ad substantia
illorum est
purior.*

*Ratiocina-
tricem natu-
ram inesse ho-
minibus.*

*Divinā men-
tem esse ex-
tensam per
aerem, arbi-
tratur Ga-
lenus.*

*Opus de usu
partium esse
constituendū
perfectissimā
theologiae ve-
rum princi-
piū, quā lon-
gē medicina
et maior.*

*Opus de usu
partium philo-
sophiae esse lon-
gē et maius.*

ipsis hominibus cernere, si Platonem, Aristote-
lem, Hipparchū, Archimedes, & complures al-
ios contempleris accuratissimē. Si igitur in tan-
ta colluvie (quo enim alio nomine quis appelleret
id quod ex carne, sanguine, pituita, ac bile utra-
que est conflatum?) mens gignatur adeo eximia
& excellens, quantam eiusdem putandum est
esse excellentiam, in sole, luna, aliisque etiam syde-
ribus? Mihi quidem dum hæc mecum voluto,
non exigua quædā mens talis, per ipsum etiam
nos aerem ambientem, esse extensa videtur. Fie-
ri enim non potest, quā lucis ipsius Solis sit par-
ticeps, quin vim etiam ab ipso assumat. Quæ
omnia qui exquisitè perpenderit, tum sapientiā
opificis, tum humanæ mentis prærogativam in-
telliget: ac denique hoc opus de usu particularum,
quod prius despiciebat, tanquam exiguum, per-
fectissimæ theologiæ verum principium consti-
tuet, quæ theologia multo est maior atque præstā-
tior tota medicina. Idcirco non soli medico, o-
pus de usu partium est utile, sed multo certè ma-
gis philosopho, quā totius naturæ scientiam sibi
cōparare studeat, * circa cuius indagationem nos
consensescere oportet. Nec verò in solo homine
videre est ipsam summā artem naturæ, sed quod-
cunque animal dissecare velis, partem in eo indu-
striam opificis, & sapientiā reperies. Et quanto
ipsum minus fuerit, tantò maiorem tibi excita-
bit admirationem. Quod declarant opifices, quā
in corporibus parvis, aliquid magnum sculpunt:
quemadmodum is, qui nuper in annulo exiguo
Phæronta quatuor instructum equis sculpsit, spe-
ctaculum certè incredibile. Quanquam horum
nihil structuram cruris pulicis superabat. Quum
igitur tanta opificis ars veluti actuarium atque
parergon quoddam in tam abjectis animalibus
efflueret, quantā eius vim ac sapientiam, in præ-
stantioribus inesse putabimus? Unum igitur ex
hoc opere ac maximū, non ut medicis, sed ut na-

turæ studiosis, hoc nobis accedit commodū, nem-
pe facultatis (quæ inest conditori) cognitio. Se-
cunda autem utilitas est, ad affectus partiū, quæ
intus in alto corpore delitescunt, cognoscendos:
quam ad rem, actionis cognitio magnum habet
momentum. Quandoquidem qui jam explora-
tum habet, quod actio crurum est ambulatio, si
quem viderit qui ambulare non possit, statim ju-
dicat partem cruris aliquam esse affectam. Sed
quemadmodum in actionibus, ita & in utilita-
tibus res se habet. Ut enim ambulatio tollitur, si
nervi ac muscoli qui cruribus insunt, affecti fue-
rint: ita tollitur, si os aliquod fuerit fractum, aut
sua sede dimotū. Si verò nescimus, quod per os
sa cruribus innitamur, haudquaquam scire pos-
simus, quod ossibus læsis animal etiam læda-
turi. Eoque modo fit, ut ad cognoscendum quæ nā
pars sit affecta, non minus conferat utilitatem
quàm actionum cognitio. Eadem est ratio & de
futurorum præcognitione. Nam qui affectus in-
sunt cruribus incurabiles (ut luxationes quæ cū
ulcere incidunt, aut perversiones coxendicum)
insanabilem in futurum tempus significant am-
bulationis noxam. Tertia, præter prædictas, hu-
jus operis utilitas est adversus sophistas, qui no-
bis non concedunt crises morborū a natura fie-
ri, quique ipsam ullam animantium habere ratio-
nem pernegant. Jam verò in partibus quibusdā
scindendis, aut circuncidendis, aut abscindendis,
quemadmodum & in eximendis sagittis, vel ja-
culis, qui partium utilitates probè calluerit, præ-
scribet quas nam audacter & securè, quāve tre-
pidè & cautè incidere oporteat. Hæc itaque tot ac
tanta hujus, quod ad umbilicum jam perduxim-
us, operis commoda, liber iste, veluti bonus
quidam *εἰσὸς*, explicat.

GAL. LIBRORUM DE VSV PAR-
TIUM FINIS.

ILLUSTRI AC GENEROSISSIMO
VIRO, D.D. FERDINANDO, COGNOMENTO
à Mendoza, literarum patrono, Andreas Lacuna, Sec. Doc.
M. Miles Sancti Petri, S.



COMMENTARIOS GALENI DE PLACITIS HIPPOCRATIS ET PLATONIS a
me haud ita pridem elaboratos, atque (ut ita dixerim) ad meliorem frugem redactos, multis de
causis adductus sum, tibi ut dicarem, Ferd. generosiss. Primum, quod rationi esse consonum
ducerem, ut aliquantulus ad te rediret mearum meditationum fructus, qui fovere indies illas
atque provehere non desinis. Dein, quod te conspicerem divino quodam affectu præditum, sapi-
entiaque ardentissimo amore inflammatum, diu noctuque ipsi philosophiæ incumbere, ei que navare haud instre-
nuam operam: ac proinde eorum philosophorum dogmata fore tibi non minus accepta, quàm tuis studiis apta,
sperarem. Quocirca ut officium meum observantiamque erga T. Dignationem testarer, simulque lucubrationi-
bus meis conciliarem patronum optimum (qualem ha. virulentissima ætate omnes ingenuæ artes & discipli-
næ desiderant) non alia fieri posse ratione apud me existavi, quàm si nominis tui præfatione illustratum, id-
ipsum laboris quod est, ederetur in lucem. Tuum igitur est, Vir clariss. hæc vigilias nostras ne utiquam per-
nitendas, vultu hilari in tuos sinus excipere, exceptasque contra viros male feriatos defendere: ut verè
sis id quod diceris, Philanthropos, *μισοπώνος*, philalethes, *φιλόσοφος*.

Vale. Venetiis, XII. Calend. Aprilis.

GALE-

GALENI PERGAMENI
de Hippocratis & Platonis placitis,
Liber II.

Nam primus desideratur etiam in graeco exemplari.



Porro Chrysippus his frivolis assumptionibus, animam rationalem delitescere in corde persuadere conatur, quod dum animi sententiam exprimimus, atque indicantes nos ipsos, hanc vocem, Ego, proferimus, in priori syllaba, E, os & mentum inferius veluti ad pectora deducamus: quodque etiam manum interdum admoveamus pectori similiter indicantes nos ipsos: ut cum dicimus, Mihi hoc convenit. Ceterum quod etiam nasum similiter homines quandoque attingunt, dicentes, mihi hoc da, tamen si in eo anima non resideat, omnino esse oblitus videtur. Cur autem, dum concedimus aliquid annuentes capite, in quam partem ipsum flectimus, in illa principium animi esse potius ostendimus, quam in ea quae movetur? Etenim quae primum in nobis movetur particula, dum annuimus, eam nimirum probabilius est animae principium in se continere, quam aliarum ullam, ad quam motu perfertur: ut interim illos homines non commemorare, qui capite renuunt, cum assentiuntur. Oportebat itaque ab ipsa rei substantia, quam tractabat, Chrysippum orsum, tum per convenientes, tum per proprias assumptiones investigare. Nam quae demonstrationes ab ea rei substantia recedunt, ut minimè scientificae sunt, sic eas aut exercitatorias probabilesve, sive dialecticas, aut rhetoricas, aut denique sophisticas nominaveris. Ac traditum sanè à veteribus de singulis est: de sophisticis quidem, in elenchis: de rhetoricis autem, in rhetoricis artibus: in topicis, de dialecticis sicuti in libris de demonstratione (quae dicuntur secunda analytica) de scientificis: in quibus omnibus, qui rectè demonstraturus est, sese oportet exerceat. Quia igitur propositum est nobis considerare, num animae principatus in corde consistat, omnia quae cordi insunt, & à quibus demonstrationes desumi possunt, dinumeremus. Cordi sanè insunt, situs, magnitudo, plexus, conformatio, dispositio, & motus. Situm autem est cor, thoracis quidem ratione, quodammodo medium magis: totius verò animantis respectu, tantò superius mediis partibus eius, quanto ab umbilici regionibus (quae ad amissim sunt mediae) distat. Versus ipsam etiam arteriam asperam, per quam respiramus, ita quodammodo situm est, ut per medium pulmonem ei committatur. Nam ex sinistro cordis ventriculo arteria quaedam venosa in pulmonum fibras disseminatur, ad cuius quidem numerosas propagines, fines asperae arteriae perveniunt, quae & ipsa in totum viscus simili distribuitur modo, quo arteria venosa. Quinetiam juxta pulmonem ita locatum est cor, ut extrinsecus ab eo undique cõtegatur. Verum neque ex situ, neque ex cõmunionem cordis cum illis partibus, licet eius quod petimus scientificum ullum argumentum discere: quadoqui-

dem nondum per ea colligitur, cor sensus motusque voluntarii principium esse: quemadmodum neque etiam quod cor vocis opifex sit, qualis est quorundam sententia. Etenim vocis instrumentum & primum & peculiare est summa pars gutturis, quam Graeci larynga vocant. Si igitur infra ipsum asperam arteriam incideris, non amplius animal vociferari audies, etsi respirare ipsum sine impedimento, etiam nunc videas. Jam verò thoracis musculos, una cum iis qui in abdomine sunt, quum animal vocem molitur addere, vehementer extendi conspicias, corde nullam novam insuper actionem interim acquirere. Non itaque jam spiritus qui ab imo sursum effertur, priusquam ab ipso concinetur larynge, vocis habet specimen, sed solius tantum sibili. Icta autem à supremi asperae arteriae finis cartilaginibus, veluti plectris quibusdam efflatio haec, vox efficitur. Ceterum composita est summa gutturis regio, larynx dicta, ex tribus cartilaginibus, quas complures muscoli movent, tantumquam motus voluntarii instrumenta. At musculi, ut ipsi moveantur, nervos à cerebro orientes requirunt. Ex quibus si aliquem fune interceperis, dissecuerisve statim immobilem illum musculum reddes, in quem inseritur nervus: immobile etiam animantis membrum, quod prius à musculo movebatur, quam nervus esset incisus. Ac fit qui dem ab aliis instrumentis, musculisque & nervis, inspiratio libera, qualis sanis adest nulla fortis motu agitis: ab aliis autem violenta, quam efflationem appellare solemus: ad quam perficiendam videbis omnes scapularum particulas simul attolli. Est tamen proprium vocis instrumentum larynx, ac tum eius motores muscoli, nervique à cerebro in musculos ipsos demissi: deinde lingua, quae non vocis modo, sed loquelae etiam instrumentum existit. At verò pulmo, à thorace motus, distentus quidem, externum aërem, id quod est inspiratio, attrahit: contractus autem, eundem in asperam arteriam, atque in os ipsum, extrudit: quod opus est expiratio. Atqui, si vox ab eo, qui in corde est spiritu, fieret, non aboleretur statim, nervis quibusdam vel in collo, vel in capite sectis: multoque minus aut contuso aut vulnerato cerebro, aut spinali medulla dissecta: sed potius oblato corde, id quod non accidit. Etenim si nudaveris cor, contuderisque ipsum atque depresseris, nec voce, nec spiratione, nec ulla prorsus voluntaria actione impediri animal cernes. Quod si minimè perforaveris concavitatem thoracis, libet tibi etiam universum ac semel cor ipsum eximere, illaesis voluntariis actionibus: id quod in nonnullis sacrificiis contingit, in quibus animalia cernuntur, corde jam artis imposito, non respirare tantum, aut clamare fortiter, sed etiam fugere, quousque perfusione sanguinis cõmoriantur. Cerebrum autem ossibus si detexeris, aut quencunque ipsius sinum compresseris, non mutum duntaxat, ac protinus spirationis expertus efficies, sed etiam omnino sensu, omnibusque arbitrariis actionibus animal ipsum privabis. Porro tauris, quibus spinalis medullae origo juxta primam vertebra dissectatur quotidie, simul cum sectione ipsa, motus, respiratio, & vox exolvuntur, illaeso motu cordis & arteriarum: quod ipsa

Larynx est primum instrumentum vocis.

Thoracis musculi.

Abdominis musculi.

Vox qua ratione efficitur.

Larynx ex tribus cartilaginibus constat.

Musculi motus voluntarii instrumenta.

Nervos productos à cerebro, argi-ri sum mu- sculis motu.

Inspiratio libera.

Inspiratio violenta.

Lingua, vocis loquela instrumentum existit.

Inspiratio quid.

Expiratio quid.

Corde nudato & contuso, nulla prorsus voluntaria actione impediri animal.

Corde iam artis imposito, animalia respirare, clamare & fugere.

Cerebro detexto ossibus, aut compressis eius ventriculis quam accedant.

pulsandi vis, à cerebro non descendat. Verum pulsatio ipsa motus alterius generis est, sic etiam principiorum alterum non indiget altero: Quare neque respirationis, neque vocis, cor existit principium: tametsi propter illud majori ex parte contingat fieri respirationem. Argumenta autem Zenonis, Diogenis Babylonii, & Chrysippi, quibus freti, in corde rationalem animam habitare, ab eoque emitti vocem contendunt, in hoc unum ferè conspirant omnia. Unde vox ac sermo eliditur, illic necessum est fiat ratiocinatio, intelligentiaque, & meditatio omnis, ibidemque etiam mens delitescat. Est enim sermo veluti mentis nuncius, qui ex ea procedit: nec alia existit vocis origo, alia animæ pars præcipua. Atqui vox & sermo, qui vox articulata est, à pectore proficiscuntur, cum per asperam emittantur arteriam, id quod non fieret si à cerebro emitterentur. Mens igitur & omnes eius actiones, in pectore, ac præcipue circa cor, non in capite, delitescunt. Quæ quidem argumentatio facile redargui potest. Primum siquidem, dum situs observantes propinquitatem, aiunt, si ex cerebro sermo oriretur, non per asperam arteriam procederet, perperam hallucinantur: cum nimirum mens ipsa, aut voluntas (sive eam in cerebro, sive in corde posueris) quælibet instrumenta, etiam longissime sita, actutum movere possit, nihil ex intervallo, ad celeritatem, impedimenti recipiens. Ut enim nullum sensibile tempus est, interea dum particula vulneratur, & ipsum animal sentit: ita nec interim dum homo respirare aut loqui vult, atque ipsam actionem obit. Quare nihil prohibet, quo minus voce per asperam arteriam emissa, cerebrum motus asperæ arteriæ sit causa. Falluntur etiam secundo, sermonem procedere ex mente dicentes. Sermo quippe aut vox significativa, à mente (quemadmodum voluntaria omnia) non tamè ex mente, sed ex summo gutture proficiscitur. Prius autem nondum vox, id quod effertur, existit: est materia quædam vocis (quam efflationem aut sibilum vocamus) ex asperis arteriis profecta, quarum nulla cor attingit: id quod certe sensui manifestum cum sit, fidem ex seipso facit. Ergo non dicemus, ut illi, unde sermo emittitur, illic etiam ratiocinationem fieri: sed, à qua parte sermo emittitur, secundum illam quoque, & in illa fieri ipsam ratiocinationem, quæ principis animæ est actio. Licet namque pro mente, principem animæ partem dicere, sicuti & dominantem, imperantem, præidentem, ratiocinantem, atque intelligentem. Jam verò cum tria va-

forum genera, venæ scilicet, arteriæ, & nervi, cerebro cor connectant: si primum quidem ea in superiori & inferiore cervicis regione funiculis exceperis validis, ne sanguinis perfusio magna sequatur: dein autem, vinculorum medium secueris: videbis planè, ipsis quidem nervis quæ juxta arteries consistunt incisis, statim obmutescere animal, illæ si aliis universis actionibus: arteriis autem solis aut sectis, aut interceptis, minimè reddi animal mutum, privari tamen pulsu omnes quæ supra vulnus aut vinculum sunt, eius patriculas: iis quæ infra consistunt, semper eodè

modò pulsantibus: venis denique aut incisis aut interceptis, nullam manifestè aboleri functionem. Unde liquidò constat, neque cor, ad pulsum motum cerebro egere: neque cerebrum corde, ut sentiat animal, opereturque pro voluntatis imperio. Porro si intelligendo, discendo, docendoque, nullus insignis motus in corde apparet: in omnibus autem perturbationibus is manifestè innotescit (quod etiam Chrysippus confirmat) clarum utique evadit, ratiocinatricem animæ facultatem non esse in corde: irrationalem autem, & affectibus obnoxiam, in ipso comprehendi. Cæterum qui per cardialgiam cor dolere autumant, vocis æquivocationem non sentiunt, qua nimirum os ventriculi veteres cor appellabant. Quæ pars cum ab acerbis humoribus irritatur, tali sensu tristitiæ afficitur: id quod maximè iis contingere solet, qui impendio diutius à cibo abstinuerunt, præcipue post exercitationes vehementes. Nam exercitatis valentius, in ventriculo flava bilis colligitur, à quo morbi, cardialgia laborant. Ad hæc autem, etiam si concesserimus, cor primum omnium particularum formari, non ob id tamè inferre oportebit, cor initium facultate existere, sed secundum generationem. Quod autem cor primum omnium particularum moveri incipiat, atque ultimum cesset, ostendit quidem, id motus initium esse, non tamen omnis, sed solius qui in pulsibus est: qui genere à voluntario differt, cujus cerebrum origo existit. Quod si nobis objiciant, in corde copiam nervorum conspici: respondebimus, non nervos, sed nervosa quædam esse corpora in corde, quæ specie solum nervis respondent, non actione & usu. Dicunt præterea, in corde consistere nutritionis animalium originem, ac proinde in eo vim ratiocinatricem esse debere. Verum in utroque mentiuntur lemmate. Nam primum nutrimenti principium sunt os, stomachus, & ventriculus: alterum, meseraica venæ, in quibus primis fit sanguis: tertium jecur ipsum: quartum post jecur, vena cava, in qua prima purus à recrementis sanguis relinquitur: ab hac enim, quemadmodum aliæ omnes animalis particule, cor alimentum recipit. Sed nec si cor nutritionis esse principium admitteremus, consequens esset, in qua parte id genus principium est, in eadem ratiocinatricem facultatem haberi. Præterea ubi ajunt, unde spiritus suggeritur, ibidem esse animæ principatum: cogimur id concedere, si quidem de animali spiritu intelligat. Ubi verò postea subdunt, ex corde spiritum suppeditari, vitalem quidem fatebimur, animale autem non item. Quod si neutrum horum spirituum intelligere se fateantur, sed naturalem, qui sicco humidoque alimento proportionem respondet, audient dicentem Hippocratem: Principium alimenti spiritus, os est, nasus, aspera arteria, pulmo, ac reliqua perspiratio: quibus sanè instrumentis initium motus à capite nos transmitti fateamur. An verò animæ substantia sit evaporatio sive ex alimento, sive ex spiritu, hac de re nihil ad præsens in dubium vertimus, ne per omnia Diogeni videamur infesti esse, qui sanguinem esse animam, ut Empedocles & Critias, existimavit.

Cor neque respirationis, neque vocis principium est. Anima sed in corde esse, quibus argumentis probabant veteres.

Mentem, ubi cunque ea sit, quælibet instrumenta & longissime sita, subito movere posse.

Sermo à mente, non ex mente, sed ex summo gutture proficiscitur.

Ratiocinationem esse principis animæ actionem.

Mentis nomenclatura.

Cor per quæ vasa cerebro connectatur.

Cor ad pulsum motum suum non eget cerebro.

Cerebrum non eget corde sentiat & movetur animal.

Animam rationalem affectibus obnoxiam corde comprehendit.

Os ventriculi veteres cor nominabant.

Os ventriculi quibus præcipue irritatur.

Cardialgia.

Nutrimenti principia.

Meseraica venas primas conficere sanguinem.

Cavæ venæ suggerere alimentum nervoso corde.

Spiritus vitalis à corde nascitur.

Spiritus naturalis.

Principium alimenti spiritus.

Animam esse sanguinem qui putarent.

GALENI PERGAMENI

de placitis Hippocratis & Platonis, lib. III.

QUOD sanè necessariū existat, non solum medicis, sed philosophis etiā, nosse, quot genere sint, & quales secundum speciem singulæ, quamq; potissimum animæ partis particulā occupent, facultates corpus nostrū regentes, primo libro demonstratum à nobis est. Secundo autem, de sumptionū differentiis sermonē habui: quæ quidem in universum sunt quatuor. Nonnullæ quippe ipsarum, ab iis quæ particulæ insunt, juxta problematis substantiam sumuntur: aliæ vero ab iis sanè quæ insunt, non tamen secundū id quod propositū est, ac de quo quæstio habetur: aliæ ab externis testibus, ut rhetoricæ: aliæ deniq; à principiis sophisticis, vocularū ambiguitate & impostura obarmatæ. De quibus cum jam disse-
 10 ruerim (idque illorum qui eis utuntur, exemplis propositis) operæ precium videtur nunc in ter-
 tio hoc commentario, numerum & substantias facultatum docere, numerumq; etiam atq; discrimina eorum quæ illis accidunt. Satis autem mirari non possum, videns Chrysippum, qui deberet ostendere, animam rationalem in corde domicilium habere (est enim hoc illius dogma) se-
 20 se nimis anxie torquentem, ut tum rationibus, tum innumeris poetarum exemplis (quæ brevitas gratia prætereo) irascibilem facultatem, per-
 30 turbationibusq; obnoxiam, in thorace habitare demonstraret: id quod jam pridem est à veteribus demonstratum: qui quidem fervorem innati caloris aliquem in corde per iracundiam oriri di-
 cunt: cujus ratione accidit, ut tota facies infle-
 40 tur, corpus universum rubescat, incalascaturque, & vehementer cor unā cum animantis arteriis sub-
 filiat: quæ omnia pulchrè describit Plato in Timæo. Ad hæc verò, cum debuisset Chrysippus, quæ suam quidem fovēt sententiam, ea tan-
 tum testimonia poetarum eligere: quæ evertunt autem, & labefaciunt, explodere: ille sanè ex æ-
 quo omnium meminit: imò verò maximè præ-
 cipua, & quæ ipsi patrocinebantur, omisit. Qua-
 lia sunt illa:

*Iuppiter exemit tunc ipsi ex pectore mentem. &
 Consilium Neptune meum, hoc in pectore nosti. &
 Non mihi stat talis sententia pectore.*

Hæc igitur testimonia sola, & similia alia, quæ rationalem vim in corde sitam esse portendunt, se-
 50 ligere conveniebat Chrysippum, si omnino tes-
 tibus litem dirimere statuebat. Nam numerosa illa quæ adduxit, tamesi vera sint, ejus tamen prorsus opinionem dejiciunt, præsertim quæ ira-
 cundiæ manifestò adversantem faciūt rationem: veluti & hæc sonant:

*Pectora sed feriens, ipsum cor increpat ira:
 Suffer & hæc cor, nā graviora aliquando tulisti.*

Hæc siquidem Ulysses ad se dicentem introdu-
 60 xit Homerus, cum ob ea quæ ab ancillis domi-
 agi videret, calor in corde ipsius effervesceret: & animus, sive iracundia, ratione devicta, ad in-
 tempestivam mulierum punitionem, ipsum jam vi præcipitem actura esset. Nam quam eques ad
 equum, aut venator etiam ad canem, rationem

obtinere, hæc ratio ad animum, sive iracundiam. Etenim imperare in omnibus & prævalere ju-
 stius est, id quod natura præcellit: equitem sanè equo, venatorem autem cani, necnon iracundiæ
 10 rationem. At non semper accidit, ut tale conju-
 gium, lege administraretur naturæ. Verum quem-
 admodum equus, nonnunquam refractarius &
 contumax, non pro decoro elatus, infessorem
 virium imbecillitate, aut equestri scientiæ igno-
 rantia victum, simul secum rapit, trahitque lon-
 20 gius: sic iracundia effrenis, & ad præcipitem vin-
 dictam erumpens, rationem interdum imbecil-
 lam, ignaramve, unā secum solet præcipitare. Si
 igitur robur scientiamque habeat, vincet nimi-
 rum & ratio iram (quale exemplum in Ulyssæ
 proponitur) & auriga equum. Sin autem aut al-
 ter utro, aut utroque privetur, periculum ibi est,
 ne id quod præstantius est, à deteriore vincatur:
 id quod certè in Medea contigit. In qua quidem,
 priusquam filiis occidendis admoliretur impia-
 30 tas manus, diu multumque ratio reluctata cum
 iracundia est. Noverat enim quā impium fa-
 cinus perpetraret. Cæterum postea tandem à
 perturbatione devicta, ipsi iracundiæ concessit,
 dicens:

*Novi equidem cuiusmodi faciam mala,
 Sed fortior iracundia consiliis meis.*

Novit itaque magnitudinem malorum, quæ e-
 rat perpetratura, à ratione edocta. Verum ira-
 cundiam longè fortiolem esse ratione ait, ac
 30 propterea se ab illa violentè ad scelus perpe-
 trandum abduci. Ulysses autem contra, ratio-
 ne iracundiam coercuit. Sæpe igitur in alio ira-
 scibilem animæ partem ratio adeò superat, ut
 ne pugna quidem unquam ipsis inter se oria-
 tur, sed hæc dominetur, illa obtemperet: id quod
 sanè iis adest, qui ad summum philosophiæ per-
 venerunt. Rursus iracundia subinde ita ratio-
 nem vincit, ut imperet, ac ducat perpetuò: quem
 40 admodum in multis barbaris, & pueris natura
 iracundis, necnon in ferarum non paucis, &
 hominibus belluinis videre licet. Et quum ne
 alterum quidem usque adeo valens sit, ut statim
 alterum trahat: sed adversantur invicem, pu-
 gnantque, & temporis spacio alterum vincit: ut
 in Ulyssæ quidem ratio, in Medea autem ira-
 cundia. Quas animæ aut partes aut facultates
 maximè inter se differentes, Chrysippus quum
 in unum confundat, carminum tamen Ulyssis &
 50 Medæ meminit, qui evidenter ipsius opinio-
 nem subvertunt. Taceo etiam Chrysippum, qui
 leonibus iracundiam ademit, carmen illud Tyr-
 tæi inter alia adducere, Leonis animum conti-
 nens in pectore: quod leonibus maximam in-
 esse iracundiam suadet. Et quum pronunciet,
 ideo nonnullos vocari excordes, quod universi
 homines animæ principatum in corde statuunt:
 miror sanè quod nō intelligat, nullum stolidum
 aut imprudentē, excordem dici: sed illos quidem
 60 omnes, vacuos cerebro: meticulosos autē, excor-
 des: sicuti & evisceratos eos, qui nullo affectu
 moventur: omnibus nimirū putantibus, in cere-
 bro quidem rationē, in corde iracundiam confi-
 stere. At quia tertiū quoq; viscus jecur extitit, in
 quo appetitoria animæ vis consistat, huic etiam

*Rationē præ
 esse animo,
 ut equo præ-
 esse videatur
 eques.*

*Medea faci-
 nus.*

*Medæ iracū-
 diam, super-
 rasse ratio-
 nem
 Ulyssæ coër-
 cisse iracun-
 diam ratio-
 ne.*

*Rationi sem-
 per iracun-
 dia obsecun-
 dat, in iis
 qui ad sum-
 mum philo-
 sophiæ perve-
 nerunt.*

*Cerebro & a-
 cui
 Excordes.
 Eviscerati.*

*Jecori inesse
 vim animæ
 appetitoria.*

Medeam fa-
isse magnis
donata visce-
ribus, ait
Euripides,
quo posside-
ret tres illas
animas fa-
cultates ve-
hementissi-
mas.

Hippocratis
Platonisq; en-
comia.

Rationalis
facultatis,
qua cerebro
inest opera.
Irascibilis fa-
cultatis, qua
cordi inest,
quid propria

Cerebrum es-
se originem
nervorum,
qua motus
voluntarij ex-
sunt in-
strumenta.
Cor esse arte-
riarum prin-
cipium.
Cerebri affe-
cti sympto-
mata.
Cordis affe-
cti sympto-
mata.

Aristoteles
plures ani-
mae faculta-
tes diversas
in uno cor-
de constituit.
Chrysippi de
partibus ani-
mae opinio
Appetitoria
animam in-
esse iecinori
Tityo apud
inferos hepar
exedi a vul-
turibus.
Minervam
ex Iovis cere-
bro fuisse or-
ta, fingunt
poetae.

commodationem quandam propriorum mo-
tuum inesse oportet, si homo in totum ornari a-
nima debet. Quas quidem tres animae facultates
Euripides in Medea vehementissimas esse descri-
bens (appetitive enim ardentissimus ille amor
quo Jasonem ardebat: irascibilem, immanis ejus
furor in liberos: rationale deniq; , suadela qua se
ipsam a tanto scelere dehortabatur, satis abunde
declarat) eam magnis visceribus donatam fuisse
ait. * Quamquam neq; Euripides, neque ullus
alius poeta (quorum testimonia praeter mo-
rem recitare, me Chrysippi garrulitas cogit) imò
verò neq; ipse etiam Hippocrates, omnium me-
dicorum calculo, praestantissimus, quemadmo-
dum neque Plato philosophorum princeps (cujus
nec opinionem sectatores Chrysippi supera-
re unquam poterunt, nec imitari demonstratio-
nis ornatum) de proposito placito fidem face-
re possit citra demonstrationem. Chrysippus
autem cum nullius demonstrationis memine-
rit interim non erubescit Tyrtaeum & Stesicho-
rum testes nobis citare, quos si etiam vivos ali-
quis interrogaret, an de horum dogmatum scien-
tia ambigerent, faterentur utique voce una, ni-
hil se ipsorum sensisse: ipsiq; potius à Chrysi-
ppo non nihil discere, quam de illis demonstrare
(ut arbitror) mallent. Ratiocinari igitur, & quae
dicuntur considerare, item pugnantiam, aut cō-
sequentiam rerum novisse, rationalis facultatis
(quae cerebro inest) est opus. Ob convicia autem
aut minas, neque irasci, neque excandescere, ani-
mosae (quae cordi haeret) est proprium. Etenim
dum ea quae in homine sunt, convenienter admi-
nistrantur, cerebrum quidem imperat: cor autē
paret, & obsecundat. Diximus autem, nervorū,
quae motus voluntarij, atq; sensus sunt instru-
menta cerebrum originem esse: quemadmodū
arteriarum, cor: ad haec etiam, contusis aut vul-
neratis ventriculis cerebri, totum animal subito
evadere torpidum, illaeso motu cordis & arteria-
rum: sicuti & ubi cor similiter affectum fuerit, ar-
teriarum motus offendi, citra ullam noxam vo-
luntarij motus, & sensus, quod eorum princi-
piorum neutrum cōmemoratas facultates alte-
ri subministraret. Porro patiente cerebro, prom-
ptē animal desipit, motuq; & sensu privatur. At
corde affecto, syncope arripitur, interitq; , praedi-
ctorum nullo quicquam perpeffo. Jam verò Ari-
stoteles, plures animae facultates genere diver-
sas esse concedit, etsi illas in uno corde consti-
tuat: Chrysippus autem neque eas omnes dif-
ferre inter se proficitur, neq; alia quadam vi ani-
mal irasci, alia cōcupiscere, alia ratiocinari: cum
tamen vel testimoniis poetarum, quos citat, as-
serere cōtraria cogatur. Etenim in jecinore deli-
tescere appetitoriam animae facultatem, illic pla-
tōe Homerus nos docet, ubi ait, vultures apud
inferos Tityo jecur exedere, quod concupisset
constuprare Latonam: * partem nimirum illam
plectentes, quae illatae contumeliae fuerat veluti
origo & radix. Quod pertinet ad rationalem a-
nimae facultatem, cum sentiret Chrysippus, fa-
bulam de Minerva, quae post deglutitam Meti-
dem, ex Jovis capite orta esse putatur, suis ipsius
dogmatis adversari, maxime illam detorque-

re conatur, hinc figmentum illud habuisse origi-
nem dicens, * quod artes quidem universae concipiantur & consistant in corde: a ratione autem
per caput, hoc est, per os (quae capitis particula
existit) emittantur sermone. Ceterum (ut fig-
mentum secus interpretemur (quemadmodum
cordi corpus virtute sua distentum & contra-
ctum vicissim, proprias materias attrahit, expel-
litque: pari modo cerebrum, ubi statuerit spiri-
tum animale, in suis contentum ventriculis,
particula cuiuspiam transmittere, motu ad id ido-
neo incitatum, distribuit ipsum. Hunc autem spi-
ritum qui in ventriculis ipsius est, fortassis qui-
dem paucum, etiam venae ad ipsos pertinentes
generant: copiosissimum verò & principalissi-
mum arteriae, plexum reticularem, qui ad cere-
bri basin est, perreptantes, suppeditant, quae a
corde sursum feruntur. Quare si quis fabulam
veris velit connectere, in partibus inferioribus
prudentiam conceptam (hoc est, animalem spi-
ritum in capite natura perfici * dixerit: praeser-
tim in vertice: quandoquidem in eo medius &
principalissimus cerebri sinus habetur. Verum si
scientificas demonstrationes sequutus, omisisset
Chrysippus fabulas, etymologias, reclinatio-
nes, declinationesque capitis, manuum motio-
nes, labiorumq; figuras, una cum mulierculis, &
aliis idiotis, utique veritatem ipse invenisset, nec
nobis periisset tempus, ostendentibus ipsum ni-
hil ex iis quae adducit, juvari.

GALENI PERGAMENI de placitis Hippocratis & Plato- nis, lib. IV.

AT verò ubi Chrysippus affectum defi-
niens, eum esse ait irrationalem, & praeter naturam animi motum, hoc est, re-
luctantem rationi: recte sanè ipsum qui in affe-
ctu est motū, ab inanimis irrationabilibusq; di-
stinxit. Moveretur siquidem lapis & lignum, sic ta-
men ut nō reluctentur rationi. Cujus enim neu-
tquam interest ut obtemperet, sequaturq; ratio-
nem, hoc quomodo repugnare rationi poterit?
Merito itaq; id nō uti ratione dicetur: sicuti relu-
ctari rationi, quod naturā quidem habet sequen-
di, obtemperandq; , sed interim praeter sui naturā,
alio modo fertur. Unde liquet, nec inanimato
cuiuspiam, neq; irrationali animanti, affectū inna-
sci posse animalem. Perdecenter etiam ab errori-
bus affectus ipsos distinguit. Quandoquidem er-
rores, prava sunt judicia, & ratio veritatem men-
tita, implicitaq; errori. Affectus contra, nullum
quidem erratū, neq; praetermissum in ratiocina-
tione: sed est animi motus rationi inobediens.
Nam qui ut patriam servet, liberorū vitā cōtem-
nit, vel jugulandos tradit, honesti imaginatione
id facit, ac ratiocinio usus. Medea autem, quae
sciebat qualia perpetraret flagitia, non errore, ut
ille, sed perturbatione ducta, trahebatur. Quin-
etiam, ubi celeriter currentium, qui ne si siste-
re quidem velit, statim id possunt, Chrysippus
meminit, aperte illo exemplo aliam vim prae-
ter rationalem, nobis posuit ob oculos, a qua
affectiones ipsae absolvuntur. Etenim eorum
qui per acclivia currunt, nulli adest ea difficultas
fisten-

Cordis
tus dup-
Spiritu-
nimalem
tineri in
triculo
bri.

Cerebri
tus.

Spiritu-
nimalem

tim a
gigni, p

tim &
cipue ab

ris.

Retiform-
plexum

sistere ad
sim cereb-

Ventricu-
lum cere-

principa-
mum, &

ci inesse

ris.

sistendi: sed iis tantum, qui per planam quandam aut declivem feruntur viam. Quippe composita inest ipsorum lationis causa: una, tanquam animalium, quæ animæ impetu moventur: altera, tanquam inanimatorum corporum quæ corpore inclinant. Cæterum qui in plana regione retrorsum corporis inclinationem inter currendum molitur, sistendi potens est, & sui juris: qui verò in anteriorem partem, utiq; ab illa impeditur. Qua de causa hoc pacto omnes currunt, ab ipsa rei natura edocti, corporis inclinationem in anteriora, celeritati motus conferre. Quemadmodum igitur iis, qui nihil à corporis pondere ad motus celeritatem juvantur, in promptu est ut sistant: illis verò qui ex duplici causa celeritatem generant, non amplius voluntas est satis: eodem modo in animi impetu, quum ratiocinatio sola causam habuerit, promptum est propter ipsam cessare impetum: ubi verò aut iracundia ei, aut cupiditas quædam accesserit, quæ sunt vires irrationales, & corporis gravitati persimiles, statim quidem neutiquam posse consistere, verisimile est: etsi tēporis spatio fortè hoc quoque fiet, quemadmodum in currentibus. Nam quum ratiocinatio, & iracundia, movere ipsum impetum possint, si quidem à sola ratione fiat, & compescere ipsum & rursus excitare sola voluntate licebit. Sin ab iracundia quadam & cupiditate, quum illæ cessaverint. Sin ab utrisque operantibus fiat ratione simul, & facultate quadam irrationali: ratione quidē renitente, quod valentius est, præcellet: simulantem concurrente, nunquam cessabit. Concurrat affectui ratio, quum quæ ille facit: etiam ratio opinatur: quemadmodum in intemperantibus & protervis hominibus, qui summum bonum in voluptatum fruitione collocant, ultro ratio ipsam cupiditatem sequitur. At remitti ac repugnare affectui rationem dico, quum homo non opinatur propositæ voluptatis fruitionem, honestum aut bonum esse: trahitur autē quodammodo ad eam, propter valentem appetitoriam virtutis motum. Verum si ratio superaverit, talis homo tum sui, tum suorum affectuum continens, & est, & dicitur. Sin autem cupiditas, contrariam huic appellationem sortitus, incontinens nominatur. Quum verò à ratione sola ad suavius usum ducitur, talis vocatur temperans, hoc consilio ea deligens, non ut fruatur, sed ut juvetur: quemadmodum etiam protervus, qui à sola cupiditate ducitur, ratione tanquam famulo quodam eam subsequente. Eiusmodi ergo causarum, impetus animi exiccantium, complexui, attestatur etiam Chrysippi exemplum. Etenim adversus acclive currētes, sola vi rationali ducuntur. Qui autem inviti feruntur ad præcipitium, irrationali: quam sanè corporis esse pondus diximus: in declive currentes, utrisque: perinde ut qui in plano currunt, si prorsum tendant. Nam si renitantur retrorsum, current quidem aliis minus, sed ubi voluerint, sistētur. Quare nihil Chrysippus usq; ad definitionum expositionē veteribus contrarium pronunciat. Maximè autem ab eis recedit, ac sibi met adversatur, dum affectus esse iudicia existimat. In summa verò, Chrysip-

pus semper veluti in unda fluctuat: nunc quidē sine omni ratione fieri dicens affectus, nunc ad solā rationē pertinere animæ facultatē: ac proinde eos, iudicia quum sint, irrationabilibus animalibus non inesse. Oblitus autem esse videtur interim, quod à vitiis oppido quā decenter affectus ipsos distinxerit. Ratio siquidem, etiam ex Chrysippi sententia, sive sana & vera, sive prava & mendax extiterit, is qui secundum ipsam movetur, nunquam in affectum incidit. Quandoquidem secundū veram, rectē & venustē movetur: secundum falsam, pravē & vitiosē. Ubi enim ratio dux est, aut virtus sequitur, aut vitium: affectus nunquam. Itaq; putare voluptatem bonum existere, quemadmodum Epicurus existimabat, peccās, vitiosa & falsa ratio est: omnesq; actiones & particulares animi motus, qui voluptatem, tāquam finem respiciunt pravē, pravos sanā necessario, & aberrantes facit, ac vitiosos: non tamen jam affectus quoque. Quippe proprium affectus hoc ipsum est, ut anima citra rationem moveatur: id quod pulchrè etiā scripsit Chrysippus. Quum aut nihil sine causa oriatur, ratio verò minimè præsit affectibus, justum est jam nobis Chrysippus respondeat, quidnam affectus ipsos producat. Nos siquidē affirmamus, interim quidem ab irascibili, interim ab appetitoria animæ facultate illos ducere originem. At Chrysippus nulli firmiter hærens sententiæ, modò eos præter rationem oriri ait, modò secundum rationem, modò temerè atq; à casu procedere: quocirca reprehensionem ullo pacto effugere nequit. Nam si dicat affectuum insultus ab ipsa ratione oriri, discernere jam vitium ab affectu non potest. Si verò rationem adimat, in motum quendam causæ expertem incidit: quum liceat illi ex facili ambas absurditates vitare, si cōfiteatur irrationales quasdam facultates in anima affectuum ipsius causas existere. Quanquā ubi ea quæ nō rectē homines faciunt, partim quidem ad pravū iudiciū refert, partim ad infirmitatem animi, imbecillitatemq; quemadmodū ubi rursus iis quæ rectē administrant, rectum iudicium cum bono animi robore præesse ait: illic sanè diversam à ratiocinatrice vim quandā esse in animis hominum, causam talium affectuum fateri, velit nolit, cōpellitur. Siquidem ut iudiciū, facultatis rationalis est opus: ita firmitas, robur virtusque, facultatis est diversæ à ratiocinatione. Porro ut scientiam habere (secundum quam, ex Platonis sententia, nemo ulla in re potest hallucinari) non est affectus: ita neque oblivio illius affectus dicenda est, sed inscitia potius, aut ignorantia. At si quis iracundia, aut voluptate deceptus, ab iis quæ initio statuerat recesserit, imbecillis quidem huic anima & infirma est: motus autem ipsius, est affectus dicendus, ut constat in Menelao, qui quum Helenā occidere decrevisset, eamq; districto gladio invasisset, propius accedens, ac mammas illius candidissimas conspicatus, attonitusq; ob pulchritudinē ejus, propter infirmitatē imbecillitatemq; animi, nō solum gladium abiecit, sed mulierem etiam est osculatus, ei quo seipsum mancipium obtulit, citra iudicium, citraq; rationem, impetu ad cōtraria

Affectus distinguatur a virtute.

Ratione ducit, virtutem aut vitium sequi: affectum nunquam.

Voluptatem non esse in bonis ponendam.

Affectus proprium. Nihil sine causa oritur. Ratio non præest affectibus.

Affectus unde proficiantur.

Facultates quasdam irrationales in anima affectuum causas existere.

Scientiam habens, nulla in re potest hallucinari.

Menelai imbecillitas, mollitiesq; animi.

ria ductus, eorum quæ initio decreverat. Quem-
admodum igitur in Medea iracundia oppressit
rationem, eamq; ad perpetrandum scelus per-
traxit: sic animam Menelai ipsa decipiens cupi-
ditas, revocavit illam ab instituto. Quæ qui-
dem exempla ab ipso Chrysippo adducta, maxi-
mè illi adversantur, quum ex eis constet, tres fa-
cultates diversas inesse hominibus: nec esse affe-
ctus ipsos iudicia, qui præter iudicium orian-
tur. Nec verò à veteri placito illa carmina abhor-
rent, quæ, ut suam opinionem tueatur, citat etiã
de animantibus.

*Venus siquidem admonita laxat nihil,
Si nanq; cogas, amplius intendere appetit.*

Admonitus autem amor, magis premit.

Quibus postea subdit, affectus ipsos amantium
declinare semper rationem, tanquam intempe-
stivum increpatorem. Reperies & alia innume-
ra in libro De affectibus, ab eo prodita, pugnan-
tia quidem iis dogmatis, quæ ipse statuit: con-
sentanea autem & manifestò apparentibus, & o-
pinioni Platonis. Quum autem Chrysippus di-
xisset, tristitiam esse opinionem recentem præ-
sentis mali: ab eo Posidonius exigit causam, cur

Jam verò sunt qui nolentes plorant, lachrymas
cohibere impotentes. Sunt contrà, qui plorare
cupientes, protinus cessant, ob motiones affe-
ctibus subditas, vehementer ita inhærentes, ut
non evincantur à voluntate: aut ita omnino ces-
santes, ut ab ipsis excitari nequeant. Quorum
causas investigantes, inveniemus quò pacto ra-
tio cum affectu pugnet, atque ab eo differat, si-
mulq; servabimus animæ facultates. Consue-
tudines itaque & tempus, ad affectuum motus
plurimum posse videntur. Consuetudine quip-
pe mollescit animæ irrationabilitas, in quocun-
que educetur. Tempore autem affectus conquie-
scunt, repletis irrationabilibus potentiis ani-
mæ, iis quæ antea desiderabant. At rationales co-
gnitiones, iudicia & summatim scientiæ omnes,
& artes, neq; difficiles ad dissolutionem fieri ap-
parent propter solum tempus nudum (quem-
admodum consuetudines secundum affectum)
neq; transponi & cessare, sicuti tristitia, aliq; affe-
ctus id genus.

G A L E N I P E R G A M E N I
*de Placitis Hippocratis & Plato-
nis, lib. V.*

Quum igitur sectatores Chrysippi osten-
derint, *quemadmodum ipsi quidem exi-
stimant, universos affectus in corde con-

sistere: ut autem veritas habet, solos eos, qui cir-
ca irascibilem facultatem versantur: ac dein as-
sumpserint ubicunq; animi affectiones sint, ibi-
dem quoque ratiocinatricem ipsius facultatem
haberi: ita demum concludunt, in corde ratio-
cinatricem existere. Nos verò, quò inde ira-
cundia nascatur, unà cum ipsis fatemur: quòd
autem in loco eodem delitescant vis irascibilis
& ratiocinatrix, non item: neq; quòd unius ope-
ra facultatis existant. Porro affectum animi,

motionem quandam esse præter naturam, ra-
tionis expertem, quæ civiliū animis non inna-
scantur, nò veteres tantum, sed Chrysippus quo-
que fatetur. Est autem inter animi constitutio-
nem, & eam quæ corpori inest, quædam simi-
litudinem & proportio. Quare Posidonium laudo,
quòd pravorum animas, quum extra affectus
constiterint, sanis corporibus similiter se habe-
re prædicat: non probo autem, quòd ejusmo-
di constitutionem morbum nominet. Oporte-

bat nanque, si rectè sapientium animas vellet as-
similare, dicere, * eas similes esse corporibus iis,
quæ ab affectibus sunt immunia. At provido-
rum bono habitu præditis. Mediocrium verò
virorum, sanis sine bona habitudine. Vulgariū
& iniquorum, iis qui vel ex occasione levissima
in morbos incidunt. Irascentium deniq;, aut fu-
ribundorum, aut lugentium, amantiumve, aut
obsessorum aliquo affectu, iis quæ jam ægrotant.
Siquidem quocunque tempore vel dormiunt,
vel ad aliud mentem hî transferunt, extra affe-
ctum feruntur. Paulò post ubi ipsorum memi-
nerint, in constitutionem perveniunt febrium
insultibus similem. Quemadmodum autem sa-
nitas corporis, est commodatio simplicissima-
rum ejus particularum, quæ jam elementa voca-
mus:

*Tristitia
quid.*

*Tristitiam
cur inferat
opinio recens
presentis mali:
inveterata
aut nequa-
quam ante nò
perinde.*

*Immodicum
omne irru-
ens subito,
permutat a-
nimu: con-
suetum ve-
rò, nò usque-
adeo.*

*Immunes ab
affectu esse,
qui non præ-
sentib. tan-
quam præ-
sentibus re-
bus utuntur.*

*Anaxagora
dictum hero-
icum.*

*A sapiente aliquo perdoctus ego,
In curas animum & calamitates indidi.
Atq; exulem me proposui à patria mea ad mortes
Immaturas, & vias malas alias:
Ut si quid paterer ex ijs quæ putaveram
Aliquando, animum non morderent recentia.*

*Eòdem pertinent & illa.
Si hic primus esset malorum dies mihi,
Et non diu vexarer in laboribus,
Forsan reniterer: ut pullus ingo recens
Subditus, excutiens frenum susceptum super.
At nunc malis obdurni, & occallui.
Hæc interim emollescent longo tempore,
Malum pubescit nunc.*

*Affectus se-
dari tempo-
re, etiam si
opinio ipso-
rum perma-
neat.*

*Affectus
quomodo co-
pescantur.*

Tempore itaque affectus cessant, etiam si opinio
eorum & iudicia permaneant. Ut enim pars ani-
mæ obnoxia affectibus, peculiaria quædam con-
cupiscit appetibilia: ita etiam ipsis, quum acci-
dunt, repletur & saturatur, atq; in hoc suum ipsi
us motum sistit, qui animalis impetui præerat.
Nihil autem tam clarum est, quam vires quas-
dam in nostris animis inesse natura concupiscen-
tes, hanc voluptatis, illam dominij & victoriæ.

*Consuetu-
ne molles-
cit anima ir-
rationabili-
Tempore
fectus co-
quiescunt*

*Chrysippi
atorum
sursus.*

*Affectus
quid.*

*Animi co-
stitutionem
corporis co-
stitutioni
se similem*

*Animarum
cum corpori-
bus compa-
rationes de-
scribere*

*Sanitas cor-
poris qua.*

333
 museodem modo etiā erit animi sanitas, com-
 moderatio quādam simplicium particularum i-
 ipsius. Quinetiam morbus animi similiter immo-
 deratio quādam est, & discordia ipsarum harum
 particularum inter se, quarum commodatio e-
 rat animi sanitas. Sunt autem hæ particulae ju-
 xta Platonis sententiam, irascibilis, rationalis, &
 præter has etiam appetitoria. Etenim concor-
 des invicem, & in nullo dissidentes hæ tres, sa-
 nitatem animi efficiunt: discordes autem & con-
 tendentes, morbum. Ubi autem Chrysippus ait,
 animæ partes esse, per quas ratio in ea consistit:
 intelligens animam, notionum & præsumptio-
 num quādam collectionem existere, duplici-
 ter errat. Primum enim non animi, sed rationis
 has dicendum erat esse particulas. Quippe non
 idem est anima & ratio, quum hæc in ea conti-
 neatur. Quod si hoc etiam aliquis irreprehen-
 sum permiserit, certè notiones & præsumptio-
 nes non particulas animæ, sed actiones animæ
 dicere oportet. Nihil autem ex propriis functio-
 nibus constat. Ad hæc etiam Chrysippus sanita-
 tem animæ & pulchritudinē in unum atq; idem
 confundit. Porro corporis pulchritudo, in par-
 ticularum commodatione (qualis in Polycleti
 regula cernitur) secundum omnes medicos phi-
 losophosq; consistit. Sanitas verò, elementorum,
 quæcunq; illa sint, inter se est cōmodatio. Cæ-
 terum animæ pulchritudo, ad moderatos ac de-
 centes ipsius animæ motus (qualis est Platonis
 sententia) refertur: ad immodicos autem & effe-
 ratos, turpitudine ejusdem. Siquidem in cōmode-
 ratione motionum particularium, pulchritudo
 actionum est cognita: sicuti turpitudine in immo-
 deratione. Quod autem anima nostra composi-
 ta ex particulis diversi generis, & substantia &
 sede inter se differentibus sit, quodq; innumeras
 vires fortitur, Hippocratis est atq; Platonis Pla-
 citum. Quare neq; in una particula animæ, neq;
 in una ipsius facultate, tum judicia, tum etiam af-
 fectus fient, ut Chrysippus existimavit. Jam verò
 pueris multò plures & vehementiores quàm a-
 dultis oboriuntur affectus: quum à nullo docti-
 magistro, sed naturali ductu illi omnes ad volu-
 ptates flectantur, aversentur autem labores. Vi-
 demus enim ipsos & irascentes, & calcitrantes,
 & mordentes, & prævalere cupientes, ut nonnul-
 la animantia, nullo præmio proposito, præter ip-
 sam victoriam. Neque verò à ratione impetus
 eorum coerceri dicere possis, ut qui rationem
 necdum habeant: neq; quod non innumeris af-
 fectibus implicentur. At ubi processerint, quo-
 niam ad honestum, naturalem quādam propen-
 sionem habent, & erubescunt peccantes, &
 justitiam, aliasq; virtutes amplectuntur, facien-
 tes plurima secundum earū notiones: etsi prius,
 quum essent parvi, ex affectu viverent, nullamq;
 præceptorum ex ratione curam haberent. Cæ-
 terum animæ constitutiones, ex diversis corpo-
 ris temperamentis oriuntur: quum videamus a-
 nimalium, quæ lati pectoris & calidiora sunt, om-
 nia sortiri naturam iracundiorem: ut timidior-
 rem, quæ latis coxis, & frigidiora. Ac secundum
 varietatem regionum, haud parum etiam mo-
 ribus homines ad timorem & audaciam, vel vo-

luptatis laborisq; studium, differunt. Quare, mea
 sententia, curatio animi affectuum, in nonnul-
 lis quidem prompta & facilis est, eò quod neque
 affectuum motus ipsis insint validi, neq; ratioci-
 natricis pars, imbecillis natura & imprudens, sed
 propter inscitiam pravaq; consuetudines, id ge-
 nus hominum vivere ex affectu cogantur. Non-
 nullis verò difficilis, quum motus affectuum,
 qui ex corporis constitutione necessario obve-
 niunt, magni & vehementes extiterint: ratiocina-
 tricis autem facultas imbecillis, imprudensque.
 Hunc quippe veri scientiam indipisci oportet, ac
 affectuum motus retundere, probis institutio-
 nibus assuescentem. Sic itaq; & ab initio homi-
 nem ad optimum conformare oportet, ante om-
 nia quidem, ipsorum seminum, dein victus quo
 grvida utetur, ac præterea cibi, potus, exercitio
 rum, atq; adeo quietis & somni ratione habita-
 Oportet autē (ut inquit Plato) pueros jam ædi-
 tos, ita educari & institui, ut reddant partem ani-
 mi affectibus opportunam & irrationalem, mo-
 tibus commodatam, ac rationis jussis audien-
 tem. In pueritia tamen exigui & imbecillam
 * hanc ipsam rationem esse verisimile est: ma-
 gnā verò & valentem evadere, circa quartum-
 decimum ætatis annum, quando jam dominari
 & imperare ipsam convenit, tanquam aurigam
 quendam pari connatorum equorum, nempe
 cupiditati, iracundiæq; dum non valentes ni-
 mium sunt, neq; imbecillæ, nec pigræ, nec effre-
 nes, nec contumaces omnino, aut indecoræ, aut
 contumeliosæ, sed in omne promptæ, tum sequi,
 tum obsecundare rationi. Hujus autem institutio-
 nem, virtutemque, scientiam esset oportet re-
 rum naturæ: quemadmodum aurigæ, speculatio-
 num artis aurigandi. Nam in irrationabilibus
 animæ viribus, scientiæ non solent innasci, sicuti
 neque equis: sed his sanè propria virtus, ex con-
 suetudine quadam irrationali proficiscitur, au-
 rigis autem ex disciplina rationali. Quemadmo-
 dum igitur irrationaliū animæ partium necesse
 est irrationales quoque virtutes esse, ita rationa-
 lem, solius ratiocinatricis. Quapropter meritò
 illarum virtutes, facultates dicendæ sunt: solius
 autem ratiocinatricis, scientia. Quum itaque in
 nobis alia potior sit animæ pars, alia deterior:
 qui potior sequitur, consentaneam naturæ vi-
 tam dicetur agere: qui deteriorem, repugnan-
 tem. Hic enim ex affectu, ille secundum ratio-
 nem, vivit. Quum igitur hæ tres propensiones
 nobis natura insint: ad voluptatem sanè, pro-
 pter appetitoriam: ad victoriam verò, propter
 irascibilem: ad honestum deinq; propter ratio-
 cinatricem animæ facultatem: Epicurus quidem
 infimæ animæ partis tantum proportionem con-
 spexit: Chrysippus autem, optimæ, quum dixerit
 peculiariter nos affici erga solum honestum. At
 universas tres proprietates perspicere solis ve-
 teribus philosophis licuit. Porro qui ex affectu
 vivit, hic irrationalem & attonitam animæ par-
 tem: qui verò sine affectu, rationalem atq; divi-
 nam sequitur. Quare affectuum causa cognita,
 plurimum ad remedij inventionem confert. Id-
 circo Damon musicus quum esset apud tibici-
 nam Phrygium modulantem, ebriis quibusdam
 adolescen-

Hominem ab
 initio, quo
 pacto secun-
 dum virtu-
 tem formare
 atq; institu-
 ere oporteat.

Pueris ratio-
 nem ipsam
 esse imbecil-
 lam: valen-
 tem autem
 evadere, cir-
 ca quartum
 decimum æ-
 tatis annu-
 m.

Scientiam
 non innasci
 irrationali-
 bus anima-
 rum facultatib.

Irrationali-
 um anima-
 rum partium, ir-
 rationales
 virtutes esse:
 rationalem
 autem solius
 ratiocinatri-
 cis.

Visero qui
 ex affectu,
 & qui secun-
 dum ratio-
 nem dicatur.
 Propensiones
 quibus move-
 mur natura,
 sunt tres.

Affectuum
 causa cogni-
 ta, plurimū
 ad remedij
 inventionē
 confert.

adolescen-

adolescentibus, & insana quædā peragentibus, Doricū canere iussit: illi verò statim à motu insulso cessarunt: non quòd opiniones ratiocinatricis facultatis docerentur à cantionibus tibicina, sed quòd affectibus obnoxia pars animæ, quū esset irrationalis, excitaretur, mitigareturq; motibus irrationabilibus. Siquid in irrationali, ab irrationabilibus & commod & noxa obvenit: rationali verò, à scientia bonaque disciplina.

Verum pars animæ affectibus obnoxia, temporis spatiopartim repletur propriis cupiditatibus, partim diuturnis laborat motibus. Quapropter amborum nomine ea conquiescente, & mediocriter mota, superior esse ratio jam potest: quemadmodum & equo effreni infessorem violenter excutiente, deinde laborate simul cursu, & præterea saturato iis quæ concupivit, rursus auriga superior evadit. At Chrysippus neque

Bruta, libidine & iracundia reguntur. Animalia quæ à quibus animæ facultatibus dispensentur.

Anima partem appetitivam, diversam à ratiocinatricem existens.

diversam animæ partem affectibus deditam, à rationali arbitratur: & affectus tollit à brutis animalibus, quum tamen libidine & iracundia regantur. Posidonius autem rectius, quæ animalia ægrè moventur, & stirpium modo adhærescunt petris, ea cupiditate sola gubernari pronunciat. Reliqua verò bruta universa, utrisq; facultatibus uti, & appetitoria, & irascibili. Hominem autem solum, tribus: quippe rationale principium, hunc sumere. Quòd igitur pars animæ appetitoria, diversa sit à ratiocinatricem, hinc colligere licet, quòd pueri dum sumus, instar brutorum animalium promptè ad repletionem ferimur neq; an id conducatur, aut obstit, considerantes.

Ætate verò & ratione provecti, sæpe ne bibimus quidem omnino, ubi persuasum habuerimus, ex potu noxam subsequitur: sæpe minus quàm appetimus, si & hic copia obfutura est. Interim aquam bibimus, vinum concupiscentes. Rationis autem expertes homines, similiter infantibus atq; feris, neq; tempus expectant, neq; quantitatem, qualitatemve corporis inspicere sustinent. Quòd ergo nec feræ, nec infantes, ratione utantur, etiam apud Chrysippum in confesso est. At quòd vialia præter rationem ad fruendum iis quæ concupiscunt, alliciantur, modò ait, modò negat. Etenim irrationalia in nobis facultas, ad singula quæ desiderantur, requirentem allicit: ratio retrahit, & inopportuna commotionem continet, ac pugna frequenter utrisq; valida inter se oboritur, evidenter indicans duplicem esse in nobis naturam facultatum invicem dissidentium. Si enim una esset sola, quemadmodum in pueris, nihil sanè prohiberet intempestivè nos frui appetibilibus. Quemadmodum etiam si sola esset ratio, nullum esset negocium, sitientem non bibere, aut esurientem non esse: neq; continens, neq; sobrius, qui non bibit, nominaretur: sicuti nec qui non vadit, nisi velit. Sitientis itaq; nolentis autem bibere, anima, una quidem facultate, aut parte, potum concupiscit: altera verò, fugit, & aversatur. Uni enim & eidem att-

Naturam facultatum nobis esse duplicem.

Iracundiam esse à natura tributam rationi contra cupiditatem, seu venatori canem.

pere aliquid fugereq; non licet. At verò rationi iracundia, ut subserviat & auxilietur illi, perinde ac venatori canis, contra tertiam animæ speciem, à natura tributa est. Quare ubi ultro sequitur ratio appetentiam, consequitur & iracundia

rationem. Ubi autem adversatur illi, atq; renititur, iracundia à ratione stat, atq; illi fert opem, præcipuè cum ratio ipsa ab aliquo vel intus, vel extrinsecus se affici injuria, & vi compelli, autumat. Siquidem autumare se injuria affici, rationalis est facultatis: eam autem ulcisci, animosæ proprium existit. Quum igitur appetitoria facultas, immoderate ad aliquid irruens, invitam rationem eò secum attraxerit, irascibilis contra illam rationi suppetias fert. At ubi à nullo affici injuria putatur ratio, minimè sanè iracundia effervesceat, etsi quammaximè tunc corpus justè puniatur ab aliquo, vel algere, vel famescere, vel sitire coactum. Unde liquet, iracundiam naturalis statui præditam, opiniones rationis sequi. Fieri tamen quandoq; potest, ut hæc quoq; pravè affecta immorigera rationi moveatur. Quòd autem iracundia à ratione diversa sit, hinc docet Plato, quòd pueri, perinde ut feræ maximè iracundi existentes, ratione careant. Eodem siquidem modo irascuntur pueri, quo & ætate provecti: hoc interjecto discrimine, quòd hi sanè in multis, ratione continent iracundiam, quemadmodum generosum canem, ferocius proximos insipientem aliquis pastor: in pueris autem, nihil ejusmodi accidit, quemadmodum neq; in bestiis: quòd in illis quidem, nondum, in his autem nunquam, ratio impetus animi inhibeat.

Iracundia naturalis præbetur nemini sequitur.

Pueri rationem.

GALENI PERGAMENI
de placitis Hippocratis & Platonis, lib. VI.

Est autem actio, motus quidam efficiens, hoc est, qui ex se existit: affectus verò, motus in altero, ab altero, ut necessario sæpe in unum subjectum cum affectu actio conveniat. Nam à secante facta divisio in eo quod secatur, una & eadem res quum sit, secantis quidem actio: ejus autem quod secatur, affectus est. Ita sanè & iracundia, actio quidem est irascibilis animæ: affectus autem, reliquarum ipsius duarum partium, & præterea totius nostri corporis, quum ab iracundia violenter ad actiones ducitur. Atque hoc unum est significatum utriusque nominis. Alterum autem, si actionem quidem, motum quendam naturalem intelligamus: idque primaria ratione: affectum autem, præter naturam. Etenim primaria ratione illa fieri à natura dicimus, quæ veluti scopos natura amplectitur: nec ex aliqua consequentia, alia necessario sequitur. Ut autem res magis innotescat exemplis, cordis motus, qui in pulsibus quidem fit, actio dicitur: qui verò in palpitationibus, affectus: pro secunda hujus dictionis (affectus) significatione. Atque ita non omnis pulsus est actio, sed is tantum, qui naturalis existit. Iracundia igitur & omnes animi affectus, actiones quædā sunt, secundum primum significatum. Quatenus autem effrenes & immoderati existunt, neq; secundum naturam, affectus esse dicuntur, ex significatione secunda. Qualis enim res in arteriarum motu magnus est pulsus, talis in irascibilis animæ motu, iracundia. Qualis rursus parvus pulsus, talis timiditas. Porro iracundiam ipsam frequenter alia duo

Actio quæ affectus quid.

Iracundia esse actioem & affectum secundum varias partes actionis secundum quædam significationes. Primaria ratione quædam dicuntur.

duo sequuntur: sæpe verò concupiscentiâ, tanquã abstracta, compulsaq; jugalium equorum instar, quorum alter valentius impellens, alterũ secũ trahit, unã cum auriga & curru. Tunc enim in ef freni equo motus, actio & affectus ejus dicitur: priori quidem significato, actio (motus enim ex seipso est) secundo autem, nõ actio, cũ sit motus ei præter naturam, sed jam affectus. Aurigæ verò motus, ne secundum alterum quidẽ signifi catum actio est, sed secundum utrunq; affectus: 10 cũ neq; ex seipso, neq; secundum naturã ei ad sit motus. Jam verò facultates illas tres corpus nostrũ regentes, rationalem, irascibilem, & appe titoriã, tum species, tum partes animæ rectẽ ali quis nominarit. Quarũ appetitoriã quidem, bel lûæ variæ, multiplicitiq; irascibilem autẽ, leoni: homini deniq; rationalem Plato interdum com parat. Quamvis idem in Phædro, priores quidẽ illas equinam quandam formã referre ait: auri gam verò, tertiam. Quamobrem Plato locis eas 20 esse distinctas, & substantiis permultũ variare ar bitratus, meritò illas tum species, tum partes ap pellat. Aristoteles autem & Posidonius, faculta tes eas esse unius substantiæ ex corde proficiscẽ tis, affirmant. At Chrysippus, tanquã ad unã substantiam, ita & ad unã facultatem ratiocina tricem diducit tum iracundiam, tum ipsam con cupiscentiã. Porro in stirpibus solam speciẽ appe titoriam habitare, professus est Plato: in diis au tem ratiocinatricem. Irascibile verò in homini bus creatam esse ait, rationali animæ auxiliatri cem, tanquã canem quendã, cõtra multipliciteẽ illam & agrestem ferã, cupiditatẽ. Plato item nos docuit, quòd quæcunq; fuerit species, hæc, pars nominari etiam possit: nõ tamen quælibet pars, statim species erit. Cũ igitur ex iis quæ superius à nobis sunt tradita, constet jam ratiocinatricem quidem animæ partem fontemq; voluntariarũ actionũ consistere in cerebro: in corde autẽ tum 30 irascibilem, tum pulsificam facultatem (etenim si fune interceptantur, aut dissecẽtur nervi, parti culæ quidem continuæ cerebro, principij sui re tinere facultates apparent: quæ verò infra funẽ habentur, statim & sensum perdunt, & motum: quemadmodum etiã arteriæ, quæ quidem cordi cõtinuæ sunt, originis suæ perpetuò functiones obeunt: quæ verò vinculo interveniente, illius cõmercio privantur, prorsus nõ pulsant. ac præ terea affectus animi qui ex iracundiã & motu ac cidunt, cor palam immutare à sua actione viden 50 tur) reliquũ est ut appetitoriã delitescere in he pate, similiter ostendamus. Quippe hoc viscere læso, etsi nõ subito afficiantur reliquæ partes, quẽ admodum per aliorũ læsiones, temporis tamen processu animal nutrimenti inopi elanguescit, atq; in pallidum colorẽ mutatur. Ejusmodi nãq; facultatis initium est jecur, qualis & stirpibus in est. Ad cujus demonstrationẽ, optimũ prius fue rit considerare, quo modo stirpes gignantur. Pro jecto in terram semine qualicunq; si squalida il 60 la fuerit, ac sicca, nihil amplius ad stirpis genera tionem ipsum semen molietur, cũ nimirũ om nem ejus madorem ad se ipsa terra alliciat. Ubi verò mediocriter humida est, molle redditur se men, intumescitq; juxta ambiens ipsum opercu

lum: quòd utiq; rumpitur quidem primũ, mado re seminis in aërem converso: deinde protendi tur juxta rupturam germen quoddam tenue, & utrobiqu; molle: ac superior seminis portio ceu ad aërem, inferior in terrã vergit. Atq; hæc qui dem continuò videntur augescere, ac semper fer ri in quæ ab initio inclinabant. Processu tempo ris, si arboris cujusdã magnæ sit semen, pars quæ in aërem fertur, caudex ipsius evadit: quæ in imũ terræ declinat, radix: & utraq; portio variis scis suris divaricatur, si multifidæ arboris ipsum se men extiterit. Unum itaq; principiu generatio nis & incrementi omnibus stirpis partibus est lo cus ille, unde sursum quidem caudex, initium ve rò radices nascitur: ac apparet veluti ex loco quo dam, virtus dispensans arborem, illinc procede re. Quale autẽ est animantibus os, tale stirpibus extremũ radicationis videtur, osculis pluribus ex terra alimentũ trahentibus, fabricatũ. In hũc igitur arboris modum licet magnã arteriam cer 20 nere, quæ caudicis instar ex corde procedens di varicatur, altera quidem parte minore ad caput perreptans, altera verò majore per spinã sese de torquens: à quibus propagines omniũ corporis arteriarũ oriuntur. Cõtẽplare rursus alterã ar teriam ex ipso cordis sinu profectam, quæ in pul mones, nõ secus ac radices pars in terram, diffun ditur. Quemadmodũ enim ex terra per radices totũ alimentũ trahit arbor, ita ex pulmone cor 30 per dictam arteriã haurit. Quare arteria quæ ve luti caudex apparet, maxima est omnium quæ in tota animali habentur: quæ in pulmone inferi tur, omniũ maxima est, quæ inibi existunt: ipsum verò cor, medium ambarũ est, & origo faculta tum eas gubernantiũ. Constat nanq; majora mi norum semper esse principia, sicuti & fontem, ri vorum in quos dispensatur: quamvis nõnulli eo veniunt absurditatis, ut principio ea quæ post i psum sunt, esse majora existimẽt, decepti ob flu mina, quæ exigua planẽ cũ prope fontes exi stant, progressu augentur. Non vident tamẽ id sic accidere, quòd in se alios decursus aquarũ exce perint. Quippe nullũ flumen ex uno procedens fonte, minus caput obtinet iis quæ subsequũtur. Esset autẽ summa impudentia, aliud viscus à cor de statuere arteriarum principiu, cũ hoc solũ viscus animalis corpore exemptũ, diutissimẽ na turalem functionẽ retineat, ceu initium motus tum sibi, tum iis quæ ab ipso proficiscuntur, arte riis. Hæ autẽ ab eo segregatæ, aut funibus inter ceptæ, aut divisæ sectionibus, unã cum affectu ipso, motum etiam amittant. Porro venæ quæ à jecore ad ventrem pertinent, similes sunt radici bus. Nam ut arboribus terra, sic est animantibus venter. Cæterũ vena cava truncus quidam exi stens, atq; à gibbis partibus hepatis orta, in supe riorem & inferiorẽ corporis regionem excurrit. Vena cava 40 Cujus latissima portio est, quæ infra jecur de scendit: minus autem lata, quæ sursum per septũ transversum adit: his verò duabus minor, quæ in cor inferitur: quanquam si esset cor venæ cavæ sicuti arteriæ magnæ, principiu, maxima esset (o pinor) portio venæ ei cõtinuã. Est itaq; tũ vena rum, tum sanguinis, tum nutriẽtis facultatis ini tiũ hepar, quod viscus in universas corporis par

Arteria ma gna ortus, di varicatioq;

Arteria ve nosa.

Cor haurire spiritum à pulmone per arteriam.

Maiora mi norum sem per esse prin cipia.

Venter ani malibus est, quod arbori bus terra.

Vena cava (qua ab he pate nasci tur) diviso, processusq; Hepar esse tum venarũ, tum sangui nis, tũ nutri entis facul tatis initium.

*Hepatis re-
crementa, ex
purgantia or-
gana.*

*Vis non eff-
dem uti na-
turam ad se-
mielabora-
tas materias
et ad omni-
no confectas.*

*Animalia
non respiran-
tia ex aere,
neq; pulmo-
nem habere,
neq; cordis
ventriculū
dextrum, qui
cum pulmo-
ne perit, et
generatur.
Vena cava di-
varicatio.
Venarū porta.
Venarū ra-
dicatio est
hepar
Cor est radi-
catio arteri-
arum.*

*Initium à
natura con-
stitutum, co-
git discipli-
nam à seipso
fieri.*

*Cordi inesse
quatuor tan-
tum ora va-
forum.*

res benignum alimentum distribuit. Quod autē sanguis perficiatur in hepate, argumēto sunt recrementorum purgatoria instrumenta, quæ natura illi fabricata est, renes videlicet, lien, ac receptrix bilis vesica. Nam quartū aliud alimenti excrementū, vel materiæ qualiscunq; à calore mutata, ne cogitare quidem licet. At in corde, neq; aliud quoddam purgans instrumentum natura fecit, neq; alium machinata est humorē. Similis namq; sanguis est, & qui in dextro cordis sinu, & qui in omnibus venis per totum animal cōtinetur: quemadmodū & qui in arteriis habetur, ei respōdet, qui in sinu sinistro existit. Maximam facit fidem, jecur nullū humorē præparare ipsi cordi, ad particularū nutritionē (quemadmodum nōnulli putabāt) sed ipsum universam ejus speciem absolvere,* quod cum una sit vena, quæ ex jecore in cor procedit, alia nulla feratur ex altera ipsius cordi parte, quæ elaboratum humorem in totum corpus deducat: etsi alia quidem arteria inferat, alia educat spiritū. Videtur quippe natura non eisdem uti vasis, & ad semielaboratas materias, & ad omnino confectas: imō ne eisdem quidem viis. Taceo complura animalia, dextro cordis sinu carere. Unde existimari nō potest, cavam venam ex hoc oriri ventriculo, cum in permultis animalium generibus, jecur quidem existat, & cava vena: sinus autem dexter nequaquam. Etenim quæ non respirant ex aere animalia, ea neque pulmonem habent, neque cordis ventriculū dextrum: qui sanè simul cum pulmone petit, & generatur. Igitur quemadmodū arteria magna ex corde, sic semper vena cava ex jecinoris gibbo oritur, vel si dexter cordis sinus non adsit. Quæ quidem ubi septum transversum subter cor penetraverit, in duos magnos ramos divaricatur. Quinetiam ex cavis hepatis, altera vena (quam portas, aut portis vicinam appellant) producta, in partes ventris varias demittit propagines. Quarum omnium cum nulla cordi cōtinua sit, meritō dictum est, venarū omnium esse radicationem hepar, arteriarū cor: sicuti & arboris, partem illam, quam occupavit semen projectum. At Pelops venarū principium cerebrum esse existimans, cōsectionem ipsarum à jecore est auspicatus: affirmans hoc viscus, ad disciplinā fieri initium sermoni: cum tamē initium à natura cōstitutum, etiam disciplinam cogat à seipso fieri. Quare inquirendum non est aliud rei naturæ principium, aliud ipsius disciplinæ. Jam verò, cum in corde reperiantur tantum quatuor ora vasorum: duo in sinistro ventriculo, quorum unum quidem ex pulmone spiritum introducit, alterum educit à corde in universas arterias: atq; in dextro similiter duo, quorum alterum sanguinem vehit in pulmones, alterum in dextrū sinum cordis introducit ab hepate: habeatq; hoc orificium quartum, tres quasdam in se membranas foris intrō vergentes, quæ ad orificium id concident, impedimento sunt, quō minus contracto corde, sanguis semel in cor ingressus, revertatur rursus ad venā cavam: nec reperiatur quintū aliud ab his orificium, quo sanguinem ex jecore ad ipsum cor perveniētē, in totū corpus transmittat: sanè liquidō cōstat, cor

neq; esse initium sanguinis totū corpus nutriendi opifex, neq; instrumentū ipsius. Quam verò necessaria sit animantiū vitæ, ipsa sanguificatio, hinc discas licet, quod cum possimus vivere, etiā si cibos venter non cōterat (interdum enim succos tantū, aut ipsum lac propinamus) necessariō moriendum sit nobis, sanguinis generatione pereunte. Quod autem ipsæ venæ non procedant à corde, vel in ipsa in utero fœtum conformatione, facile perspicere est. Omnes siquidē secundarum venarū, quæ utero conceptum annectunt, propagines sunt unius venæ maximæ, prodeuntis ab hepate. Siquidē ostensum est, maxima vasa vicinorum esse principia. Quarum venarū extrema, veluti radicata in utero, sanguinem ex eo ad jecur, tanquā totius stirpis principium, sursum videntur transmittere. Vena itaq; procedens ex jecore, venarū omnium quæ secundas perreptant, initium existit: sicuti & arteriarum, arteria quæ à corde trahit ortum. Etenim hæc quoq; omnibus quæ in secundis sunt, propriam facultatem supeditat, nō illæ huic. Quippe ex semine infantibus provenit initium facultatum eos gubernantium, nō ex utero. Porro si fune interceperis, aut tuismet digitis umbilici arterias compresseris: omnes quæ in secundis habentur, statim pulsu destitutas videbis: cujus contrarium cernerēs, si motus initium ipsis præstaret uterus. In quod igitur omnes desinunt secundarum venarū, inde necessariō procedunt. Atqui (ut manifestē ex cōsectionibus liquet) universæ in unam coeunt venam ex jecore enatam: sicuti & arteriæ omnes, in duas magnas degenerant, quæ cōscendentes veficam, atq; in decliven pergentes, in illas terminantur arterias, quæ à magna lumborum arteria ortæ, in crura fœtus feruntur. Quare multo magis hepar venarum principium dicendum est, quam cor arteriarum. Sed neq; illud te oportet lateat, quod omnino pulsarent venæ, si ex corde originem ducerent. Pulsat namq; totum ipsius cordis corpus, sublatum, contractumq; ex seipso: quæ quidem eandem vim à se ortis elargitur arteriis. Quod si cor operimētis nudaveris, dextri ipsius ventriculi pulsum evidenter contuebere. Nec te latebit etiam, ei vas insertū, quod cavæ venæ est propago, similiter arteriis pulsare: quavis etiam pulsatio minimē cōmunicetur cæteris quæ per universum corpus feruntur venis: ut motus arteriæ magnæ. At verò non quia implentur arteriæ, ob id dilatantur: sed quia dilatantur, implentur. Ut igitur denuō sermonem repetam, si requiris exordium primæ generationis venarū, id jecur est: si materiæ dispensationis, qua universum corpus nutritur, & virtutis, aliud nullū viscus reperiās, quod aptius initium censeatur. Ad hæc verò, si id quod mutatur, in similem speciem cū eo quod mutat, pervenit, jecoris ipsius carne nihil ad sanguinis generationem reperiri possit accommodatius. Nam sanguis si incrassatus fuerit, tum colore, tum cōsistentia, exacta jecoris caro efficietur. Ac proinde si humor qui ex ventriculo in jecur distribuitur, fieri sanguis debeat, necessum est ut ipsius à propria hepatis substantia fiat mutatio: quandoquidem ipsæ venarum tunicæ, ex sua ipsarum natura generare sanguinem nequeunt.

Non

*Cor neq; e-
initium op-
sex sangui-
nis, neq;
strumentū
ipsius.
Vere lie-
nobis, etia
si venter
bos non co-
terat: pere-
te autem
guificati-
non item.*

*Secundari-
tam arteri-
quæ venæ
a vena ca-
maxi-
arteria p-
duci.*

*Umbilici
teris vinn-
lo intercep-
omnes quæ
secundis
bentur, de-
tui pulsu
Vterum
præstare
tus initium
secundari-
arterijs.*

*Hepar cum
magis prin-
cipium venarū
dicendum
sit, quæ
cor arteri-
arum.*

*Cordis ven-
triculū d-
trum pul-
re, nec non
nam illi à
core infer-*

*Arteria n-
dilatantur
quia imple-
tur: sed ob
implentur
quia dilan-
tur.*

*Caro hep-
tis.*

*Sanguine
fieri à pro-
pria hepatis
carnis sub-
stantia.*

*Venarum
nitas ex
ipsarum na-
tura non
se sangui-*

gignere.

Non enim rubrum illum humorē, sed album & viscosum reddere idoneæ sunt, unde & generatio ipsis est, & incrementum, & nutritio. Porro ventriculus circa cibos sui tantū ipsius gratia cōtractus, peculiarem sibi ex ipsis humorem sugit: quo quidem ubi fuerit expletus, superfluum totum ad jejunum intestinum propellit. Inde rursus jecur trahit ipsum, atq; elaborat. Sicut autem ventris reliquū jecinori fit idoneū, ita hujus rursus ipsius superfluum, iis quæ post jecur habentur omnibus, cū neq; jecur ipsum, eorū causa alimentū permutet. Quemadmodū igitur jecur per venas ex ventriculo & intestinis alimentum attrahit, quod sibi ipsi, hoc est, suæ carni assimilatur, ita quæ post illud constitutæ sunt partes, per alias ad se venas alliciunt, deinde rursus aliæ, donec in omnem animantis particulam alimentum sit distributū: ac præparat semper præcoquitq; unaquæq; particula ei quæ sequitur, secundum distributionis continuitatem. Singulæ autem animalis instrumentariæ partes cū ex aliis simplicioribus cōstent, omnino peculiari quadā ejusmodi substantia sunt præditæ, quali nō aliud totius animantis corpus. Arteriæ verò, nervi, atq; venæ, instrumentis inferuntur cōmunis usus gratia: quorum actio neutiquā ex corporis loco immutatur, sed ubicunq; sint, semper illū usum cōmunem præstant. Quin etiam proprium cuiusq; corporis, sine his ipsis existit: ac proinde actionem propriā, eximieq; diversam ab aliis, singula possident, propter proprietatem substantiæ. Nihil ita mirum est, jecoris proprium corpus secundum ipsius naturam esse gignēdo sanguini aptissimum, ut quod ruberrimū sit, tanquā sanguis, & solum hoc, quod coagulatum sit, ab eo differens. Grumi siquidem coagulatio, ab ambiente fit, extinguente quidem calorē ipsius: denigrante autem substantiā, propter refrigerationē. At nō ita etiam in hepate accidit, sed ab insita caliditate, quæ exoritur id magis, quā corrumpat. Alteratur enim utroq; modo sanguis, sive grumus evaserit, sive jecoris caro. Verum alteratio in grumum, via ad corruptionē est: in jecoris autem substantiam, actio naturæ. Cor etiam rubei coloris est particeps, at nō tantū jecur: quippe hoc viscus, corde est humidius, eoque rubrius, molliusq;: cor autē sicci⁹, calidiusq; jecore existit. Ita enim futurū est simul durius, & duplici motu, arteriis similiter, agitabitur: ut ejusmodi agitatione, conservetur calor natiui symmetria. Igitur sanguinis humidi & rubei, prima in jecore generatio consistit. Rivi autē venæ eam in totum corpus distribuunt. At sanguinis flavi, tenuis, subtilis, spirituosus, calidissimiq;, & qui rapidē per omnia membra fertur, ut inquit Plato, prima in sinistro cordis sinu est origo: ideoq; irascibilis anima ibidem habitare ostenditur. Sanguinem autē hunc arteriæ in universum corpus dispensant: quas vetustissimi medicorū similiter appellarūt venas: etsi ab aliis, quod quidem vas pulsatur, arteria: quod autē pulsus est expers, vena cōmuniter appellatur. Porro cū motus arteriæ quæ cubitum, ac præsertim sinistrum, excurrit, ex generatione est citatus, & magnus, validusq; robustam in corde vim irascibilem innuit: calo-

rem verò in eo vigentem, & fervidum, quem nominare furiosum iracundumq; mos est. Eam autem arteriam appellās venam Hippocrates, ait: Cui celeriter vena in cubito pulsatur, is furiosus & iracundus erit: cui autē lentē, torpidus. Quod autem in jecore collocarit Plato eam animæ partem, quæ esculenta potulentaq; expetit, illic maxime significare videtur, ubi ait: Verum eam animi partem, quæ cibum potumq;, & reliqua omnino quibus corpus indiget concupiscit, media regione inter septum transversum, & umbilici terminum collocarunt: quoddā quasi præsepe ad totius corporis alimoniam fabricati, ac ibidem illam animi vim, ceu feram agrestem illigarunt: quā sanē corpus suum alere necessariū est, si mortalium genus aliquandiu sit mansurum. Et paulo post: Quod, inquit, Deus perpendens, hanc ipsius jecoris speciem constituit, &c. Nihil autem refert, venarū principium dicas jecur, aut sanguinis, aut appetitoria animæ: familiarius tamen est medico, de corporis instrumentis: philosopho, de animæ facultatibus disciplinam instituere: id quod facit Hippocrates, dicens: Venarum radicatio, jecur, arteriarum cor est. Etenim de corde Plato sic disserit: Cor, & venarum, & sanguinis, qui per omnes partes vehementer circumfertur, fontem, in domiciliū mutatum constituerūt: ut cū iracundiā vehementia ferveret, ratione hortate, si quid iniquē in eis fiat extrinsecus, vel etiam ab internis cupiditatibus, statim per omnes angustos meatus, quicquid sensus est particeps in corpore, iussa minasq; sentiens, fiat morigerū, & undequaq; obsequatur, præstantissimumq; in ipsis omnib. principatum gerere sinat. At Hippocrates, dum pravo colori corporis, gracilitatiq; in habitu perfri gerato medetur, iracundiam dicit studiosē excitandam esse, tum coloris recipiendi gratia, tum effusionis humorū. Iracundiam porro esse, definiūt philosophi, caloris effervescentiā in corde. Quod autē vel testimonio Homeri possimus cōfirmare appetitoriam vim in hepate delitescere, facile cognoscent ij, qui apud illum Tityi fabulā legent: cui nimirum finxit à vulturibus hepar exedi, quod Latonam cōpellasset stupri. Quemadmodum nunc factitare solent, qui peccantes famulos puniūt: eorū sanē qui fugitivi sunt, crura exurentes, sacrificantes, atq; ferientes: eorum qui sunt in furto deprehensi, manus: gulozorū, ventrem: garrientium, linguam: summam vero eas plectentes particulas, quibus illi pravas obeunt actiones.

GAL. DE PLAC. HIPPOCR. ET PLAT. LIB. VII.

Quemadmodum autem affectus ab ipsa tolluntur anima, si sit sola ratiocinatrix facultas, nulla neq; appetitoria, neq; irascibili, præter eā, existente: sic & virtutes omnes præter prudentiā, exterminantur. Quia verò (ut prius est demonstratū) alia vis ratiocinatrix, alia irascibilis, alia deniq; appetitoria existit, unaquædam in singulis earum existit virtus: quant-

*Vñ esse quod
præstantissi-
mum est.*

*Ratiocinatri-
cis anima vir-
tus, prudentia-*

*Irascibilis a-
nima virtus,
virilitas.*

*Appetitoria
anima vir-
tus, est tem-
perantia.*

*Iustitia nas-
citur ex sym-
metria mu-
tuarum ani-
mae particu-
larum.*

*Habitus qua-
virtutes di-
cantur.*

*Scientia com-
pos dicitur so-
lar ratiocina-
trix pars ani-
mae.*

*Platonis de
virtute sen-
tentia.*

*Philosophia
reddat a pec-
catis immu-
nes.*

*Principia
tria dispen-
santia ani-
mal.*

*Rationalis
principij ope-
ra.*

*Irascibilis
principij ope-
ra.*

*Appetitorij
principij ope-
ra.*

*Nervos non
a dura me-
ninge cerebri,
sed a medul-
la illius exo-
riri.*

*Cerebro exci-
so, animans
non privari
motu, nec sen-
su, priusquàm
ab aliquem
ventriculorū
esset sectio per
generis.*

doquidem quod præstantissimum est in singulis, unum tantum existit: sicuti & perfectio una quam virtutem vocamus. Eam igitur quæ in ratiocinatrice est, sapientiam, aut prudentiam, aut scientiam appellare licebit: eam quæ in irascibili rursus habetur, fortitudinem, aut virilitatem: sic uti & eam quæ in appetitoria oritur, appellare poteris temperantiam. Ex quarum quidem animarum trium particularum mutua comoderatione, ac venustate decente, quarta virtus iustitia nascitur: ac proinde merito totam animam dixeris iustam. Cæterum virtutes ipsæ in partibus animæ irrationabilibus, habitus quidam sunt, & facultates solummodo. In rationali autem, non habitus modo, sed etiâ scientia, aut virtus. Sola enim hæc animæ pars, scientiæ compos est: aliæ autem, facultates sanè quasdam, habitusve, aut meliores, aut peiores comparare possunt: scientia autem fieri participes, non item, quatenus neque etiâ rationis. At Plato scientias omnes rectè, mea quidem sententia, unam esse virtutem ait, cognitionem videlicet bonorum atque malorum: hoc est, eligibilem, & eorum quæ declinari debet. Cum autem in omnibus vitæ actionibus, deligamus id quod videtur bonum: quod autem apparet malum, vitemus: habeamusque natura impetus hos ad horum utrumque: philosophia, quæ verè bonum malumque docet, a peccatis immunes reddit. Ostendimus igitur dispensationem animalis in lucem æditi, a tribus administrari principiis: uno in capite collocato, cuius opera per se quidem, imaginatio, memoria, intellectio, cogitatioque: in relatione autem ad aliud, sensum partibus animalis sensibilibus impartiri, motumque arbitrarium iis quæ moventur: secundo autem in corde consistente, cuius opera per se quidem, robur est animi, firmitudoque in iis, quæcunque ipsa ratio iusserit: atque etiam invictus animus: secundum affectum autem, veluti fervor nativi caloris, anima tunc eum qui injuriâ inferre est visus, punire desiderante: at relatione ad aliud, initium esse particularis caloris, singulis corporis partibus: sicuti pulsatis motus, arteriis. Tertiæ ultimæque virtutis in hepate collocatæ opera sunt, quæ ad animalis nutritionem spectant omnia: necnon suavium fructio: per quam vehementius, quam par sit mota, intemperantiam atque libidinem gignit. Demonstrato autem quod nervorum principium in capite delitescat, simul etiam cognoscitur nervos ipsos non a cerebri dura meninge, quemadmodum aliquando opinatus est Erasistratus, sed ab ejus medulla oriri: etsi primò quidem, tenuis membranae processu, secundo autem crassioris, sint involuti. Porro exciso capitis osse, vivente adhuc animali, & crassiori detecta membrana, si utrobique medio rectitudinis, quæ cerebro hæc plexu duplici incumbit, per hamulos elevatam, aut solam ipsam incideris, aut totam excideris, neque insensibile, neque immobile ipsum evadet animal: quemadmodum nec si obregentem ipsius partem totum posterius cerebrum, aut solam incideris, aut excideris: imò verò ne si cerebrum ab ipsis quomodocunque excindas, sic quoque animas motus aut sensus expers reddetur, prius quam ad aliquem ventriculorum ipsius, talis sectio per-

veniat. Maximè autem ventriculus posterior offendit animal: deinde medius: minorem verò anteriorum uterque noxam adfert. Cum igitur conjunctis ventriculis cerebri (divisio quorum abstulerat motum & sensum) paulò post rursus sentiat ac moveatur animal, dicendum est in ipsius quidem cerebri corpore animam habitare: primum autem ejus organum, tum ad universos animalis sensus, tum ad motus voluntarios, esse animale spiritum: qui quidè si animæ substantia esset (quod aliquis posset existimare) simul cum eo, dum evacuatur, periret anima: cuius contrarium contingit. Nam evacuatus, donec recolligatur, sensu, motuque, non vita destituit animal. Merito igitur generatur hic spiritus* juxta ventriculos cerebri, atque ideo illinc definit arteriarum venarumque non exigua copia, ex qua sunt plexus choroides formati. Nam ex arteriis conscendentibus caput, ac postea sese ad cerebri basim torrentibus, conficitur plexus reticularis, in quo elaboratur ipse animalis spiritus. Etenim arteriarum spiritus, vitalis & est, & dicitur: * sicuti & animalis, qui consistit in cerebro: non tanquam animæ substantia is sit, sed veluti primum ipsius organum, habitantis in cerebro, qualiscunque illa substantia existat. Quemadmodum autem vitalis spiritus in arteriis & corde gignitur, ex inspiratione & humorum vapore, ita animalis ex vitali accuratius elaborato ducit originem: ad quam quidem elaborationem retiformis ille plexus fuit fabricatus. Nam si exactè semen ipsum & lac natura elaborare desideras, fecit ut diutius ea in coctionis instrumentis immorarentur: ac propterea semini quidè, anfractum quendam ante testiculos præparavit, lacti verò longitudinem vasorum ad mammas tendentium: merito etiam ad conficiendum animale spiritum ex vitali, veluti labyrinthum varium, prædictum illum plexum construxit. At verò cum nervi ipsi ex cerebro & membranis id ambientibus contrahantur, per eam ipsorum partem quæ ex cerebro oritur, sensus omnibus membris atque motus suppeditatur. Quæ autem utriusque membranae propago est, eundem nervis usum præbet, quem cerebro illæ exhibebat. Quare vel si ambas eximeris, nihil lædatur particula, in quam nervus inferebatur: quemadmodum neque si ipsi cerebro exteriores membranas abstuleris, in præsentem quicquam offendas, etsi processu temporis aliquid sequi possit incommodi. Quod autem ad facultatem, quæ a cerebro descendit, spectat, non licet nobis promptè affirmare, an quemadmodum ex solari splendore qualitas quædam profecta, in omnem aeris ambientis partem disseminatur, ipsa Solis substantia in loco suo permanente: sic etiam ex cerebro virtus quædam membris per nervos influat: an potius substantia spiritus usque ad sensibiles mobilesque particulas proficiscatur: aut aliqua ex parte in nervos incidens, ita ipsos immutet, ut alteratio eorum in mobilia membra distribuitur: cuiusmodi quippiâ fieri in sensu visorio contingit. Siquidem per opticos nervos, qui ab anterioribus ventriculis cerebri (qua parte versus medium ventriculum in obliquum & angustum se contrahunt) oriuntur, & manifestè cōcavi sunt, splen-

*Cerebri
triculi qu-
tuor.*

*Animam
bitare in
cerebri co-
re, primū
sem illius
strumenti
esse anim-
spiritum.
Animalis
spiritus
est substan-
anima.*

*Choroidi-
plexus
Ratiformis
plexus.
Spiritus
vitalis.
Spiritus
malis.*

*Semini
lactis elab-
ratio.*

*Sensus totus
membra
qua via
peditetur.*

*Cerebro
dato, a me-
branis, an
mal nihil
fendi.*

*Facultas
rebro descen-
dens per
Sensu, sit ne-
porea, imo
porea,
Galenus ad
bigis.*

*Opticorū
corum ex-
tmo.*

splēdidus spiritus ad oculos fertur: id quod ipsa
structura docet: & præterea quod uno quidē o-
culo clauso, dilatescat alterius pupilla: aperto au-
tē statim rursus in naturalem magnitudinē re-
deat. Cæterum quod inanitionis repletionisque
celeritas, non humoris cuiusdā influentis, sed so-
lius spiritualis substantiæ sit opus, haud negocio-
sum est cōtueri. Quoniā verò in idē utriq; mea-
tus perveniūt, verisimile est cōmunem regionē
ex utrisq; meatibus spiritū recipientem, dum al-
ter oculus clauditur, alteri totū ipsum trāsmitte-
re. Quare si iis qui suffusione laborant, dilatetur
pupillæ foramē, clauso altero oculo, incolumis
vis visoria servatur: sin aut hoc eis non eveniat,
perierit omnino: ac proinde licet probè suffusio
curata sit, ipsi non cernent. Aliis verò quibusdā
accidit, ut non videant, vel citra suffusionem, ob-
visioriorū obstructionem meatuum. Verū enim-
verò minimè quidem arbitror nervis omnibus
inesse meatus, sed iis tantum qui corpulentio-
res existunt: quemadmodū est processus ille spi-
nalis medullæ, cui porus ita sensibilis inest ut viso-
riis nervis, ad vehementiorem virtutis distribu-
tionem. At verò quod ab omnibus vocatur di-
stributio virtutis, alterationis quādā est impar-
titio: qualis etiam in aëre à solari splendore acci-
dit. Sic utiq; consentaneum est, etiam spiritū qui
in oculos proficiscitur, primo illapsu uniri cum
aëre ambiente, & simul ipsum in suam ipsius na-
turam alterare, nō tamen extendi plurimū. *
Corpus siquidem quod videtur, aut mittens de
se aliquid ad nos, cum illo etiam propriam indi-
cat dignotionem: aut si ipsum nihil mittit, expe-
ctat aliquā à nobis ab se venire facultatem sensi-
ficam. Utrū igitur ipsorū sit nervis, hoc judicabi-
tur modo. Per pupillæ foramen fit visio, quod
quidem si expectaret portionem aliquam, aut fa-
cultatem, aut imaginem, aut qualitatem corporū
extrinsecus subsectorū, ad se proficisci, nūquam
ejus quod videtur, magnitudinem cognoscere-
mus: ut montis, exempli gratia, maximi: alioqui
tanta imago ejus oculis nostris incideret, * quan-
tus est ipse mons: quod omnino ratione caret:
quemadmodum & si quis dicat, eam una tempo-
ris occasione, ad singulos videntes, etiam si fue-
rint mille, permeare posse: cū visorius etiam
spiritus nequeat fluore suo tantū extendi, ut to-
to corpori quod videtur, circumfundatur. Re-
linquitur itaq; adhuc, aërem ambientem tale no-
bis instrumentū fieri, quo tēpore videmus, qua-
le in corpore nervus perpetuò existit. Ejusmodi
autem quippiam accidere videtur ambienti nos
aëri, ab excidente spiritu, cuiusmodi etiam ab
splendore solis. Ille siquidem supernū aëris extre-
mū attingens, in totum virtutem cōmunicat.
Visus autem per nervos visorios exiliens, cū
substantiā habeat spiritalem, ubi in ambientē in-
cidit, primo incurſu alterationem efficiens, * ac
se quam longissimè extendens, illuminat quod
illi continuū est, nempe quod ambit corpus, sic
ut in momento temporis alterationē in totū ip-
sum transmittat. Apparet autē similis quidā affe-
ctus utrique accidere, & nervo, & ambienti aëri
Nam quemadmodū si interponatur aliquod so-
lidum corpus in medio subsequētis aëris: statim

videmus ejus splendorē perire, ceu qui dum im-
mutatur evadat lucidus, nō autē quod permuta-
tus fuerit (sic enim lumen perpetuò servaret, vel
si ablatū id quod illuminat esset) ita & nervo se-
cto, quantū sectio à cōtinuitate cerebri separave-
rit, tantū is insensibilis statim reddetur. Sed in ar-
teriis etiam eadem natura, quæ in nervis, cerni-
tur. Dissectæ siquidē, interceptæve funiculo, non
pulsant, destitutæ, non ut Erasistratus putat, eo
quod à corde mittitur, sed facultate illa quā tu-
nicæ ipsarū, corpori cordis cōtinuæ, influentē ab
eo semper obtinent. Cōmune igitur omnium est
sensus facultatū, quæ à cerebro originem ducūt,
per nervos usq; ad propria instrumenta deferri.
Item quod nervus substantia cerebro est similis,
nisi quod quantū, ne esset ad patiendū facilior,
statim condensatus est, tantū à cerebri natura re-
cessit. Quantū igitur singuli nervi propriè dicti
sensorij, à cerebri natura recedunt, tantū etiā ab
ipsius facultate. Vocantur autē propriè sensorij
nervi, qui instrumentis immittuntur sensorijs, mol-
liores aliis, qui particulas movent: idq; meritò.
Sensus quippe non fit, absq; hoc quod quoquo
modo afficiantur nervi: motus autē, in agendo
solum actionē obtinet: ac proinde nō ab re sen-
sorius mollior, durior autē motorius nervus est
factus. At motori omnes, sunt sensus tactus par-
ticipes, quoniā hujus sensibile crassiorū est par-
tiū. Porro visorius nervus, omnium nervorū ma-
ximus, inter cerebrū & oculū totus medius cōsi-
stit: interiorē quidem sui partē, molliorē habēs,
externā verò duriorē, ut & facile per ipsum mul-
ta ex cerebro spiritualis substantia in oculi regio-
nem perveniat, & etiam agrè afficiatur. Quanto
aut oculi primū sensibile exactius est, & tenuius,
quàm sensoriorū aliorū, tantò etiam oculus ma-
gis quàm illa, cerebri naturæ est particeps. Qua-
re cum sub tunicis oculorū duo cōtineantur hu-
mores orbiculares, unus qui vitrum, alter qui re-
fert crystallum, ubi primū visificus nervus exte-
riorem oculi tunicam permeat, spiritus quidem
per ejus porum illapsus, humoribus illis misce-
tur, ut substantia eorū fiat tota sensibilis: ipsius
autem nervi substantia soluta, dilatataq; am-
plectitur vitreum humorem, in maximum crys-
talloidis circulum desinens. At plexus quē efficiūt
fibræ ipsius nervi optici dilatati, vocatur tunica
amphiblestroides, ac si dicas reticularis: quam si
velis rursus in unū cogere, coacervareq; cerebrū
tibi esse apparebit. Ac meritò sanè si constructus
is nervus fuit, instrumento usus aëre circum-
fluo. Tale autē instrumentū nervo fit aër, ad pro-
priam sensibilibum explorationem, quale existit
ipsi cerebro nervus. Proinde quam cerebrum ra-
tionem habet ad nervum, talem habet ad aërem
oculus. At propriū visus sensibile (quod primū
antea appellavi) colorum est genus. Illud siqui-
dem primū, & per se, & solus inter alios sentit,
quēadmodū gustus * sapor: quanquā & co-
loratū corpus simul cum eo cognoscit, perinde
ut gustus * id quod sapor edit. Cæterū ut gu-
stus atq; alij sensus fiant, opus est ut ad animatis
corpus ipsum perveniat sensibile. Visus autē per
mediū aërem ad coloratū extēditur, unde ipse so-
lus unā cū colore illius quod videtur, cognoscit

Nervus quā-
do reddatur
insensibilis.

Arteria quā
do non pul-
sent.

Arteriarum
tunicis influ-
ere pulsificā
vim à corde.

Animales fa-
cultates de-
scendere per
nervos à cere-
bro, usq; ad

propria in-
strumenta.

Nervi senso-
rij sunt mol-
liores ijs, qui
mōvent par-
ticulas.

Sensum abs-
que nervi af-
fectu non fia-
ri.

Motus in a-
ctione consi-
stet.

Nervi moto-
res omnes sen-
su tactus suis
præditi.

Optici nervi
sunt, & con-
sistentia, &
constructio.

Oculi fabri-
ca.

Vitreus hu-
mor.

CrySTALLINUS
humor.

Amphible-
stroides tuni-
ca.

Colorum ge-
nus esse pro-
prium visus
sensibile.

Gustus sapo-
res percipit.

Visus qua
percipiat.

& magnitudinem, & figuram, & situm, & intervallum, id quod sensibus aliis non licet, nisi per accidens nonnunquam tactui. Si igitur visus solus percipit sensibile quod ipsum movet per medium aërem, non ceu per baculum quendam, sed particulam cōsimile specie, & cognatā ipsi, ac soli hoc illi eximium est datum, simul quod per reflexū videt, merito opus habuit spiritu desuper influente pellucido, qui ambienti aëri incidens (qualis est Platonis, Empedoclisque sententia) & veluti converberans ipsum, sibi illum assimilaret. Visus igitur necessario diceretur esse instrumentū pellucidū, splendidumque; auditus, aëreum: olfactus, vaporosum: gustus, liquidum: tactus denique, terreum. Neque enim aliter consistere possent, ut quæ ex similibus alterationē requirant. Sed enim instrumentū olfactus, minimè in nariū meatibus, sed in extremitatibus anteriorū cerebri vetriculorum consistit: in quas utique nariū meatus perveniunt. Ceterū cōmunis quædam facultas (de qua etiā differuit Plato) ex cerebro per nervos in singula sensoria perveniens, alterationes quæ in ipsis sunt, persentiscit. Porro quemadmodum tactilis sensus instrumenta per renixum, sic gustatorij per humiditatem & succos in sensus cognitionem perveniunt. Unde si inarefacta vehementer sit lingua, corrumpitur ipsa saporū dignotio. At obstructis narium meatibus, odorū sensus labefactatur: non secus quam auditorius, si aures obstructæ fuerint. Eiusmodi obstructionibus respondet oculorū suffusio, in qua sic obstruitur solaris luminis meatus, qui in tunica rhagoide habetur, ut propriū visus instrumentum non amplius cum aëre, qui totum extrinsecus oculū ambit, jungatur. At sensus ipse neutiquam est alteratio, sed alterationis dignotio. Quare dispositio in qua corpora excedentia naturæ modum cōsistunt, & sensus ipsius, invicem differunt. Quippe id genus dispositiones labores vocans Hippocrates, ait: Qui laborantes aliqua parte corporis, plerumque laborē non sentiunt, iis mens ægrotat. Patiuntur porro singula exiguas mutationes ex finitimis genere. Idcirco visus instrumentū, quoniam niam coloribus discernendis idoneū ipsum esse expediebat, splendidum creatū est, quod sola huiusmodi corpora à coloribus alterari soleant: quem admodū iudicat etiam aër ambiens, qui cum maxime purus est, tunc à coloribus alteratur. Ut enim à Solis splendore solum contractus aër, totus ei cōfertim assimilatur, sic protinus à colore mutatur. Nervus itaque cerebri pars existit, veluti germē arboris. * Pars autem in quam inseritur, virtutem ipsius totā in sese excipiens, omnino redditur habilis, ut discernat ea quæ seipsam cōtingunt. Persimile quid etiam in aëre nobis circumfluo accidit. Nam illuminatus à sole, tale jam est nobis visus instrumentū, quale ex cerebro proficiscens spiritus. At si de animæ substantia aliquid pronunciare oporteat, alterutrū necessario dicemus: aut hanc esse veluti lucidū æthereūque corpus: aut prorsus incorpoream substantiā, cuius primū vehiculum hoc ipsum corpus lucidū sit, per totū cerebrū means, & cōtinuitate quadam spiritū visificum, etiam splendidum reddens: in tercessu cuius, cum reliquis corporibus commu-

nionem ipsa anima habet. Alteratur itaque sensus instrumentum: dignotio autem ipsius alterationis, fit ex una facultate omnibus sensoriis cōmuni, quæ à principio influit. Ceterum initium ipsorum, sive cōmunem sensum, sive princeps sensorium nuncupare voles, nihil intererit. Atque hoc prior disputatio iudicavit esse cerebrum, à quo omnes particulæ sensum & motū obtinent, descendentes aliis nervis in sensuum instrumenta, ut sensilia dignoscantur: aliis moventibus ea quæ moveri desiderant. Etenim à cerebro originatur & ipsa spinalis medulla, à qua nervi sexaginta procedunt. Quæ sanè ut cerebrum, duas etiam sortitur membranas: quas si quando juxta singulos nervos ademeris, nulla pars offendetur, in quā nervus demissus fuerit, cum videlicet membranæ ipsæ, tegmina tantum sint & cerebri & spinalis medullæ: sensus autem & motus vis, in medulla, quam comprehendunt, existat. Quod si nervi partem medullarem secueris, statim membrum in quod nervus deferebatur, sensus motusque omnino expers reddetur. Quod autem spinalis medulla à cerebro suscipiat facultatum originem, hinc licet perpendere, quod secta ipsa quacunque in parte, quæ regio supra sectionem habetur, cōservetur incolumis: iis quæ infra eam sunt, destitutis motu simul & sensu.

GALENI PERGAMENI
de Hippocratis & Platonis placitis, lib. VIII.

Diximus igitur animæ principatū id esse, quod sensui ac voluntario præest motui. Voluntario enim dico, nam cordis & arteriarum motus, non pro arbitrio nostro perficitur: sicuti nec tertium motionis genus, quod circa alimentum dispensationem versatur. Jam verò, ubi principium nervorum est, ibi animæ principatus existit. Atqui principium nervorum in cerebro est: illic igitur animæ principatus est nobis statuendus. Omnes porro animantium particulæ, nervorum compotes sunt: hæc manifestò ex cerebro descendunt in ipsas, illæ per mediam spinæ medullam. At jecur virtutis vegetatricis, quemadmodum & venarum, origo existit: nec reperitur alia in animante particula, cui omnes venæ cognatæ sint. Si enim vena cava oriretur ex dextro cordis ventriculo, quod nonnulli existimant, omnino hæc, ut arteria, bifariam scissa, altera parte sui ad jugulum, altera ad jecur ferretur. Quod quum non appareat, clarum est, neque ex corde ipsam originem ducere. Quod autem cor tum arteriarū, tum irascibilis animæ principium existat, abundè à nobis est demonstratum. Deinceps verò de naturalibus elementis, secundum Hippocratis & Platonis doctrinā, similiter differamus. Elementum est minima illius quod constituit portio. Quare ex iis quæ ad aliquid sunt, vox hæc elementum dicitur: quem admodum etiam pars. Ut igitur sermonis nostri quatuor & viginti sunt elementa, eodem modo omnium generabilium & corruptibilium corporum, terra, aër, aqua, & ignis, minimæ particulæ existunt. At minimum dicitur, quod neutiquam sectionem

Platonis de
Sensione sententia.

Sensoriorum
instrumentorum
singula,
qualia esse dicantur.

Olfactorij
instrumenti
sedes.

Tactus & gustus,
quibus
intercedenti
bus fiant.

Suffusioni
qua accidat.

Sensus est non
alteratio, sed
alterationis
dignotio.

Hippocrates.
Mens quibus
ægrotet.

Partes modice
singula, à finitimis
genere.

Visus instrumentum
cur
splendidum
aër purus à
colore mutatur.

Aër quale visus
instrumentum
sit nobis.
Anima substantia
quæ
sit.

Sensus instrumentum
terari dicitur.

Sensoriorum
initium
cōmune
sensus.

Cerebrum
se princeps
sensorium
Nervos sexaginta
originem
spinalis
medulla.

Spinalis
medulla
membrana.

Spinalis
medulla
se
quid acci-

Anima
principatus
quod
Cordis &
arteriarum
motus
voluntarium
esse.

Anima
principatus
in
cerebro.
Partes omnium
corporis
nervorum
compotes.
Jecur esse
virtutis vegetatricis,
&
venarum
originem.

Cor esse
arteriarum
principium,
&
irascibilis
animæ
faciem
tis.

Elementum
est minima
illius, quod
constituit
partem.

Elementa
minima
generabilium
&
corruptibilium
corporum
qua.

Minimum
quid dicatur.

sectionem admittit. Quum autem nullum corpus tam parvum sit, quod secundum magnitudinem per sectionem reddi minus non possit, certe quæ in diversam aliam speciem amplius dividi nequeunt, ea corpora & minima, & insectilia & elementa vocamus. Etenim pro cōfesso habetur, in unoquoque rerū genere reperiri individuum quandam speciem talem, qualis est in naturalibus corporibus terra, aqua, aer, & ignis. Hæc enim elementa naturalium rerum, Hippocratem sequutus, Plato in Timæo statuens, sic differit: Quum enim ex terra, igni, aqua, & aëre compactum sit corpus, horum præter naturam excessus, defectusque, & ex loco proprio in alienum translatio, seditiones ac morbos procreant. Quæ quidem elementa postea in materiam atque figuram dividit. Quod igitur excessus defectusque bonam temperiem corrumpat, in qua consistit primorum corporum sanitas, omnibus est perspicuum: item & quod translatio: si consideremus, quomodo simulatque thoracis & asperæ arteriæ instrumentis sanguis, aut alius quidam humor concidit, inculcata ipsorum sanitas aboletur. Cur autem humectet aqua, urat ignis, ac reliqua etiam nuda suas vires sortiantur, inquirere (quod anxie indagavit Plato) ad morborum curationes nihil conducit. Sufficit siquidem sanitatem cōservaturo, curaturoque morbos, scire, propter bonam temperiem calidi, frigidi, humidi, & sicci sanitatē adesse animantibus: ob malas aut horum intemperantias procreari morbos. Ex elementis itaque mutuò inter se atque sæpius mutatis, tum Plato, tum Hippocrates ajunt, nostra cōstari corpora. Etenim ex quatuor elementis & stirpium generatio est, & ex ipsis tum fructus, tum semina. Alimentum verò hæc omnia, ovibus, suis, capris, bubus, aliisque animantibus quæ herbas, aut arborum fructus, aut furculos, aut radices comedunt: hominibus hæc eadem animalia alimento sunt: atque hinc ipsis generatur sanguis, pituita, & bilis utraq;. Est autem sanguis ceu generationis nostræ materia, ex quatuor humoribus cōstans: ex quo quidem in utero primam conformationē accipimus, ac postea particulis efformatis, artuum confirmationē, incrementū, & absolutionem, æditi in lucem recipimus: ac primū sanè ex lacte nutrimur, à sanguine qui in venis est generationem ducente: deinde solidioribus alimentis, unde rursus sanguis, pituita, bilis flava & atra proveniunt. Quæ omnia Hippocrates primus omnium definiens, morbos primorum corporum ex intemperie fieri dicebat. Porro prima corpora appello similes particulas, quæ in diversi generis alias minimè dividuntur, & ex quibus instrumentaria cōstant. Prima itaque generatio nostri, ex sanguine, qui ex alimento quod intra corpus assumitur fit, est, & ex semine. Ex his primariæ particulæ generantur, cartilago, os, nervus, membrana, ligamentū, aliaque ejusmodi. Ex his rursus instrumentaria, oculus, lingua, caput, viscera, & artus: ex quibus tandē universum corpus conflatur. Sunt autem elementa in corporibus, non actu, sed facultate: hoc est, quatuor nobis humores insunt, ex illis alimentorum intervntu, procreati: sanguis videlicet, pituita, bilisque

tum flava, tum atra. Igni siquidem flava bilis respondet: atra, terræ: pituita, aquæ. Ideoque calida & sicca ipsa flava bilis existit, quæ admodum ignis: atra, frigida & sicca, cōsimiliter terræ: pituita vero frigida & humida, quemadmodum aqua. At solum aëreū elementū in animantium corporibus, propinquum suæ ipsius naturæ videtur, & in respirationibus & in pulsibus. Moderata ex omnibus quatuor elementis temperies, exactum produxit sanguinem. Sanum igitur maximè est corpus (ut Hippocrates nobis est autor) cum mediocriter & virtute & copia hæc inter se habuerint. Dolet autem, cum aliquid horum minus aut majus fuerit, aut dum ab aliis semotum, in alienam sedē trāscurrit. Etenim hi quatuor humores, ad quamcunque particulam transfluant, in ea morbos efficiunt: erysipelata & herpetas, flava bilis: cancri, atra: oedemata, pituita. At sanguis cum in pulmone, & spacio inter pulmonē & costas medio, ex propriis instrumentis effusus confluerit, putrescens tempore, tabē efficit. In ventre etiam, & per magna vulnera in grumū coalescens extrema pericula inducit. Terrā verò nullibi per se videre est solam in corpore coacervatam, quemadmodum neque ignem etiā per se solū, neque aquam elementū. Porro Hippocrates multo accuratius quam Plato, demonstravit quatuor esse in corpore humores, & lege & natura distinctos: videlicet sanguinē, pituitam, bilem flavam, & atram: illorum simul opinionem convellens, qui unum tantū humorem elementum homini, constituebant. Cum igitur astruxisset quatuor humores inesse nobis secundum naturam, eosque ut quantitate excedentes, sic qualitate alteratos, morborum autores fieri: postea ostendit, hyeme quidem redundare pituitam, vere sanguinem, æstate flavam bilem, autumno denique nigram. Cæterū de anni temporibus differens, virtutē etiam, de ætatibus, regionibusque differuit: cum nimirum alias semper jubeat cum anni tempore, regionē & ætatem considerari. Ex regionibus, temperata quidē veri respondet: calida ætati: inæqualis calore & frigiditate, sed frigore & siccitate redundans, autumno: humida denique & frigida, hyemi. Hæc itaque, ubi docuit Hippocrates, & præterea quod contraria contrariorum remedia existunt, artis methodi elementa tradidit. Postea verò, traditis ijs quæ ad aphorismos pertinent, de exuperantibus in unoquoque anni tempore ab ætate, morbis, veluti syllabas his adjunxit. At verò Plato, aëris quidem excessus, quotidianas: aquæ autē exuberantiæ, febres tertianas tribuens, hallucinatus est. Primū quidem, quod in cōmunia omnium corporū, nō in sanguine eorum animantium elementa, febrium circuitu remanentium, causam retulit: deinde, quoniam ad veram earum febrium causam, ne propè quidem accessit. Apparet enim evidenter, in quotidianis pituitosus superare humor, qui humidus est & frigidus: in tertianis flava bilis, quæ sicca & calida existit. Gignuntur tamen acutissimæ & ardentissimæ febres à flava bile: atque ex genere ardentium febrium ipsa quoque tertiana existit. Etenim de ipsius flavæ bilis natura, sic Plato scribit: Quæ aut corporis partes incendi dicuntur, à bilis actu,

Humorū singuli, quales nam sint, quibusque elementis proportionē respondent.

Sanguinem productū fuisse a moderata qualitate elementorum temperie.

Sanum esse quando dicitur corpus.

Dolor quando accidat.

Morbi ob humorum affluxum.

Sanguinē putrescente in ventre, aut in grumū coactum extrema pericula inducere.

Humorū qui in quibus redundent temporibus

Regionē cum temporibus comparatio.

Contraria cōtrariorum remedia existere.

Platonis duplex error circa febrium substantias.

Quotidianas febres oriri à pituitoso humore. Tertianas febres à flava bile productas.

Tertiana febrem ex genere ardentium re ardentissimam fieri.

& flamma omnes infestantur: & post hæc deinceps. Quæ quæ respicit extrinsecus, omnigenas tuberculorum species fervens emittit: intus autem cohibita, igneos, plurimosque morbos procreat. Verum dum Hippocrates tradit, semper insitum calidum, omnium naturæ operum esse quammaximè causam, Plato non calidum dicit, sed ignem: quum tamen si ab igne ciborum cōcoctio fieret, necnon distributio, sanguificatio, & nutritio, melius utique in acutè febrientibus hæc perficerentur. At insitus calor temperatus existens, substantia quidem in sanguine & pituita consistit: qualitate autem, mixtus est temperatè, ex caliditate atque frigiditate. Tutius igitur dixit Hippocrates, qui crescunt, plurimum habent calidi innati, atque illud: Vētres hyeme et vere natura calidissimi sunt: & hic etiā calore insito intelligēs. Falsus etiam est Plato, dum attractionē pulmonis inter respirandum ē medio tollit, inspirationemque ipsam successione ad id quod vacuatur, nempe succedēte uno spiritu atque subingrediente per cutis poros, in locum alterius, qui expulsus est, necessariò fieri contendit. Quippe nervi ab spinali medulla orti, arbitrarium motum musculis thoracis largiuntur: a quibus elavatus quidem, externum aërem per fauces & asperam arteriam, in pulmonem attrahit: cōtractus autem, per eadem expellit. Pulsus autem à corde & arteriis fit: atque in elevatione quidem, per arteriarum ora in cutem pertinentia, externus aër intra corpus attrahitur, triplicis usus gratia: refrigerij, eventilationis, & spiritus animalis generationis: in contractione verò, arteriæ explodunt quicquid fuliginosum fumosumve in ipsis procreatum est. Sermo itaque Platonis coarguitur: primò quidem, quod inspirationem affectum suipervenientem, non actionem voluntariam constituat: cum tamen in nostro situm sit arbitrato, citius, tardius, minus, magis, & frequentius inspirare, quemadmodum expirare. Secundo autem, quia post arteriarum contractionem, oportet statim inspirationem fieri: sicuti & post expirationem, protinus arteriarum elevationem. Ceterum licet nobis longiori tempore respirationem cohibere, nec ob id tamen desinunt moveri arteriæ cum corde. Quinetiam elevantur nonnunquam hæ inspirantibus nobis: sicuti & expirantibus contrahuntur: & in unius respirationis tempore, septies, aut octies, cor cum arteriis attollitur, deprimiturque. At qui Platonem credunt fuisse adeò imperitum & rudem, ut cum dixerit, spiritum potumque pulmones ipsos excipere, existimarit potum omnem in pulmones deferri, ij sanè manifestè falluntur: quandoquidē non fuit talis eius viri sententia, sed nonnihil ex ipsa portione, per fauces, perque asperam arteriam in subditum pulmonem defluere, non per mediam instrumenti laxitatem delatum, sed circa tunicam, ceu lenimentū quoddam, aëris modo descendens: id quod verissimum est, atque rationi cōsonum. Quod si aliquis accepta, dum stat, copiosa aqua intra os, dein supinus decumbat, eiusmodi percipiet defluxū, si aperuerit modicè gutturis orificium. Verum cummulata portio & copiosa, tantaque, ut spiritus vias intercipiat, ani-

mal ad tussim irritat: modica autē, nec omnino sensum sui, cum per arteriam delabitur, exhibet. Ad hæc, si sitibundo animali coloratam aquam propines, ac dein statim jugulatū id disseces, pulmonem eius similiter coloratū invenies. Liquet itaque manifestè, aliquid ex portione ipsos pulmones allabi.

GALENI PERGAMENI
de placitis Hippocratis & Platonis, Lib. IX.

Cum autem facultatem discernēdi rerum similitudines plurimi fecerint tū Hippocrates, tum etiam Plato, atque ad discretionem huiusmodi necessaria sit veritatis cognitio, equidem veritatem eorum quæ inquiris inventurum te affirmo, si primum initium viæ quæ ad ea ducit, cognoveris: à qua aberrans, in perennem verborum captionem, errorēque decides. Est autem principium, dimidium, & (ut Plato ait) totius operis maximum. Si igitur nullum nobis insit naturale iudicij instrumentum, neque artificiosum, nihil poterimus invenire. At cum naturalia & cōmunia omnes habeamus, invenimus etiam aliquod artificiosum. Quæ autem sunt illa naturalia iudicij instrumenta, quæ nobis cōmunia adsunt? Oculi secundum naturam habentes, qui visibilia conspiciunt: aures naturali modo dispositæ, quæ audibilia percipiunt: lingua saporum dijudicatrix: nares odorum: & tota curis tactuum. Ad hæc intellectus, vel notio, vel mens, vel ratio, qua consequentiam repugnantiamque internoscimus: atque alia præterea quæ his incidunt, in quibus est divisio, & compositio, similitudo, & dissimilitudo. Ut enim sensibilium iudex est sensus, ita & intelligibilium alia quædam facultas, quam ut quisque appellare voluerit, illi permittimus. Rectè itaque dixit Hippocrates, rerum naturam inveniri, si à maximis quidam usu, facillimis autē cognitu, inceperimus. Etenim natura ambo nobis hæc dedit, & ipsa iudicij instrumenta, & quod ipsis à nullo docti præceptore credamus. Ea igitur quibus iudicamus, & instrumenta sensuum sunt, & facultates instrumentis utentes. At fides ipsorum, citra disciplinam: & natura non hominibus tantum, sed aliis etiam animantibus inest. Quum igitur appareant artium opera vitæ hominum conducibilia, utique naturalibus iudiciis fidem accommodantes homines, de ipsis iudicium fecerunt: ac nos illis eò feliciores sumus, quod quæ illi longo tempore, laboreque improbo adinvenere utilia, ipsi brevi condiscimus tempore, futuri etiam præstantiores prioribus, si pari ac illi studio, similium dissimiliumque dignotioni indefessè insistamus, idque semper auspicientes à facillimis cognitu. Enimverò Plato, cum prius nos in civitate exercuisset, iudicassetque aliam populi partem dominari, aliam propugnare, tertiam aliam opificem esse in ea: digressus tandem ad animam, etiam in ea ostendit aliam partem esse quæ dominetur, cum bene habet: alteram quæ ipsi ministret, quemadmodum in urbibus ministrare militaris consuevit: ac reliquam denique tertiam,

Calorem insitum consistere in pituita & in sanguine, mixtumque temperatè esse ex caliditate ac frigiditate.

Respiratio quomodo fiat

Pulsus fieri à corde et arteriis. Dilatactionis arteriarum triplex usus.

Platonis opinio de inspiratione & respiratione cōstitutur. Inspirationē esse voluntariam actionem.

Potionis partem aliquam in pulmone semper defluere, per ipsam arteriam asperam

Tussis unde irritari soleat.

Facultate discernendi rerum similitudines plurimi fecerunt veterum veritatis sciendæ methodus.

Principium totius operis maximum

Iudicij naturalia instrumenta, quæ cōmunia adsunt

Sensibilium iudex est sensus, intelligibilium iudex est intellectus, natura rerum quo pacto veniatur.

Iudicia fieri per instrumenta sensuum & facultates instrumentis utentes

Feliciores quæ rationis sunt veteribus.

Platonē triam animæ facultates, tribus reipublice partibus comparasse.

EPITOMES OMNIUM GALENI OPERUM SECTIO SECUNDA.

SANCTISSIMO D. N. P. III. P. M. ANDREAS
LACUNA SECOBIENSIS, MILES
S. PETRI, S. P. D.



UI UT MEDICAM ARTEM EXTERMINENT, EAMQUE NON ESSE EX
usu mortalibus persuadeant, summum diem ita hominibus esse à Deo præfinitum contendunt,
ut non modo non produci, sed ne quidē ante illam metam ullo pacto vita intercipi queat, y, Bea-
tissime Pater, præterquam quod falsa & inania loquuntur, omnem ferè humanam providen-
tiam e medio tollunt. Quocirca tametsi sycophantæ id genus, infestissimi sint Medicinæ ipsius hostes, eam-
que assiduis saucient vulneribus, eius tamen sunt ope & præsidio curandi, cum gravissimo laborent ani-
mi morbo, correptique phrenitide, aut alia quavis animi alienatione, talia insanire cogantur. Infixit
autem hanc opinionem complurium mentibus, quod legitur apud prophetam Iob, Deum constituisse ter-
minos homini, qui præteriri non possent: id quod sanè est verissimum. Deus quippe & natura non ho-
minibus tantum, sed etiam animantibus universis (sub quibus comprehendo stirpes) constituerunt, ceu
quendam suæ durationis atque periodi apicem, ad quem singula pervenire possent, si omnes occasiones effu-
gerent, quæ interitum præcoccem accersunt. Cum autem hic vitæ cursus in singulis animalibus, ab in-
sito vitalique humore profisciscatur, portionem cuius in prima generatione non omnia fuerunt parem sor-
tita, merito, mea quidem sententia, illa durabiliora erunt, quibus eius copia largior obtigerit: vitæ ve-
rò brevioris, quibus humoris insit parior. Quemadmodum igitur si conservemus oleum purissimum, sem-
per illi inardebit flammula, quandiu oleum ipsum duraverit: extinguetur autem, ipso oleo absumpto: pa-
ri etiam ratione, si humorem nativi caloris fomitem, immunem ab omni corruptela tueamur, non defun-
gemur vita, donec ipse prorsus nos deserat: quod ubi acciderit, produci amplius dies nostri non possunt: ad-
proinde is erit verè ultimus vitæ terminus, quem nimirum transgredi nulla homo industria, aut ratione po-
test. Quod si quispiam Dei donum ac beneficium contemnens, aut vitam exosam habens, prius quam ad
finem sibi designatum adventet, det seipsum præcipitem, disrumpatve crapula & vino: prævidit quidem
hæc talem Deus exitum, non præfinit autē, cum ipsum suo in consilio atque imperio voluntatis reliquerit,
Est itaque in singulis iam sua extrema dies, ad quam utique pervenire, nisi optima victus ratione, possint,
à Parcis ipsis præfixa: quam quidem ut præterire nemini ab illis est datum, sic etiam ut eam consequantur,
solis contingit illis, qui præceptis medicorum audientes, & temperantissime vivunt, & fovere vapidum il-
lam humorem, vitæ autorem, omnibus modis conantur: ad quam rem plurimum confert cum exquisitissima
victu, exercitiisque modicis, etiam regio vel admodum temperata, vel ad frigus magis quam ad calorem
declinans. Pro variis siquidem ipsius cœli constitutionibus, constat hominum temperamenta, adeoque
ætates ipsas variari. Æthiopes quippe (id quod tradit ex Asclepiade Galenus lib. de philosophica hi-
storia) circa tricesimum annum senescunt, quod sub ardentissimo sole, eorum calor genuinus quam citissime
una cum subiecto humore evanescat. Angli verò Daniq̃ue, ob contrariam causam, ad vicesimum supra cen-
tesimum annum, nisi propria pereant intemperantia, solent vitam ipsam protrahere. At Hispani, ut sita
sunt medij inter hos, sic vitam illis quidem longiorem, his autem longè breviorē sortiuntur. Inter omnes
porro temperies atque constitutiones ambientis, quas mihi experiri contigit, nullam hæcenus adeo propitiam
reperitum hominibus, tum fructibus universis, atque est hæc qua perfruntur Veneti: apud quos, fructus
quidem ipsi quamdiutissime incorrupti & succulenti servantur: homines autem, vegeti, floridique, raro
nisi extremo senio absumuntur. Id quod sanè est in causa, ut Veneti passim tot senes, tamque reverendi,
cernantur. Roma verò contrà, per pauci inveniuntur veri atque genuini cives sexagenarii. Quod si quæ
exteri illud ætate ingravescentes confluant, intercipiuntur brevi: quod certè argumentum efficacissimū est, te,
Beatissime Pater, singulari modestia & temperantia tua, pervicisse malignitatem syderis: quippe qui sensi-
bus universis integris, absolutissimisque, tam venerandam canitiem indeptus atque assecutus fueris: ad
quam quidem nobis feliciter conservandam, producendamque in multa annorum curricula, quæcunque de
tuenda valetudine Galenus Pergamenus conscripsit, ea omnia nuper instigatione Excellentissimi viri Ioan.
Aquilery, tui medici longè vigilantissimi, à me & castigata, & in enchiridion coacta, dicare Tuæ Beati-
tudini statui: sperans fore, ut hoc erga T. S. officium meum piis omnibus quam gratissimum esset, ac præci-
pue illustris & reverendis. D. D. Francisco à Bovadilla & Mendoza Cardinali Cauriensi, Patrono-
que meo singulari: qui Beatitudinis Tuæ amantissimus, nihil tam habet in votis, quam ut eam diu CHRIS-
TUS servet superstitem. Quare unice T. S. oro, Beatissime Pater, ut quemadmodum superioribus die-
bus periochen illam de victus & exercitij rationi à nobis oblatam, vultu hilari suscepisti, sic salutares hos
commentarios, quos offerimus denuò, suscipias: exiguos quidem, sed ea imbutos eruditione & doctrina, quæ
possit mirè tuum oblectare animum, teque manu placidissima ducere ad extremum illud senectutis fasti-
gium, quod omnes cupimus, quodque prius quam assequaris, tibi longum adhuc iter est conficiendum:
cum non dubitem quin, si Galeni institutis & documentis usus, pro solita etiam sapientia tua, constantia-
que, & animi magnitudine insuperabili, fausta omnia & adversa, breviterque universas humanarum
rerum

rerum vicissitudines, eodem animo tuleris, adhuc sis victurus nobis diutissime. Quod quidem Ecclesie largiri dignetur Deus Optimus Maximus. Vale. Venetys. ex aedibus illustrissimi D. D. Ioannis Furtadi à Mendoza., in hac Repub. Cesarei Oratoris longè dignissimi, quarto Idus Aprilis. M. D. XLVIII.

REVERENDISSIMO IN CHRISTO
PATRI, D. D. NICOLAO VINCEIO, EPISCO-
PO BALNEOREGIENSI, A C S. D. N. P. III. DATA-
rio vigilantissimo, sapientissimoq. dirigitur liber De sanitate tuenda,
ad Pontificem maximum.

*I liber, & quam fers, domino impartire salutem,
Vivat ut admonitu tempora longa tuo.
Sis licet exiguus, tecum sed Nestoris annos,
Multaq. conciso corpore secla geris.
Verum ne nimium timidus videare, vel audax
Materia pecces utilitate tua:
Scis cui magnarum Paulus molimina rerum,
Eius ut arbitrio stentq. cadantq. dedit:
Qui sacras dispensat opes, qui ne quid ab ullo
Tentetur contra iusque piumq. caret:
Huic uni te crede liber: si duxerit intrò,
Et patrociniò in verit ille suo,
Res tunc facta tibi fuerit, nihil amplius optes.
Sed propera ad sacros oscula ferre pedes.*

GALENI PER-

GAMENI AD THRASYBU-

lum, Num ratio tuenda sanitatis, ad medici-
nalem artem, an ad exercitatoriam
spectet, liber unus.



NOMNI CONTEMPLATIONE optimum inventionis initium est, prius exacte cognoscere quidnam sit id de quo disputeretur. Qui autem rationalem contemplationem satis diligenter tractarit, is quodlibet sanè quæsitum æquè discutere poterit: sine qua quidem commentarios evolvere, nihil aliud est, quàm oleum & operam ludere. Cum igitur in controversiam vertatur, num ars sanitatis tuendæ ad medicinalem artem spectet, an ad exercitatoriam: qui medicinam esse curatricem ægrorum, & sanorum conservatricem, definiunt, ii certè medicinæ partem, salubrem esse cōfirmant. Qui verò medicinam laborantium tantum curam habere ajunt, ab ea sanitatis conservatricem abstrahunt. Ita & exercitatoriam si quispiam sanitatis servatricem statuatur, quæsitum pro comperto habuerit: quemadmodum & qui solum boni habitus eam opificem tradat, diverso modo & ille ambiguū pro certo assumet. Nunquid igitur sic medicinam definire præstiterit, eam esse cujus finis est sanitas? Gymnasticam verò, cujus finis est bonus habitus? At sic etiam gymnasticæ salubrem, tanquam nihil sit dubium, detrahemus: medicinæ autem adhuc obscurum attribuemus, quæcunque enim definitiones constituuntur à fine, non exiguas ambiguitates pariunt. At qui salubrium scientiam medicinam esse affirmaverit, is etiam nimis audacter salubre, tanquam medicinæ partem, accepisse videbitur. Non deerunt siquidem contrariæ factionis nonnulli, qui ægrotabilium tantum scientiam esse medicinam contendunt: hi tamē primū ignorant, contrariorū omniū unam esse scientiā: & quicunq; ægrotabilia norit, hunc & salubria non latere necesse est. Dein verò nesciunt, quod & salubre dicimus signum, quod ægroto adveniēns, futuram sanitatem portendit: nec non causam salubrem, quæ sanitatis est procreatrix: sicut & salubre corpus, quod est sanitate præditum: quorum omniū medicus scientiam habet. Periculum autem fuerit, ne si unam trans-eamus, septem circa humanū corpus artes constituamus: primam & manifestissimā, & penē solam controversia carentem, eam scilicet quæ expellit morbos: duas alias, unam à sanitate secundum affectionē, & lubrica, ad eam quæ est in habitu, ducentem: alteram, in ea conservantē: duas item alias circa bonum simpliciter habitum, effectricem unam, alterā quæ conservat: præter has etiam duas alias, circa bonum habitum Athletarum versantes, qui non simpliciter bonus est, sed cum adjectione, atq; periculosus. Ab his autē, septem, alias possemus etiam numerare artes, cujusmodi est comptiva, quæ corpori pulchritudinem quandam adulterinā conciliat, vitiosa &

adulatrix existens. Huic etiam est contraria, quæ circa legitimā, veramq; pulchritudinē (quæ in vegeto colore, carnis moderata copia, membrorumq; congrua coagmentatione consistit) versatur. Porro sanitas & bonus habitus nō idē nobis significāt: cū sanitas quidē, salubrē quandā affectionē: bonus aut habitus, nō affectionē simpliciter, sed fixā & permanentē significet, quam nimirū omnes desideram⁹. Cum aut omnes activæ artes, pponant sibi quod in materia quā circa versantur, est valde optimū, ac maximè duraturū: earumq; finis sit unus, nempe ipsius propositi consecutio: utiq; manifestum evadit, artis circa corpus nostrū versantis, finem etiam unū, ut propositū unū, existere, sive id quispiā integritatem, sive bonum habitū, sive sanitatē, sive naturalem corporis structurā, sive naturālē actionē, aut affectionē nominare voluerit. Ut enim corpus humanū una res est, sic hujus quoque una perfectio habetur, quam & præsentē custodire, & absentem revocare, alicujus artis officium est. Quare nec multa corporis bona ponenda sunt, neque ipsius boni, quod est, aliam opificem, aliam conservatricem artē statuere oportet. Ita verò cum unum sit corporis bonū primariè ac propriè dictum, utputa sanitas, ad quod cætera referuntur, ut actio integra, pulchritudoq; certè non per alia exquisitè sanescet corpus, per alia robustum atq; pulchrum evadet: unde una circa corpus esse ars concluditur. Quemadmodum igitur animi, sic etiam corporis bona multipliciter dici solent: unum quidem ratione primaria, ut sanitas: aliud, tanquam fructus illius, ut actio: tertium deniq; necessario consequens, ut videlicet pulchritudo: nec licet alicui horum prodesse, aut obesse, quin omnibus tribus aut profis, aut noceas. Ars itaq; in primis efficere sanitatē videtur, quam necesse est actio naturalis pulchritudoq; sequatur. Quod enim primum artifex cū fecerit, acquiescit, id eius planē finis existit: at naturali affectionē per quam agimus (hoc est, sanitate) restituta, cōquiescit: finis igitur medicinæ sanitas est, quam cū induxit, nihil circa actionem pulchritudinēve laborat, ut quæ vel invito artifice sanitatē sequatur. Sed neque in ulla materia ars una finis affectio, altera conservatrix habetur. Qui autem sanitatem propria ratione tuetur, circa illa, iudicio meo, versatur, quibus, velimus nolimus, corpus nostrū utitur: qualia sunt, ipse nos ambiens aer, somnus, vigilia, quies, motus, ac deniq; cibus & potus. Hæc siquidem quæ per se lædendi juvandi; potestatem habent, sanitatis custos speculatur, id semper ante oculos habens, ut in corpore exactè sano, validoq; nihil novare audeat: cū verò aliquantulum moderationē transierit, continuo quod deficit, priusquā latius id malum serpat, refarciat. Sive enim plenitudine, sive inanitione laboret corpus, utrunq; vitii ars una uno modo emendat, quod deficit nimirū instaurans, Cæterū in quanto, non in quali, correctionis differentia versatur. Atqui secundum quantū in his quæ fiunt differentia, ad unam artem pertinet: quod si alterius artis esse debeat, oportet prorsus qualitate etiam differat. Porro cū multa ac variæ sint medendi rationes, quarum alia ferro,

*Pulchritudo
vera in quibus
consistat.*

*Sanitas quid
Bonum habi-
tus quid.*

*Artium om-
nium scopus.*

*Artis cuius-
que finis, est
consequutio
scopi.*

*Artis medi-
ca finis.*

*Perfectio hu-
mani corpo-
ris, una tan-
tū existit.*

*Unicam esse
artem, quæ
circa huma-
num corpus
versatur.*

*Bona animi
& corporis
multiplici-
ter dici.*

*Sanitatē ac-
tio natura-
lis, pulchri-
tudoq; conse-
quitur.*

*Finis artis
quod sit.*

*Medicina fi-
nis est sani-
tas.*

*Res expen-
denda à
medico.*

*Novandum
nihil in sanis
corporibus.*

*Medendi ra-
tiones varia.*

Artes distinguendas non esse, per actiones singulas.

Scopus communis medicamentum, omnium est sanitas.

Artes omnes in subiecta substantia bono versari.

Medicina unius. Varia species, siue partes sunt, omnes ad sanitatem tendentes.

Artes esse distinguendas scopis.

Medicina artem laceras & fies sarcineti, esse similem.

Finis artis quid sit.

Artes effectus ab actibus, quo differant.

Sanitas est medicina finis.

Artes non esse ex materiis diiudicandas.

Medicina in finibus materiis subijci.

Artes iudicandas ex fine esse.

Artes cuiusque constitutio, a fine sunt initium.

alia igni, alia medicamentis: alia victus ratione curantur, hallucinantur sanè qui per singulas actiones, artes esse distinguendas putant. Nam quis adeo fatuus atq; stupidus est, ut à medicina modo propositas actiones deducat, atque aliam quampiam artē pro unaquaq; ipsarū statuatur? Etenim ob cōmune propositū, quæ sanitas est, omnes qui quocunq; modo medentur, medici vocantur: sed ppter actiones, aut materiæ, aut membri diversitatē, hic manuarius, ille medicamentarius, alter ocularius, & est, & dicitur: manuarius ab actione, medicamentarius à materia, sicuti ocularius à membro: & cum omnes sanitatis gratia operentur (artes enim omnes in subiecta substantiæ bono versantur, atq; illi operam navant) sequuntur operationis modos diversos. Erit itaq; medicina unica, sed ipsius variæ species ac partes, omnes ad eundem scopū tendentes, ad sanitatē videlicet. Ac proinde nō multitudine agentium, sed propositis exploratis, artes sunt distinguendæ. Siquidem singularia innumera sunt, sed generale quoddam opus omnibus est commune. Nam & corpori aliquid ut supervacuum detrahens, aut aliquid quod deficiat adjiciens, unum uterq; opus præstat, corpori naturalem modum, hoc est, sanitatē cōparans: proinde verò & calefaciens, & refrigerans, sicuti & madefaciēs & siccans. Non est autē unius artis, opus facere: alterius, vitiatū corrigere: sed eiusdem. Quod si non eiusdē, at certē medicina nihil quod pri⁹ nō esset, procreat, sed arti laceras ac tritas vestes sarcienti oppido q̄ similis est: sanitatisq; conservatio, parū labefactata corrigit, minimè existēs diversum genus à curativo. Est porro id artis finis, quod quiescētē artifice, demonstrare valemus, ut sanitas: quæ ratione effectivæ artes ab activis, quarū finis ipsa actio est, tantū dissentiūt. Nam quamprimū activæ ab agendo desierint, finis quoque unā desuit. Nihil siquidem in saltatoria præter ipsam actionem ostendere possimus, ut in fabili grabatum, in ædificatoria domū, sanitatē in medicina. Quare nec sanitatem custodire, aut vitiatam emendare, ut prorsus amissam recuperare, finis est: sed omnia hæc actiones sunt, finis autem est sanitas. Sed neq; ex materiis ipsis artes diiudicandæ sunt: quandoquidem materiam unā constat pluribus artibus subijci (ut lignum, exempli gratia, navii artificii, carpentarii, machinarumq; structori) sicuti & unam eademq; artem, permultis uti materiis. Quippe medicæ arti, una cum sit, infinitæ materiæ subsunt: corpus nempe sanitatem suscipiens, cibi, ac potus, & medicamenta omnia, sicuti & vocata diætēmata. Hæc igitur materiæ sunt causarum vim obtinentes: corpus aut, tantquam id ex quo finis, aut in quo. Itaq; ad finem properare omni ex parte, ab eoq; artes iudicare, præcipit ratio. Propter hunc enim & cōmunibus actionibus, & propriis præceptis atque principiis differunt: nam hæc & secundum artiū fines evariant: & cuiusq; artis constitutio à fine (quæ regula omnium artis præceptorum existit) sumit initium. Igitur unum tantū cum sit humani corporis bonum, sicuti & aliarum omnium substantiarum, atque una similiter ars, quæ circa illud versatur, hujus artis jam omnes particulas spe-

culamur: cuius quidem finis cum nō in sola contemplatione sit situs, sicuti Arithmetica, Astronomia, ac Physica: nec simul cū actione ipsa desinat, quod cōtingit in saltatoria: manifestū utiq; est, neq; inter activas, neq; cōtemplativas, sed inter effectivas aut acquilitivas, quales sunt quæ ex parte vitiatum corrigunt, eam esse connumerandam: sic ut natura quidem & corpus fabricetur, & ipsum imbecillum confirmet: eius autē ministra sit ars, quæ in præsentiarū investigatur. Appelletur igitur correctiva: quæ quidem aut multum subito corrigit, aut pauxillum. Etenim quæ ipsius pars multum semel corrigit, eam medicativam aut curativam dicamus: cuius sanè, quemadmodū quantitatis, differentia permagna existit, quæ verò pauxillum, conservativam. Atque hæc quidem insignibus differentiis tripartitō distingui videtur. Aut enim exactē valentem accipiens, in hoc ipsum gradu conservat, diciturq; evectice, hoc est, boni habitus conservatrix: aut eos qui jam evaserunt morbū, ac secundū habitudinem sani existunt, reficit, appellaturq; analeptice, hoc est, instauratrix: nā quæ inter utranq; pars collocatur, versaturq; circa corpora in habitu, non in bono habitu, sana, ea conservativa simul & salubris nuncupatur. Tres igitur hæ partes conservativæ, analeptice, salubris, & evectice, sunt quidem omnes sub ea medicinæ parte, quæ exigua tollit vitia: inter se autem ratione maioris minorisq; dissentiunt. Minora enim castigat evectice: paulo his majora salubris: adhuc majora analeptice. Quidam verò & quartā huius particulam prophylactice, hoc est, præservatricem addunt, facultatē ei habentem oppositam quæ à morbo reficit liberatos. Curativa igitur, magna vitia: evectice autem atq; salubris, parva tollit: in medio verò harū interstitio analeptice & prophylactice positæ sunt, si ad salubrem atque evecticē comparentur, haud exigua vitia emendantes: si ad curativam, non magna. Quocirca non immeritō neutræ appellari possunt. Ergo ut totum sermonem repetam, circa corpus humanum unam quandā artem constitutio, eiusq; duas has esse partes, efficientem unam, corrigenē alteram: ambasq; hæc prius natura inesse, sed ipsarum alteri, emendatrici scilicet, humanam artem opitulanti, quæ & ipsa bipartitō dividitur, in curatricem partem, seu medicatricem, atq; in alteram conservatricem, quæ & salubris vocatur. Hujus rursus tres partes sunt, analeptice, evectice, ac toti generi cognominis, salubris. Cum autem omnis quæstio sub definitionem cadat, sanè si quid tum medicina, tum gymnastica sit, didicerimus, nec amplius difficile fuerit invenire ad utram ipsarum salubris referatur. Cum ergo una tantum ars circa corpus versetur, poterit, qui volet, medicinā eam appellare: sin hoc non placet, exercitatoriam. Sin id quoq; displiceat, totam artem nomine carere dicens, unam eius partem, medicinam, alteram exercitatoriam appellet. Si neq; id probas, salubrem quandam artem curativā ex diverso distinctam, eiusque partes diæteticen, gymnasticenq; dicito. Singula enim nomina si interpretabere, ita universum quod quærebamus indeptus fueris. Quod aut ut artem corpora

Medicina esse inter factivas artes connumerandam.

Medicina esse ministrantem naturam.

Medicatrix medicina pars.

Conservatrix medicina pars triplex.

Evectice.

Analeptice.

Salubris.

Prophylactice.

Correctrix artis partem humanam artem opitulanti.

Quæstio neminem definitionem cadere.

latrice. male affecta curantem, iatricem, hoc est, medicinam, sic artificem etiam ipsum, Medicum appellet Homerus, perinde atque alii Græci, verba illius indicant, ubi ait:

Vir medicus multis alijs tibi dignior esto,

Dira venena trahens, & pharmaca mitia fundens,

Multa salubria miscens, & letalia multa:

** Unicus existens, ritè tamen omnia callens.*

Medicina Præcipuas porro medicinæ partes esse pharmaceuticam, chirurgicam, diæticam, nemo ferè inficiatur. At gymnasticæ artis nomen, Homeri seculo nondum repertum erat. Nam paulò ante, Platonis tempora gymnastarum ars exorta est: quo etiam tempore Athletarum exercitatio emerfit: quorum quidem bonus habitus ut vituperandus est, sic etiam ipsos instruens gymnastica, contumelia non caret. Eum autem habitum bonum laudamus, qui & tutissimus est, & ad obeundas naturales actiones maximè idoneus: cuius materiæ effectivæ simul & conservativæ, duæ sunt, & salubris vocata victus ratio, & exercitatio. Nam cum quatuor sint genere omnes materiæ, à quibus nostrum alteratur corpus, manuarum functio, medicatio, exercitium, ac victus ratio: una quidem est ægrotis inutilis, duæ verò secundum naturam se habentibus. Æger quippe in multis medicamina, manuum operam, victusque rationem postulans, nulla ex parte exercitatione eget: exquisitè autem sanus, corpus exerceat, & certa quadam victus ratione utatur necesse est, sed medicamenta, aut manus ministerium, non postulat. Salubris igitur artis constat partem quandam esse gymnasticam. Siquidem etiam Plato in Gorgia, aliam gymnasticam esse ait, ut artis corpus regentis partem: atque aliam qua utuntur Athletæ: quam nimirum ceu omnium flagitiosissimam criminatur plurimis modis: hujus quidem finem, virum esse incrementum, quo adversarios prosternant: illius autem, usum ad naturales actiones, confirmans. Cum igitur in quadam moderatione sanitas sita sit, Athletarum autem gymnastica intemperiem excessumque; molitur, multam ac solidam carnem procreans, sanguinisque copiam quam tenacissimi adaugens: haud difficile inventu fuerit, artem hanc omnibus naturalibus animalibusque actionibus prorsus inutilem esse (crassus enim venter subtilem mentem non parit) atque obnoxiam periculis. Quare Athletarum nonnulli repente obmutuerunt: alii sensum motumque amiserunt, ac penitus attoniti facti sunt, mole illa præter naturam, ac multitudine, insitum extinguente calorem, liberumque spiritui transitum intercludente. Quicumque autem ex ipsis mitiora mala patiuntur, rupto vase sanguinem vomunt, aut expuunt. Cæterum legitimæ gymnasticæ autores sunt, Hippocrates, Diocles, Praxagoras, Philotimus, Erasistratus, atque Herophilus, & quicumque alii totam artem ad corpus pertinentem optime didicerunt: quorum sanè dogmatis congruit illud Platonis: Una cum sit corporis curatio, duas ejus partes appello, unam gymnasticam, alteram curatricem. Licebit etiam in ipsa arte corporis præfide, si quis invenire partes ejus desiderat, ægros curantem, medicativam: sanis consulentem, salubrem

appellare. Vel melius sic ut diximus antea: Ars corporis curam habens emendatrix cum sit, qua parte magna vitia corrigit, medicatrix dicetur: quæ verò exiguas noxas tollit, vocabitur conservatrix. Quinetiam aptius à materiis has partes, morbidam una, salubrem alteram appellaveris: quæ ut antea nobis est dictum, in reſectricem, salubrem secundum habitum, & eveſcticem, sive boni habitus effectricem, diducitur. Nam dictarum partium singulis propria materia subijcitur: primæ quidem, secundum habitudinem sive affectionem valens corpus: secundæ, secundum habitum: tertiæ denique bono habitu præditum. Etenim corpus secundum affectionem sanum appello, quod jam extra morbum cum sit, levi tamen noxa pulsatum, facile in morbum relabitur: imbecillum etiam ad actiones existens. Secundum habitum autem, quod jam periculis obnoxium non est, absolutum tamen actionum robur nondum est consecutum. At bono habitu præditum, quod extra omne versatur periculum, ac præ se fert etiam insigne quoddam omnium actionum robur. De sanitate etiam similiter judicandum. Sanitas namque secundum habitum, inter sanitatem secundum affectionem & bonum habitum, actionibus media est. Nam sanitas, in affectione, debiles actiones producit: bonus habitus, firmiores. Sanitas autem in habitu, nondum quidem firmas, non amplius tamen debiles. Quod si secundum auxiliorum materias artem hanc salutarè, conservatricemque distribuas, in quatuor partes secabitur. Una siquidem in assumptis, altera in iis quæ fiunt, tertia in his quæ evacuantur, quarta in foris secus occurrentibus, prorsus versari videbitur: per hæc enim sanitas custoditur. Pars igitur quæ in his quæ assumuntur versatur, ciborum portionumque ad sanitatis custodiam pertinentium est scientia. Quæ verò in iis quæ evacuantur, excrementorum omnium est exploratrix. Quæ exterius incidentium est, aerem, aquam, oleum, & cætera id genus speculatur. At quarta pars artis quæ superest, in iis quæ aguntur posita, studiis exercitationibusque continetur. Insomnietas namque, vigilia, somnus, Venus, ira, lavatio, ex hoc genere sunt. Cæterum singulorum enumeratorum salubrium quantitas, qualitas, & occasio, dignoscenda est. Minima igitur salubris artis pars est de exercitationibus scientia: rectius enim puto gymnastica ars appellabitur, quæ omnium exercitiorum facultatis cognitio est. Nam quæ ad palæstram solum pertinent, cognoscere, perquam exiguum est, omnibusque mortalibus minimè utile. Unde tibi jam intueri licet, non modò salubris artis quota sit portio gymnastica, sed etiam gymnasticæ minimam esse particulam luctandi studium, & huic cognatum Athletarum exercitium, affectionis cuiusdam non naturalis effectivum. Idcirco eos male sentire constat, qui in dividenda tota arte, gymnasticam medicativam opponunt: illa namque à materia, hæc à generali communi que actione appellationem habet. Similiter etiam quisquis per divisionem, medicativo conservativum opponit, cognatorum oppositionem facit. Porro cum universæ artes mechanicæ mutua ope indigeant, perfectioribusque materiis, ex quibus finem suum consequantur, suppedient: instrumentaque optima, per quæ

*Correctrix
ars.
Medicatrix.
Conservatrix*

Corpus secundum affectionem sanum, quodnam esse dicatur.

Corpus sanum secundum habitum.

Corpus bono habitu præditum.

Sanitatem tripliciter dici.

Conservatricem artem, secundum auxiliorum materias esse quadruplicem.

Exercitationem esse minimam artis salubris partem.

Artes omnes mechanicas, mutua ope indigere.

illas adornent, conficiant: eis omnibus, ceu quædam architectonica, ars corporis curativa, quæ una est, præsidet. Siquidem ædificatoria, ut tales quædam ædes extruat, præcipit: calcearia, ut calceum: panifici, ut panem: culinaria, ut obsonium: aliisq; singulis, ut quæque apta est, imperat. Sed huiusce artis corpus nostrum curantis, salubris appellata pars est, cuius quadripartitio divisæ, partis unius gymnastica particula existit. Caven- dum tamē est ne pædotribam, aut palæstræ præfectū, cum gymnaste confundamus. Nam qui luctas omnes & frictionū sigillatim omnes actiones ritè obire valet, iste panifici & coquo proportionē respondet, facere quidem panem & obsonia scientibus, minimè tamen quid in ipsis optimum sit, quid nō optimū, intelligentibus: quā- ve facultatē ipso- rum unumquodq; ad sanitatē habeat, nō dignoscentibus. Ut igitur miles artis imperatoris, sic pædotriba gymnasticæ minister est. Vocant tamen nō solum pædotribas eos qui exercent athletas, sed etiā gymnastas. * Quare gymnastica duabus artibus maximè separatis infer- vit: quemadmodū culinaria, quæ salutare obso- nium medico salubriq; concinnat: gustui verò jucundum, ac voluptuosum, nō amplius id arti cui- piam, sed adulationi potius cuidam, finē sibi non sanitatem, sed voluptatē constituenti. Similiter & luctatoria, id quod ad sanitatem bonū est, salubribus & gymnasticis dictis conciliat. Quod au- tem ad affectionem athleticam pertinet, illi vi- tiosæ parti comparat, quæ se gymnasticam vo- cat, cum tamen prostratoria potius, aut cabalice appellari mereatur. Verū omnis benè instituta respublica hoc genus artis odit ac detestatur, ut quæ omne vitæ robur prosternat, haud in bonam affectionem traducens corpora. Jam verò cum prima totius artis pars curativa, quod sic expedi- ret maximè, constituta sit: deinde per multū ociū conservativa salubrisq; vocata, ei adjecta fuerit: totam artem à præcipua magis parte medicinam denominari cōtingit, sicuti & medicū illius pro- fessorem. Idcirco non ab re nunc quispiam inter- rogatus, cuiusnam artis pars sit illa facultas, quæ tuendæ sanitatis noticiam tradit, medicinæ re- spondere poterit, latius fuso & amplificato voca- bulo, neq; adhuc partem, sed integram humani corporis artem significante. Cujus sanè duas ma- ximas partes esse curatricem & salubrem, sicuti & huius salubris, gymnasticam membrum ex- istere constat.

GALENI PERGAMENI
de exercitatione parvæ sphaeræ
libellus.

Exercitatio-
num utilis-
sima sunt, quæ
exercentes
corpus, oble-
tiant ani-
mum.

Animi affe-
ctus ad pel-
lendos mor-
bos quantā
vim habeat.



Llæ mihi sanè videntur utilissimæ omnium exercitationum, quæ non corpus solum exercere, verum etiā animum oblectare possunt. Unde & sapiētes, & naturæ humanæ illos probè fuisse peritos judico, quicūq; venationes, & alias animalium capturas, primi omnium ad- invenerunt, laborē qui in illis est, voluptate, ob- lectione, laudisq; cupiditate lenientes & tem- perantes. Adeo enim potentes sunt, quæ in id ge- nus exercitiis contingunt motiones animi, ut

multi morbis sæpè liberati ex delectatione fue- rint: multi rursus ex nimia cōturbatione, in mor- bos inciderint. Nullus est autem corporis affe- ctus tantus, ut vehementior animæ affectioni- bus esse possit. Quamobrem diligentior istarū, quā corporis passionū habenda ratio est, tum aliis de causis, tum quia corpore longè præstan- tior est anima. Cæterum aliis omnibus parvæ sphaeræ exercitium multis nominibus antecellit. Primo siquidem cum cæteræ exercitationes ma- ximum apparatus, hominemq; ociosæ admo- dum vitæ requirant, huic certè una tantum pila, eaq; perexigua est opus, quam vel pauperrimus quisque comparare sibi faciliè poterit: neq; is qui ea se exercet, cogitur reliqua negotiorum relin- quere. Quid igitur eo esse possit commodi, quod omni fortunæ, omni item negotio cōvenit? Jam verò quæ ex æquo exercere partes corporis uni- versas, seseq; nunc in summā vehementiam in- tendere, nunc in summā facilitatem remittere possit, aliarum, præter hanc parvæ pilæ, nullam quidem exercitationem invenies, quæ modò ce- lerrima, modò tardissima, jam vehementissima rursusque levissima, utcūq; sanè volueris, cor- pusq; toleret, fieri assolet: hac enim membra si- mul omnia, si commodum tibi videatur, aut alia præ aliis, si id magis placet, studiosius exercere potes. Ubi enim invicem sibi oppositi, alter alte- ri pilam ipsam præripiunt, in ea certè cōcertatione caput quidē cervixq; collis per motionibus exer- cetur: latera autem, pectus, & venter, faciei sub- levationibus, depressionibus, obnixibus, cæte- risq; id genus prehensionibus, vehementer la- borant: valideq; tum lumbi tenduntur, tum etiā crura firmantur. Hæc itaq; una exercitatio om- nes corporis partes quā fidelissimè exercet. Si- quidem progredientibus, alii nervi musculiq; alii item subeuntibus, plus agitantur: quemadmo- dum etiam alii illis qui in obliquū se transferunt, & quotquot uno modo crura ipsa commovent. Quinetiam eorum membra qui transversim ferun- tur, moventur planè inæqualiter, sicuti & illorū qui impariter currunt. Sed quemadmodum cru- ribus, ita & brachiis exercitatio hæc, cuiq; æquā portionem largitur: quandoquidem pilam exci- pere in omni figura student. Accidit aut, ut dum necesse habent variis subinde modis se transmo- vere, aliis musculis alii fortius tendantur: hiq; in vices omnes laborent, æqualiter quietē partita, aliis requiescentibus dum fatigantur reliqui: sicq; vicissim & laborent cuncti, & requiescāt, nec sint ociosi omnes, nec laborent omnes. Quod porro etiā visum exerceat, patebit, si reputemus quā diligenter pila sit oculis observanda, ut statim quò dilapsura sit, præsentiat, ne in illius appre- hensione aberrare necesse sit. Unde etiā animus intentus atq; sollicitus redditur. Et licet sola soli- citudo macerare nos extenuareq; soleat, exercita- tioni tamen & gloriæ cupiditati conjuncta, in vo- luptatem abit, plurimumq; & ad corporis sanita- tem, & ad animi prudentiam confert. Quod au- tem & ad res maximas, adeoq; eas, quas subire præstareq; imperatores, urbiū reginæ leges præ- cipiunt, animum & corpus exerceat, demon- stratu non est difficile. Quandoquidem & aggre- di in

Animi affe-
ctus quā-
dam corporis
maior habet
da cura.

Parvæ spha-
eræ exerciti-
um aliis longe
antecellere

Parvæ spha-
eræ exerciti-
um omniq; ne-
gocii cōven-
iens ex æquo
omnes corp-
oris partes
exerceat, potest
intendi &
mitti.

Parvæ pile-
ludum, etiam
exercere oca-
los.

Sollicitudine
exercitatio-
nis & gloriæ
cupiditate
iunctam, in
voluptatem
abire.

Parvæ pile-
exercitium
exercere ad
res maximas
corpus & ani-
mum.

di in tempore, & insidiando latere, & occasione praebitam momento arripere, & aut vi, aut improvise astu, quæ hostium sunt occupare, occupataque tueri, bonorum imperatorum sunt opera. Etenim egregie cautum, subdolumque esse ducem oportet. At quotquot in palæstris dimicant, corporis obesitatem, potius quam virtutis exercitationem, consequuntur. Unde multi ad tantam pervenere crassitiem, ut vix etiam respirare possent. Et sane genus hoc hominum vel ad bella gerenda, vel ad regia vel civilia obeunda munera, minimè valent: ac suis propemodum potius, quam his, rem quampiam quis possit committere. Sed cursum fortasse, & cetera exercitia, quaecumque gracile reddunt corpus, laudaturum me suspicaberis. At hoc non ita se habet. Nimirum enim quod est, reprehendo semper: omnemque quæ exerceatur velimus artem, esse moderatam volo: quæ si modum excedat, jam bona esse desinit. Quæ ratione ipse neque cursus commendo, ut qui nimium exrenuent corporis habitum, ac ne tantillum virilis habeant exercitationis. Non enim celeriter fugiendo, sed fortiter stando, pugnandoque paratur victoria. Jam si ad sanitatem respicias, quatenus per cursum inæqualiter exercentur membra eatenus valetudo læditur. Necessario namque fit, ut alia defatigentur, alia autem sint omnino ociosa. Horum verò neutrum bonum, sed utrumque & morborum seminariū est, & vires in primis debilitat. Quapropter eam potissimum exercitationem probo, quæ & corpus conservare validum, & membra retinere integra, compositaque, & animum præterea vegetum, alacremque reddere est potis. Quæ quidem facultas, in ea quæ parva pila fit exercitatione, reperitur. Quod autem placidissima sit, hinc discas licet, quod pueris, senibus, atque à morbo convalescentibus, hoc etiam nomine, aliis omnibus exercitatio hæc esse præstantior videatur. Quippe facilius nullum est exercitium, si præmissa molli ex oleo unctione, eo leniter, adeoque moderate utaris, ut ipsius qualitas minimè à quantitate obscuratur. Illud siquidem omnium lenissimum est, quod laxatis requieturisque utile in primis, potentissimumque ad debilitatas vires revocandas existit, junioribus juxta senioribusque conducens maximè. Inter alia eius quæ recensui comoda, neque hoc esse prætermittendum videtur, quod maximè omnium extra pericula sit, quæ frequenter adeo in reliquis cadunt exercitationes. Celeres enim cursus, jam multos rupto vase præcipuo perdiderunt. Quemadmodum & voces magnæ, vehementesque & confertim emissæ, maximorum non paucis malorum causa extiterunt. Sic equitationes etiam concitatae, sæpe renes rupe runt, & pectori frequenter nocuerunt: poris quoque nunquam spermaticis: ut ea interim præterea incommoda, quæ ab ipsis equis existere solent, ita ut multi equites sellis excussi subito sint exanimati. Similes iis saltus, discus, & quaecumque nimis inflectunt corpus exercitia sunt. Nam de illis qui ad palæstram proficiscuntur, quid attinet dicere, cum eos videas aut claudos, aut distortos, aut fractos, aut aliqua omnino parte mutilatos redire? Quamobrem cum præter reliqua comoda, parvæ huic pilæ exercitio adsit etiam securitas,

nimirum aliarum omnium utilissima hæc exercitatio merito censenda est.

GALENI PERGAMENI
de alimentorum facultatibus, liber
primus.



Acultates alimentorum merito præstantissimorum medicorum plurimi diligenter pervestigarunt, quod aliis quidem præsidium minimè omni tempore utamur, sine alimento autem, ne vivere quidem, nec secunda nec adversa valetudine liceat. Porro cum demonstrationum duobus genere sint principia (aut enim à sensu, aut à notionem evidenti, demonstratio omnis ac fides proficiscitur) nos de iisdem facultatibus conscripturi, satius esse duximus ab experientia auspicari, eoque maximè, quod bona pars medicorum, hac sola vires alimentorum esse pronunciarint inventas: inter quos præcipue Diocles, experientia sola, facultates alimentorum nobis notas esse arbitratur, non ex indicationibus, quæ tum à temperamento, tum à saporibus desumuntur. Quod verò experientia, ut alia pleraque, ita & qui cibi facile concoquantur, aut secus, quæque stomachum juvent, aut offendant, alvumque laxent, aut sistant, nos doceat, nemo sanæ mentis ignorat. Cæterum in his ipsis plerique falluntur, qui citra limitationem faciunt de rebus periculum. Etenim quibus flavabilis copia in ventriculo, vel ob pravam quampiam temperiem, vel ob peculiarem constructionem colligitur, ii cibos corruptu difficiles, melius quam faciles, concoquunt: quando quæ facile concoquuntur, facile item alterantur, & corrumpuntur: contra quæ concoctu sunt difficilia, non facile quoque tum alterantur, tum corrumpuntur. Hæc itaque, si in multum calorem inciderint, coquuntur magis, quam si moderato occurrerint. Atque hac profecto ratione accidit, ut nonnulli bubulam facilius quam saxatiles pisces concofiant. Lens autem quibusdam alvum movet magis quam inhibeat: melicratum verò magis sistit quam laxet, ob naturam ex pugnantis compositam facultatibus. Nam solidum cuiusque corpus tardè permeat, alvumque fit: humor verò, ad excretionem stimulat. Quare lentis aut brassicæ decoctum, alvum subducit: ipsa verò corpora, inhibet. Siquidem brassica bis cocta, sunt qui ad ventris cohibitionem utantur. Omnibus enim quæ in humore coquuntur usu venit, ut quiddam ab eius facultate in se derivent, ac de sua vicissim portione aliquam ipsi impartiantur. Quare si aut lentem, aut brassicam, aut aliquem marinorum piscium, quibus testa pro cute est, decoxeris, ac potestea decoctum ipsum oleo, garo, pipereque conditum, propinaveris cuiquam, videbis plane potione quidem alvum dilui, esu autem solidi corporis constipari: sicuti & tormina & inflationes oriri, si unam cum ipsorum jure, solidum etiam corpus sumatur. Sic namque pugna quædam inter utrumque fit, cum solidum quidem corpus hæreat subinde, succus autem ad excretionem properet. At cum nonnullis quidem venter ad egerendum sit natura propensus, aliis autem difficilis, utrique pro sua natura symptomatis quæ ab huiusmodi cibis sunt,

Vivere absque alimento non licet.

Demonstratio omnis aut à sensu proficiscitur, aut ab evidenti notione.

Diocles.

Experientia qua cognoscantur.

Biliosum fortis ventriculum, cibos corruptu difficiles, quam faciles, multo melius concoquere.

Bubulam, quam saxatiles pisces, cum nonnulli multo facilius concofiant.

Lentis & brassica decoctum, alvum subducere, ipsas autem substantias, sistere.

Elia omnia deponere in aqua nonnulla propria substantia, & sic sibi aliquid ab illis accipere.

Tormina fieri, eduliorum contrariis facultatibus inter se pugnantis.

*Pituitosi hu-
moris qua-
druplex dis-
ferentia.*

*Biliosi humo-
ris discrimi-
na.*

*Alimentorū
celer tardū-
que descen-
sus, a quibus
proficisci oc-
casionibus
possit.*

*Olera quæ ob
lentorem de-
scendunt fa-
cile.*

*Fructus sub-
ducenda alvo
idonei.*

*Deponibus,
melepeponi-
busq; sim in
esse diureti-
cam.*

*Melocratum
quando ex-
cretionem
excitet.*

*Alimenta me-
dicamentosa.*

*Alimenta
tantum.*

*Temperata
corpora, tem-
peratis ali-
mentis ser-
vanda esse.
Intemperata
corpora, redu-
cenda ad me-
diocritatem
sunt, per ali-
menta qua
contrariam
illis intempe-
riem sortun-
tur.*

afficiuntur, quum venter alius succi, alius solidi corporis facultati opituletur. Interdum etiā pituitosum in ventre humorem, interdum biliosum acervari contingit. Atque ipsius pituitosi, alius quidem est acidus, alius falsus, alius dulcis, alius denique sensibilis qualitatis expers. Rursus alius est liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dissipatu difficilis. Humoris etiam biliosi, alius est flavus, alius pallidus: in quorum utroq; maximū est, pro majoris minorisq; ratione, discrimen. Singuli igitur memorati humores, cum aut ad alvi excretionem, aut eiusdem cohibitionem plurimum habeant momenti, postquam in tegra ciborum memoratorum corpora cum suis succis in ventrem pervenerint, iis quidem qui e-iusdem secum sunt facultatis, ferunt suppetias.

Alimenta ergo citi tardive transitus esse comperiuntur, aliās ob naturalem nostrā ab initio constitutionem, aliās ob ventris dispositionē acquisitionem, nonnunquam ob peculiarem esculentorum ac potulentorum substantiam. Siquidem atriplex, blitum, malva, cucurbita, quia sunt lenta & perhumida, aliis quæ talia non sunt, celerius subsidunt, in iis potissimum, qui sumptis illis, leviter in pavimento obambulant. Eodem in genere aliquis ponere possit, mora, dulcia cerialia, & ex vinis quæ dulcia simul sunt atq; crassa. Pepones quoque & melepepones, quod humidi sint ac lenti, ventri sunt subducendo idonei, facultatemq; mediocriter abstergēdi habēt, ideoq; inter ea quæ urinam movent, connumerantur.

Ex numero etiam humidorum atq; aquosorum corporum sunt & illa quæ præcoccia, & Persica vocant: & omnino quæ nullam gustantibus aut olfacientibus qualitatem repræsentant. Quæ quidem si venter sit ad dejiciendum proclivis, non ægrè subsident: sin minus, hærent & ipsa sublimia, medium quodammodo inter alvum sistentia, & proritantia, locum sortita. At melocratum, in quibus celeriter distribui anticipat, nihil alvo ad excretionem confert: quinimō cibis secum commistis, ad distributionem præit. Quò si distribui celeriter non antevertat, excretionem, non secus ac flava bilis, sua acrimonia & mordacitate proritat. Atq; horum cibiorum potionumque genus, duntaxat mordicatione sua ventris partes ad expulsionem exusciat.

Alia autem sunt, quæ ventrem subducunt, quod facultates in se medicamentosas habeant commistas: ac proinde horum substantia ex cibo pharmacoq; conflatur. Porro quæ mediū temperamenti sunt, nullaq; vincenti qualitate prædita, ea solum sunt alimenta, non etiam medicamenta, quum nullam aliam dispositionem in animantis corpore ingenerent, sed quale animalis, quod nutritur, corpus assumpserant, tale prorsus conservent. Cæterum si hominis quidem corpus mediū planè temperamenti sit, per alimenta mediū temperamenti eo in statu servabitur. Sin autem frigidius, calidiūve, aut sic-60 cius, aut humidius id fuerit, mediū temperamenti cibum & potum perperam exhibueris. Quippe huiusmodi corpus, quatenus ab exactè media constitutione recessit, eatenus in diversum statum traducatur oportet: idque per præsentis

intemperantiæ contraria, in eodem gradu adhibita. Quare ad præsentem speculationem summe necessarium esse videtur, hominum pariter ac ciborum temperamenta considerasse, ut cognoscamus quænam quibus sint adhibenda. Etenim mel, verbi gratia, calidis & ficcis naturis est adversissimum: frigidis verò ac humidis utilissimum, sive ea temperies sit eis naturalis, sive accesserit propter ætatem, sive propter regionem, aut anni tempus, aut vitæ conditionem. Neque verò satis est principalissimam cuiusque cibi temperiem novisse, sed qualitates etiam quæ hanc sequuntur, callere oportet: quarum multæ quidem in saporibus, quædam in odoribus videntur consistere: quandoquidem cibi ipsi eandem cum iis medicamentis obtinent facultatem, quibus cum sapore conveniunt. Cæterum in commentariis de medicamentis causam explicuimus, quamobrem astringentia quædam non eadem cum aliis astringentibus agant, ut aloë, æsustum, atramentum futorium, flos æris, squammæque, & chalcitis. Siquidem quod in quoque istorum, astringenti facultati alia quæpiam sit mista, evenit ut opera quæ sigilatim edunt, sint diversa, perinde ac si malo cydonio scammoniam intus inseveris: quod interdum utique facimus, partes mali quæ circum semen sunt, exculpentes, deinde cavitatem scammonio replentes, ac postea luto * circumlinentes, assantesq;, atque ita malum mandendum dantes. Quod nanq; hunc in modum præparatum est, absq; stomachi subversione alvum subducit. Quare minimè dubitandum est, quin saporum facultates, actionem suam quam à natura habent, efficiant. Porro in quo qualitas inest astringens, ipsa quantum in seipsa est, vicina corpora cogit, constringit, refrigerat. Idem tamen corpus nonnunquam alias sui partes calefacientes, alias refrigerantes habere potest. Nos autem ex beta & lente cum sale & garo interdum edulium paramus, alvi solvendæ gratia. Sin minus velis subducere, ubi lentem excorricatam bis coxeris (nempe aqua priore effusa) ac dein portiunculam gari atque salis indideris, tantum aceti injicito, quantum gustum minimè offendat. Ita enim pharmacum jucundissimum utilissimumque reddideris, & cibum non paucis eorum qui diuturna conflictantur diarrhœa. Cæterum affectuum cognitio, existit remediorum materia, non autem remedia ipsa: de quorum facultatibus differere in hisce commentariis est animus: quanquam libri solent esse monumenta quædam eruditorum, non rudium & indoctorum perfecta doctrina. Neq; enim quisquam ex libro nauclerus, aut artifex alterius artis evasit. Ac proinde rectè illud vulgò dici videtur, optimam esse doctrinam, quæ viva voce traditur.

¶ De Tritico.

PLURIMUM exigua mole habet redditq; alimentum id triticum, quod densum est, dentibusq; vix dividi potest. Quod huic contrarium existit, magna mole exiguum alimentum largitur. Est autem quod densum est, laxo longè gravior & ponderibus, coloreq; magis flavescent. Porro furfu-

*Cydoni-
li cum
monio p-
ratio, an-
senda*

*Astring-
qualita-
opera*

*Edulium
senda a-
quomodo
peta & l-
paretur*

*Affectu-
gnitio ex
remedior-
materia*

*Libros es-
monimen-
quædam
ditorum*

*Artifex
mo ex lib-
easit*

*Doctrina
laest optin-
que sive
ce explicat-
tur*

*Tritici di-
ferentia*

Panes calfacere.

quàm panes non loti, corpori alimentum præbet & non calefacit, cum ceteri panes calefaciant.

De Hordeo.

Hordeum refrigerat. Hordeum quomodo à tritico differat.

HORDEUM, quoquomodo ipso utaris, vim quandam habere refrigerandi cernitur: qua quidem ratione à tritico differt, nec non quod triticum sanè crassum & lentum humorem gignat, hordeum autem & tenuem & deterforium non nihil. Ceterum polenta quæ ex frixo hordeo conficitur, siccare conspicuè cernitur: quum tamen ipsa ptisana humectet, ubi plurimum intumuerit coctione longa, tandemque in chylum degeneraverit. Acetum autem tunc ei admiscetur, cum planè intumuerit: cum verò cocta fuerit exactè, sub edendi tempus saltem tenuem injicere oportet. Oleum etiam, si in principio statim injeceris, coctioni nihil nocueris. Porro hordeum ex quo conficienda est ptisana, aliquandiu in aqua præmacerandum est, postea verò in mortarium coniectum, usque eò terendum est re aliqua aspera, dum is qui in superficie est cortex, abjectus sit.

Ptisana conficienda ratio.

Ptisana de tergere magis, ubi ex hordeo non plenè decorata confecta fuerit. Ptisana magnifica commendatio.

Quod si non quicquid est paleaceum deciderit, elixa ptisana magis quidem deterget, nulla autem aliam noxam accipiet. Sic præparata ipsius ptisanæ lentor, lævis, continuus, blandus, lubricus, & moderatè humidus est: sitimque arcet, ad abluendumque idoneus, nec astrictionem habet, nec tormina gignit, nec denique in ventre exturgescit, cum intumuerit inter coquendum, quantum intumescere poterat.

De panibus hordeaceis.

Hordeacei panes nutriunt multò minus triticeis, magisque subducuntur per alvum.

Hordeum laudatissimum quale Rugosa semina, deteriora esse. Seminibus quando utendum.

HORDEACEI panes (quorum similes sunt differentiæ illis quas de triticeis tradidimus) multò minus triticeis alunt, magisque subducuntur per alvum, & potissimum si facti ex pejori hordeo fuerint. Laudatissimum autem est hordeum quod candidum, ubi pinsitum est, apparet, non nihilque habet densitatis & ponderis. Porro quod totum plenum est, & circumscriptionem externam habet tensam, melius eo est, quod gracile est & rugosum: id quod seminum omnium tibi sit indicium commune. Ceterum non debes uti seminibus statim post collectionem, sed ubi ea in locis reposueris, diu ab eis abstinere, quò interea pars quidem humoris superflui exhalet, pars autem etiam coquatur. Desluit enim à plantis, fructibus, & seminibus, postquam collecta et reposita fuerint, primum quidem quicquid in ipsis aquosum est, ac tenue: post autem, & non nihil humidi naturalis. Quare quæ diutissimè fuerint reposita, vires habent imbecilliores. Verum hujus terminus sit, cum ab ipsis divisus pulvis quidam tenuis excidit.

Semina quæ diu fuerint reposita, cur vires habent imbecilliores.

De Polenta.

Polenta epota cum vino austero, ventrem siccare.

Polenta quibus plurimum alimenti largiatur.

Ex recenti hordeo mediocriter frixo laudatissima fit polenta. Quum autem polenta omnis quæ rectè est facta, boni sit odoris, ea est suaveolentissima, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod aristam non admodum habeat siccam, confecta est. Quæ quidem si cum vino austero fuerit epota, ventrem desiccet. In universum autem, privatis quidem & in ocio degentibus, plurimum alimenti largitur: iis verò qui quoquo modo exercentur, minus quam quòd sit satis.

De Maza.

AT maza (quæ ex polenta frixa conficitur) tantum in alendo corpore, à panibus hordeaceis, quantum hi à triticeis, relinquitur. Quippe cum hordeum initio suapte natura furfurem haberet non paucum, vel ex se ad concoctionem ineptum, frixum jam, cum ipsum habebit tum sicciorum, tum fractu & comminutu difficiliorum: sicuti & cremorem illum ex quo corpus alimentum sumebat, similiter aridiorem. Quo fit ut maza panibus hordeaceis, ægrius coquatur, magisque ventriculum flatu impleat: in quo etiam si diutius manserit turbationem excitat. Citius autem subducitur, si comesta diutius, atque subacta fuerit. Quod si mel quoque addatur, citius etiam ob id ventrem excitabit ad excretionem. Porro ptisana deterforia & incisoria est: quæ in cute nostra indicat, ipsius sordes eluens. Jam si paulò post, quam ipsam cuiuspiam sorbendam dederis: vomere ipsum compuleris, pituitam quæ in ventriculo continebatur, deterget, & omnia vomitu simul cum ea ejiciet.

Maza a us coqu panibus deaceis tuq, m ventriculo implet.

Ptisana cultas.

De Zea, Typha, & Olyra.

ZE A (quam vulgò speltâ vocant) nutrit quidem hordeo valentius, at impotentius tritico: ac proinde mediam inter triticum & hordeum naturam possidet. Olyra ejusdem cum Zea est generis. Quæ quidem si bona sit, panes ex ea confecti, post triticeos saltem sunt præstantissimi. Secundi ab his sunt qui ex typha parantur. Ex nobilissima autem olyra, ut decet, excorticata, sunt qui nominatum tragus conficiant: quo plerique utuntur, primò in aqua coquentes, deinde ea effusa infundentes sapam, aut vinum dulce, aut mulsum quibus postea superinijciunt & pineas nuces aqua præmaceratas, donec plurimum intumuerint. Quod verò ad colorem nativum pertinet, in hordeo quidem & olyra est albus, in tritico & zea subflavus. At typha flavior tritico existit. In universum autem, quæ semina parva mole multâ reddunt substantiam, eamque crassam & viscidam, optimi succi sunt, ac multi alimenti: non tamen facile per alvum secedunt. Quæ verò his sunt contrariâ, mollem quidem ad laxam habent substantiam: partes autem ipsorum furfureæ, citius quidem subducuntur, sed alunt minus. In iis ipsis, quæ graveolentia sunt & gustum quendam habent injucundum, perspicuum est quòd omnia & pravi sunt succi, & difficilia concoctu.

Spelta. Zea media inter hordeum & triticum. Olyra. Typha. Tragus quomodo præparatur.

Semina multi alunt, parva namque le multam substantiam reddunt. Semina pravi succi quæ.

De Avena, quæ Bromus dicitur.

A V E N A, jumentorum, non hominum, est alimentum, nisi eos extrema fames illa nutriri compellat. Est autem admodum calida, minusque nutrit quam typha: & panis inde confectus, insuavis existit, non tamen alvum aut sistit, aut prurit, sed quod ad id saltem pertinet, medium locum obtinet.

Bromus.

Avena admodum calida.

De Milio & Panico.

P A N I S qui ex milio fit & panico, exigui est alimentum & frigidus, ac præter id, tum præaridus tum friabilis, cum nihil in sese habeat nec lentoris, nec pinguitudinis. Quare alvum humentem desiccet. Porro milium ad omnia est panico præstantius, suaviusque editur: ad hæc conquiritur facile, ventrem minus sistit, ac magis nutrit.

Panicum.

Milium omnia est præstantius.

**DE LEGUMINIBVS, HOC EST,
SEMINIBVS CEREALIBVS, Ex
quibus panis non fit: ac primum
de Oryza.**

ORYZA omnes ad sistendā alvum utuntur: quod semen difficilior quā alica concoquitur, ac minus alit, illa insuavior existēs.

De Lentibus.

SUBSTANTIA lentis crassa, terrea, austera & astringens existit. Succus autem qualitātē astringenti contrariam possidet. Quare decoctū ipsarum sale, garo, aut oleo etiam conditum, alvum deiecit. Ceterū lens bis cocta supprimit alvi profluvia: stomachum, intestina, & totum denique ventrē corroborat. Lens porro decorticata magis nutrit quā quæ cortice spoliata nō est: succum tamen crassum & pravum gignit, nec sic alvi profluvia desiccant. Jure igitur qui largius hoc edulio utuntur, elephantiasim & caneros incurunt: iisq; tantū qui laborant cachexia, utiliter talis cibus præbatur. Qui quidem integrū & inculpatū visum hebetat, ipsum immoderate excans: ei verō qui contrario modo se habet, confert: retinetq; muliebria profluvia. Cū autem prifana, in eo saltem, contrariam ipsi facultatem possideat, ex amborum missione præstantissimū edulium cōficitur, idq; minori portione ipsius prifanz injecta, necnō satureia, aut pulegio addito. In summa verō, lēs adversatur iis, qui crasso melancholicoq; succo redundant. Ceterū in ipsa victus ratione, temporum ratio est habenda, sicuti & regionum, & anni temporū. Etenim autumno melancholicis ac siccantibus cibus abstineri, hyeme autem uti oportet: quemadmodum æstate humectantibus simul & refrigerantibus. At vere, quod medijs temperamentis sit, mediz facultatis cibi sunt dandi.

De Fabis.

CIBUS qui ex fabis conficitur flatulentus est, etiā si coquatur diutissime: id quod sentientes nonnulli, cepas ipsis adjiciunt: cū quicquid flatulentum cibariis inest, corrigatur per calefacientia & tenuentia. Habent autem fabæ substantiam non densam nec gravem, sed fungosam ac levem, quæ vim quandam detergendi possidet. Quare fabacea farina mulieres faciem deungūt: tollit enim lentes quæ in facie apparēt: ob quam sanè facultatem, ventrem non cunctanter fabæ ipsæ permeant. Porro si frixæ fuerint, sicuti & legumina omnia, flatum quidem deponunt, sed concoctū sunt difficillimæ, tardeq; prætereunt, & crassi succi alimentū exhibent. Quæ fabæ si virides quidem collectæ sunt, postea verō assiccata, ut minus nutriunt, sic dejiuntur promptius.

De Faba Aegyptia.

FABA Aegyptia ut magnitudine, sic insita humiditate, quā nostra, est lōgē superior, magisq; etiam excrementitia.

De Pisif.

PISA tota substantia cum fabis sunt confimilia, eodemq; modo sumuntur: non sunt tamen flatulenta usque adeo, nec fortiuntur vim detergendi, ideoq; magis in alvo morantur.

De Ciceribus.

CICER edulium est non minus flatulentum quā faba: sed valentius nutrit illa. Ad venerem autem incitat, creditumq; etiam est semen gignerē. Abstergit præterea cicer magis quā faba: sic ut nigra & exigua cicera manifestē calculos renū, vel hærentes, cōminuant. Satiustamen est succum ipsorum in aqua coctum ebibere.

De Lupinis.

ELIXUS lupinus, ac deinde maceratus in aqua dulci donec omnē insuavitatem exuerit, sic demum manditur cum garo & oxygaro, vel solum cum sale mediocri conditus. Lupini porro substantia, dura & terrestris existit: quocirca ipse concoctū difficilis sit, succumq; crassum gignat, est necessarium. Ex quo nō probē in venis confecto, crudus propriē appellatus succus colligitur. Quare lupinus ipse tardē ac difficulter descendit. In universum autem, ut ea quæ humidiora sunt, consistentia, exiguum corpori dant alimentum, & quod celeriter in halitus digeratur, sic dura & terrestria (ē quorum numero lupinus existit) perdurabile, copiosum, & quod agrē absumatur, largiuntur.

De Fenogrecō, quod πικλὺς dicitur.

INTER manifestē calefacientia hoc semen cōfetur, eundemque hominibus in cibo usum præstat, quem lupini. Præsumitur autem ipsum cum garo, alvi subducendæ gratia. Caput, si sumatur copiosius, ferit. Succus elixi fœnigraci sumptus ex melle, ad omnes pravos humores, qui in intestinis habentur, subducendos est commodus: suo quidem lentore, leniens: calore autem, dolorem mitigans. Quod autem absterioris qualitatis quoq; sit particeps, intestina etiam ad excretionē instigat. Sed parcius mel ei est miscendum, ne mordacitas ipsa exuperet. In diuturnis verō thoracis citra febrim affectibus, pingues cum eo quidem palmulas elixare oportet: ubi autē succum ipsum expressum copioso melli miscueris, ac rursum super carbones ad medium crem crassitiem coxeris, tum demum longē ante cibum eo uti præstat.

De Phaselis & Eruiāla.

HÆC quoque semina homines, quo modo & fœnumgracū, prius in aqua, quoad radicem prodixerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandunt ante alios cibos, garo intingentes. Succum autem, cū coctus est, atque in corpus distributus, habent copiosiores alimenti, quā fœnumgracum. Inter ea tamen quæ succum bonum ac pravum generant, inter concoctū facilia & difficilia, tardē & celeriter transeuntia, flatulenta & flatus expertia, multum ac parum nutritia, medium sibi vendicant locum.

De Cicerula.

SUCCUM habet phaselis & eruiālis facultatē quodammodo similem, sed consistentia crassior rem: ob eamq; ipsam causam, plus aliquantulo, quā illa, nutrit.

De Aracis.

SEMEN hoc & usu & facultate semini cicerulæ est simile, nisi quod durius est, ægriusq; elixatur: ac proinde in ventre difficilior concoquitur.

*Cicer probo-
cat venerē.
Cicerā ni-
gra, calculos
renū fran-
gunt.*

*Lupinus est
concoctu dif-
ficilis, cras-
sumq; succū
producit.*

*Lupinus ali-
mentum co-
piosum, per-
durabileque
largitur.*

*Fœnumgracū
calfacit,
lenit, atq; do-
lore mitigat,
facultatem
etiam possi-
dens abster-
gentem.*

*Fœnigraci
succum auxi-
liari diutur-
nis thoracis
affectibus.*

*Phaselorum
& eruiāla
facilitat.*

*Cicerula
vis.*

*Aracorum
facultas.*

De Dolichis, sive Smilace hortensi.

*Dolichus si-
ve smilax
hortensis.*

QUEMADMODUM frumentacea semina spi-
cis, ita memorata legumina filiquis continentur,
similiterq; ipsos dolichos filiquæ continent: qui
quidem minus sunt flatulenti quàm pisa, necnō
affluentius nutriunt, ac celerius etiam descen-
dunt. Cæterum integros ipsos atque etiānum vi-
rides unā cū suis filiquis, ex oleo & garo, ut plu-
rimum homines mandunt. Nonnulli etiam vi-
num adjiciunt. Sed eos, nisi prius resiccentur, non
reponunt, propter copiosorem humiditatem,
cujus occasione solent corrumpi. In summa ve-
rō, dolichus videtur species esse illius plantæ, quā
hodie phaseolum appellant.

De Orobo sive Eruo.

*Dolichus & i.
detur esse spe-
cies phaseoli.*

Eruum.

Orobus pra-

si est succi.

Orobi expur-

gant pectus.

Orobi dupli-

ces.

ERUUM insuavissimū est, pravi succi: qua-
re homines ab eo, nisi in summa fame, abstinent.
Utimur autem orobis ipsis cum melle, ceu medi-
camentis humores crassos thoracis pulmonisq;
expurgantibus. Porro inter orobos, albi minus
sunt medicamentosi iis, qui ad flavitiem, aut pal-
lorem recedunt. Bis cocti, insuavitatem, ac simul
detergendi incidendiq; vim amittunt, ac sic citra
insignem amarorem desiccandi vim possident.

De Sesamo & Erysim.

*Sesamum
subvertit sto-
machum.*

*Sesamum
crassi est suc-
ci.*

*Sesamum cū
melle in pla-
centulas cogi-
tur.*

*Erysimum.
Sesamū cal-
facit.*

SESAMI semen pingue est, ideoque repositū,
celerrimè fit oleosum. Quamobrem eos qui ip-
so vescuntur, celeriter implet, stomachumq; sub-
vertit, ut pinguia omnia, ac tardè concoquitur,
pingueq; corpori alimentum præbet. Est autem
crassi succi: ideoq; non properè pervadit. Cæte-
rum ipso solo nō usque adeo vescuntur, sed cum
melle coacto in placentulas. Panibus etiam in-
spergitur. Erysimum sesamo quodammodo ef-
se affine videtur, sed eo omnino deterius. Utrū-
que tamen temperie est calidum, quamobrem si-
tim excitant.

De Papaveris semine.

*Papaveris se-
men commo-
dè permisce-
tur panib.
Papaveris
facultates
insignes.*

SATIVI papaveris semen, panibus utiliter
ceu condimentum inspergitur: est tamen album
nigro præstantius. Refrigerandi autem possidet
facultatem, ideoq; somniferum est. Quod si sum-
ptum liberalius fuerit, soporem etiam inducit,
atq; coquitur ægrè. Inhibet præterea quæ ex pul-
mone ac thorace tussi expuuntur. Confert verò
iis qui catarrhis fluxu tenui à capite defluentibus
infestantur: corpori autè multum comme-
morabile alimentum præstat.

*De Lini semine, quod Lino spermon
vocat.*

*Lino spermon.
Lini semen
modicè uri-
nam movet.*

STOMACHO noxium est, coctu difficile, exi-
guumq; alimentum corpori exhibet: modicam
tamen movendæ urinæ possidet facultatem: quæ
magis apparet, cū frixum sumitur. Tunc autè
magis quoque alvum sistit.

*De Ormino, vulgò Gallitricho
appellato.*

*Orminum.
Gallitrichū.*

PARUM in seipso habet alimēti, ut quod me-
diæ inter erysimum & cuminum naturæ existat.

De Cannabis semine.

*Cannabis se-
men calidū,
est, caputq;
ferit.*

Hoc semen concoctu est difficile, stomachoq;
& capiti nocet, ac breviter pravam succum pro-
ducit. Multum autem calefacit, ideoq; sumptum
paulò largius, caput ferit, vaporē suum ad ipsum
mittens, calidum simul & medicamentosum.

De Viticis, sive Agni casti semine.

Id semen etiam per se frixum manditur, cre-
diturq; appetitus inhibere venereos. Alimētum
autem corpori præbet exiguū, idq; siccans refri-
geransq;. Flatus autem valde dissipat: quorum
omnium occasione, iis qui à venere puros se ser-
vare conantur, est accomodum.

De Aphace & Vicia.

Hæc legumina non insuavia modò, sed con-
coctu etiā sunt difficilia, alvumq; inhibent: qua-
re alimentum haud boni succi, sed crassum, atq;
ad humorem melancholicum gignendum, ido-
neum exhibent.

*De seminibus alienigenis, quæ in quog; gene-
re permixta reperiuntur.*

In tritico quidem frequens lolium reperitur:
in hordeis etiam, sed paucum. Quam autem ægi-
lopem vocant, ea in hordeis frequens invenitur:
sicuti in lente aracam, & securinum, & planta il-
la, quam aparinem dicunt, quæ ipsam lentē stran-
gulat. Melampyrum autem nuncupatum ex tri-
tici quoq; mutatione gignitur, sed pravitate quā
plurimum à lolio relinquitur. Non igitur oportet
nos in purgandis seminibus, quæ ad esum cō-
parantur, esse negligentes: persuasos, etiam si no-
xam quæ quotidie fit, ob exiguitatem sensu non
percipimus, quod tamen longo tempore ex ipsa
servatur, tandem erupturum.

*GALENI PERGAMENI
de alimentorum facultate, liber
secundus.*

OMNIA edulia, quæ primo libro fuerunt
commemorata, plantarum erāt semina,
exiguū quiddam à fructibus discrepā-
tia: nunc verò de fructibus agere instituo, in quo
rum visceribus reperiuntur & alia semina, quæ
ab ipsis fructibus maximè diffident: cujusmodi
sunt quæ in ficibus, uvarum acinis, piris, ac de-
nique aliis plantarum fructibus, ut cucurbitis,
peponibus & melopeponibus, licet cernere se-
mina. Cæterum in fabis, lupinis, dolichis, lente,
& aliis id genus seminibus, quæ filiquis obvol-
vuntur, quod quidem ex filiqua semineq; est cō-
positum, ipse fructus existit. Plurima tamen sub-
stantiæ pars in seminibus inest. Porro aliorum
propemodum omnium, quæ primo memoravi-
mus libro, semen duntaxat manditur: solius
autem dolichi, dum adhuc virefcit, fructus in-
reger editur. Unde veterum nonnullos arbi-
tror sub phaseolorum nomine dolichos com-
prehendisse.

*De fructibus fugacibus, quos Græci
ἡγρίους nuncupant.*

HORAMANNI, Græci id tempus appellant, in
cujus medio caniculam exoriri contingit. Tem-
pus autem id dierum est quadraginta: quo tem-
pore omnes horarij (quos vocant) fructus, con-
sistunt, ut cucurbitæ, mora, pepones, melopepo-
nes, persica, & consimilia. Vocant autem ipsos
horarios, quò eos ab iis qui ad reponendū ido-
nei sunt, distinguant. Corruptuntur siquidē fa-
cilè, nec probe asservari queūt, quemadmodum
cerealìa

cerealía omnia. Nonnulli tamen è cucurbitis semen vacuantes, dein earum velut carnē siccantes, in hyemem reponunt. Porro quæ corpus habent cōpactum, ea ut permanentem, sic solidam, terream, multiq; nutrimenti substantiam possident. Quæ verò cōsistentia sunt humida, corrumpuntur, exiguumq; habent alimentū, & quod ex cernatur facile, potissimum cū nitrosum quippiam ipsis inest, ac detergendi facultas. Talia sane deterioris succi esse perhibemus iis, quæ nullam saporis qualitatem habent sensibilem, quomodo aqua optima nullam habet. Hæc igitur omnia & iis multo magis quæ ante exactam maturitatem mandimus, flatulenta quidem sunt, verum subducuntur celerius: quemadmodū etiam quæ succum habent tenuem, citius distribuuntur. Sunt autem omnia hæc pravi succi, solusq; is utiliter ipsis u.etur, qui æstu vehementiore, & longiore itinere sese cōfecerit, tunc enim juvant, corporis squalorem humectantia: & si frigida sumantur, moderate refrigerantia. Etenim humectandi quidem semper habent facultatem: refrigerandi verò nequaquam, si calida, sic ut dixi affectis, fuerint comesta.

De Cucurbita.

CRUDA quidem insuavis est, concoctūq; difficillima: stomachū lædit, nisi vomitione reddatur. Hanc igitur & alia fugaciū pleraq; aut postq̃ elixa fuerint, aut statim certè, aut in sartagine frixa, aut assa, omnes homines esse consueverunt. Siquidem cucurbita elixa, prorsus insipida est: quocirca multos apparandi modos admittit, ut quæ in medio omnis excessus consistat, ob idq; ad quemvis excessum ex æquo duci queat: ac proinde illis quibus mista fuerit, assimilatur. Jam verò cucurbita, quantum in se est, humidum frigidumq; & ob id exiguum corpori alimentum præbet, facile tamen descendit. Sed neq; coquitur ægrè, si modò prius corrupta non fuerit: id quod interdum ei, ut aliis omnibus humidis, si mulac fugacibus accidit, si diutius in ventriculo hæreat. Assa autem vel frixa in sartagine, quam plurimum quidem de propria humiditate depōnit. Cæterum ob aqueam sibi qualitatem innatam, meritò gaudet origano.

De Peponibus.

UNIVERSA Peponum natura frigidior est, cum humiditate copiosa. Habent aut vim quandam abstergendi, cujus beneficio urinam cient, & deorsum expeditius quàm cucurbita, melopeponesq; permeant. Semen autē potentius quàm ipsorum veluti caro, deterget: adeo ut adversus renes calculo infestatos conveniat. Succum tamen in corpore gignit vitiosum, idq; potissimū, cū concoctum probè nō fuerit: quo casu cholera morbo obnoxios consuevit efficere. Quinetiam priusquàm corruptum fuerit, ad vomitum quoq; est idoneum, præcipuè si largius sumat.

De Melopeponibus.

MELOPEPONES minus quàm pepones sunt humidi, nec adeo pravi sunt succi. Minus item urinas movent, tardiusq; deorsum descendunt. Ad vomitum præterea excitandum, non tantum, quantum pepones, habent momenti, nec adeo celeriter in ventriculo corrumpuntur, etsi

in iuvando eo, autumnalibus fructibus longè sint inferiores.

De Cucumeribus.

URINAM quidem & ipsi, quomodo pepones, cient, minus tamen quàm illi, quia ipsorum substantia minus, humida est, ideoque nō facile, ut illi in ventriculo corrumpuntur. Invenias autem qui ipsos concoquant, ob naturæ cum eis familiaritatem. Siquidem à totius substantiæ proprietate, suis cuiq; animantium generi cibis est familiaris: ut coturnicibus quidem elleborus, sturnis autem cicuta. Cæterum quibus biliosus humor, aut omnino pravam excrementū quodvis, in ventriculo sæpe congeritur, in iis quæ natura concoctu facilia sunt, celeriter corrumpuntur. Quod si quispiam eorum aliquid quæ cæteris concoctu sunt difficilia, concoxerit, succus tamen qui ex eo in corpus distribuetur, eandem semper retinebit naturam. Quare omnibus pravi succi edulius censeo abstinendum, etiam si ea quibusdam esse concoctu facilia videantur.

De fructibus qui ab arboribus colliguntur.

EX fructibus quibus vescuntur homines, humidi quidem, tenue humidumque corpori alimentum præbent: quod ob id per corpus celeriter permeat, excerniturq; tū per cutim, tum per urinas. Consistentia autem solidi, ut alimentum copiosius exhibent, sic etiam ad permeandum tardius.

De Ficibus.

FICUS quanquam pravitatem non potuerunt omnino effugere, facile tamen totum corpus pervadunt. Nam & abstergendi quoque insignem obtinent facultatem: quo fit, ut post ipsarum esum, nephritici arenulas multas excernant. Nutriunt præterea uberius cæteris autumnalibus fructibus: flatibus tamen hæ quoque implent. At quæ ficus prorsus jam maturuerit, propemodum nihil omnino lædunt, quomodo nec carica, quæ multiplicem quidem præstat utilitatem: si quis tamen largius eas esitaverit, offendetur ab ipsis, quandoquidem sanguinē non admodum probum gignunt. Quo fit ut ex ipsarum esu pediculorum multitudo proveniat. Habent etiam tenuandi facultatem, & incidendi, qua ventrem quoq; ad excretionem irritant, renesq; expurgant. Cæterum jecori, lieniq; inflammatione obsessis sunt noxiæ: quemadmodum & ficus, cōmuni omnium dulcium ciborum ac potuum ratione. Obstructis tamen illis, aut scirrhoticis, ipsæ ex sese nihil cōmodant, nec officiunt: sed medicamentis incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus mistæ, non mediocriter juvat, tum carica, tum ficus.

De Vitis.

FICUS & Uva quemadmodum inter autumnales fructus principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; pravi succi habent: laxam tamen carnē ac præhumidam gignunt, ob idq; celeriter flaccescerem. Verum uvæ minus alunt quàm ficus, maximumq; id ipsis inest commodum, quod descendant velociter. Quocirca si quādo hæserint, graviter lædūt, quum id minimè maturis ficibus insit. Etenim

Cucumeres movent urinam.

Coturnices vescuntur elleboro. Sturni aluntur cicuta. Bile reduntantem ventriculum, corrumpere cibus concoctus faciles.

Ficus rellunt arenulas facultate excernendi prædita, flatibus tamen implent.

Caricas uberrius sumptas, pediculorum multitudinem gignere. Caricas, si cuscus ad esum inflammatis visceribus communis omnium dulcium ratione.

Vitis minus alunt quàm ficus descendant, velociter.

acino-

*Acinorū sub
stantia ex
quibus con-
stet.*

*Acinorum
semina a-
stringere, ni
hīq; mutari
in corpore.*

*Mustum non
nihil ventrē
flatibus re-
plet, nīq; trā-
seat & veloci-
ter*

*Vn̄ qua nu-
triant ma-
gis, & qua
deiciantur
promptius.*

*Vna venrosa
qua sint.*
*Vas asser-
tandi, in lu-
bria de cōsa
vuarum as-
seratarum
discrimina.*

*Vna dulces
quam vim
possideant.*

Vna austera.

Acida.

Acerba.

Vinosa.

Mustum dul-

cissimum,

subducere

alvum ma-

ximē.

Lora compo-

sitio.

*Lora qua ra-
tione vinosi-
or reddatur*

acinorum substantia, composita est ex carne, hu-
more, seminibus, atq; ambiente pellicula. Cæte-
rum substantia seminis sicca est, & quodammo-
do astringens, omniaq; intestina pervadit, nihil,
quod sensu queat deprehendi, a se mutata: non
secus ac in ficibus *νεγκαμίδες*. Exiguam etiam &
tegumentū acini recipit in ventriculo mutatio-
nem. Quare si sola acinorum caro cum succo sit
transglutita, magis alvus laxabitur. Laxatur au-
tem impensius, cum solus ipse succus expressus
(vulgo mustū appellant) fuerit epotus: qui ven-
trem, ni petranseat velociter, nonnihil flatibus
implet. Ex hoc sanè alimenti nonnihil corpori ac-
cedit: copiosius tamen ex carnea substantia. Er-
go quibus uvis exiguus est succus, eæ magis nu-
triant. Quibus verò uberior, minus quidem nu-
triant, sed promptius deiciuntur. Vocant autē
uvas huiusmodi generosas, quæ humidam qui-
dem substantiam habent exiguam, solidiorē au-
tem non paucam. Quas quidem reponentes, eas
in mustum conijciunt, aut impletas eis novas ol-
las, sic in vinaceis, hoc est, in uvarū reliquiis, re-
condunt, ut ne minimam quidem habeant respi-
rationem. At huiuscemodi sanè uva, ventricu-
lum dissolutum corroborantes, hominibus ap-
petentiam restituunt, nō tamen per alvū descen-
dunt. Quod si sumatur largius, feriunt caput, mi-
nus tamen quàm quæ in musto conduntur. At
pensilis, nihil prorsus caput lædit: ventrē autem
nec sistit, nec ad dejectionē irritat. Porro uva in
musto aut in ollis recondita, aliarum omniū fa-
cillimè concoquuntur. Cum autē non sit parva
differentia inter vuas, quæ sanè dulces existunt,
calidiorē possident succū, ob idq; siticulosæ sunt,
atq; alvum subducunt: austera verò, acidæ, acer-
bæq; frigidorem: ac proinde nō excretioni mo-
dò, sed coctioni, distributioni, & nutritioni sunt
noxia. At qualitatis expertes, quas vinosas appel-
lant, locum inter calidum & frigidum, mediū
obtinēt, Maximè autem subducit alvum, ipsum
mustum dulcissimū. Quod verò ab uvis austeris
aut acidis est expressum, ad omnia pessimum est.
Solent præterea conjectis in parva dolia vina-
ceis, tantū aquæ superaffundere, quoad omnia
permadeant. Quod ubi satis factum videtur, in
doliij fundo foramē aperiunt, ut dilutum (quam
nos appellamus loram) effluat: id quod postea
pro vino bibunt. Capitis tamen dolorem affert,
nisi quis dilutiorem loram ipsam ebibat: quam
vis ocyus per urinas excernitur. Cæterum dilu-
tū id multò vinosius efficitur, si vinaceus ad ver,
aut æstatem, repositus fuerit.

De Vvis passis.

Uvæ passæ cum aliis uvis eandem habent
rationem, quam carica cum ficibus. Cæterum
ut dulces temperamento sunt calidiores, ita auste-
ræ frigidiores: quæ quidem stomachum roborāt,
& ventrem constipant, & his multò magis, acer-
bæ: inter quas mediam quodammodo constitu-
tionem dulces obtinent. His enim ut vis quædam
semper inest contemperandi, ita & mediocriter
detergendi: unde exiguas mordicationes, quæ os
ventriculi infestant, obtundunt. Inter passas au-
tem præstantiores sunt, quæ tum pingues sunt
tum cuticulam habent tenuem. Quæ quidem si

inveteratæ sint, aqua præmaceratæ, purgatæq; à
seminibus, multò præstantiores redduntur. In Ci-
licia tamen crescunt nonnullæ solidæ, minutu-
læq; nullum semen prorsus habentes. Porro in
regionibus frigidis, ne uvæ quidem ipsæ exqui-
sitè maturari queūt, nedum passarū quæpiam:
ob idq; refinam vinis immittunt, ne acescant ce-
leriter. Alimento ex passis tale qualitate in cor-
pus distribuetur, qualis ipsarū natura fuerit: quā-
titate verò, copiosius ex pinguib. dulcibusq; par-
cius ex austeris & macris. Quod si pinguiū dul-
ciumq; repurgatarū parem molem cum pari uva-
rum mole contuleris, passas valentius nutrire
deprehentes.

De Sycaminis, quæ & mora appellantur.

MORA (quorum succum recipit medicamen-
diamoron, ori gratum) celerrimè pertranseunt
cibisq; aliis præeunt, si in ventriculum purū inci-
derint & sumpta in primis epulis fuerint. Quod
si post alios cibos sumatur, aut pravum succum
in ventriculo offenderint, celerrimè computre-
scūt cum aliis cibis, ut in cucurbitis accidit. Qua-
re ut posteriores ij cibi sumendi sunt, qui tardè
permeant: sic omniū primi, qui celeriter quidē
permeant: corrumpuntur tamen, si in ventricu-
lo commorentur diutius. Tempus verò utendi ut
peponibus, ita & moris est, cum corpus ventri-
culi squalore æstuat: quo tempore necesse quo-
dammodo est hepati quoq; idem accidere. Por-
rò moris, cum nō admodum maturaverint, quali-
tas quædam astringens inest, sicuti & immatu-
rioribus acida: unde nonnulli iis resiccatis, ad
diuturna alvi profluvia utuntur. Matura autē, si
corrupta non fuerint, omnino quidē humectāt:
non tamen omnino refrigerant, nisi sumpta fri-
gida fuerint. Alimento verò corpori præbent mi-
nimum, quomodo pepones: non tamē ut ij, vo-
mitum excitant, neq; stomachum lædunt.

De Cerasiis.

Ex cerasiis quædam sunt moris similia, cujus-
modi sunt quæ nullam habent astrictionem: alia
ruborum fructui, ut quæ evidentes astringunt.
Quædam autem sunt quæ vel valentius astring-
unt. Proinde memoratæ cujusq; speciei faculta-
tem, ex iis quæ de moris & rubi fructibus dici-
mus, potes colligere.

De Rubi fructibus, quos Batina vocant.

MAGIS astringunt quàm mora: quod si quis
largius ipsis vescatur, capitis dolorē sentiet. Alij
stomacho anguntur. Proinde ut mora, sic fructū
hunc priusquam edatur, maximè abluere oportet.
Cohibet autem ventrem: atq; medicamenta
omnia quæ ex mororū succo parantur, si ex hoc
rubi fructu fiāt, facultatē habebunt efficaciorē.

De fructibus Canirubi, quos Batina vocant.

MULTO magis quàm ruborū fructus astring-
ūt, ac ventrē cohibet: parūq; alimenti suggerūt.

Juniperi fructus.

FRUCTUS juniperi, acris admodum est, cum
exigua dulcedine, & minori præterea astrictio-
ne. Habet autē & aromaticū quiddam: unde con-
stat, quod calefacit. Omne enim aroma calidū.
Hepar autem & renes purgat, succos crassos &
lentos tenuat: unde medicamenti salubribus
admiscetur. Cæterum alimentū præbet exiguū.

At

At largius sumptus mordet stomachū, caput calfacit: ob idq; ipsum nonnunquā replet infestatq; doloribus: ventremque nec proritat, nec cohibet: urinas tamen mediocriter vacuat.

¶ De fructibus Cedri.

FRUCTUS cedri, fructui juniperi est similis, nisi quòde eo est durior, siccior, exilior & acrior, nihil, ut ille, aromaticū habens. Quare nisi quis ipsum aqua præmaceraverit, nullum corpori alimentum præstat. Valde autem stomachum mori dicat, capitiq; dolorem infert, nisi quis ipsum parvisimè sumpserit.

¶ De Nuce pinea, sive Strobilo.

SUCCI boni est & crassi, multumq; nutrit, nō tamen facile coquitur.

¶ De fructu Myrti.

NUTRIT tenuiter, astringitque valenter, atq; ob id alvum sistit. Cæterum astrictioni habet quandam acrimoniam admistam.

¶ De Persicis.

CORRUMPITUR horum tum succus, tum caro: pravaque ominino sunt. Quare non sunt post alios cibos mandenda (alioqui corrumpuntur, in superficie natantia) sed in primis mensis, ut cætera quæ & mali sunt succi, & subduci facile queunt.

¶ De Armeniacis & præcocibus.

HÆC quoque ex genere sunt persicorum, bonitate nōnihil ea superantia. Neq; enim in ventriculo corrumpuntur ut illa, neq; etiā acescunt: vulgè autē suaviora apparent, unde etiā stomacho sunt gratiora. Præcocia tamē Armeniacis præstant. Porro venterculus, quæ deorsum quidē vergunt, ex molestantibus, ea per alvū expellit. Quæ verò supernatant, per vomitus eiicit.

¶ De Malis.

MALA quidem quæ astringunt, succum habent frigidum atq; terreum. Quæ verò acida apparent, frigidū simul atq; tenuium partium. Mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, quæ tamen ad calidius vergunt: ut ea quæ omnis sunt qualitatis expertia, & veluti aquosa, ad frigidius inclinant. Porro hæc tria saporum nomina, astringens, austerum, acerbum, qualitatem quidem unam significant. Acerba tamē valentius austeris astringunt. Austeris igitur potius uteris, cum venterculus, vel propter calidam intemperiem, vel multam humiditatē, est imbecillus: acerbis autem, cum duo hæc aucta admodū fuerint: acidis, quando succum crassum, qui non magnope-
rè frigidus sit, suspicaberis esse in ipso collectū. Quandoquidem succus frigidus, non acida, sed acria postulat. Utraq; certē & acida & acria, succos crassos incidunt: sed hæc quidem cum calefactione, illa cum refrigeratione id præstant. Jam verò astringentia quidem alvi dejectiones perpetuò cohibent, acida autem cum succum crassum in ventre offenderint, incidunt ipsum, atq; deorsum trudent, ob idq; dejectiones humectant. Quòd si purum ventrē invenerint, ipsum magis sistunt. At succus dulcis, cum purus & per se fuerit, distribuitur celerius: si verò acrimoniam aut crassitiem sortiatur, citius subducitur. Est & aliud succi genus, non pomis modò, sed cæteris omnibus, aqueum & qualitatis expers, quod in

medio memoratarum facultatum, quemadmodum aqua ipsa, consistit. Optima poma (quæ colligi ante maturitatem non debent) sæpe in morbis maximū præsidium afferunt, vel cataplasmatismo modo cum farina admota, vel in calidis cineribus mediocriter assa, vel in aquæ bullientis vapore percocta. Cæterum post cibum statim dare ipsa convenit iis, qui dejecta sunt appetentia, tardeq; concoquunt, aut vomitu, diarrhœa, & dysenteria infestantur. Sed in hunc usum acerbissima sunt commodissima.

¶ Qui fiat ut poma aut pira astringentia, ventrem quibusdam laxent.

UBI post ea quæ fluida & lubrica sunt, astringentia sumuntur, in iis potissimū qui stomachū imbecillum sortiuntur, dejectionē ipsam accelerant, venterculū roborantia, & ad expellendum deorsum, quæ in sese continet, incitantia. Quòd si prima omnium astringentia ingerantur, ac dein quæ pinguiora & magis fluida existunt, os quidem subvertetur venterculi, alvus autē ipsa firmabitur: id quod in Protà Rhetore, usu & experientia exploravi. Quamobrem ubi pallida bilis, aut alius quispiā humor venterculū turbat, si is qui sic est affectus, aliquod astringentiū gustarit, repente deorsum succum infestantem excernit.

¶ De Cydoniis & Struthomelis.

HIS pomis eximium quiddam, quod in aliis non invenitur, inest. Nam præterquam quòd astrictionē possident copiosiore, succus etiam eorū diu permanet, si quis ipsum cum melle coctum asservet: cum aliorum succus si reponatur, acescat, ob exuberantem humiditatem. Quocirca ad exoluti venterculi robur uti succo illorum solemus, ita ut monui, confecto. Sed ex carne ipsorum & melle placentæ quædam parantur prodigiosa perennitatis. Nos verò medicamini quæ ex eorum succo & melle conficitur, nonnihil piperis albi, zingiberis, atq; aceti miscemus.

¶ De Piris & Puniciis.

QUÆ de malorū differentiis diximus, si ad pira punicaq; trāstuleris, nihil erit quod nos de ipsis dicere oporteat. Pirorū igitur usus, pomorum usui est similis. Punica verò, cætera quidem sunt similia: in eo tamen discrepant, quòd nunquam cum hordei farina assentur, neq; in aqua aut vaporibus elixentur. Succum autem habent piris & pomis tum copiosiore, tum gustu suaviorem, interdumq; etiam utiliore: ut puta dum cardialgia, hoc est, mordicatio oris venterculi, infestat. Cum autem minimi nutrimenti sint punica, nunquam ipsis ceu alimento, sed tantum ut medicamento egemus. At pira aliquantulum nutritiūt. Quibus quidem in tenues orbes dissectis, & exiccatis, ac postea tandem elixis, hyeme & vere, vice ciborum utuntur.

¶ De Mespilis & Sorbis.

AMBRO enim astringunt, verū mespila multò valentius quàm sorba: proinde ventri fluenti cibus est, commodissimus: sorba tamen in cibo ipsis sunt suaviora. Quamvis neutro ipsorū ut nutrimento, sed tantum ut medicamento, egemus.

¶ De Palmæ fructu, quem phœnicem, dactylum, & palmulam vocant.

PALMULARUM alia quidē sunt sicce, astringentia.

Mala quando & quibus offerri debent.

Mala acerbissima sunt commodissima.

Astringentia siquidem sumuntur post fluida, deiectionem accelerant: si vero lubricis præsumantur, alvum constriungunt.

Cydoniorum struthomelorumq; succum cum melle asservari, firmareque exoluti venterculi firmitudinem.

Diacryonite vulgo appellatur.

Pirorū usus, qualis malorum.

Punicorum malorū succum cardialgia esse utilis.

Pira quando exiccari debeant.

Mespila. Sorba.

Phœnix. Dactylus. Palmula.

*Palmula
Aegyptia.
ægyptiæ di.*

gentesq; ut Ægyptiæ: aliæ molles, humidæ, & dulces, ut quæ ægyptiæ appellantur. Reliquæ omnes palmæ inter hæc duo genera videntur media. Omnes autē difficiles concoctu sunt, capitiq; dolorē conciliant, si largius fumantur. Porro succus qui ab ipsis in corpus digeritur, crassus omnino est: habet etiam & lentoris quippiā, cum palma ipsa pinguis fuerit. Cum autē dulcedo tali succo permixta sit, celerrimē quidē hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem vel maximē a palmularū esu,* vel inflammatū, vel scirrhus affectum. Post hepar etiā lien & obstruitur, & læditur. Quod autem dulces palmæ succum calidiorē possideant, sicuti & astringentes, magis frigidum: quodq; virides, flatus gignant, nec in regionibus non admodum calidis possint maturescere exactē, perspicuum est.

De Olivis.

*Palmula non
maturefcere
visi in regio-
nibus admo-
dum calidis.
Olivæ parū
nutrimenti
largiri.
Olivæ hal-
madas & co-
lymbadas,
edi ante ali-
os cibos ven-
tris subdu-
cendi gratia.*

EXIGUUM quidem & ipsæ corpori alimen-
tum præbent, potissimūq; caducæ. Edunt au-
tem homines has quidem cum pane, majori ex
parte: sine illo verò, quas halmadas & colymba-
das vocant, idq; garo perfusas, & ante alios ci-
bos ventris subducendi gratia. Porro quemad-
modum caducæ, pinguitudinis habent plurimū,
ita hæ succum astringentem: proinde stomachū
roborant, & appetentiam excitant. In univer-
sum autem, quod suavius est, facilius us quæ ex
æquo sunt salubria, concoquitur.

De Nucibus.

*Sanctiorem
cibū, in qui
ex æquo sunt
salubres, fa-
cilius conco-
qui.
Nuces Pon-
tica.
Ægellana.
Regianunces
astringunt
nonnihil.*

NUCES corpori alimentū præbent exiguum:
copiosius tamen Ponticæ nuncupatæ, quas avel-
lanas appellant, quod substantia ipsarum coac-
tior sit, minusq; oleosa quàm regiarū, hoc est,
cōmunium. Habet tamen & astringentis facul-
tatis exiguū ipsa nux regia, quæ procedente mar-
cescit tempore, tota ipsius substantia, in cibum
pinguem transmutata. Coquitur autē hæc nux
facilius, quàm Pontica, stomachoq; est gratior,
& multo magis quando manditur cum caricis.
Homine à pharmacis letalibus nihil magnope-
re læsum iri, si utraq; has ante alios cibos cū ru-
ta sumpserit, proditū est. Liqueat præterea, quod
humida quibem apta ad dejectionem est, sicca
verò minus. Plerique autem ventris subducendi
gratia, cum garo etiā ipsam præsumunt: in quem
usum viridis est accommodatior, utpote minus a-
stringēs. Quin & siccarū quoq; si in aqua fuerint
præmaceratæ, facultas, viridibus est assimilis.

De Amygdalis.

*Nucem re-
giam, si cum
caricæ & ru-
ta sumatur,
fieri alexi-
pharmacū.
Nucem regi-
am, viridē,
esse aptam
ventri sol-
vendo.*

SOLA in amygdalis tenuandi facultas ac de-
tergendi præpollet, quæ tum viscera purgant, tum
humores è pulmonibus ac thorace, sputis expe-
ctorant: sed potentius quæ amaræ sunt. Sunt au-
tem omnes oleosæ & pinguis qualitatis partici-
pes, minus tamen quàm nuces: quare tardius il-
lis oleosæ fieri cernuntur. Cæterum nec ventri
subducendo conferunt, nec corpus multum nu-
triant.

De Pistacijs, vulgò fisticis appellatis.

*Amygdala-
rū facultas.*

*Amygdalas
amaras dul-
cibus poten-
tiores existe-
re.*

*Amygdala
non multum
nutriunt.*

*Pistacia.
Fistici.*

QUALITATEM obtinent aromaticam, sub-
amaram, & subastringentem. Quare parum qui-
dem nutriunt, verum ad hepar roborandum &
succos in ipsius visceribus infractos purgan-
dos conducunt.

De Prunis.

HIC fructus minimū quidem nutrit, sed ven-
trem mediocriter humectat, atque refrigerat, ip-
sumq; tum humiditate sua, tum lentore, subdu-
cit. Siccatus porro esse esui potest, ut ficus. Da-
mascena pruna perhibetur præstabilissima omnium.
Secundæ tribuuntur partes iis quæ in Hispania p-
veniunt. Maximè illa omnium probatur, quæ cum
mediocri astrictione, magna simul sunt, & laxa.
Cocta in melicrato, in quo plussculū sit mellis, ad
modū alvū deiiciūt, etiā si quis sola ipsa sumpse-
rit, & multo magis, si postea melicratum biberit.
Confert etiā ad subducendam alvū, post sumpta
ipsa, vinū dulce exhibere, temporisq; aliquid in-
terponere, non autē statim post prandere: quod
in omnibus solutivis sit præceptum commune.

De fructu quem Serica appellant.

EXIGUUM quidem est alimenti, & cōcoctu dif-
ficilis, nec juvat quicquam stomachum.

De Ceratijs, hoc est, siliquis: Algarrobas Hispani vocant.

EDULIUM lignosum est, ob idq; pravi succi,
& concoctu difficile existens, non deijcitur facile.

De Cappare.

TENUUM quidem est partiū, ac proinde mi-
nimū alimenti exhibet. Utimur autē fructu hu-
jus plantæ magis ut medicamento, quàm ut ali-
mento. Sale enim cōpersus ad nos importatur, pro-
pterea quod putrescit, si reponatur solus. Ubi
igitur falsuginem deposuerit elota, collapsam ap-
petendi vim excitat, pituitam ventris detergit,
atq; subducit, purgatq; tum lienis, tum hepatis
obstructiones. Uti autem ad eas res oportet an-
te alios omnes cibos ex oxymelite, vel oxelæo.
Hujus etiam plantæ, virides ac teneros surculos,
non aliter quàm terebinthi, mandunt, in aceto si-
mul & muria, aut solo aceto condientes.

De Sycomoris.

PLANTA est parvæ ficui albæ persimilis: cu-
jus fructus exigua est dulcedinis particeps, in
mororum atque ficuum medio consistens, unde
nomen contraxit.

De Persea planta, quæ à Persica di- versa existit.

HUJUS arboris fructū apud Persas adeo esse
noxium fertur, ut perimat: esculentum autē eva-
dere, in Ægyptum translatum.

De Citrio, quod etiam malum Medi- cum vocant.

TRES hujus fructus partes existūt: acida, quæ
in medio ipsius sita est: præterea quæ veluti fru-
ctus est caro: & tertia, quæ ut tegumentum ex-
trinsecus circundatur, suaveolens & aromatica
existens. Atq; hæc sanè concoctu difficilis est, ut-
pote dura & callosa: quanquàm ut medicamen-
tū exhibita, cōcoctioni auxiliatur. Partē autē i-
psius mali acidam, in acetum imbecillum conji-
ciunt, quò ipsum longè acrius reddant. Cæterum
pars inter dictas media, quæ neque aridam neq;
acrem qualitatem sortitur, propter duritiē etiā
concoctu est difficilis: quare ipsam omnes cum
garo & aceto edunt.

De fructibus plantarum agrestium, inter quos sunt quercuum glandes.

PLANTÆ illæ vocantur agrestes, quæ citra mæ-
gonij

*Pruna
Sivas.
Dama
pruna
Pruna
Spania*

*Pruna
in melle
alvum
duceret*

*Solutio
quod
aliqua
pserit
tim illi
dendum*

Serica

*Cerari
Siliqua*

*Cappari
cultat
signes.*

*Cappari
dum in
mis epu
se, idq;
xymeli
oxelæo.*

Sycomori

*Persea
Pm.*

*Malum
dicum.*

Citrium

*quibus co-
tur parti*

*Citry co-
concocti*

auxiliari

Acetum

*becillū co-
citry ac-*

fit acrim

*Planta
stes, quæ
Glandes*

quercina

gonij industriam proveniunt, ut fagus, quercus, ilex, cornus, comarus, rubus, canirubus, acherus, pirus, atq; agricoccymelus, cuius fructus appellatur in Italia unedo, stomachoque nocet, & capitis dolorem conciliat: estq; acerbus cum exigua quadam dulcedine. Porro glandes æquè nutriunt, ac frumentaceorum eduliorum pleraq; Alimentum autem quod ex eis sumitur, tardi est transitus, & crassi succi: ob idq; sunt concocti difficiles. Cæterum Comari fructus: *μυμήκων* appellatus, glande querna ad omnia est deterior: quemadmodum hæc glande, quam vocant castaneam.

De alimento quod à plantis ipsis agrestibus sumitur.

Non modò plantarum semina & fructus, sed etiam integras ipsas sæpenumero mandimus: idq; aut urgente necessitate, aut etiam suavitatis gratia. Siquidem palmæ verticē edimus, nec non tenellas spinas, aut elixas, aut crudas, vel si ad id fame adacti non simus. Cæterum omnia id genus & parcissimè nutriunt, & pravi succi sunt productiva. Quædam etiā ex ipsis, noxam ventriculo adferunt, præter spinas, quæ nunc primum è terra emerferint.

De Lactuca.

Hoc olus succi est, quàm alia omnia, laudabilius. Nam quum reliqua omnia sanguinem gignant paucissimum, ac pravi succi, lactuca nō multum quidem generat: id tamen nec mali succi est, neq; omnino laudabilis. Porro dum essem juvenis, ventriculusq; mihi infestaretur bili, lactuca, quò ipsum refrigerarem, utebar: quū verò ad ætatem declinantem perveni, hoc ipsum olus fuit mihi contra vigilias auxilio, quæ senibus esse annexæ videntur. Habet itaque lactuca succum quidem frigidum atq; humidum, minimè tamen pravam. Quare nec concoctioni resistit, nec perinde ut reliqua olera, ventrem cohibet: sicuti neq; etiam proritat.

De Seri, sive Intybo.

INTYBI facultatem habent lactucis similē: suavitate tamen & cæteris quæ lactucis insunt, ab eis relinquuntur.

De Malva.

DISSIDENT agrestis malva & sativa, quòd hæc quidem humiditate, illa siccitate exuperet. Utraq; autem calorem habet moderatum & tepidum, facileq; subducitur, non modò propter humiditatē, verum etiam propter lentorem, præsertim si cum oleo & garo, copiosa ipsa ingeratur. Nutrit tamen mediocriter.

De Beta.

Succus betæ abstergerendi vim adeò manifestam sortitur, ut ventrem ad excernendum excitet, atq; stomachum mordicet, præsertim quibus sensu exactiori est præditus. Ob idq; edulium id est stomacho noxium, si largius sumatur. Corpori autem ab ipsa, ut ab aliis oleribus, paucum alimentum accedit. Verum obstructū hepar magis quàm malva aperit, præcipuè si cum sinapi, aut saltem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem modo sumpta, utile medicamentum existit.

De Brassica.

BRASSICÆ quidem succus purgatricæ pos-

fidet facultatem, estque non probus, ut lactuca sed pravius graveolensq;: at corpus, cōmuni siccantium ratione, magis sistit quàm laxat. Quare dum humentem alvum resiccare est consilium, brassica ipsa discocta in secūda aqua donec extabescat, utimur. Quippe nihil quod accuratè coquitur, propriū succum servare omnino potest: sed necesse quidem est ut totū abijciat, si coctū diutius fuerit. Quin & lenticulā diximus eodem quo brassicam modo, oportere parari, ut quæ ærunq; possit efficere, ventris subductionē scilicet, & cohibitionem. Cæterū nihil ex iis quæ bis coquuntur, aërem frigidum, aut frigidam aquam attingat, alioqui non extabescet: sed oportet calidam in promptu habere, ut cum ex priori extraxeris, protinus in illam coniicias. Lens itaq; & brassica, æquali inter se mensura siccant, ob idq; visum hebetant. At lens quidem, non exiguum corpori alimentum præstat, idq; crassum & melancholicum: brassica verò paucū habet alimentum, verum quàm lens humidius.

De Atriplice & Blito.

Hæc sunt aliis oleribus aquosiora, nec non qualitatis expertia magis quàm cucurbita, aut saltem non minus, cum cocta videlicet fuerint. Quo fit, ut non ex solo oleo & garo ipsa mandant, sed ætiam etiam iniiciant: alioqui sunt stomacho noxia. Corpori porro alimentū præstant exiguum, non nihilq; ad dejectionem inclinant.

De Portulaca.

NUTRIMENTUM exiguum exhibet, idque humidum, frigidum, atque lentum. Quo sanè lentore suo mordicationis experte, stuporem dentium per sanat.

De Lapatho, quod licet appellare betam agrestem.

Non gustu modò, sed viribus etiam betæ hor tensi est persimile. Quia tamen beta lapathum est suavior, idcirco nemo est, qui ipsa non libentius vescatur.

De Oxylapatho, sive Rumice, sive Lopatho acido.

MULIERES rusticæ laborantes pica, nec non pueri quidem gulosi, oxylapathum crudum interdum mandunt: quod quidem olus non nutrit multò magis quàm lapathum.

De Solano, sive Solatro, sive Morella.

RARO ipso utimur ut alimento: ut medicamento autem, assiduè. Efficax enim est in iis, in quibus astrictionis refrigerantis usus incidit. Minimi autem est nutrimenti.

De Plantis spinosis.

PLERIQUE rusticorū plantis hujuscemodi è terra nuper emerfis, priusquàm ipsarū folia desinant in spinas, vescuntur, non crudis modò, sed in aqua etiam elixis: crudas quidem aceto & garo intingentes, coctis verò præter hæc affundentes oleum. Mediocriter enim juvant ventriculū.

De Cinnara, quam Romani Caccopham, Galli Artichao vocant.

PRAVI succi est edulium, maximè cum plusculum obdurerit. Tunc si quidem ex ea succus melancholicus: ex ipsius autem succo, tenuis ac biliosissimus gignitur. Quare longè satius fuerit ipsam elixam, aut frixam mandere.

Apium.
Petroselinū.
Sion.
Smyrniū.

De Apio, Hipposelino, Sio, & Smyrnio.

Hæc omnia urinas cient: inter quæ apium est usitatissimū, & suave, atq; stomacho gratum. Petroselinum autem, & Sion, insuaviora. Smyrniū verò non est inusitatum. Siquidem Romæ maxima copia manditur, acriusq; multò est quàm apium, necnon calidius: præterea aromaticū etiā nōnihil possidet. Proinde urinas valentius provocat quàm apium, quàmque Hipposelinum & Sion, mensesq; mulieribus movet. Cæterū Hipposelinum ipsum & Sion, cocta mandunt, cum utrunq; ipsorum crudum sit insuave. Nam tametsi nos utilitatem quæ ex cibis provenit spectemus, non voluptatem, quia tamen cibi insuavitas magna ex parte causa est, quo minus ipsi nonnulli conficiant, ob id nimirum satius fuerit cibos condire interdum mediocriter: non uti coqui faciunt, cōdimenta quorum plus interdum concoctioni obsunt, quàm prosint.

De Eruca.

Hoc olus manifestissimè calfaciat, semenq; gignere creditur, & coeundi excitare appetitum. Capiti etiam dolorem infert, præsertim si quis ipso solo vescatur.

De Acalyphe, sive Vrtica.

TENUUM est virium & partium: unde nemo ipsa ut alimēto utitur, nisi fame extrema prematur. Utilis autem est, ut obsonium, ac medicamentum quod alvum dejicit.

De Scandice, Gingidio, quod Chærefolium vocant.

GINGIDIUM non aliter quàm scandix manditur apud nos, stomachumq; admodum juvat, collapsamq; illius appetētiā, si cum aceto sumatur, excitat, sive elixum sive crudum mandere velis. Elixationē tamen diuturniorem nō tolerat. Est porrò non tam alimentū, quàm medicamentū, astrictionē & amarorē nō mediocrem sortitum.

De Ocymo, quod vulgò Basilicon vocant.

Hoc olus ventriculo existit noxium, praviq; succi, & concoctu difficile.

De Fœniculo.

ASSIDUE utuntur anetho quidem in condimentis, fœniculo autem etiam in obsoniis. Nam apud nos sanè reponunt ipsum, eodem modo quo pyrethrum & terebinthum, adeò ut in totum annum sit utile.

De Asparagis.

OMNES propemodum Græci, teneros caules, quo tempore ad fructus ac seminis productionē augescunt, asparagos cōmuniter vocant. Brassicę igitur germen, minus quàm brassica ipsa siccat: tametsi aliorū olerū caulis temperatura sit ut plurimum quàm folia sicciore: ut atriplicis, lactucæ, bliti, betæ, malvęq;. At radiculę asparagus, sicuti & rapæ, sinapi, cardami, pyrethri, & omniū propemodum acriū & calidorū, humidior existit. Bulbus autem, apium, sion, eruca, ocymum, oxylapathum, lapathum, & omnes oleracei generis herbę, antequàm semen effundant, ejusmodi caulem quandam producant, qui post semen effusum siccatur, fitq; ad cibum hominibus utilis. Hæc autē omnia aquę incocta mandunt cum oleo & garo, paucō aceto adjecto. Alimentū tamen paucum dant corpori, neq; id boni succi.

De alio genere asparagorum.

QUI asparagi in oxymyrsine, chamædaphne, oxyacantha, & bryonia proveniūt, ac tum is qui regius, tum qui ἐλαθὺ vocatur, omnes inquam hi stomachū juvant, urinasq; cient, ac parū nutriūt.

De Germinibus.

ARBORUM ac fruticū germina, olerum asparagis proportionē respondent. Quæ quidem omnia aquæ incocta manduntur, præter insuavia quædam ac medicamentosa. Quibus etiam urgente fame, homines vesci coguntur. Omniū tamen præstantissima sunt, terebinthi, viticis, vitis, junci, rubi, & canirubi germina.

De discrimine quod partibus plantarum esculentarum inest.

NON est autem Mnesitheus audiendus, ubi ait, radices omnes cōcoctu difficiles esse, longeq; ipsis foliis crudiores. Radiculę siquidem, radicem habent caule ipso, ac foliis acriorem: similiter cepta, ampeloprasum, porrū, & alliū. Quod si betæ quoq;, & malvæ, & rapæ radicē cōparare ad folia volueris, plus viriū in ea deprehendes: quemadmodū & in althææ, quæ agrestis quædā esse malva videtur. Nā radix ipsius, ut & betæ, cum tumores multos pituitosos discutiat (id quod folia præstare nequeūt) planè facultatē suam indicat. Etenim quod in radicib. id genus probè cōfectū non fuerit, in folia & caulem ipsa natura excernit: ut facere videtur etiā in cervis, totius substantiæ excrementa, ad gignenda cornua, minimè necessaria transmittens. Tutius itaq; est, gustantē prius atq; olfacientem, singulas plantarū partes ipsas per se explorare: post autem experiri mandentem: quandoquidem olfactus & gustus, omne ipsius plantæ temperamentum ostendunt.

De Rapæ sive Buniade.

DURA quidem est, minimèq; esculenta, nisi coquatur. In aqua autē cocta non nutrit minus cōgeneribus aliis. Succū autē in corp⁹ distribuit, mediocri crassiorē, coctionemq; diuturniorē desiderat: atq; illa unicè cōmēdatur, quæ bis cocta fuerit. Quod si crudior sumatur, cōcoctu difficilius, & flatulenta redditur, stomachoq; noxia.

De Aro.

MANDITUR & hujus plantę radix eodē modo quo rapæ. Cæterū dum ipsam coquis, priore aqua effusa, in aliam calidam, eam cōjicere convenit. Quæ autē acrior & medicamentosior existit (qualis in nonnullis regionib. crescit) ad eliciēdos tussi crassos pulmonis succos est præferenda.

De Dracontio.

HUJUS quoq; radicē bis tēve elixātes, quoad medicamentosum omne posuerit, nōnunquā exhibemus mandendam: quemadmodū & ari, quando humores crassi & lenti, qui in thorace ac pulmonibus habentur, vi majori indigent. In universum autē, acria quidē et amara si edantur, corpus parcius nutriunt: insipida autē, & iis adhuc magis dulcia, multū: & multò magis, si compactam adhuc habeant substantiam.

De Asphodelo.

RADIX asphodeli & magnitudine, & figura, & amarore, scillæ radici quodāmodo est similis: facultatemq; habet tenuandi, atq; aperiēdi. Si tamen, ut lupini, paretur, maximam sui amaroris partem

Asparagi
Santes
ver-
triculum,
quinam sin-

Arborum
fruticum
mina.

Menses her-
Radices co-
le & folia
criores &
tentiores;
qua sint.

Radices co-
rheæ, & be-
discutere
pituitosos
mores, qu-
non datur
lis earum
Cervus tot-
substanti-
excrement-

ad gigne-
cornua tri-
miti.
Plantarū
temperam-
tum ostend-

ab olfactu
gustu.
Rapæ.
Bunias.

Aron.

Dracontio
usus.

Nutrire
pus quæ
cus, &
uberius
sint.

Asphodeli
radicis

partem deponit: scillæ autem qualitas difficillime eluitur.

De Bulbis.

BULBUS quoque ejusdem cum predictis est generis: manditur enim ipsius radix sine foliis: vere autem, interdum & asparagus. Facultatem habet in se amarā & austeram, eamque insignem: unde etiam stomachum exolutum, ad appetentiam quodammodo excitat. Cæterum si bulbi elixi bis fuerint, magis quidem nutriunt: verum cum amarorem omnem jam deposuerint, ad versabuntur iis, quæ sputo sunt ejicienda. Quidam ex ipso rum esu liberaliore, semen sibi in auctum, sequi ad venerem alacriores manifestè senserunt. Alimētum porro dant mali succi, nisi probè coquatur.

De Pastinaca, Danco, & Caro.

HORUM quoque radices manduntur: minus tamen quam rapæ & arum Cyrenaicū nutriunt. Calefaciunt autem insigniter, aromaticumque non nihil ostentant: conficiendi tamen difficultas iis inest. Urinam porro cient: & si quis eis copiosius utatur, mediocriter vitiosum succū producūt. Cari tamen radix melioris est succi, quam pastinacæ. Sunt qui pastinacam agrestem appellent daucum: qui urinas quidem movet potentius, sed medicamentosior existit.

De Tuberibus.

HÆC quoque radicibus aut bulbis annumeranda sunt, ut quæ nullam qualitatem habent insignem: crassum autem alimentum largiuntur.

De Fungis.

Ex fungis quidem boleti, si bellè in aqua fuerint elixi, propè accedunt ad insipidos cibos. Alimētum autem ex ipsis est pituitosum, frigidum, praviq; succi. Omnium tamen iis minimū noxiū existunt. Secundi autem post hos, sunt amanitæ. Reliquos verò omnes tutius est ne attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu interierūt. Cæterum oxymeli per se, & cum hyssopo & origano, quibus nitri spuma fuerit inspersa, si propinetur, auxiliatur iis qui ex fungorum esu habent pessimè.

De Radicula.

RADIX ejus ex iis est quibus assidue vescimur: estque obsonium magis quam alimētum: ni mirum quæ & ipsa cum manifesta calefactione attenuandi facultatem sortitur, nam qualitas acris in ipsa superat. Sed caulis ejus elixus magis nutrit quam cruda radícula: paucissimum tamē & ipse alimentum præstat. Mirari autem subit eos medicos & idiotas, qui non sine multorum incommodo, post cœnam crudas eas esitandas tradunt.

De Cepis, Alliis, Porris, & Ampeloprasis.

CORPUS calefaciunt, & qui in ipso sunt humores crassos attenuant, lentosque incidunt. Si cocta autem bis terve fuerint, acrimoniam quidem deponunt, tenuant tamen adhuc, & alimētum corpori dant paucissimum: quod certè priusquam elixa essent, omnino non dabant. Cæterum allium quidem mandūt non ut obsonium, sed ut salubre medicamentum, quod digerendi, & obstructions aperiendi habet facultatem: quod si elixum parū fuerit, vires quidem imbecilliores, succi autem pravitatem non amplius retinet:

quemadmodum nec porra, nec cepæ, quum elixa bis fuerint. Ampeloprasa verò tantum à porris dissident, quantum in aliis omnibus cognationibus agrestia à domesticis. Abstinentium autem ab assiduo usu omnium acrium est, præcipuè natura biliosis. Solis enim qui vel succum pituitosum, vel crudum & crassum ac lentū acervant, ejusmodi cibi expediunt.

Porra.
Cepæ.
Ampeloprasa.

Acres cibi
quibus tantum
conveniunt.

GALENI PERGAMENI

de alimentis, liber III.

De alimento quod à gressilibus animalibus sumitur,



ARTES animalium omnes non eadem facultate sunt præditæ: sed carnes quidem, cum probè elixæ fuerint, optimum gignunt sanguinem, & potissimum, si ex anima-

Carnes elixas optimum gignere sanguinem.

lium boni succi fuerint, cujusmodi est suum genus: nam partes nervosæ, iusto sunt pituitosiores. Omnium itaque ciborum, suum caro potentissimè nutrit. At bubula, alimentum quidē & ipsa corpori suggerit non mediocre, nec dissipatu facile: sanguinem tamē gignit, quam cōveniat, crassiorē. Quod si quis naturali temperamento melancholicus magis fuerit, affectu aliquo melancholico prehenderetur, si largius ea vescatur. Affectus melancholici sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febris quartana, & quæ peculiari nomine melancholia nominatur. Lien autem quibusdā à tali succo intumuit: quam rem cachexia & hydropes sunt consecuti. Cæterum quantum carnes bubulæ totius suæ substantiæ crassitie suillā superant, tantò suillæ bubulas lentore antecedūt.

Nervosæ partes iusto pituitosiores existere.

Suilla caro omnium potentissimè nutrit.

Bubulæ gignere melancholicum sanguinem.

Melancholici affectus qui sint.

Ut autem iis juvenibus qui bono sunt corporis habitu, suæ ætate florentes magis quam porcelli congruunt, sic vituli perfectis bobus, hædiq; capris, sunt præferendi, utpote quorum carnes multo facilius atque præstantius coquantur. Porro capra temperamento minus quam bos est sicca: si tamē sui & homini comparetur, multū superat.

Iuvenibus ætate florentibus, suillas vitulinas, atque hædinas carnes congruere.

Capra temperamento.

Suillas carnes esse humanis similes.

Suillæ autē carnis similitudinē cum humana ex eo poteris intelligere, quod nonnulli carnes humanas pro suillis exhibitas ab hospitibus improbis, sine ulla in gustu vel olfactu suspitione comederint. Merito igitur porcelli alimentum nobis præbent tantò magnis suisbus excrementosis, quanto ipsis sunt humidiores: ac merito etiā minus nutriunt. Nam alimentum humidius ut distribuitur, ita etiam discutitur longè celerius. At agni carnem habent humidissimā, pituitosamque ovium verò excrementosior est, ac deterioris succi. Caprarum quoque caro, præter succū vitiosum acrimoniam etiam sortitur. Hircorum autē, tum ad coquendum, tum ad succum bonum gignendum, est deterrima. Hanc sequitur arietum, post taurorum. Porro in iis omnibus carnes castratorum sunt præstantiores: quemadmodum senū pessimæ. Ad hæc caro leporum, sanguinē quidem gignit crassiorem, sed melioris succi, quam bubula ovillaque. Cervina autem non minus iis succum vitiosum generat, & concoctu difficilem. His agrestium asinorum bene habitorum, ac juvenū caro est propinqua. Sunt tamen qui asinorum,

Porcelli quale alimentum exhibeant.

Alimentum humidius distribuitur celerius.

Agmina carnes.

Ovilla.

Caprilla.

Hircina.

Arietina.

Taurina.

Castratorum carnes sunt præstantiores, ut senū pessimæ.

Leporina.

Cervina.

Asinina.

*Equina car-
nes.
Camelina.
Ursina.
Leonina.
Pardorum.
Vulpina.*

*Assa fixa & sic-
cior quam
elixa, dant
alimentum
corpori.*

Garum.

Album ius.

*Condimento-
rum genera
varia.*

Limaces.

*Limacum
succus subdu-
cit alvum.*

*Limaciscaro-
bis cocta alv-
um sistit.*

*Extrema me-
bra minus a-
lunt, sed deij-
ciuntur prom-
ptius.
Porcellorum
pedes conie-
cti in ptisa-
nam, melio-
rem reddunt.*

Linguae caro.

domesticorum, ubi senuerint, carnes mandunt, quæ pessimi succi sunt, concoctusq; difficillimæ, atq; stomachum lædunt, etiā insuaves inter edendū: quemadmodū equorum & camelorum carnes, quibus & ipsis homines animo & corpore asinini cameliniq; vescuntur. Sunt qui & ursis, & iis adhuc deterioribus, leonibus ac pardis vescantur, semel aut bis elixantes. Vulpiū aut carnibus autumnino apud nos venatores vescuntur: tunc siquidem uvarū usu pinguescunt. Porro animalia omnia quibus alimēta propria affatim suppetunt, longē seipsis in cibo præstantiora evadunt: quēadmodum deteriora fiunt, quibus ea minus adsunt. Cæterum quæ assantes homines mandunt, aut in sartagine frigentes, ea corpori siccius dant alimentum: quæ verò in aqua præcoquunt, humidius: quæ in patinis cōdiuntur, inter hæc media sunt: quanquam & illa ipsa pro modo condituræ inter se multū discrepant. Siquidem quæ vinum aut garum habet copiosum, ea sunt aliis quæ ipsa non habent, sicciora. Rursus quæ exiguum quidem illorū portionem, aut sapæ etiam ampliorem habent, aut in simplici & plebeio, alboq; appellato jure elixa sunt, ea prædictis longē sunt humidiora. Quæ autē in sola aqua coquuntur, iis quoq; adhuc humidiora existūt. Maximū præterea in præparatione discrimen accidit, pro eorum quæ injiciuntur potentia: ut cum omnia ficcant quidem, sed alia magis, alia minus. Sunt porro hæc ex feminibus quidem, anethū, apium, carum, libysticum, cuminū: ex plantis, porrū, cepa, anethum, satureia, thymum, pulegium, mentha odorata, origanum, & alia id genus pertinentia ad obsonatricem commendationem.

De Limacibus.

LIMACES Græci omnes quotidie mandunt, carnem quidem duram habentes, eoq; cōcoctu difficilem, sed quæ confecta potentissimè nutriat. Succus autem ipsis inest qui ventrem subducit: quemadmodum & iis, quibus testa pro cute est. Quapropter quidam oleo, garo, vinoq; ipsos condientes, eo jusculo ad alvum dejiciendam utuntur. Hujus porro animalis caro bis terq; elixa, conditaq; alvum sistit, alimentumq; dat corpori minimè contemnendum.

De animalium pedestrium partibus excarnibus.

EXTREMÆ corporis partes, ut pinguedinis ita substantiæ carnosæ habent minimū. Nervosa enim, hoc est, ligamētosa, & cutacea natura in ipsis præpoller: non tamen tales hi nervi, cutisve sunt, quales in reliquo corpore: nam in excarnibus magis exercitatoria sunt, eoq; magis lenta. Quare meritò quidem corpus minus alunt: ob lentorē tamen facilius dejiciuntur per alvū. Meliores autē sunt pedes suum quàm rostrū: quemadmodum hoc auribus est præstantius. Porcellorum pedes ptisanæ elixæ injecti, illam meliorē efficiunt, ipsi etiam meliores reddit: quare sic in ore & ventriculo melius elaborantur. Quantō aut aliorum animalium carnes alimentum bonitate suilla sunt inferiores, tantō illorum partes excarnes partibus suū excarnibus sunt deteriores.

De animalium pedestrium lingua.

PECULIARIS quædam huic parti substantia

inest: carnem enim habet fungosiorē, ac sanguineam magis: eam tamen haudquaquam solam, sed cum musculis, glādulis, venis, arteriis, & nervis (quæ illi communia sunt) exemptam, solent coquere & mandere.

De Glandulis.

QUANTUM lingua à carnis substantia, tantum glandulæ à linguae substantia recesserunt. Porro glandulas quæ juxta linguam consistunt, ad salivam generandam comparavit natura: ad conficiendum autem lac, mamillares: ob idq; post fœtum cōceptum laxescunt, atque lacte replentur. Omnibus autem glandulis illud cōmune inest, ut suaves in cibo, friabilesq; appareant. Cæterum mamillares, cum imbutæ sunt lacte, de ipsius etiā dulcedine aliquid præ se ferunt. Alimentum autem quod ex iis probè quidem in ventriculo concoctis provenit, propè sanè ad carniū alimētum accedit. Quod si minus quàm par est sint confectæ, succum crudum aut pituitosum generant: humidiores quidem pituitosum, duriores verò crudum.

De testibus.

TESTES, autem cum ex genere sint glandularum, non perinde tamen sunt laudabilis succi ut mamillares: sed habent virosū quiddam, seminis, quod in se generant, naturam referētes, ceu renes urinæ. Animalium gressilium testes, concocti sunt longē difficiliores. Nam testes gallinaceorū altilium & suavissimi sunt, & laudabile corpori alimentū præbent. Renes admodū prævi sunt succi, & concocti difficiles, ut adultiorū animalium testes. Juniorū quippe sunt præstantiores. Porro taurorū, hircorum & arietum, insuaves sunt & mali succi, concoctusq; difficiles. Sues quidem apud nos execant, quod videlicet castratorum caro suavior sit, & alimentum plenioris, concoctusq; facilius: boves autem, ut multo melius eis ad agriculturam utantur, cum non facile tauri domentur. Capræ autem & oves, propter utrunq; usum castrantur. Cæterum omnes memoratorum animalium testes, concoctioni resistunt, ac mali sunt succi: nutriunt tamen, si bellè conficiantur. Quantō autem suum caro aliis præstantior est, tantō horum quoque testes, aliorum animantium testibus sunt meliores. Sorli autem gallorum gallinaceorum undequaque sunt præstantissimi, & potissimum eorū qui saginati fuerint.

De Cerebro.

CEREBRUM omne cibus est pituitosior, crassiq; succi, & tardè permeans, atq; ad coctionem difficilis: nec minimū lædit ventriculū. Excitat præterea nausæā, omninoq; vomitioni est accommodatius, si cōcinnatū cū incidētibz & calefacientibus fuerit. Si tamen rectè concoqui possit, alimentum corpori præstabit nō contemnendum.

De ossium medulla.

HÆC cerebro est dulcior, jucundior & pinguior, nausæamq; provocat, si liberalius sumatur: nutrit tamen & ipsa, si conficiatur probè.

De spinali medulla.

SPINALIS medulla (quæ perperam medulla appellatur) cerebro cōtinua, ejusdemq; cū eo naturæ existit: nisi quod ipso multo est durior, potissimum

*Glandula
linguae
mamillares
usus.
Glandulae
mnes ex
cibo sunt*

*Testes ex
genere
glandularum*

*Testes
gallinaceorum
stant con-
alimentum
laudabile
Renes præ-
stantiores
Testes autem
nos malis
succis.
Castratorum
carnes suavia-
ores, & su-
lentiores*

*Suillam
nem esse
ris præ-
stantiorem.
Gallorum
testes.*

*Cerebrum
seā excitat
Cerebrum
quale ali-
mentum præ-
stabit
Medulla
sum.*

*Spinalis
medulla*

tissimū in infernis spine finibus. Quantum enim à cerebro abscedit, tantum magis durefcit. Pinguitudinis præterea habet minimum, quo fit, ut nauseam non provocet: ac si probè conficiatur, non exiguum corpori alimentum suggerit.

De pinguedine & adipe.

PINGUEDO, humida quæpiā res est, oleo longa vetustate incrassato assimilis: adeps verò pinguitudine multò est sicciior, ideoq; fusus concrefcit facillè. Pauci utraq; est nutrimentū, potiusq; carniū os alentium sunt cōdimenta, q̄ alimenta.

De pedestrium animalium visceribus.

OMNIUM quidē animalium jecur crassi est succi, ac ad coquendū difficile, tardeq; permeat. Omnium autē est præstantissimū, non modò ad voluptatem, sed ad alia omnia, quod ex caricarū esu optimè præparatū fuerit. At lien gustu est suavissimus: in eo tamē reperitur perspicua quædā acerbitas. Meritò etiā pravi succi esse creditur, ut qui sanguinē melancholicū gignat. Utroq; verò tantò pulmo facilius coquitur, quātò est rarior. Multò tamen quod ad nutriendum attinet, est hepatis inferior. Pituitosius autem est alimentū quod exhibet. Cor substantia quidem carō est fibrosa ac dura, ideoq; concoctu difficile: & tardè permeat. Si tamen probè conficiatur, alimentū corpori dat ut non paucum, ita nec mali succi.

De quadrupedum animalium ventriculo, utero, & intestinis.

DURIOR ES carnibus sunt hæ partes: ob id, etiam si ritè conficiantur, succum tamen gignit non planè sanguineum, sed frigidiorē, atq; crudiorē. Proinde multum temporis postulant, priusquā satis confici queant.

De agrestium ac domesticorum animalium differentia.

DOMESTICA animalia, tēperie humidiora sunt q̄ agrestia, tū ob aëris in quo degunt, humiditatē, tū ob vitæ ignaviā. Caro eorū quæ in montibus degūt, ob cōtrarias causas est durior, nulliusq; prorsus pinguedinis, aut paucissimæ participes. Ob idq; plurib. diebus q̄ domesticorū, impuris servatur: alimentūq; exhibet minus excrementitium, eo q̄ à domesticis sumitur: ac proinde & nutrit valentius & succum gignit meliorem.

De lacte.

LAC boum crassissimū ac pinguisimū est: liquidissimū ac minimè pingue, camelorū: mox equarum: deinde asinarū: mediæ autem consistentiæ est caprarū: hoc crassius, ovium. Secundum autem anni tempora, lac post partū est liquidissimum. Temporis verò progressu, magis semper ac magis crassescit. At mediæ estate, ipsum etiam in suæ naturæ medio consistit. Post id autē tempus, sensim jam crassescit, quoad penitus deficiat: sed Vere, ut liquidissimum, ita copiosissimū est. Porro liquidissimum lac, serum: crassissimū, caseum habet plurimū. Meritò igitur liquidius quidem lac, magis: crassius autem, minus alvum subducit. Quinetiam lac quod ignitos lapillos, aut orbiculos ferreos extinxerit, & ventrem sistit, & ijs auxiliatur, quibus venter aërium excrementorū morfu infestatur. Facillè tamen sic paratum lac in ventriculo cogitur: ob idq; mel illi, & salem, adjicimus: sicuti & aquam etiam, quæ seri

acrimoniam corrigit. Constat siquidem lac omnino ex cōtrariis substantiis, sero scilicet, caseo, & pinguitudine, ex qua butyrum conflatur: quo in frigidis plerisq; regionibus, pro oleo utuntur. Cuius pinguis succi asininū lac habet minimū. *

Quo circa rarò alicui in ventriculo cogitur, si statim ut mammis excidit, calidum fuerit epotum. Quod si sal & mel adjiciantur, fieri nō potest, ut ipsum in ventriculo coaguletur. Eandem ob causam magis per alvū dejicitur, ut quod serū multum habeat, à quo lac omne facultatē accipit deijciendi, uti à caseosa substantia sistendi. Quare plurimo sero ad deijciendam alvum usi sunt veteres. Cui quidem tantum mellis optimi & salis est adjiciendū, quantum suave citra stomachi eversionem sentietur. Porro inter omnia quæ mandimus, lac optimū, optimi succi est. Nam quod vitiosum existit, pravo succo utentium corpora replet. Quod si capræ, aut alterius animalis, scammoniū tithymalūve depasti, lac cibi loco quis sumpserit, omnino alv⁹ ei fluat. Lac igitur quod feri habet plurimū, etiam si semper eo utaris, nihil penitus periculi adfert. Quod verò huiusmodi humiditatē habet exiguam, caseosam aut crassitiem multam, eos quidem offendet, qui calculis generandis sunt prompti: jecurq; obstruet ijs, qui hoc affectu facillè prehendi possunt. Thoracis autē ac pulmonis partibus lac omne est utile: capiti verò, nisi quis ipsum habeat admodum firmum, nō est accommodū: ut neq; hypochondriis, quæ levi de causa inflantur: plurimis siquidem in ventriculo in flatu vertitur. Si verò cum aliquo eorum cibariorum, quæ crassi sunt succi, diutius elixum fuerit, flatuosam quidem naturam deponit, sed jecur magis obstruit, & promptius calculos in renibus gignit. Illud igitur lac boni succi & multi alimenti existit, quod ex contrariis substantiis & facultatibus constat, subducendi scilicet, ac sistendi, obstruendi ac tenuandi. Nocet autem ipsius usus assiduus tum dentibus, tum gingivis: has quippe humidas, dentes putrefactioni reddit obnoxios. Cæterum occurre huic malo, si aut diluto, aut meraco vino, cui nonnihil mellis permixtū sit, aut primò quidem melicrato, dein verò astringēte vino, sumpto lacte, os ipsum pollueris.

De oxygala, hoc est, acido lacte.

DENTES qui secundum naturam habent, nihil offendit: eos autē lædit, qui justò frigidiores existūt. Iam verò ventriculus quavis de causa frigidior, oxygala nō bellè concoquit: temperatus verò, quamvis ægrè, conficit tamen id aliquando. Contrà, ventriculi calidiores, præterq̄ quod nihil ab huiusmodi eduliis læduntur, aliquo etiam fruuntur cōmodo. Pro diversa autem ventriculorum natura accidit, ut lac ipsum interdum acescat. Siquidem caloris inopia, in acorē: eiusdem excessus, in nidorem & fumum vertit. Porro oxygala etsi in ventriculo non coquatur, nunquam tamen in nidorem convertitur, potissimum si in ferventissimum ac biliosissimum ventriculū incidat. Est autē natura tum frigidū, tum crassi succi: quare nō facillè à modicæ naturæ corpore cōcoctionē suscipit. Quinetiā cōsentaneum est crudū succū à cibis huiusmodi gigni

Lac ex quibus substantiis constat.

Lac asininū rarò alicui in ventriculo cogitur.

Lac asininū habere plurimum substantiæ serosæ. Sero utebantur veteres ad deijciendam alvum.

Lac optimū optimi est succi.

Lac nimis serosum, obesse non potest. Lac admodum caseosum quibus noceat.

Lac omnè est utile pectori.

Lac quibus noceat.

Lac optimū quale.

Lac nocet dentibus gingivisq;.

Lactis noxiā quæ corrigat.

Oxygala quibus convertitur, aut minime.

Lac quibus
modis scin-
datur.

Lactis par-
tes quæ ma-
gis, et quæ mi-
nus alant.

Non ab re autem eduliū hoc calidissimis est ven-
triculis utile: quemadmodum frigidioribus ad-
versissimū. Ad partes ipsius lactis, citra coagulū,
etiam scissio, quam vocant, discernit, cum lacti
abundē calido oxymel frigidū instillamus. Idem
etiam mulso efficitur. Interdum citra ullam li-
quoris instillationem, vase frigidissimā aquā ha-
bente, in lac demisso, ipsum scindimus. Præterea
sine coagulo id lac, quod post editum fœtū emul-
sum fuerit, cōcrescit protinus, si super cineres ca-
lidos parūper calefiat. Nutrit autē uberius ex la-
cte id quod concretū est: parcius verò, quod se-
rosum existit. Ceterum quod lac à partu concre-
scens, nihil recipit mellis, cōcoctu quidē est dif-
ficilius, atq; succi crassioris: præterea per alvum
tardius secedit, corpus tamen abundē nutrit.

De Caseo.

Du m caseus cōficitur, assumit ab injecto coa-
gulo acrimoniam quandam, humiditatemq; om-
nem deponit, & potissimū si inveteraverit: tūc
enim quā prius, longē acrior evadit, ac manife-
stē calidior, atque ardentior redditur: ob idq; i-
psū, siticulosior, & difficilior cōcoctu, & peio-
ris succi efficitur: ac proinde calculis est generā-
dis. Ubi enim succorū crassities cum ardenti ca-
lore jungitur, illic calculi generātur. Itaq; caseus
id genus, omnium ad omnia est pessimus. Dein-
ceps autem malus quidem, sed prædicto minus
putandus est, qui neq; est vetus, neq; acris. Om-
nium autem caseorum recentium, præstantissi-
mus is habetur, qui à nostris incolis oxygalacti-
nus dicitur, suavissimus quidem in cibo, stoma-
cho autē minimē noxius, aliisq; omnibus caseis
concoctu transituq; facilius: succū habens nō vi-
tiosum, neq; usque adeo crassum. Præstantissimus
etiam est is, quē Romani βῆδῆ appellat. In uni-
versum autē, mollior caseus durior est præstan-
tior: rarus verò ac laxus, denso admodum, & cō-
pacto. Iam verò cum glutinosus valde, & is qui
ad asperitatē usq; est friabilis, sint vitiosi, præstan-
tior est qui inter hos duos est medius. Quod au-
tem ad gustū pertinet, is omnium est præstantissi-
mus, qui nullā vehementē obtinet qualitātē, sed
dulcem habet supra alias parum eminentē. Ru-
ctu etiā, cuius qualitas paulatim marcescit, præ-
stantior: cuius contrā perdurat, non bonus.

De pedestrium animalium sanguine.

SANGUIS omnis concoctu est difficilis, præ-
cipuē crassus & melancholicus, qualis bobus &
apris inest. Leporinus autem, caprinusq;, ut sua-
vissimi celebrantur.

De alimento quod à volucribus ani- malibus sumitur.

AVIUM omnium volatiliū genus paucissi-
mum præstat alimentū, si ad genus gressiliū con-
feratur: potissimū si ad suillam, qua nō aliud in-
venias, quod copiosior sit nutrimenti. Volu-
crium tamen caro concoctu facilius est, præci-
puē perdicis, artagenis, columbæ, galli gallinacei
& gallinæ. Turdorum verò & mēricularū, minu-
torumq; passerulorū caro, quā prædictorum,
est durior. His autē ipsis, turturis, palumbi, ana-
tisq; caro etiam durior existit. At phasianorum
caro, quod ad concoctionem & nutrimentū atti-
net, carni gallinarum est similis: voluptate tamē

in edendo eam superat. His durior est pavonum
caro, & fibrosior, & difficilior concoctu. In uni-
versum autem, augescentiū caro multo est præ-
stantior, quā inclinantium ætate: media verò
est inter utranq;, florentium. Prava autem admo-
dum est novellorū, sed diversa ratione ac senum.
Siquidem horum caro, dura est et sicca, ac nervo-
sa, ideoq; concoctu difficilis, & nutrimenti exi-
gui: contrā animalium nuperrimē æditorum cor-
pora, mucosa sunt ac humida, eoq; excrementis
plena: facilius tamen per alvum descendunt. Se-
cundum etiam præparationis modos, & locos
in quibus ipsa animalia vivunt, non mediocris
eorum est differentia.

De anseribus & struthocamelis.

CARO horum excrementitia existit, multoq;
difficilior concoctu, quā prædictorum volu-
crium. Ipsorum tamen alæ, non sunt cæterorum
alis deteriores: quandoquidem in multis, alarū
substantia fibrosa est & dura. Quarundam autē
caro, tota est eiusmodi: cuiusmodi gruum: quas
tamen & ipsas mandunt, plurimis antē diebus
macerantes & mortificantes. Inter grues & anse-
res, caro tardarum est media.

De differentia quæ est in partibus ani- malium volucrium.

Non manduntur intestina volucrium: ventri-
culi autem & vesci sunt, & nutriunt. Quidam au-
tem ipsorum valde etiam sunt jucundi, ceu anse-
rum: secundum quos, sunt altilium gallinarum.
Ad hæc anserum quibus lac in alimentis misce-
tur, jecur est jucundissimū, atq; potenter nutrit:
& cum sit optimi succi, deijcitur faciliē, probeq;
in ventre cōcoquitur. Ad hæc alæ anserum, & ijs
adhuc magis gallinarum, minimō negotio co-
quuntur. Pedes autem paulo minus omnium, ci-
bo sunt inepti. Cæterum juniorum & probē nu-
tritorum caro, gracilius carni atq; annosorum
præstat. Gallorum testes, præcipuē altilium, præ-
stantissimi sunt, & multo magis, si cibis ipsorū,
quo sunt nutriti, seroso lacte fuerit imbutus. Por-
rò volucria, exiguum quidem habent cerebrū:
ipsum tamen tantò pedestrium cerebro præstan-
tius est, quantò durius. Ac montana sanē, quā
palustria, cerebrum habent præstantius.

De Ovis.

GALLINARUM & phasianorum ova, omni-
bus sunt præstantiora: deteriora autem anserum
& struthocamelorum. Porro quæ ova dicuntur
tremula, ad nutriendum omnium sunt præstantis-
sima. Sorbilia autem, minus quidem nutriunt,
sed subducuntur facilius, & pharyngis asperita-
tes lævigant. Cocta verò, & ad coquendū sunt
difficilia, & tardi transitus, corporiq; crassius ali-
mentum largiuntur. His autē tardius permeant,
& crassioris sunt succi, quæ in calidis assantur ci-
neribus. Quæ verò in sartagine sunt inspissata,
pessimum habent modis omnibus alimentum.
Porro quæ suffocata appellant, sunt elixis atque
assis meliora, parantur autem ad hunc modum:
Ubi enim ipsa oleo & garo, & paucō vini cōsper-
sa fuerint, vas quo cōtinentur, cacabo aquam ca-
lidam habenti induunt. Deinde ubi ipsum totum
supernē obrutarint, ignem substruunt, quoad o-
va mediocrem consuetudinem sortiantur.

Paſſonum
caro.
Carnis
rentia se-
dum as-

Anserum
caro.

Strutho-
melorum

Gruina

Tardarum
caro.

Anserum
ventricu-
lus suus
mum.

Anserum
hepar un-
commentum.

Ala anse-
ra, galli-
ceæq;

Testes gal-
linarum.

Cerebrum
vium.

Ovorum
ferentia.
Ova tremu-
la.

Ova sorbilia.

Ova cocta.

Ova assa-
nata cineribus.

Ova fixa.

Ova suffoca-
ta parantur
modis.

Caseus in ve-
teratus cal-
culū gignit.
Calculi qui-
bus à causis
gignantur.

Oxygalacti-
nus caseum
esse omnium
caseorum o-
ptimum.

βῆδῆ caseus.
Caseorū qui
præferendi.

Sanguis om-
nis est conco-
ctu difficilis.

Suilla carne
nihil nutrire
copiosius.
Volucrium
carnes quæ
facilissimæ,
& quæ ægrius
coquantur.
Phasianorum
caro.

De volucrum animalium sanguine.

GALLINARUM & columbarum sanguine nonnulli vescuntur, maximè altiliū: qui suum sanguine haudquaquā inferior est, neq; suavitatem, neque concoctionis facilitate. Plurimū tamen à leporino relinquitur. Ceterum sanguis omnis concoctu est difficilis & excrementitius.

De nutrimento quod ab aquatilibus animalibus sumitur: & primum de Mugile.

MUGILES ex squammatorum piscium sunt genere. Verū eorū caro, qui in aquis limosis, sordidis & stagnantibus degunt, excrementitia admodum atq; mucosa existit. Optima aut eorum est, qui in puro mari vivunt, præcipuè cum ventorum procellis ipsum mare agitur, atque ad Boream spectat. Nam in quieto, nullisq; agitato fluctibus, tantò piscium caro deterior fit, quanto minus exercitatur. Eorum autem qui in fluviis gignuntur, præstantiores sunt, qui in ijs gignuntur, in quibus aqua rapidè fluit, & copiosa. Qui verò in stagnantibus, nō laudabiles. Præterea penes alimenta ipsa pisces meliores peioresve evadunt. Etenim qui in fluminibus urbem magnam præterfluentibus, hominum stercorebus, & pravis id genus escis victitant, omniū deterrimi sunt. Porro qui mugil in mari gignitur, is à mari longissimè abscedens, adverso flumine natat, numerosasque ac parvas spinas non habet. Qui verò à fluviis stagnisq; ingreditur mare, huiusmodi spinarū est plenus. Nam omniū ferè pisciū caro, qui in stagnis aut fluminibus crescunt, tenuibus spinis plena invenitur, quas nullus marinorū habet. Pauci autē fluvialium mare ingrediuntur: at marini omnes, fluviis gaudent. Mugilis præstantioris caro est jucundior & acrior, necnon expers pinguedinis. Nam pingues, & soluti saporis, & vitiosi sunt succi. Quapropter eos cum origano præparant. Hic piscis unus eorum est, qui conditi sale asservantur.

De Lupo seu Laurace.

Hunc piscem natum in aquis dulcibus non vidimus, sed è mari in flumina aut stagna, ipsum ascendisse cōspeximus: ideoq; parvus rarò, què admodum mugil sæpe, invenitur. Alimentū sanè quod tum ex hoc, tum ex aliis piscibus provenit, sanguinem gignit cōsistentia tenuiorem, quàm quod ex pedestribus animalibus sumitur: adeò ut nō affluenter nutriat, & discutiatur celerius.

De Mullo seu Trigla.

Hic quoq; pelagicis piscibus annumeratur: habetq; aliorū fermè omniū carnem durissimā, & valde friabilem. Ac nutrit sanè cum probè cōfectus fuerit, copiosius omnibus aliis piscibus, quod durior & crassiorum partium existat, habeatq; substantiam alendo corpori accommodatam. Quare nulli caro jucunda est: quæ quidem licet aliorum carne sit durior, mandī tamen quotidie potest, propterea quod friabilis est, & pinguedinis expers, cū quadā acrimonia. Nam pingua & lenta cibaria statim ut sumpta fuerint, celeriter implēt, & appetentiā evertūt. Mulli etiā hepar propter voluptatē à gulosis summopere expetitur. Optimi autem mulli fiunt, ut alii etiā omnes pisces, cum propter mare purū, tum vel

maximè propter alimenta.

De piscibus saxatilibus.

SCARUM, merulam, turdum, juliam, fucam, percam, à petrosis promotoriis maris, in quibus comperiuntur versari, saxatiles appellantur. Inter eos autē scarus excellere suavitatem creditur. Secundum hunc, merulæ, ac turdi. Tertio loco julia, fucæ, ac perca. Porro alimentū quod ex eis sumitur, nō modò concoctu est facilè, sed hominum etiā corporibus saluberrimū, ut quod sanguinem medium consistentia generet.

De Gobione.

GOBIO littoralis est piscis, ex numero etiā eorum, qui parvi perpetuò manent. Præstantissimus autē omniū ad voluptatē, coctionē, distributionem, ac deniq; succi bonitatem is est, qui in arenosis littoribus, aut saxosis promotoriis degit. Ceterū gobiorum caro, ut carne saxatiliū est durior, ita mollior quàm mullorū. Ipsa igitur pro portione, vescentium corpus nutrit.

De piscibus molli carne peditis.

SCARUS itaque primas inter pisces saxatiles obtinet: quibus omnib. caro inest quàm aliis piscibus mollior & friabilior. Sūt qui carnis tantū duritiæ à saxatilibus dissidēt, cuiusmodi sunt pelagici propemodū omnes: nisi si quæ ipsorū pravo alimentō propriā carnē corrumpāt, ut mulli, qui cancellos, animalia flavo colore, minimis cæcis similia, mandūt. Porro saxatiles pisces, nec loca, nec alimentā mutant, nec dulcibus aquis utuntur: ob eamq; causam omnes perpetuò sunt inculpati. At aselli dicti, si probo alimento utantur, & mari puro, carnis bonitate contendunt cum saxatilibus. Qui verò pravo alimento utuntur, aut in aquis mistis, aut vitiosis versantur, carnis quidē non abjiciunt molliem, sed pinguitudinē atq; lentore contrahūt. Quare neq; suaves persistūt, sed alimentū excrementitiū reddunt. In universum autē, pessimi pisces gignuntur in eorū fluviorum ostiis, quæ purgamenta cuiuspiam civitatis magnè recipiūt. Idcirco in eiusmodi fluviorum ostiis (qualis est Romanus præterfluens Tyberis) muræna pessima gignitur: eoq; in ea urbe omniū ferè marinorū piscium ea minimo veditur, cum tamē meliores sint eius fluminis pisces, priusquā is ad urbem perveniat. Quin & alius est fluvius, trecentis & quinquaginta stadiis ab urbe in Tyberim profluens, Nar appellatus, qui pisces habet longè Tyberinis meliores. Similes autem quodammodo inter se sunt, passer & solea, non tamen omnino eiusdem sunt speciei.

Solea nanq; mollior est, & cibo suavior, atque in totum præstantior quàm passer. Quin & lacerti medii quodammodo sunt inter pisces carnis molliis & duræ. Nullus tamen memoratorū piscium, aceto, aut sinapi, aut origano indiget: veluti pingues, lenti, atque duri. Quidam etiam frixis ijs in sartagine aluntur: alii assant, aut in patinis condiunt, ut rhombos, & citharos. Optimè autē omnium condimentum ex albo jure concoquitur, quod in hunc modū paratur. Copiosam aquam primum injice: dein olei quod satis sit affundito: cum paucis anethi, & porri. Ubi verò pisces semicocti fuerint, salis tantum aspergito, quoad totum jus salsum nodum appareat. Hæc siquidem

Saxatiles pisces unde dicantur.

Saxatiles pisces præbere alimentum saluberrimū corpori.

Gobiorum caro.

Scarum.

Mulli. Cancelli.

Pisces pessimi ubi locorum gignantur.

Tyberis. Muræna Romana omnium ferè marinorum piscium minimo genti.

Nar flumen, producere pisces longè Tyberinis meliores.

Passer. Solea. Lacerti.

Albiuris condimentum.

liquidem præparatio vel ægrotis ipsis est cōmoda. Quibus autem inculcata sanitas est, ijs piscium in sartagine frixorum, secundo loco super diatricula assorum, præparatio est conveniens. Hæc tamē, oleum garūmq; cum paucō vino exposcit. At frixis, plus vini, garūq; addere expedit, minimē verō olei. Quod si cui id subvertat stomachum, paratum habeat acetum, modicum in se gari, piperisq; cōtinens. Omnium autem memoratorum piscium alimentum, hominibus o-
ciosis, senibus, imbecillibus, & ægrotis est accōmodatissimum. Qui verō corpus exercēt, cibos firmiores postulant.

¶ De piscibus dura carnis.

Pisces dura carnis qui sunt.

DRACONES quidem, libellæ, cuculi, scorpius, trachurus, mullus, cernua, glaucus, conger, pager, hamya & aquila, inter duræ carnis pisces annumerantur: nonnullæq; mustellorum species.

Galexia.

Nam celebris ille qui apud Romanos galexia dicitur in eorum numero, qui dura carne cōstant, 20

Canis piscis.

habetur. At canis ad cetaceorum genus refertur,

Balene.

Delphinus.

Phoca.

ut qui carnem duram habeat, atque excrementitiam. Quapropter ipso in partes secto et salito,

vescuntur vulgares homines. Ingrati enim saporis est, ac mucosus, ideoq; cum sinapi & oxelæo, atque id genus acribus condimentis eum mandunt. Ex hoc item genere sunt balenæ delphini,

& phocæ: ad quos proximē magni thunni accedunt: quanquam non æquē sunt ut prædicti, ju-

*Thunnos sal-
sos & adere
meliores re-
centibus.*

cundi. Instaves enim sunt hi, præsertim recen-

tes: nam falsi evadūt meliores. Thunnorū autē ca-

ro, qui & ætate & corporis mole sunt minores,

nō perinde dura est, ideoq; hi facilius etiā coquū-

tur: & ijs adhuc magis pelamides, quæ sale cōdi-

tæ laudatissimis salsamentis nō cedunt. Post sar-

das autē & pelamides, myli qui ex Ponto afferū-

tur præcipuē cōmendantur. Post ipsos sunt gra-

culi. Porro duræ carnis pisces, ægrius quā mol-

lis cōcoquantur. Siquidem quæ molliora sunt, fa-

cilius alterantur, quod facilius patiātur. Durior

etia cibus crassiorē habet substantiā, ut mollior

tenuiorē: ac proinde ille succū crassiorē gignit.

*¶ An dura omnia per decoctionem falsos
succos gignant, ut Praxagoras &
Philotimus existimarunt.*

*Decoctum om-
niū, quan-
diu coqui-
tur semper
falsius eva-
dere.*

EQUIDEM omniū decoctū, quamdiu coqui-

tur, falsius semper evadere, post autē, amarum,

deprehendo. Nam corpus ipsum solidum quod

in aquā elixatur, qualitates quæ initio sibi ine-

rant, in ea deponit, sic ut qualitatē expers eva-

dat. Clarius autem huiusce rei veritatem intelli-

ges, si quando quod elixas, in aliam aquā trans-

fusum, secundo & tertio recoquas. Invenies quip-

pe id quod decoquitur, propriā amisisse qualita-

tem, sive falsam, sive acrē, sive etiam acerbam:

aquam autem, eam in se recepisse. Si verō succos

ipsos solos concoxeris, prius quidem falsiores,

postea autē amari etiam fient. Siquidem vel ipsa

aqua optima diutius cocta, falsam qualitatē tan-

dem assumit. Quamobrem, quod ad succos atti-

net, Praxagoram ac Philotimū rectē sensisse, no-

bis est concedendum: quod verō ad solida cor-

pora pertinet, non item.

¶ De animalibus quibus testa pro cute est.

OMNIBUS id genus piscibus commune est,

falsum in carne succum contineant, qui alvum subducit: quod seorsum cuiq; magis minūse in est, pro qualitatē & quantitatis ratione. Siquidem ostreā, inter alia testacea, carnē habent mol-
lissimam: parvæ autem hiatulæ, vertebræ, un-
gues, purpuræ, buccinæ, omniq; eiusmodi, du-
ram. Non ab re igitur ostrea quidem, alvum va-
lentius subducunt, corpus autem imbecillius a-
lunt. Duriora verō, difficilior quidem coquūtur, sed firmioris sunt nutrimentū. Verū hæc quidē om-
nia elixantur. Ostrea verō etiā citra elixationē mā-
duntur. Sunt qui ea in sartagine frigrant. Quem-
admodum autē ex ipsis testaceis, quæ dura sunt, carnem habēt concoctu difficiliorē, sic etiam quæ corrumpatur ægrē. Quare ipsa bis tēve co-
cta, eis exhibemus, quibus ob pravos succus ci-
bi in ventriculo corrumpuntur: gignitur tamen ex ipsis succus crudus plurimus, at ex ijs quæ molli sunt carne, pituita.

¶ De Crustatis.

ASTACI, paguri, cancri, locustæ, carides, gam-

mari, atque id genus alia, tenui testa concludun-

tur, duritiæq; sunt testaceis similia: sed falsi hu-

moris minus quā illa continent, quanquam eū

habent satis multum. Dura in totum carne cō-

stant: ideoq; & concoctu sunt difficilia, & firmi

alimenti, quum scilicet in aqua potulenta per-

cocta fuerint. Horum quoq; caro, ut ostreorum,

ubi percocta, ut dictum est, in aqua succum sal-

sum reliquerit, alvum sistit: ægrē etiam corrup-

puntur, non secus ac testacea, quæ duram car-

nem possident.

¶ De Molliibus.

MOLLIA vocantur, quæ neq; squamas, neq;

asperā cutem, aut testaceam habēt, sed mollem:

at polypi, sepia, lolligines, & his consimilia: quæ

omnia mollia tangenti apparent, duræ tamen

sunt carnis, & difficilia cōcoctu, exiguumq; in se

succum falsum continent. Cæterū si concoquan-

tur, alimentum exhibebunt non paucum corpo-

ri: succi tamen crudi plurimum gignent.

¶ De Cartilagineis.

HORUM animalium cutis est aspera, ac no-

ctu splendicans. Inter ea autem torpedo & pasti-

naca carnem habēt mollem atq; jucundam, ceu

mediocriter per ventrem subeuntem, nec cōco-

ctu difficilem. Nutriunt item mediocriter. Raja

autem, levitaia, squatina, omniāque huiusmodi,

duriora sunt, & concoctu difficiliora, alimentiq;

copiosioris, quā torpedo & pastinaca.

¶ De Cetaceis animalibus.

OMNIA eiusmodi duram & pravi succi, ex-

crementitiāque habent carnem.

¶ De Echinis marinis.

Ex mulso eduntur hi & garo, alvi subducen-

dæ gratia: paraturque in patinis, ovis, pipere, mel-

lèq; injectis. Imbecillis suntimenti, ac mediū in

ter ea quæ humores extenuant & densant.

¶ De Melle.

MEL oritur in foliis plantarum, eiusdem cum

rore generis. Porro in monte Libano quotan-

nis persæpe coria super terram extendūt, ac dein

arbores excutientes, quod ab eis defluit, exci-

piūt, & ollas ac fictilia melle implent: vocantq;

id mel roscidum, & æreum. Proinde constat

materiam

Testa

succu

subdu

Ostre

Ostre

tiam

Testa

ra ca

quib

rant.

Crusta

Molli

intecta

Cartilag

nea.

Torpedo

Pastinac

Raja.

Cetacea.

Echini

rini.

Mel.

Manna

go appella

ortus.

Mel roscid

Mel æreum

materiam ex qua mel gignitur, rori esse congene-
rem. Videtur autem & ex plantis, in quarum fo-
lis colligitur, boni malive quidpiam ipsi accede-
re. Ideoq; laudatissimū in locis mel gignitur, in
quibus thymus, & alia quædam herba & fruti-
ces temperamento calido & sicco, affatim prove-
niunt. Tenuiorū enim est partium id mel: ideoq;
in calidis corporibus promptē in bilem conver-
titur. Frigidis verò est accommodatissimum. Cum
autem tenuiū sit partium, acrimoniæ quiddam
habeat etiam necesse est, quæ vñ ad excretio-
nem prorit. Quam quidem adimētes per inje-
ctionem aquæ, atque coctionem, ipsum redde-
mus ad distributionem atq; concoctionem ac-
comodatius. At melicratum quod paulisper aut
nihil omnino concoctum fuerit, prius deijcitur,
quàm concoqui, & in corpus distribui, & nutri-
re possit. Præterea mel nō planē coctum, in ven-
triculo & intestinis flatus quosdam gignit: con-
trā quod in decoctione spumam omnē abjece-
rit, flatus est expers, & urinam movet. Quod si
quis citra aquæ admisionē mel solum delingat,
nutriet quidem infirmius, sed alvū prōptius de-
jiciet. Largius verò sumptū ventrē superiorem cō-
citare ad vomitū solet. Coctum autē sine aqua,
neq; vomitū similiter movet, neq; alvū subdu-
cit: verū distribuitur & nutrit magis: urinā autē
minus eo quod cum aqua coctū est, movet. Seni-
bus itaq; mel cōmodissimū est: ætate autem flo-
rentibus & calidis, in bilem vertitur.

De Vino.

SI MODO quicquid alit, cibusest, vinū etiā
in genere ciborum est collocandum. Cæterū vi-
norum omnium, rubra simul & crassa, sanguini
generando sunt accommodatissima, ceu quæ mi-
nima mutatione indigeant ut fiant sanguis. Post
ipsa sunt nigra, crassaq; & dulcia: tum quæ colo-
re quidē rubra sunt & nigra, consistentia autem
crassa, unā cum qualitate astringēte. His autem
minus sua natura alunt, quæ alba sunt, simul &
crassa, & acerba. Omnium autem minimum nu-
triant, quæ colore quidem sunt alba, consisten-
tia autem tenuia, & aquis hydromeliti faciendo
appositis, similia quodāmodo. Dulcia verò con-
ficiuntur in ventriculo, & distribuuntur facilius,
quàm austera, ut quæ facultate sunt calidiora.
Quia autem sunt admodum crassa, tardius qui-
dem perficiuntur, atq; distribuuntur. Si tamē in
ventriculum adeo robustum incidant, ut confici
rectē ab eo possint, alimentum copiosius corpo-
ri dabunt. Constat præterea, quod quemadmo-
dum hæc corpora alendo: tenuioribus sunt præ-
stantiora, ita ad urinam ciendam sunt deteriora.

De cibis sale conditis.

ANIMALIUM corpora, quorū carnes simul
duræ sunt & excrementitiæ, sunt ad saliendum
accommoda. Quæ verò aut admodū mollem, aut
valde ficcum, & minimē excrementosum habet
corporis habitum, sunt ad saliendum inepta. Sa-
lis nanq; facultas, humores superfluos tenuat, &
digerit, corporaq; cogit atq; condensat: cum ni-
tri spuma, & laxum aphronitru, tenuare quidē
& discutere possint, cogere verò & condensare
non possint. Suum igitur obeforum & ætate flo-
rentium carnes, ad saliendum sunt cōgruentissi-

mæ, ut quæ ab utroq; extremo absint. Quemad-
modum enim corpora sicca salita, coriis evadūt
similia: sic cōtrā, quæ immodica humiditate dif-
fluunt, salis commercio tabescunt. Ob eam cau-
sam neque pisces mollis carnis, & excrementis
vacui, ut saxatiles & aselli, ad saliendum sunt a-
pti. Graculi verò, pelamides, myli, sardæ, & sar-
denæ, quæq; σαζάνια vocāt, & falsamenta, ad sa-
liendum appositi sunt. Mulli verò, quod dura
eorum sic caro, & ab excrementis pura, nō sunt
ad saliendum accommodi. Ex his autem perspi-
cuum est, ea esse concoctu admodum difficilia,
quæ sale condita, dura & nervosa evadunt, ac
veluti coriacea. Quæ verò contrā habent, te-
nuia quidem ipsa redduntur, mansa autem hu-
mores crassos & glutinosos attenuant. At præ-
stantissima omnium quæ mihi licuit experientia
cognoscere, sunt quæ a veteribus medicis Sardi-
ca falsamenta appellantur.

De medijs edulys.

IN singulis differentiis, quas alimentis inesse
diximus, quædam sunt media. Animalibus au-
tem naturalem temperiem atq; inculpatam ser-
vantibus, similia suis naturis cibaria conveni-
unt: ijs verò quæ pravam temperiem, aut ab ini-
tio sunt sortita, aut post acquisiverunt, non simi-
lium sibi ipsis esus, sed contrariorum est utilis. I-
taque singulæ naturæ suum proprium medium
habebunt, idq; secundum ætatem, vitæ cōditio-
num, institutionum, & regionum, in quibus tan-
diu habitant, differentias.

GALENI PERGAMENI

de euchymia & cacochymia, li-
ber unus.



Nnona caritas assidua, quæ nū pau-
cos abhinc annos multas nationes
Romano imperio subditas afflixit,
coëgitq; vesci alimētis pessimi nu-
trimenti, ac proinde varios, & ma-
ximē perniciosos morbos induxit, planē signifi-
cavit, quantam vitiosi succi ad gignendos mor-
bos vim habeant. Etenim ab ijs alimur, quæ na-
turæ nostræ sunt familiaria: quæ verò illi adver-
santur, nos in perniciem deducūt. Cæterum qui
haustu letalium venenorum pereunt, facile secer-
ni ab ijs possunt, qui ab aliqua corporis affectio-
ne extinguuntur. Neque etiam quispiam infi-
cias ibit, ob humorem quem venenata animan-
tia in ictam particulam infligunt, vel illam cele-
riter vita privari, vel in putredinem labi, vel do-
loribus vehementissimis, aut phlegmone urge-
ri: necnon scorpionem jejuni hominis sputo bis-
tërve aspersum, protinus interire. Nam sicut na-
turæ quædam cum alijs quibq; naturis conveni-
unt, sic altera quoque adversatur alteri, eamque
corrumpit. Porro quandiu ipse patris consilium
sequutus, ab usu immodico fructuum, quos ho-
rarios vocant, abstinui, observaviq; ab illo tra-
ditam optimam victus rationem, tandiu immu-
nis ab omni intemperie perstiti. Quoties au-
tem eius præcepta negligēs, unā cum cōtaneis
meis ultra modū fructibus illis me implevi, sem-
per in morbos incidi, qui sanguinis missionem
desidera-

Pisces apti
ad saliendum.

Sardica sal-
samenta.

Animalibus
temperie na-
turalem ser-
vantibus, si-
milia natu-
ris suis ciba-
ria cōgruunt:
contraria ve-
rò, ijs qui
pravam tē-
peraturam
fortiuntur.

Succos vitio-
sos ad gigne-
dos morbos
maximam
vim habere.
Nutriri nos
ab ijs quæ na-
turæ nostræ
sunt familia-
ria.

Scorpionem
hominis sputo
bis tërve con-
spersum, per-
stiteri.

Galenus quā-
diu ab omni
intemperie
immunis per-
stiterit.

*Galenus pater
in omni disci-
plinarum ge-
nere fuit ver-
satus.*

*Cibus admo-
dum exquisi-
tus non egere
qui possunt
exerceri an-
te cibum.*

*Panis opti-
mus quis sit.*

*Alica.
Suilla caro.*

*Crudos hu-
mores neces-
sario debere
aut concoqui,
aut compu-
rescere.*

*Calculorum
generatio.*

*Exercitium
ante cibum
mediocre.
Tragus.*

*Cibi conside-
res in medio-
critate, om-
nium comen-
datissimi
sunt.*

desiderarent. Erat enim pater meus geometriae, architecturae, astronomiae, arithmeticae, logisticaeque studiis excellens, maximeque omnibus quibus erat notus, ob ipsius iustitiam, modestiam, bonitatemque, ut quivis ex philosophis alius, admirationi. Ceterum qui potest exerceri ante cibum, is haud sane admodum exquisitos cibos desiderat: cui verò negocia & occupationes impedimento sunt, non modo huic probato innoxioque victui, sed salubribus quoque medicamentis est opus. In primis igitur ijs qui quiete ac pro animi sententia vitam traducunt, eam victus rationem describam, ex qua gigni sanguis optimus possit. Dein enitendum est, ut quaedam his etiam praecepta tradantur, qui turbulentam vitam, atque negotiis deditam agunt. Cibi itaque succi probati sunt, ex frumentaceorum genere panes purissimi probeque confecti, adhibita prius maceratione atque fermentatione debita, necnon sale injecto. At cocti in clibano praestant: post quos furnaceis secunda debentur partes. Alica verò, sicuti & suilla caro, si exacte in ventriculo concoquantur, in sanguinemque à jecinore convertantur, probatissimos gignunt humores: aliquid tamen glutinosi in se habent, ob idque in ijs jecur obstruunt, & renes, quibus haec à natura astrictos meatus sortiuntur, ac proinde distributionem impediunt. Horum quoque usus uberior, in supradictis particulis vel gravitate, vel dolorem nonnunquam facit. Quin etiam in venis quae per cava jecinoris, aut per mesaraeon feruntur, redundans humor periculum adfert, ne vel putredinem contrahat, vel eae ipsae particulae in quibus coegeritur, afficiantur phlegmone. Quippe necesse est crudos crassosque humores, vel concoqui, vertique in sanguinem, vel computrescere: non secus ac quae calidis in locis diutius manent. Quamobrem inventa medicamenta salubria sunt, quae tenuandi vim possident, quae obstructionibus liberant. Quamquam horum frequentior usus, vel serosum, vel biliosum, vel melancholicum procedente tempore sanguinem reddit. Quandoquidem id genus medicamenta, non solum incidunt & tenuant, sed etiam immodice calefaciunt: ob idque & solida membra exiccant, & crassum humorem reddunt, quo in renibus asso, gignuntur calculi. Optima itaque corporis constitutio, quae temperatissima est, meatus, per quos humor fertur, patentiores habet: quam quidem talem conservat ante cibos exercitium mediocre. Tragus ex frumentacei generis alimentis, eiusdem cum alica naturae est: agrius tamen concoquitur. Propè etiam natura ovarum atque vires accedunt. Jam verò quae glutinosos crassosque humores gignunt, si in hepate convertantur in sanguinem probum, potentissime nutriunt. Ceterum qui cibi in omnis excessus mediocritate consistunt, ijs omnium commendatissimi sunt. Eius generis panes optimi habentur: praeterea gallinarum gallinaceorumque carnes, necnon phasianorum, perdicum, attagenarum, columbarum, merularum, turdorum, turturumque, & omnium passerulorum. Pisces item saxatiles, pelagici, littorales, gobii, murenque, buglossi, aselli, & simpliciter pisces omnes, qui neque insuave, neque mali odoris, neque glutinosum quicquam gustu representant. Verum ad sa-

nitatem tuendam, si ante cibum corpora moderate exerceantur, mirum in modum prodest: at contra, quies & ocium diuturnum, ijs maximo nocumento est. Qualiscunque autem post cibum motus, alimentum ex ventre crudum in diversas corporis partes distribuit. Porro panis qui nec fermenti, nec salis quod sat est continet, neque probe maceratus nec coctus est, is glutinosum succum producit. Caseus omnis, crassus: vetus, mali succi est: recens verò, succi pravitate caret: qui quidem ex melle sumptus, alvum subducit. Lac autem cum ex triplici, dissimilique substantia constet, nempe serosa, crassa, & pingui: camelinum, asininumque, lac, serosi humoris plus habet: plus crassi & caseosi, ovillum: plus pinguitudinis, bubulum. At lac caprillum, inter cetera lactis genera moderate se habet, ob idque in corporibus nostris medium etiam praestat effectum. Etenim lac quod serosum & tenue est, minus nutrit, sed alvum magis dejicit: contra crassius, minus alvum subducit, ceterum magis nutrit. At lac caprillum, sine melle sumptum, periculosum existit, quod nimirum in ventriculo concrevens strangulet: quemadmodum ubi sanguis in grumos coactus, aut in vulnus aliquod, aut in venter, aut in aliquod intestinorum defluerit, gravissima symptomata inducit. Lac itaque, statim ubi est emulsum, hauriatur. Cui quidem ne in ventre concrevat, mellis, aquae, & salis aliqui solent nonnihil miscere. At quod ex lactis coctione defluit serum, alvum egregie movet. Quae ex lacte & caseo placenta conficitur, itriaque etiam quae ex lacte & similagine constant, crassi succi alimoniam praestant. Cochleae crassi succi censentur: itemque ova, quae vel elixa, vel tosta, penitus sint densata. Frixia verò, mali succi, fumosaque in ventriculo cocturae existunt, secum etiam corrumpentes admissos cibos. Mediocriter verò cocta, quae ideo appellantur tremula, ad coctionem, digestionem, nutritionem, bonique succi generationem, sicuti & quae sorbilia dicimus, ad leniendas gutturis asperitates, idonea sunt. In aquatilibus verò, quae mollia dicuntur, videlicet solligines, sepiæ, polypi, aliaque id genus, crasso & tenaci sunt succo: necnon ex piscibus, quae cetacei generis habentur, cuiusmodi sunt thynni. Sed pelamides ex his magis ad mediocritatem tendunt. Ostreae item, buccinae, purpuræ, crassi admodum succi sunt: ac omnia breviter, quae dura testa integuntur, necnon chamae, patellae, pectines, pinnae, & alia id genus. Quorum omnium succum scire debes, non secus ac serum lactis, alvum dejicere: at solidiores ipsarum partes, serius ob crassitatem concoqui, crudumque & crassum, & frigidum humorem gignere: quales vires in brassica & lente etiam videre licet. Quorum tamen succus, non glutinosus, sed nitrosus, & deiciendo alvo efficax est: sicuti dracunculi acerrimus, & amarissimus. Utrunque etiam aron praestat, sed minus efficaciter. Bulbi austero amaroque sunt succo: ex quibus lotis coctisque, sapius, quicquid superest, crassi succi habetur. Sed fungi inter huius generis cibos, frigidissimo, tenacissimo, & crasso succo redundat: à boletis tantum neminem interiusse memoriae proditum est. Sed hi ubi concoqui nequiverunt, in nonnullis cholerae excitant. Alii omnes

*Exercitium
ante cibum
mediocre
fert ad
tatem a-*

*dam.
Mortis
cibum
moda.
Panis
fuit.*

*Caseorum
ferentia*

*Lactis
stantia
plex.*

*Lactis
ventia.*

*Lac
lum.*

Lac fer-

Lac cr-

Lac cap-

*absque
sumptum*

riculosum

Sanguis

grumosus

ctus gra-

ma sym-

mata in

cit.

Lac sta-

ubi est

ctum, ha-

endum

Serum

alvum

ducit.

Placenta

natura

Cochlea

Ova.

Ova tre-

la.

Ova for-

Pisces

Cetacei

ces.

Testacea

Dracunc-

culus.

Aron.

Bulbi.

Fungi.

Boleti.

omnes fungi periculosissimi sunt. Tuber, leniter
 crassi, non mali succi est: cuius generis amyli ha-
 betur. Itidem nux pinea se habet. In his quæ cras-
 si succi censentur, jecur, renes, & testes annu-
 merandi sunt. Verum jecur mali succi non est: renes
 testesq; non boni, testibus gallinaceorū exceptis.
 Lien ex cæteris animalibus, satis vitiosus est succi,
 melancholicusq;: minus verò nocet suillus. Cor-
 dis substantia durior ac magis fibrosa est, quàm
 quæ in aliis habetur visceribus: quare ipsum non
 nulli inter musculos collocant. Sed musculorum
 verorum capita, nervosiora quoquomodo cæte-
 ra carne sunt, in eaque ex ossibus ligamenta orta
 disseminantur. In fine autem muscoli tendones
 oriuntur: eamq; ob causam extremæ utrinq; mu-
 sculorū partes nervosiores: sicuti & mediæ car-
 nosæ sunt, & uberrimè nutriūt. Porro totus mu-
 sculus propriis quibusdam lineamentis circun-
 scriptus, se junctusque ab aliis partibus cernitur,
 obitq; functionē unam, quæ est ex motibus vo-
 luntariis. Extremæ animalū partes, ligamento-
 sæ existunt, corporiq; alimentū lentum & gluti-
 nosum præbent. Partes etiā quæ penes labia pe-
 destrium sunt, lentum, sed non crassum humore
 gignūt, coquunturq; cōmodè: itemque & volati-
 lium alæ, cōmuni quadā cum corporibus se ex-
 ercentibus ratione. Nam hæc omnia excremen-
 tis carent: quæ verò in ocio degunt, excremen-
 tosa sunt. Suilla cutis præpinguis, ubi probè fue-
 rit elixa, glutinosum, sed non satis quidem cras-
 sum succum præstat: nec veluti extremæ partes,
 concoctionē admittit: nec bonū succum, sed ex-
 crementosiores producit. Cerebrū quoq; pars
 crassi succi est, & quæ dorso medulla excipitur.
 Sunt glandulæ eiusdem naturæ, sed mediocriter:
 necnon juvenū victimarū testes. In universum
 autem partes seniorum, duræ, siccæ, & concoctu
 difficiles sunt: sicuti & juniorum, humidæ, mol-
 lesq; atq;, idcirco faciliores concoctu: his tamen
 exceptis, quæ ubi in lucem æditæ sunt, protinus
 in cibo sumuntur. Sūt enim id genus omnes mu-
 cosæ. Quæ in mammis glandulæ habentur, si lac
 in sese contineant, crassi sunt succi edulia. Quod
 si animal ex quo sumuntur, boni habitus fuerit,
 abundè nutriunt, & bonū succū efficiūt. Etenim
 lac probatissimi succi habetur. Quare nonnulli
 pulmonis ulcere affectos, portione tantum lactis
 curari putant, antea scilicet quàm id ipsum ulcus
 vastius atq; callosum fiat. Sed præ cæteris lac mu-
 liebre, tanq; naturæ eiusdem, nobisq; familiaris-
 simum, commendatur cum ab aliis medicis, tum
 vel maxime ab Herodoto & Euriphone, qui qui-
 dem ubera ab ita affectis fugenda esse pronun-
 ciant. Lac siquidem, simulatq; est emulctū, non
 nihil nativæ bonitatis amittit. Scire autem opor-
 tet, lac ex iis animantibus quidem, quæ boni ha-
 bitus fuerint, boni esse succi: ex iis autē quæ de-
 pravato, nō secus ac sanguis q in illis habetur, ca-
 cochymū existere. Inter crassi succi cibos annu-
 meratur utraq; balanorū species, querna videli-
 cet, ac fructus etiam palmarū. Ex his autem quas
 quercus ferunt, gratæ sunt castanæ & suaves:
 quæ quidē & cōcoquuntur cōmodius, & pravū
 succū non gignunt: ea enim assæ vel elixæ man-
 duntur. At quæ figura oblonga sunt, & similes

palmulis, subus sunt certè nutriendis, haud item
 hominibus congruæ. Illigæ verò glandes duræ
 sunt & acerbæ, ægreq; concoctionē admittunt;
 atq; crassum succū largiuntur: ac proinde vitan-
 dæ sunt. Est autem in austeris quidem remissa a-
 stringendi qualitas, in acerbis autē intensa. Sed
 quantò illigæ glandes valentiorē astringendi po-
 testate cæteras superant, tantò hac in re ab ipsis
 glandibus superantur castanæ: à quarum ta-
 men usu uberiori cavendum, quod & crassi sint
 succi, ægreq; coquantur, ac tum alvum astringe-
 re, tum excitare inflationes possint. Porro pal-
 marū fructus dulcis sunt succi, crassiq;, & astringen-
 tem facultatē habentis: quare facilè jecur ob-
 struit. Siquidē dulces cibi, crassiq; succi, jecino-
 ris ac lienis obstructions faciunt: inchoantemq;
 in visceribus phlegmonē augent: necnon infla-
 tiones, scirrhusa vitia, adeoq; abscessuū genera-
 tiones proritant. Nostri aut corporibus alimen-
 tum accommodatissimū est, quod ex iis rebus con-
 ficitur, quæ nec crassi, nec tenacis sunt succi: hæc
 siquidem moderatæ consistentiæ sanguinem gi-
 gnunt. Quod verò tenue admodum est, parum
 nutrit. In his quoq; vitium est cibus, qui omnino
 friabiles sunt, ut qui paucissimum in se habeant
 lentorem. Panis quippe ex panico, miliove con-
 fectus, dum estur, arenidum quiddam, vel quasi
 cinerem sapit: nisi ei aliquid indideris pinguitu-
 dinis. Quare ad bonam valetudinē ii cibi cōmo-
 dissimi sunt, qui mediam quandam naturā inter
 ea quæ diximus obtinent. Cæterū quæ ex semi-
 nibus, aut omnino ex fructibus intumescunt, ve-
 teremq; protinus siccitatem atq; duritiem depo-
 nunt, mollioraq; & humidiora redduntur, præ-
 stantiora existunt: deteriora verò, quæ pristinam
 duritiem retinent, atque etiam minimè tument.
 Quod verò ad prisanam pertinet, quæ celeriter
 quidem turget, probatissima est: quæ autē post
 multū temporis intumuit parum, vitiosa. Porro
 quod præstantius est triticū, plus quidem: quod
 deterius, minus farinæ reddit. Ii autem fructus
 cōmodè, iudicio meo, asservantur, qui priusquā
 marcescant, siccantur. Nonnulli cucurbitas in te-
 nues offas dissectas, arescere sinunt. At fungi
 cum siccari nequeant, vitium in se habere maxi-
 mum indicant. Paucissimos tamen fructus repe-
 rias, qui siccari nō possint, præter pepones, me-
 lopepones, Armeniaca, Persica, & quæ à Roma-
 nis præcoccia appellantur. Ficus etiā siccata du-
 rant, & cucumeres ut cucurbitæ similiter repo-
 nuntur. Qui cibi ilico in tumorem crescunt, in-
 terim dum in aqua coquuntur, ii & conficiuntur
 aptius, & ad bonos humores gignendos sunt
 præstantiores. Nihil autem in cibariis omnibus
 ad boni succi generationē tam pertinet, quàm si
 probè in ventriculo cōcoquantur: hæc siquidem
 & secundam, quæ in jecore & venis fit, & tertiā,
 quæ in particulis quæ nutriuntur, perficitur, fa-
 cilis concoctionem admittunt. Fit enim nutri-
 tio, alimento secundum qualitatē mutato, & par-
 ticulari quæ nutriuntur assimilato. Cæterū præ-
 parata præcocta, cōmodius transmutantur, q
 cruda, cum ad invicem concoctiones succedant.
 Cunctis igitur corporis partibus jecur alimen-
 tum præparat, illi ventriculus, huic os, ori ars

Illigæ glandes.

Castanæ.

Phænices fa-
cile jecur ob-
struunt.
Dulces cibi,
quæ mala in-
ducant.

Friabiles
cibi.

Panicum.
Milium.

Semina præ-
stantiora
quæ sint.

Prisana qua
præstantior.

Triticum.
Fructus ad
reponendum
aptiores.
Cucurbitæ.
Fungi.

Fructus qui
siccari non
possunt.

Ficus.
Cucumeres.

Concoctio
triplex.

Nutritio quo
modo fit.
Præcocta me-
lius trans-
mutari quā
cruda.
Concoctionis
organum.

*Interanea
animalium.*

Cauda.

*Colla Col-
erium.*

*Ventriculi
gallinacei
anseriniq.
Anserina
carnes.*

*Struthoca-
melorum
partes.
Aures.
Oculi.*

*Sues.
Porcelli.
Suilla caro.
Hedina.
Vitulina.
Agnina.*

Pisana.

Fenogracu.

*Fabazinfla-
tiones gi-
gnunt.
Pisa.*

Lentes.

*Ochri. Dol-
chi.*

Cicerula.

Olyra.

Typhē.

Panicum.

Milium.

Cicer.

Lupinus.

Castanea.

Horai fructus

si corrumpantur in ven-

tre similes le-

talibus vene-

nis reddun-

tur.

Ficus, Vua.

Carica quan-

do pediculos

gignant.

obsonatrix, quæ variis modis concinnat cibos: quibus deniq; omnibus gubernatrix natura fructiferas plantas disponit. At ventriculi, vulvæ, intestinaq; animalium, quò duriori substantia q̄ caro constant, eò etiam concoctu difficiliora, nec adeò boni succi sunt, nec tam apta ad nutriendum. Sed caudæ sunt his quoq; duriores: reliqua verò in ipsis, quæ ad concoctionem & nutritionem spectant, duritiei proportionem respondent: hoc tamen excepto, quòd motionis causa minimè excrementis redundant. Cum his volatilium colla, similitudinem quandam habent. Ventriculi pedestriū & volatiliū, maximè inter se differunt. Nanq; ex volatilibus crassus durusq; est, & concoctu difficilis: at si coquatur, uberrimè nutrit. Gallinæ & anseris præstantissimus est. Cæteræ verò anserinæ partes, alis exceptis, sunt duræ, & excrementosæ, nec facillè concoctionem admittunt. Struthocamelorum membra omnia, dura, excrementitia, & concoctu sunt difficilia. Aurium cartilago & sicca est, & minimè nutrit: earū cutis exterior tenuis aridaq; agrè item cōcoquitur, & parvissimè nutrit. Oculi a paucis eduntur: constant enim ex substantia dissimili. Cæterū eorum muscoli tantum facillimè concoquuntur. Ex animalibus quorū natura est ad gignendos bonos humores aptissima, sues mediocris jam ætatis habentur. Caro ex porcellis parvulis, excrementis scatet. Itaq; ex pedestribus animalibus suilla caro cibis probatissimus est: deinde hædina, mox vitulina. Agnina verò, humida, tum lentorem, mucorēq; in se habere censetur. A cæteris pedestris generis, meo iudicio, abstineat, quisquis boni succi generationi animū curamq; intendit. Pisanam probè ex optimo hordeo confecta, inter cibaria omnia prorsus omni noxa caret: nutrit tamen quàm panis minus. Fænogracum non boni succi est, si quis eo liberalius utatur. Pisanam verò, etsi quotidie ad satietatē sumpseris, nō idcirco boni succi generationē impediās. Idē quoque de fabis dicerem, cum nec mali sint succi, nec ob vim illam detergendi, quam habent, obstructions faciant, nisi inflationes parerēt. At pisum extergendi quidē vim nō æquè habet, ac faba: sed inflatione caret. Lentes & vitiosi succi, & melancholici sunt. Ochri præterea & dolichi his quæ diximus deteriores, & cicerculis meliores habentur. Post hordeum olyra anumeranda est: post hanc typhē. A panico prorsus abstineas. Huic milium confimilis est generis, sed minus malū. Cicer egregiè nutrit, sed nec boni succi est, & inflat nō minus q̄ faba, semenq; auget, ac veneris desiderium. Lupinus nō mali, sed crassi succi est, proptereaq; nutrit egregiè. Fructus quos arbores ferunt, omnes ferè mali sunt succi, castaneis tamē exceptis, quæ si in ventriculo concoquantur, efficaciter nutriūt: atq; eæ crassi quidem, nunq̄ autem sunt mali succi. Cæterum qui fructus horai appellantur, humorem vitiosum gignunt: quod si fortè in ventriculo corrumpantur, similes le- talibus venenis redduntur. At ficus & uvæ cæteris autumnalibus fructibus sunt præstantiores. Quippe maturæ ficus ferè innoxie sunt: uvæ deinde, & eæ quidem appensæ. Veram caricæ, si diutius immorentur in corpore, mali sunt suc-

ci, & pediculorum copiam producunt. Cum nucibus autem sumptæ, cibi præstantissimi sunt, cum amygdalisq; similiter: sed cum his obstructions aperiunt, non tamen ita bonum succum præstant, nutriuntq; ut cum miscentur cum nucibus. Sunt qui caricæ cum ruta nucibusq; præsumptas, venenis universis adversari fateantur. Reliqui arborum fructus mali succi sunt, iūq; potissimum, quos sylvestres plantæ & frutices ferunt. Sed malis, piris, punicisq; ut mespilis, non alimentorū, sed medicamentorū loco utimur, ad ventriculi firmitudinē. Inter fructus quoq; cucumeres, pepones, melopeponesq; cōnumerantur: quorum nullus boni succi est. Quòd si celeriter perfici, digeriq; nō possint, in succum ferè letalibus venenis similem convertuntur. Cucurbita duntaxat ex huiusmodi fructibus damnanda nō est. Si tamen in ventriculo corrumpatur, ipsa etiam malum succum producit. Mora itidem, si perficiantur citò, & priusq̄ corrumpantur transierint, innoxia sunt: nisi iis quispiam liberalius utatur. Ex oleraceis nihil est quòd bonum succum præstet. Lactuca tamen in iis quæ boni malique succi sunt, mediocriter se habet. Post illam malva habetur. Post hanc portulaca, atriplex, blitum, rumex. Sed lactuca agrestis, chondrilla, scandix, gingidium, seris, cichorium, aliaq; ex oleraceis agrestibus omnia, succum vitiosissimū gignunt. Radices olerum in se acrimoniā habentium, ut allii, cepæ, porri, raphani, & pastinacæ sylvestris, malum succū producunt. Sed ari, cari, radix, & rapi, in iis quæ boni praviq; succi sunt, media habetur. Aves piscesq; ferè omnes, boni succi censentur, exceptis lacustribus, palustribus, & qui in immundis fluminibus atq; turbidis degunt. Minus enim hæ natationibus sese exercēt, vitiatq; aère, & pravo victus genere utuntur. Quæ vero in meliores aquas se transferunt, adhuc animalia ea iis deteriora sunt, quæ puro ex mari victitant. Omnia siquidem propemodū animantia, quæ in ea maris parte versantur, quæ dulci aquæ se non immiscet, innoxia sunt: ut pelagica, & saxatilia, quæ tum ad bonos humores gignendos, tum ad gustus ipsius voluptatē, cæteris multò sunt præstantiora. Horū itaq; frequēs usus, tutissimus est. Nonnulla præterea sunt quæ duplici ex humore vivunt, tum marino, tum dulci: ut lupi, capitones, cancri, gobii, murenæ, anguillæ. Sed quæ puro ex mari victu petūt, ea & boni odoris sunt, & gustui suavia: pinguedinis autem aut nihil omnino, vel paucissimū in se cōtinent: diutiusq; a putredine illæsa durant (quibus signis discernuntur ab aliis) præsertim si nive obducantur. Ad hunc enim modum quæ duriori sunt carne, præstantiores evadunt. Murenæ igitur ex aquis impuris, pessimæ. Anguillæ nunq̄ boni sunt succi, vel si in puro humore versentur, nedū in eo qui purgamenta urbiū recipit. Secundū quoq; locorum pasturas, pisces & meliores & deteriores fiūt: id quòd odore & gustu explorabis facillè. Cæterum neq; auxiliorū, neq; exactā salubrium ciborum notitiā consequitur is, qui illorū vires accuratissimè norit, nisi corporū quoq; atq; particularū naturas, quorū causa cibi expetuntur, agnoscat. Ex his enim nonnulla sunt densa, & quæ spirare non possunt:

Carica

ruta

basque

sumpt

versan

nis.

Fructi

bus ut

camer

mur.

Cucur

Peponi

Melopi

nes.

Cucur

Mora

Olerace

nia can

ma.

Olerum

ria spec

Radice

rum ac

niā bl

tium.

Aves, l

Pelagica

pisces.

Saxatili

Pisces da

ci ex aqu

si denter

Pisces pa

ex mari

etum capi

res.

Murenæ

Anguilla

quam bon

sunt succi

Corporum

differenti

possunt: laxa nonnulla, & quæ inaniuntur facile: eamq; ob causam humidior illa alimēto egent, hæc sicciore. Alia item glutinosius, alia tenacius, alia parcius, alia uberius alimentū desiderant. Similiter, quibus sanguis est admodū melancholicus, humidi calidiq; cibi sunt dandi: quibus verò biliosior, frigi & humidi. Verū ubi pituitosus existit, cibi tunc opus est qui calefaciendi sic eandique vires obtineant. Qui probo sanguine abundant, alendi sunt parcius iis cibis, qui naturam mediam sortiantur, sic ut neq; aliqua primarum qualitatū excellant, nec crassi ac tenues, nec lenti aut aridi, aut deniq; friabiles sint. Porro ariditas, in duris valideq; siccis rebus: friabilitas autem, in mollibus, mediisque inter humida & sicca invenitur. Commune tamen utriq; est, ut tenaci lentore careat omnino. Ex vinis quæ aquosa tenuiaq; sunt, urinas movent, & paucissimi sunt nutrimenti: crassa verò, ut Theræum & Scybelites, quæ absolutæ dulcedinis sunt, non leviter quidem nutriunt Cilicium vinum, austerū simul & dulce existit. Quæ Ægis & Perperinæ proveniunt, medium inter dulcem & exquisitè astringentem qualitatem, saporem reddunt: nigraq; hæc omnia sunt. Nulla enim vina invenies crassa pariter & dulcia, quæ nigra non sint. Alba vina haudquaquā dulcia sunt, sed alia austera & crassa, alia aquosa & tenuia. Ex flavis autem, rutilisq; nonnulla mediocriter dulcia sunt, sicuti Hippodamantiū, Faustinum, Falernum: nonnulla omnino dulcedine carent. Sunt autem his rubra crassiora, & ex rubris, quæ proxima colore ipso nigris sunt. Nutriunt autē hæc omnia crassitudinis proportionē: eamq; ob causam, qui indigent refectione, ut dulce vinū potent, ludandi sunt: ac tum præcipuè, cum horum jecur, lien, & renes, vitio penitus carent. Verū cui crassus succus per venas redundat, tenuis substantiæ vinum: cui frigidus, acris & vetustum: cui non frigidus, quod neq; acris neq; vetustum sit, accommodatum est. Ad bonos autē humores gignendos, odoratū præstantius: sed tamen caput tentat. Tenuē, ciendæ urinæ magis idoneum, capiti nullam infert noxam. Vitanda quæ crassa simul, malique odoris, gustuiq; ingrata & austera sunt. Ex vix probatissimi succi Falernū habetur, potissimumq; id quod dulcius. Ad alvi fluxiones sistendas, austeris utimur vinis: quæ ad nullos alios usus accommodare solemus. Cæterū in ipsorum vinorū exhibitione, non minus regionum, temporū, exercitiorumq; quàm affectuū, & temperaturarū hominū, ratio est habenda, sic ut moderata conservemus similibus, immoderata corrigamus contrariis. Temperaturis igitur frigidioribus, rutilum dulceq; vinum, utpote calidū, accommodatū est. Contrariū verò, temperamenti atq; dispositionibus calidis: quod illud calefaciat impense, capitisque dolores, & febres facile inferat, nervosq; nonnunquam lædat. Quod aut crassa vina dulciaq; deiciant alvum, nemini obsecrum est. Mustum etenim, licet coquatur agrè, crassumque succum & inflationes gignat, alvum tamen subducit: id quod si interdum efficere nequeat, mirum in modum nocet. Vitanda ergo quæ nimis vetusta sunt, nimisve recentia. Namq;

illa præter modum, hæc nullatenus, quandiu recentia fuerint, calefaciunt: quæ tantum abest ut aliquem usum cibis concoquendis afferant, ut etiam ipsamet conficiantur ægerime. Præterea nec commodè per alvū transeunt, nec digeruntur, nec urinas movent, nec sanguinis confectioni nutritioniq; idonea sunt. Sæpe etiam, ut aqua; in ventre suspensa remanent: ut si paulò amplius ex iis hauseris, facillimè coacescant. Sed ex recentibus vinis genus illud duntaxat tutò bibitur, quod tenuis substantiæ est: sicuti ex Italicis, Carchanum, Albanum, & ex Sabinis Thuscisq; nonnulla. Aminæū quoque quod in eo colle nascitur qui Neapoli imminet, citò ut bibatur idoneum redditur: quale apud nos in Asia est Tibinū, Arsinium, & Titacazenum. Quæ sanè tenuia, candida, & aquosa existunt, ideoq; oligophora vocantur. Et quemadmodū rutila vina, cum calida potestate sint, replent protinus caput, sic illa, nempe tenuia, & aquosa, leniterq; astringentia, non modo capiti innoxia sunt, sed etiam leves eos capitis dolores nonnunquam tollunt, qui ab humoribus in ventriculo collectis proficiunt. Quin & aquæ potio, vitium præcipuè in se habentis, nonnullis capitis dolores infert: nam & ipsa corrumpitur, & naturale robur exolvit. Quod fit, ut ubi ventriculum invalidum reddidit, in cavas eius partes ex reliquo corpore sanies quædam biliosa defluere consueverit, more eorum quos premit inedia. Quibus sanè offensis, noxisq; dictum vinū, sui temperamēti ratione, hominem actutum liberat: pauloq; post, ubi firmavit ventriculum, quæ illi noxia sunt, ad partes infernas deferat. His ergo qui calido admodū temperamento sunt, aquæ potus longè accommodatior est vino: quod utiq; si interdū propinare expediat, sit quidem tenue, leniterq; austerū. Ex vinis itaq; quod vetustissimum est, adeò ab albo & austero, necnō recente & crasso distinguitur, ut illud quidem efficacissimè calefaciat, sensibilem hoc refrigerandi facultatem obtineat. Dulcissimum autē acerrimumq; mel, eximie æstimationis est. Verū cuiuslibet generis mel calefaciendi vires sortitur, sumptumque à calidis corporibus facile in bilem vertitur. Idcirco pituitosis admodum naturis, ætateq; & senio confectis, utiliter datur: frigidis quoq; morbis accommodatissimū est. Acetū mulsum, hoc est, oxymel, sanitatis tuendæ gratia ætatibus naturisq; omnibus utilissimum est: siquidē obstructions omnes discutit, astrictosque meatus ita aperit, ut nulla in parte crassi glutinosiq; succi adhærescant. Quare medicamenta salubria, tenuandi omnia in se potestate habent, tutioraq; ad valetudinem tuendam cēsentur, quàm quæ crassiores humores gignūt: sed bonā habitudinē, roburq; efficere nequeunt. Vitanda autē penitus quæ viciosi sunt succi, præterquam æstate, cum languentem corporum siccitati & calori occurrendum est. His enim hoc ipso tempore, mæla, pruna, cerasa, mora que idonea sunt: item cucumeres, pepones, melopeponesq; sed parcius his uti convenit. Dantur quoq; præcoccia, persica, & quæ à Romanis milce dicitur, refrigerata tamē: necnon spuma lactis, atq; etiā cibaria ex lacte confecta. Ficus item frigida.

Vina Calida
sua calfacere
impensius, rō
centia nulla
tenus.

Aminæum
vinum.

Aquæ potio
qua mala
inferat.

Aquæ potus
quibus con-
veniat.

Mel omne
calfacit, atq;
in corporib.
calidis bile-
scit facile.
Mel quibus
conveniat.

Oxymel æta-
tibus & na-
turis esse om-
nibus utile.

Cibi æstate
admittendi.

& cucurbitæ, ita affectis accommodæ sunt. Prudens tamen vir, ad refrigerandos æstus ex balneis rediens, epota prius aqua, mox vino mediocriter aquoso, iisque per vomitum redditis, lactucam edat, quæ innoxia est, simulq; vires habet refrigerandi. Sumat postea suillos pedes bene decoctos, ex aceto & garo: itemq; alas gallinæ vel anseris, & eiusdem etiam ventriculum, necnon pisces nonnullos frixos, ex iis qui molli sunt carne. Danda item ex oleribus quæ mali succi non sunt, sicuti malva, cucurbita quæ. Vinum postea, ubi frigida aqua dilutum sit; potet. Mihi sapius similes æstus & calores perpeffo, ptisana cremor bene refrigeratus fuit satis. Sunt qui nive refrigerentur. Sed hæc illius præcepta traduntur, qui assiduis occupationibus impediuntur: qui verò huiusmodi sunt soluti negotiis, si exercitatione uti solent, quàm rarissimè frigido potu indigent. Qui minimè exercitantur, summæ æstate cum vehemēti calore urgentur, aquam fontaneam bibant, ab usuq; nivis abstineant. Hæc siquidem, quamvis protinus nullam corporibus juvenum læsionem sensibilem inferat, sensim tamen, occulteq; crescente vitio, cum jam ætas progressu temporis inclinarit, articulos, viscera, nervosq; iis morbis vexat, qui vel difficulter admodum, vel omnino tolli nō possunt: nimirū semper imbecilliori particula, faciliè quancunq; excipiente læsionem. Quod autem vitio si humores morbos gignant, cruditas assidua maximè in causa est. Ea autem cruditas deterior est aliis, quam vitiosi succi cibaria effecerūt. Quæ cum duplici modo se habeant, si tenuem quidem succum reddant, acutos morbos cum maleficiis quoq; febribus invehunt: succorumq; vitio in unam duntaxat particulam decumbente, tunc erysipelata, herpes, aliæq; affectiones calidæ oriuntur. Si verò crassum succum efficiant, articulorum & renum vitia, podagræ, anhelationes, tum lienis jecinorisq; scirrhusi affectus gignuntur. At quibus malus corporis humor melancholicus fuerit, affectus melancholici orientur. Sed ex humoribus mixtis, mixtæ affectiones proveniunt.

GALENI PERGAMENI

de attenuante victus ratione, liber unus.



Um victus ratio attenuans plerisq; diuturnis morbis, ut arthritidi, dysipnæ, tumoribus lienis & hepatis, necnon morbo comitiali incipienti, adeo conferat, ut sola ea, sine ullo alio medicamento, sublata sæpe ii fuerint, operæ precium videretur aliquid & de ipsa perscribere. Vocant autem eam attenuantem, quemadmodum incrassantem, quæ illi contraria existit: pro eo humore scilicet, quem utraque in nostris corporibus gignit. Etenim olfactus & gustus, mentem nostram ad omnes eiusmodi cibos discernendos, satis abundè instruunt. Quippe quæ sensus nostros pungunt & mordicant, ea omnia constat esse acria, & quæ succos crassos tenuare queat. Quæ etiā, si largius æquo sumpta fuerint,

ventriculū mordicant, ciborumq; nauseam magnam inducunt, & halitus acres emittunt. Plurima autem eorū urinas & sudores graveolentes & acres promovent: alia autem divellunt, erodunt atq; pertundunt. Cæterum corpora in quibus humores frigidi, crassi & lenti redundant, huiusmodi ciborū usu majori ex parte juvantur. Nemo igitur est qui allium, cepam, nasturtium, porrum, & sinapi, in genere ignoret esse tenuantium: post illa autem, smyrniū, pyrethrum, origanum, calaminthen, sisymbrium, pulegium, sarureiam, thymū: quæ omnia viridia quidem manduntur: exiccata verò, jam non amplius sunt cibi, sed medicamenta. In summa, omne quod siccum est, viridi valentius existit. Eorum verò quæ sicca non sunt, maturiora minus maturis: & quæ in montibus & locis siccis proveniunt, iis quæ in campestribus, planis, hortis, & paludibus crescunt, sunt fortiora. Prædictis autem ordine proxima est capparitis, & terebinthi fructus: his autem eruca, sium, apium, petroselinum, orminū, raphanis, brassica, & beta. Malva verò & blitū, & atriplex, tamen si iis specie sint proxima, facultatibus tamen dissident: aquea enim sunt, minimūq; acris facultatis sortiuntur: quomodo cucurbitæ, citrulli, melones, melopepones, & pruna: humida siquidē sunt hæc omnia, nec non frigida & pituitosa, potissimū si cruda & non elixa mandantur. Omnia igitur tenera & incrementa, facultatibus moderata existunt. Quo fit ut pleraque medicamenta, dum oriuntur & adolefcunt, non secus ac cibi mandantur: ut silphii, sinapis, pyrethri, & iringii stolones, quæ omnia ubi comaturuerunt, magnam habent vim incidendi. Tenuant verò admodum, dum oriuntur, atque adolefcunt. Pari modo & urtica, priusquam exiccetur est esculenta: præterea fœniculus, ruta, coriandrum, anethum, eiusdem cum illis sunt speciei, evidenteq; etiam calfaciunt. At verò agrestia olera, inter ea quæ diximus, naturam mediam sortiuntur. Si quid igitur olfactui, aut gustui, aut utriq; simul, acre, mordicans & calidum apparebit, scito facultatem id habere tenuandi, atq; incidendi. Ad hæc, si quid olfactui bonū odorem inferens, aromatis speciem repræsentet, id quoque viribus calidum esse oportet: sed non æquè ac mordicantia & rodentia, & insigniter calfacientia. Incidunt præterea & quæ saporem habent nitrosum, aut salsum: quorū plurima etiā alvum dejiciunt, nec minus iis amara, facultate tenuandi sunt prædita. Incidendi autē in illis facultas, aceto & melle intenditur, oleo verò minuitur. Mixacanthus porrò, mediæ quodammodo est facultatis: ab eo autē elii & chamædaphne utriq; nō multum differunt. Stomacho autem minus prædictis comodant vitis albæ, & viticis, & spinæ asparagi: omnium autē maximè austerrit atq; astringentes, quales sunt vitis, ac rubi. Spinæ verò asparagus alvum dejicit. Juvat etiā ventriculū, facultatisq; est mediocris, & palmæ germen. Qui asparagi amaroris quippiā præferunt, quantò amariore, tantò iis sunt sicciores, & incidentes magis. Semina sunt facultate suæ plantæ similia: nisi quod illis prorsus sicciora sunt, magisq; ad calorem propensa, eorūq; magis tenuantia.

Non

Non omnia tamen sunt vesca, ut nec herbae ipsae. Est itaque papaveris semen herba ipsa praestantius, adeo ut tanquam innoxium panibus ipsum & placens permisceant. Refrigerare tamen & ipsum palam ex hoc intelliges, quod caput gravat, & soporiferum est, sed non perinde ac succus ipsius. Soporiferum est & lactuca semen: quandoquidem & olus ipsum frigidum est & humidum. Ab his igitur frigidis humidisque seminibus ei est cavendum, qui tenuante victus ratione uti volet. Sesami semen, succum crassum ac lentum in corpore gignit: apii vero, petroselini, cumini, carui, anisi, libystici, sinapi, ameos, dauci, seseleos, & omnium denique odoratorum & acrium, evidenterque calefacientium semen, tenuanti diata utentibus congruit. Ceterum ruta semen vehementissimam tenuandi vim possidet. Pari modo & lini & cannabis semina: quae etiam & caput tentant. Quibus tunc praecipue utendum est, dum sanguinem per urinas purgare volumus. Cerealia omnia generaliter appellantur legumina. Quae vero manu leguntur speciatim dicuntur chedropa: sicuti & frumeta, quae falce putantur. Triticum igitur firmissimum est alimentum: succumque crassum admodum gignit ac lentum. Quare illo simpliciter elixum non est vescendum: nam concoctioni renititur, & crassum succum producit. Sola autem ea praeparatio est probanda, quae fermento constat, sale, & clibano. Paulo deterius quae minori furno. Triticum quod grave est & densum, ac in profundo flavum, copiosissimum alimentum est, crassique succi ac lentum. Contra quod leve est, & rarum, & album, minus nutrit, succumque gignit crassum minus, ac lentum. Similago autem & alica, multum alunt, crassique sunt succi, ac lentum. Verum similaginem quidem non convenit eos attingere, qui extenuante victu utuntur. Alica vero possunt vesci moderate, tum sola aquae incocta, tum vero cum mulso, aut vino dulci, flavoque ac tenui, quodque viribus Falerno sit proximum. Licebit etiam miscere tum betas tritas, tum anethi nonnihil, vel porri, vel pulegii, vel calaminthes, vel hyssopi, vel piperis. Prisana autem ipsa per se nonnihil absterget, ut hyssopo non magno perere egeat. Mel prisanae immiscere opus non est, nisi quis ea quae in thorace ac pulmonibus continentur, studeat expectorare. In hepatis vero ac lienis affectibus ipsum admiscere non convenit. Hordeacei panes, quovis illi modo parentur, exigui alimentum sunt, succumque crassum, ac flatum minimum generant. Polenta vero, similiter ac panes, nutrit: nisi quod siccatur magis, propterea quod frixa existit. At farina est utrisque humidior, excrementosaque magis ac flatulenta, & potissimum si cum lacte coquatur. Ex typha porro & avena, panes similiter conficiuntur, qui & agre coquuntur, & succum reddunt non probum. Inter haec & triticum, olyra medium locum sortitur: nimirum tantum deterius tritico, quantum his melior existit. Quod vero ad zeam pertinet, non arbitror esse aliud frumenti genus, ab olyra & typha diversum: sed existimo, id quod nos appellamus typham, a veteribus zeam appellari. Quod semen ubi a cortice spoliatum fuerit, tritico, hordeo, & olyra, longe tenuius atque exilius existit. Flavum praeterea est, ut triticum: non autem album, ut hordeum.

Fabae minus quidem quam hordeum tergent: verum sunt concoctu difficiles, atque admodum flatulentae. Fabis pisae ad omnia sunt praestantiores. Erululae vero, & dolichi, & phaseoli, multo fabis sunt deteriores. Lentescunt autem tamen succum crassum gignant, non omnino tamen sunt aspernandae. Lupini similes sunt lentibus, nisi quod multum siccant. Ciceribus est flatulentus, & concoctu difficilis, atque excrementitius: ad movendas tamen urinas commodum. Eruium bouum magis quam hominum est alimentum: incidendi tamen facultate insignitur. Unde & ex eo medicamentum paratur, quod in iis quae in thorace haerent expectorandis, nulli est secundum. Foenogracum non incommodum alvi deiciendae gratia, ante alios cibos sumitur. Cum melle quoque eius succum exhibent, ut qui calfaciendi ac detergendi vim habeat. Quod tamen caput tentet, usus eius multus cavendus est. Pruna Damascena hydromelite incocta, praeman-
dunt illi, quibus extenuante victus ratione est utendum. Verum his magis alvi deiciunt, quae ex Iberia exportantur. Ventre praeterea subducit echini marini, & concharum omnium atque annosorum galinaceorum juscula. Panicum & milium pravi sunt succi, flatulenta, & difficilia concoctu. Nam alvi fluxum impense siccant. Hortenses lobi cibo adaptantur: crassi tamen, pituitosique sunt succi. Ex frumentaceis cibis solum hordeum, tenuanti victui est innoxium. Secundum hoc sunt panes clibanitae, qui ex tritico sunt. A reliquis abstinendum censeo. Ex piscibus saxatilibus, montanisque, aviculis, multum copiosumque potes alimentum ad tenuantem victum accommodare. Animalia siquidem quae in stagnis ac locis aquosis & campestribus degunt, humidiora sunt, atque excrementitia: quae vero in montibus vivunt, omnia sunt tum sicciora, tum calidiora temperie: eorumque caro minimum pituitosa ac viscida existit. Quare animalia omnia in montibus naturaliora, multo iis quae in locis oriuntur planis, sunt praestantiora. Mandedae etiam sunt aves earum, quae in turribus vineisque agunt vitam. Quare columbae turricolae domesticis sunt meliores: tum etiam pari modo & apri, suis domesticis atque ut in summa dicam, omnia quae exercetur, iis quae sunt ociosa: et quae cibis siccioribus, iis quae humidioribus utuntur: & quae purum ac tenue aerem inspirant, iis quae contrarium, ad tenue victum sunt praefenda. Etenim suum domesticorum caro omnium aliorum ciborum firmissimum nutrit: plurimum tamen habet lentoris. Quod si is qui tale victum requirit, sese multum exerceat, licebit ei & auribus, & rostris, & pedibus suillis vesci: ventre praeterea, & matrice, si modo ea elixa bene fuerit. Qui autem vitam in majori ocio degunt, abunde eis fuerit montanis avibus vesci, & piscibus saxatilibus, ac breviter omnibus, quae carnem habent simul mollem atque friabilem. Nam ab iis quae aut duram habent, aut lentam, omnino abstinendum est, nisi aliorum penuria nos aliquando talia esse compellat. Porro anguilla, & mollium piscium pars maxima, tamen carnem mollem fortiantur, quod tamen succo lento ac pituitoso redundant, iis qui victu tenuante uti volunt, plurimum noxia est. Hirci autem & boves, carnem quidem habent satis friabilem, nocent tamen propter duritiam, & in alterando difficultatem. At sola car-

Fabae.

Pisae.

Erululae.

Dolichi.

Phaseoli.

Lentescunt.

Lupini.

Cicer.

Eruium.

Foenogracum.

Pruna Damascena.

Pruna Iberica.

Echini marini.

Panicum.

Mili.

Lobi hortenses.

Hordeum.

Saxatiles.

piscis.

Montanae.

aviculae.

Montanae animalia campestribus, omnia esse calidiora, atque ob id praestantiora.

Columbae turricolae.

domesticis.

praeferuntur.

Apri sunt meliores suis domesticis.

Tenuis est sui qua animalia conducant magis.

Suilla carnes.

Anguilla viscerum ad versatur.

Hircina carnes.

Bululae.

Torpedo. tilagineorum torpedo & turtur laudantur: pos-
Turtur pi- sisq; nonnunq; in saxatiliū penuria iis uti. Ex ter-
scis. restribus verò animalibus, hirci & arietes, & ge-
Arietes. nus omne oviū caprarūq; , non usquequaq; sunt
Hædina car- alimenti laudabilis. Solis aut hædis innoxie utē-
nes. ris. Agnorum esus propter insignem est humidi-
Agnina. tatem fugiendus. Equorum & asinorū esum, ho-
Equina. minibus asininis: ut pardorū, & urforū, & leo-
Asinina. num, hominibus tantum feris permitto. Proxi-
Pardorum mi sunt asinis cervi, eoq; ab eorum esu abstinē-
carnes. dum. Caro autem leporū, ad aliam victus ratio-
Vrsina. nem siccantē est, nō ad propositā, cōmoda: san-
Leonina. guinē enim vehementer crassum producit. San-
Cervina. guis omniū animalīū in cibo est vitandus, & mul-
Leporina. tō adhuc magis in tenuante diætā. Pari modo à
Sanguine in visceribus est abstinendū: sunt enim excremen-
cibo utendū titia, difficiliaque concoctu, necnon crassi succi.
non esse, sic Canum & vulpium carnem equidem nunq; gu-
uti neq; vi- stavi: sunt tamē ea animalia sicco temperamen-
sceribus. to. Ut autem suum extremis partibus vesci ali-
Canina car- quando cōcessimus, ita & uti gallinarū alis per-
nes. mittimus: testes tamē & viscera tenuanti victui
Vulpina non competunt. At corporum gallinarū esum,
carnes. si quis exerceatur, nō veto: & potissimū earum,
Testes galli- quæ in montibus enutritæ fuerint. Qui verò nō
nacei tenui exercetur, mandendæ ei erunt modicæ, non mo-
victui non dō gallinæ, sed columbæ etiam ac turtures. Cæ-
congruunt. terum nec recens turtur, nec perdix mandenda
Perdices non est, nec alia omnia, quæ carnē habent moderatē
esse manden- siccā: sed ubi unum diem ad summum suspen-
das recentes, deris, ita demū edas licet. Porro palumbes, præ-
priusquam terquā quod carnem habet columbis, perdi-
unum diem cibus, turturibusq; duriorē, etiam concoctu dif-
suspensa fue- ficilem, excrementitiāq; fortitur. Perdices ve-
rint. rō ac turtures nec durissimas habent carnes, nec
Palumbes. concoctu difficiles, nec pravo succo refertas: sed
Perdices tur- ipsarum durities, si mortuæ uno die asserventur,
resq; asser facile vincitur, fiuntq; omnino friabiles, atq; in-
Satas unum culpatæ. Alimentū autem dant corpori laudabi-
diem, melio- le, sanguinemq; minimē viscidum generant, &
res reddi. crassi ac tenuis medium. Proinde quibus salu-
Olerum om- bris cibus curæ est, eos, ut arbitror, uti his con-
nium radi- venit. Olerū omniū radices excrementitiæ sunt,
ces excremen- & concoctu difficiles: adversissimæ autē sunt ra-
titia sunt. pæ. His paulò minus adversi sunt bulbi. Omniū
Rapa. pessimi fungi existunt. Itaq; eorum omniū quæ
Bulbi. gustu nullum morsum, nec acrimoniam, nec ca-
Fungi. lorem referunt, radices suspectas habere oportet.
Radices gu- Quid jam olera memorem, quorū nō solum
standa ad te- radices, sed etiā germina, stipitesq; ac folia, suc-
nuem victus cum gignunt admodū pituitosum? Solæ itaque
rationem, radices acres & calidæ sunt gustandæ, ut allia,
qua sint. cepæ, & radiculæ, cæq; pro pharmacis potius q̃
Fructus re- pro alimentis habendæ. Quod verò ad fructus
nui victus pertinet, rei propositæ minus sunt noxii, qui ven-
rationi apti. trem lubricant: ut mora, pruna, cerasia, & ficus.
 Deteriores autem sunt qui tardē permeant, ma-
 ximē si consistentia sint duri: à quibus prorsus est
 temperandū. Mandendi autem qui ad reponen-
 dum sunt apti, qualia sunt pira, cydonia, & ple-
 raq; uvarum genera: in quibus molliora potius
 quā duriora mandenda sunt. Nemo tamen ul-
 lo horum ad sanitatē utitur: quemadmodū neq;
 pomis, nec perficis, nec Armeniacis, quæ latinis
 præcoccia appellatur: & iis multò adhuc minus,

sericis, quæ vocant, & myrtis, & aliis eiusmodi.
 Pari modo nec mespilis, nec sorbis: quibus tamē
 rectē quis ad alia utetur. Summatim verò quæ
 vehementer sunt austera, & pontica, huic sunt vi-
 ctus rationi adversa. Soli autem ventris fluxui, *Tenui & rationi quæ sint adve-*
 aut ventriculo stomachove imbecillis, conferunt.
 Porro inter ea quæ in hyemem servari possunt,
 caricæ ac nuces tum ad id sunt accommodatissimæ, tum etiam nihilominus ad tenuē victus ra-
 tionem. Pistacia præterea, & amaræ amygdalæ *Caricæ. Noces. Pistacia. Amygdalæ. Noces Pontica.*
 haudquaquā sunt improbandæ. His duriores sunt
 nuces ponticæ, nullamq; abstergendi ex visceri-
 bus excrementa vim possident. Castaneæ verò, *Castaneæ. Crassum g.*
 siue elixentur, siue assentur, siue etiam frigan-
 tur, semper sunt pravæ: & multò magis, si cru-
 dæ mandantur. Olivæ, quod quidem ad propo-
 sitam diætā attinet, medium quodammodo
 sunt edulium. Quæ uvæ in vinaceis conduntur, *Uvæ.*
 ventriculi quidem imbecillitati conferunt, præ-
 senti autem scopo nō item: & his adhuc minus,
 quæ in vinis servantur. Uvæ passæ si astringentes *Uvæ passæ. Si astringentes non sunt, non conducuntur.*
 nō sint, tumentibus lieni & hepati nō conducunt:
 thoracis aut ac pulmonis affectibus auxiliantur.
 Noxia etiam sunt mala punica, si fuerint ponti-
 ca: imbecillū tamē ventriculū juvant. In summa
 verò, duri omnes ac pontici fructus, sunt pravi:
 reliquis autē moderatē uti poteris. Quod si quis
 existat, qui in variis sui partibus sapes habeat
 diversos (mali enim citrii cortex est acris, acida
 aut pars intima: at caro tum pituitosa, tum cras-
 si succi) partes quidem acidæ & acres sumendæ, *Citrium. Lum ex quibus constat partibus.*
 ab aliis autē est temperandum. Quæ in aceto &
 muria conduntur, ea tantū à pristinis viribus esse
 immutata putanda sunt, quantū à conditura alte-
 rata fuerint. Quamobrem cum acetum & muria
 palam ex eorum numero sint, quæ incidunt, te-
 nuantq;: certē pisces aridi exucciq; , qui in illis cō-
 diti fuerunt, humores crassos ac lentos attenua-
 bunt vehementer. Eligendi tamē sunt, qui natu-
 ra carnē mollem fortiuntur: fugiēdi verò cetacei,
 & eis adhuc magis ipsa cete. Præterea suilla exuc-
 ca tutò adhiberi poterit: quæ utiq; alioqui esset
 vitanda, ut quæ succū crassum ac lentū generet.
 Mel nō modò est ciborū omniū dulcissimū, sed
 succū etiā cōsistentia tenuissimū gignit. At vina
 quæ admodū dulcia existūt, omnia crassum san-
 guinē gignunt: nigra nanq; hæc sunt, & cōsisten-
 tia crassa: & iis adhuc magis sapa, quod est mu-
 stum plurimū coctū. Porro ficus exactē maturæ,
 nec succos evidenter cōdensant, nec tenuāt. Aliæ
 verò omnes hoc genere sunt inferiores. Quæ vi-
 na clara sunt & pellucida, coloreq; pallida & fla-
 va, ea fortē minimum dulcia invenias. Præterea
 nullū albū dulce cōpéries: quemadmodū nec fla-
 vum quodvis admodum dulce existit. Quæ verò
 crassa sunt, nigraq; simul & dulcia, crasso sangui-
 ne venas referciunt. At alba simul atq; tenuia, hu-
 mores crassos incidunt, & sanguinē per renes ex-
 purgāt. Quæ autē inter hæc cōsistentia sunt me-
 dia, ut sunt flava simul ac dulcia, & splēdida, ea vi-
 na neq; ut crassa sanguinē crassum generāt, neq;
 ut alba per urinas secedūt. Cæterū Ariusū vinū,
 Lesbīū, Falernū, & Tmolites, unicē cōmendatur:
 quæ quidē sanguinē bonū & consistentia medio-
 crem gignūt, At quæ odorata sunt, & cæteris va-
 lidiora

lidiora, meritò caput tentant, quocirca vitanda
iis sunt, qui cephalæa, aut hemicrania, aut cepha-
lalgia, aut morbo comitiali, aut deniq; mania la-
borât. Affectus verò omnes thoracis ac pulmo-
nis, qui diuturni sunt, & sine febre infestant, à vi-
nis huiusmodi juvantur mirū in modū, & potis-
simū qui humoris per sputa expectoratione pur-
gantur. Siquidem quæ vina sunt crassa & dulcia,
propterea quòd humiditatē possident crassam,
& ob id perdurantē, in thoracis ac pulmonū af-
fectibus, si cum tenuantibus medicamentis su-
mantur, multū adferent cōmodi. Verū nec acer-
bam nec austeram, nec omnino astringentē vim
eis inesse oportet: sed ad melleam magis, odore,
gustū, & facultate, spectare ipsa expediet: ac tale
sanè est quod Tmolites dicitur. Porro vina Pon-
tica multum implent, ac tardè permeāt, ambasq;
excretiones morantur: tum eam quæ fit per se-
dem, tum etiam quæ per vesicam: hærentq; in hy-
pochondriis diutissimè: & facile acescunt, nau-
seamq; provocant. Soli autem ventri fluenti cō-
ferunt, idq; si moderatè sumantur.

GALENI PERGAMENI

de cognoscendis curandisq; animi affe-
ctibus, liber unus.

PEccata quidem hominū à falsa opi-
nione proficisciscuntur: affectus aut, si
ve perturbationes, à vi quadam ra-
tionis experte, quæ minimè rationi
obtemperat. Etenim cernimus cun-
ctos homines existimare seipsos aut esse omni-
no sine peccato, aut paucis exiguisq; rebus rectā
rationē offendere: cum ab aliis forte omniū fla-
gitiosissimi habeantur. Quicunq; igitur aliis per-
miserūt, ut de seipsis ferrent sententiā, ac judica-
rent quales nam essent, eos in paucissimis aber-
rare solitos animadverti. At quicūq; seipsos opti-
mos existimarunt, nec aliis iudiciū sui ipsorū face-
re permiserūt, hos contrā, & in maximis rebus,
& in plurimis offendētes cōspexi. Quamobrem
meritò cōmendatur illud præceptū Pythiū, quo
jubetur unusquisq; seipsum cognoscere. Is tamē
solus qui sapientissimus est, perfectè seipsum co-
gnoscere poterit: reliquorū autē omniū, perfectè
quidem nullus, alius autem alio, & magis & mi-
nus. Quod enim in vita universa & in artibus
omnibus cernimus, ut magnas quidem atq; insi-
gnes rerum eminētias differentiasq;, unusquisq;
facile possit discernere: exiguas autē ac tenues, ij-
duntaxat qui & prudentes sint, & ipsarū artiū pe-
riti: idem quoq; in peccatis affectibusq; solet usu
venire. Si quidem perturbationes maximas uni-
versi facile deprehendūt: mediocres aut & leves
& quæ etiā correctionē desiderant (tamen si eas
vitare propterea quòd parvæ existunt, magis sit
arduū) nō item omnes agnoscunt. Quisquis igi-
tur velit honestus atq; probus evadere, is cogita-
bit necessū esse, ut plurima à se peccata sua igno-
rētur. Nam cum duplicē mantica(m) (ut ille Aeso-
pus agebat) è collo suspensam geramus, unā qui-
dem ante pectus alienorū, alteram verò à tergo,
nostrorū criminū plenā: aliena sanè spectamus
semper, propria autem cernere nunq; possumus,

Etenim quicquid amat, ut inquit Plato, cecū est
erga eam rem, quam amat. Ac proinde si nostrū
quavis seipsum omnium maximè diligit, unus-
quisq; nostrū erga seipsum maximè cecutiatur
est necessarium. Quomodo igitur propria mala
inspiciet, aut se peccantem intelliget? Si ante om-
nia se ab affectibus liberarit: quādoquidem par-
est ab iis nos detentos, semper falsa opinari. Sūt
autem animi affectus, quæ omnes novimus; ex-
candescētia, ira, timor, mœror, invidia, vehemēs
cupiditas, ac deniq; alicujus rei excellens amor,
aut odium. Quare probè dictum est illud, men-
suram esse optimā: tanq̃ nil rectè fieri possit sine
illa. Quomodo igitur quis ista unquā ejiciet, ni-
si prius ea se habere cognorit? At verò ut quis co-
gnoscat, fieri non potest ob philatiam. Si igitur
ratio tibi hæc nō permittit, ut de teipso iudices:
at saltē ut de alio, quē neq; ames neq; oderis, ju-
diciū feras, tibi non adimit potestatem. Cum
ergo audieris in urbe quempiā à multis laudari,
quòd nullis hominibus aduletur: tunc ipse, ubi
ad illum propius accesseris, num sit talis, qualis
utiq; perhibetur, hujuscemodi periculū fac. Pri-
mū, si videas ab eo frequentari ædes magnatum,
ac principum, nō existimes illum fore veridicū.
Obsequia quippe istiusmodi, mendacium sequi
cōsuevit. Deinde, si id genus hominū salutan-
tem, si illis seipsum comitem exhibentem, cō-
vivisve illorum ac cœnis ingerentē conspicias,
non solum nō veracem, sed omnis etiam nequi-
tiæ alumnum illum talem esse ne dubites: quip-
pe qui aut pecuniarum, aut principatus, aut glo-
riæ, aut honoris cupiditate trahatur. Quem ve-
rò nec salutare, nec comitari id genus hominū,
nec cum valde potentibus cœnare, sed frangi ac
temperato victu uti solitum indies magisq; com-
pereris, speraverisq; tibi vera dicturum, conare
hunc quoq; profundius altiusq; cognoscere, ut
scias cujusmodi tandem sit vita: quā cognitionē
ex longiori cum eo consuetudine comparabis.
Quòd si talem offenderis, qualē ipsum fore spe-
rasti, se voca aliquando hominē, rogaq;, ut si quē
tibi ex illis animi affectibus turbulentis inhære-
re notaverit, continuo admoneat, teq; illi maxi-
mam habiturū gratiam, existimaturumq; te ab
ipso magis servatū, quā si corpore ægotantē
sanasset. Quòd si ille recipiat se facturū cum pri-
mū aliquo tali vitio te laborantē inspexerit, ac
deinde longo temporis intervallo interjecto, ni-
hil dixerit, accusa hominē, rogaq; iterū aliquan-
tò blandius q̃ prius, ut quicquid talium pertur-
bationū in te residere animadverterit, ilicò tibi
significet. Qui si tibi respondeat, propterea se ni-
hil tibi dixisse, quòd tali tēpore nihil in te istius-
modi deprehenderit, ne ob id quidem continuo
illi fidem adhibeas: néve existimes te repente o-
mnino evasisse inculpabilem, sed duorū alterū
in causa esse, aut negligentiorē amicū fuisse, aut
illū redarguendi verecundia impeditū, tacuisse,
aut etiam nolle tibi in odium venire: cum haud
ignarus, sit, omnibus (ut ita dicam) hominibus
hūc morē esse, ut eos oderint, qui vera loquātur.
Aut si nihil horū est, scito hominē propterea ta-
cere, quòd nolit tibi prodesse: aut ob aliud quip-
piam, nempe q̃ nō sibi observāda putaverit, quē

Sapiens est omnino à peccato immunis.

Sapiens Deo similis.

Contumelias esse a quo ferendas animo.

Temporum suorum deplorat infelicitatem Galenus.

Exercitationem per totam vitam requiri, ut quis vir perfectus reddatur.

Iracundiam si non vincis, ac certe posse reprimi a nobis.

Galenus in sermone benignitas.

à te perperam agitentur: id quod certè non probò. Est autè sapiens omnino à peccato immunis: ac proinde philosophi, non hominè, sed Deo similem sapientè esse dixerunt. At tu repentè Deo similis nunquam effici poteris. Cæterum si ei qui te reprehenderit gratias egeris, post autè diligenter tecum expenderis, verène te ille, an falsò increpaverit, ex ea re senties te magnà percipere utilitatem. Si verò idem assidue egeris, tibiq; animus sit ad meliorem frugem te moresq; tuos componere, facile absolutus evaseris. Cæterum hæc sit tibi exercitatio præcipua, ut calumnias & contumelias æquo animo feras: quod ubi feceris, atq; sedatus fueris, habuerisque tuas perturbationes perspectas, tum aggreditor respondere calumniatoribus: quorum auditis rationibus, quammirissimè cum eis lites tuas cõponas: atque ita rē omnè agas, ac si pædagogis mox sis redditurus rationem. Porro si quis sit vel apprimè potens, vel opulentus, qui velit in virū egregiū evadere, habereq; admonitores liberos, necessum est illā majestatem reliquat his præsertim temporibus, in quibus nullus adest Diogenes, qui vel opulentissimo Principi, vel alicui Monarchæ sit ipsam veritatem dicturus. Iis autè monitoribus duntaxat credendum est, qui & inculpatissimè vixerint, & ætate provecti sunt. Cum aut nullus sine peccatis, aut sine affectib. vivat, vel si optima quis natura sit præditus, sed necessum sit unūquēq; labi & errare in aliquibus, eoq; etiam magis, quò junior quispiā fuerit, haud dubiè quisq; nostrā exercitacione per totā indiget vita, ut vir perfectus reddatur. Nec tamen deterreri quempiam oportet, quò minus seipsum conetur meliorem facere, etiā si jam factus sexagenarius, sentiat sibi animū vitio immedicabili deformatum. Nā tamen si nobis cõpertū sit, animū nos nō posse sapientis consequi (id quod fortè liceret etiā, si à teneris illū excoleremus) at saltē ne totū illū omnino deformē geramus, ut Thersites corpus, sedulò nobis curandum est. Etenim si supremā quispiā animi excellentiā assequi haudquaquā possit, at certè post supremos illos sapientes, in secundis, aut tertiis, aut quartis ut collocetur, id facere lōgiori tempore atq; assidua exercitacione poterit. Primò igitur satis erit, si neq; in deos maledicta jactabis, neq; calcibus feries, aut dentibus aggredieris lapides, neq; efferato vultu intueberis, sed intra te ipsum cõtinebis, atq; occultabis iracundiā. Nam ab ira prorsus liberari simulac quis velit, nō cõtinnuò quis potest: cõprimere autè illius perturbationis intemperantiā, atq; insolentiā potest. Quod remediū si sapius quis usurpaverit, agnoscat tādē adeo seipsum minus quam antea propensum ad irā, ut ne ob magnas quidē causas irasci possit. Porro servū à me unquā mea manu verberatū fuisse, nō memini: id quod etiā pater meus perpetuò cavet, qui complures amicos increpare solitus erat, q̃ ferociter iravirent in famulos. Id igitur quod in nobis est iracundiæ ac furoris, ratione cõercere atq; erudire oportet: erudietur autē exercitacione improba. Turpe enim est quempiam multos annos cõtinenter laborare, exerceriq; ut vel medicus, vel grāmaticus fiat: ut autē in virū bonū evadat, in tanto curriculo temporis

nunquam sibi quicquā laboris assumere. Ergo nec tuis ipsius manibus servum cædas, nec quando iratus fueris, alij ut id faciat imperes, sed in posterum differas. Postquam enim furor refrigeratus fuerit, prudentius, temperatiusq; dispicies, quot verberib. famulus plectendus sit dignus: nisi fortè melius esse videatur, initio statim concessa venia, negociū ipsum transigere, & ubi locum afferri jusseris, tum verbis duntaxat corrigere, minitariq; te non amplius cõdonaturum, si rursus ille idem scelus patrarit. Præstat itaque te facere omnia quæ facis, ubi impetus ille animi deferbuerit: quo tempore jam ratione opitulante, punitionis modum sis inventurus: cum nimium impetus irascentis nihil ab insania, vel à furore differat. Quamobrem à veteribus haud immeritò animi affectus hæc quinque appellata fuerunt: mœror videlicet, ira, exandescencia, cupiditas, metusq;. Singulis itaq; diebus atque horis habere hanc in promptu opinionem oportet, quòd præster quidem unumquēq; sese exhibere dignum, qui egregius ac frugi ab omnibus appelletur: hoc autem fieri nō posse ut contingat nobis, nisi eum, qui singula errata indicet, censorē admonitoremq; habuerimus: quem sanè ipsum nostrorū peccatorum judicem, & servatorem nostrum & amicum maximū existimare convenit. Qui quidem & si tibi visus fuerit aliquando falsa crimina objicere, ne ob id quidem irasci oportet: & quòd multò melius quam tu, ille singula peccata tua perspicere possit: & quòd licet falsum quandoq; tibi crimen objiciat, in eo tamen tibi sit utilis, quòd te ad eorum quæ agis diligentiorē observationem exciter. Curabis autem perpetuò, ut quā dignus sis, quantiq; faciendus, à teipso, non ab alio, accipias: habensq; in memoria semper, quanta sit eorum qui irascuntur, deformitas animi, quantaq; rursus venustas eorum qui sine ira vivunt. Omnibus accusandi teipsum potestatem facias, gratiamq; habeas nō adulantibus, sed objurgantibus potius. Pateant autem semper domicilij tui fores, ut liceat notis ac familiaribus omni tempore ingredi: cum sic affecto, atq; omnia ritè facienti, verendum tibi non sit, ne ab ingredientibus aliquo magno scelere implicitus deprehendaris. Volo itaq; ut non modò alios omnes, sed teipsum in primis etiam verearis, illiq; auscultes qui dixit: Omnium autem maximè tui ipsius te pudeat. Quod sanè si feceris, poteris quandoque expertem illam rationis vim, qua exandescimus, quasi feram quandam reprimere, mansuefacereq;. Ut autem longè turpissimum est, hominem iracundia percitum intemperanter, aliquid agere, sic etiam ob amorem viniq; & carpulæ cupiditatem: quæ omnia facultatis appetitoria sunt affectus & opera, ob quæ homo non jam equo vel cani, disciplinæ capibus, evadit similis, veluti ob illa priora, sed vel petulanti apro, vel hirco, vel cuipiam agresti belluæ, quæ mansuefieri non possit. Quocirca libido hæc perducì ad obedientiam non potest, quemadmodum illa poterat: castigari autē quodammodo potest, si rebus potiri ac frui prohibeatur, quarum appetens est. Nam si potiatur, crescit, majorq; ac vehemētiore fit. Sin castigetur, tenuis

Furore gerato, dentinò sumi.

Ira scelerum ab insana differre affectum.

Iracundia deformis animi.

Quicquid alios moratur, sed seipsum etiam devertit.

Appetitus facultatis.

Libido non reddit similes bellis gressibus.

Libido quæ ratione caret, gariqueat.

tenuis atq; imbecilla redditur, ac imbecillitate coacta, nō ultrō, ipsam rationē sequitur, veluti quoddam mancipiū. Duplex itaq; in nobis est animi vis expers rationis: una, cuius & citō excandescere & irasci est officium: altera, quæ ad id quod ipsis iucundum, suaveq; visum sit, præceps fertur, antequam utilis ne sit atq; honestū, an noxium & turpe, cognorit. Hanc igitur, quæ vehementissima est, cohibere actutū oportet, priusquā ubi incrementū acceperit, viribus invictā in expugnabilemq; se exhibeat: tunc enim vel si volueris, non poteris illam compescere, sed dices (quod audiavi olim quendam amante) velle te quidem desinere, at nō posse. Quippe ut nonnulla corporis vitia propter magnitudinem insanabilia sunt: sic vis illa, cuius est temerē concupiscere, plerunq; amore accenditur insanabili, nō corporum modō quæ sunt formosa, aut rerū quæ pertineant ad venerē, sed etiā crapulæ & vinolentiæ, itemq; obscenitatū quæ præter naturam patrantur. Quæ igitur de ira & excandescencia vincenda dixi, eadem puta de aliis affectibus me dixisse. Quæ omnia tibi sæpius revocanda in memoriā sunt, quod si non possis tam crebrō, at saltē matutinis horis, semper anteq̃ aliquid eorū quæ acturus es aggrediari, & vespertinis anteq̃ cubitū eas. Ego siquidem cōsuevi admonitiones has primū quidem bis legere singulis diebus, post verō etiam ore enunciare. Neq; autē sat esse putas ab ira una duntaxat liberū te conservare, nisi etiā ab omni edacitate vinolentia, nequitia, curiositate, & invidia, te purū integrumq; cōserves. Nam nec propter sitim decet, sordentiū instar, totum calicem exhaustire: nec propter famem in conspectu omnium, insatiabiliter ipsum ventrē explere: sed danda opera est, ut omnibus unā cœnantibus, minus obsonij assumamus, & a cibis gulam nimīū irritantibus abstineamus, moderatē interim vespertis iis, quæ salubria habentur. Progressu verō temporis, ne respicere quidem te ad convivantes velim* (magnū quippe nō fuerit, si in cibo & potu illis continentior esse videaris) verū, si hoc honore te afficere decrevisti, cura sedulo, ut continētius vivas hodie q̃ heri. Quod si feceris, senties haud dubiē te indies ab iis, quæ dixi, multō minori negotio abstinere: maximaq; perfunderis lætitia, si quando verus modestiæ, temperantiæq; amator extiteris. Sic enim gaudet, quicūq; in ea re promovetur, cuius amore flagrat. Hæc enim si ingrediamur viā, nō satis esse putabimus, si plusquam dissoluti homines consecuti simus modestiæ, probitatis, & continentiæ: sed primū quidem eos qui hisce student virtutibus, superare conabimur (est enim hæc concertatio atq; æmulatio pulcherrima) post verō, etiam nos ipsos: idq; memores semper pulcherrimorū dictorū, quorū vel hoc in primis est unum: Delige optimum vitæ genus, quod reddet consuetudo iucundum. Quemadmodum igitur cum te adversus iracundiā exercere jubebam, tum argumento uti poteras, te aliquid profecisse, quod nō amplius te excandescens cerneret: ita in iis quæ ad modestiam pertinent: hoc indicio intelliges quantū profeceris, quod nec cupiditate quidem suavissimarū rerum tangaris. Cæterum ad mo-

destiam una est via per cōtinentiam. Hoc siquidem modestus superat continentē, quod ille nec cupit quidē amplius titillantes palatū cibos. Laboriosa tamē ab initio via hæc est & aspera, quæ admodū cæteræ omnes honestorū studiorū exercitationes. Verum si pro malitia cupis habere virtutē, ac pro voluptatibus corporis, tranquillitatem animi: per continentia, ratione duce, ad modestiam cōtendas oportet. At verō & cōtentionis, & gloriæ, & principatus appetitio, animi planē est affectus, licet illis jam dictis minor. De invidia autē quid attinet dicere, cum omnium sit vitiorum fœdissimū? Est enim invidia, dolor ex alienis bonis conceptus. Sic itaq; id genus affectus omnes sunt dispungendi, ut ne radicem quidem eorū ullam in nostris animis relinquamus. Nam ex iis quæ sic relinquuntur, solet rursus aliquid pullulare, dum id ipsum a nequitia & pravitate irrigatur. Porro natura in puerili ætate ad vitam perficiendam, in cunctis plurimū potest: secundo autē loco, studia, exercitationesq; disciplinarū. Cæterum ipsa puerorū ingenia plurimū inter se differunt, cum alia magis, alia minus virtutes ipsas sectentur: omnia tamen sunt vel maximē ad affectus propensa. Verū educatio puerorum similis quodāmodo est sedulitati, qua in plantis alendis utimur. Siquidem, vel si optimus sis plantarū sator & cultor, nunquā tamē efficias, ut rubus uvā producat, quod natura illius talem a principio perfectionem capere nequeat. Rursus vites, quæ, quod ad ipsas pertinet, fructū ferre paratæ sunt, si neglexeris, reliquerisq; soli naturæ curandas, aut multō deteriore, aut planē nullum edere fructum animadvertes. Mihi autē ingenti quadam felicitate contigit, ut partem ab omni iracundia alienum, iustissimum, frugalissimum, humanissimūq; haberem, at matrē usq; adeo iracundā, ut interdū etiam morderet ancillas, semperq; & vociferaretur, & cum patre contenderit, idq; longē quidem odiosius, quā Xantippe illa cum Socrate. Inter omnia porro admodum nebat me pater, ut a nulla secta cognomen sumerem: sed illas perpetuō artes ediscerem, per quas iustitiam, modestiam, animi magnitudinem, atq; prudentiam consequerer. Laudant autem (dicebat mihi) virtutes has cūcti, tametsi sibi ipsis sint conscij, nullam se harū habere: dantq; operā pro virili, ut aliis appareant fortes, modesti, iusti, & prudentes. Ut verē autē mœroris sint atq; tristitiæ expertes, vel si minimē tales esse videantur, id magno studio contendunt. Quare etiā huic a me rei in primis studendum esse, cui omnes mortales student, præq; omnibus aliis virtutibus, unū hoc quærendum suadebat. Quæ documenta pater in hanc usq; diem retinens, nec ullius sectæ nomenclaturæ me addixi, neq; ob ullam fortunæ vicissitudinē fui perturbatus animo. Quippe assuefecit me pater gloriam & honorem contemnere, atque unam tantum, eamq; nudam veritatem suspicere. Suadebat etiam, ne ob ullam pecuniæ jacturā mœrore afficerer, quandiu quæ reliqua essent, ad curandum corpus sufficerent. Hunc enim primū finem illis quæ possiderentur, statuebat, non esurire, non algere, nō sitim pati: quod si cui plura suppererēt, quā horum usus postulat

Viam ad modestiam esse unam, per cōtinentiam. Modestus quæ in re continet superet. Via qua ad virtutem ducit est laboriosa.

Invidia est omnium vitiorum fœdissimum. Invidia est dolor ex alienis bonis conceptus.

Natura in puerili ætate quanta vim habent ad mores formandos.

Exercitia disciplinarum plurimum posse, ad virtutes adipiscendas.

Puerilia ingenia omnia esse ad affectus propensa.

Puerorū educationem esse similem cultura plantarum.

Galenus pater ternas laudes longis tibi decat.

Galenus mater iracunda.

Galenus constantia.

Discipulorum primus finis qui sit.

Galenus opulentia.

Inexplebile habendi libidinem comparari insatiabilitati ventriculi.

Cupiditatem esse unicam omnem moris atque tristitia causam.

Ditius praestare, non virtutis sed fortunae munus existit. Galeni genus clarum.

Velle cognosci ab omnibus, unde profiscatur. Velle honorari ab omnibus a stulta ambitione procedit.

postulat, iis sanè ad eas res agendas, quæ honestæ essent, esse utendū censebat. Nec me later (aje bat ille) te fortunariū plus duplo quàm ipse habeam, possidere, in nostraq; hac civitate nō mediocri honore esse præditū: usque adeo ut quænam mororis tibi causa futura sit, nullā videam, præter inexplebilem ac summam quandam cupiditatem. Comparabat autem insatiabilem illam habendi libidinē, voracitati ventriculi, qua plus quàm satis sit, ciborum ingeritur. Etenim cibo, ut dicebat, nulla alia causa egemus, nisi utq; alamus corpus. Nutrit verò corpus, si bene concoctus fuerit: bene autem coquetur, si modicus. Nam si immodicus fuerit, concoctionē nō experietur, sed usus ipsius corrumpetur. Siquidem aut dejectus per inferiora, profusionē alvi excitabit, aut distributus per universum corporis habitum, malum intra venas humorē gignet. Quæ igitur in corpore didicisti, ad animum licet transferas: cujus inexhausta cupiditas, plura perpetuò expetit, q̄ ipse usus postulet, unicaq; omnis mororis atq; tristitiæ est causa. Ea nanq; accensi nōnulli, qui præsentium rerum inexplebiles sunt, nunq; concupiscere desinūt, sed si duplum quippiam habeant, triplū ilicō student acquirere. Triplum nacti, quadruplum appetere incipiūt. Qui quidem nunq; sibi proponunt eos, qui pauciora possident: sed illos tantum, qui plura: quos etiā superare conātur. Quanq; certè multò satius est civem in eo cæteris antecellere, quod iis quæ nunc habeat, sit omnino cōtentus: id quod certè (dicebat pater) in tua manu est. Contrā, divitiis præstare, nō virtutis, sed fortunæ munus existit, quæ plerunq; servos atq; libertos facit longè ditiores nobis, qui generosi, & nobiles appellamur. Quod si tu (quo in nostra repub. reperiuntur pauci ditiores) quantū optas aliquando assequaris, hoc est, ut plus universis possideas civibus, ne sic quidē satis sis habiturus, sed ilicō circumspecies, num quis in alia civitate sit ditior: quem quidem si superaveris, tibi obsecundante fortuna, ad alia progredieris nationes, & iis quos apud illas opulentos offenderis, fieri opulētior cōtendes. Quare nunq; tu sanè omnibus ditior, sed propter immensas cupiditates, semper futurus es pauper. Quod si ipso usu rerū metieris id quod motulo tuo respondeat, jam te ipsum unū ex divitibus numeraveris: aut saltē ex iis, qui eo quod opus est abundant: erisq; quatenus ad rationē pecuniarū spectat, beatus, cum earū causa minimè futurus sis tristis. Si verò etiā illā, quæ ad honores appetendos pertinet, insatiabilitatē exploseris, hac quoq; parte jucundè ac sine molestia vitam ipsam traduces. Sin autem tibi non satis fuerit honorari ab iis, qui tua consuetudine utantur, sed velis ab omnibus omnino qui sunt in civitate laudari, etiam ab illis scilicet à quibus ignoraris prorsus: fortasse primū quidem ab iis ipsis cognosci voles: tum autē, ubi cognitus fueris, suspici. Ad illud quidem, velle cognosci ab omnibus, ab immēsa quadam profiscitur gloriæ cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari & suspici, ab inani planè & stulta ambitione. Quocirca tibi necesse erit, ut nec pecuniis quærendis invigilanti, si tunc ad gloriæ honorisq; studium

cupidinē intēdenti, ob illos qui cū plures sint, te neq; cognoscent neq; honorabunt, majori q̄ nunc tristitia & dolore affici. Si igitur in his semper nos exercuerimus, jam exploratū habentes, insatiabilitatem vitium esse animi pessimū, fundamentumq; omnium cupiditatum, pecuniæ, gloriæ, honorum principatus, & contentionis, haud dubiè citra omnem molestiam vivemus. Qui enim sua sorte contentus fuerit, is omni morore ac tristitia carebit. Quis autem nolit omnē ætatem citra mororem transigere? aut quis non hoc omnibus præposuerit? mobilibus, imò verò secleratis divitiis? Ille igitur hæc & alia multa mihi & aliis quam verissimè pronuntiabat. Turpe siquidem est libertatem eam, quæ humanis legibus accepta refertur, maximi facere: eam autem quæ & verè, & natura ipsa est libertas, non omni studio venari, sed in honestis, impuris, atq; tyrannicis dominis inservire, lucris videlicet, minutissimisq; quibusque pecuniariis rationibus, ac principatus, gloriæ honorisq; ambrosiosis cupiditatibus. Quorū sanè omnium matrē ego haud dubitaverim dicere, inexplebilem habendi libidinem. Quis igitur talem in animo pestem habēs, possit unquā aut honestus, aut probus evadere? aut cur nō mille sit mortibus dignus, qui nō toto animo talem turpitudinē oderit? Porro autē hanc ipsam multò magis & odisse & fugere debent adolescentes, qui se salvos esse velint. Nam si fortè initio assueverunt pecuniam insatiabiliter cupere, fieri jam certè non poterit, ut cū ad annum pervenerint quadagesimū, seipsos recuperent. Ceterum tametsi difficile atq; arduum videatur, adolescentes ipsos in principio sese liberare ab affectibus, progressu tamen temporis omnia facilia reddentur. Quò enim majus rationalis nostri animi pars in hujuscemodi exercitationibus ac studiis incrementū acceperit, eò perfectiorem obedientiam habebit. Nam cū ea quæ maxima sunt, ratio nondum exercitata pervicerit, minimè dubium est, quin ubi duplicem excellentiam indepta spacio temporis fuerit, sit multò facilius superatura: quippe ex eo quod jam sese exercuerit, evaserit multò generosior quàm antea: proindeq; sic abundè sufficet exterminandis affectibus, jam etiam imbecillioribus redditus.

GALENI PERGAMENI

De Consuetudine, liber unus.



Quod consuetudinis ratio ad inventionem eorum quæ sanitati conducunt, magnam sibi vendicavit facultatem, non modò Hippocrates, sed Erasistratus etiā professus est: quam quidem negligentes medici, interdum ægros q̄ miserrimè jugularunt: ut in Ario Peripatetico factitatum fuisse videtur, qui cū gracilis natura esset, & os ventriculi frigidissimum sortiretur, ita ut vex levissima refrigeratione singultu statim corripere, ob idq; nunquā fuisset ausus aquam gustare, tandē febri occupatus, à medicisq; præter consuetudinem coactus potu frigida uti, subito fuit quidem exanimatus. Aliis verò

Insatiabilis est fundamentum nostrum.

Contentus sua sorte fuerit, non carebit tristitia.

Adolescenti si fortè in assueverit pecuniam insatiabiliter cupere, non possit cū ad annum pervenerit quædam seipsos recuperare.

Rationē experientia indicet generosioribus redditus.

Arius Peripateticus in inscitia medicorum extinctus.

verò contrā, nisi audacter potus is propinetur, periculum sanè est, ne extinguantur celerrimè. Sūt enim quibusdā aliqua peculiaria ex propria natura, aliudq; alimentum alijs corpori accommodatur. Ob idq; animalia ipsa absque ulla disciplina, sed tracta à natura, ad ea pabula accedunt, quæ sibi magis sunt familiaria: jumēta nimirū ad herbas, fœnum, paleas, & hordeum: ad carnes verò, tum leones, tum lupi. Ut autem nō parva in animantibus juxta varia genera propriorum alimentorum reperitur differentia, sic in eodem etiam genere multa intersunt atq; magna discrimina. Nam multa sunt quæ vinum (exempli gratia) ne gustare quidem possint, quod tamē ab alijs plurimum sine ulla modestia bibitur: ac de cæteris quidem pari judicio. Solēt quippe homines alia alijs avidius mandere, pro suæ naturæ ratione, quod videlicet talia ipsis facilia concoctu videantur: contrā verò quæ gustui sunt ingrata, fugere & fastidire, tanq̃ ea quæ ab ipsis concoqui nequeant. Est igitur hic consuetudo ipsa signum naturalis cuiusdā proprietatis. Sed quod ea nonnunquam sit etiā illius causa, hinc liquidò constat, quod aliquib. rerū quarundā usus inter initia ingratus & noxius cum sit, ubi paulatim assueverint, jam ea illis neq; amplius ingrata, neq; noxia redduntur. Nam ut unū quodq; eorū quæ vel comeduntur, vel bibuntur, alteratur secundū qualitatem: ita & ipsum quoq;, id à quo alteratur, quoquomodo afficit. Quod autem similitudo quædā si inter ea quæ alunt, & illa quæ aluntur, tum semina, tum plantæ, evidenti argumēto esse possunt, quæ ita sæpissimè alterantur & transmutantur, ut quæ in uno loco soleant esse exitiosa, ad aliū translata, maximè cōferentia reddantur. Jam verò ut corpus cibo & potu immutatur, sic etiā iis quæ extrinsecus occurrunt nobis, quæq; nō minus cōsuetudini inserviunt. Primū igitur à refrigerantibus rebus cutis ipsa colligitur: dein cæterę partes quę illi proximę sunt, donec ad profundiores alteratio ipsa perveniat: idq; primò & per se. Nam per accidens, calor in alto collectus corpore, cutē dēfata præ frigore, increfcit. At verò sicut causa refrigerans ejusmodi alterationes invehit, sic calefaciens, istis cōtrarias. Cæterum ab una & eadem causa sæpe contraria fiunt. Sol siquidē inter initia, dum nos calfacit, fundit humores, cutem lenit, carnemq; reddit molliorem. Si quis tamen æstivo tempore pluribus diebus nudus sub eo sit diversatus, illi tum cutis, tū caro, dura aridaq; reddetur: id quod nō est caloris solius, sed siccitatis etiam illi annexæ opus. Porro balnea dulcium aquarum calefaciunt nos & humectant, quod calori habeant humorem cōjunctum. Quare necēssum est nos novisse, aliam quidem efferationē caloris humidi, aliam verò sicci. Cæterū corpus rarum & molle facile ab extrinsecis injurijs afficitur: durum autē multò facilius eas tolerat, ægerrimeq; ab illis labefactatur, ad quā etiā patiendi facilitatē & dyspathiā, consuetudo nō exiguam vim obtinet. Quod verò ad exercitia pertinet, exercitata particula fortiores pariter & solidiores reddūtur, ac proinde motiones suas obire ac ferre, q̃ ceterę, longè facilius possunt: quæ, quod exercitio caruerint, mol-

les atq; languidæ existunt. Eōdem etiā animi exercitationes spectent, quibus exerceri solemus: primū quidem grāmaticis rudimentis, dum sumus pueri: mox rhetoricis, geometricis, arithmetis, logicisq; theorematis. Cum enim facultates illæ, quæ ad animi principem vim spectāt, ad omnes artes pernecessariæ sint, quarū altera quidem cognoscimus quid consequens, quidve repugnans est, altera verò memores sumus: à prima sanè id habemus, ut sapientiores simus: à secunda autē, ut magis memores. Eam tamen naturam hæ facultates habent, ut exercitatione vires indipiscantur & crescāt: ocio autē languescāt, ac minuantur: id quod disertissimè explicuit Platon in Timæo, secutus Hippocratem, qui usum robur addere, ocium verò dissolvere pronūciavit. Verum ipsis exercitationibus, sicuti & cibo, & potui, vigilijsq; & veneri, mensura congrua adhibenda est, quæ rem ipsam neq; ultrā quā par sit, protrahat, neq; etiam de illa adimet: quia excessus dissolvunt vires: defectus verò tantum de utilitate detrahunt, quantum ipsi à recta mensura deficiūt. Facultates itaq; nostræ robur sibi cōparant, si moderatis congruentibusq; exercitijs foveantur. Atq; hæ quidem sunt consuetudinū differentia, à vi materierum in quibus illæ consistunt, & à quibus fiunt, desumptæ. At vacationes non debentur corporibus ob consuetudinē aliquam, quemadmodum Erasistratus existimavit: sed ob causam quæ illas postulat. Sunt siquidem qui ex malo victu, sunt qui ex prava corporis affectione sanguinē plurimū, aut vitiosos humores aggregent: quos plurimum juvare solet, cum aut à natura aut à medico, quod redundat, antequam in morbum labantur, detrahatur: quo remedio toties utuntur, quoties aut morbum præsentem vident, aut eum adventare præsentunt: adeo ut talis medendi ratio in consuetudinem illis esse versā videatur.

GALENI PERGAMENI

de tuenda sanitate, liber primus.



Um una sit ars, quę circa humanum corpus versatur, ejus primæ ac maximæ partes sunt duæ: quarum altera sanitatis tuendæ, altera morbi profligandi facultas est. Ac sunt quidē officia earum contraria: illi quippe tueri, huic immutare statum corporis, est propositum. Quoniam autē & dignitate & tempore sanitas morbi præcedit, utiq; & nos, quemadmodò hæc servanda sit, prius tractare conveniet: post autē, quo pacto commodissimè sit abigendus morbus. Utriusq; facultatis inveniendæ cōmunis ratio est, ut quidnam ea corporis affectio sit, quæ sanitas dicitur, liquidò cōstet: quandoquidem nec præsentē servare, nec amissam restituere, si eam penitus ignores, licet. At similariū partiū sanitas, calidi, frigidi, humidi, & sicci symmetria est. In instrumentaliū verò, ex similariū ipsarū cōpositione, numero, magnitudine, & figura cōstat. Quare quisquis hæc cōmodè tueri possit, is optimus sanitatis custos fuerit. Tuebitur hæc, qui modos

Exercitatio in artium liberalium studijs.

Intellectus. Memoria.

Anima facultates exercitatione vires indipiscuntur, & crescant: ocio autē languescunt, & minuantur.

Exercitia debere esse modica.

Excessus dissolvunt vires.

Vacationes fieri ob causas, quæ illas postulant.

Medicina primæ ac maximæ partes sunt duæ.

Medicina partium officia contraria.

Sanitas morbo, dignitate & tempore est prior.

Sanitas similariū partium quid sit.

Sanitas partium instrumentalium in quibus consistat.

omnes

*Eadentia cor-
rumpentiaq;
corpus gene-
re duplicia
existere.*

*Primordia
nostra gene-
rationis esse
sanguinem,
& genitale
semen: illum
tanquā ma-
teriam, hoc
opificis ratio-
nem obtinēs
Semen esse i-
pso sanguine
ficcus.*

*Siccantia ele-
menta sunt
ignis & ter-
ra.*

*Ignis maiore
copiam con-
fluxisse ad
utrumq; no-
stra genera-
tionis prin-
cipium.*

*Senij accura-
ta descriptio.*

*Corruptela
interitusque
duplicem in-
esse nobis ne-
cessitatem,*

*Animalium
corpora in
perpetuo fluo-
re versari.*

*Animanti-
bus univer-
sis esse insitas
quasdam vi-
res, deficient-
is ac deside-
rati appeten-
tes.*

omnes quibus vitiantur, cōpertos prius habue-
rit. Sanè quæ corpus nostrū lādūt corrumpūtq;
ea sunt genere duplicia: altera nobiscū congeni-
ta, & quæ evitare nequeas, quæq; ex ipsis gene-
rationis principiis oriuntur: altera, quæ decli-
nare possis, & orta à nobis non sunt, sed aliundē
perveniant: quæ tamen non minus q̄ illa corpus
nostrū conficiunt. Etenim sanguis, semenq; geni-
tale, generationis nostræ primordia sunt: ille,
ceu materies quædam apta: hoc opificis rationē
obtinens. Constat horū utrumq; ex iisdem gene-
re elementis, nempe calido, frigido, humido, &
sicco. Cæterū in semine plus est igneæ substantiæ,
& aëreæ: in sanguine aqueæ, terreæq;: quanq̄ præ-
pollet in hoc quoq; calidum frigido, & humidū
sicco. Semen itaq; sanguine ficius est, etsi sit ip-
sum quoq; humidum atque fluxile. Quare nobis
utrumq; ex humida substantia genituræ origo pro-
ficiscitur. Hanc autē ficcari oportuit ad genera-
tionem ficcariū particularū, elemento nempe fa-
cultate ficcandi prædito confluente illuc libera-
lius. Siccat autē tum ignis, tum terra. Ex illo ta-
men ad utrumq; principiū, major cōfluxit copia,
ut scilicet tum siccaret abundē, tum calore suo
ad motiones agilitatem præstaret. Ab hoc siqui-
dem primū cogitur atq; concrevit fœtus. Mox
ficcior redditus, veluti lineamenta quædam cu-
jusq; membri obtinet. Ulterius verrō siccescens,
exactam uniuscuiusq; speciem ostendit: ac tandē
in lucem editus, magnitudine augetur, ficiorq;
& valentior usq; ad summum incrementū effici-
tur. Quo tempore universa membra, non solum
robusta & integra sunt, sed vires suas etiam sum-
mas sortiuntur. In eo verō quod sequitur tempo-
re omnibus jam partibus supra iustum siccescen-
tibus, nō solum cuiusq; officium minus probē ad-
ministratur, sed etiam corpus ipsum macilētius,
gracilius, atq; rugosius redditur, artusque omnes
invalidi, atq; ad motus suos pigri & inconstan-
tes cernūtur. Quæ affectio appellatur seniū, ipsi
marcori plantarum, provenienti ob siccitatis ex-
cessum, quadam proportionē respondens. Una
igitur hæc est omni genito corpori corruptelæ,
interitusq; connata necessitas. Altera autē, quæ
præcipuē in ipsis animalibus cernitur, totius sub-
stantiæ fluor, quē insitus calor excitat. Hæc itaq;
incommoda, nullum quo genitū sit corpus effu-
gere potest. Reliqua quæ hæc sequuntur, & quæ
ad victus rationē pertinent, providētia cōsilioq;
certē potest. Neq; enim his aliundē origo est, q̄
ex ipsis jam dictis incommodis corrigendis atque
farcendis. Nam cum tota moles animalium in
perpetuo fluore sit, ni similis altera substantia pro-
ca quæ defluxit, restituta fuerit, evaporabitur cer-
tē dissipabiturque universa. Idcirco natura non
modò animalibus, sed stirpibus etiam, insitas
quasdam vires, deficientis ac desiderati semper
appetentes, statim ab initio indidit. Cibo igitur,
quicquid ficioris substantiæ effluxit, restituimus:
potione, quicquid humidioris. Ita verō & aëreæ,
igneæq; substantiæ modum, respiratu, arteria-
rumque pulsu tuemur. Necesse autem est, ex his
omnibus colligi excrementorum proventū, cum
nimirū iis quæ effluxerint, prorsus similia non
sint, sed varias mutationes alterationesq; prius-

quā assimilentur, postulent. Cum igitur esse,
bibereq;, necessaria animantibus sint, has autem
res generatio excrementorum sequatur, natura
non solum eis excernendis instituit organa, ve-
rumetiam organis ipsis facultates inseruit, qui-
bus incitata, quædam ad se trahunt, quædam a-
liis transmittunt, quædam omnino explodunt
ipsa excrementa. Porro hæc, quò semper mun-
dum corpus ipsum servetur, nec obstrui aliqua-
tenus, nec ad propria functiones imbecilla esse
oportet. Atq; ita geminum jam scopū salubris vi-
ctus sermo noster exposuit: alterū ejus quod ex-
haustum est reficiendi, alterū excrementa expel-
lendi. Nam tertius, qui huc spectat, ne animal
præproperē senescat, duos jam dictos necessario
comitatur. Ex se itaq; duplici ratione cōsumitur
corpus: & quod vel ætatis cursu, vel assiduo fluo-
re ad interitum tendat: & quod etiam excremen-
torum copia obruatur. Eorum verō quæ extrin-
secus incidunt, unum certē est, quod ab eo sepa-
rari nō potest, sed perpetuò illi veluti cognatum
adhæret, aër ipse ambiens. Alia nec necessario, &
incertis temporibus nobis accedunt. Aër igitur
circumfusus nos lædit, calidos immodicē, vel fri-
gidos, vel humidos, vel ficos efficiens. Hæc,
quod cōtundant, divellant, vulnerent, articulūq;
aliquem sua sede dimoveant. Est autem sanitas,
haud quidem absolute ipsorum elementorū, sed
duntaxat partium similariū temperamentū cō-
moderatum. Quemadmodū & instrumentaliū
sanitas, in figura, numero, magnitudine, & com-
positione similitium consistit. Porro habitū sa-
nitatis discernimus, ex functionibus secundum
naturam obitis: in ipsaq; latitudine sanitatis, sa-
nitas quædā optima, cōsummataque existit: quæ
dam veluti recedens ab hac, nec ita planē ab so-
luta, quæ & ipsa suam etiam nec parvam latitu-
dinem habet. Nam cum sanitas symmetria quæ-
dam existat, symmetria autem omnis duplici ra-
tione dicatur: aut enim veluti summa & perfe-
cta, aut tanquā à perfectione hac deficiens pau-
lulum: utiq; & sanitatis symmetria similiter du-
plex erit, hæc quidē absoluta & optima, illa pau-
lò recedens ab hac, nō tamen eatenus, ut anima-
li sit gravis. Quemadmodū igitur corpus aliud
magis, aliud minus album cernitur: ita quod sa-
num dicimus, magis minusq; tale esse mihi vide-
tur: id quod ex mutatione ætatum atq; actionum
diversitate licet planē colligere. Siquidem cum
ipsæ actiones quæ debitæ respondent tempera-
turæ, corporisq; constitutioni (quæ sanitas est)
sint variæ: necessariū profectò est, ut temperatu-
ras atq; constitutiones hominū, sic sanitates etiā
varias & diversas existere, secundū majoris mi-
norisq; rationē. Non itaq; absoluta illa tantum,
quæ insectilis est, simul est & dicitur sanitas, sed
etiā quæ ab hac deficit, & in qua nec doloribus
cruciamur, nec vitæ actionibus impedimur. Sed
nec functionū imbecillitas, morbi statim est no-
ta, nisi adjicias, quæ præter naturam cuiusq; sit.
Nam ut sanitas est naturalis affectio actionem
perficiens, sic morbus affectio præter naturam,
impediens actionem. Quare non omnis affectus
secundum naturam, cōtinuò etiam sanitas erit.
Siquidem Aegyptiorum nigritia, licet naturalis
affectus

*Excremen-
pellenda
ria orga-
ni ex ju-
cultatib;
prædita
tuisse na-
ram.*

*Salubri-
tus ge-
nus scopi*

*Corpus
duplici
ne const-
Aerem
bientem
veluti
tum cor*

*Sanitas
larium
rum qua
Sanitas
strumen-
in quibus
ssat.*

*Sanitas
bitus di-
nitur ex
ctionibus
cundum
tura ob
Sanitas
esse latit-
nem am-
Sanitas
symmetri-
Symmetri-
omnem
plici dic-
tione.*

*Sanitate
minum
diversas
Imbecilla
function-
nisi præ-
naturam
nobis est
cium mo-
Sanitas
quid.*

*Morbus
affectus
ter natu-
impediens
actionem*

affectus sit, nō tamen dicitur sanitas, cū ea minimē in colore consistat. Neq; si prāter naturā aliquis affectus se habeat, protinus morbus est: alioquin morbus esset nigredo ex insolatu contracta. Permagnam itaq; haberi sanitatis latitudinem cōstat, nec eam in nobis omnibus aequaliter prorsus inesse. Judicabimus autē ipsam eucrasiam & dyscrasiam, in quibus sanitas & morbus consistunt, unius sensus opera: is siquidem ad omnia vitæ munia ubique nobis est iudex. Quare actionis vitium, non antē pronuciabimus morbum, quā ad sensibilem pervenerit magnitudinem. Porro actiones ipsæ, cōstitutiones corporis necessariō sequūtur, eam quæ proba est inculpatæ probæq; quæ contrā est, culpabiles ac vitiosæ. Ac proinde nihil refert impræsentiarū, si quis in genere functionū, aut cōstitutionū, sanitatē & morbū collocet: modō intelligat, in naturali cōstitutione corporis illa maximē servanda esse, quorū beneficio obeuntur functiones: & quod similiariū quidem partiū eucrasia, instrumentalium autē forma, positura, numerus, & magnitudo, causæ existunt functionum: quodq; hæc omnia spectentur in latitudine quādam. At verō diversitatem eucrasiae in corporibus sanis, ex ætatibus ad amissim cognosces, cū nimirū ad omnes voluntarias actiones adolescentiū ætas q̄ aptissima sit, ineptior autē infantiū & senum, propterea quod humor in illis, in his siccitas frigiditasque nimis abundet. Quāq; certē in functionib. naturalibus infantium ætas cæteris omnibus antecellit. Neq; tamē eō secius omnib. per omnes ætates licet esse sanis. Et quæ admodū in ætatibus sese habet, ita etiā in naturis eorū immensam esse differentiā temperamentorum invenies. Quibuscunq; igitur corporibus multō supra justū calidis, frigidis, humidis, aut siccis esse cōtigit, iis planē optima temperies nō est. In quibus autem ab eo quod absolutissimē temperatū est, diversitas quēdam intelligitur, minor tamen q̄ quæ sensu discerni possit, hæc certē p̄ absolutissimis accipimus: ita ut sanitatis, quā in latitudine cōtemplamur, hæc quidem mediū temperamenti sit, nec ulli vitio obnoxia, quod saltem sensu percipiatur: hæc ceu intemperata, vitioq; exposita. Quocirca illi quā inculpatā diximus, exacta absolutaq; debetur custodia: alteri quæ vitio nō caret, haud ita exacta. Quippe in temperies quæ intra sanitatis consistunt terminos, ita corrigere oportet, ut per contraria redcantur ad moderatius temperamentū. Sicuti igitur nec nimis gracile corpus probamus, nec q̄ valde est obesum: ita nec temperamenta eorū, a quibus videlicet habitudines id genus oritur, planē laudabimus, tamen utriq; maximē sanū esse cōspicimus. Sed quæ in mediō horū habitudinis sunt, Græcis dictæ, sicuti ipsæ debitam partium convenientiam, speciemq; inculpatam habent: ita id totū cōvenientis laudabilisq; temperamenti beneficio acceptū fertunt. Cæterū ne tales quidem corporū habitus absoluta exactaq; temperie dixeris tēperatos: quod nunquam eodem in statu permaneant: licet secundū sensum, & quatenus ad usum sit satis, nō inculpabiles modō, sed etiā optimos eos esse censueris.

Est autem optima corporis cōstitutio, si substantiam ejus spectes, & quæ optimo temperamento sit, & quæ figuram partiū, omnemq; tum numerum, tum magnitudinē, tum omniū earū, inter se contexturam, ad functiones egregiē comparatam habet. Si verō indicia notatq; respicias, cujus corpus carnis mediocritatem præfert, atq; secundum singulas partes, in mediō excessuum omniū librat, pulcherrimū simul & cōmoderatū existens. Hujus ergo sortis homo, si statim tibi editus est in lucē, arti sanitatis tuendæ educandus tradatur, erit utique fortunatissimus. Si nanq; ad animi quoq; affectus nonnihil lucrificiet, ipsa nimirū recta victus ratione mores quoque probos reddente. Ergo recens is natus infantulus, cujus corporis cōstitutio omni nota vacat, primum quidem fasciis deligetur, sed corpori prius toti sale modicē insperso, quō cutis ejus densior solidiorq; iis quæ intus sunt partibus reddatur, ut resistat faciliē injuriis extrinsecis. Ubi verō involutus jam fuerit, lacte pro alimento utatur, & balneis salubriū aquarū. Universam nanq; victus rationē, humida sibi adhiberi postulat, ut qui cæteris ætatibus temperamento sit humidior. Id quod sentiens Hippocrates, ait, humidam omnē victus rationē febricitantibus esse utilē, præcipuē verō puellis, & iis qui tali refici victu sunt assueti: ubi a morbo quidem contrarij adhibendi indicationē accipit: ab ætate & consuetudine similiū. Quæ enim corpora secundum naturā se habent, iis custodiri suum habitū decet: quæ aliquo morbo premuntur, iis contrā, alterari & ad contrarium trahi habitū expedit. Ac servatur quidem similibus unumquodq;, alteratur contrariis. Si itaq; nulla prāter naturam humiditas subsit, pro naturæ ratione alendi, ac dulciū aquarum balneis humectandi sunt puelli. Nam sulphureæ, bituminosæ, aluminosæq; aquæ, planē omnes siccant. Cū igitur sanguine in utero alii nos constet, ex sanguine autem exiguum in mamillis mutationē perpesso gignatur lac, erit utiq; lac maternū non modō alimentū consuetū, sed etiam maximē propriū cunctis infantibus, ac præcipuē optimē temperato: quippe cujus maternū non corpus modō totum, sed etiam lac, a vitio esse alienū non sit absimile. Tribus autē remediis nutrices ipso usu edoctę mulcere solent infantes, dū aut offenduntur, aut plorant: nempe ipsa papilla ori indita, motu medio cri, necnon vocis modulatione. Quibus non solum eos mitigant, sed etiam somnum conciliāt: vel hoc ipso testificante natura, ad muscen eos & exercitia suo pte esse ingenio propēsos. Adeo quisquis his artibus probē uti sciet, is corpus & animam optimē instituet. Nutricibus porro triplex infantibus excogitata dimotio est: in cunis, in pendentibus lectulis, in suis ipsarum ulnis: totidemq; in universum notantur etiā prima exercitationum genera. Quippe aut a nobis ipsis movemur, aut ab aliis, aut medicamento. Horum tamen tertia species, ad sanos nequaquā pertinet. Sed qui ab altero præstatur motus, navigando, equitando, vehendo, atq; in cunis, lectulis, & ulnis obitur. Recens tamē nati puelli, tam valentē motū, quā est qui vehiculis, navigiis equisve

Optima corporis cōstitutio quæ dicitur

Mores reddi probos a recta victus ratione.

Infantuli educandi ratio.

Infantulo, prius quā involvatur, sale esse inspergendum.

Lac.

Balneæ.

Humida victus ratio quibus conveniat.

Corpora secundum naturā se habentia, servanda esse: alteranda quæ aliquo morbo premuntur. Similibus singula conservari.

Alteratio fit per contraria. Aquæ siccantes quæ.

Sanguine in utero alimur.

Lac fit ex sanguine. Lac familiarē alimentū infantulo. Infantes mulcendi ratio triplex.

Infantes natura propēsos esse ad muscen, atq; exercitia.

Infantibus motionē triplicem excogitantur nutrices.

Exercitiorū prima generat tria.

præstatur, adhuc non desiderant. At qui jam tertium aut quartum annum agunt, is vehiculo, navigioq; modice agitari licet. Septennes verò, jam equitare assuescunt. Ac per se tum primū pueris moveri licet, cum jam repere cœperunt, magisq; etiam cum ingredi. Immaturè autem cogendi omnino nō sunt, ne pondere crura eorum vitentur. Sanè vel hac ætate facile declaratur, quanta sit naturæ nostræ cum exercitiis societas: cum pueros nec si cōcluseris loco aliquo, prohibeas quo minus discurrant, ac pullorū vitulorumq; modo lasciviant. Quippe sua cuiq; animanti natura satis est ad proprias convenientesque excitandas appetitiones, quibus sanitatem tueatur. Jam verò qui optimo corporis habitu præditi sunt infantes, his animi quoq; mores citra vitium esse par est. Qui enim sunt ad iram magis proclives, aut animo planè demisso,* aut intelligentes magis, aut stupidi, aut appetentes ultra modum, hos parum idoneo temperamento esse iis partibus, quibus prædictorum singula administrant, necesse est. Infantis autem quem absolutum inculpatumq; proponimus, ut nullū ex animi moribus corrigere, sic eisdem servare ne quo vitentur, oportet. Servatur verò quidq; iisdem planè generibus quibus corrumpitur. Corrumpuntur animi mores prava cōsuetudine cuiusq; horū, cibi, potionis, exercitationis, vidēdi, audiendi, totius deniq; musices. Quare peritū horū omnium esse eū medicū oportet, qui sanitatis tuēdę curā suscipiet. Etenim iracūdia, fletus, ira, cura immodica, & multæ super his vigiliæ, febres accedunt, ac gravissimis ægitudinibus initia præbent: veluti è diverso, cogitationis mentisq; segnitia, ac animus omnino deses, decoloratos, atq; ex atrophia graciles, ob naturalis caloris imbecillitatē, reddunt. Hunc enim calorē, præter cætera intra sanitatis fines custodire oportet. Custoditur autem cum corporis, tum animi exercitiis modicis. Siquidem qui motus nimis modum exceßerint, biliosum animas reddūt: si intra modum nimis subsistunt, frigidū & pituitosum efficiunt. Quin etiam priorē habitudinē febres, & qui calidiores affectus sunt: posteriorē jecinoris & viscerū obstructions, comitiales morbi, apoplexię, in summa destillationū fluxionumq; morbi plerūq; excipiunt. Et nos ægros, quotannis nō paucos per sanavimus, solis animi motibus ad debitum modum revocatis. Itaq; infantes qui optimū sortiti sunt temperamentū, non levi cura egēt, ne quos animi motus immodicos incurrant. Quippe loquelæ adhuc expertes, ploratu, clamore, iracundia, & inordinato sui motu, dolorē indicant. Nostrum igitur officiū est, cōjectantes quid optent, assidue id suppeditare, priusq; auctus dolor, in nimium atq; inordinatū motum unā cum corpore etiā animū rapiat. Siquidē dentientes, aut ab externo quopiam offensi, aut alvū exonerare, aut mejere, aut esse, biberēve cupientes, aut multitudinem stratorū, vinculaq; arctiora nō tolerātes, aut deniq; diuturnā quietem pertæsi, perinde ac discruciatī plorāt, enormiterq; movētur. Nullū enim animal ullo immodico delectatur, sed semper medium modum expetit. At medius ipse modus non unus omnibus est, sed ex eorū sem-

per est numero, quæ in collatione ad aliud spectantur. Eum igitur qui curam infantis educandi suscipiet, acré mediocritatis, convenientisq; conjectorem esse oportet. Hæc autem omnia, usq; in tertium à natali annum, circa puerū peragenda censeo: in primisq; de nutrice ipsa nō minimam habendam esse curam, quid edat, quid bibat, quo pacto in somno, venere, & exercitatione se habeat, ut videlicet lac ejus egregiè sit temperatū, quale certè erit, si sanguis ejus quā optimus sit. Sanguis porro sit optimus, à modica exercitatione, & cibis tum boni succi, tum iusto tempore modoq; assumptis: præterea portione tempestitiva, modiceq; assumpta. A venere omnino abstinendam esse, quæcunq; lac præbebit moneo. Nam & menses viri consuetudine provocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat. Quinetiam aliquæ concipiunt in utero, quo alienius à puello adhuc lactente nihil est: cum quicquid sanguinis optimum est, absumatur in fœtū. Quare ubi mater concepit, vel aliquo morbo est affecta, alia nutrix est invenienda: cujus lac gustu, odoratu, visuq; explorandum est diligenter. Siquidem quod optimum est, id gustanti, olfacienti; planè suave, intuenti candidum, æquabile, ac medium liquidi crassiq; apparebit. Quod vitiosum est, è diverso aut crassum & caesolum, aut liquidum & ferosum ac lividū, tum consistentia ipsa, coloreq; inæquabile nobis videbitur. Idem gustantibus amarorem, aut falsedinem, aut qualitatem quampiam extraneam exhibebit. Tale verò nec olfacienti suave erit. Atq; lactis probi improbiq; hæc sunt indicia. Puellum autem ipsum primò quidem solo lacte nutrire: at ubi primores dentes emisit, eum solidiori quodammodo jam cibo assuefacere convenit. Corpus autem infantis confricare oportet oleo dulci, idque posteaquā universum lac accuratè concoctū fuerit: alioqui alimento crudò universum corpus replebitur. Quare post longissimum somnū fricandi occasio captanda est. Majorum tamen puerorum, qui parere plagis & minis norūt, iis duplex tum fricandi, tum lavandi temporis occasio est. Prior ac cōmodior, cum à matutino somno surrexerint, deinde luserint, ac jam cibum petant. Quod si qua occupatione, qui puellum alit, avocetur, modico pane præbito, ludere permittat quantum velit. Dein cum rursus cibum petierit, tum fricet, lavatq;. Minime tamen bibere ei permittendum post cibum est, quem balneum excipit: quando ita præcipatione eorum quæ ventriculus cōtinet, distributio in corpus fiet, id quod in corporibus prorsus sanis cavendum est. Præstiterit autē semper, ut in nobis proposito puello, balneum cibis sequatur. Nam quibus utilius est ante balneum cibum dedisse, horū planè improbandæ habitudines sunt. Cæterū nec Germanis, nec hominib. id genus aliis agrestibus, hæc documēta prodimus, nō magis q̃ apri & ursi, sed Græcis, & iis qui eorum æmulatur studia. Nam quis obsecro nostrū tulerit, modò editū in lucem infantulum, atq; ab utero calentem, ad flumen deferri, ibiq; (sicuti fieri apud Germanos ajunt) ceu candens ferrū, in frigidum humorē submergi, ut & roboretur corpus,

Nutricis
Eius ratio
quam dili-
genter co-
lendū e-

Sanguis
optimus a
b gignatu
Venere m-
dicendū n-
trici, qu-
ab ea cito
tur mense
& lac odo-
gratiam a-
mittat.

Nutrici gr-
vidam eff-
ineptam
dando inf-
tulo.

Lactis opti-
mi notæ.

Lactis si-
sinota.

Infantulum
primò qui-
solo lacte
triendum

se, postea
rò assuefa-
endum so-
diorib. cib-

pus frican-
oleo dulci-
se, idq; po-
longissimu

somnum.

Pueris ma-
ribus dupl-
fricandi &
lavandi re-
pus.

Puero post
bum quē
neum excep-
rit cur fla-
tim non sit
bendum.

Balneum
bus in opti-
mi habitus
puero sequa-
tur.

Germanorū
agrestes mo-
res Galenū
damnat.

Infantuli
lim apud
Germanos

quamprimū
erant editi
in lucem, de-
mergebatur
in frigidam

corpus, & periculū de vigore illius sumatur? Præstat itaque nec adeo de facie cutem, ut corporis transpiratū prohibeat: nec rarefacere ita, ut facile a qualibet extrinsecus incidenti occasione lædatur. Corpus autē propositi nobis puelli, medium excessus omnis existit. At verò cum mitti jam is in ludum est habilis, non necesse erit assiduis præterea balneis uti, sed interim cum luctari condiscit, mediocriter inibi ante cibum exerce ri sat erit, ac balneo plerumq; abstinere. Vinū sanè quam diutissime qui ea natura puer est, ne gustare quidem suaferim, quòd humectet nimis & calfaciat corpus, caputq; halitu repleat. Quare nec jam adultis vinū, nisi modicè sumptū, est utile: quòd videlicet ad iram & libidinem præcipientes facit, & partem animæ rationalem, hebetem atq; turbidam reddit: quanq̃ his ipsis ad bilis excrementa vel mitiganda vel expellenda, est sanè non inutile: non minimè verò ad eam siccitatē, quæ in solidis partibus aut ex immodicis laboribus, aut ex proprio temperamento provenit. Jam puellis potio frigide, ac præcipuè a cibo & per calores, non incōmoda est. Aqua tamen fontana & recens aliis est præferenda. Quæ autē omnium optima est, ea penitus nō gustui modò, verumetiam olfactui, omnis qualitatis expers videbitur: eritq; jucunda gustui, & celeriter pertransibit præcordia. Porro quæ aqua ex petra cōtra septentrionē fluit, solemq; aversum habet, ægrè quidem concoquitur, ac tardi trāsitus est, tardeq; incalescit, atq; refrigeratur. Cujus ad orientem solem erumpit fons, quæq; per terram puram colatur, eadem calefit ac refrigeratur ocysimè, omniq; ætati utilissima est. Idem de aère etiā est judicandum: quem optimum, hoc est, purissimum, in pulmones trahere, omnibus juxta salubre est. Nam impurus aër, omni ætati adversatur. At verò quæ ex calore, frigore, siccitate, humiditateq; diversitas aëris contingit, nō perinde se ad omnes homines habet: sed corporibus quæ optimo temperamento sunt, etiam optimè temperatus aër est saluberrimus. In quibus verò aliqua exuperans qualitas dominatur, iis utilissimus aër est, qui ei qualitati pari gradu adversatur. Porro ubi puer jam est secundū septennium ingressus, calidum est, eodem gradu quo prius, illi temperamentū: humidū verò nō eodem, quandoquidem omne animans ab ipso statim ortu, siccius indies efficitur. Cui igitur optimi status corpus contingit, is ad quartumdecimū usq; annum jam traditam victus rationē observet, modo semper exercitij servato. Lavetur autē calida potius q̃ gelida, ut qui nondū hanc citra noxam pertulerit: adhibeaturq; illi educatio optima, q̃ probis consuetudinibus, & gravibus disciplinis paratur. A secundo autem septennio usq; ad expletum tertium, licebit tibi ad robustissimū corporis habitum provehere hominē, aut instruere iis animi dotibus quæ ad scientiā, sapientiāq; pertinent. Non est tamen eadem utrobique victus ratio. Atq; hac maximè ætate perfici absolviq; cōvenit, quæ spectant ad mores. Ut aliquis autē in longissimū prolata vita, etiam bona valetudine perpetuò utatur, is liber oportet sit ab omni negotio publico, nimirū sibi vivens duntaxat, so-

liq; indulgens corpusculo. Etenim immortale fieri quod genitum est, planè non potest: ut verò in longum perduret tempus, id maximè fieri potest. Nam qui optimū sortitus est corporis habitum, si ab omnibus quæ ad publicum in vita spectant, secedat, sibiq; tantū vacet, nec morbo ullo quoad fieri poterit unquam tentabitur, neq; ante longissimū vitæ tempus morte occupabitur. Cæterum cum huic tali edendum, bibendumq; sit, ad reparanda quæ ex corpore effluūt, necesse utiq; est, excernendorum habeat rationē. In primis igitur excrementum à sincero separatur, & paulatim impellitur per omnia intestina, usque ad rectum vocatū: ad cuius exitum musculi quidam inserti sunt, qui ipsum, ne immaturè effluat coërcent. Postea verò quā plurimū congestū jam grave animali fuerit, tum foras agi sinūt, ad celeritatem emissionis etiam abdominis musculis unā cum transverso septo adjuvantibus. Jecinoris excrementorū aliud est, quale quod florē in vino appellant: aliud, quale quod sæx dicitur. Attrahitur alterum à vesicula quæ jecinori subditur, alterū à liene. In his collecta excernuntur, alterum in priorem intestini tenuioris partem, alterum in ventriculum, ab hisq; per omnia intestina permeant. Quod autē in venis & arteriis excrementū acervatur, ejusmodi planè est, quale in lacte concreto serum. Hoc renes à sanguine secernentes, ad vesicam transmittunt. Cujus collo transversus etiam musculus inest: quo arctato supprimitur, laxato emittitur lotiū, ad id conferentibus etiam abdominis musculis. Reliquū excrementorū genus in singulis animalis nascitur partibus, ex ipso unde aluntur succo. Huic excremento nullus certus à natura præscriptus meatus est: expellitur tamen partim per ipsa molliora corpora, ac partim per sudorē, partim per latentem trāspiratū discutitur. Sed in hoc perflatu insensibili, etiā crassioris excrementi nō nihil ex cernitur, à quo tum pili, tum ipsius cutis sordes gignuntur. Cum igitur ejici omnia excrementa hæc oportet, expedit arbitror primū novissima, quibus maximè causis remorentur: dein rationem iniri, qua nec in ipsas incidatur; ac si quando inciditur, q̃ primū error corrigatur. Atque ne incidatur quidem, hinc licet assequamur, utique si excreta abundè sint, nec ne, compertū habuerimus. Porro iis quæ in ventre continentur excrementis mora cōtingit, aut ipsius cibi potioniſve culpa, aut ipsius ventriculi unā cum intestinis. Et cibi quidem portionisq; vitio, aut propter qualitatem eorum, aut quantitatem, aut propter ordinē, utendique modū. Et propter qualitatem quidem, si acerba, austera, aut sicce nature fuerint: propter quantitatem, si justo plura aut pauciora sint assumpta. Ordinis culpa, si quæ sicca, astringentiave sunt, primò: quæ humida, pingua & dulcia, secundo exhibeantur loco. Modi usus ratione, si cum bis fuit edendum, totum semel sumpserit. Quæ ventris aut intestinorū vitium sequitur excrementorū mora, vel ob naturalē eorū affectum accidit, vel certè acquisititiū. Ac quæ quidem naturæ eorū vitio causæ proveniunt, ex pravis corporis habitibus aliqui sunt. Recentiorū autē ventris affectionū acquisititiarū,

Excrementi
à sincera
substantia se
cretio, quo
modo fiat.
Musculi ex
pulsionem ex
crementorū
servientes.

Bilis flava
in exortu in
testinum ex
cernitur.
Atra bilis à
liene in ven
triculū mit
titur.

Vrina secer
ni à sangui
ne, per renes
quæ in vesica
demitti.

Colli vesica
musculus.

Excrementis
quæ in singu
lis gignun
tur particu
lis, excernen
dis, non fuisse
aliquē cer
tum meatū
à natura

præscriptum.
Pilorum ge
neratio.

Excrementa
alibi suppri
mi quibus de
causis poss
sint.

*Affectionum
Ventriculi ac-
quisitiarum,
differentia
octo.*

*Intemperies
Ventriculi a qui-
bus gignan-
tur.*

*Flava bilis
retineri qui-
bus de causis
possit.*

*Angustia va-
sorum unde
exeriri possit*

*Astringentia
ficcare.
Atra bilis
quando sisti-
tur.*

*Excrementum
singulis par-
ticulis insi-
tum, a qui-
bus suppri-
mi possit.*

*Meatus late-
tes quib. par-
tibus sint tri-
buti, ad ex-
cernenda ex-
crementa.
Cerebrum a
sua domi-
cilium pluri-
mis canalib.
expurgatur.*

*Oculi qua
parte expur-
gentur.*

*Retentionis
excremento-
rum causis,
contraria
alio sunt ad-
bibenda.*

*Exercitia
quanto pra-
estent cibis &
medicamen-
tis tenuanti-
bus.*

octo sunt differentiae: quatuor nempe simplices
intemperies, toridemque compositae: a quibus ma-
ximè invalescentibus, invalida potest reddi ex-
pulsiva facultas cum ventris, tum omnium inte-
stinorum. Creantur porro ejusmodi intemperies,
aut à cibo & potione, quibus vis insit medica-
lis: aut à vitio aeris ambientis, aut à lavacro, aut
ab unctione, aut denique ab alia re, quae extrinse-
cus ventri adhærescens, eum alterandi vim pos-
sident. His igitur de causis excrementum ventris
supprimitur. At flavæ bilis excrementum mora-
tur, aut propter attrahentis expellentisve facul-
tatis infirmitatem, aut propter vasorum quibus
deducitur atque excernitur angustiam. Porro in-
firmitas tum vesiculæ totius quæ subjicitur he-
pati, tum eorum meatuum qui ab ea in jecur subeunt,
tum eorum quibus in intestinum evomitur bi-
lis, ex recenti provenire potest intemperantia. An-
gustia verò vasorum, aut phlegmonis vitio fit, aut
propter scirrhus, aut obstructionem, aut circum-
jacentium partium innixum, aut oscillorum conniventiam.
Jam ipsa proximarum partium compressio, aut pro-
pter immodicam copiam eorum quæ in se conti-
nent, aut propter phlegmonem aut scirrhum acci-
dit. Acque & oscillorum conniventia, aut pro-
pter horum quicquid, aut siccitatem. Siccitatem con-
ciliant & quæ valenter astringunt, & quæ partim
calfaciunt & ficcant. Ad eundem modum atra bi-
lis excrementum aliquando sistetur, si lien quidem
proportione respondeat bilem excipienti vesicæ: 30
vena verò quæ à porta jecoris in ipsum inseritur,
vasis illis quæ excrementum biliosum attrahunt:
atque ea denique vena quæ ex liene in ventriculū fer-
tur, proportionem etiam respondeat meatui illi qui
excernit bilem. At excrementum quod per singu-
las cogeritur animalis particulas, & copia sui, &
crassitudine, & præterea lentore remoratur. Ad
hæc, ob imbecillitatem caloris, transitusque angus-
tiam. Sunt tamè partes quæ præter latentes mea-
tus, alios quosdam patentes atque conspicuos ob-
40 tinet, ut cerebrum, & oculus: idque aut ob principia
tum particulæ, aut propter actionem exquisitius
obeundam, aut propter continentium corporum
spissitudinem. Est namque cerebrum rationalis animæ
cen domicileum: quod cum osse solido undique se-
ptum sit, plurimis maximisque canalibus expurga-
tur: primum per nares & palatum, secundò per
utranque aurem, tertio per calvæ commissuras. Nec
absimile est etiam aliquid ab eo conflueret ad oculos.
Oculus verò ipse per evidentes meatus ejicit 50
quicquid in eo excrementi gignitur, idque juxta na-
res & genas. Illud autem commune omnium excre-
mentorum sit documentum, ut retentionis causæ,
contrariam semper causam admoveas. Ut, exem-
pli gratia, si ex comestorum paucitate & siccitate
restricta alvus sit, plura & humidiora exhibebis:
ac sic de cæteris. Obstructa quippe sunt aperienda:
intemperata reducenda per contraria ad natu-
ralē temperiē: sicuti & quæ crassa & viscida sunt,
incidenda, tenuatoria victus ratione, ac præci- 60
puè exercitiis, quæ tam cibis quam medicamentis te-
nuantibus tantò præstant, quanto satius est nul-
lo corporis nostri habitus incommodo exigi quæ
redundant, quæ pariter & carne liquida, & solidis ex-
tenuandis. In his autem tribus primis generibus. co-

sistit sanitatis tuendæ studiū, æquè ac medendi
methodus: nempe corporibus, causis, & signis.
Corporibus. quidē, iis quæ & sana jam sunt, & eo
statu servari debent. Signis verò, corporum acciden-
tibus, ex quibus ipsa corpora dignoscuntur. Cau-
sæ sunt, ex quibus custodia sanitatis perficitur. Ha-
rū materiā quatuor generibus. juniorum præbatissimi
sunt complexi: admovendis, educendis, faciendis,
extrinsecus incidentibus. Satiùs tamē fortasse fue-
rit admovendis, educendis, faciendis, & inciden-
tibus, alterari immutarique corpus dicere. Muta-
tionem verò aut in qualitate fieri, aut in quantita-
te. In qualitate, dum aut incalescit, aut refrigera-
tur, aut siccescit, aut humectum redditur. In quanti-
tate, dum alitur aut nutritur. Jam inanitionem
ipsam duplicem quoque esse, alteram excremento-
rum, alteram naturalis substantiæ nostræ, assidue
defluētis, quæ nutritioni ex adverso opponitur.
Porro alimentum est secundum Hippocratem, tri-
plex. Aliud enim est nutriendum, aliud veluti nu-
trienti, aliud quod nutriturum est. Quarum diffe-
rentiarum primæ, ipsius substantiæ fluorem op-
ponas recte. Secundæ autem, tum hæmorrhagi-
am, tum omnem sanguinis inanitionem. Ter-
tiæ denique, lienteriam & vomitum. Jamque in hoc
loco primum commentarium claudamus.

GALENI PERGAMENI de sanitate tuenda, lib. II.


Proponatur nobis in hoc commentario salu-
berrimæ naturæ puer, qui jam tertium æta-
tis suæ septennium ingreditur: cujus corpus
effingere quo ad fieri potest quod optimè, propositum
sit. Cum autem ut corporum ipsorum numero-
sa diversitas est, ita vitæ rationum quibus vivi-
mus, sint species diversæ: fieri nequit sanè, ut in
qualibet proposita vita absolute optimam cor-
poris nostri curam exhibeas, sed eam tantum
quæ cuique optima sit. Quare omnibus iis qui aut
servitute, aut etiā impediti negotiis, corpori cu-
rando vacare nequeunt, optimam prorsus cor-
poris curam scripsisse, supervacaneum fuerit. Iis
autem qui omni modo liberam vitam degunt,
præcepisse fas est, quemadmodum victuri sint
feliciterque & diutissime. Porro quod simplex in-
culpatumque in omni genere est, id cæteris omni-
bus cum regula quadam præponi postulat. Ac sim-
plex inculpatumque in corporibus. quidem est quod
optimo est habitu: in vitæ generibus, quod om-
nino liberum est. Primum igitur hoc libro duo hæc
conjuncta tractemus. Itaque in optimæ notæ pue-
ro, qui tertium septennium ingressus est, ac uni cor-
poris curæ vacat, labor cibum præcedat, sintque
mediocria omnia, labor scilicet, cibus, potio, so-
mnus, & Venus, quemadmodum recte monuit
Hippocrates. Quamquæ certè Venus, quæ somnum
debet excipere, tantum florentium est, utique quo tem-
pore etiam ejus est usus. Quæ autem hanc vel præ-
cedunt, vel sequuntur ætates, aut planè semen
non effundunt, aut certè infœcundum, aut malè
fœcundum. Porro laboris ipsa appellatio, idem
mihi significare videtur, cum communi exercitatio-
nis appellatione. At non quivis motus exercita-
tio videtur, sed tantum qui vehementior est. Quoniam
autem

*Sanitatis tu-
enda studiū
methodum
medendi, cor-
pore in cor-
poribus, cau-
sis & signis.
Causarum
medicinalium
quatuor ge-
nera.
Alterari co-
pus quotup-
liter possit.
Mutationem
fieri aut in
qualitate,
aut in quan-
titate.
Inanitione du-
plex.
Alimentum
triplex secun-
dum Hippo-
cratem.
Inculpatissi-
mum quod
in omni gen-
re est, præpo-
ni cæteris cen-
sura debet.
Labor cibum
præcedat.
Mediocria
debere esse
omnia.
Venus, quæ
somnia de-
bet excipere,
à florentibus
tantum est
exercenda.
Motus Sehe-
mentior tan-
tum dicitur
exercitatio.*

autem eorum quæ ad aliquid dicuntur, est quod vehementius, dicitur, fieri potest, ut idem motus alteri sit exercitatio, alteri non sit. Terminus igitur vehementiæ est alteratio respirationis: quando in quibus nulla sit respirationis mutatio, hos nondum exercitationes vocamus. Sunt autem exercitationis duplicia cōmoda: hæc quidem ad excrementorum inanitionem, illa ad solidarum partium bonam habitudinē conferentia. Nam quoniam vehementior motus exercitatio est, instrumentorum duritiem, genuini caloris augmentum, & spiritus valentiorē motum necessario inducit. At ex instrumentorum duritia sequitur ad labores robur & renitentia: ex calore, distributio validior, immutatio expeditior, nutritio absolutior, omniumq; corporū fusio, ob quam solida mollescunt, humida tenuantur, exigui meatus laxiores fiunt. Sed ex valentiori spiritus impetu, & purgari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli. Quoniam autem exercitatio digestionem in corpus adjuvat, non debet, cum ministrabitur, aut cruditas, aut multitudo succorum, vel in ventre, vel in vasis consistere. Quoniam verò & exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit, utilius est ante cibum eam ministrare. Siquidem quæ impura corpora sunt, atq; ab excrementis parum purgata, hæc quò magis nutries, magis lædes. Quare tunc ad exercitationem commodissimum tempus est, cum hesternus cibus duplici concoctione jam prorsus cōfectus fuerit, & ea quæ in vētriculo, & ea quæ in vasis sanguinis agitur, ac jam denuò cibandi tempus instet. Quòd si prius aut posterius exercitatione utare, aut crudis humoribus hominē impleveris, aut pallidę bilis proventum auxeris. Atque huiusce temporis nota, color est urinæ. Quæ enim aquæ speciem præfert, crudum adhuc in venis esse indicat succū eum, qui à ventre submittitur. Quæ verò rufa, biliosaq; est, jam dudū concoctum esse huiusmodi succum. Quæ modicè pallet, peractæ modò secundæ concoctionis est signum. Cum nanq; bili infecta urina nondū est, aquæ speciem alboremq; præfert: cum verò plus justo ejus bilis acceperit, rufa cernitur. Ergo cum mediocriter est rufa, mediocriterve pallēs, tum est exercitatio adeunda: sed expulsis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel in inferioribus intestinis continentur, ac partibus solidis molli frictione sensim concalfactis, crassisq; tenuatis humoribus, necnon reclusis per exiguis meatibus, ne vel excrementis repleatur universus corporis habitus, vel rumpatur aliqua pars ex solidis, vel prædicti obturētur meatus. Oportet itaque, ubi linteolo suaviter perfricando sic calfece ris totū corpus, ut floridus quidem rubor per totam ejus cutem fundatur, oleo tandē ipsum subigere: id quod nunquam tentandum est, priusquam incalescat cutis, & laxentur ejus meatus. Unctio autem ipsa fieri nudis manibus debet, ac medium, inter mollem & durum, modū servatibus: infricandumq; prima contrectatione blādus, inde sensim paulò fortius, donec caro manifestè citra contusionem prematur, adeoq; universum corpus legitimè compactum esse videatur. Haudquaquam tamen tam valida frictione

diu utendum, sed semel aut bis in quaq; parte, ne ejus pueri corpus duretur, exicceturve, quod servare in medio temperamēto est animus. At procedente tempore, ubi jam adolescit, tū duriorē frictione utemur, ac præterea frigida ab exercitando lavatione. In præparatoria verò illa ante exercendum frictione, quæ huc spectat, ut corpus molliat, mollis duræq; mediam qualitatem dominari oportet, ac pro ejusdem qualitatis ratione, compleri singula. Variæ autem quàm maxime ex manuum injectu circumactūq; frictiones esse debent, quò universæ musculorum fibræ omni ex parte fricentur, ne supernè modò deorsum, aut infernè sursum adhibitæ, sed etiā tum in subrectum, tum in obliquum, tum in trāsversum, tum in subtrāsversum. Quas quidem differentias frictionum, discere ex hac figura licebit.

*Frictionibus
variis uten-
dum.*



Dura porrò frictione ligari corpus, molli solvi, multa extenuari, mediocri crassescere, autor est nobis Hippocrates. Quæ differentiarum quatuor ex quadruplici omnis frictionis tum virtute, tum usu oriuntur. Quòd si medias quoq; harū annumeres, sex in universum differentiarum existent. Jā verò mollem frictionem necessario cōsequitur ut corpora emolliat: sicuti duram, ut impingat induretq; illa. Si igitur dura ligandi, mollis solvendi vim habet: quæ supra modum soluta corpora sunt, ea duriter planè fricanda sunt: contrā, quæ cōstricta sunt, molliter. Quæ modicè se habēt, manifestum est ea nec molliter nec duriter, sed mediocriter esse fricanda. Sicuti verò in iis differentiis quæ in qualitate spectantur, non solum dura mollisq; consistunt, sed etiam media, ita & in iis quæ ex quantitate ducuntur non solum multa, & pauca, sed etiam media internoscitur. Cur autem in iis differentiis quæ ex qualitate trahuntur, omiserit mediam Hippocrates: in iis verò quæ ex quantitate, exiguam, jam dicam. Cum enim ex contrarietatibus, aliæ quidem in frictionum genere (ut dura & mollis, multa & pauca) aliæ in affectuum qui ab iis proveniunt, necessario consistant, ut colligatio & solutio, gracilitas & crassitudo: ac prior quidem affectuum contrarietas, ex priori frictionis contrarietate nascatur: secunda autem non item (evenit enim in hac, ut gracilitas proveniat ex multa, carnis incrementū ex mediocri frictione: quandoquidem pauca augendæ carni non sufficit, sed exci-

*Frictionum
diversarum
varij usus.*

*Frictiones
mediae.*

*Contrarietas
tum alia in
frictionū ge-
nere, alia in
affectuū qui
ab iis prove-
niunt consi-
stunt.*

*Frictionum
utiles diffe-
rentias cur
distinguit.
Hippocrates,
secundum af-
fectuum con-
trarietates.*

tando calori modico, id quod aliis cōmune est omnibus) ob id nimirum secundum affectuum contrarietates, ceu longè utiliores iis, quæ in frictionibus spectantur, ipsarum frictionū distinguit utiles differentias Hippocrates. Meminit itaque duræ, mollis, multæ, & mediocris frictionis, subtrahens cæteras, quod ab his corpus in cōtrarias affectiones ducatur: quodque unā cum ipsis protinus se promant, tum media earum opera, tum ea quæ per conjugationem faciunt. Media, cum neq; ligare corpus, nec solvere, nec carnem augere, nec minuire studemus. Quæ per conjugationem, cum, verbi gratia, pariter colligare, & carnem addere. Quis enim nō videat, cum duram carnem adjicere corpori volumus, frictionem duram unā cum mediocri modo petendam esse? veluti cum mollem addere studemus, frictionem mollem & quantitate mediocrem adhibendam? & per alias conjugationes ad portionem? Particulares porrò frictionū conjugationes, sunt novæ in universum. Quippe si tres, quæ à qualitate frictionum sumuntur differentia, tribus quæ à quantitate ducuntur junxeris, novem conjugationes effeceris, ut per subjectam formulam constat.

Qualitas.

Quantitas.

Dura.

{ Pauca.
{ Multa.
{ Mediocris.

Mollis.

{ Pauca.
{ Multa.
{ Mediocris.

Mediocris.

{ Pauca.
{ Multa.
{ Mediocris.

*Frictionum
genera om-
nia dici res-
pectu collatio-
nemq;
Pueri habi-
tudinis opti-
ma qualis fric-
tio conveni-
at.*

Meminiſſe autem oportet, hæc omnia frictionum genera respectu collationeq; dici: quando quæ huic dura est, alteri mollis fuerit, ac sic intelligendum de cæteris. Igitur optimæ habitudinis nobis propositum puerum, cuius: volumus pristinam mediocritatem servari, neq; duriter, neq; molliter, neq; multis frictionibus, neq; quantitate mediocribus, sed paucis, & qualitate mediocribus, infricabimus: nihil ultra moliri, q̃ ut ad exercitandum corpus ipsius præparemus: ac rursus, cum jam satis exercitatum sit, apothepia curemus. In traditione autē harū differentiarū, Hippocrates usus est doctrina quæ per rerū elementa instituitur, ceu aliis omnibus utiliori: quippe quæ & sub cōpendium rem omnē cogit, & memoriæ affigit, & reminiscentiæ faciliè suggerit, ac omnium quæ singulatim agentur, rectum usum promptè suppeditat, ceu ad pauca & certa elementa referens. Quis enim non faciliè membratim frictionum differentias, usum, ac vires inveniat, si intelligat illam senis sententiā, quæ docet, constringere quidem frictionem duram, solvere mollem, minuire multam, augere mediocrem posse? Ex horum nanq; notitia ac memoria, primum sanè quæ omiſſæ in verborū cōtextu sunt, differentias invenias: mox omnibus inter se cōplicatis, novem illas cōjugationes efficias, quas paulò suprà descripsimus. Sed jam de affectuum

nominibus nō nihil dicendū est. Ac duri quidem & mollis vocabulū, quidnā significet, planè constat: rari autē & densi, nō usque adeo. Est enim propriè rarū, q̃ meatus magnos per totum obtinet: sicuti è diverso densum, q̃ eosdem parvos. Tamen et si per metaphorā, de laxo coactōq; hæc ipsa vocabula dici audias. Qua ratione & aërem & ignē aliquādo raros dicimus, aquā & terrā dēſas, quæ tamen & unita sunt, & ex similaribus natura partibus constant, nec ullos ejusmodi meatus obtinent. Oportet autē nō nominū inspicere numerū, sed affectuū genera duplicia in totū existimare, alterū quod in similarib. observatur, de quo molle durūve dicitur: alterū q̃ in instrumentis, meatuū ratione, consistit, q̃ densum, vel rarum vocatur. Hi nāq; corporū ipsorū proprii affectus existunt. Ceterum ad institutū redeundo, frictio ipsa interdū per se corporibus nostris cōmodum aliquod affert: interdum iis quæ cōmodum afferunt, subministrat. Efficit autē frictio, rara densando, & mollia durando: atq; hæc quidē omnino dura esse postulat: præterea dura molliendo, densa laxando: quæ contrā sit mollis oportet. Pari modo & quæ carnis augendæ minuendæve causa suscepta est, utraq; per se utile aliquid corpori præstat. Quæ tamen ad exercendū corpora præparat, itē quæ post exercitationē adhibetur, hæc exercitationibus subserviūt: illa modicè calfaciēdo tenues meatus recludēs, & simul excrementa carnis fluxilia reddens, & solidas emolliēs particulas: altera, quam apothepicē, hoc est, recuratricē appellāt, cum plusculo oleo administrata, simul sua pinguetudine humectat, & solidas emollit particulas, & quæ in corporis meatibus cōtinentur, discutit. Sed præparatoria illa frictio in optimi status natura calfaciēdi corporis causa suscepta, fiat mollis primū: mox verò exercitationem aggressuro, dura. Quod si quid erroris contingat, id potius ad durum atque densum deflectat, q̃ ad laxum & molle. Nam transpirandi defectū, exercitio sarcire licebit: alterius verò affectionis vitium, quod est ad externas injurias opportunitas, neq; alias corrigi faciliè potest, facitq; ut nō excrementū modò, verū etiam corporis nutrimentū evaporetur. In iis autē frictionibus quæ à quantitate ducuntur, in proposita natura & ætate, si qd delinquitur, versus id q̃ minus est id esto, cum augendi ejusmodi corpus, haudquaquā siccandi, nobis studium sit. At verò ipsa frictionū mensura, secundū temperaturā aëris qui corpus fricandum ambiet, secundūq; anni aut diei tempus, atque adeo constitutionē regionis, debet variari. Cæterū dum proposui hominē eo corporis statu de quo queri non posset, obiter etiam regionē ipsius potestate nimirū definivi: cum nec optimo temperamento, nec irreprehensibili omnino membrorū modulo, corpus ullū in iis regionibus quæ à temperamenti modo recesserunt, gigni possit. Quippe sicci, graciles, & veluti torrefacti, in æstuosis tractibus homines fiunt. Rursus frigidioris plagæ incolæ, inæquali temperamento visuntur, ut in quibus externa frigeant, interiora impensè caleant. Itaque apud Gallos, Scythas, Egyptios, Arabas, ne per somnium quidem usquā est vidisse id corpus, quod veluti

*Frictionem
duram con-
stringere:
mollem, solve-
re: multam,
minuire: me-
diocrem auge-
re posse.*

*Rarum
Densum
quid.*

*Elementa
rere pro
meatibus
Affectum
duplicia
nera.*

*Frictio
Frictio
lis.*

*Frictione
exercitatio
sub serva-
tes.*

*Apothepa
pentice
Frictio quæ
usum præ-*

*Frictio præ-
paratoria
qualiter
ministran-
sit.*

*Frictionum
mensura
ta qua sit
rianda.*

*Corpus opti-
mè constitu-
tum in regi-
onibus inten-
peratis gigni
non posse.
Regiones in-
temperata
qualis prodi-
cans corpora*

veluti Polycleti regula existit. Qui in nostro situ, non pauca similia videas. Siquidem nostræ regionis, quæ in latitudinem non parvam extenditur, id quod in medio habetur, optimè sanè temperatum est, cuiusmodi patria est Hippocratis. Eiusmodi igitur locum cum corpori proposito dederis, anni quoque tempus, veris medium ipsum dabis: ex die autem, meridiem. Eadem exigit ratio, ut ne domus quidem in qua exercendus est, ipso præsertim die calidior frigidiorve sit, quam publicus totius urbis aer: qui hyeme quidem calidior, æstate autem frigidior, vel arte parandus est, quò exacta temperie corpus, frictionis tempore fruatur. Sunt autem rubor & tumor in æris temperie & corpori statu temperato, mediæ frictionis notæ. Veluti enim si calidam infundas, primū quidem corpus intumescit: si largius infundas, decumbit: ita frictio quoque attollit quidem primū, postea contrahit, ac molem deponit. His ergo qui carnis augendæ causa fricantur, tunc planè finienda frictio est, cum corpus & intumuit, & ad summū ferè tumorem pervenit. Qui autem ad exercitandum jam præparantur, his minimè id tempus expectandū, sed longè prius desistendum à frictione est, potissimum cum optimi temperamenti sunt, & ætate adhuc pueri. Præparatoriæ verò frictionis est finis, ut solidæ partes molliantur, humidæ solvantur, corporis exigui meatus laxentur. Porro expedit neque paulò animosiores esse, qui exercitatur, ut lassus jam viribus etiam exerceri aveat, quod contingit ijs qui sunt calidiori temperamento: neque item ignavū, qui integris adhuc viribus, laborè tamen detrectet, quo solent ij qui aut laborant plethora, vel frigidum temperamentum sortiri. Porro natura optima, quæ hic est nobis proposita, frictionis, exercitationisque, ac tum cibi, tum somni mensuras apertè indicat. Hæc tunc primū quodlibet horum respuit, cum eius ultra non eget. Quare ipsius quidem naturæ ad singula quæ agi debent promptitudo & alacritas, ei qui tali præficitur corpori, fuerit index mensuræ. Quippe sanū corpus ipsum, sibi ipsi omnia invenit proprio naturæ suæ impetu directum: maxime si in ijs quæ ad animum pertinent, rectè sit educatum. Nam multi in malis moribus à pueris educati cum sint, in desidiaque & intemperantia viventes, bonitatem naturæ corrumpunt. Sicuti contra nonnulli vitiosam corporis naturā sortiti, temperantia vitæ, & tempestivis exercitiis, naturæ vitia cōmutarunt in melius. Genera exercitiorum sunt, lucta, pancratiū pugillatus, cursus, & alia id genus: quorū nonnulla tantū sunt exercitia, ut illa ipsa quæ modò diximus: nonnulla verò exercitia simul & opera, ut cum aliquis, exempli gratia, fodit, aut remigat, aliudve quippiam exercet, in usum mortaliū. Atque horū etiam plerisque est, quādo veluti pro exercitatione tantum utare. Triplex autē ipsorū in universum est usus: cum interim operis tantū gratia usurpentur: inter meditationis, sed quæ ad usum futuri sit operis: interim pro exercitatione tantum. At nullum exercitium, ut exercitium, aut perpetuum diem obitur, aut alio tempore quā ante cibū. Servari verò tum modum exercitationum in his

oportet, tum vocatam apothepiam. Quod si etiam idonea frictione usus, ad ea quis accedat, jam omnes exercitationis numeros impleverit. Ac genera quidē exercitationū sunt ea quæ diximus: qualitas verò seu differentia, velocitas, tarditasque; movendi sunt: præterea quòd aliud robustum, aliud imbecillum est: ad hæc, vehementia & lentitas. Utendi verò rationes sunt huiusmodi. Nam aut perpetuus motus est, aut intercisus; & si perpetuus, æquabilis, aut inæquabilis. Sin intercisus, aut certo ordine, aut citra ordinē. Hæc igitur utendi rationes ab ipso negotio capiuntur. Quæ verò ab ijs quæ extrinsecus sunt posita ducuntur, eiusmodi sunt, quòd aut sub dio exercitatio sit, aut sub tecto, aut in mixta umbra, aut calenti loco, aut frigido aut temperato, aut sicco, aut humido, aut medio, aut cū pulvere exiguo multoque, aut cū exiguo aut exuberanti oleo, aut etiam sine utroque. Omnium autē exercitationū cōmune est illud, quòd earū auxilio, animalib. ex ipsorū corporibus, insiti caloris augmentū excitatur. Is tamen proprius exercitationū effectus non est, si modò & iratis, & perturbatis, & pudore affectis naturalis etiam calor augetur. Quāquā ira, non augmentū, sed veluti fervor est caloris in corde. Jam verò ex exercitiis ipsis, aliam partem aliud alio magis fatigat: quædam lentè motis fiunt, quædam ocysimè agitatæ, quædam robore & nixu adhibitis, quædam sine his: ad hæc, quædam cum robore pariter & celeritate, quædam languidè. Fodere ergo, robusta exercitatio est. Similiter, & quatuor simul equos habenis coërcere impensè robusta exercitatio est, nō tamen celeris. Ad hæc sublatio maximi oneris, inambulatioque acclivis, huius quoque generis sunt. Præterea si quis per funem manibus apprehensum scandat, aut ex eo arrepto sublimis pēdeat, ac diu ipsum teneat, robustū is, validumque laborè exercet, citra tamē celeritatē. Ita verò & si quis manibus in pugnū reductis, iisdē prolatis, vel in altū sublatis, diutissimè in habitu eodem consistat. Quod si adhibitu quempiam deducere sibi manus jubeat, nec tamen ipse remittat, vel impensius hic tum musculos omnes, tum nervos ad robur cōparat, ut quorum maxime propria sunt omnia id genus exercitia. Jam si calpiam jusseris ut te violenter detrahat, inflectatque dum toto erectus es corpore, non levem ad membrorum robur exercitationem obieris. Robur aut partium & exercet & firmat, qui aut quē complectitur mediū, absolvere sese jubeat, aut ipse se à cōplectente solvat. Ita etiā & si quis antagonistam suum à latere aggressus, ilibus apprehensum, ceu aliquod onus sublatū, vicissim proferat, reducatque. Equè verò qui pectoribus ex adverso innixi, magno se conatu retrudunt invicem. Etiam qui à cervicibus pendentes deorsum trahunt, ad robur præparant. Cæterum talia omnia exerceri citra palæstrā aut copiosum pulverem queunt, quocumque cōculcato loco, erectis atque stantibus. Quæ verò luctantes inter se moliantur, cum robori augendo student, hæc aut pulverem altum, aut palæstram desiderant. Sunt infinitæ aliæ in palæstra exercitationes id genus robustæ, quarū omnium peritiū usumque pædotriba caller, si ipse à gymnaste diversus, ut à medico

Exercitatio-
num quali-
tas.

Exercitiis ut-
tendi ratio-
nes.

Exercitatio-
num omniū
quid sit com-
mune.

Calor in quibus augeatur perturbatio-
tionibus.

Ira est veluti
fervor calo-
ris in corde.

Exercitiorū
diversa gene-
ra.

Exercitia ro-
busta absque
celeritate.

Exercitia
musculorum
maximè pro-
pria, quæ.

Exercitiorū
quæ nam ci-
tra pulvērē,
et quæ mini-
mè, possint
administrari.

Pædotribam
differre à
gymnaste, ut
differre à me-
dico dico coquum.

*Exercitia
qua celerita-
te absq; robo-
re peragun-
tur.*

*ἐκπλεγεῖν.
πιτυλιεῖν.*

*Exercitatio
vehemens ex
robusta cele-
ritate compo-
sa est.*

*Exercitia
crurum.
Manuum.
Lumborum.*

*Exercitatio-
nes thoracis
sunt respira-
tiones & vo-
ces.*

*Voluntaria
actiones, qua-
rum partium
sunt propria.*

*Motuum na-
turalium spe-
cies diversa.*

*Facultatib;
naturalibus
quatuor gub-
ernari om-
nes partes.*

*Motus cordis
arteriarumq;
intermitti-
tur nunquā.
Pulsus a qui-
bus causis
mutentur.*

*Venarum o-
pus a quibus
causis varia-
ri possit.*

*Motum qui
actiones non
sunt, differen-
tia triplex.*

*Equitatione
concurrit visce-
ra.*

coquus. Peraguntur autem celeritate, citra robur & violentiam, cursus, umbratilis armorum contentio, necnon quæ summis manibus fit concertatio, tum quæ per corycū & pilam exercitatio à distantibus & curretibus administratur. Huius generis est & quod ἐκπλεγεῖν Græci dicunt, & quod πιτυλιεῖν, necnon celeris volutatio & circuitio in oalæstra. Potest & solis cruribus, manibusve, idq; erectus, ac uno loco consistens, celeriter exerceri. Porro exercitatio vehemens, ex robusta celeriq; cōposita est. Non in postremis verò vehementes hæ sunt, fodere, discū mittere, saltare, idq; sine intermissione: similiter, grave quodvis telum jaculari, cōtinuatis sibi q̄ maximè jactibus: aut gravi armatura tectū, celeriter agitari. Sed qui aliquo taliū exercetur, intermittere paululum solent. Quæ verò remissiores exercitationes sunt, eæ sine interposita quiete magis fiunt. Cæterū incessus, cursusq;, crurū exercitationes sunt: acrochirismi & sciamachia, brachiorū ac manū propria. Lumborū autē, assidue se in omnes partes torquere inclinareq;, idq; aut pondus aliquod è terra tollentē, aut assidue in manibus sustinentē. Thoracis verò & pulmonis, maximæ respirationes, propriæ exercitationes sunt. Maxima aut vox præter jam dicta, vocis quoq; instrumenta omnia permover. Porro voluntariæ actiones, musculorū, nervorū, atq; tendonū sunt omnes propriæ: cum ipsis tamē unā movetur ex accidenti & cæteræ animalis partes, si motus ipse celerius & vehementius edatur. Reliquorū autem motuum qui vel naturales sunt, vel pro animi eduntur affectibus, alii cordis & arteriarum, alii venarum & jecinoris actiones sunt: atq; horum quidē primū, & maximè: secūdo loco, reliquarū omniū partiū, quandoquidē quatuor naturalibus facultatib; omnes gubernantur. Ac arteriarū quidē cordisq; motus nunq; sanè omnino intermittitur. Cæterū magnitudine, parvitate, velocitate, tarditate, & vehemētia, variè intēditur atq; remittitur. Una igitur mutadi puls⁹ causa est, naturalis caloris auctio, diminutioq;: atq; hæc quidem pro anni tempore, nutrimento, potione, balneo, frictione, somno, vigilia, itemq; animi affectibus, & voluntariis actionib; incidit. Altera causa est, secundū quantitatem animalis spiritus alteratio, quæ pro motus voluntarii differentiis variatur. Tertia, quæ ex firmitate, infirmitateq; naturalis virtutis accipitur, pro substantiæ ipsius cordis & arteriarū bono contrariove temperamento accidens. Quarta deniq; est, quæ ex instrumenti ipsius malo affectu æstimatur. At venarum opus, unā cū aliis instrumentis, quæcūq; natura ad alimentum dispensationē excogitavit, pro cibo potioneq;, tum verò pro distributionis in corpus, & cōcoctionis, & nutritionis ratione variatur. Huius verò mutationis, arteriæ quoq; participes sunt. Qui verò motus actiones nō sunt, horū triplex intelligitur differētia. Alij nāq; animantib; ex seipsis insunt, ut quos antea cōmemoravimus. Alii extrinsecus adveniunt, ut navigatio. Alios medicamenta pritant, Nonnulli tamē mot⁹ planè sunt mixti, ut equitatio: qua quidē qui exercetur, simul & agit, & agitur. Cōcutitur aut præcipuè secundū viscera. Quæ quidē ubi quis-

piam fricare voluerit, statuatur is qui fricat, à tergo, ac modò in dextrā, modò in sinistrā, manus injiciat. Sanè cōcuriunt nōnihil ea quæ sub septo viscera sunt, & maximæ tum respirationes, tum voces, pariq; modo efflatus. Iam ipsa spiritus cohibitio, exercitatio quædā musculorum est, non minus certè eorū qui in abdomine, q̄ qui in thorace insunt. In summa verò, validi & ocyssimi motus, gracile, musculosum, durū, compactum, atq; vegetū corpus efficiunt. At remissi, tardi, & languidi, diversam omnino affectionē inducūt. Prædotriba igitur, quicquid in palæstra motuū geritur, accuratè pernovit: quid quisq; motus efficere queat, ignorat: cum hoc ipsum ad gymnastam solū spectet, cuius prædotriba minister est, indicans nimirū illi omnē actionū exercitiorūq; materiā. Ergo gymnastes propositi nobis adolescentis, omniū quidem exercitationū vires cūm sciat, deligit illi ex omni genere quod moderatū mediumq; inter utrunq; excessum est: quādò nō alterare, sed planè servare optimū corporis statū convenit. Ac proinde ex omni genere mediocritas adhibenda est, frictione, exercitatione, balneo, cibo, somno, ita ut neq; durior illi, densiorve, nec mollior aut rarior corporis habitudo reddatur: hæc quippe ab extrinsecus imminenti-bus facile offenditur: illa corporis inhibet auctum. Exuat autē se puer ipse propositus, ubi in lotio jam pfecta cōcoctio cernitur. Mox frictionis ratio huc spectet, ut membra molliantur. Post hæc exercitetur, dum & corpus intumescit, & color illi floribus apparet, & motus prōptè, æqualiter, & concinnè edit. Inter hæc verò sudorem cum calido vapore mixtū cernes. Inhibenda verò exercitatio tum primū est, cum aliquod horū fuerit mutatū. Nec tamen protinus lavandū eius est corpus, sed ubi summus exercitationis vigor remissus atq; sedatus fuerit. Quod si illa velit cohibito anhelitu implere, perfundi oleo, atq; apothērapia uti deinceps debet: de qua in sequenti libro dicemus. Lavacrū autē ipsum omnino medio temperamento eligendū est, ad propositā ætatem atq; naturā. Cui ne pulvere quidē est opus, si domus in qua exercitabitur, optimè constituta sit. Quæ si fuerit calidior, tum pulvere utendum. At eo si uteretur, omnino erit lavandū. Sin nō uteretur, liceat & illotū dimittere, præsertim hyeme.

GAL. DE SANITATE TUENDA LIB. III.

Stautem apothērapia duplex. Una quidē ceu exercitationis species: altera verò ceu pars, de qua impræsentiarū agendū est. Omnis igitur exercitationis probè peractæ postrema pars, apothērapia dicitur: quæ duplici cōsilio suscipitur, & ut excrementa expurget, & ut corp⁹ à lassitudine tutum reddat. Proprius tamen apothērapia scopus est, ut lassitudinē quæ succedere immodico exercitio solet, submoveat, atque prohibeat. Cæterū optimè constituto, à nobisq; proposito puero, cum eoq; aliis, qui tuendæ tantum bonæ valetudinis gratia exercentur, etsi rarò lassitudo succedat, quemadmodum supervenire solet athletic, cæterisq; etiā qui corpus opere ex necessitate fatigant: eis tamen apothērapia est ex

est ex usu, si nō lassitudinis nomine (à qua etiam nos securiores reddet) at certè excrementa purgandi gratia. Qualis autem apothèrapia sit adhibenda, ipsa finit, ad quos tendimus, demonstrabit natura. Cum igitur & excrementa digeri, & quæ tensa ex exercitatione sunt, molliri expediat, duræ certæ frictiones fugiendæ sunt, nec his minus à lentis cavendū arbitror. Nam postq̃ à se corpus non amplius dimovetur, periculū est ne frigescat ac defescat, dū nulla ope externa cal-
 10 fit: quare nō solū celeriter, sed adhibitis plurium manibus, largiori; oleo circūfuso, fricandū est. Oleū quippe ad velocitatē frictionis cōducit, remittit tensa, simulq; mulcet ac mollit mēbra defatigata. Sed nimīū mollis frictio etiā vitāda est, ut quæ neq; altius penetret, neq; ea quæ in angustis meatibus hærent, discutiat: cuius profectō causa, tum ipsam fricandarū partiū tensionē, tum spiritus cohibitionem injungimus. Media igitur frictio, quæ ab utriusq; distat incōmodo, eligenda est. Nō exigua autē apothèrapia portio spiritus cohibitio videtur: cū qua si leviter cōtrahantur abdominis muscoli, partes quæ in ventre cō-
 20 sistunt, quicquid excrementi est in ipsis, exprimunt. Si verò feriari planè patiaris abdominis musculos, nullius earū partium excrementa vacuabis. Quæ tamē in thorace & pulmonibus delitescunt, ea deorsum trāsferes. Expedi autē huc transferantur potius, q̃ in illis maneant, tantō profectō magis, quanto etiā eorum quæ in ventre, q̃
 30 quæ in pulmonib. & pectore cōtinentur, promptior exitus patet: hæc enim vel evomūtur facile, vel dejiciuntur: illa cū conatu & vi ejiciuntur per tusses. Verū si quis perinde ut septum transversum, ita abdominis quoq; musculos anhelitus cohibitione intēdat, exquisitius planè expurgabit ea quæ sub septo sunt viscera: nō transferetur tamē quicq; à spiritus instrumentis, ad ea quæ nutrimento sunt delegata, sed totū in ipso thorace pulmonibusq; excrementū manebit. Quare
 40 cohibitionē anhelitus id genus impræsentiarū nō probo: multoq; minus, si quis omnino nō distento septo, validè ac vehemēter musculos abdominis cōtrahat: quando ita necesse est venas omnes, partesq; quæ circa collū sunt, flatu ac sanguine impleri: excrementa verò sursū atq; ad caput, nō deorsum & ad ventrē ferri, ut in tibia cinibus, acutamq; & maximā vocem edentibus indies videre licet. Est autē omne huiusmodi opus, mixtū ex maxima expiratione, & ex cohibitione spiri-
 50 tus: nimirū in efflatibus cōfertim factis, maximo expiratu edito, idq; cum validissima musculorū tum qui costis insident, tum qui in abdomine sunt, tensione. At in spiritus cohibitione, eadem utrorūq; musculorū, facta tensione, nullo tamē spiritu elabi permissio. In ijs qui tibia sonant, aut acutā vocē edunt, musculis pari modo tensis: spiritu tamē nec penitus cohibitio, nec toto simul emissio, sed mediā rationē servāte. Causa autē harum actionū triū est pharynx, qui in totius quidē spiritus simul cōpulsi efflatu, latissimè se ex-
 60 pandit: in spiritus cohibitione, prorsus clauditur: nūijs qui tibia sonāt. aut voce acuta simul & magna utitur, mediū quenda habitū servat. Ceterū cohibitio spiritus, quæ ad apothèrapia est utilis,

attollit ea quæ ad ventrē spectāt, idq; tensis thoracis musculis, & remissis qui sunt in septo & abdomine: ita nāq; deorsum excrementa ferētur. Secundo autem loco habēda est, quæ mediocriter eos qui in abdomine sunt musculos tendit, quō videlicet ea quæ sub septo sunt viscera, apothèrapia fructū sentiant. Atq; his ipsis de causis fasciarum circumactus fiant, quas fricantes ipsi dum à tergo fricandorū cōsistunt, circa totū ventrē adhibent. Aliās verò cum à frōte se collocarint, cervicibus circa dorsum circūvolutiones efficiunt, duabus manibus circūducentes. Alias præterea costis, spinæ, & pectori accōmodant, idq; cōverso pariter cum his quodāmodo eo qui fricantur. Circa lumbos verò similis fasciarū circumjectio fiet, tendēte se ad singulas eo qui fricatur, nō tamen cum omnibus pariter se revertēte: cum neque cōtinuos motus, nec vehemētes ei cōtingere ex apothèrapia, sicuti ex præparatoria, conveniat: sed certè aliquos, & quibus ex intervallo frictiones sint interpositæ. Hæc enim vel maximè ratione, & calorem qui exercitando est adactus servaverit, & simul excrementa propriis ipsius tum tensionibus, tum motibus ejecerit. Ad quod sanè opus cohibitio spiritus cōducere non parum mihi videtur. Quippe exilia instrumentorum foramina, vehementiori spiritus inflatu videas etiam expurgātes opifices: extruduntur siquidem quæ antè occurrūt: attrahuntur quæ ad
 100 latius sunt posita, impetu ipsius spiritus utraque acta. Cum autē vehementissimi materiæ impetus, diversis temporib. ac rationibus, contrarios edere effectus possint: obstruere quidem, cū crassum & multū fuerit, quod confertim ac præceps agitur: purgare verò, cū exigū tenueq; est, nec præproperè, nec violenter cogitur simul vniversum expelli: rectè mea quidem sententia illi faciunt gymnastæ, qui inter ipsam vehementem exercitationē interponunt cohibitionē spiritus necnō frictionem quæ apothèrapia debetur, simul hominē recreantes, paulatimq; ipsius cutis expurgantes meatus. Nobis autem proposito juveni, cū mediocri exercitio atque etiam victus ratione utitur, non est opus interpositione id genus, quæ ob contrarias causas athletæ postulant. Ac de apothèrapia quidem abundè nobis est dictum. Nunc de balneis agere tempestivum videtur, ac primū quidē de aquis dulcibus calefactis. Earum igitur, si media temperie
 110 sint, vis calida & humida est: sin tepidiores, humida & frigida. Quod si iusto calidiores reddantur, calida quidē, sed non perinde humida. Quippe horrere corpora, contrahi; exiles eorū meatus cogunt, ita ut neq; madescere ab extrinsecus accedente humore possint, nec excrementi quod intus latet, quicquam emittere. Ceterū ab ijs incipiendum, quæ medium temperamentū obtinent, quæ per se semper calfaciunt & humectant, licet interdum ex accidenti aut per habitum digerant humores, aut supervacua fluxione corporis particulas impleant, aut molliant, aut concoquant, aut vires firment, aut solvant: ad hæc siquidem quantitas quoq; earum non minimū confert. Huius autē balnei juveni à nobis descripto perexiguus est usus, ut qui omnia jam ex
 120 mediocri

Spiritus cohibetio, quæ ad apothèrapia est utilis, quo fiat modo.

Fasciarum circumactio quorsum, & quotupliciter fiant.

Spiritus cohibetio cui opere conferat.

Materia impetus, contrarios edere effectus posse.

Spiritus cohibitionem interponendā esse exercitio vehementi.

Aquam dulcem calfactam, pro intentione ac remissione caloris quem suscipit, & varias facultates sortiri.

Aqua modice calfacta, per se humectant semper & calfaciunt: ex accidente vires alias sortita.

*Balnei mode-
rate calentis
usus.*

mediocri exercitatione, & dicta apothera-
pia consequutus. Nihil fecius tamen si probe bal-
neum adhibeas, ipsum quoq; apothera-
piæ pars aliqua sit. Siquidem duras ten-
sasq; partes emel-
lit: excrementū, liquamentūq; si quid intus ad cu-
tim hæret, evocat. Verū neutrius horū eget talis
adolescentulus: quare elui sibi in balneo sudore
& pulvere, si quando hoc utitur, magis postulat, q̃
calefieri. Ergo transire tantū ad solū usq; non in
balneo morari is debet. Sed nec immorari huic
in piscina est opus: imò lotus quatenus dictum
est, festinet confestim ad mediocriter frigidam. Si

*Frigida la-
dum non est
optimum cor-
pus, quā diu
augescit.*

*Frigida la-
tionis usus.
Frigida la-
tionis tempus,
& gymnaste-
rium aptū.*

quidem optimū corpus quoad augescit, frigida
lavandum non est, ne eius incrementū moretur.
Ubi verò jam abunde est auctum, tum frigida
quoq; assuefaciendum, ut quæ & illud robo-
ret, & cutem duram atque densam efficiat. Tempus
autē ad id per commodum, est æstatis initium, ut
ante hyemē, toto interposito tempore, cōsuetu-
do minimē spernenda inducatur. Esto præterea
dies, quo auspicabimur, quā maximē tranquillus
& quoad id tempus feret, calidissimus: cuius
enim calidissima pars eligenda est: sicuti & gy-
mnasterium mediocriter temperatum. Qui verò

*Frigida la-
tione us-
rus, medium
quarti septē-
nij attingat.*

frigida utetur, in quarti maximē septēnij medio
consistat, pristina salubritatē ad unguem servas:
sitq; is cum animo hilari, tum minimē abjecto:
ac primum quidem linteis durioribus fricetur,
q̃ antea, vehementius: dein oleo prout assuevit
fricetur: ac postmodū exercitetur exercitationi-
bus, multitudine paribus, sed citatiorib. q̃ antea.
Ab his in frigidā, eamq; nec tepidā, nec glaciale,
totus simul insiliat: altera nanq; repercussum ca-
loris non facit: altera ferit insuetos, atq; impensē
refrigerat: Quāq; hac procedēte tēpore utetur,
si necessitas exigat. Exeunti verò ab aqua fricari
oleo, idq; à pluribus, expedit, quoad cutis ipsa in
calescat. Post hæc cibū plusq; cōsuetū, potionē in-
tra consuetudinē, capiat: quæ ultro ipsa facturū
est, modò sint omnia ritē peracta. Nam à frigida
lavatione & plus appetit, & melius cōcoquunt,
ac minus sitiūt, veniūtq; ad exercitationes postri-
die planē meliori habitu: corporis quidē mole,
pari ei quæ antē, cæterū cōpacta & musculosio-
re, ac vegetiore: cute verò duriore ac densiore.
In hoc ergo secundo præterea die, similiter om-
nia sunt peragenda, etiā tertio & quarto. Postea
verò procedente tempore, ad eundem modū fri-
gidam iterum ingredi jubebimus, videlicet post
eam quæ priori ingressui successit frictionē: verū
tertiō eam ingredi, minimē laudo. Nam & secū-
dò id fecisse est abunde, præsertim cum pro arbi-
trio nostro remorari ac detinere illic hominē li-
ceat. Cæterū si egressus frigidam, coloratior ex
frictione citò reddatur, id mediocriter moratū
fuisse indicat. Sin & tardius ei calor redeat, &
decolor diutius maneat, plus æquo moratū do-
cet: quare ex notis quæ in cute sunt, discas mo-
ræ mensuram. Quia verò fieri nō potest, quin ju-
venis exercitationibus deditus, aut sui ipsius, aut
etiā gymnastæ errore aliquādo in lassitudinē in-
cidat, non nihil de ipsa dicendum est. Porro lassi-
tudinis in universum octo sunt differentia: qua-
tuor simplices, totidemq; cōpositæ. Nam quod
incendi tendiq; corpus videatur, & quod movē-

*Aqua glacia-
lis ferit in-
suetos atque
impensē re-
frigerat.*

*Frigida la-
tationis
commoda.*

*Mensuram
mora futura
in frigida bal-
neo, ex notis
quæ in cute
sunt, sum-
mi.*

*Lassitudinis
differentia in
universum
sunt octo.*

ti se, vel ulceris, vel phlegmonis sensus oboria-
tur, affectiones nō sunt, sed symptomata. Simpli-
ciū igitur lassitudinis differentiarū, prima est ul-
cerosa: quæ oritur ab excrementorum copia te-
nuiū simul & acriū, adeo pūgentiū ac veluti vul-
nerantiū tum cutem, tum carnē inter exercitan-
dum, ut etiā horror ac ceu cōcussio universi cor-
poris interim oboriatur. Secūda est lassitudo ten-
siva, citra ullum ulceris sensum. Accidit nanq; in
vehementi tensione, omnes musculorū fibras tē-
di, eas tamen in primis lassari, quæ per longitudi-
nem tensionis porrigūtur: quippe ubi tensæ fue-
runt immoderatus, tendi adhuc videtur, etiam
si nulla jam tensione urgeatur. Tertia differentia
dicitur concussoria, qua nō mirū ceu cōtusas aut
phlegmone obsessas partes sentimus: eaq; tum
solet maximē incidere, cū musculi nimīū exal-
facti attraxerūt quippiā ex circūfusis sibi excre-
mentis. Quod si etiā tum tendonibus, tum ner-
vis idem affectus incidat, quasi ossiū la-

borem, ob penitiorem sensum, eum vocant. At
differentia quarta, quæ improprie dicitur lassi-
tudo, tum incidit, cū musculi supra justū sic-
cantur, sic ut squalens contractumq; corpus vi-
deatur, atq; ad motū quodammodo pigrū, citra
tamen ullū nunc descriptorū symptomatū. Ha-
rum autē quatuor differentiarū singulis, sua re-
media sunt. Cæterū lassitudo ulcerosa, maximē
in ea incidit corpora, quæ et mali succi sunt, & ex-
crementis abundant. Succedit verò recentibus
cruditarib. cū aut exercitantur immoderatus,
aut in sole sunt morati. Nihil tamen obstat, quo
minus in corpore boni succi & citra cruditatem
proveniat, utiq; ob exercitationis excessum. Re-
medium aut huius est redundantis evaporatio,
quæ fiet frictione tum multa, tum molli, cum o-
leo adhibita, à quo omnis astringendi vis absit:
quod genus maximē Sabinū est. Adversissimum
verò huic affectioni est, q̃ a p̃o ex his ex Hispania
& Iberia portatur: quodq; etiā fit circa Aulonē.

Utendum itaque est dulcissimo oleo & copioso,
primo quidem die, quò suspecta lassitudo omni-
no nō sit futura. Secundo verò, ut si qua incidit,
discutiatur. Discutit porrò eam apothera-
pia, in
qua scilicet motus adhibeas quantitate medio-
cres, qualitate tardiores: idq; cum frequenti in-
terposita his quiete, qua utiq; fricare hominem
oportet, pluribus cōrectantibus, quò nec frige-
scat pars ulla, & excrementa ocysimē digerātur.
Porro frictionū plus adhibebitur iis, qui in cute
& sub cute excrementorum collectā vim habēt:
motū verò, quos ipsi met edant, in altera lassi-
tudine, in qua plus est in ipsis congestum muscu-
lis. At lassitudo tensiva, pro remedio relaxatio-
nem postulat: ea nanque tensioni contraria est,
quemadmodum & duritati mollieties. Hac autē
lassitudine affecti, relaxabuntur pauca mollique
ex oleo dulci gelidoq; frictione: tum intermis-
sione omnino, aut quiete, aut lavatione medi-
temperamē, atq; in calida pluscula mora: quod
si bis tēve laveris, plus proderis. Hi verò & post
balneum ungi desiderant, priusquam vestiatur.
Quinetiam postero die, cū ē cubili surgūt, un-
gi his expedit: nūquam tamen oleo extremē fri-
gido, nec dura frictione. Tertia lassitudo, quæ

ex ve-

ti se, vel ulceris, vel phlegmonis sensus oboria-
tur, affectiones nō sunt, sed symptomata. Simpli-
ciū igitur lassitudinis differentiarū, prima est ul-
cerosa: quæ oritur ab excrementorum copia te-
nuiū simul & acriū, adeo pūgentiū ac veluti vul-
nerantiū tum cutem, tum carnē inter exercitan-
dum, ut etiā horror ac ceu cōcussio universi cor-
poris interim oboriatur. Secūda est lassitudo ten-
siva, citra ullum ulceris sensum. Accidit nanq; in
vehementi tensione, omnes musculorū fibras tē-
di, eas tamen in primis lassari, quæ per longitudi-
nem tensionis porrigūtur: quippe ubi tensæ fue-
runt immoderatus, tendi adhuc videtur, etiam
si nulla jam tensione urgeatur. Tertia differentia
dicitur concussoria, qua nō mirū ceu cōtusas aut
phlegmone obsessas partes sentimus: eaq; tum
solet maximē incidere, cū musculi nimīū exal-
facti attraxerūt quippiā ex circūfusis sibi excre-
mentis. Quod si etiā tum tendonibus, tum ner-
vis idem affectus incidat, quasi ossiū la-

borem, ob penitiorem sensum, eum vocant. At
differentia quarta, quæ improprie dicitur lassi-
tudo, tum incidit, cū musculi supra justū sic-
cantur, sic ut squalens contractumq; corpus vi-
deatur, atq; ad motū quodammodo pigrū, citra
tamen ullū nunc descriptorū symptomatū. Ha-
rum autē quatuor differentiarū singulis, sua re-
media sunt. Cæterū lassitudo ulcerosa, maximē
in ea incidit corpora, quæ et mali succi sunt, & ex-
crementis abundant. Succedit verò recentibus
cruditarib. cū aut exercitantur immoderatus,
aut in sole sunt morati. Nihil tamen obstat, quo
minus in corpore boni succi & citra cruditatem
proveniat, utiq; ob exercitationis excessum. Re-
medium aut huius est redundantis evaporatio,
quæ fiet frictione tum multa, tum molli, cum o-
leo adhibita, à quo omnis astringendi vis absit:
quod genus maximē Sabinū est. Adversissimum
verò huic affectioni est, q̃ a p̃o ex his ex Hispania
& Iberia portatur: quodq; etiā fit circa Aulonē.

Utendum itaque est dulcissimo oleo & copioso,
primo quidem die, quò suspecta lassitudo omni-
no nō sit futura. Secundo verò, ut si qua incidit,
discutiatur. Discutit porrò eam apothera-
pia, in
qua scilicet motus adhibeas quantitate medio-
cres, qualitate tardiores: idq; cum frequenti in-
terposita his quiete, qua utiq; fricare hominem
oportet, pluribus cōrectantibus, quò nec frige-
scat pars ulla, & excrementa ocysimē digerātur.
Porro frictionū plus adhibebitur iis, qui in cute
& sub cute excrementorum collectā vim habēt:
motū verò, quos ipsi met edant, in altera lassi-
tudine, in qua plus est in ipsis congestum muscu-
lis. At lassitudo tensiva, pro remedio relaxatio-
nem postulat: ea nanque tensioni contraria est,
quemadmodum & duritati mollieties. Hac autē
lassitudine affecti, relaxabuntur pauca mollique
ex oleo dulci gelidoq; frictione: tum intermis-
sione omnino, aut quiete, aut lavatione medi-
temperamē, atq; in calida pluscula mora: quod
si bis tēve laveris, plus proderis. Hi verò & post
balneum ungi desiderant, priusquam vestiatur.
Quinetiam postero die, cū ē cubili surgūt, un-
gi his expedit: nūquam tamen oleo extremē fri-
gido, nec dura frictione. Tertia lassitudo, quæ

ex ve-

Affectus simplices, simplex remedium postulat.

& viri-

*Obstructio
unde oria-
tur.
Densitas
unde.*

*Olea calida
& relaxan-
tia.*

*Unguenta re-
laxantia.*

*Anethinum
unguentum
esse aptum
cuti densa la-
xanda.*

*Affectus & a-
rii si in unū
conspirent,
quid agen-
dum.*

*Venero ex
usu imbecil-
iores reddi-
ti, aut exolu-
ti, aut refri-
gerati, qua
ratione corri-
gi debeant.*

*Venero reddit
corpus laxi-
us, frigidius, im-
becillius &
siccus.*

*Apothera-
pia quando
sit utilis.*

*Exercendum
non esse si sub
sit cruditas.*

& viribus antecellit. Ac dignitate quidem & vi-
ribus major latitudo est, quæ phlegmones sen-
sum præfert, quàm excrementosa. Est affectus
jam dictis proximus, & ipsa meatuum cutis an-
gustia, quæ obstructis illis aut densatis contingit.
Ac obstructio quidem ex lentis crassisq; excre-
mentis oritur: densitas, tum ab ijs quæ astrin-
gunt, tum quæ refrigerant. Verùm obstrui pro-
positi nobis corporis cutis, si ad præscriptam ra-
tionem ritè agatur, non potest: densari certè ali-
quādo potest, tum ex valido frigore, tum alumi-
noso balneo. Fieri autè potest, ut & post balneū,
sudorēve, prius laxata cute, auræ flatus inci-
dens, obstructionē quampiam densationēque
efficiat. Cui remedium est calfactio: ac proinde
valentiore exercitatione, ac balneo calidiore u-
tendum. Magis autè ad rem pertinebit, si in pri-
ma domo pinguius oleo aliquo antiquo, rela-
xanteq; (quale Sabinum est) volutetur. Mora ve-
rò in frigido solio diuturna ne sit, sed neq; aqua
frigida. Inducendi autem, ungantur aliquo, quod
mediocriter calefaciat. Oleis quidem ex ijs quæ
in Ægypto habentur, cicino & raphanino in re-
liquo orbe, dulci, tenui, ac modicè antiquo. Un-
guentis verò, susino, gleucino, irino, amaricino,
& cōmagino. Ex quibus sanè gleucinū, prorsus
acopum est, ac relaxans. Paulò hoc calidius, ma-
gisq; relaxans, susinū est. Irinum verò & amari-
cinum, & cōmaginū, etiam susino calefacere po-
tentiora, iis affectibus qui propriè frigiditates
dicuntur, sunt idonea. Cutis tamen densitati sa-
nanda, etiam anethinū est satis, maximè si ex vi-
ridi anetho fiat. Facit & ad tales affectus acopū
quod ex abietis semine conficitur. In universum
autem, cum in idem varii affectus coierint, hi, si
unam medendi rationem indicent, utiq; intendi
magis eam rationem conveniet, quàm si singuli
seorsum consisterent. Sin cōtrarii sint, is qui vin-
cit affectus prius est corrigendus, ita tamen ne
reliquum omnino negligas. At qui vel propter
ætatem, vel etiam alia ratione imbecilles, concu-
buere, in his virium infirmitas necesse est supe-
ret. Qui verò firmiores & juvenes, veluti qui
nunc est propositus, horum habitus corporis in-
raritatem magis, quàm vires in imbecillitatem,
mutatur. Itaq; etiam corriguntur hi per ea quæ co-
gunt & contrahunt, qualis præparatoria existit.
Quod si etiā ex venere, & refrigeratio sentiat,ur,
tum præcipuè præparatoria exercitatione est u-
tendum: quando quidem ea nō solum calorē ex-
citāt, sed habitū etiam cogit, atq; constringit. Si
verò anni tempus non dissuadeat, neq; à frigido
balneo abstinendum censeo. Sit autem cibus &
humidior, & parcior, mediocq; temperamento,
vel calidiore. Nam cum corpus à ventre & la-
xius, & frigidius, & imbecillius, & siccus sit red-
ditum, debent planè quæ densent, & calefaciant,
& vires reparent, adhiberi, atq; ad hæc studium
omne impendi. Post vigiliam autem vel tristitiā,
vel ambas, quæ apothera pia dicitur exercitatio
idonea est, si tamē cruditas absit. Nam si qua sub-
sit, omnino exercitandū nō est. Cum autè à vigi-
liis & tristitia graciles magisq; aridi, ac minus di-
cto audiētes planè cernantur, siccus existimandū
est his redditū esse corpus. Quare tales affectus,

partim molli frictione ex multo oleo, partim re-
perato balneo sanantur: partim tarda & modi-
ca agitatione, quæq; subinde interponat quietē.
Is verò apothera pici exercitii erat modus.
Ad eundem modum ex quæ ab ira, vel potionis
penua siccitates fiunt, corrigendæ sunt. Cōtra-
ria prorsus à jam dictis ratione humiditates e-
mendare cōveniet, quacumq; ex occasione pro-
veniant: quippe studium in his ad siccationē di-
rigitur. Cæterū si ex longiori desidia, & hume-
dantis alimenti immodico intempestivoq; usu,
cōtracta humiditas est, longiori remedio est o-
pus: sin ex liberaliori potione quæ pridie sit hau-
sta, citra ullum capitis, aut oris ventriculi affe-
ctum constiterit, eam vel unico die persanare li-
cebit, si sicca frictione largius, & exercitatione
veloci, & parciore potione, & sicciori cibo utere.
Porro si lassitudinis sensus ullus à somno appa-
reat in proposito juvene, atq; is siccior iusto cer-
natur, ungendus dulci oleo est: fricandusq; ut o-
mnino parcissimè, ita neq; duriter, nec molliter
est, idq; matutino tempore. Quod si etiam cutis
densitatem corrigere studes, utique ei quæ ex du-
ris tum frictione, tum contrectatione, præterea
vehementi exercitatione orta est, mollis frictio
cum copioso, & dulci oleo medetur. Quæ verò
cōtracta ex frigore est, eam primū frictione sic-
ca ac celeri, deinde cū oleo adhibito calefacien-
tes, naturæ suæ restituemus. Laxitatē verò, quæ
frequens balneum, & mollem frictionem, et ve-
neris usum consecuta est, paucula frictione, pri-
mū quidem sicca, deinde cum oleo quopiam
eorum quæ astringant sanaveris. Humiditatem
quæ nimia potioni successit, sicca frictio cū lin-
teo administrata, vel cū manica, interdū etiam
solis manibus, corrigit. At vespertina frictio ijs
utilis est, quos vel lassitudo valida premit, vel
siccitas male habet: vel atrophia macerat. Igitur
in natura proposita, cum valida lassitudo, vel
immodica siccitas corpus afficit, prandium mi-
nus esto: tum ab eo ad cœnam longius interpo-
natur tempus. Præterea plurimū quiescat: modi-
cum tamen inambulet, quò cibus per erectā agi-
tationem concussus subsidat. Utilius etiam fit, si
& alvū exonerare possit. His etenim probè per-
actis, securus oleo dulci frices, idq; ventre pror-
sus intacto. Quod si in musculis ei vicinis vel
lassitudinis sensus aliquis, vel siccitas appareat
major, ungi debebunt mediocriter, & blandè, &
suspensa manu.

GAL. DE SANITATE TUENDA, Lib. IIII.

Nunc autem primò de morbofis sympto-
matis differere est animus, prout citra ex-
ercitationem incidunt. Secundo loco de
illis quæ similitudinem quandam cum his ha-
bent. Ac quæ immodicas quidem exercitatio-
nes lassitudo excipit, sanorū symptoma est: quæ
verò sine his cōsistit, morbosum. Itaq; & ab Hip-
pocrate cōmodissimè dictum esse videtur, lassi-
tudines spontè natus nunciare morbos. Atq; ul-
cerosus quidē sensus symptoma lassitudinis est.
Causa verò unde ea nascitur, affectus lassitudi-
nis

*Siccitas
vigiliis
nisi a
bus oris
modo cu-
genda.*

*Humiditas
curatio
diversa
cundum
ricatē
sarium.*

*Cutis d
quomo
laxana*

*Laxitas
is qua
ne sana*

*Frictio
spertina
bus utili*

*Prandiu
quando
debet m*

*Lassitud
spontè na
morbos p
nunciati*

nis est. Huius rursus ipsius causa bifariam scinditur. Aut enim intra ipsum animalis continetur corpus, diciturq; antecedens interna; : aut omnino non inest, ac pcatartica nominatur, sive primitiva, sive etiā externa. Itaq; tria in universum genera sunt, de quibus habendus sermo est: ipsius lassitudinis sumptoma: affectus unde hoc oritur, & affectus ipsius causa. Cuiusq; igitur horum species quædam differentes sunt. Causarum externa & interna: affectus, is qui ulceris, & qui tensionis, & qui phlegmones sensum invehit: symptomatis verò, ipsi tres sensus. Qui igitur ulceris sensum facit, is affectus motis quidem gravem excitat sensum, ceu corpus ulceretur: idque vel circa cutim tantū, utiq; cum est moderatior: vel circa subjectā illi carnē, cum est valentior: vel circa utrāq; cum adhuc est atrocior. Atq; sensus ipse est symptoma. Affectio verò ex qua id nascitur, acrimonia est tenuis & calidi humoris, qui corpus erodit & pungit. Oritur hæc aliquando ex immodico motu, aliquando ex vitioso succo. Actales lassitudines, spontaneas appellat Hippocrates. Tensivæ lassitudinis genus plethoricis solet supervenire. At tertium lassitudinis genus, quod phlegmones sensum affert, ex ambobus oritur, tum nimia boni succi abundantia, tum prædicto vitioso succo. Solus autem rodens & acris succus lassitudinē ulcerosam inducit, idq; dum à venis ad carnes atq; cutē trāsfertur. Qui verò ex abundantia nasci hanc lassitudinem putant, falluntur: nam neque ex ea copia quam plethoram dicimus, neq; ex ea quæ vires prægravat, ulceris sensus procedit, sed gravitas, vel ad motiones segnitia, vel vitia quædam in pulsibus. Porro ubi erodentibus succis corpus ipsum scatet, minimū quidē motus, lassitudinis duntaxat sensum inducit: vehementior, rigore excitat: medius inter utrumque, horrore parit. Potest enim tum horror, tum rigor, à calida causa excitari. Impellitur autē ipse acris humor, interdum à sensibili corpore, q̄ repellendi alieni vim possidet: interdum à vehementiori motione, id quod tum ab exercitando, tum frictione, tum balneo conquirit. Quod si calida & putria excrementa sint, ubi vehementius moventur, non horrore modò rigoremve, sed etiā febrim accendunt. At quæ frigida sunt, & ex partibus tenuibus constant, ea horrore quidem rigoremq; inducūt, non tamen febrē. Porro vim quandam utriusq; congestam esse oportet, si hæc fuerint. Oportet igitur excrementū, sive calidum id sit, sive frigidum, ipsum aut expellas, aut certē alteres. Cæterum quod prorsus alienū est, id ægrè alterari à natura potest: ac p̄inde educere id quamprimū tentandum est: æquē certē ut quæ in ventre corrupta prorsus sunt, ea vel vomitione, vel deiectione expelli profectō est optimum. Non tamen perinde promptū est in carne, atque aliis corporibus imbibitū vitiosum succum educere. Communes igitur scopos, quibus quis omnium excrementorū vitiis medeatur, jam diximus vacationē & alterationem esse: proprios verò utriusq; generis adjiciamus. Neque enim una tantum ratione educendum alterandūve est: sed explorata quæ ei quod affligit, magis accommodata sit, ei est insilendū. Ea autem ex cu-

jusque contrario debet administrari. Quoniam igitur lassitudo ulcerosa, vitio acrium excrementorum oritur, ante omnia considerandum est, in solidis ne tantum corporibus, an intra venarum sinus, malus succus contineatur. De iis verò quæ intra venas sunt, nullum planè nec manifestum, nec evidens signum habemus, præter solam urinam. Conjicere tamen licebit ex natura, consuetudineq; ac breviter ex universa victus & exercitii ratione, corporis ea lassitudine affecti, qualis ipsius mali succi sit modus. Nec minus profectō ex universis affectibus cutis, quibus aliquando tentari est solitum: ac deniq; ex evacuationibus aut retentis, aut intermissis. Ubi igitur omnino exiguus, & ad cutim tantum collectus ipse vitiosus est humor, mediocrius remedium postulat: valentius autem, si multus & in profundo. Porro si à nobis ille boni succi antea propositus juvenis, nunc necessitate quapiam urgente, longi temporis iter confecerit, in quo prava victus & exercitii ratione usus fuerit, nihil tamē in modo assumptorū deliquerit, ac proinde neq; in cruditatem inciderit, talis certē multū mali succi congestisse non potuit: quare sola apothera curatur, huc omni revocato consilio, ut excrementa, quæ circa cutem sunt, educantur, propterea quod affectus in hac una consistit. Quod si præter alia etiam in cruditates inciderit, sentiatq; nō cute tenus modò, verū in alto corpore ulceratio nis sensum, sic ut totum id malis succis refertum suspicere, huic nec exercitationē, neq; ullum omnino injungemus motū, sed quiescere ac dormire jussum, in abstinence totum diem exigere cogemus. Dein vesperi pinguius uncto, & temperato balneo mediocriter lavato, pro cibo dabimus sorbitionē aliquam boni succi, sed planè q̄ minimā. Nec tamen à vino eum abstinēbimus, concoquit enim id semicrudos humores, tum sudorem, urinamq; promovet, ac somnū conciliat. Quod igitur mali succi jam planè corruptū est, nec concoqui potest, in sudore, urināq; expellatur: quod semicoctum adhuc est, concoquatur, atque utile reddatur. Id autem quies & somnus optimè præstant. Si ergo his peractis malum cōstiterit, ad consuetudinem rursus reducendus homo est. Sin in posterum etiam diem duret, de valentiore jam remedio est cogitandū: maximè si per noctem vel lassitudo magis q̄ antea, vel fastidium infestet, vel pervigilet, vel somnos turbatos, & imaginationib; inquietos habeat. His si quidem, si vires nō dissuadent, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda. Nam si vires imbecilliores dehortantur, sanguis mittendus nō est, sed deiectione mediocri utendum. At cōstante robore viriū, si lassitudo adhuc infestet, ac vitiosus quidem humor, qui ipsam gignit, cum sanguinis copia consistat, vena tundenda est, aut aliquid quod tantundem valeat agendū. Sanè tantundem potest, hæmorrhoidū, menstruorumq; provocatio, quibus suppressa sunt. Quibus autē horū est nihil, malleolorū incisio cum scalpello: Post hæc alvæ eo medicamēto deijcienda est, q̄ malo succo maximè accommodatū sit. Quod si vitiosi tantum succi citra sanguinis copiā subsint, purgatio petenda est, quæ infestanti excremento

Primum solā indicare naturam humorum delitescentium in venis.

Apothera sola quæ do sit lassitudinis ulcerosa sufficiens remedium. Lassitudinis ulcerose, cōiuncta cruditate, curatio.

Balneorum usus in cruditatibus.

Vini opera.

Corrupta & cruda esse concoquenda. Cruda concoqui à quiete & somno.

Sanguis quæ do mittendus. Deiectione quando est utendum.

Malleolorū incisio quando molienda.

*Cacochymia
nota unde su-
menda sint.*

fit etiā commoda. Hinc autē mali succi notā su-
mentur. Qui in ocio degunt, hi pituitosum suc-
cum solent accumulare. Quos multus labor ex-
ercet, hi biliosum, vel melancholicū, illum aesta-
te, hunc autumno gignunt. Quantō autem diu-
turniores labores fuerint, tantō sunt ad atram
generandam bilem magis proclives. Præterea
qui cum multo sudore obeuntur, hi crassius ex-
crementū faciunt: q̄ sine sudore peraguntur, ma-
gis tenue: veluti qui hyeme, & frigido aëris statu
colliguntur. Ad hæc etiam, nō solum urinæ mul-
tudo & qualitas, sed ipsius etiam sudoris con-
sideranda est. Cujus in eo qualitatis dignotio nō
modò ex gustu & olfactu, sed ex colore etiā faci-
lis est. Pallidus quippe cernitur sudor, pro eiuf-
modi bilis ratione. Sæpe tamē post validissimos
labores & vehementē æstū, planē flavus conspi-
citur: aliquando medius, atque ex ambobus mi-
xtus. Ad eundē modū & ipse bilis humor se ha-
bet. Qualiscunque verò in corpore habetur, ta-

*Sudorem esse
notam succo-
rum qui in
universo cor-
pore abun-
dant.*

*Urina indi-
cat tantum
qua continen-
tur in vasis.
Urina aquo-
sa & tenuis
quid indicet.*

*Turbulenta
urina quid
indiceret.*

*Urina per-
mutationis
species varia.*

*Sudor quid
indiceret.*

*Color à succo
proficiscitur,
non à solidis
animalis par-
tibus*

*Succi à qui-
bus causis in-
tro pellantur*

le necesse est eius appareat serum. Ac sudor qui-
dem succorū, qui in universo corpore abundant,
nota est: urina eorū tantū qui vasis continentur.
Itaq; tum consistentiam, tum colorē urinæ, nec-
non quæ in ea pendent, aut fidunt, perpendere
oportet, ut quæ ostendant qualisnam sanguis
sit qui in vasis habetur. Quando si is biliosus sit,
serum quoq; eius biliosum esse necesse est. Simili-
modo pituitosum, si pituitosus. At ubi crudus
planē is est, utiq; tenuis aquosaq; urina cernitur,
nihil nec quod fidat, nec quod pendeat in se ha-
bens. Ubi autem concoctus, hæc in urina appa-
rent, desuperq; tenues quædā nubeculæ. Quod
si turbida sit, qualis veterinorum visitur, crudis
succis refertas venas indicat, non tamen cessare
naturā, sed eos valenter concoquere. Si verò ce-
leris separatio crassi à liquido in ea cernitur, sitq;
quod subsidet album, læve, & æquale, jamjam su-
peraturā ipsos omnes succos naturā indicat. Sin-
cū emingitur, pura sit, protinus verò turbetur,
jam crudi succi concoctionē aggredi naturā do-
cet. At si interposito tempore turbetur, nō protin-
us, sed post aggressuram insinuat. Similiter si
protinus separatio fiat, & id quod obsidet, sit al-
bum, læve, & æquale, superiorem longē naturā
succis quos concoquit, indicat. Sin bonum sit
quod subsidet, sed longiori tempore colligatur,
etiam naturam temporis spacio superaturā suc-
cos declarat. Si verò vel omnino nulla separa-
tio, vel id quod subsidet malum sit, imbecillitas
naturæ significatur, egetq; ope aliqua ad succos
percoquendos. Sicuti verò urina succorū qui in
vasis sunt cōstitutionem prodit: ita sudor, & alia
quæ per universum animalis habitū conspiciun-
tur, eorum qui illic sunt affectus demonstrant.
Quippe superantibus in eo calidis succis, insoli-
tus caloris sensus percipitur: frigoris verò, cū
frigidi dominantur. Jam albiore, pituita domi-
nante: pallidiores, bili abundāte, cernunt. Siqui-
dem color à succo provenit, non à solidis anima-
lis partibus, utiq; cum se succi in altum non rece-
perunt. Accidit verò id illis propter frigora, rigo-
res, vel animi affectus: veluti timorē, vel ingen-
tem tristitiam, vel incipientem verecundiā: quo-
rum si adsit nullum, nullum se in altum recipi-

unt succi. Equè neque in cutem violentius ir-
ruentes, hanc adurent unquam, nisi animus ali-
quo modo affectus sit, aut æstu immodico ani-
mal extrinsecus obsessum. Ergo si neq; ambien-
tis violentia, neq; ullus animi affectus subsit, cer-
tissima succi animalis cognitio ex colore datur.
Quare si ad rubicundius q̄ pro natura mutatu sit
corpus, sanguinis abundantia subesse significat:
si ad nigrius, nigram superesse bilem ostendit.

10 Porro color plumbeus, quiq; mixtus ex albo &
livido est, crudos & pituitosos dominari succos
indicat, minus tamē humidos q̄ sit pituita comu-
niter dicta: cui si adsit lentor, vitreus succus dici-
tur à Praxagora. Generaliter igitur eiufmodi suc-
ci omnes albi crudiq; sunt: nomenclaturā verò
alius aliam sortitur. Ipsorū autē & biliosorū san-
guis in me-lio est: hi siquidem ex eo supra justum
percocto fiunt: illi autem, ex nondum perfecto.

Ac singulorum quidē variæ sunt differentia. Cæ-
terum in corpore lassitudine affecto, ubi paulu-
lū vel citra sanguinem restitum, vel ultra pro-
cessum est succis, audacter mittendus est sanguis:
ubi plus, consideratius agendum: ubi plurimū,
in hoc nullus omnino mittendus. Inspicere ve-
rò & quantitātē conveniet: ut, verbi gratia, si bo-
nus sanguis exiguus sit, reliquus verò succus plu-
rimus, utique in his abstinendum à detractione
sanguinis est. Sin is quidem exiguus, sanguis ve-
rò copiosus, audacter incidenda vena est. Dein

30 deicere alvum oportet, ratione habita de abun-
dantis succi copia & specie. Quod si quis detra-
hi sibi sanguinē nolit, huic deicienda largius est
alvus: aut si id quoq; suspectū habeat, alia ratio-
ne educendum est supervacuum. Jam verò, si in
venoso vasorū genere copia semicrudorum hu-
morū subsit, in reliquo autem corpore multitu-
dō horū mordaciū, cū duo hi nobis scopi sint,
nē inpe semicoctorū percoctio, atq; acriū & mor-
daciūeductio, abstinere eos convenit ab omni

40 validō motu, quos lassitudo secuta fuerit. Blan-
dē tamen unctos atq; oleo perfrictos, perquam
suavi lavare balneo expedit: inde in ocio absti-
nētiq; habere, atq; etiā somno, si id fieri possit.

Nihil enim æquē cōcoquit, aut malos succos dis-
cutit, ut somnus à balneo. Conducit autem ad
somnia non in postremis etiam & balneum i-
psū. Quod si secunda die & tertia, similiter gra-
vatum sentiamus hominem, iterum atq; iterum
utemur eadem medendi ratione. Sitq; tibi som-
nus & causa & signum speratæ utilitatis percom-

50 modum: sicuti è diverso, non posse à balneo dor-
mire, nec causa, nec signū est commodum. Sed ex
somnia vigiliisq; plerunq; redundantis succi in-
dicia sumuntur. Frigidi namque succi, *soporem
& longiores somnos inducunt: calidi & morda-
ces, vigilias. Sicuti autem in primo, ita in secun-
do die, ex simplici cremore psianæ, aut ex alica
cui pauxillum aceti ad incidendum permistum
sit, si cruditatis suspicio subsit, sorbitionem mini-

60 mam eis exhibebimus. Quippe ut largior nutri-
tio nocet, sic abstinencia omnimoda, nausēā in-
ducit, ventriculum lædit, resolvit vires, ac pravū
succum accumulāt. At boni quidem succi est ali-
ca. Cæterum nisi lentor ipsius corrigatur, adje-
ctis aceti & porri modico, non solum obstruer,

sed

*Color e-
rius qua
sit exga
nota eorū
qui sub
humorū*

*Color p-
beus qu
diceret.*

*Vitreus
cus.*

*Sanguis
tendus q
do in las-
tine sit.*

*Alvum e-
largius &
andam i
qui per la-
tudinem
cerosam
trahi sibi
guinem p-
lunt.*

*Somnia a
balneo con-
quere, ac n-
los succos a
scutere.*

*Balneum
conducere
somnia.*

*Frigidos qu
dem succos
soporem: ca-
dos aut, sig-
lias gignere.
Cruditati
qua sorbitio
commoda.*

*Abstinencia
omnimoda
inducit nau-
seam, ac pra-
vum succum
accumulat.
Alica lentor
corrigendus
aceto & por-
ro.*

sed etiam nutriet plenius, q̄ propositis sit ex usu. Hac itaq; ex causa ptisanæ cremor in hoc casu tutior est, ut qui tum modicè nutriat, tum facile per angusta permeet, dissecetq; & dissolvat quicquid in crudis habetur succis. Horū ipsorū gratia & mulsa his idonea est, & oxymeli, & apomeli, & piper, & zingiber, atq; omnia breviter, quæ citra vitiosi generationem succi, humorem crassum dissecant, solvuntq; Frugum itaq; maximè apta est ptisana: olerum, sola lactuca: pācium, qui dicuntur saxatiles: panis, qui in clibano coctus, & fermentatus, & modicè purus est: aves monticolæ: potio, oxymeli, mulsa, vinum tenue, & albū. Quæ verò urinam cient, hoc casu non probo: maximè quæ prævalentia ex his sunt, & sanguinem calefaciunt, & liquant. Quippe quod concoquendum probè est, huic tanta vexatio non convenit. Hæc itaq; omnia secūdo die ita facienda sunt, itaq; etiam tertio, quartoq;. Quod si tum lassitudinis sensus levetur, tum cætera pro naturæ ordine appareant, fricare quidem liberalius, exercere verò parçè hominem audebis. His ita peractis, si nullus lassitudinis sensus præterea superfit, ad consuetas statim exercitationes reduces ipsum. Sin quicquam appareat priorum aut symptomatum, aut notarum, rursus tu quoque in id intentus, mutare tentabis ea quæ particulatim non rectè habent. At si in eodem lassato corpore, reliqua eadem habeantur, sanguis autem bonus exiguus sit, crudiq; humores plurimi, huic nec sanguis mittendus, nec alvi dejectio, aut exercitatio, aut omnino motus, aut balneum adhibendum: sed servandus in omni quiete is est, dandaq; ipsi cibus, potio, medicamentaque sunt singula eius generis, quæ attenuent, dissecent, & conficiant succorum crassitudinē, idq; citra manifestum calorem. Ergo nutries hos maximè oxymelite, aliquando etiam ptisanæ & mulsi exiguo quopiam. Sustinent enim hi victū, si modo alii ulli, tenuem, ipsa nimirum crudorum humorum copia, quos paulatim concoquunt, ad corporis alimentum abutentes. Quoniam autem præcordia istiusmodi omnibus turgida inflataq; sunt, & facile quicquid assumpserint, in flatum vertitur, non inutile fuerit & longi piperis, aut albi, aut nigri aliquid cum cibo dare. Sed album quidem supra reliqua duo genera alvum roborat. Nigrum id eligendum est, quod præcellit pondere. Utilius tamē sit & Diospolitico medicamento uti, cuius duplex est cōpositio. Nam aliās ex paribus omnibus, cumino, pipere, ruta, nitroq; id conficitur: ac potest sic magis ventrem solvere: aliās cum reliquorū pari pondere miscetur nitri dimidiū. Præstiterit aut cuminū esse quod Æthiopicū vocant, piper verò vel longum vel album. Macerabitur cuminū in aceto maximè acri: dein continuò id tunditur aut etiā prius modicè frigitur in vase fictili quod coctum in camino q̄ optimè sit. Sunt verò & rutæ folia modicè exiccata. Sumitur & per se medicamentum hoc, & cum ptisanæ cremore, & ante & post cibū. Porro ad eum usum maximè commendatur, quod mel optimum, optimeq; despumatum admixtum habet. Appositū sanè remedium sic affectis est, & quod ex tribus piperibus

constat, utiq; cum non admodum medicamentosum sit, atq; ex variis confectum, quale est illud quo utimur in iis fluxionibus quæ à capite descendunt ad pectus. Expedi autem præparatum habere utrunq; ad manū. Simplex igitur illud, quo ad cruditatē quæ in primis est venis utimur, huiusmodi est: Ad cuiusq; trium piperū drachmas quinquaginta, abundè adduntur anisi, & thymi, & zingiberis, singulorū drachmæ octo. Hoc magis simplex est, à quo detractū sit zingiber. Alterū verò est, quod ex iisdem conficitur: verū ad cuiusq; triū piperū drachmas quinquaginta, reliquorū cuiusq; sexdecim drachmarū injicitur pondus. Debet autē, si haberi potest, anisum Cretense esse. Thymum aut Atticū, aut ex editis locis & siccis: cuius quicquid lignosum est circūciso, coma ipsa vnā cum floribus injicietur. Esto verò & piper, quod longū quidem est, integrum, minimèq; foratū: æquè verò & zingiber. Quod autē piperis qualitātē retinet, ac nec maceratum resolvitur, nec etiam pertusum est, piper id longum ut maximè idoneum est, sic minimè fuerit adulterinum. Nigrum verò nec exile, nec rugosum, nec crassi corticis esto, sed maximum plenissimumq;: quæ duæ notæ album etiā piper cōmendant. Deinde omnibus simul tuis, & per tenue cribrū transmissis, mel optimū, curioseq; despumatū miscetur: id quod debet esse odoratū, flavum, acerrimū, dulcissimumq;, atq; crassitudine quadam mediocri, & quæ suā continuitatē tueatur. Hoc igitur medicamen & ante cibum, & post, & euntibus cubitum rectè datur, cochlearii pleni mensura: atque huius quidem, ut parvis parvi, & maximis maximi, ita mediis ad portionē: præterea etiam zingiber, quod ex barbaris affertur, aceto maceratum. Est id virentis herbæ radix, à collectu statim in acetū injecta. Extingitur enim eiusmodi medicamentorum calor circa ipsas primas venas: neq; in totum perfertur corpus, veluti aliorū quorundam, cuiusmodi est quod diacalaminthen appellant. Idcirco etiam oxymeli his utilissimum est, cuius talis est cōpositio. Cum melli optimo super carbones spumam abstuleris, cōjicies in ipsum acetū tantum, unde gustanti nec acidum nimis, nec dulce videbitur, ac denuò super prunas coques, quoad planè unitæ amborum qualitates sint. Hinc ab igni depones, cumq; uti voles, aquam ei miscebis, ita nimirū temperans ut vinū. Quò autem pluribus id cōveniat, uni aceti parti, mellis à quo detracta spuma sit, duplum est miscendum. Pro uniuscuiusque tum gustu aut natura, plus aut aceti, aut mellis nos adjicere convenit, id esse sumentis naturæ convenientissimū oxymeli ratos, quod illi utiq; jucundissimū est. Cum aqua verò ita facies oxymeli. Quadruplū optimæ aquæ miscebis melli: dein coques modico igni, donec spumare desinat. Ac malū quidē mel multā egerit spumā: quò etiam diutius cōcoqui debet. Optimum verò ut brevissimo coquitur tempore, ita minimū spumæ evomit. Post verò dimidio aceti adjecto, rursus coquendū, donec qualitatum omnino sit unitas, nec acetum crudum sentiat. Conficitur sanè oxymeli, etiam tribus statim à principio mixtis, ad hunc modū

Diatrion piperis conpositum, quod in fluxionibus esse medicamentum aptissimum.

Diatrion piperis conpositum, quod in fluxionibus esse medicamentum aptissimum.

Piper longū quale sit eligendum.

Piperis nigri albiq; electio.

Mellis optimi nota.

Diatrion piperis conpositum, quod in fluxionibus esse medicamentum aptissimum.

Zingiber quid.

Piperatorū calorem circa primas venas extinguere.

Oxymelitos aquati faciendi modus.

Mel vitiosū multum spumam egerit.

Optimum vero, minimū, brevissimoq; coquitur tempore.

Apomeli refrigerat.

Musam ex pluvia aqua conficit.

Pluviam aquam non probat Galenus.

Apomelites compositio.

Vina quae aescunt leviter, esse cruditatibus comoda.

Capparitis ex oxymelite facti ad cruditates.

Vinorum genera varia. Vina cruditate adversantia.

Vomitu cur non utendum per cruditates lassitudinis copulatas.

Humores vocantur ab alto.

Humores in tro pellentia.

Vomitu quando utendum.

Ulceroso praesente sensu, crudisq; humoribus ab alto in corporis habitum distributis, quatenus

Aceti uni parti, additur mellis duplum, & aqua quadrupla: atq; hæc ad tertiam vel etiam quartam partem coquuntur, spuma interim detenta. Quod si valentius id facere studes, tantundem injicies aceti, quantum mellis. Apomeli optimum aqua conficitur, bibiturq; tota æstate refrigerantis vice. Potest verò cui id libet, & ad quam proposuimus affectionem eo commodè uti, potissimum ubi coacuit: id quod sæpe contingit ei, alias magis, alias minus, utpote ex aqua confecto non pluvia, sicut mulsa, sed qualibet. Quamquam potest qui volet, & ex aqua pluvia id conficere, ipseq; si pluviam aquam probarem, id suaderem: verum neq; ipsam probo, & nihilo est deterius si acescit, potissimum ad ea quæ nunc sunt proposita. Quinimò mediocriter etiam acetum, quod non omnino incuriosè est confectum. Sanè cura conficiendi in eo est, ut nec favus admodum sit vitiosus, coquaturque bene in fontana aqua, quæ & pura sit, & dulcis. Oportet enim expressio à favis melle, eatenus in aqua coquere, quoad nulla inde spuma existat. Ergo tum hac utendum portione est, tum verò è vinis iis quæ leviter acescunt. Nutriendum præterea cibus est, qui citra calorem extenuent, cujusmodi capparitis est, si ex oxymelite vel oleo sumatur. Quod si crudos jam succos satis attenuatos speras, vinum dabis quod & substantia sit tenue, & colore fulvum albumve: hoc enim ad succi bonitatem, & concoctionem facit: illud urinam movet. Sunt verò in Italia, prioris generis Falernum, & Surrentinum: posterioris, Sabinum & Albanum, & Adrianum. In Asia verò, prioris generis Lesbium, & Ariusium. Secundi Titacazenum, & Arsyinum. At crassa & nigra vina sunt rejicienda. Quod si his adhibitis melius habere se senserit, etià lavare tum hominem debet, ungereq; ac molliter fricare. Ut verò primò in urina hypostasis cernitur, tum frictiones augere, tum ad cõsuetas exercitationes paulatim reducere. Hoc tempore unguentis iis quoque utendum, quæ per halitum evocent. Vomitu autem minimè in affectibus id genus utaris, ne succi revellantur intrò mordaces, qui videlicet carni inhaerent. Quemadmodum autem exercitatio, frictio, balneum, fomenta calida, unctio calefaciens, iracundiaq; humores ab alto revocant, ita quæ refrigerant astringuntq; cutim, ad hæc tristitia, horrorq; à quacumq; causa calida frigidave procedens, necnon omnia quæ introrsum impetum faciunt, ea in quâ à cute ipsa motum humorum ad interna concitant. Hæc itaq; omnia devitanda tum sunt, cum idem homo pariter & lassitudinem sentit, & venas habet crudis succis refertas. Nam nec qui extra sunt, rectè intrò revocantur: nec qui intus, foras. Imò qui foris sunt, leviter educendi per halitum sunt. Ergo quibus intus crudi succi copia est, & foris lassitudinis sensus, iis hyssopum in mulso coquens, non statim nec primo die, sed in sequentibus dabis: vomitu verò abstinebis, nisi ubi crudos citra lassitudinem succos evacua-re contendis. At verò si unâ cum sensu ulceroso, etià crudorum copia aut à calore, aut ab immotico motu in corporis habitum sit transmissa, quæ quidè jam non in venis, sed in solidis animalis partibus hæreat, tunc sanè ea exhibenda sunt, quæ vel

ad cutim usq; suum calorem transfundant: fricandumq; largiter oleo quod relaxandi vim habeat, ac potissimum manè, cum surgunt à somno. Nam ea frictio concoquit crudum succum, simulq; corpoream molem animantis nutrit. Quiescendum verò diu post hæc est. Cederet autem negotium felicius, si homo exiguum cibum pridie sumpserit, nec aliud à cœna biberit, quam tenue vinum, fulvumq;. Post ipsam autem quietem diuturnam, modicè inambulandum est: ac dein tum denuò multa frictione, tum balneo modicè calido, & alimentis quæ boni sint succi, utendum. Quinetiam medicamentis diacalaminthen audacter dabis: cujus talis est compositio: accipe calaminthes, pulegii, petroselinii, seseleos, cujusq; uncias ij. feminis apii, cacuminum thymi, singulorum unc. iij. Libystici, unc. xvj. piperis unc. xlvij. Hæc omnia ubi electissima fuerint, simul tundenda cribrandaque sunt tenui cribro. Tenuia quippe medicamenta in totum corporis habitum maximè digeruntur: veluti è diverso, crassiora in ventre hærent. Idcirco Diospoliticon medicamentum crassius facere soleo, quoties de jicere alvum per id studeo. Miscendum his ita præparatis mel optimum est, curiosè despumatum. Porro usus ejus erit post matutinam frictionem, ante exercitationem & balneum: potestq; etià cum aliquo cibo mixtum assumi. Post cibum autem nunquam nec hoc medicamentum, nec aliud ullum quod ad distributionem vehementiorem facit, sumendum est. Licet & sine admixto melle siccum medicamentum reponere, eoque salis vice uti. Ad ipsorum autem concoctionem ciborum, præstat sanè aut medicamentum diatrion pepereon simplex, aut ipsum piper portioni inspersum, aut etià quod ex succo mali cydonii constat medicamentum porrigere. Verum ad ea quæ nunc agimus, optimum omnium est, quod constat ex calaminthe. Nam crassa lentaq; attenuat, & per halitum educit, & urinas movet, & muliebria provocat, estq; jucundissimum gustui. Ubi igitur circiter duos vel tres primos dies ita præparatus homo est, exercitationibus consuetis tradatur, animadversis prius universis quas jam diximus notis. Nam si omnia comodè se habere videntur, plenè exercitandus est. Sin minus, etiam ante mediocritatem desisteret, prius dicta victus & medendi ratione tractandus, donec postridie circa exercitia omnibus ex sententia se habentibus, ad consuetum victum revocari jam postulet. Quia verò & acopo quod ex abiete fit, uti expedit iis qui in carne & tota corporis mole succos congesserunt, qui aut concoqui desiderant, aut per halitum digeri, apponamus eius compositionem. Igitur abietis pulcherrimum semine, quale circa Septembrem colligitur, conjicere oportet in oleum, quolibet anni tempore, ubi prius contusum fuerit. Postea verò quâ spacium dierum ad minimum quadraginta in ipso oleo relaxante (quale Sabinum videtur esse) maderit, ipse liquor est percolandus. Conjicietur autem in quinque & viginti olei heminas, eius seminis modius Italicus. Excolato oleo, quatuor ceræ libras adjungito: resina verò abietinae tertiâ unius libræ partem: injicies etiam & pineæ resinae tantundem. Quod si harum copia non sit, earum loco tere-

fit ratio medendi.

Diacalaminthes compositio.

Tenuia digeruntur in totum corpus. Crassiora in ventre hærent.

Purgantia medicamenta debent crassiora liqui.

Distributio medicamentorum.

Concoctio ciborum.

Concoctio ciborum.

Diacalaminthes medicamentum.

Acopie compositio.

terebinthina utendum. Coques aut commodius hæc in vase duplici, aut certe igni lento. Medicamentum enim hoc aptissimū ad omnē lassitudinem est. Utile etiam est & quod ex populi floribus fit. Est autē id tale: Ex illis enim adhuc cōnivētibus mediocriterq; contritis, modius Italicus in quindecim aut viginti libras Sabini olei aut alterius similis, immittitur, quotidieque sub sole fervido simul totū id dimovebitur, si id fieri liceat. Itaq; post binos aut ternos menses potes flore expresso habere oleū, quod sine ulla mordicatione, nihilo minus quā abietinū, per halitum digerat. Cui tantundē ceræ & resinæ licebit addere, quantum illi esse adjiciendum diximus. Si quando verò humidum id quod exprimitur, crassius videbitur, sat fuerit, vel quintā partem ceræ adjici. Sunt qui in duplici vase eleganter id medicamentū conficiant. Qui verò celerius id præparare cogitur, hunc necesse est aquæ vinive quartam aut quintā partē, ne torreatur, injicere. Atq; ad ea quidē de quibus nunc agitur, utilior aqua est: vinū verò ad articulares affectus. Ergo & hæc medicamenta succos quicunq; nō crassi nec lenti in carne cuteq; resident, evaporāt: necnō quod ex chamæmelo fit oleū, tum ipsum solum, tum ceræ quarta, resinæ duodecima parte immixta. Potest etiam & anethinum oleum, aut per se, aut cum cera & resina, similiter discutere in halitū. Præparetur autem in duplici vase, fiatq; ex anetho viridi, maturoq;. Jam sampsychinum oleū, hyeme, & regione frigida, ac tempestate simili, idoneum medicamentum est. Similiratione ros maris herba, aut betæ albæ radix, aut agrestis cucumeris, aut althææ, aut vitis albæ, efficaciter etiam discutit, ubi suas vires in oleo similis facultatis quæque ipsarum dimiserit. Quod si eorum singulis, vel ceram solam, vel cum ea resinam injeceris, non solum pulcherrimum, sed etiā quod in loco bene hæreat unguentum facies. Abundē autē omnino erit, si ceræ quartā partem, resinæ duodecimā addas. Si verò abietinam simul & pineam resinam injicias, aut cum his etiā terebinthinam, aut si hæc defint, humidā pini resinā, aut resinam quæ in fictilibus est, aut etiam quam frixam appellant, sic quoq; medicamentum feceris, quod evaporandi vim habet. Porro ubi præter ulcerosum sensum, etiam copia humorū crudorum in toto corpore abundat, concoquenda quidem ipsa cruditas primarum venarum est, concoquendaq; simul & discutienda quæ extremas obsidet corporis partes: semper ipsius curationis studio in id propenso, quod affligere magis videtur. Nam si pari noxa ipsi infestent affectus, respectu æquali curandi sunt: sed ita tamen, ut inter initia potiores medendi partes ei præstentur, qui in primis venis consistit: in fine verò, ei qui in carne. Medio inter hæc tempore, ambæ rationes æquabiliter miscebuntur. At lassitudo tensiva, cum citra exercitationem incidit, abundantiam indicat, quæ solidas animalis partes distendit. Ubi igitur sanguinis redundantia gravat, optimū est vel venam tondere, vel scarificare malleolum. Ex iis autem quæ in ulceroso affectu retulimus, ubi vitioso succo miscetur, licet ratiocinari & de alio quovis, cum solus consti-

terit. Jam verò lassitudo quæ phlegmones sensum infert, si quidem spontē oriatur, subitō accendit vehementissimam febrem, nisi missione sanguinis malo prius sit occursum. Itaq; nec cūctari, nec parū detrahere convenit, sed (nisi quid obstat) ad animi usq; defectum. Optimum verò fuerit, bis eodem die, si fieri possit, detrahere: ac primum quidem ita mittere expedit, ut animi defectum homo non adeat: secundo verò, ne defectus quidem ipse est formidandus. Quippe, qui priore detractioe resolutus est, secundam sustinere haud poterit: in hac verò si quid tale homini incidit, facilē revocabitur. Qui verò sic affecti sanguinem non miserint, hi si evaserint, utique fortunæ beneficio id acceptum ferent. Aestimare autem diligenter oportet, qui sanguinem sunt missuri, in thoracē, dorso, & lumbis tensio, pulsansq; dolor figatur: an in capite potius & collo. His nanq; affectis, humeralis venam divides, maximē si repletum caput & calidum sentiunt: illis verò internam. Si verò omnino æqualiter lassitudo occupat corpus, ambarum mediam. Ac si ab incisa quidem vena febrile cœperint, alterius est artis, nempe curativæ, his prospicere. Sin autem non febricitent, primo die post incisam venam, aut ptisanæ cremorem, aut sorbitionē ex alica solum dabis. Secundo verò etiā lavare licet cum copioso oleo, nutrire aut moderatissimē, lactucæ, vel curcubitæ, vel ptisanæ aliquid offerens. Est & alica non inutilis. Si cucurbitæ copia nō sit, malva, betaq;, & lapathio, & atriplice utendum. Quod si carnē quoq; gustare velit, saxatiles pisces, vel oniscos in albo jure (quod anetho, sale, oleo, & porri exiguo in aquam coniectis conficitur) bene elixos dabis. Vino aut utiliter etiam ipso secundo die parcat. Tertio verò, si quidem aquæ potionem facilē toleret, tunc quoq; vino abstinebit: si non ferat, potissimum quidem apomeli dabis. Hoc si non sit, album & tenue vinum offeres, aliaque pro ratione exhibebis, quæ ut boni sint succi, ita minimē calefaciant. Cavendum tamen vel maximē est, ne properē & multū, sed sensim, & paulatim renutrias. Alioqui minimē ipse ventriculus poterit tantam ciborū colluviem pro dignitate concoquere, ac proinde plurimū crudi succi rapietur in universum corporis habitum. Venter quippe sua ipsius causa nutrimentū suscipit, ut eo nimirū fruatur. Ubi autem expletus fuerit, quod reliquū ciborū est, exprimit, pessumq; ceu onus alienum dejicit, videlicet ad ipsa intestina. Ab his verò rursus ad venas suggeritur, à quibus tandem in universas animalis partes disseminatur: ubi alimentū ipsum nactum jam concoctionem tertiam, alendo corpori assimilatur. Unde multi exinanito corporis habitu, nisi reficiantur lentē, plurimum excrementorum in toto eo congerunt, atq; ex iis non leviter agrotant. Quoniam autem per lassitudinē quæ phlegmonem repræsentat, vis calidi sanguinis congesta in corporis mole est, venæ autem sectio succos vasis emittit, utile est post priorem detractioem tantisper intermittere, dum aliquid eorum qui in corpore sunt humores, remigrare possit ad venas. Quod tamen quoniam cōmittendum

Lassitudinis quæ phlegmones sensum infert, curatio per sanguinis missionem usq; ad animi deliquium, administratur. Sanguinis missio quando sit eodem die repetenda.

Humeralis vena quando secanda. Interna vena in quibus tunc secanda. Media quando aperienda vena. Lassitudinis phlegmonosæ visus ratio conveniens.

Albi iuris compositio.

Ventriculus sua ipsius causa nutrimentum suscipit. Nutritionis modus.

Sanguinis detractio prima & secunda curatio respondens sic tempus.

*Sanguinis
detractio cur
iteranda sit.*

non est ut in iis maneat, utpote ex dimidio corruptū, idcirco detractionem sanguinis etiam secundo die iteramus: aliquando verò & in tertio, ubi videlicet & revellere, & ex aliis in alia transferre visum est conducere.

GALENI PERGAMENI
de sanitate tuenda, liber V.

*Hominū na-
tura diversa*

*Ars sanita-
tis tuenda
quid præstet.*

*Galenum vi-
xisse sanissi-
mum.*

*Corpus opti-
mè constitu-
tum, ad cu-
stodiam sui
desiderare*

*omnium ex-
cessuum me-
dium*

*Excessū cor-
rigendū esse
per contrarij
excessū usur-
pationem.*

*Affectuum
cognitio quid
inveniat.*

*Recordatio
præteritorū
quid cōferat.*

*Humidus af-
fectus a mol-
li quo differe-
rat.*

*Siccus immo-
dicè affectus
quid indicet.*

Cum hominū naturæ sint numerosæ, diver-
sam victus & exercitii rationē postulant,
quæ ex arte quæ valetudinē tuetur peten-
da est. Hujus enim beneficio contingit, ut qui ab
ipso ortu imbecillum corpus nō sunt sortiti, sen-
sibus illæsis, ab omniq; prorsus morbo & dolo-
re alieni, ad summam senectutem perveniant.
Ego verò, tametsi nec salubrem corporis statum
ab ortu ipso sim nactus, nec vitam planè liberam
egerim, hac tamen ipsa arte usus, post octavum
& vicesimū annum ne minimo quidem labora-
vi morbo, nisi fortè diaria febris, ob lassitudinem
aliquando contracta: cum alioqui liceat nō mo-
dò hanc, sed bubonē etiam effugere, si quis libe-
ram vitam sit nactus, vacetq; ab utroque genere
excrementorū, & eo quod in quantitate, & eo q
in qualitate cōsistit. Ergo corpus optimè consti-
tutū, ad sui custodiam, tum in exercitationibus,
tum in potulentis & esculentis, necnon in som-
no, vigiliis, balneis, atq; universis animi actioni-
bus, medium utriusq; excessus, idq; in qualitate, 30
quantitate, & facultate, postulat. Quod si in ali-
quo sit erratū, corrigendus error est, par contra-
riū excessus usurpationē. Ut autem corrigēdo nō
erres, primū corporis affectus ad unguem scire
oportet. Deinde omniū eorū quæ priore die fa-
cta videris, meminisse. Nā affectus quidē, quod
delictū sit, docebunt: recordatio eorū quæ pri-
die sunt acta, quantū tibi à consuetis sit receden-
dum, insinuat. Imò verò id quod peccatū est, me-
moria factorū ostendet: & prout corrigetur, ex 40
præsentium collatione docebit. Ut, exempli gra-
tia, si mollius quàm prius postridie corpus vi-
deatur, primū quidem frictionū meminisse con-
veniet, an molles, & cū pinguitudine & balneis
leviter tepidis sint adhibitæ. Ab his revocari ad
memoriā debet, an exercitationes tardæ & exi-
guæ præcesserint. Dein, an potio uberius fuerit.
Mox, an cibos plures, aut natura humidiores ac-
ceperit. Postremū, an multum dormierit. Proxi-
mus molli corporis affectui, est humidus: hoc 50
differens, q mollis ipsorum corporum propria
qualitas est: humidus, qui in eo continentur, hu-
morum. Discernuntur hi tactu: nam humidus affe-
ctus cū madore cutis est: mollis sine hoc: quanq
est profectò & molle corpus humidum suis i-
pſius partibus: non tamen cum mollitie necessa-
riò cōiunctus est humidus affectus. Potest nanq;
durata caro esse, & tamen mador sudorve è cor-
pore emitti. Ac siccus quidē immodicè affectus,
habitū statim durum efficit: indicat autē, aut ci- 60
bi potionisve penuriam, aut vigilias, aut vitæ so-
licitudinem, aut multam frictionem, aut deniq;
exercitationem immodicam. Hæc itaq; conside-
rans, corrigere quotidie errorem poteris, prius-
quam is in auctus, curatu difficilior evadat. Sem-

per autem memineris, excessum omnem contra
rio excessu emendandum esse. Cui præcepto si
corporū dignoscendorū peritiam adjeceris, &
singulorū remediōrū facultates adjunxeris, uni-
versæ jam artis quæ corpori hominis tuendo di-
cata est, peritus fueris: cujus ope licet præsentem
sanitatē tueri, & amissam recuperare. Atq; opti-
mum quidem corpus cujusmodi sit, dictum jam
est. Quod ab hujus perfectione defecit, scire li-
cet tribus id de causis defecisse: aut quod statim
in utero, vitioso statu fuit: aut quod qualibet de
causa in non naturalem affectum post concessit:
aut ætatis ratione. Omnia verò corrigenda per
contrarium excessum sunt. Nam senium, frigi-
dum & siccum cū sit, per ea quæ calefaciunt &
humectant, corrigitur. Talia sunt balneum dul-
cis & calidæ aquæ, vini potio: præterea ex cibis
quicūq; humectare calefacereq; sunt nati. Quod
pertinet ad exercitationem, frictionem, atq; om-
nem motum (qui cibum debet præcedere) scire
licet poetam ex parte verum dixisse:

*Ut lavit, sumpsitq; cibum, det membra sepori.
Nanq; hæc iusta seni.*

Postulat autem senum, non secus quàm juvenū,
corpus, dimoveri aliquando. Imò corporū quæ
in florenti ætate sunt, nō defunt quæ quietem re-
quirant. Senum verò nemo quietem ex toto po-
stulat: sed neq; exercitiū vehemens. Ceu enim vē-
tulo quodam excitari, accendiq; calore eorū defi-
derati: vehementiori autē motu dejicitur. Cum
igitur senum omne corpus sit frigidum, nec po-
tens alimentū ad sese trahere, atq; id probè con-
ficere, ex eoq; nutriri, plurimū frictione pingui
adhibita post somnū matutinū juvatur: quippe
quæ vitale robur excitet, ac modicè calefaciat,
efficiatq; ut sit distributio nutrimenti faciliior, atq;
nutritio promptior. Quare multos etiam labo-
rantes atrophia, ejusmodi frictione adhibita, fa-
cilè paucis diebus carne implevimus. Frictio ita-
que ex oleo administrata manè, veluti exercita-
tio quædā sit senibus. Post hanc inambulatio. ge-
statioq; ex senis viribus cōjectatæ. Etenim exer-
citatio acuta corpus tenuat: cōtraria crassius red-
dit: multa corpus siccant: mediocris obesum præ-
stat. Verū exercitationis formæ quæ senibus uti-
les alienæve sint, tum ex corporis totius affectu,
cōsuetudinēq; tum vitis iplis quæ infestant, in-
telligentur. Ex totius corporis affectu: nam opti-
mi status corpus, sicuti in juventute ad vehemen-
tissimos quosq; labores maximè idoneū est, ita
in senecta se habet ad omnes mediocres. Quod
verò à mediocritate recedit corpus, ad plerasq;
id exercitationū ineptū est. Quippe vitiosæ figu-
ræ thorax, in iis quæ per vocem administratur of-
fenditur. Per ambulationē gracilia crura lædun-
tur: de cæterisq; pari judicio censendum. Quic-
quid autem ex his parum ritè ab initio cōditum
est, id exercitando imbecillū redditur. Senibus
verò quæ præcipua ad sanitatem exercitia sunt,
hæc per valētiores corporis partes sunt obeun-
da. Sed habenda consuetudinis in primis est ra-
tio. Nam quæ consueta sunt, ut minimè lassantia
quos exercent, etiā delectant: sicuti è diverso, quæ
insueta sunt, tum displicent, tum verò lassant.
Porro quibus operibus arte opus est, ea ne attin-
gere

gere quidem senes debebunt. Senes igitur consuetis laboribus exercendi sunt, sed tamen vehementia eorum remissa. Tertiū quo dirigit qui exercitationis formā præscribit, ab affectione sumitur. Nam quos comitiales morbi, vertigines, gravis ophthalmia, vel aurium dolores ex levi occasione malè habent, iis inclinato capite, dorsove, aut humi volutatis, exercitari non expedit: sed tum ambulatione sæpe, tum cursu mediocri, tum gestatione in vehiculis citra fatigationē uti. Si simili modo quibus aut in fauces, aut in partes eas quæ circa collum aut totū caput consistunt, fluxiones procumbunt, minimè quæ caput impleat exercitationē sustinent: sed sunt his omnibus quæ per crura geruntur utilia: sicuti è diverso, qui imbecillis sunt cruribus, his superioribus partibus exercitari est satius. At quorum mediæ crurum brachiorumque partes opportunæ offensionibus sunt iis quod vis exercitationū genus idoneum fuerit, modò ne reliquarū considerationē nulla prohibeat. Quæ tamen circa thoracem partes sunt, magis inferiorū exercitatione iuvatur: quæ circa velicā & renes, superiorum. Lien, ventriculus, jecur, & intestina, ut in medio superiorum & inferiorum sunt, ita se ad exercitationes habent. Frictiones tamen partibus infirmis, quò tempore laborant, admoveere non convenit. Ubi sanæ sunt, convenit vel magis quàm aliis, & potissimū siccis. Quinetiam qui certa periodo redeunt quibusdam partibus dolores, hi ne fiant, nō exigua ejusmodi frictione cautio est, præcipueque si duas vel tres horas ante accessionem adhibita sit: firmantur enim eæ partes, & cōsuetas fluxiones minus admittūt. Atque hæc quidem omnibus ætatibus cōmunia existunt. Non exercitari verò imbecillis partibus, solis senibus suadeo: ex cæteris, quantò quisque remotior à senio fuerit: tantò illi magis exercitari pars debet. Cæterum si crura gracilia sortiatur, ea sanè picari, modiceque fricari, & cursu uti potius quàm alio exercitio conducet. Si igitur nec lassitudo, nec calor præter modum sentiatur, augeri ambulationem & cursum oportet, nec non alternis diebus picari. Sin aliquid eorum cernitur, crura sursum habita in lecto collocare cōveniet, & copiam exercitationis minuere, atque infernè sursum uti frictione. Ubi verò, his obitis, consecuta fuerint naturalem habitum crura, ad eum quem cœpisti remedium usum redibis: adhibitis & rotundis frictionibus, quæ durarum ac mollium sunt mediæ. Aliquando etiam & pingui pulvere prius inspersis cruribus, oleum infundes, & mox fricabis. Si cui verò crassiora quidem crura sunt, brachia verò cubitiq; gracilia, huic omnia quæ per manus fiunt exercitia, sunt petenda: fugienda verò quæ cruribus obeuntur. Frictiones tamen & picationes simili modo fiant. Porro qui imbecilliores sunt, hos gestatione potius quàm in ambulatione dimovebis: validiores utroque genere exercitabis, ægeq; ad secundam frictionem utrosque, sed semper imbecilliorē citius. Nam ubi imbecillæ sunt vires, crebra exiguaque frictione utendum: ubi validæ, rara multaque. Scire autē licet, senilis statum corporis, quoniam ex levi momento in morbum incidit, simili ratione iis qui

ex morbo convalescunt, in victu esse curandum. Tutius ergo est imbecillo seni exiguum dare terdie, sicuti Antiochus medicus solitus est se cibare, qui circa tertiam vel ad summū quartam horam, panem cum attico melle sumebat. Post sextā autem, jam exercitatus & lotus, prædebat mediocriter, primū iis sumptis quæ alvum dejiciūt: post hæc maximè piscibus, vel quos saxatiles vocant, vel qui in alto mari degunt. Rursus in cœna à piscium usu abstinuit: sumpsit autem aut farcum mulso, aut avem ex jure simplici: qua quidem victus ratione sensibus & membris omnibus integris ad extremū duravit. Sciendum autem est, ut pueris vinum est adversissimū, ita esse quam aptissimū senibus. Esto autē id ex his quæ calidioris naturæ existunt, qualia sunt in Græcia quidem Ariusium, & Lesbium, & Mysium: ex Italicis verò Falernum & Surrentinū. Proximā his sunt in Italia quidē Tiburtinum & Signinū, ambo vetera: quando novella diu fluitant in ventre. Secundo ab his loco sunt Adrianum & Sabinum, & Albanum, & Gabrianum, & Triphilinū: præterea omnia Aminæa quæ in Italia nascuntur, & circa Neapolim & in Tuscia. Ergo de his modicæ antiquitatis bibendum senibus est, utique quibus valentius caput non est. Quibus autem est, his & Falernum, & Surrentinū, & Ariusium, & Lesbium, & Mysium, & Tmolides, idonea sunt. Huc autem dirigi omne consilium debet, ut vinum ipsum sit substantia tenuissimū, atque fulvo colore: quāquā pallidum cōmodum etiam existit. Calidissimū autem vinum, si colorē spectes, est flavum: minimè verò calidum, album. Quæ media inter hæc sunt, prout alterutri magis accedunt, ita vim ejus exhibent. Unū igitur illud maximū senibus cōmodum ex vino accedit, quod omnia eorum membra calefacit: alterum, quod per urinas serum sanguinis expurgat. Quæ omnia præstat tenue simul & flavū vinum. Quæ verò ex pallidis aut flavis vinis substantiæ pinguis sunt, hæc & sanguinē augent, & corpus nutriūt: quo fit ut ea utilia senibus interdum sint, utique quo tempore nec serosam humiditatem in venis habent, & ali liberalius desiderant. Cæterum quæ diu in ventre morantur, ut crassa simul & astringentia vina, eorum sane nullum aptum est seni. Si quis ergo senum dulci vino uti à balneo velit, ubi manè comederit, huic optimum Faustianum Falernum fuerit, aut aliquod illi simile. Possunt etiam vinis iis uti senes, quæ melle condiuntur: maximè ubi suspicio est gignendi calculi in renibus, aut podagræ, articularisve morbi impetus futuri. Verum quia obstructio à cibis crassum atque lentum succum gignentibus, difficilius curatu est ea quæ à vinis procedit, ideo cavendum senibus est à multo alicæ, aut casei, aut ovorum, aut cochlearum, aut bulborum, aut lentis, aut suillæ carnis esu: multoque magis ne anguillarum, aut ostrearum, aut cartilagineorum, aut thynnorum, aut cetariorum usum frequentent. Sed neque ex carnibus cervina, caprinæve, aut bubula est utilis, nō modò senibus, sed neque ulli ætati. Ovilla verò juvenibus quidem nō malus est cibus. Senibus tamē, nec ea est cōmoda: atque hæc etiā multo minus agnina. Hædina verò seni nō

Senes crebrius et parcius cibandos esse. Antiochus quæ usus vitæ ratione, sensibus & membris omnibus integris ad extremū duravit.

Vinum ut pueris est adversissimum, ita quam aptissimū senibus.

Senibus quæ lia & vina sint cōmoda.

Vinum flavū calidissimū esse, album verò minimè calidum. Vinum quæ cōmoda præstent sensibus.

Vina in cōmoda senibus.

Senes à quibus cibis cavere debeat. Carnes omni ætati inutiles, sunt cervina, caprinæ, & bubula.

*Senibus salu-
ta esse melio-
rare tantis.*

*Senes quib.
uti debeant
præsidis ne
in obstructio-
nes incidat.
Panis qualis
exhibendus
senibus.
Bellaria esse
abigenda a
senibus.
Melle corrigi
prævitatem
placentula-
rum.
Panis quò
purior fue-
rit, eò magis
seni aduersa-
tur.*

*Lac esse ad-
versissimum
dentibus.
Lactis com-
moda.
Pascua ani-
malium con-
ferre pluri-
mum ad bo-
nitatem la-
ctis, maliti-
am de.*

*Asininum
lac quale.
Caprillu lac
Lac asininu
minimè in
Ventre cogi-
tur.
Lac quibus
sit exhiben-
dum.
Vina senib.
que condu-
cant.
Senile cor-
pus, parti-
bus quidem
solidis esse sic-
cum & frigi-
dum, collige-
re tamen in
se pituitosa
& serosa ex-
crementa,
qua sunt pur-
ganda.*

incòmoda est: præterea aves ex quæ extra palu-
des ac flumina, stagnaq; degunt. Salita autem o-
mnia meliora recentibus sunt. Ergo ante om-
nia cavendum ab obstructibus est. Quòd si res
cogat aliquando copiosius iis uti, protinus su-
mendum medicamen Diacalaminthes est, aut e-
tiam diatrion pepereon: aut piper album & re-
ductum in pollinem, cum ipsis cibus ac potione
est miscendum. Sed & cepas esitare tunc expe-
dier, alliumque, si huic assueverint. Quòd si post
obstruentes cibos, ea quæ obstructiones aperiât
dederis, atq; ab iis ipsis soluta alvus sit, utilissi-
mè postridie theriacen propinaveris, sicuti &
Ambrosiam, & Athanasia. Jam illud patere arbi-
tror, panè quoq; his exhibendum, qui nec salem,
nec fermentu, nec subactione, nec justam coctio-
nem desideret: nò autè aut similaginem, aut quæ
ex ea fiunt bellaria, cum nimiru viscera obstruât.
Quippe nisi placentis quæ ex butyro & similagi-
ne fiunt, mel affatim admixtu esset, nullus cibus
omnibus hominibus, nedum senibus, magis ad-
versus esset. Panis itaq; quò purior fuerit, eò ma-
gis seni adversatur. Siquidem nisi multu fermen-
ti & salis receperit, diligentissimeq; sit coctus,
obstructiones in jecinore, liene, & renibus facit:
maximè quibus in his visceribus vasorum exitus
angustiores natura sunt: pro quorù sanè diversi-
tate contingit etiam, ut alij citra noxam diula-
cte nutriantur, alij gravitate in præcordiis ac ma-
ximū pondus, dum utuntur illo, persentiant. No-
vi autem quendam, cui ex lactis usu dentes om-
nes perierunt: id quod ea de causa contigit mul-
tis aliis. Porro lactis comoda sunt, ventris mo-
derata dejectio, succi bonitas & nutritio: pascuis
ipsis quoq; animaliu, quorum lacte sumus usu-
ri, nò parum adhæc conferentibus. Nam si scam-
monia, aut rithymalorù quopiam vescantur, cò-
stat in lacte etiam laxandi vires inesse. Quare a-
nimaliu quorù veluti optimi succi lacte sis usu-
rus, neq; acria, neq; acuta, neq; admodum auste-
ra nutrimenta esse debent. Animal autem ipsum
sit ætate florens oportet, habituq; inculpato cor-
poris. Sariusq; fuerit alterum capram, alteru a-
sinam esse, earuq; lacte vicibus uti. Quippe asinæ
lac tenue serosumq; est capræ, mediocris substan-
tiæ existit. Itaq; hoc nutrit magis, illud omnino
tutius est. Nam & si quando solum cum pane su-
mitur, tum citius subducitur, tum minimè est fla-
tulentu: sed neq; in ventre cogitur, potissimum si
prius salis aliquid & mellis immiseris. Lac tamè
nò omnibus exhibendum est, sed iis solis, qui id
probè concoquant, nec ullum ex eo symptoma
in dextra præcordiorù parte sentiant. Vina autè
quæ calidiora sunt, & quæ ipsas urinas movent,
ea magis conducunt senibus. Cum autem seni-
le corpus, quantum ad ipsas partes attinet, frigi-
dum siccumq; sit: facile autem serosis & pituito-
sis excrementis, ob virium infirmitatem, implea-
tur, hæc quidem purganda sunt, solidæ autè par-
tes calefaciendæ simul & humectandæ. Jam quòd
moderato motu & somno senes indigeant, satis
magna documenta sunt, quò victus eorum con-
siliu dirigi debeat. Quare si quando propter
pituitam aut obstructiones cogimur aliquid ex
iis quæ incidant ac dissecant petere, revertendu

sine mora ad humectantè victum est: atq; alica
ex melle, cui aceti aliquid mistum sit, aut ex mul-
so, vinove Falerno exhibenda: aut lacte utendu,
aut prisana bene cocta, quæ piperis pollinem ac-
ceperit. Ita verò & maturi fici, præ cæteris autu-
mnalibus fructibus eligendi sunt, sicuti hyeme
caricæ. Panis autè præparatus sic uti diximus ex-
hibeatur. Sed urinas quotidie moveri còvenit,
nò per pharmaca, sed apio, & melle, vinisq; ad id
facientibus: necnon alvum solvere, potissimum
oleo ante cibum absorpto, atq; oleribus ex oleo
garoq; ante cibum assumptis. Quin & ficis, pru-
nis, aliisq; id genus quæ æstate autumnoq; vigent,
solvitur nonnullis alvus. Hyeme verò tu caricis,
tum Damascentis prunis, aut elixis, aut in mulso,
cui plusculum insit Attici mellis, maceratis. Lon-
gè autem ad dejiendā alvum Damascentis Hi-
spana præstant. Olivas etiam ex muria præsume-
re aliquando licet. Aloën verò (quod multos se-
num, quibus siccus venter est, facere video) haud
quaquam sumi suaserim, nisi major aliqua ne-
cessitas urgeat. Quòb si biduo astrictus venter
tertio die nò solvitur, sat eò tempore fuerit mer-
curialem herbam, & marinam brassicam, & eni-
cum in prisana, dedisse. Similiter & terebinthi re-
sinam, nucis ponticæ magnitudine: aliquando
duarum triumve. Quippe non modò alvum sol-
vere citra noxam potest, sed etiā viscera omnia,
jecur, lienem, renes, pulmonesq; abstergere. Vi-
catim autem prædicta exhibere oportet, tum ve-
rò id medicamentu quod ex caricarum eniciq;
à pelliculis exutorum tusorumq;, pari mensura
constat. Sumere verò còvenit duarum triumve
caricarum magnitudinis modum. Cæterum nu-
lum eorum quæ dicta sunt exhiberi admodum
copiosè debet. Siquidem nonnulli in præsens
gaudent, si copiosius desederint: verum quan-
tò magis sunt vacuati, tantò his venter sequen-
tibus diebus magis astringitur. Quod sit ut ipse,
si qui sunt quibus in diuturnis morbis venter si-
statur (contingit enim id post longum morbum
in convalescentia) iis alvum ducam non acri-
bus per inferna infusis sed tantum oleo: id quod
sanis similiter utile est. Omnis porro affectionis
corporalis providentia, in duobus còsistit: nem-
pe propria ejus internoscenda essentia, & mate-
riæ præsidiorum virtus. Ut statim in proposi-
to nunc senio, qui scienter pernovit senectutem
esse siccum & frigidum corporis temperamen-
tum, annorum multitudinis ratione proveniēs.
si quidem quæ humectent pariter & calefaciant
præsidiorum materias norit, is idoneus senum
medicus fuerit. Quadruplex verò materiæ ge-
nus cum sit, quæ sumuntur, quæ geruntur, quæ
educuntur, quæ foris admoventur: utiq; ex singu-
lis eligere oportet, quæ calefacere humectareq;
possint. Quod autè ad exercitia pertinet, ut juve-
nibus ea mutare quæ nocent, tentandum est, etiā
si à pueris his maximè insueverint: sic utilius est
senibus consueto opere exercitari, vel si modicè
noxium sit. Sicuti verò senum ipsorum inter se
non parva differentia est, ita & eorum qui na-
tura sicciore frigidiorq; sunt, si ad mediocrem
statum compares, non parvum intemperiei dif-
ferentia invenias. Atq; humectare quidem hos
cale-

*Senibus
Anhu
stans co
gruit.
Ficos
ros com
resenib
Senibus
na &
quibus
cament
que cib
venda
Dama
pruna
Oli &
Aloes
improb
lenia
bus.
Ventre
ventia
Terebi
nam su
alvum
gereq;
ra.
+ wov
Medica
ex caris
enico, a
venda
modum
Ventre
to mag
stringi
si semp
quò ma
esse su
tus.
Clysmo
lo oleo
dejienda
cum co
disimas
Affectu
corporis
videnti
propria
internoj
da essent
& scrib
præsidior
còsistit
Seniu qua
Materia
mediocr
druplex
nus.
Senibus
genda qu
humect
& calfac
Senes ex
cendi con
to opere
si modic
num sit.*

calefacereq; conveniet: audacius tamen eos, qui per ætatem majori exercitio ferundo sunt. Conducit autem ad certiorē affectuū notitiā, cum ætatis consuetudiniq; tum causarum quas procatarticas vocant, consideratio. Qui verò affectum exacte norit, facile adinveniet remedia, cum contraria contrariis auxilio sint. Malè itaq; affecto corpori, semper contraria: optimè se habenti, viribus similia exhibeantur. Quinetiam intemperies ipsas, quæcunq; adhuc intra sanitatis fines subsistunt, si corrigere studebis, contraria quodammodo victus ratione curabis: quod tamen per multum sit ocium. Nam si in negotio sint, similibus uteris, potissimum cum ita fuerint corpora assueta. Atque hætenus malè affecto corpori contraria exhibebimus, quoad pristinum statum sit consecutum. Cæterum ea victus ratio quæ intemperies corrigit, longius plerunq; procedit, propterea quod similibus majori ex parte morbis tentamur. Facilius itaq; quicquid intemperatū est, ad propriam naturā redit, quam ad optimū temperamentū accedat. Quippe id cum in medio omnis intemperantiæ sit, quisquis conveniente naturæ suæ morbo laborat, ab eo longius abest: qui dissimili, minus. Ergo nec assuetudines ipsæ, tametsi parvæ sint, dissimilibus adhuc sibi corporibus, sunt mutanda. Cum autem contrarij inter se multorū hominum corporis status sint, cerre mirandum non est, nonnullos utilitatem ex contrariis percipere. Ac proinde sicuti fieri non potest, ut unum calopodium ad omnes homines sutor accommodet, ita nec medicus unam omnibus vitæ speciē quæ conducat, potest accommodare. Nonnullos siquidem novi, qui si triduo se ab exercitatione abstergerent, protinus ægrotabant: alios in perpetua quiete degentes, tamen secundam tueri valetudinem: atq; horum ipsorū alios minimè lavare: alios nisi lavissent, ilicò febricitare: sicuti Premigenem Mitylenæum, cui nimirum ob excrementa fumida sub cute collecta cohibitaq; febris excitabatur. Quare naturis ejusmodi balneum est utilissimū, nō modò quòd fumitum evocet, sed etiam quòd humectet, idq; dulci humore. Facillimè igitur id quod quæritur, ratiocinatio invenit: fidem verò ejus experientia cōprobat. Porro ubi Hippocrates ait, labores debere ipsos cibos præcedere: illic agit de ordine exercitationis & cibi, nequaquam illud affirmans, quòd omnibus hominibus hæc ambo cōducant, sed quòd iis quibus exercitari expedit, præcedere exercitatio ipsos cibos debeat: cum nimirum in lib. De morbis vulgò grassantibus, calidis naturis quiescendum esse suadeat, hoc, est, à vehementi motione cavendum: quandoquidem ex ipsa in totū delidia, nemo unquā adjutus est. Quibus itaq; mordax calor à natura est, adeò ut fumida gignat excrementa, iis balneum salubre est, tum motus qui exiguus & lentus sit: multus autem & celer, adversissimus est. Quare istis non semel modò, verum etiam bis lavari die cōducit, potissimum æstate. Esse quoq; boni succi nutrimentū, in quo nihil sit acre. In sole autē versari, & irasci, & multū cogitare, his inimica sunt. Qui diversæ ab his naturæ sunt (hi autē sunt frigido & humido tempera-

mento) valentiores motus desiderāt, ac victū in quo superet quod tenuem succū faciat. Hi verò, nec si in sole exercites, læduntur: nec etiam si balneo abstineāt. Porro senescūt celeriter, quæ corpora frigida & sicca sunt. At humidum & calidū temperamentū est fluxionū vitiis obnoxium. Jam verò omnes intemperatas naturas corrigere quidem contrariis oportet, dum planè in ocio sunt: servare autē similibus, dum per negocia vacare sibi nō possunt. Cæterū plus laborandū est propter humiditatem corporis: præceleri motu non utendum, propter calorem. Ad hæc, cum ex segnitie vitæ ratione ad exercitationes & balnea se transferunt, ilicò fluxionū tentantur morbis, nisi prius sint vacuati, quam exercitationes adeant: quare antevertere per veris vitiū sanguinis detractione oportet, aut per incisam venā, aut scarificatis malleolis. Quòd si ita inaniri recusent, purgandi medicamento sunt, non simplicis facultatis, sed quod trahere flavam bilem, & pituitam, & serosa excrementa possit. Vinum autem frigidis & siccis naturis utilissimū esse prius dictum est: circuncidendū verò iis est, qui summè calidi propter intemperiem existunt. Nam qui media temperie sunt, utiq; plurimus iis fuerit naturalis calor, ac tali quidem naturæ mediocri dandum est vinum, sicuti ipsa quoq; mediocris est. Sed cum triplex genere sit calidi temperamenti differentia: una in qua reliqua cōtrarietas (nempe quæ in humido & sicco cōsistit) mediam temperiem servat: altera, in qua siccitas subsultat: & tertia, in qua unā cum calido etiā redundat humidum: ei quidem quam primo loco diximus, tantum albi, tenuis, atque diluti vini offeremus, quantum ipsa à summa intemperie recessit. Reliquarū autē differentiarū neutri, cum summæ caliditates existant. At quod calidissimum vinum est, id frigidissimis intemperantiis est utile: reliquis autem quod portione respondet. Hæc verò dicta mihi de iis sunt, qui mediam senectutis ætatem agunt.

GALENI PERGAMENI de sanitate tuenda, lib. VI.

Cum autem anterioribus quinq; libris, quo pacto quis cum qui optimo corporis sit statu, ab omniq; civili negotio immunis, propriæ tantū valetudini indulget, à prima in eunte ætate ad ultimam usq; senectutem in sanitate custodiat, jam abundè docuerimus: nunc sanè ad eos veniemus, quibus per negocia esse, bibere atque exerceri debito tempore haud licet: præterea ad eos, qui statim ab ortu sunt valetudinarium corporis statum sortiti. Vitiosi autem corporū status, genere duplices sunt. Alii siquidem universas similes particulas similiter habent intemperatas, alij verò dissimiliter, inæqualiterq; Quinetiam instrumentaliū partium compositione, quædam æqualiter, quædam inæqualiter conditæ sunt. At primū quidem dicam hîc quoq; qui status corporum sint maximè valetudinarij: sicuti & prius, qui maximè sanus esset, ostendi. Verum is unicus erat. Etenim in omnium rerum genere, quod optimum est, id unum est.

Viti-

Naturis frigidis ac humidis, quæ convenient, senescunt celeriter corpora quæ. Intemperata natura dum sunt in ocio, corrigenda contrariis, ut servanda similibus, dum sibi vacare non possunt.
Sanguinis detractione aut purgatione, quibus namprospiciendum sit in ante vere.
Vinum frigidis & siccis naturis est utilissimum.
Vinum mediocri, mediocri naturæ dandum. Calidi temperamenti differentia triplex. Calido temperamento absq; excessu humoris & siccitatis, quantum sibi offerendum sit.
Vitiosos status corporū esse duplices genere.
Vinum ubiq; esse, quod optimum est.

Vitiosa esse plurima.

Vitiosa verò plurima sunt. Eorum autē quæ per omnes partes similem habent intemperantiam, maximè improbanda sunt, quæ validas habent ipsas intemperantias, ac potissimum frigidas simul & siccas. At eorū quibus inæqualiter se habent corporis partes, illa quidem maximè morbis patent, quorū principes maximè partes contrariis temperamentis affectæ sunt. Minus obnoxia valetudini sunt, quibus ignobiliores partes ita se habent. Afficiuntur autem interdum partes per consensum aliarum, atq; consortij lege. Primum ergo de iis verba faciā, qui æquali sunt intemperie, idq; ab iis qui præcalidi sunt, auspiciatus. Dictū autē alibi à nobis est, nō posse diu intemperiem unā solam per se durare: quādō ipsa sibi ipsi alteram ex necessitate asciscit. Sciendum etiam est, temperiem optimā corpori in adolescentia accedere: reliquas autē ætates, hac detiores existere: necnō corporales quidem actiones, præcipuas adesse pueris: animales autem, ei ætati, quæ à pueritia ad remissionē usq; succedit. Nec tamen est has ætates annorū numero circūscribere: nisi fortē in latitudine quadam. Pubescere quippe incipiunt aliqui, ubi expleverunt quartumdecimū annum. Quidam uno post anno, aut etiam amplius. Initium præterea remissionis nōnulli habent statim à trigésimo anno: nonnulli post quintū & trigésimū. Ac robur quidem omnibus minuitur, post ipsam summi vigoris ætatem: nō tamen hi sanitatem amittunt, tametsi minus hanc quā ante laudabilem habeant. Nam cū latitudo sanitatis sit ampla, nō solum usque ad initium senectutis, verum etiam in ipsa senectute tota (quæ quibusdam naturalis esse morbus videtur) sani dicuntur homines. Sanitate senectuti congruente: quæ tamen, sanitas absolutē non est, cū actiones in senibus non sint perinde validæ & firmæ, ut in iis qui ætate florescunt. Quare horum sanitas, propter ipsam actionum virtutem integra est, & de qua queri non possit: senum sanitas, querimoniis non vacat. Quamvis enim omnes actiones habet, nullam tamē validam possidet. Porro corpora quæ à prima statim genitura prona ad morbos statum sortita sunt, ea sanē ad senectutem nūquam perveniunt aut quando pervenerint, uno saltem diutino morbo penitus laborant. Qui autem salubrem vivendi rationem ignorant, credibile etiam est, hos citius quā pro naturæ ratione interire. Sed jam ad illos cōvertamus sermonem, qui æqualiter per omnes partes, calidius sunt sortiti temperamentū: cæterum in humiditate & siccitate se habēt modicē. Actalis quidem corporis natura, ab initio statim magis apparet sana, quā quæ in utraq; oppositione est vitiosa. Citius quippe edet dentes & citius articulatam vocem, ingrediturq; citius, & singulis annis ad portionem increscet. Postea verò q̄ adolescentiæ annos compleverit, exinde ad remissionem usq; manifestē apparebit calidior, ita ut tum morbis, tum symptomatis quæ à bile oriuntur, facilē sit obnoxia. Multus nanque calor dum humorem absumit, siccus reddit temperamentum. At cū florens jam ætas item calida sit, nimirum composita eorum temperies, calida si-

mul & sicca erit. In talibus autem temperamentis, bilis abundare tum pallida, tum flava solet. Sunt verò qui hac natura sunt, ad ætatem usque adolescentiæ, similiter educandi iis qui optimæ sunt naturæ. Si igitur bilis ipsa ventrem superiorem perat, per vomitum expellenda est, post exercitationes aqua tepida propinata: nam ab vino tunc utendum nō est, nisi difficulter vomant ex aqua. Quippe ejusmodi quædam naturæ sunt, quibus utiq; vinum dulce, ubi aquam præbuerint, est concedendū. Præterea etiam magis, ubi temperamentum eorum ab initio calidius ficiusq; fuit, vomitio petenda est. Quin & exercitari his utilius est, non acutis exercitationibus & prævegetis, sed potius tardis, & mollibus. Sunt enim omnes qui hoc statu sunt, graciliores. Acutæ autem exercitationes extenuant: lentæ implent corpus. Sunt verò ex iis qui impensè calido temperamento sunt, & qui exercitari prorsus nō debeant: sed abundē his satisfaciant inambulatio, balneū, & mollis ex oleo frictio. Quos etiam juvat à cibis balneum, nisi in dextra præcordiorū parte dolorem, tensionēve aut gravitatem sentiant. Etenim quidam eorum incredibile est, quā etiam obesi sint redditi ex tali victus ratione. Antiquū autem vinum inimicū iis est: album verò & tenue, idoneum. At si quando eorum quæ dixi aliquod circa dextra præcordia sentiatur, ilicō dandum aliquid est eorū quæ jecur obstructū liberēt, abstinendumq; ab iis cibis, qui crassum efficiūt succum: idq; donec affectus sese remiserit. Utile sanē fuerit & liquorē in quo macerata sit absinthij coma, offerre: præterea quod ex ea, tum ex aniso & amaris amygdalis cōficitur: quod etiam bibere ex oxymelite præstat in eo tempore, quod inter surgendum à somno, lavandumq; intervenit. Non inutile est & medicamentum diacalaminthes, ex oxymelite: cujus tamē assiduū usum cavere oportet in biliosis temperamentis. Porro alimenti species, si quis horū temperamentū vertere in melius studet, contraria esse intemperantiæ debet. Cæterū qui versatur in rebus civilibus, & multis negociis distringitur, huic tutius est, ut nec tentet suum temperamentum mutare, sed similia sibi nutrimenta assumat. Nutritio siquidem fit, cū is qui nutritur cibo, corpori quod alit, assimilatur. Citius autem assimilantur sicca siccis, & humida humidis. Quibus verò æquale temperamentum est, iis quātō jucundius fuerit quod edunt, tantō utiq; fit magis nutriendum. At qui inæquale temperiem sortiti sunt, iis diversum est quod assumptu jucundum est, ab eo quod cuiq; est particulæ idoneum. Duplex autē est, id ipsum quod cuiq; cōveniens dicitur. Aliud quippe secūdū simplices qualitates, aliud secūdū totam substantiā esse cōveniens dicitur. Atq; illo quidem utimur, dum aut mutare intemperiem per ociū volumus, aut servare, propter negocia. Hoc autē quod tota substantia maximè idoneū est, sola experiētia discernitur, habetq; vim non vulgarem, ad mutationē alimentorum in substantiā animalis nutriendi, totius substantiæ convenientia. Fiunt autem & qualitatibus cōvenientiæ, utiq; si servare temperamentum studes humidis naturis humectante cibo

Intemperie unam per se diu durare non posse. Temperiem optimam soli adolescentia accedere.

Actiones corporeas adesse præcipuas pueris, ut animales, pro Vectioribus usque ad declinationem. Aetates circūscribi nullo numero annorū non posse.

Robur immixtum omniū post vigentiæ ætatem.

Sanitatis latitudo est ampla.

Sanitas senum non est sanitas absolutē.

Corpora ab initio pestime constituta, non pervenire ad senectutem: aut aliquo semper morbo teneri.

Calidioribus quæ excessu humiditatis aut siccitatis temperamento quæ adsint.

Bilem dare in dis & temperis. Bilis peritio quæ sit molis.

Calido cōtempmento: ti, tardis libusq; citius facienda.

Macile quali ratione quiescere leant.

Obstructum viscerum tulari aethium, sum, amigdali, & medicamentum diacalaminthes.

Occupatio, non bene temperamentum mutare.

Nutritio cum nutritus cibis alitur corporis assimilatur.

Cōveniens cuique dicitur.

aut secundum qualitates aut secundum totam substantiam.

Temperamentum esse servanda similibus ut alterantur contrariis.

cibo maximè quadrante : ficcis verò eo qui fice-
 cet: fin alterare placet, contrariis. In eo verò qui
 est in calido frigidove ad intemperantiam lapsu,
 contraria dare semper expedit, cum efficaciores
 quam quæ & siccitate & humiditate consistunt,
 ejusmodi intemperies sint, facileq; similibus nu-
 trimentis in morbosam intemperantiam abeat.
 At si ficius quodvis membrum efficias, nihil ma-
 nifestè lædes. Pari modo nec si humidiori suam
 serves humiditatem. Evidenti verò argumento
 tibi ætates sint. Quæ enim à prima genitura, ado-
 leſcentiam usq; habentur, humidissima iis caro
 est. At senili ætati, tum caro, tum cæteræ partes
 admodum sicca sunt, licet mediæ capacitates su-
 perflua humiditate impleantur. Corpus itaque
 justo calidius, si quidem in prima constitutione
 medium siccitatisq; humiditatisq; habitum obti-
 nuerit, omnino id in incrementi statu ficius effi-
 citur: idq; tum magis, tum celerius, si etiam natu-
 ra erat ficius. Sed & senescet idem citius, quan-
 to utiq; ad summum incrementum pervenit ci-
 tius. Hi ergo in præcipui vigoris ætate potissi-
 mum humidam victus rationem postulat: quæ
 humectantibus cibis & balneis, tum exercitatio-
 num, quæ prævalidæ & multæ sint, abstinentia,
 perficitur. Prodest his & frigida potio. At Venus
 ficcis temperamentis inimicissima est. Vitandæ
 quam maximè his sunt exustiones, & lassitudines,
 & sollicitudines, & vigilæ, & motus omnis ce-
 ler. Iracundia verò, cum biliosas naturas maxi-
 mè accendat, acutas febres parit. Eatenus autem
 intendere, remittere ve speciem victus oportet,
 quatenus supra naturalem habitum aucta dimi-
 nutæve sunt temperamentis elementa. Ac muta-
 tur quidem temperamentum contraria victus ra-
 tione: custoditur simili. Sanè calidiores humi-
 dioresq; naturæ in puerili ætate, fluxionum, pu-
 tredinis, & redundantia morbis tentantur ma-
 ximè. Quo magis & pluribus exercitationibus,
 & exacta ventris concoctione indigent. Itaque
 & ante cibum bis terq; hi si lavent, & calidis spon-
 tæ ortis utantur, maximum inde commodum sen-
 tiant. Quippe huc dirigitur in his consilium, ut
 ipsas animalis particulas servemus humiditas.
 Quæ res omnis temperamentis communis est, si
 modo contraria ratio omnium animantium cor-
 pora citius ad senectutem perducit, ipsaq; est, cu-
 jus culpa omne genitum corpus mortale sit. Nam
 cum non liceat corpori effugere progressum ad
 siccitatem, idcirco senescere nobis, corrumpiq;
 est necesse. Erit tamen id maximè diuturnum,
 quicquid erit minimè siccatum. Ac proinde qui
 maximè humidi sunt, ij maximè sunt longævi,
 & sanitate, ubi corpus ad robur pervenit, plus
 cæteris fruuntur: & reliquis qui parem ætatem
 agunt, valentiores ad extremum usque senium
 persistunt. Nam tametsi humidum temperamen-
 tum in principio deterius sit, tempore tamen re-
 liquis præstantius evadit. Quo magis qui tuen-
 dæ hujus corporis sanitati præficatur, excretio-
 ni omnium recrementorum oportet maximam
 operam navet, tum balneis ante cibum plurimis &
 tum exercitatione, tum apophlegmatismis &
 purgationibus: sed ante omnia cibis boni succi,
 necnon vini potione, quod urinas promoveat.

At frigidorum temperamentorum tres summae dif-
 ferentia existunt. Nam aut modicè habent in
 altera oppositione: aut altera qualitas in his exu-
 perat, utique vel siccitas, vel humiditas. Pessima
 tamen merito sicca temperatura est: quippe quod
 temporis spacio senescentibus accidit: id iis sta-
 tim à principio contingit. Ergo istos humectare
 calefacereq; oportebit: quod fiet exercitatione
 modica, & nutrimento humectante, & calido:
 præterea calidi vini potione, & somno liberalio-
 re: illud interim providentibus nobis, ut quoti-
 die excrementa omnia expellantur. Venerem au-
 tem adversissimam esse temperamentis ficcis,
 jam diximus. Quare adversari eam iis qui præ-
 ter siccitatem sunt quoq; frigidi, etiam verisimi-
 le est. Nam innoxia Venus iis tantum est, qui ca-
 lidi sunt & humidi, tum verò qui genitura natu-
 raliter abundant. Malum verò & illud frigidum
 temperamentum est, quod cum humiditate con-
 jungitur: maximeq; est id fluxionum morbis ob-
 jectum. Succurritur huic & balnei abstinentia,
 & exercitio, & tenuiori victu, & unctionibus
 quæ modicè calefaciant. At qui frigidi natura
 sunt, cæterum in fici humidiq; temperatura se-
 modicè habent, minus ij vel ad sanitatem, vel ad
 corporis robur sunt inepti, quam qui sunt in il-
 lis intemperati. Horum igitur excitare, firmare-
 que calorem expedit: in humiditatis verò fici-
 tatisq; specie, tota victus ratio sit media. Nunc
 autem de iis dicamus, quibus corporis status est
 inculpatus, vivunt tamen vitam servilem, aut ne-
 gociis implicitam: sed ita, ut ad extremum diei
 liberè possint sibi vacare. Salubris & inculpatus
 corporis status, in latitudine intelligi debet, sicuti
 & ipsa sanitas. Cum autem ad extremum diei
 dico, distinguendum est: circanè solstitium æsti-
 vum, hybernūve, an circa æquinoctia, dies ipsa
 sit æstimanda. Romæ siquidem maximæ dies ac
 noctes paulò majores quindecim æquinoctiali-
 bus horis sunt: contra minimi, paulò intra novē.
 In magna verò Alexandria, maximus dies qua-
 tuordecim horarum est, minimus decē. Ergo qui
 in brevissimis diebus & longissimis noctibus à
 ministerio sole occidente redit, huic fricari per-
 ocium, & lavari, & modicè dormire licet. Nemo
 autem tam infelici est sorte, qui in maximis, & e-
 tiam in minimis diebus, non possit aliquid me-
 diocriter agere. Cæterum qui exercitationi nō as-
 sueverunt, sed citra frictionē protinus perfusi o-
 leo cōsueverūt lavari, satis per se transpirabiles,
 ita ut neq; assidue, nec longo tempore agrotēt,
 ij ad aliā consuetudinē transferendi non sunt, si-
 cuti neq; ulli alij, nisi qui jam longo tempore æ-
 grotant. Agrotare autem solent, aut redundan-
 tia, aut succi vitio. At si quidē redundantia vitiis
 agrotent, succi ad cōvenientem modum sunt re-
 vocandi. Sin succorum vitio, ad meliorem fru-
 gē ij reducantur oportet. Ubi igitur quod exhalat
 à corpore, minus est iis quæ accepit, redundantia
 oriri morbi solēt. Quare prospiciendū est, ut eo-
 rum quæ eduntur & bibuntur, respectu eorū quæ
 expelluntur, servetur conveniens mediocritas.
 Servabitur sanè is modus, si ponderetur à nobis
 in utrisq; quantitas. Detrahimus porro de nutri-
 menti vel quantitate, vel qualitate, videretiam
 utraq;

*Frigidorum
temperament
orum diffe-
rentia tres.*

*Sicca tempe-
ries cur pess
ma existat.
Sicca frigid
que tempera
mento prædi
ti, quæ ratio-
ne calefacien
di simul &
humectandi.
Venus adver
satur tempe-
ramentis sic-
cis et frigidis
Venus qui-
bus innoxia.*

*Humido &
frigido tem-
peramento,
qua sit occurr
endum &
dus ratione.*

*Salubris cor-
poris consti-
tutio, ut sani-
tas, etiam la-
titudinem
habet*

*Dies maxi-
mi & mini-
mi quot sint
horarum Ro-
mæ, & in ma-
gna Alexan-
dria.*

*Redundan-
tia morbi
quando sele-
ant oriri.*

*Nutrimenti
quando mi-
nuenda qua-
ritas, aut mu-
tanda quali-
tas, aut utru-
que facien-
dum sit.*

*Alvi deiectio
quibus sit au-
xilium com-
mune.*

*Nutrimenta
ventrem sol-
venda, quibus
ante alios ci-
bos sint inge-
renda.*

*Astringen-
tium usus in
iis qui os ven-
triculi imbe-
cillum possi-
dent, ad al-
vi deiectionem condu-
cit.*

*Apothera-
pia usus qui-
bus conve-
niat.*

*Exercitia
post crapulam,
qua mala so-
leant produ-
cere.*

*Capiti pleno
succurrendum
ambulationi-
bus.*

*Obstructio-
nis remedia
etiam ad con-
coctionem fa-
cere.*

*Oxymeli.
Diatrion pe-
pereon.*

*Deijcere al-
vi levis
Diospoliticum
medicamentum,
ex quo ex fi-
cis, & cnico,
& epithymo
constat.*

utraq; Ac quemadmodum de quantitate dematur, notum est. De qualitate demitur, cum unius maximè alentis cibi loco, alius exigui nutrimenti apponitur. Qui igitur celeriter notabilem abundantiam acervant, iis de utraq; qui non celeriter, aut non notabilem, iis de altera demptum esse sat fuerit, utra videlicet homo ipse potius voluerit. Qui verò vitiosos congerunt succos, ij non perinde ut qui redundantiam cogunt, uni tantum rei sunt intenti: quando quidem neq; unica est vitiosi succi species. Cuiq; tamen horum ab iis cibis potionibusq; abstinendum est, qui eum quem ipsi congesserunt vitiosum succum facile gignant. Ac sanè omnibus his commune auxiliū est alvi deiectio, sicuti & veneris conveniens mediocritas. Nam quibus inculcata corporis constitutio est, non debent ij, veluti siccis supra præceptum est, à venere omnino abstinere. An verò semel in die, an bis, sit iis qui ejusmodi vitam agunt comedisse ex usu, cum ex corporis ipsorum natura, tum ex consuetudine, atque adeo tolerantia ad ipsius consuetudinis mutationem, indicationes petendæ sunt. Et eorum quidem quibus biliosus venter est, primi semper ciborum ac potionum sint, qui alvum deijciant. Nempe ex vinis dulcia, & quæ mollire ventrem possint. Ex cibis olera cum oleo & garo. Vitanda verò ex vinis sunt austera: ex cibis, qui astringunt: nisi si firmandi oris ventris gratia, post totam comestitionem exhibeantur. Siquidem astringentium usus, in iis qui imbecillius os ventris obtinent, non solum alvum non comprimit, sed etiam ad deijciendam illam conducit. Quicūq; verò palæstræ exercitiis ante balneum sunt usi, priusquam districtæ negociis vitæ se addicerent, iis ut ab ipsis abstinuisse est incommodissimum, ita ut similiter utantur, præter incommodum etiam fieri non potest. Ergo apothera pia istis utendum censeo: & simul de suillæ carnis modo non nihil demendum. Quibus autem ante balneum aliquid esitasse est melius, si quidem in die (gratia exempli) tredecim horarum æquinoctialium, circa horam decimam curaturi sint corpus, ij hora quarta solum panem assumant, id quod ipse sum solitus facere. Modus autem ejus sit is, qui decima hora possit esse coctus. Sed nec post assumptum ipsum bibendum est. Eorum porro qui repleti cibo se exercent, nonnullis caput repletur vaporibus, & in jecinore aut ponderis, aut distentionis, aut utriusq; sensus percipitur. Si igitur caput repletum sit, succurrendum ambulationibus est, sed potissimum ante cibum. Nihil tamen vetat quin & post cibum. Cæterum has quam maximè lætas esse oportet, illas his celeriores. Si jecur obstructum sit iis quæ in viis ejus hærentia expédiant. At quæ obstructos hepatis meatus aperiunt, eadem tarditati concoctionis conducunt. Horum optima sunt oxymeli, & diatrion pepereon, quod nihil non familiare receperit: ad hæc extenuatorius victus. Ubi verò corruptio ciborum in ventre accidit, quibus id quod corrumpitur, per alvum descendit, iis maximum id compendium ad sanitatem est. Quibus autem non descendit, ij provocandi iis sunt, quæ deijciunt leviter: cujusmodi sunt diospoliticon, utiq; cum pari cum reliquis pondere nitrum immixtum habet: & quod ex ficis & cnico compo-

nitur, aliaq; quæ ex cnico vel epithymo conficiuntur. Porro iis qui sic sunt affecti, etiam vomitus ante cibum ex vini dulcis potione conducit: nec non alvi subductio, ex convenienti intervallo, medicamine dialoës (quod amarum vocant) exhibito. Nam si longo tempore vitiosum succum augeri sinas, gravis quispiam ipsis incidet morbus. Consulendum verò his est, ne quid fumidum, aut malè olens, aut facile corruptibile nutrimentum accipiant, sed qui boni succi sunt potius eligant. Ars quippe quæ sanitatem tuetur, iis qui sibi paruerint, firmissimam sanitatem promittit: qui verò aut voluptate, aut ambitione victi, parere recusant, iis perinde est, ac si omnino non esset. Jam verò, iis qui nimis graciles sunt (solent enim accidere nonnullis gracilitas ob frigidam & siccam intemperantiam, nonnullis propter digredientis in corpus, vel nutrientis, vel ambarum facultatum naturalem imbecillitatem) illitio ex pice conducit maximè. Dein unguentum illud quod dropax dicitur. Prodest tamè si ante balneum manu mediocriter molli corpus perfrices, quoad ruborem contrahat: deinde dura frictione, non multa, cutem cogens, densam eam duramq; efficias. Ab his, si mediocri exercitatione usum, ac lotum, citra longam tamen in solio moram, hominem abstergas, moxq; ungas oleo exiguo, & cibum offeras. Quippe studium in his est, ubi bonum sanguinem in corporis molem attraxeris, ut tum nutricem vim firmes, tum ne quod attractum est exhalet, prospicias. Ac firmatur quidem nutriendi vis excitato in carnibus calore. Non exhalabit qui in has sanguis attractus est, si oleo unxeris: utpote quod emplastici medicamenti vim habet. Quod si ætas non reclamet, etiam frigida lavatione una cum prædictis utatur, magno fruetur comodo. Contra verò in iis qui immodicè sunt obesi, minuenda digestio est, augenda verò corporis exhalatio. Minuetur porro digestio, assidue ventris deiectione. Corporis autem exhalatio inaugebitur celeri exercitatione: cujus generis cursus est: præterea unguentis iis quæ evaporandi vim habent, fricando quam plurimum. Frictio tamen ipsa esse mollis debet, ac quæ laxum corpus efficiat. Qua ratione præpinguè quendam parvo tempore ad mediocritatem carnis reduxi. Sed & alias quæ totum occupant corpus intemperantias, simili methodo corrigere convenit: primum, eorum quæ agi expédiet, invento scopo: mox materiis quæ ipsa præstare queant. At jam ad inæquales corporis status accingor. Sanè inæquales status trifariam fiunt, prout compositio corporis nostri est triplex. Una ex primis elementis, ex quibus constant similes particulæ. Secunda ex iis ipsis similaribus, ex quibus instrumentalium compositio consistit. Tertia ab his, compositio totius corporis ex ipsis instrumentalibus. Ac facillima quidem, tum ad discernendum, tum ad curandum, tertia est: difficilior secunda: maximè lubrica est prima. Commodius ergo à tertia incipitur. Quare exordiamur disputationem à capite, quod intemperata nature sit, adeo ut multa excrementa gignat, unde lædi subiecta membra contingat, in quodcūq; excrementa decubuerint. Ac promptissimè quidem in os & nares

*Vomitus
ante cibum
conducit.*

Dialoës

*Ars san-
tatem tuetur
iis qui
paruerint
firmam
sanitatem*

*Gracilitas
ob frigidam
intemperantiam*

*Gracilitas
ob imbecillitatem
facultatum*

*Nutricem
vim firmes
tum ne quod
attractum
est exhalet*

*Obesitas
immodicè
minuenda*

*Augenda
corporis
exhalatio*

*Exhalatio
mollis*

*Inæquales
status
trifariam
fiunt*

& nares excrementa impetū faciūt. Decidunt ve-
rō & in oculos: nōnullis etiam in aures. Sed ex-
crementi in os decursum, tum gula excipit, tum
aspera arteria, cuius summa pars ori conjuncta,
quæ larynx dicitur, instrumentū est vocis. Ergo
is larynx ab iis quæ capite decidunt madefactus,
principiō quidem raucā vocem facit: proceden-
te verō tempore parvam. Si verō longius etiam
procedit malum, totam adimit: quippe cum la-
rynge, arteria quoq; ipsa unā humectat. Quod si
acris fluxio sit, nō solum ad vocem ineptæ præ-
dictæ partes fiunt, sed etiam gravissima eis ero-
sio accedit, qua & pulmo simul exulceratur, qui
morbis tabes dicitur. At si in gulam & ventrem
feratur fluxio, quæ quidem frigida est, in frigida
intemperiem corpora mutat: quæ calida, in cali-
dam. Hæc verō etiam spacio exulcerat. Verū in-
ter initia appetentiæ & concoctionē prosternit.
At frigida quidem fluxio tarditatem concoctio-
nis & cruditatē, & acidosis ructus creat. Quod si
etiam corrupta sit, alimentū quoq; vertit in cor-
ruptelam. Si verō inferius se noxa recipiat, & je-
junum, & colon intestinum affligit, tangitq; vasa
quæ in mesenterio sunt, per quæ sit in jecur cibi
digestio. Ac nōnullos quidem fastidium eiborū
excipit: alios appetentiā canina, aut etiam vitiosi
cibi cupiditas, qualis est circa affectus in gravi-
dis. Nec latet uvam quoq; & paristhmia, & paru-
lides, & antiades, & erosiones dentium, & ulce-
ra, & in ore putredines, hanc sanie quæ a capi-
te in ipsa decidunt, consequi. Satiū autem in his
omnibus est, ipsum mali ceu fontem prius tolle-
re, caput firmādo, quā ad eorū curationē nos
convertamus. Aut si id præ magnitudine natura-
lis intemperantiæ non licet, saltem illi prospice-
re, ab ipsa scilicet vitij specie, providentiæ indica-
tione semper accepta. Quibus igitur ex calida in-
temperie caput malè habet, hos frequēti balneo
dulcis aquæ fovere expedit. Calidarum autem
quæ spontè nascuntur, noxius his usus est. Si-
quidem quæ ex iis sulfureæ bituminosæve sunt,
eæ propterea quod calefaciunt, inimicissimæ ca-
lido naturaliter capiti sunt: aluminosæ verō, quo-
niam angustos meatus claudūt. Solis autem iis
spontè natis quæ dulces sunt (si tamen ipsis utē-
dum sit) uti citra noxam poterunt. Nam quod
utile etiā aliquid ipsæ præstare possint, hoc dice-
re nō perinde tutū est: quādo nec calidæ fortasse
forent, si omnis calefacientis medicamentosæ vir-
tutis essent expertes. Quibus verō caput vehe-
menter calidum æstuantq; est, iis præstat æstatis
tempore rosaceo perungi, quod ex rosis in oleū
omphacinū salis expers injectis, cōponitur. Sūt
capita quæ propter arteriarū temperamentū in
vertigines & capitis dolores incidunt: in quibus
etiam incidere arterias solemus. Sed hoc genus
propositæ artis limites egreditur. Quæ autē ex
nimis acuto nervorū sensu (qui a capite orti, in-
ter alia os etiā ventriculi texunt) frequenter do-
lent, his sanè mederi, propositæ artis officiū est.
Potius tamē consiliū est id agere, quò minus hæc
ullo modo incidunt, curando ne aut biliosus hu-
mor in ventrem prorsus confluat, aut q̄ celerri-
mè inde expellatur. Atq; ut ne prorsus quidē cō-
fluat consulueris, si citius cibum exhibeas. Ubi

enim totius corporis biliosius temperamentum
est, necnon imbecillus venter, nisi is corroboretur
cibo, defluūt in eum quas corpus accumulat
superflua sanies: ex quarū vapore dolores capi-
tis, suffusiones, atq; morbi comitiales gignūtur.
Horum itaq; omniū universa victus ratio ad fri-
gidius potius, humidiusq; mutanda est. Quod au-
tem in ventrē cōfluit, id vomitione ac ventris so-
lutione expellendū. Stomachus verō cibis qui-
dem quotidie priusquam bilem cōtrahat firmā-
dus. Purgetur etiā medicamentis ex majori inter-
vallo, absinthij coma, & compositione ex aloë,
quam picrā nominant: quippe hæc quod altius
in tunicas biliosi ventris se recipit, expurgat: ab-
sinthio parum id præstare valente, ut cui vis in-
tantū detergendi astringendiq; ac talis, quæ sor-
des tunicarū ventris detergeat: nō si quid altius
in eo imbibitū est, foras extrahat expellatq; sicut
aloë. Quæ verō post hanc ventri extrinsecus ad-
moventur unctioes, eæ modicè astringētes sun-
to: ut melinū, mastichinū, & nardinū. Ac æstate
quidē potius melinū, hyeme nardinū, vere ma-
stichinū sumendū. Est autē opulentis mulierib.
& quod præstantius nardino unguentū sit, nem-
pe foliatū: præterea quæ spicata vocantur, quæ
ventrem & roborare possunt, & calefacere. Si ve-
rō nō modò caput calidam sanie transmittit ven-
tri, sed etiam venter ipse calidam intemperie ha-
beat, utiq; refrigerante tum potione, tum cibo,
semper uti cōveniet: atq; eam qualitatem in his
pro temporū anni ratione intendere variè, ac re-
mittere; nusquā tamen ad contrariā pervenire.
Ad eundē modū si utraq; pars sit frigida intem-
perie affecta, illis calefacientibus est utendū: va-
riè tamē ea pro ratione temporū intendenda re-
mittēdaq; sunt. Porro difficilis cōnexio est, quo-
ties vel in calidum ventrē frigida & pituitosa sa-
nies defluit, vel in frigidū calida. Atq; harū dua-
rū alterā semper expertus sum magis ad curādū
rebellem: nempe in qua frigidi pituitosiq; succi
in calidū decidunt ventrē. Pessimus verō is sta-
tus est, si præter id, homo etiam ea natura sit, ut
neq; alvum faciliè solubilem habeat, nec vomere
ex facili possit. Si verō pituitosus succus a capite
in frigidum natura ventrem decurrat, faciliè his
succurrit, si manè aliquid medicaminis diatriō
pepereon sumpserint. Sed & piper solum, præci-
puè quod album est, cōminutū, atq; aquæ immi-
xtum, bibere iis licet. At potio absinthij his ad-
versissima est, ut quæ pituitosum succū ipso-
rum ventri affigat. Sed neq; aloë valde his conducit,
cū ei biliosi trahendi humoris facultas sit: eoq;
excogitata salubriter est cōpositio quam picram
dicunt, quæ acrimonia caloreq; eorum quæ in se
habet, crassos & lentos succos dissecat, ac deter-
get. Verū assidue uti hoc medicamento nō li-
cet, sicuti diatrion pepereō, aut diacalaminthes.
In totū ergo ad aloës drachmas centū, reliquo-
rum cujusq; conjiciuntur sex drachmæ, quæ ipsa
quoq; sex sunt. Atq; hæc est picra quā Romæ om-
nes præparāt. Ego verō etiā alias duas cōpono;
atq; in altera, eorū quæ calefaciūt, plus: in altera,
minus cōjicio. Utrūq; autē fiet, si aloës solius pō-
deri nunc præscripto, aut reddamus, aut detraha-
mus viginti drachmas. Caterū si cinnanomi co-

Ventriculi
imbecillum
nisi corrobora-
retur cibo re-
cipere totius
excrementa
corporis.

Picram ex a-
loë expurga-
re humores
altius imbi-
bitos in ip-
so Ventriculi
tunicis.
Absinthij
Sires.
Unctioes ro-
borantes ven-
triculi.
Foliata un-
guenta.
Spicata un-
guenta.

Frigida in-
temperantia
capitis & ven-
triculi quo-
modo succur-
rendum.

Status ven-
triculi pessim-
us quis.

Diatrion pe-
pereon piper-
is ex aqua
succurrere
Ventriculo
frigido in
quem pitui-
ta descendit
a capite: ab-
sinthium au-
tem illi esse
adversissi-
mum: neque
aloë valde
utilem.

Picra usita,
atq; composi-
tiones discre-
tae.

*Diospolitici
compositio
duplex.*

*Ventriculi
intemperie
calida coeſe
cum capitis
frigida, quid
agendum.*

Oxymeli.

*Ore Ventri-
culi naſe a-
bundo exiſte-
re, cum aſtri-
ctione aſſi,
quid agen-
dum.*

*Renos ſi gi-
gnant calcu-
los, totum au-
tem corpus
ſit gracile,
qua utendū
ſiſtus ratio-
no.*

*Lac aſininū
ſolū eſſe utile
renibus cal-
cuſiſis, cum
ſiſtus corpo-
ris ſiccitate.*

pia nō ſit, ponendum pro eo eſt optimæ caſiæ du-
plum. At in quibus quidem venter aut frigidus
eſt, aut etiā temperatus, ad frigus tamen propen-
ſior, iis aptū diospoliticū eſt: quod dupliciter cō-
fici aſſuevit: iis nempe qui alvo ſunt aſtriſta, ni-
tro, quod Berenicariū vocāt, cum cumino, ruta,
& pipere, pari pōdere admixto: iis verō qui ſunt
ſoluta, dimidio. Gravis autē nec facilē tractabi-
lis cōplexio eſt ventris, qui intemperanter cali-
dus ſit, cum frigido capite: quippe os ventris ab
iis quæ calore accendūt, offenditur. Ergo in iis
qui ſic ſunt affecti, id agēdum, ut pituitā diſſeces,
detergeaſq; iis quæ minimē calefaciūt, quod ge-
nus oxymeli eſſe novimus. Jam lubrica atq; ad
curationē difficilis connexio eſt, ubi tales partiū
affectus coierint, in quibus os ventris imbecillū
ac nauſeoſum eſt, ſiſtitur autem venter. Iſ igitur
cōvenit primo loco olera cū oleo & garo, aliaq;
quæ ventrē mollire ſolent, ſumere. Poſt juſtū au-
tem cibi modum, aliquid eorū quæ ſtomachum
roborent, accipere. Ea ſunt mala, & pira, & puni-
ca. Ipſe autē qui affligitur, omnibus ſeorſum uſu
exploratis, quod minimē noxium, jucundissi-
mūq; invenerit, eo in quantitate mediocri uta-
tur. Atq; in totum magis qui ita ſunt affecti deji-
ciunt, ſi quid aſtringens poſt cibū ſumpſerint, q̃
ſi eo caruerint. Siquidem eorū uſu roboratus vē-
triculoſus, natātes ſuccos pellit ad inteſtina, quos
ea etiam cōtinuata expulſione propellunt. quē-
admodū ē converſo, ubi humor aliquis mordax
ad expulſionē ſui circa ſedem nos irritat, quē ta-
men cohibere propter civilia negocia coacti, ne
que ab his expediti cum expellimus, ſignum eſt
illum ipſum humorē, converſione facta, ab inte-
ſtinis pulſum eſſe verſus ſuperna, unde ſæpenu-
mero capitis dolore tentamur. At ubi renes cal-
culos aut tophos gignūt, totus verō habitus gra-
cilis eſt (quæ inæqualis cōnexio cæteris maligni-
tate nō cedit) hi medicamenta & victū quæ exte-
nuare poſſint, requirūt: ea tamen gracili corpori
inimiciſſima ſunt. Cæterū cum interrogaret me
quiſpiam, qui ob tales renum affectus, ſicciffimi
victus ratione uſus, in maximam ſiccitatem inci-
derat, quo utiq; victu, citra renum noxam, me-
deri quis poſſet ſiccitati illi ſuæ, piſanæ cremo-
rem excogitavi, & piſces tum ſaxatiles, tum qui
in alto mari degunt. Simili ratione & ex volatili-
bus quæcūq; ſimilem carnē habent. Porro mul-
tæ ex mōtanis volucris tali ſunt temperamen-
to. Quas nanq; in urbibus cōcluſas humido nu-
trimento impinguant caupones, adverſiſſimæ
hiſ ſunt. Optima verō ſic affectis caro eſt, ut ex
avibus, perdicum: proxima attagenarum, & ſtur-
norum, & merularū, & turdorum. Quod ſi mō-
tanarū avium copia nō eſt, de iis quæ in agro vi-
citant, & gregalibus columbis, paſſeribuſq; qui
in turribus nidificant, ſumere licebit. Sunt au-
tem in editis locis huiusmodi turres. Ita nanq;
& gallinis, & gallinaceis qui in corte aluntur, uti
licet. Ex lactibus autem, ſolum aſininū eſt conce-
dendū, propterea quod cæteris omnibus eſt te-
nuius. Ac breviter, media inter extenuantem im-
pinguantemq; ſit eorū victus ratio. At ſi obefus
ſit quē calculus infeſtat, audacter huic tenulē vi-
ctum injungito. Eadem & iis qui articulorum vi-

tiis laborant, convenire præcepta cenſebis. Scire
tamen licet, podagrica antidota multū diſtare à
nephriticis, non tantū quod craſſos glutinoſoſq;
ſuccos attenuent, ſed quod etiā calefaciāt & ſic-
cent. Nam calculoſis, quæ valde calefaciūt, dare
nullo modo cōvenit. Jam verō partes quæ læſæ
ſunt ob defluxionem à capite, nō omnes corro-
borandæ veniūt, ſed ex tantum, quarum perma-
gnus eſt uſus: ut oculus, atq; auris. Idcirco deci-
dentibus in has partes excrementis à capite, de-
rivatio per vicinas partes molienda eſt, ac ad na-
ſum potiffimum trahēda, quæ in illa decumbūt,
idq; per ea quæ ſternutamenta movent, atq; ejus
obſtructiones aperiunt. Si ad naſum nō ſequun-
tur, in os ipſum apophlegmatiffimis ſunt dedu-
cenda. Oculis verō ipſis robur adjicies, ſi ſicco
collyrio, quod ex Phrygio lapide conſtat, utare:
ac ſic palpebris ſpecillo inducas, ne oculi mēbra
nam intus cōtingas. Ita nanq; mulieres quotidie
faciunt, cum ſtibio oculis gratiam cōciliant. Ad
aurium verō robur adhibeas vel glaucium ſolū
ſuper cote tritum cum aceto, ac mox tepidū: aut
collyrium quod diaglaucium vocatur, aut dia-
rhodon, aut crocodes, aut nardinum, aut quod
dicitur, aut deniq; foliata & ſpicata unguē-
ta. Cæterū ubi ſatis firmatæ ſunt, ita ut nihil jam
in has confluat, aſſiduē aliquid inſtillandum eſt
optimi unguenti nardini. Porro auriū ulceri, An-
dronis medicamento, ſimilibuſq; medeberis. In-
terim tamen avertere materiam ad naſum & os
oportet. Ut autem ex iis quæ à capite defluunt,
lāduntur nōnulla eorū quæ illi ſubjecta ſunt, ſic
ex jecinore & renibus, & liene, in alias partes
quæ ipſis ſunt imbecilliores, morbi incidunt: ni-
mirum ſemper ipſo excremento à fortiori ad im-
becilliorē partem demifſo, donec ad imbecilli-
mam omnium deventū ſit. Atq; ad hunc modum,
quorū nulla ſui cura eſt, alius alia parte aſſiduē
vexatur. Qui verō nihil colligūt ſupervacui, nec
qualitate, nec quantitate, hiſ manent imbecillæ
partes ſemper in tuto. Jam quod redundat, aut
per totum colligitur corpus diciturque affectus
plethora: aut in parte aliqua princeps: ſed quæ a-
lioi natura ſit imbecillior. Ante omnia tamē
eſt definiendū, propriōne affectu labore mem-
brum: an propter aliud, quod prius ipſo ſit affe-
ctum. Sed extrinſecus etiā imbecillæ parti noxa
poſteſt accidere: plurimū tamē ex vitioſa victus
ratione. Attēdere itaq; magnitudini naturalis in-
firmitatis membri conveniet, ac tenuiorem qui-
dem victum quā antea, exhibere homini: tum
idoneam exercitationem injungere, cavendo ne
quid ab externis cauſis noxę incidat. Poſtea ſi ab
hiſ neq; ipſe gracilis fiat, neq; imbecilla ejus pars
affligatur, inſiſtendum eidem victus rationi eſt.
Sin autē aut omnibus membris fiat gracilis, aut
malē afficiatur quod vitioſo eſt habitu, mutare
talem victus rationem debebis utiq; ſi affligitur,
aut victum hominis in tenuiorem mutabis, aut
certo anni tempore purgatione uteris. Ac aliis
quidem una quotannis purgatio vere incipiente
ſatisfacit: aliis altera quoq; poſt hanc, aut ſi-
no eſt opus. At ſi ſanguinis quidem abundantiam cor-
pus accumulavit, mittendus iſ eſt. Sin vitioſum
ſuccū, vacuūduſ proprio ad id medicamēto fue-
rit. Quod

*Podagrica
medica
re a neph-
riticis.*

*Calculoſi
nullo mo-
danda &
calefaci-*

*Derivatio
per vicinas
partes moli-
enda eſt.*

*Collyrium
cum ex phry-
gio lapide
oculis ra-
addere.
Auribus
xiliantia
medica.*

*Excrementum
ſemper a
tioribus
imbecillioribus
partes de-
gere.*

*Plethora
quid.*

rit. Quod si ex tenui victus pars afflicta levatur, sed corpus emaciatur, picatione utendū. Porro status corporis eorum etiā est pessimus, qui genitale semen copiosum calidumq; gignunt, quod eos ad expulsionē sui proritat: post quā & vētris os illis resolvitur, & ipsi toto corpore nō solum relaxantur, imbecilliq; fiunt, sed etiam sicci, graciles, pallidi, cavisq; oculis cōspiciuntur. Quod si propterea quod de cōcubitu sic vexātur, ab hoc se retrahant, nō m. capitis molestiam, sed stomachi offensionē, fastidiaq; sentiunt, nec ex continentia magnoperē juvantur. Accidunt enim ipsis per nocturnas imagines nō minora incommoda iis, quā a cōcubitu senserunt. Sumere igitur ij debent non cibos modō, verum etiam medicamenta quā semen extinguant: tum verō exercitationibus uti, quā supernas tantum partes exerceant: ac deniq; a balneo lumbos totos ungere unctione aliqua refrigeratione, qualis ex omphacino oleo, et rosaceo, et melino cōficitur. 20 Ipsi autem oleis, ne defluant, ceram adicere poteris. Ubi verō ceratum id in mortario subegeris, cum eo succum aliquem refrigerantem miscbis accuratissimē: videlicet sempervivi, aut solani, aut umbilici Veneris, aut psyllij, aut polygoni, aut tribuli, aut portulacæ, aut lactucæ. Portulaca tamen succū suum non remittit, nisi dum in mortario tunditur, affusum sit humoris quippiā tenuis aquosaq; substantiæ, qualis uve immaturæ est, & rosarum. Quin etiam lini semen si in aqua coquas, refrigerantem cremorē efficit. Ego verō cū ē plebe cuidam consulerem, ut plumbi laminam renibus superponeret, quō nocturnis careret Veneris imaginibus, tali præsidio adjutus postea mihi egit gratias. Alter autem qui plumbi duritiā non tulit, ex dictarum herbarum, cum eisq; mollium amerinæ & rutæ foliorum appositione, necnon ex assiduo esu seminis ipsius amerinæ, singulare præsidium sensit. At quicūq; ex papavere mandragorave unctiones fiunt, omnino fugiendæ sunt. Sed neque ut prædictis, ita his quoq; substratis utendum est, cū in vigore cōsistunt. Quin rosas experiri cui dam suasi, sensitq; ex iis substratis levamen citra ullam renū noxam. Alios autē, qui ubi cibis boni succi modicē se impleverunt in cœna, postea concubuerunt dormientes, postero die cū satis dormierint, ac surrexerint, jubeo linteo fricari, quoad rubor per cutem appareat: mox aliqua ex oleo frictione modicē uti: tum exiguo interposito tempore panis aliquid fermentati & in clibano cocti, & puri, ex vino mixto, illis gustandum porrigo: atq; ita ad cōsuetum opus dimitto, magnam hinc utilitatem expertos. Non dissimilem roborandi per cibum stomachi rationē, & grammatico cuidam, quē assiduē morbus comitialis urgebat, suasi: ac mirificē contulit. Maxime verō in fiduciam veni hominis juvandi, ubi didici tum spasmos incidere, cū diutius a cibo abstinuisset, magisq; si dolor interim, irāve intervenisset. Quinetiam habitū ejus intruebar gracilem: sciscitantiq; mihi de hac ipsa re, stomachū assiduē bili urgeri est fassus. Nonnulli itaq; immo dicē veneris usu læduntur. Alij citra noxā usu ejus ad seniū usq; sufficiunt. Verū hæc ambo genera ra-

ra. Totum verō quod in medio est, id cum majoris minorisq; discrimine, ad magnū hominū numerum se extendit. Ac de his hæcenus. Huic autem cōmentario jam colophonē imponam, ubi medicamen illud descripsero, quod ex mālōrū succo conficitur, tum ad appetendi vim excitandam, tum ad juvandam facultatē coëtricem, roburq; conciliandum ventriculo, maximē confrens. Accipies igitur succi mālōrū cotoneorum, quæ dulciora majoraq; sint, sextarios Romanos duos, quibus mellis optimi tantūdem miscbis, aceti sextariū unum & semissem. Hæc cū super prunas modicē coxeris, & spumā detraxeris, immittes zingiberis uncias tres, piperis albi unc. ij. Dein rursus in simili igni recoques, donec mellis crassitudo consistat. Quā utiq; crassitudine, stomachica medicamēta parari solent. Hoc porro pharmacū, etiam iis quibus invalidum jecur est, salutare in primis existit. Illud verō latere nō debet, jejunis id maximē dandum esse, mediocri cochlearis modo. Quāquā nec si a cibo sit sumptum, quicquam lædit. Cōmodē quoq; dabitur, etiam si prius pransus quispiam, ante cœnam id sumpserit. Maximē tamen tempestivē id duabus horis aut tribus ante cibum obtuleris. Quod si id astringere magis voles, ex succo acerborum cotoneorū conficies ipsum. Licebit autē piperis zingiberisq; portioni addere, sicuti etiam detrachere, atque omnino nihil illorum miscere, prout is qui tali est medicamine usus, aut calidum biliosumq; ventrem sortitur: aut contrā, frigidum atq; refertum pituita: aut deniq; in medio constitutum temperamento.

Medicamēnis ex cydoniorum succo & usus, et compositio.

GALENI PERGAMENI

de usu respirationis, lib. unus.



Inimē sanē vulgare esse respirationis usum, hinc liquet, quod ea privati, ne momentum quidem possimus vivere. Ex quo manifestū est, respirationē ipsam, ad nullam particularem actionē, sed ad solam vitam * conferre. Cū igitur actio animæ, vita sit, quæ plurimū a respiratione juvatur: tandiu certē utilitatis momentum nos ignorare oportet, quādiu animæ substantiam (quæ nobis incognita est) ignoraverimus. Coarguitur autē facile Erasistrati opinio, dicentis, impossibile esse ut cor ex pulmone aerem transumat, circa respirationis cohibitionem. Nam si millies quis inspirationem faciat, plurimumq; undique premat thoracem, & nihil rursus expiret, apparebit certē nihilominus in ipso cor pulsans, hoc est, tum attrahens, tum expellens: suffocatur tamen interim homo, idq; eo magis & citius, quō plus inspiraverit: quod nimirum tunc non substantia, sed qualitate spiritus, cor opus habeat. Quare hujus suffocationis medela, unica exspiratio existit: quæ quidem si confertim & cum magno strepitu fiat, validē compresso thorace, & reserato asperæ arteriæ orificio, efflatio appellatur. Si igitur ipsum cor substantia tantum egeret spiritus (quod nimirum Erasistratus existimabat) magis utique ex penuria ipsius, quā ex abundantia oboresceretur

Respirationis privati, ne momentum quidem possimus vivere.

Vita est actio animæ.

Anima substantia est nobis incognita.

Suffocatio nis medela, exspiratio.

Efflatio quid

læsiones, id quod minimè apparet, cum tunc præcipuè affligatur, dum maximè illius copia redundat. Similiter confutatur illorū etiam opinio, qui solius nutritionis ipsius animalis spiritus gratia, nos respirare contendunt, cum suffocatio, respiratione cohibita, non propter inopiam nutrimenti animalis spiritus accidat. Adest siquidem largus tunc in pulmone spiritus: longiusq; requiritur tempus ad hoc, ut animal propter inopiam nutrientis spiritus pereat. Etenim substantia animæ, etiam si non una sit, per omnem tamen vitam, ad multum tempus durat. Ergo si non ob substantiæ, relinquitur quod ob qualitatis penuriam, animalia in respirationis cohibitione extinguantur. Quæ igitur ista qualitas sit, inquirendum venit. Porro quandoquidem ubi amplior quàm secundum naturam caliditas in locis circa cor & thoracem fuerit collecta, statim, & amplius solutio, respirare appetim⁹: videri utiq; possit refrigerationis gratia, respiratio fieri. Rursus, si perfrigeratis iisdem organis (quemadmodum in magna fame, & ubi quis in magno frigore sit versatus, contingit) non solum non refrigerare eam, quæ in nobis est, caliditatem oportet, sed etiam calfacere, refrigerationis gratia respiratio minimè fieri apparet. Nonnulli tamen huic objectioni occurrentes, insitum calorem semper egere refrigeratione contendunt: verum cum auctus is sit, ampliori: pauciori verò, cum imbecillior est redditus. Hanc autem controversiam diluamus, flammæ exemplo proposito: quæ quidem (ut animalia) aëre privata extinguitur: quemadmodum indicant cucurbitæ medicinales, undique circumpositæ. Nec verò tantum si quis cavum quid circumponat flammis, sed in balneis etiam, & Solis ardoribus, & frigoribus excellentibus, & vehementer ventilatæ, & materiæ multitudine obrutæ, sicuti & inopia alimentii, similiter extingui videntur. Augentur autem ac roborantur à moderato frigore, & si moderatè ventiles, & cōmoderato alimento nutritæ. Omnes autē flammæ duplici moveri motu videntur: altero à materia ex qua accenduntur, per quem maximè sursum feruntur, & unde quaque disperguntur: altero huic contrario, ad sui ipsarum principium, ac veluti radices vergente, per quem confidunt & contrahuntur. Etenim si facisq; maximè supernam extremitatem accenderis, confestum ad infernam perveniet ignis. Siquidem cum omnis flamma celerrimè corrumpatur, ob id necessarium est, velocissimam ejus esse generationē. Atqui generatio uniuscujusq; flammæ, est ex subiecta materia accēdi. Corrupti igitur omnem flammam est necessariū, si aut materia, aut altero motu privetur. Quippe ex contrarijs motibus, quorum alter alterum mutuo excipit & consequitur, alterum sine altero conservari impossibile est. Ob id igitur, moderatè frigido ambiente aëre omnis flamma opus habet. Qui enim excellenter calidus est, motum alterum ipsius immodicè extrā extendendo, frigidus verò alterum immoderatè intrā protrudendo, extinguit. Uterq; autem* modicè ventilatus, flammam materiæ applicat, ut frigidus aër temperatè: supra modum verò moveri, flammā di-

spergit veluti etiam calidus vehementer ambiens. At verò moderatio, omniū cōservatrix flammarum existit. Eodem igitur modo caliditas animalibus insita, materiā unde accenditur, sanguinem habet: nec non à natura insitum principium motus in utranq; partem, ita ut altero privata, etiam reliquo ex necessitate destituatur: & ob id ipsum, sive à respiratione prohibeas, sive à sanguine, statim corrumpitur: nam & lucernæ flammā tolles suffocando, aut omnino oleo privando. Simile itaque ponito cor funiculo, oleo sanguinē alicui organo cavo pulmonē: nam circumfusus est cordi forinsecus, ad cucurbitæ similitudinem. Verum quo tēpore expirat animal, assimila veris potius ipsum cucurbitæ foratæ: ubi verò respiratio cohibetur, imperforatæ & undiq; occlusæ. Quemadmodū itaq; cucurbita perforata intra se non potest flammam extinguere, respirantem per ipsum foramen: quæ verò è vestigio est conclusa, eam per suffocationem extinguit: ad eundem modum pulmo arctus & densus, qualis est in respiratione cohibita, extinguit: perforatus autem & rarus (talis enim existit circa respirationem) insitam caliditatem cōservat. Jam expiratio ipsa, ad evacuandum id quod veluti fuligo sanguinis est, mirè conducit. Favilla quippe, & fumus, & fuligo, & omnis ejusmodi ustæ materiæ superfluitas, non secus quàm aqua, consuevit ignem extinguere. Ex omnibus itaq; sunt recipiendi ij, qui dicunt, insiti caloris gratia respirare animalia. Nam & moderatè illum tum ventilari, tum refrigerari expedit: motumq; alium quem præfici fuliginoso excremento, quod nascitur ex ustione sanguinis, explodendo. Itaque ex ventilatione principij caloris insiti, & ex moderata refrigeratione, & ex ejus quod in ipso veluti fumosum est, defluxione, unū coacervatur caput & summa, conservatio videlicet naturalis caloris. Quare in balneis diutius versantes exolvimur, ac tandem morimur: idq; non ob evacuationem ex toto corpore spiritum, sed quod perspiratio tam quæ per universum corpus, quàm quæ per os fit, offendatur, calidum spiritū attrahens. Nam cum torpedini talis vis insit, ut vel per infimum ipsi tridentem piscatores maximè stupefaciat: certè mirum esse non debet, si aër etiam ambiens, suam nobis, qualiscunque illa sit, qualitatem cōmunicet. Porro per vehementes exertationes, perq; ardentissimas febres, amplius & frequentius respirare solemus: minus autem & rarius, ubi loci circa cor & pulmonem refrigerati sunt. Valdè namque & crebrò ventilare parvam caliditatem non convenit. Siquidem major flamma ampliori aëre, minor pauciori habet opus: omnis tamen flamma eo indiget, ac proinde & calor omnis aliquam ventilationem desiderat. Jam verò pueri, q̃ puberes, plus & crebrius respirant, ob id fortè quod plurimū habēt calidi innati (necessariò enim sequitur ad magnitudinem caliditatis, magnitudo & frequentia respirationis) aut quod eorum spiritus, si quidem à respiratione nutritur, ampliorem aërem desideret: quem dum conficiunt, plurimū fuliginis procreant. Ubi enim amplius alimentū elaboratur, ibi amplior superfluitas gignitur. At senibus, cum

Anima substantiam ad multum tempus durare. Suffocari animalia ob qualitatis penuriam, dum respiratio cohibetur

Flamma quorū modis extingui possint,

Flamma à quibus augentur. Flammarū motus duplex.

Motuum se invicem consequentium, alterum sine altero servabile. Flammam omnem egere moderatè frigido aëre.

Caliditas animalis materiæ sanguinis

Pulmonem se medicum curbitum mitem.

Expiratio conferre sanguinem pellendū

Respiratio fieri tuentis caloris gratia

Balnea diutina cur mori exolvant, mori tradant

Torpedini vires.

Respiratio magna & parva quando accidat.

Calor omnino egere ventulo. Pueri quam puberes, cur plus & crebrius respirant.

cum pueris adolescentibusque frigidiores existant, respiratio adest minor, & rara. In calidis præterea regionibus & naturis, semper editur respiratio major, & densior: frigidis verò, minor, & rarior. Parum etiam & frequenter respirant, qui cibum acceperunt & potum, ob septi transversi coarctationem: sic & prægnantes. In aqua etiam inter cutem, & in hepatis, ventrisque & splenis inflammationibus, similiter respirant eadem de causa. Jam verò quandoquidem ubi ventriculi animalis spiritus juxta cerebrum vulnerantur, statim immobiles ac sensus expertes nos reddunt: oportet utique omnino hunc ipsum spiritum, aut substantiam animæ existere, aut primum ipsius instrumentum. Qui sanè spiritus cum necessario nutriri debeat, certè rationi est consonum, partim ab aëre per inspirationem attracto, partim à sanguinis evaporatione, illi nutritione accedere. Nam si arteriæ carotides circa collum vinctis constringantur, nihil offenditur animal, quod pertinet ad respirationem, nec non ad motum & sensum. Unde liquet cerebrum spiritu per eas à corde allato, non valde habere opus. Reliquum itaque est, aut evaporationem ex sanguine ipsi sufficientem existere, aut per nares inspirationem. Atqui nec evaporationem largam contingere verisimile est, si arteriæ laqueo excipiantur: quare necessum est ex inspiratione per nares potissimam alimenti partem animali spiritui accedere: in quod sensit Hippocrates dicens: Principium alimenti spiritus, os, nares, guttur, pulmo, & cætera respiratio. Ex omnibus enim his nutritur nullatenus impeditis. At si quod ex iis impediatur, per reliqua tamen ei alimentum suggeritur. Est itaque maximè & utilis & necessaria animalibus moderata caliditas, præsertim animali spiritui, & principalissimis organis, imò verò etiam universo corpori. Jure igitur principium naturalis caliditatis, ipsum videlicet cor, respiratione in tantum egens habemus, quantum etiam ipsi moderata caliditate indigemus. Siquidem citra respirationem impossibile est salvam esse caliditatem: proinde totum corpus est transpirabile. Cæterum respiratio moderata omnibus alijs membris per arterias contingit. Cerebro verò & cordi duo præcipua adjacent respirationis organa: illi nares, huic pulmo. Verum ut moveatur pulmo, thorace opus habuit. Quod si etiam sanguinis evaporatione ad nutritionem animalis spiritus indiget, id quod credibile est, maximum habuerint sanè animalia & hoc à moderata caliditate commodum. * Et enim ubi sanguis melancholicus aut etiam biliosus est, in vitiosos vapores solvitur: atque alter ad atram bilem, alter ad animi alienationem perducit: proptereaque in æstuosis febribus ægri ipsi delirant. Confert moderata caliditas ad uniuscujusque membri conservandam propriam constitutionem, actionemque similiter: quæ à nulla re promptius læditur, quàm à calore immodico: quemadmodum & constitutio ipsa, quæ in debita temperatura quatuor qualitatum consistit. Atque in alijs quidem organis actionum offensa parvi momenti est. In his verò quæ ad vitam pertinent, magni refert. Postremo in

his quæ non solum ad vitam conducunt, sed ad alia etiam rationem principij habent, maximi. Talia autem sunt cor & cerebrum: quorum constitutionis læsio vitæ damnum infert. Nequit autem constitutio ipsorum aliter brevi offendi, quàm per caliditatem immoderatam. Nec ob aliā causam in spiritus cohibitionibus defungimur vitæ, quàm ob immoderatam caliditatem. Prima itaque respirationis utilitas, per inspirationem & expirationem completur: alteram nimirum refrigerantem & ventilantem, alteram expellentem fuliginosa. Secunda verò, quæ est nutritio animalis spiritus, per inspirationem duntaxat accipit. Quod verò cum cor à pulmone aërem partim quidem ad se attrahat, partim vicinis arteriis transmittat, ipse aër qui expiratur nihilo parior appareat eo, qui per inspirationem attractus est, in causa esse videtur, quod vapor quidam omnino expiratur, par copia portioni spiritus in cor & arterias transumptæ.

Respirationis prima utilitas.

Respirationis secunda utilitas.

Expiratus aër cur sit par inspirationi.

GALENI PERGAMENI de causis respirationis, lib. unus.



Ubi respirationis causam efficientem deprehenderit, is demum solus tum offensionis differentiam, tum curandi modum cognoscat. Cæterum cum tres sint in genere respirationis causæ, facultas voluntaria, instrumenta voluntati servientia, & ad hæc utilitas ipsa, ob quam etiam prioribus causis opus habemus: utilitas sanè principem inter respirationis causas locum obtinet, utpote quæ innati caloris commoderationem conservat, & animalis spiritus substantiam alit. Voluntas verò disponit, & veluti ad rhythmum coaptat respiratorias actiones. Verum instrumentorum species multifida & multiformis existit. Quædam enim ad vecturam spiritus destinata sunt, quædam aërem susceperant, quædam ea quæ moventur movent. Principium itaque est aër, qui per os & nares attrahitur, materia existens utilitatis respirandi, bifariam partitus: cujus altera quidem & minor pars, ad cerebrum per nares suggeritur: altera verò major, per asperam arteriam ad pulmones illabitur. At qui arteria ipse organum vocis, via est etiam respirationis. Pulmo autem, veluti profundus ventriculus, destinatus spiritui est: cujus dilatationem & contractionem thorax gubernat, qui musculis movetur, & ossibus inarticulatur: præterea septum transversum, respirationis similiter organum. Circulare enim id est, in centro quidem nervosum, circum circa verò carnosum. * Sic etiam in mediis costarum regionibus duo & viginti musculi numerantur, * præter duos alios primarum costarum, & totidem extremarum. Ultra hos, tres alij ex collo utrinque provenientes: deinde qui juxta spinam porrecti, & cum ipsis, qui circa * abdomen consistunt, octo. Ac tot sanè sunt musculi inservientes respirationi. Actiones autem singulatim, eorum quidem qui in septo transverso sunt, ut respirationem in violentam operentur: eorum verò qui juxta costas consistunt, ut thoracem exactè dilatent, & contrahant. Qui cum du-

Respirationis causas esse in genere tres.

Utilitatem respirationis, inter causas illius obtinere principem locum.

Voluntas. Instrumentorum respirationis species multiplices.

Aër est materia respiracionis.

Aëris portio nem unam ad cerebrum, aliam ad pulmones illabi. Arteria aspera usus.

Pulmonis usus. Thoracis usus.

Septum transversum.

Intercostales musculi duo & viginti. Musculi abdominis octo.

Musculorum inservientium respirationi, dinumeratio.

Musculorum thoracis actiones particulares.

Musculi intercostales duplices.

plices sint, externi expirationem, interni inspirationem perficiunt. Et primorū quidem duorum actio est, ut supernam tantum thoracis partē dilatent: inferiorū verò, ut infernam ejus partem constringant. Qui ex collo descendunt, retrahūt simul & dilatant sublimes thoracis partes. Ex rectis etiam * juxta ipsum collum musculis, hi qui ad claviculas extenduntur, fines cartilaginum quæ illic sunt, contrahunt: quemadmodū etiam ij, qui ad costarū in spina radices pertinent. Musculi demum * abdominis, firmitudo existentes septi transversī, thoracis contractionem adjuvant. Cum itaq; duo genera respirationum sint, nempe facilis & violenta, habeatq; utraq; ipsarū inspirationem & expirationē, fit ut in totū quatuor sint respirationis partes. Cæterum singulis his quatuor partibus, propria quædam instrumentorū natura inest. Quippe facili inspirationi septum transversum subleuit: violentæ * tum sima scapularum pars, tum interni musculi intercostales. At facili expirationi * musculi famulantur abdominis: violentæ autem, * externi musculi intercostales. Atq; hoc quidem modo res musculorū se habet. Porro nervi duo qui ad septum pertingunt, ex cōnexionē inter quartum & quintum colli vertibulū procedentes, in ipsam septi nervosam partem se inferunt. Qui verò à spina disperguntur in musculos intercostales, trāsversim progrediuntur ad pectus. At qui in alios musculos respirationis opifices feruntur nervi, ferè omnes ex spinali medulla oriuntur. Volūtas igitur similis equiti existit, qui habenarū motu equos ipsos impellit. Habenæ autem sunt nervi similes, quemadmodum equis musculi. Sic verò & utilitas extremū est respirationis votum, perinde ac victoria artis aurigandi.

GALENI PERGAMENI

de difficultate respirationis, liber primus.

Dyspnæa est respirationis læsio.

Unum esse quod secundum naturam est.

Varium esse quod præter naturam existit.

Immoderatum omne esse duplex.

Respirationis partes præcipue duæ.



Quod respirandi difficultas respirationis quædam sit læsio, nomen aperte indicat. Cum igitur id quod secundum naturam habet, unum atq; idem sibiq; semper simile existat, veluti regula quædam: varium autem atque dissimile multipliciq; errore involutum, ac proinde & infinitum numero, & arte incomprehensibile, quod præter naturā: impossibile certè est, hujus immensitatē certis terminis comprehendere, citra cognitionem ejus quod habet secundum naturam. Cum itaq; unum sit hoc, & animali cōmodum, palam est etiam id moderatum existere. Quare immoderatum fuerit, quod præter naturam habet. Cum igitur immoderatum omne duplex sit genere (aut enim deest quid ab eo quod secundum naturam habet, aut excedit) tot sanè in seipso particulares differentias fortietur, quod possibile est rē ipsam suscipere, circa moderati excessus defectusq;. Suscipit autem simplex duplices: compositum verò ex pluribus, duplicatas, juxta numerum eorum ex quibus conflatur. At verò, cum duæ quidem sint primæ & principalissimæ totius respirationis

partes, inspiratio videlicet, & exspiratio: duæ verò aliæ per accidens, nimirum quæ interveniunt cessationes: in quatuor sanè his universa consideratio de respirandi difficultate cōsistit. Quare oportebit omnino unam ex prædictis, aut plures, aut simul omnes vitari, aut corrumpi, ut respirandi difficultati sit locus. Fuerit autem optimum, simplicem appellare respirandi difficultatem, quæ unam tantum respirationis partem occupat: compositam verò, quæ plures læduntur. At cum posterius sit semper compositum simplicibus, à simplicibus auspicabimur respirandi difficultatibus. Quandoquidem igitur ex ijs quas diximus partibus, duo motus sunt, inspiratio videlicet, exspiratioque: duæ verò hos cessationes distinguūt: ac generatio quidem motibus composita est, cessationibus verò simplex: manifestum utique fuerit, immoderationes illorum, plures: cessationum verò, binas tantum produci. Hæ nanq; simplices existentes, juxta temporis quantitatem solum differentias sortiuntur: motus verò nō solum juxta hanc, sed juxta quantitatem etiam spaciij localis, per quod instrumenta respirationis moventur. Itaq; duplices erunt immoderationes ipsorū, quemadmodum & cessationum, utraq; juxta temporis quantitatem diductæ, secundum quas aut veloces aut * tardi motus dicuntur: duæ verò adhuc aliæ, juxta quantitatem distensionis instrumentorū distinctæ, quarum nimirū ratione, aut * magni, aut parvi appellantur. Siquidem inseparabilia sunt ab omni circa locum motione, tum tempus, tum spaciū, per quod id quod agitur motu, movetur. Quemadmodum autem motui propria sunt velocitas atq; tarditas: ita & quantitati cessationū, raritas & densitas. Præterea cum & ipsa respiratio ex contrariis motibus per cessationes distinctis cōposita sit, densam ipsam reddet brevis cessationū, raram verò longitudo. Atq; hæ sanè universæ sunt simplices respirandi difficultates. Cum itaq; respiratio ex duobus contrariis motibus constet, inspiratione videlicet, & expiratione: necnon ex cessationibus binis: offensiones utiq; circa motus cōtingent, in velocitatem & tarditatem, magnitudinemq; & parvitatem: circa cessationes verò, in raritatem & densitatem: nec præter has, simplicem aliam difficultatis respirandi differentiam reperias. Porro cum unumquodq; ab iisdem peius aut melius reddatur, per quæ omnino produci solet: certè si sciverimus à quibus causis respiratio producitur, scimus etiam & respirandi difficultatis causas. Igitur animalis facultas thoracem movet, cum quo simul pulmo movetur: ad distentionem cujus sequitur inspiratio, sicuti ad contractionem ipsa exspiratio. Etenim principalissima respirationis utilitas, est conservatio caloris insiti, animalisq; spiritus nutritio. Si ergo & facultas, & usus, & unumquodq; organorū optimè habuerint, juxta naturæ legem animal respirabit: sin verò ex eis fuerit quicq; viciatū, juxta illud etiam respirationem impediri est necesse. Inquirendū igitur jam quænam causa esse possint respirationis celeris. Enim verò si illud est verum, eandem utilitatem à respiratione quidem, ei qui circa cor est calor: à pulli-

Dyspnæa duplex quæ dicenda, quæ præter naturam cōposita.

Inseparabilia ab omni motione et tempore, & spacio, per quod agitur, mobile movetur. Motus propria. Cessationum quantitas propria.

Respiratio constat ex contrariis motibus, & terminis distinctis.

Respirationis utilitas principalis est conservatio caloris insiti, animalisq; spiritus nutritio. Usus eundem esse respirationis est.

a pulsibus verò, ei qui per totum animal est disper-
 sus, contingere: ac velox quidem pulsus, sicuti &
 omnis motus, ab utilitate urgente, facultate inte-
 gra, & promptis organis perficiatur (quæ quidē
 a nobis alibi sunt demonstrata (eādem certē esse
 possint causæ velocis respirationis. Possibile ta-
 men est utilitate sufficienter urgente, etiam si fa-
 cultas moderatē debilius sit, quandoq; motum
 fieri velocem. Si verò magis debilitetur, nō am-
 plius possibile est velocem actionē fieri, sed pro-
 veloci densam. Omnis autem densitatis actio-
 nū una causa assignatur, prioris videlicet actio-
 nis defectus: siquidem illa urgente, coguntur fe-
 stinare expeditius. * Porro sermo a nobis habi-
 tus in cōmentariis de pulsibus, respirationi vide-
 tur fuisse cōmunis. Primū quidem, nam de om-
 ni motu illic disseruimus in uniuersum. Deinde,
 quia parum abest, quin omnis respiratio pulsui
 proportionē respondeat. Quippe similiter ut il-
 le, est composita ex contrariis moribus per cessa-
 tiones distinctis: atque eiusdem utilitatis gratia
 contingit. Præterea ex partibus eius, inspiratio
 quidē consimilis existens pulsus dilatationi, in-
 sitam caliditatem refrigerat: exspiratio verò, vel-
 uti contractio pulsuum, humidum sanguinis ex-
 crementum excernit. Quin & ad nutritionē ani-
 malis spiritus ambas actiones cōferre: & ex cessa-
 tionibus, eam quidem quæ post dilatationē fit,
 breviorē esse: quæ verò contractionem sequi-
 tur, longiorē: ambobus cōmunia existunt. Eū-
 dem autem causarum concursum magnitudo re-
 spirationis, quem velocitas, postulat, nempe uti-
 litatem urgentem, facultatis robur, & prompti-
 tudinem organorum. At tarditas parvitasq;, non
 omnino opus habent cōtrariis omnibus simul,
 sed unum ex ipsis prorsus adesse oportet: plura
 non est necesse. Quemadmodū igitur si parum
 sit aucta caliditas, perspicuē major, nō tamen ve-
 locior: sin autē plurimum, & maxima & velox
 & densa inspiratio redditur: eodem modo ubi
 caliditas secundum naturam imminuta fuerit,
 aliis causis immotis manentibus, necesse est par-
 vam, tardam, & raram inspirationē fieri: sed pau-
 lō tamen quā secundum naturam minorem,
 multo verò tardiorē, plurimū autem rariorē.
 Robusta enim existente facultate, non est possi-
 bile multo minorem fieri dilatationē. Sed si quæ
 ad utilitatem pertinent, admodum exolvantur,
 plurimam cessionē fieri verisimile est: non ta-
 men propterea omnino tardē moveri, modō fa-
 cultas robusta sit. Porro quæ in aucto calore, eā-
 dem & in animali spiritu ad nutritionem urgen-
 te, species erunt respirationis difficultatis, eius
 videlicet quæ circa * inspirationes consistit. *
 Quemadmodū etiā immoderatio fuliginis eā-
 dem respirandi difficultates circa expirationē effi-
 ciet, quæ circa respirationē relatæ sunt. Veloces
 quippe erūt, & magnæ & dēse, ubi multa eiusmo-
 di superfluitas collecta fuerit: tardæ autē & par-
 væ & raræ, circa affectiones cōtrarias. * An igitur
 sic ratio poscit, reluctatur autē aliquid eorū quæ
 evidēter apparēt? Ego sanē omnia hæc circa æta-
 tes, regiones, uniuersas cōstitutiones aeris am-
 bientis, exercitia deniq; & morbos, maximē con-
 sentientia reperio. Ubi. n. abundat caliditas, ve-

loces, magnas, & densas videre est inspirationes
 fieri: ubi rursus frigiditas, contrarias, nempe tar-
 das, parvas, & raras. At verò quibus animalis
 spiritus evacuatur, & ob id cito renutritione ha-
 bent opus, hi nō solum valdē, sed & citō & den-
 se inspirant: quibus nihil vacuatur, hi contrariā
 illis habent inspirationis speciem. Si verò ambo
 concurrant, & caloris augmentū, & spiritus con-
 sumptio, hi omniū maximam, & velocissimam,
 & densissimam inspirationē sortiuntur: & maxi-
 mē si ambo fuerint aucta vehementer: quemad-
 modum ubi ambo fuerint admodum imminu-
 ta, minimæ, tardissimæ, & rarissimæ fiunt inspi-
 rationes. Ipsa etiam expirationis species, si qui-
 dem multæ fumosæ superfluitates collectæ sint,
 maxima, velocissima, & densissima erit. Si verò
 paucissimæ penitus fuerint superfluitates, mini-
 ma, tardissima, rarissimaq;. Etenim ex ætatibus
 omnes quæ in augmento sunt, magnam, velo-
 cem, & densam facere inspirationem cernimus:
 quæ verò decrescunt, raram, parvam, & tardam,
 propterea quod illis caliditas amplior, his lon-
 gē minor existit: & illis quidē animalis spiritus
 substantiam cum corpore cōaugeri est necesse,
 his verò cōtabescere. Jam verò cum in ætatibus
 quidem crescentibus, ob insiti caloris robur, at
 que adeo ob ipsum augmentū, maxima humorū
 copia absumatur: in decrescantibus autē, quan-
 tum necesse est ad ipsam vitam duntaxat, utpo-
 te quæ neq; augeantur amplius, & jam sunt per-
 frigeratæ: merito sanē illis velox, magna & den-
 sa: his vice versa, per omnia cōtraria editur expi-
 ratio. Quemadmodū verò secundum ætates, ita
 & iuxta tempora, & regiones, & omnes ambien-
 tis constitutiones, tum pulsus cum respirationi-
 bus, tum respirationes cum pulsibus proportio-
 nem habent: in calidis quidem ad magnitudinē,
 velocitatē, & densitatem, mutata: in frigidis ve-
 rō, cōtrario modo. Quinetiā in exercitiis impro-
 bis (quod in eis augeatur quidem caliditas, absu-
 matur autē animalis spiritus) valdē, velociter, &
 densē respirare solemus: quiescentes verò, parū,
 tardē, rarēq;: quandoquidem sic marcescit calidi-
 tas, spiritus autē neq; in totū, aut omnino modi-
 cē absumitur. Ex balneis etiā, calida quidem, ve-
 locem, magnā, & densam faciūt respirationē: fri-
 gida verò, contrariā. Porro in somnis, magnitu-
 dine & velocitate motus, exspiratio inspirationē
 excellit: quando ciborū cōsumptiones & cōco-
 ctiones maximē tum perficiuntur. Unde verisimi-
 le est, coacervari in illis plurimū fuliginosi excre-
 menti. At per affectus febriles, maximē ubi circa
 aliquod respirationis organū, aut circa cor, ma-
 xima caloris copia est collecta, omnis respiratio
 magna, velox, & densa redditur. In quib. verò p-
 frigeratus est calor, contraria prorsus. Atq; his e-
 tiam, ut in aliis omnibus, pulsus & respiratio p-
 portionē habere videtur. Neutrū namq; ipsorū in
 totū perire est possibile, quādiu vixerit animal:
 etsi interdū ob parvitatē nonnullis periisse puten-
 tur. Hoc autē discrimen est inter respirationē &
 pulsū: quod illā quidē, cum sit animale opus,
 volūtas possit coercere: ac proinde in varias spe-
 cies mutare, vel si utilitas bona sit, & facultas in-
 tegra, & organa respirationis ad operādū prōptis-

Inspiratio-
 nes ob caliditatem
 raris excessum
 quales.
 Inspiratio-
 nes ob immodicū
 frigus,
 quales.
 Inspiratio-
 nes ab exhausto
 spiritu.

Expirationis
 species
 pro causarū
 differentiis
 variantur.

Augescentiū
 et decrescen-
 tiū inspira-
 tiones.

Exercitiis
 improbis auge-
 ri quidem
 caliditatem,
 spiritum autē
 animalē absumi.

Balnea qua-
 lem reddunt
 respirationem.

Exspiratio in
 dormientibus
 cur magnitudi-
 dine & velo-
 citate ipsam
 inspirationē
 excedat.

Febrilium
 respiratio
 qualis.
 Perfrigerato-
 rum pulsus.
 Vita manere
 nec respirationem
 omnino perire
 posse.
 Respiratio
 est voluntaria
 opus.

Pulsus est natura : pulsus aut, utpote existens opus vitale, nec
turalis actio. supprimi, nec variari possit, quandiu tres illæ cau-
 sæ inculpabiles conspirarint in unum. Ob idque
 circa inflammatas partes dolor vehemens ob ar-
 teriarum motum oritur, quod in nostra manu non
 fit motum facere magnitudine minorem, aut velo-
 citate tardiozem. Thorax itaq; unum ex respira-
 tionis organis, quandoquidem respiratio motus
 voluntarius existit, ad similitudinem crurum mo-
 vebitur. Quamobrem si sit inflammatus, & ad mo-
 tum cogatur, tardius multo quam oportebit, dilata-
 bitur, ac proinde cum respiratione difficili, ani-
 mal in discrimen suffocationis perducet. Ceterum
 ne suffocetur, desiores actiones edit, non amplius
 tantum cessans, quantum solebat cum secundum
 naturam haberet. Quamobrem tunc est necesse
 totam respirationem fieri parvam, tardam, & den-
 sam, multoque sanè minorem, quam par est, non autem
 ita multo tardiozem. Dolor quippe non adeo gra-
 viter vexat thoracem, ob motus velocitatem, si-
 cuti ob magnitudinem dilatationis. Quod si so-
 lus dolor thoracis particulas affligat, manente ca-
 lore cordis intra naturæ terminos, tunc motus
 thoracis manifestè tardior reddetur. Si verò ar-
 dor quidam in ipso corde oboriatur, velocitas
 quidem minimè exolvitur, aufertur autem hic
 etiam multum de magnitudine, pro qua densitas
 generatur, ob urgentem utilitatem. At quæ ob solum

*Dyspnœa ob
 solum ardo-
 rem produ-
 cta, qualis.*

ardorem contingit dyspnœa, ea magnam & velo-
 cem & densum spiritum efficit. Ob idque magni-
 tudine tantum & velocitate, ab ea quæ propter
 dolorem solum orta est, distinguitur. Quæ verò
 ex ambabus causis coeuntibus generatur, ab ea
 quidem quæ ob ardorem fit, sola parvitate dif-
 fert: ab ea autem quæ propter dolorem, sola velo-
 citate. Ceterum difficultas respirandi ob perfrige-
 rationem naturalis caloris, parvum, tardum,
 & rarum spiritum reddit: cum aliarum nulli simul
 tarditas & raritas accidat. At quantum in defecti-
 bus & excessibus caliditatis, ipsa respirationis
 species à rhythmo naturæ excedit, tantum etiam
 cum pulsibus communiter & eodem modo habet.
 Differt autem ab illis, in eis quæ ob dolorificos
 organorum affectus accidunt. Nam reliquæ affe-
 ctiones instrumentorum, quæ citra dolorem per
 obturationes, aut durities, aut compressiones,
 aut omnino coarctationes quasdam fiunt, con-
 similes variationes in utrisque actionibus, anima-
 libus & vitalibus faciunt. Quippe in id genus affe-
 ctibus parvus & velox, & densus spiritus reddi-
 tur circa pulsus & respirationes, necnon inæqua-
 lis, quæ vel præcipua earum affectionum est nota.
 Ac parvus quidem tunc spiritus agitur, propte-
 rea quod ob angustiam susceptiorum instrumen-
 torum, paucior quam oportet attrahitur: densus au-
 tem, quod non expletur votum utilitatis: atque ob ean-
 dem causam densus. Ut autem quæ respiratoriis

*Spiritus ina-
 qualitas,
 quarum affe-
 ctionum sit
 nota.*

*Tumores præ-
 ter naturam
 coarctantes
 septum trans-
 versum, par-
 vum, & velocem,
 & densum
 faciunt spiri-
 tum.*

instrumentis sunt propria commemorare, tumo-
 res præter naturam, qui circa ventrem, hepar, sple-
 nem, colon, hisque conjunctas partes consistunt,
 ob septi transversi coarctationem, parvum et ve-
 locem & densum faciunt spiritum. Juxta eundem
 modum & aqua inter cutem laborantibus, & ge-
 rentibus uterum, & ijs qui se supra modum ci-
 bo expleverunt, & qui prominenter ventrem ha-

bent, huiusmodi fit respirationis species. In or-
 thopnœa etiam (quæ erecta cervice spiratio est,
 fitque collectis viscidis & crassis humoribus circa
 asperas pulmonis arterias) & similiter ubi circa
 pulmonem aliquid induratur, aut tuberculum gigni-
 tur premens atque coarctans ipsam arteriam aspe-
 ram, parvus, densus, veloxque spiritus redditur.
 Ad eundem modum si in thorace tuberculum tale con-
 stiterit, parvus & densus & velox spiritus generabi-
 tur: occupante nimirum tumore præter naturam,
 pulmonis regionem, in qua dilatatus extendeba-
 tur. * Perinde autem est, ad hoc ut compressus pul-
 mo non possit sufficientem aerem attrahere, sive tho-
 rax totus angustus reddatur in affectu quovis, si
 ve media regio occupetur à quibusdam præter na-
 turam corpusculis, sive ipse etiam pulmo induretur,
 aut obturetur, aut intumescat, veluti in peripnev-
 monicis vitis contingit. Una enim in ijs omnibus
 conjuncta est causa, ob quam parva inspiratio red-
 ditur, coarctatio videlicet asperæ arteriæ. Cæte-
 rum parvitatē inspirationis densitas & veloci-
 tas sequitur, si facultas robusta fuerit. At cum iux-
 ta pulmonem affectus ipse consistit, quævis thorax
 distendi plurimum possit, parum tamen inspirat: ita
 etiam ubi intermedia ipsorum organorum regiones
 fuerint occupatae. Ubi verò totus thorax aut foe-
 tibus, aut aliter parvus & angustus redditur, tunc
 distentionem parvam efficiens, pulmonem causa est
 velocis inspirationis: quemadmodum & septum
 transversum, quando ab aliqua mole juxta infer-
 nam regionem opprimitur. Porro suppuratorum
 affectio, quævis sæpe ex pleuritide oriatur, his pro-
 xime relatis annumerabitur, quæ videlicet juxta
 pulmonem coarctationem citra dolorem faciendo,
 parvam reddunt inspirationem. * Quomodo igitur
 hæc respiratoriorum organorum vitia citra dolorem
 consistentia, ab ijs quæ cum dolore fiunt distin-
 guentur, si & parvus & densus utrisque similiter
 spiritus redditur? Motus velocitate. In affectibus
 siquidem dolorificis modicè respirant & dense, non
 tamen velociter, nisi forte etiam febris adsit. Quæ
 præsentē, licet juxta parvitatem & velocitatem respi-
 rent similiter, tamen densitudine distinguuntur:
 quippe non modicè densatur ipsis spiritus: id quod
 non evenit illis, qui ob solam coarctationem instru-
 mentorum difficulter respirant. Quin & exspiratio
 febrientibus major simulque calidior est: quod non
 contingit ijs, qui ob coarctationem parum & dense
 expirant. Verum in doloribus organorum respira-
 tionis, minimè quidem ob affectionem ipsam, sed
 ob actionis facultatem, quæ animalis existit, spiri-
 tus parvus & densus redditur. At species difficul-
 tatis respirandi, quæ ad coarctationem pulmonis
 consequitur, nihil opus habet facultate ad sui ge-
 nationem. Perspicuum igitur est, quod amplius in
 magnis thoracis motibus dolore vexantur par-
 tes quæ in ventre consistunt, minus verò in parvis:
 & ob id parvus & densus erit spiritus, non solum in
 pleuriticis, sed & quibus stomachum, aut ven-
 trem, aut hepar, aut splenem, aut peritonæum, aut
 intestina, aut præcordiorum musculos, dolorifica
 affectio infestat: cum nimirum ea omnia partim
 appensa sint, partim agnata respiratoriis orga-
 nis, atque ad eorum motum moveantur, ac proinde
 offendantur in respirationibus. Quare illis etiam
 non

*Orthopnœa
 quid sit
 unde sit.*

*Inspiratio
 nis par-
 tem eam
 & sequi
 facultas
 busta.*

*Empyema
 redditur
 & am-
 tionem.*

*Motus
 citas
 guit ad
 dolorem
 ganorum.*

*Spiritus
 ab ijs
 tra de
 infestat.*

*Exspiratio
 brevis
 qualis
 Spiritus
 eius est
 super
 affectum.*

piratori non vulgaris providentia inest, ut * ne gravius dolore affligatur animal. Quod verò ad pulmonem spectat, parum abest quin omnino sensus sit expers. Itaq; licebit pronunciare jam nobis in universum, parvum & densum spiritum signum esse doloris, non modò respiratoriū particularū, sed etiam aliarum omnium, quæ cum respirationis organis cōmoventur. Igitur naturales facultates omnes, semper necessariis sibi operibus vacant, & nunquam torpent, aut negligentes sunt: quæ verò sub voluntatis potestatem cadunt, easæpe, ubi voluntas ipsa circa alias actiones detenta fuerit, negligentius perficiuntur. Quare qui animi alienatione laborant, animalium actionum obliviscuntur: quas omnes, ut longo interposito tempore faciunt, si cōfertim & magnas. Cæterū si quis minus quam oportet bibat, non ad dies tantum, sed ad integros menses durare possit: sin verò minus quā par sit respiret, nec minimam diei partem durare queat. Proinde respirationis utilitas nō expleta in ijs qui commoti sunt mente, sollicitè ad actiones excitat: quibus sanè maximis, totū illud recuperat, quo per cessationis tempus fuit defraudata. Atq; ita nō rarus modò, sed magnus alienatorū mente spiritus redditur, tantaq; quam cōvenit major, quantò videlicet rarior: contrā quam in potu contingit: multo enim rarius, paulò verò plus bibunt. Porro ubi secundum naturā se habent organa, quantitas spiritus semper est ipsorum distentionibus similis: nō autē cum præter naturā fuerint disposita: nam possibile aliquando est plurimū distendi thoracē, verū ob coarctationē pulmonis, aut ob aliam causam, parum inspirari aeris externi. Nequaquā igitur ad affectionū omnium spiritalium instrumentorū proportionē, sed solum asperarū arteriarum, inspirationes fiunt. Sufficit autem ad dignoscenda omnia hæc, inspicere quantus aer inspiretur, & quantus per expirationem reddatur. * Etenim contractiones thoracis citra abdominis musculorum cōcitationem, nunquam magnam possunt facere expirationē. Quæ verò illorū etiam impulsu fiunt, quæq; efflationes existunt, magnitudinis sunt opifices. Ut autem ad compositas respirandi difficultates veniamus, cum aliqua sit magna inspiratio, & aliqua velox, sintq; contrariæ his parva & tarda, necessum est quatuor fieri omnes inspirandi compositas difficultates: magnam videlicet & tardam, magnā & velocem, parvam & tardam, parvam & velocem: totidemq; similiter expirationis. In cessationibus verò impossibile est cōpositam respirandi difficultatis speciem fieri, cum una tantum in eis oppositio habeatur, juxta raritatem & densitatem consistens. At verò ipsius moribus mutuo inter se collatis, inspiratione dico cum expiratione, species quædam erunt consonantiæ totius respirationis. Possibile est enim inspirationem fieri magnā, expirationem autem parvam: aut vice versa, parvam inspirationē, & expirationem magnam: aut utraq; parvas, aut utraq; magnas: sic & veloces, aut tardas utraq;: aut alteram velocem, alteram tardam. Quin & inæqualis est aliqua respiratio, quemadmodū & pulsus, tum circa motuū cōjugationes, tum circa motuū

unū. Similiter & ordinata & inordinata fieri respiratione potest, perinde ac pulsus. Et sanè quot differentię inæqualium pulsuum, tum circa unū motū, tum circa plures consistentiū existunt, tot etiam reperiuntur respirationum. Etenim si inspiratio aut exspiratio varietur, sive ex tarditate in velocitatē, sive ex velocitatē in tarditatē motu transeunte, cōpositam sive inæqualem ipsam actionē dicemus. Similiter si cessatio aliqua interceperit, secueritve alterū motum, sive inspirationem, sive expirationē, compositam etiam esse dicemus tunc eam quæ interrupta est, utratandem ea existat. Aliquando autem, licet rarò, est visum in uno eodemq; homine simul intercipi utranq;, nimirum à collecta in arteriis asperis tanta humorum colluviæ, quæ suffocare animal posset, ob pleuritidē perniciosam, aut peripneumoniam, aut deniq; suppurationē non expurgatam. Quemadmodum etiam ob arteriarum lævium obturationes compressionesque, interdū pulsū inæqualitas gignitur. Ob facultatis prætereā imbecillitatem, quæ una vice non potest ipsam actionē perficere, ut in pulsu, sic etiam in respiratione, est quando inæqualitas cernitur: hoc tamen interjecto discrimine, quòd ad ipsam sanè respirationem, quandoquidem actio animalis existit, plurimū ipsa voluntas confert: nihil autem ad pulsuum motus, quòd ijā facultatē vitali proficiantur. Ubi igitur voluntas nihil ad actionem cōducit, ut in pulsū inæqualitatē, eadem prænotio affectionis est in universis hominibus. Ubi verò aut totum, aut plurimum cōfert, ut in ipsa respiratione, ibi amplius mores ægri expendere oportet. Sed quemadmodū differentię facultatū efficientium actiones, tum circa pulsus, tum circa respirationes, differētes prænotiones facit: sic etiam circa ipsam organorū naturā, quædam judicationis alteratio erit. Pulsus enim per læves arterias, respiratio verò tum per asperas, tum per musculolum genus perficitur. Primò siquidem animalis facultas movet musculos ad respirationis generationem: hi thoracem: qui tandem pulmones cōmover, quorū pars asperæ arteriæ existunt, in quas aer qui inspiratur, illabatur. Quemadmodū igitur harum coarctationes totam respirationē sæpe inæqualem reddunt, sic & musculorum aberrantes motus & inordinati. Atq; illarum quidem, ut receptaculorum spiritus: horum vero, ut organorū motionis est noxa. Cæterum coarctationis in arteriis asperis, tumores præter naturam declaraverim reos. Porro affectiones simul & aberrantes motus musculorum existunt, convulsiones, concussiones, atque tremores, ob quos nimirum respiratio inæqualis reddetur. Omnium itaque respirationis inæqualitatum, aut asperarum arteriarū coarctatio, aut thoracis musculorum aberrans motus, aut facultatis ipsam efficientis debilitas, in causa est. Musculorū igitur genus proprium & privatim destinatum respirationibus est præter pulsuum rationē. Prætereā facultatis quidem respiratoriæ arbitriū, voluntati permisum est: vitalis autē facultas, nullū dominū superiorem agnoscit, sed prorsus libera existit. * Quin etiam eximiū quid ad inæqualitatis generationē respira-

Respiratio ordinata, inordinataq;

Respiratio in inæqualitate unde solet accideret

Mores ægri quando expendendi

Pulsus per læves arterias fit. Respiratio fit per asperas arterias, & musculos.

Musculorum affectiones & aberrantes motus.

Respiratio in inæqualitatis causa.

Respiratio est arbitrio subdita. Vitalis facultas est libera.

respira-

*Delirantiū
respiratio
qualis.*

*Dolores orga-
norum respi-
rationis, red-
dunt actionē
ipsā inæqua-
lem inordi-
natamq;.*

*Utilitatem
expleant ex
acerbare do-
lores.*

*Parilitatis
corruptio, cu-
ius sit causa.
Æqualitas
quid.
Ordo quid.*

*Respiratio
nis dolentia
organa, qua-
lis consequat-
ur spiritus.
Delirantiū
spiritus ma-
gnus simul
& rarus.
Inspirationis
magna & ve-
locis causa.*

*Inspiratio
parva simul
& velox.*

Respiratio habebit, præter pulsum rationē: dum videlicet partim quidem à sola proficiscitur facultate animali, partim verò à complexu ipsius cum doloribus. Porro in deliriis superat quidem raritas & magnitudo: apparet autem quædā inæqualitas, & ordinis perturbatio, tum juxta plures respiraciones, tum juxta unam solam: quod nimirum * spectra & phantasmata aliquando plus, aliquando minus, rationem à naturalibus operibus revocent. In doloribus etiam instrumentorum cōtingit totā respiratiōem inæqualem & inordinatā reddi, cum neq; in illis etiam expleatur utilitas juxta actiones singulas: quippe nec velociter, nec dēsem, nec amplius thoracē distendere possunt. Omnia enim hæc ipsis molesta sunt, & præsertim magnitudo: deinde velocitas: postremò autem densitas. Dolentibus namq; minus molestum est per longius tempus, q̄ per brevius moveri. Ceterū dum ob ipsorū motū imminutiones, parū abest quin animal suffocetur, voluntas tunc cogitur ad aliquod tempus majorem facere respiratiōem, & multò velociorē, & priore densiorem. At cum in eiusmodi actionibus utilitas quidē expleatur, animal verò affligatur doloribus (omnia siquidem quæ utilitatem expleant, exacerbant dolores) voluntas rursus à magnitudine & velocitate & densitate detrahit aliquando plus, aliquando minus: utpote quæ cōsiliū inops, nec sistere actionem possit, ob suffocationis periculū, nec reperire aliquam doloris medelā: quare modò ad hoc, modò ad illud transit. Unde tum inæqualitas circa singulas & omnes deinceps respiraciones, tum multiformis illa ordinis perturbatio oritur. Siquidē ex occupatione parilitatis, inæqualitatū omniū, itemq; ordinis perturbationū generatio cōstat. Parilitas quippe cōtinua, æqualitas est: parilitas verò juxta circuitus, est ordo. Ob idq; ubi paritas continua corrumpitur, gignitur inæqualitas: ubi verò juxta circuitus revertens, ordinis perturbatio introducit. Cæterū quāvis multa inæqualitas & ordinis perturbatio in eiusmodi affectionibus incidat, superat tamen id genus respirandi difficultatis, q̄ juxta parvitatē & densitatē cōsistit. Quare rectē videtur dictū, quod ad omnia dolore afflicta organa, quæ cōmoventur circa respiraciones, parvus & densus spiritus consequatur: & juxta eandē rationē in deliriis magnū fieri et rarum spiritū, idq; inæqualiter: nō q̄ autē parvū & densum. Igitur inspiratio magna simul & velox, ob utilitatē urgentem, prompta organa, & integram, aut certē parū remissam, gignitur facultatē. At magna simul & tarda, solis mente motis cōtingit, atq; his non semper. Cōspicua autē etiam hīc est ex prædictis, causæ consideratio: quemadmodū etiam, cū parvā habent inspirationem & tardam ijs, quibus calor intrus est nimis perfrigeratus. Quæ restat adhuc cōjugatio quarta, parvitas erat cum velocitate: fitq; penitus in nulla affectionē simplici, quemadmodū neq; magna simul & tarda, quam aliquando alienatis mente accidere diximus: sequitur tamē ut plurimū, ubi simul dolor & utilitatis incrementū concurrūt. Ad eundē cum prædictis modū etiam in cōjugationibus circa expirationem perferutari ipsas affectiones oportet.

Nam & in his, aut facultatem, aut aliquod organum læsum, aut caloris modum alteratū deprehendimus. Si igitur quis fumosa caliditate in corporibus redundante, expirationem magnam simulq; velocem fieri dicat, nō utiq; errarit. Manifestum est autē quod & facultatē integram tunc esse oportet, & ex organis nullum vitiatū. Similiter autē magnam simul & tardam in quibusdā delirantibus fieri, eodē modo quo inspirationē contigit. Sic parvā simul & tardam fieri ijs, quibus nullum, fumosum recrementū fuerit collectum. Sicuti tum parvam, tum velocem illis, qui cum recrementū fuliginosum collegerint, dolēt etiam aliqua parte earum quæ circa respiratiōem moventur. Ad dissonantias autē deveniendo motū respiratiōis, si tardior quidem & minor quā secundū naturā sit inspiratio, exspiratio autem & velocior & major, dicemus sanē imminutum esse calorē secundū naturā, auctum verò excrementū fumosum. Si cōtrā, inspiratio quidem sit magna & velox, exspiratio autē parva simul & tarda, auctū naturalem calorē dicemus, nullūq; inesse recrementū fumosum. Porro simplices respirandi difficultates, plurium affectionū cōmunes existunt: ob idq; nil certi indicant. Conjugata autem aliis, ad judicium minimē fallax perducunt. Magnitudo siquidem * inspirationis, ipsa per se respirandi quædam difficultas est simplex, verū nullius certæ cognitionis est signū. Nam & urgente utilitate, & læsa fieri mente assolet. At si cum densitate consistat, utilitatem urgentem: si verò cum raritate, deliriū indicat. Similiter & cū per seipsam parvitas nihil certi sit, aut dolore afflicta particulam aliquā, aut exolutam utilitatem ostendit: at densitati juncta, dolorem: sicuti raritati, utilitatis exolutionem portendit. Per se etiam nec rara quidem, nec densa firmi quicquam ostendunt. At densa simul & magna, utilitatis augmentum indicat: densa verò simul & parva, organi alicuius quod inter respirandum movetur, dolorem. Rara similiter, si cum magnitudine quidem coeat, deliria: si verò cum parvitate, perfrigerationes ostēdit. Atq; ob id sanē omnium compositarū respirandi difficultatum hæc quatuor ultimæ conjugationes sunt utilissimæ. Fiunt autē, differentiis actionū juxta magnitudinem & parvitatē, ad cessationū differentias permixtis. Cæterū ex cessationum oppositione (quæ unica tantum est penes raritatem & densitatem) aliis differentiis permixta, quatuor etiam oriuntur conjugationes. Prima quidem est densa & velox: secunda, densa simul & tarda: tertia, rara & velox: quarta deniq; rara simul & tarda. Nullum tamen certæ cognitionis signum simpliciter & necessariō exhibent, quemadmodū priores quatuor: quare his ad prænotiones neutiquā indigemus, cum nimirū si qd significēt, id jam distinctū per priores illas habeamus. Porro si q̄s agrotantis facultatis respiratoriæ, omnisq; facultatis animalis, præcipuē refrigeratæ, propria signa cupit habere, is alarū nasi motū habebit, & omniū musculorū, q̄ circa scapulas sūt, actionē, & cōfertim factā cōcidentiā thoracis. Quādo n. hic debilius q̄ expediat movetur, circa respiraciones qdē, spiritus ductū nasi alæ adjuvant: circa expirationes autem

*Expiratio
nis magni
velocis
causa.*

*Expiratio
magna
& tarda
delirantiū
accidit.*

*Expiratio
parva
& tarda
delirantiū
accidit.*

*Expiratio
parva
& velox
delirantiū
accidit.*

*Dissonantia
motuum
respirandi
causa.*

*Respiratio
simpliciter
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

*Respiratio
difficilis
dicitur
si indicat
conjugationem
autem
judicium
nimis
perducat.*

autē, thorax confertim delabitur, non autē paulatim demittitur. Etenim cōcidentia differt a demissione: quod illa quidem, facultate ægrotante fiat: hæc autem integra & valente eadem. Etenim septum transversum thoracis tensionē adjuvant, solumq; illam per expirationes resolvit, nōnihil etiam opitulantis intercostalibus musculis, per quorum actiones ipsi fiunt efflatus. Cum autē duplex existat cessatio in respirationibus, una ante inspirationē, altera ante expirationem: uter sanē motus offendatur, cessationē præcedentem, ab eo quod secundum naturam habet, immutat. Duplici igitur existente in motibus offensione, ac duplici item in cessationibus: utilitatis quidē defectus, diuturni temporis semper cessationes efficiunt: redundantia verò, brevioris. Itaq; abundantia caloris secundum naturam, reddēs inspirationem magnā, statim etiam præcedentē ipsam cessationem, brevis temporis efficit. Abundantia verò caloris præter naturā, fuliginosiq; ut expirationem magnā, sic etiam cessationem præcedentē reddit breviorē. Quare magnus & densus penitus fit spiritus, ubi caliditatis genus redundat. Sic etiam si sublatā utilitas sit, ob caloris videlicet imminutionem, ubi quidem naturalis calor imminutus parvā reddit inspirationem, etiam longa cessatio præcedit. Ubi verò calor præter naturam deperditus fuerit, parva quidem exspiratio, longa verò ante ipsam cessatio accidit. Sæpenumero verò calor præter naturam est auctus, imminuto calore secundum naturam. Atq; ita cessatio ante expirationem * brevis temporis redditur: altera verò ante inspirationem * longioris. Utrum enim ex motibus ipsa urgebit utilitas, is præcedentē cessationem cunctari non permittit.

GALENI PERGAMENI
de difficultate respirationis, liber
secundus.

Proprium itaq; desipientiæ symptoma est, magnam & raram, hoc est, per longū tempus, respirationē facere: videnturq; ambæ hæ, veluti obliuioſæ actionis affectus esse. Nam immoderatam facere spiritus attractionem, rursumq; immodicā quietem, eius est, qui nec quando desinere ab actione oporteat, novit, nec quando rursus incipere: sed in utrisque mensuram egreditur, ob convenientis ignorationem. Cum igitur respiratio animale opus sit, desipientes autem habeant oblāsam rationem, obliuiores tum circa actiones, tum circa ipsarum interstitia fiunt. Quamobrem & actiones & quietes in multo facientes tempore, hoc modo magnitudinem & raritatem circa totam respirationem efficiunt: id quod Hippocrates cum in aliis locis, tum etiam in prænotionibus, sensisse videtur, ubi ait: Spiritus magnus & per multum tempus, desipientiam significat. Quo sanē oraculo, magnum & raram spiritum desipientiæ signum esse contendit: non tamen necessum esse, ut is qui delirat, magnam simul & raram faciat inspirationem. Nec enim inseparabile magnum & raram spiritū, sed proprium esse delirū diximus,

Quicquid autem proprium existit, haud continuo est etiam inseparabile. Esse quippe geometram, propriū hominis est, nō autem inseparabile, quemadmodum rationale, existit. Licet itaq; discere ex doctrina Hippocratis, omnibus quidem deliriis magnū & raram spiritū juxta propriam ipsorum rationē comitem esse: nō autem deliris omnibus, sed illis tantū, qui non per aliam quandam affectionē delirio majorē, habent respirationem aliter alteratam. Hippocrates siquidem aliquando magnū & raram spiritū fieri deliris novit, aliquando verò ipsius contrarium: interdum in eodem homine utrunq; vicissim incidere. Porro qui in mœrore & luctu suspirant, duplici de causā post longum tempus inspirationem magnā efficiunt: tum quod circa curam, ob quam tristantur, conversi, per multas ex ordine actione respirarint minus & rarius, ob idque tandem cogatur uno actu totam semel explere atq; reparare jacturā: tum amplius etiā, propheta q; per mœrores, & spiritus & calor intus moveatur, qui quidē homini facessens negociū, eum ad majorē expirationē compellit. At in affectionibus delirantiū, necessitas quidem magnæ respirationis à prima quidem causā, est per similes: à secunda verò nō item, cum nō intro magis q; extra his calor moveatur, nisi alia fortē quæda accessio fiat. Differunt autem & febris ratione deliri ab ijs, qui aliās aliquo mœrore cruciantur. Igitur revocatis in memoriam quæ in primo libro sunt tradita, si à solo delirio pervertatur respirationis cōcinnitas, omnino erit spiritus magnus simul & rarus. Si verò à solo dolore, parvus & densus. At si conspirent ambo, & dolor præcelluerit vehemēter, obscura omnino alteratio ex delirio erit. Sin autē moderatus fuerit dolor, aut plus quidem à dolore, minus verò à delirio respirationem alteri cōtinget, aut vice versa, aut æqualiter juxta utrunq; Sic etiam si cum alia quapiam affectione deliriū cōplexum sit, respirationis speciem interdū aliam efficiet, prout superat, aut superatur, aut æqua potentia est præditum: aut nunc quidem (si ita contingat) superat, rursus alio morbi tempore superabitur. At verò in peripnevmonicis, pleuriticis, & in angina, ac breviter in omnibus quibus aliquid circa thoracem aut pulmonem, aut etiam in ventre inferiore sit phlegmone (hoc est, tumore dolente, duro & calido) obſectum, parvus omnino & densus spiritus sequitur: qualis etiā hydropicos, & eos qui se aut potu aut cibis expleverūt intemperantius, necnō prægnantes, ventre prominulo præditos, anhelosos, purulentos, atque eos denique quibus dorſi spina contorta est comitatur. Verum Hippocrates de his quidem respirandi difficultatibus, quæ sunt vel idiotis notissimæ nihil memoriæ prodidit. Porro in pleuritide quatuor mala semper se ostendūt symptomata: videlicet febris ardens, assiduus dolor, tussis, ac difficilis respiratio, parva nempe simul & densa. Splen est viscus minimè obnoxium dolori. Septum transversum est principalissimum respiratoriæ organi.

Proprium omnino non statim est etiam inseparabile

Suspirantes ex luctu, cur post longum tempus inspirationem magnam efficiunt.

Respiratio delirantiū simul & dolentium qualis.

Phlegmone quid. Spiritus parvus & densus quæ comitatur dispositiones. Pleuritidis symptomata sunt, febris ardens, assiduus dolor, tussis, ac difficilis respiratio, parva nempe simul & densa. Splen est viscus minimè obnoxium dolori.

Septum transversum est principalissimum respiratoriæ organi.

respiratio.

respirationis organum, ipsius tumor cōprimat, nisi maximus sit, & caput illius occupet, haud quidem sufficiens est ut respirandi difficultatem ex delirio inductam superet, spiritū parvum & densum reddens. Quandoquidem opus est dolorem ipsum consistere circa aliquam partē, quę iuxta respirationem movetur: aut aliquod ex organis respiratoriis coarctari, ut parvus & densus spiritus fiat.

GALENI PERGAMENI

de difficultate respirationis, liber
tertius.

*Respiratio-
nis difficilis
quatuor con-
iugationes.*

*Methodicē
disiuris
qua sint con-
sideranda.*

*Respiratio-
nis differen-
tias omnes
in tribus op-
positionibus
comprehēdi.*

Rectē autem Hippocrates rationaliq; divi-
sione usus, sexto populariū morborum li-
bro duas oppositiones difficilis respiratio-
nis inter se complicans, eam scilicet quā secun-
dum magnitudinē & parvitatē est, illi quę secun-
dum raritatem & densitatē, quatuor in univer-
sum fecit cōiugationes: unam videlicet, magnā
& raram: secundam, parvam & raram: tertiam,
magnā simul & densam: quartā, parvam & den-
sam. Quibus etiam adjecit ibidem, & reliquas
duas cōiugationes, quę ex collatione inspiratio-
nis cum expiratione oriuntur: ut puta magnam
inspirationē & expirationē parvam. Inspiratio-
nem exiguam, & magnā expirationē. Duę siqui-
dem oppositiones inter se complicatę, quatuor
cōiugationes efficiūt. Porro qui methodicē ve-
lit dividere, in primis expendat oportet, qualis
naturę existat, quod dividendū venit. Quod si
simplex esse videatur, quā juxta substantię ipsius
rationē sunt, quot sint, & quę, ac qualia, conside-
randum. Si verō compositū, utranq; aut singu-
las eius partes dividere expedit: totum autē, ex
modo compositionis. Igitur dictio Hippocratis
ita habet: Spiritus parvi densi, magni rari, parvi
rari, magni densi, extra magnus, intra parvus, in-
tra magnus, extra parvus, alius extendens, alius
urgens, dupla intra revocatio veluti super inspi-
rantibus, calidus, frigidus. Quod itaque ex spiri-
tus intrā & extrā meatu, totius respirationis ac-
tio composita sit, quodq; altera eius pars inspi-
ratio, altera exspiratio appelletur, ignorat nemo.
Quod verō nullius alterius rei quā motus, pro-
pria sint velocitas atque tarditas, jam est a nobis
expositū. Ceterū magnitudo & parvitas, ut mo-
tui propria sunt, sic omnino inseparabilia exi-
stunt ab eo, quod per localem distantiam fertur:
ob idq; juxta utranq; respirationis partem duę
differentes oppositiones erunt: altera juxta ve-
locitatem ac tarditatē, ac juxta magnitudinem
& parvitatem. Est autem & alia oppositio juxta
densitatem & raritatem consistens: quā quidem
nō tanquā motui, sed tanquā alicui rei ex ipsis di-
stantiis conflata, inest respirationi. Quare in his
tribus oppositionū generibus omnes respiratio-
nis differentias esse necesse est. In velocitate qui-
dem & tarditate, propterea quod hęc propria,
& ab omni motu inseparabilia sint. In magnitu-
dine & parvitate, quod per distantiam *organa
respirationis moveantur. Densitas autem & ra-
ritas (quā tertia oppositio est) neutrius propria-
rum ac primarū respirationis partiū proprium

aut inseparabile existit, verū totius respiratio-
nis pars sit per accidens: quandoquidem ex duo-
bus contrariis motibus quietē distinctis constat.
Hęc itaq; sunt primę differentię totius respira-
tionis, Ceterū cum respiratio res sit, quā & fa-
cere aliquid, & pati possit, aliud utiq; fuerit dif-
ferentiarum genus in ipsa, utraq; videlicet parte
æqualiter inæqualiterve perfectā: aliudq; rursus
ipsius totius ut compositę, partibus inter se mu-
tuō collatis. Hęc cum ita habeant, sciendum pri-
mas quatuor differentias difficilis respirationis,
in proposita Hippocratis dictione assignatas, to-
tius respirationis esse, cum ad neutram eius par-
tem raritas densitasve pertineat. Similiter etiam
sequentes duas: nem & in ijs duę totius respira-
tionis partes mutuō inter se conferuntur. quę
verō deinceps alię duę sequuntur, ubi ait: Alius
extendens, aliusurgens (quibus tardus & velox
pulsus significatur) eas sanē alterius ipsius respi-
rationis partis proprias, maximeque substantia-
les, putandū est. Tarditas nanque & velocitas ab
omni motu inseparabilia sunt. Quod postea de-
inceps habetur. Dupla intrō revocatio, veluti su-
per inspirantibus, inæqualem inspirationē osten-
dit. Inquirenda est autē eadem oppositio & in ex-
piratione, quam ego omissam puto a transcri-
bentibus, potius quā ab ipso Hippocrate. Ad-
didit præterea & optimē differētiis prædictis, ca-
lidum frigidumq; spiritū. Quanquā certē in Præ-
notionū libro, horum trium, densi, & magni, &
frigidi tantū spiritus meminit, tali dictione u-
tens: Spiritus densus existens, dolorem, aut calo-
ris effervescentiā in locis supra septum transver-
sum significat. Magnus autē & per multum tem-
pus, desipientiam ostendit. Frigidus verō ex na-
ribus & ore prodiens, valde jam perniciosus est.
Reliquas autem differentias subtrahit, tum pro-
pter brevitatē veteribus familiarissimā tum pro-
pter altitudinem animi, quę ipsimet erat genuina
Hippocrati. Demōstratū enim a nobis est, q̄ gra-
vis sit semper hic vir, ut qui ea quę aliis medicis
nota sunt, prætereant, veluti quę a nemine eorum
qui artem ingenuē exercent, ignorari quæant: quę
verō talibus sunt ignota, omnia diligenter, si
mulq; perspicuē exponat. Merito itaq; differen-
tias dēsitatis, ut quę medicis esse ignotę non
possint, una summa comprehensas exposuit, di-
cens: Spiritus densus, dolorem, aut maximū in-
cendium significat, in locis supra septum trans-
versum: tanquā sanē possumus nos intelligere, q̄
cum parvitate quidem, dolorem significet: cum
magnitudine verō, incendiū inexpugnabile par-
tium supra diaphragma, quod immodicę calidi-
tates partiū quę infra id sunt, respirationē in ma-
gnitudinem & densitatem augere nō possint. In
pleuritide itaq; & peripnevmoniis, anginisq; &
orthopnœis, densus sit ac parvus spiritus. * Imō
verō etiam si pleuritidis nō adsit, solus autem do-
lor costas infestet, spiritus densus & parvus red-
ditur. In universum autē, sive tumor quis sit pre-
mens coarctansq; quodcunq; respiratoriū orga-
num, sive dolor circa quamecunq; partem, sic ap-
propinquante respiratoriis organis, ut ipsis mo-
tis simul moveatur, densus ac parvus ipse spiri-
tus erit. At calore maximo in respiratoriis orga-
nis coa-

*Respira-
tio ter-
nam si-
ferenti-*

*Spiri-
tus
gigas
naris
diens
dum p
cosus
Breui-
fuisse
bus fa-
risim
Hippo-
gravi-*

*Spiri-
tus q̄
gnifice*

*Spiri-
tus &
sus in
bus ap-
bus ac*

nis coacervato, spiritus densus simul & magnus
 agatur: id quod indies in omnibus exurentibus
 febribus est conspicuū. Quare ignorandum non
 est Hippocratem, densum quidem & parvū, do-
 lori: spiritū autem densum & magnū, incendio
 caliditatis tribuisse. Quemadmodū enim dolen-
 tibus cruribus, progredi multū non possumus.
 eodem modo ubi aliquod organū ex iis quæ in-
 ter respirandum moventur, doluerit, parum re-
 spirare cogimur, & citius desistere cupimus: q
 sic citius a dolore immunes reddamur. Cæterū
 quanto citius quā oportuit, motus respiratio-
 nis cohibetur, tantō ipsum animal defectuosius
 est inspiratione recreatum. Quemadmodum
 igitur si quis pauciores cibos, quā sit ex usu,
 accipiat, hic statim aliorū ciborū opus habebit:
 sic si quis minus quā expediens sit, inspirave-
 rit, is citius inspiratione indigebit: qua ex occa-
 sione spiritū densari cōtingit: id quod etiam sen-
 tiens Hippocrates in libro de Victus ratione in 20
 acutis morbis, ait: Sputū intrā retentum, prohi-
 bet quidem spiritū intrō ferri, cogitq; eum citō
 expirari. Porro juxta copiam eius quæ inspira-
 tur, substantiæ, oportet magnitudinē ipsius re-
 spirationis metiri. Reliquit autem Hippocrates
 exemplum difficilis respirationis ortæ a dolore,
 quod multis locis jam ipse dixerit, actiones or-
 ganorū a dolore impediri, quodq; illius cognitio
 oppidō quā facilis sit. Nec verō tantū a dolore
 & retento spiritu, oriri densitas respirationis po-
 test, sed vel maximē etiā ab incendio febrilis cali-
 ditatis: cujus quidem est multū dēsumque spiri-
 tum reddere. Magnus spiritus, quantitate circa
 singulas judicatur respirationes: multum verō,
 possibile est aliquando ex multis parvis coacer-
 vari: ut videre est in pleuriticis, qui cum magnū
 quidem spiritū semel ducere ob dolorē non pos-
 sint, quamvis aëre largiori ob febrim opus ha-
 beant, continuitate tamen actionis, æqualē mul-
 titudinem spiritus magnis respirationibus colli-
 gunt. Quod enim paucæ magnæ, hoc multæ par-
 væ præstant. Similiter in peripneumonicis mul-
 to est opus spiritu, verū ob coarctationē loco-
 rum parum inspiratur: quare densitas iacturam
 parvæ inspirationis restaurat. Quod autē in hor-
 thopnoëis parvus & densus ob coarctationem
 fiat spiritus, haud scio an quisquam ignoret. Cæ-
 terum omnes qui ob talem coarctationem suffi-
 cienter inspirare nō possunt, stertorosam faciunt
 respirationem, & in suffocationis discrimen ve-
 niunt, si decumbant: ob id tum totum thoracē,
 rum collum, eos rectū habere oportet, cum non
 parvum auxiliū ipsis ex huiusmodi figura acce-
 dat. Quippe ampliora simulq; longiora sic fiunt
 omnia respirationis organa, partim quidem per
 rectam figuram in directam extenta, pattim ve-
 rō minus in sese cōcidere prohibita. Jam verō re-
 lecta etiam parva simul & rara respiratione, Hip-
 pocrates frigida meminit, quod nimirū non alia
 sit parva simul & rara, alia verō frigida. Nam
 cum magna & densa ex immoderato calore col-
 lecto in organis respiratoriis gignatur, necessa-
 riō certē parva & rara (quæ illius contraria exi-
 stit) his ipsis organis perfrigeratis orietur. Siqui-
 dem calida respiratio, cujus similiter meminit,

eadem est cum densa & magna, sub qua videli-
 cet cōprehenditur. Etenim spiritus frigidus, om-
 nino parvus & rarus est: densum autē & magnū
 * indicare incendiū organorū respirationis, mi-
 nimē sanē quis dixerit, nisi & ipse etiam effletur
 calidus. Solam verō frigidam expirationem dixit
 esse perniciosam Hippocrates, mortisq; nunciā,
 quod perfrigerari respiratoriis organis planē sit
 perniciosum, cum nimirū inter ea sit cor situm,
 infiri caloris fons & principiū. At vehemens il-
 lorum caliditas, aut dolor, aut desipientia, nō o-
 mnino sunt perniciofa, licet nō sint extra pericu-
 lum. Nam si facilis respiratio valde magnā vim
 ad salutem habere putanda est, in omnibus acu-
 tis morbis, qui cum febribus sunt, & intra qua-
 draginta dies judicantur (quale documentū no-
 bis reliquit Hippocrates) utiq; respirationes dif-
 ficiles minimē vacabunt periculo. Verū quæ
 jam morientibus accidunt, ut videlicet ipsa expi-
 ratio frigida, ea nullū magnū momentū in præ-
 notationibus habent. Est enim bonorū medicorū
 opus, non quæ jam idiotis apparent, prælagire,
 sed quæ & ipsos latent, & cum nihil mali æger ha-
 bere putetur, cernuntur. At frigida spirationis
 Hippocrates meminit, ut omnes respirandi diffi-
 cultates complecteretur, & quod etiam magnæ
 simul & densæ ipsa opposita existeret. Porro in
 Prænotationum libro nihil de inæquali respiratio-
 nis difficultate scripsit nobis Hippocrates, quan-
 doquidem propositū illi erat in prænotationibus
 solum ea quæ verē acutorum morborū propria
 sunt, recensere: quæ verō diuturnis propria es-
 sent relinquere. Quare rationabiliter etiam illic
 inæqualem respirationis difficultatem, ex alio
 morborū genere, convulsorio videlicet, proce-
 dentem, omisit. Acuti autē sunt morbi, qui om-
 nino cum febribus cōtinentibus fiunt: ut pleuri-
 tis, peripnevmonia, phrenitis, ac febris æstuans.
 Nec meminit in prænotationibus de iis respiran-
 di difficultatibus, in quibus aut sola inspiratio,
 aut sola expiratio est magna: sicuti nec velocis,
 nec tardæ respirationis: quod ad quinq; jam di-
 ctas difficilis respirationis differētiās hæ omnes
 reduci possint. Jam verō expiratio rara simul &
 magna (id quod etiam docuit Hippocrates) con-
 tinuarum oscitationum & signū & causa medi-
 catoria existit. Mam cum oscitatio continua si-
 ob vaporosum quendam crassumq; spiritū in ge-
 nere musculorū contentum, certē expiratio quæ
 rara est & magna, erit quidē signū, ut affectionis
 in contrarium mutata: causa verō medicatoria,
 quod contrariorum sint contraria remedia. Ete-
 nim per talem expirationē spiritus diutius cohi-
 bitus, qua ratione singultus sanat, videlicet alie-
 na evacuando, eadem etiam mederi oscitationi-
 bus poterit. Quemadmodū autem ipsa detentio
 spiritus superflua excernere potest, si respiratio
 continua, ventilare simul potest & excalfacere
 perfrigerata: diffens eorum & signū, & causa fa-
 lubris. Juxta hanc igitur rationē etiam in secun-
 do Morborū populariū consuluit Hippocrates,
 ut iis qui perfrigerati essent, excandescētiā in-
 duceremus, & revocandi calor, & sanguinis in
 vasa subter cuticulam colligendi gratia: tanq̃ sa-
 nē inatū calorem excitare queat excandescētia,

Expiratio frī-
 gida quæ
 mortis nū-
 ciū
 est infiri
 caloris fons
 et principiū.

Spiratio faci-
 lis, ad salutē
 magnā & im-
 obinet.

Medici opti-
 mi munus
 quod sit.

Acuti morbi
 sunt qui om-
 nino cum fe-
 bribus conti-
 nentibus fiunt.
 Expiratio ra-
 ra simul &
 magna conti-
 nuarum osci-
 tationum si-
 gnum atque
 medela exi-
 stit.

Oscitationis
 continue
 causa.

Contrariorū
 sunt contra-
 ria remedia.

Spiritus diu
 cohibitus, sa-
 nat singultū.

Respiratio cō-
 tinua & conti-
 nua simul po-
 test & excal-
 facere respi-
 rata.

Refrigerati
 cur sint exci-
 tandi ad irā.

Excandescē-
 tia innatū
 calorem revo-
 cat, & densi-
 orem reddit.

Respiratio cō-
 tinua & conti-
 nua simul po-
 test & excal-
 facere respi-
 rata.

Refrigerati
 cur sint exci-
 tandi ad irā.

Excandescē-
 tia innatū
 calorem revo-
 cat, & densi-
 orem reddit.

Spiritus frigidus ore & naribus effluens, in acutis tantum morbis est perniciosus admodum.

Respiratione non omnino perisse per interceptiones spirituum quæ ratione cognosci possit.

Anhelosa respiratione unde proficiatur.

Spiritus parvus & densus quando ducatur.

Anhelatio. Sublimis spiritus.

Spiritus obscurus, quibus sit malus. Spiritus interceptione steriles ac vi duas frequentissime corripit.

Pulsus et respirationis non esse eundem usum, quibus suaderi possit rationibus.

Pulsu privatas particulas, non magnopere lades.

quæ quidem quod densiorē etiam omnino reddat respirationem, nemo ignorat. Utemur itaque ipsa in refrigeratis, decoloratis, gracilibusque, non tamen perpetuò, sed ex intervallis, & opportunis temporibus, ne videlicet facultatē valdē lædamus. Verūmenimverò quod Hippocrates ait, spiritū frigidum ex naribus & ore prodeuntem, valdē perniciosum existere, id in morbis acutis intelligendum est. In aliis autem morbis, qui citra febrem consistunt, sæpe frigiditas totum animalis habitū apprehendit: & accidit quidem neque his extrā periculum, nō tamen penitus perniciofa. Ex his enim est strangulatio uteri, omnesque spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assiduē, viduis præsertim, accidunt: rarò autē aliquando & viris. In huiusmodi enim omnibus affectionibus, præ multitudine materiæ frigida, innatus calor opprimitur, ad similitudinē flammæ, quæ suffocatur multis humidis lignis obruta. Quare etiam accendere quandoque possibile est hanc, ubi materiam exuperaverit. Aliquando tamen consumpta materia, necessario etiam & ipsa extinguitur: * quare in iis qui per acutos morbos sic expirant, nulla spes salutis relinquitur.

Quod autē in spiritus interceptionibus non omnino respiratio perierit, licet minimus rarissimusque spiritus per illas trahatur, hinc cognosces manifestissimē, quod si aut pilū, aut tenuissimam lanā, ægri præter nasaribus, illam moveri percipies. Atque in affectibus sanē id genus omnibus spiritus densus, causa simulque signū salubre existit: quemadmodū continuationū, expirationis ratio rara simul & magna. At verò anhelosa respiratione, quæ & densum spiritum facit, & thoracem nimis distendit, oritur aliquando quidem in affectibus multa inspiratione indigentibus. Fit tamen interdū à cursu, aut ab alio quovis exercitio improbo. Eiusmodi etiam spiritus accidit in omnibus ardentibus febribus: & quando obturatio, aut compressio, aut coarctatio, instrumenta respirationis infestat. In universum autē, quando aut tumor, aut dolor quispia, in partibus iuxta ilia constitit, parvus & densus necessario spiritus ducitur. Porro spiritū impensē densatū, anhelationē consuevit vocare Hippocrates: quē admodū & sublimem eum, qui parvus simul & densus fuerit, qualis in anginis percipitur. At obscurum spiritū ait esse tabescentibus malū, sicuti & nō parientibus. Etenim nō parientes mulieres (sunt autē hæ omnino quæ nō probè purgantur) maximē à spiritus interceptionibus apprehenduntur: perinde ut illæ, quæ diu sunt orbatae suis viris. Quare spiritus qui conspicui & insignes non sunt, eos obscuros nominat. Ac sermo de respiratione difficili suum jam hinc finem sortiatur.

GALENI PERGAMENI de pulsum usu, liber unus.



Non esse eundem usum pulsus & respirationis, cōtrā quā medici existimāt, certē rationibus his quispia cōtendere possit. Primū: nam respirationem si cui adimas, ilicō mortē afferes. At pulsu si complures particulas privas, nō magnopere lades. Quippe si vel arterias quæ

per inguina descendūt ad crura, vel quæ per alas ferūtur ad manus, laqueo cōplecti velis, universas quidem, quæ in artubus sunt, arterias pulsu privabis: nō tamē artubus ipsis aut motū adimēs voluntariū, aut sensum. At si nervos funiculo religes, immotas prorsus, insensibilesque extemplo reddes particulas. Debebāt igitur & arteriæ, ubi similiter nervis essent affectæ, quod singulis membris antea cōtulissent utile, id ipsum protinus præstare desistere. Ad hæc si ipsas quæ in collo sunt arterias vinculo exceperis, nullā evidentem noxā animali attuleris: tamen si cor cum cerebro, princeps scilicet instrumentū actionū vitalium, cum principe animalū, cōnectant. Si igitur cum sint læsæ arteriæ, nihil tamen efficiunt, cōstat utique & cum valentes sunt, nihil eas conferre. * At si objiciamus illi qui arteriarum usum sic negligit, nos maximē prælagire ex pulsu: id minimē quidem fieri ut ex causis id genus, quæ plurimum habeant momenti, sed ut ex opportunis signis, responsum dabit: ut si quis mortē ex incurvis unguibus nigricantibusque conjectet. Cor si quidem princeps viscus existere, ex quo omnes arteriæ oriūtur: ac proinde eas eundem cum illo motū servare, offendi que similiter, atque ita nō exigua rei indices esse posse. At major medicorū atque philosophorū pars, inde eundē utriusque motus esse usum existimant, quod uterque, similes iisdem ex causis mutationes accipiat. Nam & qui exercitatur, & qui in balneo lavatur, & qui aliter quovis modo excalfiunt, eorū nō modo respirationem celeriorē frequentiorēque, ac majorē cōtueri licet, sed pulsus etiam pari modo mutatos. Præterea qui algent, aliterve quolibet modo perfrigerati sunt, horum sicuti respiratio rarior, tardior, ac minor visitur, ita & pulsus. Similiter qui urentibus prehensi sunt febribus, ut maximē iis & celerrimē densissimēque respirant, sic etiam maximē, densissimē, & velocissimē, iis pulsant arteriæ. Quod si ab immodica repletionē pulsus sentiūtur majores, respirationes minores, ne id quidem sermonem hunc reddat ambigū. Quippe minorē tam respiratū quā pulsum idcirco habent, quod angustus transversus eorum septo superfit locus. Cæterū quantō minorē, tantō hunc & crebriorē habent: scilicet respirandi parvitatem, assiduitatis eius ope pensantes. Ideoque tantundem minor simul & frequentior respiratio potest, quantū minor simul atque infrequentior. Dicimus autem hoc loco rariorē pulsum eum qui comestioni succedit, non utique cum eo qui comestionem præcedit comparantes (quippe quo est frequentior) sed ad respirationis speciem referentes. Igitur si respiratio pari cum pulsu modo, iisdem ex causis mutatur, non tamen parem noxam, cum perit, affert, licebit utique hinc etiam colligere opposita: nempe tum ambos motus à natura eiusdem usus gratia esse datos, tum non eiusdem: id quod est impossibile. Itaque nobis investigandum est, qua parte altera rationum claudicet, ipso respirationis usu pro norma nobis proposito. Qui quidem duplex existit: nempe alter qui major est, insiti caloris custodia: alter qui minor, animalis spiritus nutritio: in quorum utroque ex attracto per nares spiritu accedere

Necesse interce partes quæsi tum morbi & j

Prælag ex pul sum.

Cor ej riarum gitem Pulsu respiratione unde mus e eundem usum.

Respiratione pulsum ex causatione les recu

Replet immodi dunt par quidem iores tiones minores crebrior

Respiratione usum duplex insiti cal custodia ter quæ spiritus nutritio

um accedere cerebro utilitatem dicimus. Id quod vi-
 spira- deri possit in causa, ut carotidibus arteriis (quæ
 er na- sanguine calido & halituoso plenæ, cum perre-
 p- ptant ad cerebrum, antequam duram eius mem-
 branam transierint, juxta ipsius cerebri basim
 rmen- multis ac variis plexibus involutæ, admirandum
 n fieri quoddam rete conficiunt: ut quemadmodum
 rudi- in vasorum testium revolutionibus semen, atq;
 basim in voluminibus intestinorum chylus, ita in eo
 i con- sanguis ille diutius hærens, perfectissimè elabo-
 10 retur, adsitq; simul animali qui in cerebro est spi-
 ritui, alimentum copiosum) vinculo exceptis,
 per diem integrum animal sine noxa perduret.
 Quamquam certè si cogatur tale animal curre-
 re, diu quidem id facit probè, postea verò fati-
 um a- scit, atq; elanguescit: cum nimirum ille animalis
 em, ex spiritus, quo pleni sunt ventriculi cerebri, assi-
 ri per- duè nutriri postulet, absumaturque per volunta-
 ras, rias, præcipueq; violentas motiones. Cæterum
 si animal quiescat, quavis commercium cum cor-
 20 de sit interceptum cerebro, satisfacere tamen ei
 diu textus ille reticularis potest, ceu animali spi-
 ritu in motum voluntarium minimè tum con-
 sumpto. Mirum autem esse non debet, si alicuius
 partis haud omnino pereat caliditas, etiam si ar-
 teriæ illius vinculo constringantur. Nam cum
 totum corpus sit sibi conspirabile & fluxile, cer-
 te si non per arterias, at per alia, & præcipue per
 venas, propter eum qui est de una in alteram
 transitum, in omnem particulam deferetur à cor-
 30 de caloris aliquid. Nec verò simile est, aut infiri
 caloris principium pati, aut aliquid eorum quæ
 ab illo calorem accipiunt. Id si quidè semper fer-
 vere est opus, ut quod tum cæteris pulsandi vim
 præstet, tum ea calfaciat: his autem ad salutem est
 satis, si non omnino sint frigida. Nec mirari præ-
 terea debemus, si principium ipsum, ubi respiratio
 ne privatur, plus quam cætera noxæ contrahit:
 quippe sub cucurbitulis medicinalibus flamma
 illico exstinguitur. Jam verò si cor nudatū refrige-
 40 res, celerrimè perit animal: sin calidū serves, pati-
 tur nihil. Quod si corde refrigerato, ac propte-
 rea animali jam mortuo, in alterutrū ventriculo-
 rum eius, & præcipue in sinistrum, inseras digi-
 tum, magnū inibi calorem deprehendes, longeq;
 majorem quam in aliis sit partibus, dummodo
 pro naturæ modo se habeant. Siquidem ut par
 hæc caloris portio cordi est minima, sic reliquis
 partibus omnino est magna. Proinde ubi quod
 pro naturæ modo est, non servatur, cordis qui-
 50 dem calor, qui veluti flamma est, perit: reliquorū
 calor longo tempore durat. Porro illi sola respi-
 ratio calorem tuetur. Aliis autem partibus du-
 plex eius custodia est: pulsus videlicet, qui veluti
 quædam est respiratio: & quod ex abundantiore
 naturæ gratia accedit, q; à corde confluit. Quod
 autè non solum per arterias, sed etiam per venas
 confluat à corde calor, hinc colligere licet, quod
 quibus eæ vinculo exceptæ fuerunt, ob vulnera,
 partes in quas ferebantur, fuerint perfrigeratæ.
 Cum igitur nihil jam adversari videatur, quo mi-
 nus unus respirationis & pulsuum usus, finisque
 sit, facile promptumq; collectu arbitror, caloris
 in qua; parte custodiendi gratia pulsus condi-
 tum esse: atq; ita, quod ex respiratione uni præ-

statum cordi, id ex pulsu calori illi qui in toto est
 animali, accedere: communem verò utriusq; esse,
 & animalis spiritus nutritionem: magis tamen
 arteriarum propriam. Quoniam igitur in iis quæ
 de respirationis usu tradidimus, nobis monstra-
 tum est, nativū calorem per inspirationē quidem
 refrigerari: per expirationē autem purgari, fumi-
 do scilicet excremento excusso: ambas verò actio-
 nes ad eius custodiam conferre aliquid utile: pa-
 ter arbitror, quod in pulsu etiam idem dicendū
 erit: nempe in diastole arteriæ, substantiā quam-
 piā attrahi: in systole, quod ex humorū deustio-
 ne in toto animali contractum est, veluti fumi-
 da superfluitas, expelli. Verum quemadmodū &
 fauces, & pulmones, & universum pectus, dum
 recipiunt spiritū dilatantur: itidem arterias, quo
 trahunt tempore, dilatari oportet, non quo spi-
 ritum reddunt, ut existimavit Archigenes. Quin
 & quies illa quæ arteriarū contractioni succedit,
 20 cum multò major sit ea quæ dilatationem sequi-
 tur, sicuti quæ inspirationem præcedit, ea quæ su-
 pervenit illi: ostendit sanè, etiam secundum hoc
 esse quandam similitudinem inter ipsam respira-
 tionem & pulsus. Cuiusmodi enim instrumen-
 tis spiritus res inspiratio est, eiusmodi arteriis di-
 latatio existit. Et cuiusmodi est illis emissio spi-
 ritus, eiusmodi est arteriis contractio. Cujus qui-
 dem duplicis & compositi arteriarum motus,
 quæ nominamus pulsus, autor & origo est cor.
 30 Cæterum cum vis illa, unde cor contrahitur di-
 lataturq; in omnes arterias per tunicas earū in-
 fluens, eas cogat aperiatq;, quemadmodū ipsum
 cor: utiq; sicut illud dum dilatatur, ea quæ oscu-
 lis suis appropinquant, trahit: cum contrahitur,
 expellit: sic & arteriæ, cum se aperiunt, ad se un-
 diq; trahunt, cum contrahuntur, in omnem par-
 tem expellunt, videlicet per universos meatūs,
 quibus in intestina, ventriculum, universam cu-
 tim, atque adeo in venas se aperiunt. Quippe si a-
 40 nimali alicui, ex iis quibus arteriæ suat amplæ,
 magnas multasq; arterias quis vulneret, univer-
 sum per eas sanguinē evacuarit. Sunt itaq; arte-
 riis & venis communia oscula, per quæ quidem,
 dum dilatantur arteriæ, ex venis trahunt: in eas,
 dum contrahuntur, regūt. Sicuti nimirū per ora
 quæ in cutem finiuntur, quicquid halituosum fu-
 midumve excrementū habet, excernūt: recipiūt
 autè ex aère ambiente, nō exiguum in se portio-
 nem, per aliaq; spiramenta similiter. At à corde
 quidem accipiūt plus: reddūt autè ei minus, pro-
 pter membranas illas, quæ in earū superna na-
 scuntur parte: quanq; certè aliquid impertiuntur.
 Jam verò cum sanguis in arteriis, etiā rectè se ha-
 bente animali, contineatur: manifestū est nō ideo
 dilatari arterias, quod spiritu profectò à corde
 impleatur: sed potius ob id impleri, quod dilaten-
 tur. Quippe si essent sanguine vacuæ, fieri fortas-
 se posset, ut exiguo tempore, quod à corde con-
 fluit, ad fines earū perveniret: sanguinem verò in
 se habentibus, fieri omnino nequit, ut motus ce-
 leritas cum ea dilatatione cōsentiat, quæ ex iis à
 corde implendis proveniat. Arteriæ itaq; se ipsas
 movēt, vicissim se attolētes summittētesq;: idq;
 eadē qua cor vi: quā scilicet ab ipso corde ortam,
 per tunicas earū transmitti diximus. Est enim ut
 cor facultate

Animalis spi-
 ritus nutri-
 tionem esse
 minus com-
 mune respi-
 rationis &
 pulsus.

Calorem in-
 natum refri-
 gerari per in-
 spirationem,
 purgari autē
 per expiratio-
 nem.

Diastole arte-
 riarum sub-
 stantiam spi-
 ritus attra-
 hi, systole ex-
 pelli fuligi-
 nem.

Arteria dila-
 tantur dum
 trahunt spi-
 ritum.

Pulsus &
 respirationis
 similitudo.

Cor est prin-
 cipium compo-
 siti arteria-
 rum motus.

Pulsificā fa-
 cultatem à
 corde influ-
 ere arteriis,
 per ipsarum
 tunicarum
 substantias.

Arteria tra-
 hunt, dum di-
 latantur, ex-
 pellunt cum
 contrahun-
 tur.

Arterias
 trahere à ve-
 nis, & in il-
 las pellere
 per commu-
 nia orificia.

Arterias pa-
 rum cordi
 suggerere.
 Sanguinem
 contineri in
 arteriis.

Arteria non
 quia imple-
 tur dilatan-
 tur sed quia
 dilatantur
 implentur.

Arteria set-
 pus movet,
 eadem qui
 cor facultate

Respirationē esse opus animalis potentia: pulsum, Vitalis.

Diastralem esse etiam arteriarum actionem.

Expiratio est actionis remissio.

Systolem naturalem esse relaxationē actionis.

Systolem reperi, quae efflationi proportionē respondeat. Ingurgitatum cibo diastralem qualis. Calorem per somnum ad internam convertit.

Pueris expiratio et systole excellunt. Senibus systole tardior.

Pulsus à quibus mutari possit.

Molles tunicae quando sunt agiliores ad motum, et quando tardiores duris.

respirationis vis animalis, quæ à cerebro profiscitur, sic pulsum vitalis facultas, quæ à corde emanat, effectrix. Porro venæ, animali vita jam functo, simulac vacuæ sunt sanguine, prorsus in seipsas fidunt, ita ut superna earum tunica pars, committatur cum inferiore: at arteriæ, partibus dissidentibus nunquam non conspiciuntur: quod sanè propter alteram earum tunicam, quæ dura est, evenit. Quod autem non modo systole, sed diastrale sit etiam actio arteriarum, contra quam nonnulli arbitrantur, admodum perspicuum videtur: cum nimirum ipsa diastrale sub virium robore magna sit: sicuti è diverso parva, sub facultate imbecilla. Ad hæc, si quemadmodum expiratio, sic diastrale actionis esset remissio, utique nec intensio in ea, nec remissio, sicuti nec in spiritus emissionem, perciperent: nec omnino robur & vehementia ictus, quæ percipiuntur. Diastrale itaque mihi ex genere actionum videtur. Deinceps considerandum, an sicuti expiratio remissio actionis thoracis est, ac tanquam cessatio quædam: efflatio verò actio, atque idcirco intensio & remissionem admittens, quod expiratio non facit: sic systole in pulsibus relaxatio sit arteriarum operis, aliaque huic annexa inveniat, quæ efflationi respondeat, actio. Ac mihi id quoque videtur esse verissimum. Etenim rationabile est, ubi ex humorum deustione collectus fuliginosus vapor plurimus fuerit, tum animal efflatum appetere. Contra cum vel ob succi temperiæ, vel caloris mediocritatē, nihil talis excrementi colligitur, tum expirationem duntaxat. In arteriis quoque, ubi tale excrementum redundat, simile efflatum systole medi. Reliquas, cum id quod ex ipsis vacuatur, halituique fumo est similis. Quobrem iis qui se ingurgitarunt cibo, per somnum fit remissior quidam diastrale, systole autem intensior: quippe tunc intro magis quam foras naturali calore se conferente: eoque etiam circa viscera & ventrem, qui succos & cibos concoquit, jam plurimo collecto, necessum est excrementum, quoniam id quoque copiosius gignitur, naturalem vacationem desideret. Proinde expiratio quidem major, & plerumque cum efflatione perficitur: contractio autem arteriarum, illi proportionem respondens. Similiter ambæ & in pueris excellunt, quod sit in eis vehemens propter incrementum concoctio. Contra senum ætas tardior & minorem videtur habere systolen, utpote minus necessariam, cum & imbecilliter concoquant, & minime succos conficiant. Ad proportionem horum omnium, tum anni tempus, tum regio, tum omnis uno verbo circundantis nos aeris ad frigus & calorem mutatio, pulsus alterare videntur. Pari modo & animi affectus omnes, & vitæ sortes, & morbi, arteriarum motum introrsus extrorsive promovere. Qui verò inquirunt, arterias non agendo aliquid, celerius interiusque descendere: sed propter tunicarum molliem, ubi à diastrale dimittuntur, & ulterius & celerius, quam duras, in seipsas recidere: facile redargui possunt. Quippe faciliores ad motum erunt molles tunicæ, cum scilicet facultates ipsæ aliquid per eas moliantur, utpote sic magis eis obsequentes. Dum verò postquam ab iis sunt motæ, rursus permittuntur ad statum proprium redire, tum utique duræ, quam molles, ob imperium, robur, & firmitudinem suam constitutionis, revertuntur mul-

tò celerius: quemadmodum grandiores arbores, quæ ut cum renixu trahuntur, sic dimissæ, reflectuntur celerrimè. Diximus igitur, & quod pulsum naturalis qui per totum corpus diffunditur, caloris gratia sit conditus: & quod dilatata arteria, is calor refrigeretur, contracta rursus purgetur: & quod motus hi, spiritus motibus omnino sint similes: & quod animali spiritui conducant: & quod una re tantum, respiratio & pulsum dissideant, nempe quod illa ab animali facultate, hic à vitali oriatur.

GALENI PERGAMENI introductio in pulsus.



Niversæ arteriæ pulsum habent non modo sibi inter se, verum etiam cor di ipsi persimile, adeo ut ex una ipsarum possis de reliquis iudicium facere: non tamē motum omnium æquabiliter sentias, sed earum quidem quæ partibus excarnibus insunt, clarius: quæ verò in carnosissimis, obscurius: quæ autem carne multa integuntur, aut intra ossa sunt, aut aliis corporibus subjacent, earum motum sensu haudquam deprehenderis, nisi fortè extabuerit animal. Nam sic motus arteriæ quæ spinæ incumbit, tangentibus epigastrii plerumque deprehendi solet. Porro quæ in temporibus sunt, tarsis pedum, & interna parte corporum, ex perpetuo motu sensibili præditæ sunt. Verum neque expeditius, neque honestius, nec si visum spectes, maiori commodo aliam attigeris, si eas quæ in carpis sunt præterieris, & quod maximè perspicue & expolitæ sint, & secundum rectitudinem sitæ.

De quantitate dilatationis.

Tibi autem tagenti, arteria sentietur in omnem dimensionem extendi. At dimensiones corporum omnium sunt tres: in longum scilicet, latum, & profundum. Cæterum cum animal secundum naturam habet, comperies arteriam moderatè admodum dilatari: cum autem contra præter naturam habet, interdum secundum quamvis dimensionem partim minuitur, partim exuperat: quo casu memoria tenere oportet, cuiusmodi pulsum naturalis extiterat. Tum si is qui est præter naturam, auctus latitudine inveniatur, latum: si longitudine, longum: si profunditate, altum appellare. Ad portionem & iis contrarios, qui videlicet naturali sunt minores, angustum, brevem, atque humilem vocabis. Pulsuum verò secundum omnem dimensionem in statum præter naturam traductorum, qui undique est diminutus, parvus: qui auctus undique est, magnus nuncupatur. Atque hæc pulsus sunt in dilationis quantitate differentia.

De motus qualitate.

Propriæ motus differentia sunt, celeritas & tarditas: quarum illa quidem, motus quidam est concitatus, hæc autem exolutus: quas ita demum dijudicabimus, si eas ad motum naturalem comparaverimus. In occursum porro qualitate, languor ac vehementia consistunt. Cæterum durities atque mollietates, tunicæ ipsius arteriæ sunt qualitates: minimè autem propriam pulsum differentiam constituunt, licet cum eo percipiantur. Tres igitur has differentias pulsum, & præterea quartam illam quæ in magnitudine erat & parvitate, in percussione arteriæ reperiēs.

¶ De tempore quietis.

Quintam autē aliam numerabis, quæ est in intermissione, quæ inter percussiones intercedit. Voco enim percussiones, cum arteria tactui nostro occurrit: intermissione autem, quietem quæ inter duas percussiones intercedit: secundum quam, frequēs, rarus, atque inter utrunq; medius pulsus iudicatur: quo in medio pulsus secundū naturam consistunt. Porro omnes ij temporis etiam quantitate dijudicantur. Nam frequēs dicitur, cum quietis tempus breve fuerit: rarus, cum diuturnum. Non fuerit autem alienum, si tyronibus contractio arteriæ ponatur esse insensibilis.

¶ De aequalitate atq; inæqualitate.

Æqualitas autem & inæqualitas in dictis omnibus differentiis inveniuntur. Nam ubi in illis ordine se consequentibus est æqualitas ac similitudo, æqualitatem tunc vocitamus. Verbi gratia, si pulsum ordine subsequentium magnitudo fuerit æquabilis, ibi tum pulsum in magnitudine æqualem dicere possumus: sin in celeritate, celeritate æqualem. Ad eundem etiam modum in vehementia, frequentia, & languore. Inæqualitas porro, æquabilitatis est labes, in qua vis pulsum differentia ipsa accidat.

¶ De pulsu ordinato inordinatoq;.

Nonnunq; autem & post certam quandā percussionū numero præfinitarum seriem, pulsibus æqualibus inæqualis unus intercidit, idq; multis modis. Nam tres æquales, quartus inæqualis subsequitur, servaturq; id deinceps uno tenore: aut quatuor, quintus: pari modo & in omni alio numero. In quibus certē omnibus æqualitas non servatur, ob eamq; causam pulsus fit inæqualis. Quia verò certa quædam series servatur, ob id ordinatus vocatur. Quæ certa periodos si minimē servaretur, pulsus is diceretur etiā inordinatus.

¶ De inæqualitate quæ in uno pulsu accidit.

Accidit autē & in uno pulsu inæqualitas, tum partibus arteriæ situ & motu inter se dissidentibus, tum cuiusq; pulsus motu sibi ipsi non consentiente. Inæqualitas igitur in partium situ accidit, cum arteria ipsa à propria sede traducitur. In motu autem, cum arteriæ velocius aut tardius, tempestivius aut serius, vehementius aut languidius, tempore diuturniore aut breviorē, assidue aut penitus nihil, moventur. At in singulis pulsus partibus est inæqualitas, cum pulsus est intercisus, repetitve. Præterea cum motu celeritatem eandem, aut vehementiam, aut languorē, aut magnitudinem, aut parvitatem non servat. Sunt igitur hæ simplices inæqualitates.

¶ De pulsum inæqualitate composita.

Compositæ autē fuerint, quatenus licuerit alteram alteri, ac singulas singulis, aut unam pluribus, aut plures pluribus copulari. Quarū nōnullæ quidem adeptæ sunt propriam appellationē: quemadmodum pulsus vermicans, formicās, & hecticus. Vermicans quidem, cum arteria velut reptantē vermem, atq; fluctus instar subfiliētē nobis repræsentat, nō autē tota ipsa uno tempore dilatatur. Cæterū si cum exigua dilatatione id accidat, vermicās: sin cū magna, fluctuosus simpliciter appellatur. Perspicuū autem est, qd vermi-

cans pulsus, languidus est & frequens. Qui verò languidus summē fuerit, frequens ac parvus, is formicās cognominabitur: qui tamen celeritatē præ se ferat, nō tamē est revera celer. Hecticus verò, q modo febris, ita pulsus quoq; nuncupatur, quod nihil magnoperē immutetur, sed perpetuō sui similis, cohærēs, ac nunq; solutus permaneat, utpote toto corporis habitu in febribus ejusmodi ac pulsibus, in statū morbosum mutato. Ut igitur quæ sunt dicta, denuō in memoriā revocem: Pulsus magnus est, qui fit cum arteria multū in longū, latū, & profundū diducitur. Longus, cum in longitudinē tantū. Latus, cum in latitudinē. Altus, cum in profunditatē. Pulsus autē vehemens est, qui validē tactū percutit. Mollis, in quo arteriæ tunica blāda est ac tenera. Celer, qui fit dum arteria exiguo tempore dilatatur. Frequēs, cum parvo interposito repetit. Æqualis, qui serie continua sibi est æqualis. Ordinatus, qui singulis periodis est æqualis. Qui verò in una percussione est inæqualis, in una percussione dicitur inæqualis. Pulsus omnibus his cōtrarii, satis sunt perspicui. Liquet præterea, quod aliorū contrariorū omnium unus est medius: æqualis verò & inæqualis, nullus est medius: sicuti nec ordinati, & inordinati: quodq; illorū quidem omnium mediū ipsi sunt secundum naturam, in his verò solus æqualis & ordinatus.

¶ De causis pulsum.

Cum ab omni causa pulsus mutari soleant, triplicem & generalissimā mutationis ipsorū differentiam statuo. Ac prima quidem mutatio, naturalis existit: secunda nō naturalis quævis nondum præter naturā: tertia deniq; præter naturā. Verū omnes hæ mutationes, differentias naturales sequuntur. Arteriæ siquidem, alii aliter natura moventur. Proinde primas eas illi esse exploratas oportet, qui velit dignoscere, à qua causā, & quatenus pulsum ipsum mutatum esse contigerit. Proprium autē cuiusq; pulsum experientia certò didicerit: ob idq; arteriā tangere sæpe convenit, potissimū quidē perfectē sani, ac dum ab omni vehementi motu quiescit: post autē, & in ipsis affectibus. At cum fieri nequeat ut pulsus omnium experientia explorētur, certē artifex plurimū poterit, si eorum quæ multis passim similiter insunt, scientiam sibi cōpararit. Nam communio quædā naturæ viris inter se est, quemadmodum etiā mulieribus: quam qui probē calluerit, à recto aberrare non poterit. Ac viri sanē in universum mulieribus pulsum habent majorem multò, vehementioremq;: cæterum tardiorē paulò, ac longè rariorem. Qui natura sunt calidiores, ij quidem pulsum habent majorem & celeriorē, ac longè frequentiorē, non multò tamen vehementiorem. Qui autē natura sunt graciliores, majorem quidem, ac longè rariorem, verum non multò vehementiorem. Mutatur verò pulsus, & per ætates. Puero recens in lucem ædito, pulsus frequentior est, sicuti seni rarior. Qui verò etate sunt inter hos media, iis pulsus ad portionē respondent, pro ut scilicet propius ad pueri aut senis etatem accesserint. Pari modo puero quidem celerrimus est, seni verò tardissimus: mediū mediæ etates sortiuntur. Cæterum inter etates,

tempestivius aut serius incipiunt: unde tardus est minusque parvus, nonnunquam autem nihil penitus habet tarditatis, ob idque ipsum, minimè malignus existit. At quæ à febribus exitiis atque acutis oriuntur syncopæ, pulsum vermicantem non habent: qualis utique; reliquas virium solutiones ut plurimum comitatur, ac eas præcipuè, quæ sine febribus accidunt: aut certè cum exiguis admodum. Ob eam utique; causam syncopas quidem cardiacas, formicantes: choleras verò morbos, ac fluxus ventris vehementes, hæmorrhagias, fluxus muliebres, reliquosque; affectus qui corpus inaniant celeriter, ut plurimum vermicantes: cum autem extremum affligant, formicantes sequuntur. Jam verò ab ira pulsus fit altus, magnus, vehemens, celer ac frequens: At voluptate autem magnus ac rarus, non tamen vehementia diversus. A mœstitia, parvus, tardus, languidus, atque rarus. A mœtu recenti quidem ac vehementi, celer, turbulentus, inordinatus, atque inæqualis: inveterato autem, pulsus à mœstitia est similis. In omnibus porro his, si diu perseverarint, aut vehementes admodum fuerint, tales pulsus fiunt, quales consequuntur solutas vires. Dolor autem qui pulsus immutat, aut quia vehemens, aut quia in partibus principalibus est, id facit: quemadmodum inflammatio. Cum igitur adhuc parvus est, atque in ipso ortu, majorem, vehementiorem, celeriore ac frequentiore pulsus efficit: auctus autem, vehementisque; admodum factus, ut jam robori vitali noxam inferat, minorem, languidiorem, celerem ac frequentem. Qui verò vires jam dissolvit, pulsus mutat languorem, parvitatem, & falsam celeritatis imaginem, immensamque; frequentiam. Inflammationum pulsus, communis quidem omnium, quasi ferratilis est: ut pars quidem arteriæ alia quidem dilatari videatur, alia autem minimè, quæ videlicet durior sentitur. Habet autem pulsus hic &urbationis nonnihil: præterea celer quidem est ac frequens, magnus verò non semper. Proprius cuiusque; incipientis quidem, major est naturali, vehementior, celerior, frequentiorque; At in ea quæ adhuc increfcit, omnia hæc fiunt auctiora, pulsusque jam palam est durior & turbulentior. Cum verò ad vigorem pervenerit, evidentior quidem est, durior, ac turbulentior, sed minor quam antea: non tamen languidior, nisi morbus vires exuperarit, quo casu frequentior & celer redditur. Quod si diu admodum perseveret, ritumque; scirrhorum durefcit, pulsus tenuitas ac durities prædictis accedet. Hæc itaque; illi phlegmoni accidunt, quæ totius animalis pulsus immutat. Eius verò quæ animal totum non turbat pulsus, in parte saltem inflammatione accensa, est cuiusmodi esse illum in toto corpore diximus. Intenditur autem ac remittitur prædictorum quodque; aut pro inflammationis qualitate, aut pro ipsius instrumenti phlegmone obsessi natura. Nam quæ partes magis sunt nervosæ, eæ duriores, ferratilesque; magis, ac minores pulsus efficiunt: quæ verò sunt venosæ magis atque arteriosæ, contrarios. His autem ipsis major est in partibus magis arteriosis, ibidemque; facile inæqualis & inordinatus efficitur. At præter ipsius pulsus differentiâ, quibus septem transversum est inflammatum, celeriter in convelluntur: suffocantur autem quibus pulmones. Syncopæprehenduntur, quibus os ventriculi. Atrophia laborat, quibus hepar. Non concoquuntur, quibus ventriculus. Urinæ supprimuntur, quibus renes experiuntur inflammationem. Ad hæc partes sensu exactiori præditæ, pulsus, propter dolores, immutant: hebetiori autem, duntaxat propter affectum. Itaque; pulsus pleuritico rum celer ac frequens est, non tamen magnus admodum. Est præterea non languidus quidem, non tamen, quod ad affectum spectat, vehemens. Porro quantitas frequentiam in pulsu excedit consuetum modum pleuritidi, cum pleuritis ipsa in peripneumoniâ transit, aut etiâ minatur syncopen. Infra modum autem subsistit, cum in cataphoram, aut nervorum læsionem definit. Eodem modo inæqualitas illa ferratilis, quæ pleuritis maxime est propria, remittit quidem, si pleuritis sit mollis, ac facile concoquatur: intenditur autem, si ea sit exitialis: indicatque; ipsam esse coctum difficile. Tales autem pleuritides, si simul adsint imbecillitas virium, periculum præsens minatur. Sin virium robur non desit, signum est eas concoctas jam esse, aut in empyema translatas, aut in tabidum marcorem degenerasse. Cæterum si pleuritis coquatur, sensim deponit pulsus omnem mutationem præter naturam. Cum verò transit in empyema, fiunt pulsus empyematum proprii. Pari modo & marcoris proprii eis accidunt, qui tabidos marcores sunt incurfuri. Talis autem est purulentorum nuper ordientium pulsus, qualis vigentis inflammationis: hæc siquidem ipsarum est suppurationum principium. Nonnunquam autem est inæqualis & inordinatus: omnibus tamen est hecticus. Cum verò jam pus instat, cætera quidem est similis, nisi quod magis æqualis. Postquam autem est ruptum, languidior, latior, tardior ac rarior. Marcescentium pulsus non simpliciter, neque; secundum unam speciem, mutatur. Qui namque; una cum phlegmone non dum soluta paulatim emarcuerunt, pulsus habent languidos, celeriores, frequentes valde, atque; cum depressione in angustum redactos: quos utique; myuros vocant. Porro marcescentibus omnibus communis est pulsus hecticus: dein autem in diastoles magnitudine myuron imitans inæqualitas: postremo verò ea quæ in frequentia consistit: quæ omnibus etiam perpetuo inest, qui in marasum inciderunt propter inflammationes: aut quibus propter cardiacos affectus, vel syncopas stomachicas, periculum præsens imminet: quique; vino epoto periculum quidem præceps effugerunt, nihilominus tamen tempore procedente marcuerunt. Phthisicorum pulsus, parvus, languidus, mollis & celer est, hecticusque; mediocriter. Peripneumonicorum verò, magnus, aliquantulum fluctuosus, languidus, mollis, non aliter quam lethargicorum: nisi quod inæqualitate superat, tum ea quæ in una percussione consistit, tum ea quam systematicam vocant. Cum autem peripneumonici omnes aut febri acuta infestent, aut soporis gravis nonnihil habeant, utrumvis prævaluerit horum, secundum illud frequentiam quantitas maxime deprehenditur. Nam si in peripneumonia sit inflammatio febris, pulsus erit admodum frequens: sin sopor paulo magis polleat, infrequentior. Lethargicorum pulsus, cum sit magnitudine,

Septo transi
verso infla
matio, quam
celeritate co
ncoquuntur
Suffiones ori
untur suffoca
tiones pulmo
ne phlegmo
ne affecto.
Pleuriticorum
pulsus.
Serratilis in
æqualitas
pleuriticorum.
Pleuritidis
differentia.
Purulentorum
pulsus, est
qualis vigen
tium inflam
mationum.
Marcescen
tium pulsus.
Myuri pul
sus.
Pulsus hec
ticus omnium
marcescen
tium com
munis.
Phthisicorum
pulsus
Peripneumo
nicorum pul
sus.
Peripneumo
nicis quæ ad
sint.
Lethargicorum
pulsus.

*Inæqualis
pulsus, qui
ordinat⁹ sit,
reperitur
rarò.*

*Phreniticorū
pulsus.*

*Cataleptico-
rum signa, et
pulsus.*

*Catochôn,
hoc est, deten-
torum, pul-
sus.*

*Convulsorū
pulsus.*

*Percussione
arteria mul-
tis imponere*

languore, & mollitie, peripnevmonicorū pulsui cōsimilis eodem tamen est tardior, languidior, minus inæqualis, magisq; deficiens quàm interci dens. Porro cōfusio ordinis ut plurimū inæqua- litates sequitur: nā inæqualē pulsū rarò qui- dem ordinatū reperias. Cæterū minores noxæ, inæquales & ordinatos: majores verò, inæqua- les & inordinatos efficiunt. Phreniticorum pul- sus est parvus: rarissimè autem magnus fuit vi- sus, roburq; mediocre habere. Durus præterea est, ac nervosus & frequens, & valdè celer. Vi- deas autē licet & speciem inæqualitatis in situ, in eo nonnunq̃ vehementer accidere. Quin & ti- bi sæpe videbitur tota arteria suo ipsius loco re- licto, sursum deorsumq; ferri turbulentissimè: cu- jus magna frequentia eminentem minatur syn- copen. Est & alius quidam nomine carens affe- ctus, ex phrenitidis & lethargi generibus mi- stus: quo detenti, bonam quidem temporis par- tem oculos claudunt, suntq; somnolenti ac ster- tunt: post autem oculis inconniventibus atq; im- motis intuentur diutissimè, nō aliter q̃ catochi: tum si quis eos interroget, invitosque ad collo- quium trahat, tardierunt ad respondendū, diffi- cilesq;: plerunq; autē turbulenter effutiant, quic- quid primū in buccam venerit. Atq; ejus sanè af- fectus pulsus sunt frequentes & celeres, quo mo- do phreniticorum, sed minus. Pari modo & ro- boris habent minus quàm illi, verum lati sunt, atq; parvi, nec dum extra movētur, quicq̃ habēt cōfertim ac simul intercisum: sed alia ratione ve- luti intrò properantes suffugiūt, systolem quidē accelerantes, suffurantes autem diastolem. Non tamen, ne in hac quidem sunt phreniticis simi- les, cum non habeāt, nescio quid intercisum. Ca- tochôn, hoc est, detentorum pulsus, cæterā qui- dem similes sunt lethargicis, magnitudine, tardi- tate, ac raritate: quemadmodū & totus affectus à lethargo specie nō multū discrepat. Catochôn tamen pulsus imbecilli non sunt, nec molles, sed in his vel multū dissident: quemadmodū cer- tē & quod lethargicis totus habitus sit solutus, ac tumens, catochis verò constrictus, coactusq;. Præterea detentorum pulsus æqualis est: inæqua- lis autem lethargicorū. In convulsis, ipsum quia- dem corpus arteriæ coactum esse videtur, com- pactumq; undiq;: nō tanquam à quoquam com- pressum, aut arctatum: nec rigidum planè, ut in febribus, & maximè in earum accessionibus: nec propter duritiem dilatatu difficile, quod tempo- ris longinquitate accidere solet, præsertim si vi- tia quædam, aut viscerū affectibus adfuerint: sed nō aliter quàm si corpus nervosum cavū, ut inte- stinum, ab utroq; sine fuerit extensum. Talis est motus inæqualis arteriæ, quæ instar funis, sur- sum & deorsum traducitur. Nec enim ullum est diaстоles aut systoles signum, sed confusione po- tius simile quippiā hīc accidit. Apparet autē ve- hemens esse ac magnus convulsorū pulsus: is ve- rò nec languidus est, nec parvus: nō tamen adeo vehemens aut magnus uti videtur. Percussio e- nim multis imponit, quæ propter tensionē qui- dem, robusta: propter turbationē autem, exilire apparet. Unde alias quidē altior, alias quasi stre- pitum quendā aspe rū ad tactum nostrū videtur

efficere. Quem pulsū, qui fuerit exercitatus, fa- cile deprehendet, cum nulli sit alteri similis. Para- lyseos pulsus parvus est, languidusq; & tardus: nonnullis tamen rarus: sicuti aliis frequens qui- dem verum penè deficiens inordinatè. Epilepti- corū autē & apoplecticorū pulsus, sunt similes: quocirca quæ de epilepticis memorabūtur, ea- dem & de apoplecticis dicta fuisse est putādum, nisi quod omnia sunt in his intensiora. Porro quādiu mediocriter natura ipso affectu turba- tur, tantisper nullam mutationē in pulsu est repe- rire cōmemorabilem: sed solū veluti tensa in u- tranq; partē videtur arteria, quemadmodum in convulsis. Ubi verò invaluerit affectus, ita ut op- primat vires, inæqualitatē quandam ac tensionē fortē asciscit, longiorq; fit pulsus, languidior & rarior. Quod si affectus ipsas vires dejecerit, pul- sus efficiet languidos, frequentes ac celeres. An- gina laborantium pulsus, tensionem quandam habet cōvulsioni affimilem: magnus tamen est, ac fluctuosus, quo modo peripnevmonicorum. Atq; utrumvis in eo prævaluerit insigniter, se- cundum illud est trāsmutatio expectanda. Nam si pulsus peripnevmonicorum simili, præpollet, in peripnevmoniam: sin cōvulsioni, in convul- sionē, angina terminabitur. Cæterū qui ex ipsis nimis anguntur, iis pulsus fit parvus & rarus: ex- pirantiū aut, jam frequens & inæqualis. Ortho- pneæ acutæ pulsus est inæqualis, inordinatus, & penè deficiens, cum autem mediocriter est mali- gna, frequens: cum ad extremū urget, tardus ac deficiens: cum hominem è medio tollit, fre- quens ac languidus. Suffocationis à matrice or- tæ pulsus, est cōvulsoriè extensus, ac rarus: ejus autē quæ est exitialis, frequens, languidus, inor- dinatus, & penè deficiens. Os ventriculi affe- ctum, si quidem infestetur inflammatione, eā facit mutationē duntaxat, cujusmodi inflammatio- ne corporis nervosi fieri jam diximus. At mor- sus illius, vomitus, nausea, singultus, appetitus privatio, atq; dissolutiones, præterq̃ quod pul- sū parvū efficiūt & languidū, ipsum etiā nimis frequentē reddūt, & quibusdā moderatè celerio- rem. Cōpressio autē sola, citra ea omnia, rarum, tardū, parvū, obscurū. Præterea quibus fames est magna, pulsus est ejusmodi. Qui verò affectus in frequentia ipsum pulsū permutāt, si diutius perseverarint, aut vehementius affligerint, ij pul- sū vermicantē efficiēt. Qui in raritatē, præterq̃ quod memoratas differentias intendunt, talem præterea quādā pulsus speciē in ea inæqualitate, quæ in uno pulsu accidit, efficiūt, ut corpus arte- riæ in multas partes cōminutū esse videatur. Hy- dropum pulsus, ascitæ quidē, longus, frequens, & subdurus cum quadā tensione est: tympanitæ autē longior, nō imbecillus, celerior, frequens subdurus, cum quadā tensione. Ejus verò qui in toto nascitur corporis habitu (quē Græci *αναρδία* nominant) fluctuosus, latior, ac mollis. Ele- phantiasis laborantiū pulsus parvus imbellus, tardus & frequens. Ictericorū pulsus sine febre, minor, frequentior, durior, non languidus, neq; celer. Eorum qui sumpserunt helleborū, paulo quidem anteq̃ vomant, latus rarus, languidior: cum autem vomunt ac divelluntur, inæqualis, & inordina-

*Para-
lyseos*

*Epile-
apop-
lepti-
corū*

*Epile-
lepti-
corū*

*Angi-
na*

*Ortho-
pneæ*

*Suffoca-
tio*

*Pulsus
ferentis
versus
triaculi*

*Hydropi-
cus
Hydropi-
cus*

*Elephan-
tiasis*

Ictericorū

*Pulsus
belli*

inordinatus: cum meliusculè jam habent, ordinatus quidem, sed adhuc inæqualis, minus tamè quam prius. Cum autè sanescunt jam, & penè ad statum naturalem redierunt, æqualis major q̄ antea, vehementiorq̄. Qui verò ex iis syncope corripuntur, convelluntur, atq; singultiant, pulsus parvus & languidus, inordinatus, celerior, atque admodum frequēs. Qui ex eis suffocantur, parvus, languidus, inordinatus, inæqualis, non tamè frequens, neq; celer, sed subardus magis. Præ se fert aut & fluctuosū quiddam & latum, & nōnunquam exiguam quandam arteriæ tensionē.

GALENI PERGAMENI
de differentiis pulsuum, liber primus.

Prima generis pulsuum.

Quandoquidem arteriæ corpus est cavum, longū & circumductile, habetq; perpetuū geminū motum ex contrariis constitutū partibus (aut enim in seipsam undiq; cōfidet, aut in omnē partē distenditur: qui duplex motus vocatur pulsus) in utroq; ex gemina quies accidat necesse est: altera à distensione, priusquā cōtrahatur: altera à contractione, priusquā distendatur. Quas quidem binas quietes experientiū tactus cognoscit, nec minus demonstrat ratio. Nam prius contrariū motū natura, q̄ priorē sedaverit, nō exorditur. Atqui sedari, subsistere est & in quiete esse. Sic motibus intercedit quies. Exprimi ergo necessitas, quoddam esse tempus proprium utriusq; motus: aliquod etiam intermissionum, & harum item utriusq; proprium. Jam quia tres arteria dimensiones, ut reliqua omnia corpora, obtinet, longitudinem, latitudinē, profunditatē: non potest in singulis dimensionibus nō fieri quantitas aliqua distentionis & contractionis. Præterea contentiōne quandam necessariō habet, ut aut ægrè, aut languidè, aut prōptè, valenterq; operetur. Est etiam ipsa arteriæ tunica aut mollis aut dura: necnon intercapedo interna aut vacua quodammodo, aut plena. Atq; hæc omnia aliquando æqualia, aliquando inæqualia sunt. Temporis item distentionis aliqua proportio est cum tempore contractionis. Aliā in uno pulsu differentiam constituas præter has nullam: sed sunt omnes quę in unum pulsū incidunt differentiæ generales, quas retulimus. Quibus duæ accedunt aliæ, quas collectivās appellānt. Ex his in plurium pulsuum mutua contentiōne, æqualitatem & inæqualitatem, ordinē & ejus perturbationem æstimamus.

Differentia cuiusq; generis pulsuum.

At motum ipsum pulsus, aut moderatū & naturalem esse, aut tardiorē, aut celeriorē, oportet: quæ tres pulsuum circa motū differentiæ existunt. Fit igitur pulsus celer, ubi modico tempore ipsa arteria movetur: tardus, cum multo: moderatus, ubi mediocri. Differentiæ pulsū in distentionis quantitate, si quidem in singulis concipiuntur dimensionibus, novem numero sunt, in unaquaq; trium dimensionū tres. In longitudine arteriæ, qui moderatus in ea est, & qui hunc

excellit, vel eo est inferior. Vocatur qui excellit, longus: qui inferior est, brevis. In latitudine, moderatus, & alij immoderati duo: nempe latus, qui moderatum excellit: huic contrarius, angustus. Idem in dimensione profunditatis arteriæ unus moderatus est, alius altus, & alius humilis. Hæc pulsuum sunt in una dimensione acceptorum differentiæ. At differentiæ pulsuum in trinīs simul dimensionibus, sunt septem & viginti. Perspicias has manifestè in tabella. Unus enim erit longus simul & latus, altusq; , qui omnibus præponatur: alius longus, latus, & profunditate moderata, scribaturq; secundus: alius longus, latus, humilis; qui sit ordine tertius: similique reliqui omnes cognoscantur via & ratione, ut duæ primæ dimensiones maneant immotæ, trifariam ultima variet, hoc pacto. Quartus longus, moderata latitudine, & altus. Quintus longus moderata latitudine, simulq; moderata profunditate. Sextus longus, latitudine moderata, humilis. Deinde alij tres, prima dimensione longum servante, secunda angustum, tertia trifariā variante. In his novem, una dimensio permanet, longitudinis longæ: aliæ omnino commutantur. Mox alteri novem, dimensione longitudinis in mediocritate servata, variantibus reliquis. Ad hæc novem alij, ubi longitudinis brevis dimensio sit, & aliæ immutentur.

TABELLA.

1	Longus	latus	latus	magnus.
2	Longus	latus	moderatus	
3	Longus	latus	humilis	
4	Longus	moderatus	altus	
5	Longus	moderatus	moderatus	gracilis.
6	Longus	moderatus	humilis	gracilis.
7	Longus	angustus	altus	
8	Longus	angustus	moderatus	gracilis
9	Longus	angustus	humilis	gracilis.
10	Moderatus	latus	altus	turgidus.
11	Moderatus	latus	moderatus	
12	Moderatus	latus	humilis.	
13	Moderatus	moderatus	altus	
14	Moderatus	moderatus	moderatus	medius
15	Moderatus	moderatus	humilis.	
16	Moderatus	angustus	altus	
17	Moderatus	angustus	moderatus	
18	Moderatus	angustus	humilis	gracilis.
19	Brevis	latus	altus	turgidus.
20	Brevis	latus	moderatus	turgidus.
21	Brevis	latus	humilis.	
22	Brevis	moderatus	altus	turgidus.
23	Brevis	moderatus	moderatus	turgidus.
24	Brevis	moderatus	humilis.	
25	Brevis	angustus	altus	
26	Brevis	angustus	moderatus	
27	Brevis	angustus	humilis	parvus.

Atque

Longus pul.
sus.
Brevis.
Latus.
Angustus.
Altus.
Humilis.
Pulsuum dif-
ferenti in tri-
nis simul di-
mensionibus
acceptorum,
sunt septem
& viginti.

At inter* vigintiseptē hos pulsus, qui ex ternis dimensionibus constant, primus quidem ab omnibus magnus dicitur, ultimus autē parvus. Reliqui verò proprio nomine carēt. Neq; enim qui graciles dicuntur & turgidi, certū unum significant, sed multis simul generatim tribuuntur. Nam in quibus longitudinis dimensio duabus reliquis præstat, omnes hos tenues & graciles vocant: in quibus duæ reliquæ ab hac, tum crassos, tum turgidos. At moderatū dimensionibus pulsū, mediū inter magnū & parvum nominant.

De differentiis reliquorum generum pulsuum.

Tertij generis pulsū, quod in cōtentione cōsistit, tres differentiæ existūt. Unus quippe est validus cōtentione, qui vehemēs vocatur: alter imbecillus, qui languidus: & tertius inter utrunq; qui medius dicitur. Quarti etiā generis, quod circa arteriæ corpus versatur, totidem sunt differentiæ: durus videlicet, mollis, & medius. Similiter quinti generis, quod arteriæ veluti infusionē declarat, sunt differentiæ tres, plenus, vacuus, & inter utrunq; medium tenens. Quæ quidem differentiæ quinq;, cum æqualitatibus & inæqualitatibus suis, in uno arteriæ motu consistunt.

De differentiis pulsuum quæ in tempore intermissionis consistunt.

Qui contractionē pulsuum percipere se fatentur, tarditatē quidem & celeritatem in distentionis contractionisq; tempore collocant: crebritatem verò & raritatem, in quiete utraq;: at rhythmum, in distentionis tempore, unā cum tempore insequētis eam quietis, ad tempus collato cōtractionis, simul & excipientis eam quietis. Porro quietem quam vocant superam, quæ secundum distentionem contractionē præcedit, quanta sit, tactu queas ad unguem assequi: inferā non item planē, quod utrinque sibi asciscat partes, ad initium, contractionis extremitatem: ad finem, principium distentionis.

De differentiis quietis & rhythmici.

Itaq; in genere quietis arteriæ, tres pulsuum differentiæ consistunt, rarus, creber, & medius. At verò cum omnis pulsus aliquo rhythmo constet, erit utiq; arhythmo pulsui eurhythmus contrarius: eurhythmus autem genus commune utriusq;. Cæterum pulsus eurhythmus indivisus, & unus manet. Arhythmici tres differentiæ sunt: pararhythmus, heterorhythmus, ecrhythmus. Etenim cuique ætati suus est naturalis pulsus. Qui ex iis igitur rhythum servat, vocatur eurhythmus: qui labefactat, arhythmus. Atque labefactans ipse, interim vicinæ ætatis rhythum mutuatur, q pararhythmus: interim cujusvis alterius, qui heterorhythmus dicitur: sicuti q rhythum prorsus nullius ætatis retinet, ecrhythmus. Eisdem differentiis & in naturis, annique temporibus, necnon regionibus, ac breviter in omnibus, statuere oportet. Jā verò inter omnes rhythmos, hi quidem pari proportionē, illi impari constant. Pari, ubi distentionis tēpus æquet tempus contractionis. Impari, si alteruter eorū excedat: id quod modò certis, modò incertis fit excessibus, Certis bifariam, aut* multiplici proportionē, aut ut numeri ad numerū. Ac propor-

tio quidē multiplex, aut dupla est, aut tripla, aut quadrupla, aut insequentiu aliqua. Ut numeri ad numerum, ubi quot est distentio temporum, totidem fuerit contractio. Incertis, in universum tripliciter. Nam aut distentionis est tempus incertum, aut contractionis, aut utrunq;.

De æqualitate, inæqualitate, ordine, & ordinis perturbatione.

Porro æqualitas & inæqualitas tū in uno pulsū, tum in pluribus. Ordo & perturbatio ordinis, in pluribus duntaxat. Ergo (ut à facilioribus cognitu ordiamur) quæ in pluribus pulsibus æqualitas inæqualitasq; cernuntur, quas collectivas vocitant, in contentione omnium differentiarum estimatur primi pulsus cum reliquorum differentiis. Nam pares si omnino maneant, æqualis absolutē is pulsus vocatur: sin omnino impares, absolutē inæqualis. Quod si in una vel pluribus pares existāt, & in una vel pluribus impares, quatenus pares sunt, hætenus dicitur æqualis pulsus: quatenus impares, hætenus inæqualis. Nam pulsus absolutē æqualis, nec magnitudinē, nec velocitatem, nec aliud habet impar quicquā. At verò ordinatus & inordinatus pulsus divisa inæqualitate in paritatē circuituū, & in absolutam imparitatem, in utroque membro gignūtur: incircuituum paritate, ordinatus in absoluta imparitate, inordinatus. Sint itaque omnes unius pulsus differentiæ, insequentium differentiis omni in genere pares. Absolutē equalistalis pulsus dicitur. Contra omnes sint omni bus impares: erit ille absolutē inæqualis. Quod si aliqua vel aliquæ pares existant, & aliqua vel aliquæ impares: in aliqua pulsus vel aliquibus æqualis erit, in aliqua vel aliquibus inæqualis. Qui enim absolutē est æqualis, aut una, aut pluribus differentiis, non admittit sectionē. Qui autem absolutē inæqualis est, hunc per unam aut plures species secantes, circuituum paritate & im-

De collectivæ inæqualitatis differentiis: ac primò de æqualibus inæqualitatibus.

Collectivæ inæqualitates, quæ in acervo plurium pulsuum consistunt, primam habent differentiam, qua interim æqualiter, interim inæqualiter fiunt. Quippe inæquales pulsus, sicuti & cætera ferè omnia, pristinam naturam mutantia, quatenus æquam semper mutationem recipiunt, æqualiter dicuntur mutati. Quæ verò partem mutationem minimè asciscunt, ea inæqualiter inæqualia vocantur. Ubi igitur primo pulsū secundus est paulò minor, & tertius tantò secundo, & quartus similiter tertio, ac sic deinceps: tales sanè pulsus quasi imminutos, à turbatis figuris sumpto nomine, appellant. Jam qui ex ipsis perpetuò diminūtur, nec minui desistūt deniq;

Pulsus magnus parvus

Gracilis.

Turgidus.

Pulsus vehemens.
Languidus.

Durus.
Mollis.
Plenus.
Vacuus.

Quietem pulsuum superam, quantum sit, tactu posse discerni: inferam autem, non item planē.

Pulsuum differentia secundum quietē arteriæ, sunt tres: rarus, creber, & medius.
Eurhythmus pulsus.
Arhythmus pulsus.
Eurhythmus pulsus cur dictus.
Arhythmus pulsus est triplex.

Rhythmorum differentia multiplices.

Æqualitas

temperamentum

in natura

bus

dine

sione

pluribus

tum

Pulsus

lute

Pulsus

lute

lis.

Pulsus

naturæ

cutum

ritate

lit.

Pulsus

dine

absoluta

sistit

tuum

ritate

Pulsus

lute

non ad

sectionem

Pulsus

lute

omnes

tus, partes

tur

tus omnes

Pulsus

dine

pluribus

Pulsus

lute

naturæ

Æqualitas

mutari

dicantur

Inæqualitas

inæqualitas

quæ nominantur

Pulsus

mutari

deniq; ad quietem omnino recidunt, motuq; deficiunt, quos vocant deficientes *pulsus*. At qui desinunt, duplici sunt differentia. Quidam enim in quā primum parvitate minui destiterunt, hanc constantissimē servant. Alij autem rursus augentur, quos imminutos reciprocos vocant. Quorum quidem ipsorum nonnulli ad parem revertuntur pristinae magnitudinē, alij ad minorem: alij iisdem excessibus quibus fuerant prius imminuti, rursus augentur. Sunt qui minoribus accessio nibus, maioribusve utantur.

¶ De inaequalium inaequalitatum differentijs.

Inaequalium inaequalitatum quaedam nullam prorsus aequalitatem retinent: alij quae retinent ad tres usq; vel quatuor, vel quinque pulsus, sed postea admittunt: in quorum inest utrisq; vel ordo, vel perturbatio ordinis: ordo, si circuitus servant aliquos pares perturbatio ordinis, si & hos quoq; violent. Atq; hi quidem ex ipsis & motibus deficiuntur, ut illi qui aequaliter agitantur. Ceterum ut illos decurtatos deficientes: sic hos inaequales deficientes vocamus. Porro intercurrentes pulsus ex sola inaequalitate crebritatis nascitur: intermittens verò, ex inaequalitate raritatis & parvitatē, alio atq; alio utrobique modo, constat. In raritatis inaequalitate, quod quies sit producta longissimē: in parvitate, quod minima fuerit distentio. Vel potius, ex pulsuum parvitatibus deficientes constat: intermittētes, ex raritatibus.

¶ De inaequalitatis unius pulsus differentijs.

At inaequalitatis motus in uno pulsu, duae primae differentiae constituendae sunt. Quarum una, in una arteriae parte gignitur: in pluribus altera. Earum autē utraq; potest iterum in plures distribui. Auspicabimur tamen ab ea, quae circa unam arteriae partem versatur, licet distinctis temporibus: quod nimirum inaequalitas illa saepe invenitur in pulsibus, multaque denotare consueverit. Tres igitur illius sunt differentiae primae: cum videlicet quies interpellat motum particulae: aut cum ille continuus apparet, non paris tamen velocitatis: aut cum interdū recurrit. In prima autem, ubi à quiete motus interpellatur, pulsuum novem differentiae inveniuntur.

¶ Primae differentiae inaequalitatis motus, membra.

Sit prior motus celer: alter verò, aut celer, aut tardus, aut moderatus: jam hinc tres differentiae oriuntur. Rursus alterae tres, ubi prior manet tardus, & trifariam secundus variat. Aliae item tres, si permaneat moderatus primus, varietur autē tribus secundus modis. At verò inter non intermittentes distentionem inaequales motu pulsus, quidam velociter motum exordientes, tarditate finiunt: alij contra, tardi sunt initio, celereque semper magis ac magis evadunt: idque horum utriq; habent aut aequaliter, aut inaequaliter. Illorum ergo qui motum aequaliter minuunt, vel augent, quidam ab extrema tarditate ad moderatum motum perveniunt: quidam à moderato motu ad ultimam tarditatem: alij à prima celeritate ad moderatum motum: sicuti & alij ab hoc ad extremam celeritatē. Sunt praeterea qui

utrinq; à moderato motu paululum deflectunt, hiq; bifariam: modo enim celeriores, modo tardiores fiunt, ut sex sint cunctae eorum differentiae, tametsi plures excogitari possint. In solis autem inaequalibus pulsibus qui inaequaliter variant, interdum (licet raro) accidit motus ex tardissimo velocissimus, sicuti & ex velocissimo tarditissimus redditur.

¶ Differentiae pulsuum una in parte inaequaliter inaequalium.

Eorum verò pulsuum qui inaequales cum sint, inaequali in mutatione versantur, interim duae planē, interim tres motus differentiae cernuntur. Nos quartum aliquando, sed obscure animadvertimus. Ubi igitur motus arteriae duas sensibiles differentias efficit, sex erunt formae concursuum: ubi autem tres, quatuor & viginti. Quod autem cum in utroq; disparium motuum insint tres pulsus, velox, tardus & moderatus, ex concursibus eorum nō novem dicamus, sed sex differentias prodire, hac ratione intelliges, si noris, qui eundem bis deinceps pulsus ponat nulla intercedente quiete fieri, unum cum totum aequalem pulsus effecturum. Itaq; de novem comissuris tres detrahuntur, in quibus non inaequalis jam pulsus, sed aequalis redditur, vel celer, vel tardus, vel moderatus: id quod ex tabella evadet apertum. Nam secundus in ea, & quartus, & nonus sunt aequales: celer secundus, tardus quartus, nonus moderatus.

¶ TABELLA.

1	Celer	tardus
2	Celer	celer
3	Celer	moderatus
4	Tardus	tardus
5	Tardus	celer
6	Tardus	moderatus
7	Moderatus	tardus
8	Moderatus	celer
9	Moderatus	moderatus.

Eadem ratione si tribus positis inter se disparibus motibus, in singulis iis ternos pulsus commutatos committas, viginti septem numero formae erunt. Ex quibus tres necesse est inaequalitatem recidant: estq; id etiā ipsum ex tabella planū.

¶ TABELLA.

1	Celer	celer	tardus
2	Celer	celer	celer
3	Celer	celer	moderatus
4	Celer	tardus	tardus
5	Celer	tardus	celer
6	Celer	tardus	moderatus
7	Celer	moderatus	tardus
8	Celer	moderatus	celer
9	Celer	moderatus.	moderatus.
10	Tardus	celer	tardus
11	Tardus	celer	celer
12	Tardus	celer	moderatus
13	Tardus	tardus	tardus
14	Tardus	tardus	celer
15	Tardus	tardus	moderatus
16	Tardus	moderatus	tardus
17	Tardus	moderatus	celer
18	Tardus	moderatus	moderatus

19	Moderatus	celer	tardus
20	Moderatus	celer	celer
21	Moderatus	celer	moderatus
22	Moderatus	tardus	tardus
23	Moderatus	tardus	celer
24	Moderatus	tardus	moderatus
25	Moderatus	moderatus	tardus
26	Moderatus	moderatus	celer
27	Moderatus	moderatus	moderatus.

Itaque tres in his sunt æquales, secundus in tabella, & tertiusdecimus, & vigesimusseptimus. Celer enim secundus est: tardus tertiusdecimus: medius ultimus. Et jam alij duodecim pulsus, in primam tabellam transeunt. Nam primo primæ tabellæ, duo fient similes, primus nempe & quartus secundæ tabellæ, hic tarditatis plus, ille celeritatis habēs. Et tertio, tertius & nonus, ille plus obtinens celeritatis, hic mediocritatis. Quinto undecimus & quartusdecimus, ille majori celeritate, hic tarditate præditus. Sexto decimusquintus, atq; decimusoctavus, hic plus habēs mediocritatis, ille tarditatis. Septimo vigesimussecundus & vigesimusquintus: hic mediocritate, ille tarditate excellens. Reliqui de secunda tabella duo, vigesimus, & vigesimussextus, octavo sunt primæ tabellæ similes, hic mediocritate præstās, ille celeritate. At duodecim secundæ tabellæ reliquos, qui prorsus sunt inæquales, nihil cū illis prioris tabellæ consentire, clarissimū est: in quibus sanè ipsa est ascripta inæqualitas, non quod alij illi duodecim qui conveniunt cum prima tabella inæquales nō sint, sed quod in ternis hi differentiis motuū aperta inæqualitate sint prædicti, cū in binis differentiis eam habeāt alij. Sunt autē, si ordine à primo numeres, quintus, sextus, septimus, octavus, decimus, duodecimus, decimussextus, decimusseptimus, decimusnonus, vigesimusprimus, vigesimustertius: vigesimusquartus.

De tertia differentia pulsuum in una parte inæqualium.

Dicroti pulsus, siue ferientem iterum, non duos, sed unum tantum pulsus existere.

Qui repetentem pulsus, siue feriētem iterum (quem Archigenes dicrotum vocat) duos esse pulsus existimant, hallucinantur. Nam qui in una distentione intermittūt, quanq̃ iterū feriant, non ob id tamen eos dixeris duos pulsus existere. Quemadmodum enim dum malleo ad incudem ex longo intervallo prior valideq; pulsans incutitur ictus, illi secundus mitior accedit, veluti resultante haud ita multū ab incude malleo, recedenteq; in eam languidius & breviori intervallo, sic dicrotæ pulsationes in una dilatatione inæquales oriuntur. Arteria siquidem in occursum quasi repellitur, moxq; redit. Cujus delapsus à primæ distentionis fine nulla dirimit manifesta quies, qualis animadvertitur inter systolem & diastolem, sed simulatq; attolli destitit, ipsa arteria recedit, atq; paulisper vibrata, mox occurrit iterum: id quod etiam vi tractis ramis deindeq; dimissis accidit. Atq; ubi eum vi majori tales pulsus contingunt, ipsius arteriæ partes uno eodemq; tempore, hæ quidem attolli, decidere illæ videntur. Sic itaq; cū gignātur dicroti, differentiæ eorū in illis omnib. quæ retulimus generibus erunt, plenitudinis, duritiei, magnitudinis,

vehementiæ, celeritatis, & his contrariorum, tam in ipso primo motu, quam in reditu ab ipsorum discessu. Nā magnus potest esse & non magnus, sicuti & æqualis & inæqualis: ac sic de cæteris differentiis, quarum sanè cōmutationes, multas species constituunt dicrotorum pulsuum: quorū hæc quidem in una distentione sunt differentiæ, inæqualitate occupante unam partem duntaxat.

De inæqualitate diversarum partium in una distentione.

Inæqualitatis quæ secundum diversas fit partes, primæ differentiæ sunt duæ, juxta quas aut continuus est motus, aut intercisus. Reliquæ ex harum divisione gignuntur. Nam cōtinuus, aut est æqualis, aut inæqualis. Si æqualis, aut remittatur celeritas, aut increseat à primo, sex modis, necesse est, ut paulò antè exposuimus. Inæqualis sunt differentiæ plures, pro pulsus magnitudine longa, vel brevi, vel moderata. Nanque duobus digitis si motus occurrat, sex differentiæ existēt: si tribus, quatuor & viginti: si quatuor, septuaginta octo. Nam cū eorum quæ tres differentiās habent, conjugationes existant viginti septē, si quartū illis accedat, cui tres differentiæ insint, unam & octoginta numero esse ratio postulat. Quibus si tres quæ creant æquales pulsus, eripias, reliqui quidem erunt septuaginta octo.

De differentiis motus interrupti.

Interrupti motus primæ differentiæ sunt quatuor, quarum singularū complures. At quatuor in hunc modum. Aut primus & tertius digitus motum sentiunt, non secundus autē & quartus: aut primus & tertius & quartus, nō autē secundus: aut primus, secundus, & quartus, minimè verò tertius, aut primus deniq; & quartus, secundus & tertius nequaquā. Ubi igitur primus & tertius duntaxat sentiunt, novenæ pulsuum in singulis generibus differentiæ fiunt: ubi verò primus & tertius, & quartus, vigenæ septenæ. Totidē cū primus, secundus, & quartus: at cū primus & quartus, novenæ. Atq; hæc quidem est jam inæqualitatis divisio, quæ diversis in partibus fit. Cōmiscuntur porro variis modis ambæ inter se primæ differentiæ, ut non jam diversas tantum partes, verumetiam singulas teneat inæqualitas.

De inæqualitate quantitatis distentionis in diversis arteriæ partibus.

At verò inæqualitas quantitatis distentionis diversas quidem arteriæ partes occupans, cū animadvertitur crebrò, tū percipitur facillimè, & interrupta, & continua, æqualiter & inæqualiter. In una verò arteriæ parte nō recipit hujus generis inæqualitatem unus pulsus, quod prius quam finem motus attingat, magnitudo minimè deprehendi possit. Siquidem magnitudinis & parvitatis differentiam, nisi jam moveri arteria destiterit, neutiquam cognoscere possis.

Inæqualitatis vitalis contentionis differentie.

Inæqualitas verò contentionis vitalis, eandem distributionem ac inæqualitas motus habet. Nam aut eandem partem: aut distinctas tenet. Eandem tribus modis, aut interrupto motu, aut perpetuo, aut dicroto. Distinctas bifariā, vel cōtinuo motu, vel interciso. Singulorū præterea

Dicrotæ pulsationes quo modo fiant in una dilatatione inæquales.

Dicrotorum differentiæ in quibus cōsistant generibus.

Inæqualitatis pulsuum quæ secundum diversas partes partium differentie.

Interrupti motus in differentiis quæ.

Inæqualitatis quantitatis distentionis in diversis arteriæ partibus.

Inæqualitatis vitalis contentionis differentie.

terea horum generum totidem sunt singulares differentiae quot motus. Quin & commisceri etiam possit una in parte inaequalitates necesse est, ut illas quae in diversis sunt.

De inaequalitate corporis arteriae.

*qualitas
oris arte
esse in
parte
potest in
diversis po-
modis
habet.* Sed inaequalitas corporis arteriae, ex qua pulsus aut mollis aut durus redditur, in una quidem non potest parte fieri: in diversis fieri duobus modis videtur (non aliter ac inaequalitas motus & contentionis) ut aut continuus motus sit, aut intercisus. Quo fit ut differentiae huius generis sint eadem, atque praedictae illorum. Verum arteriae pars una non potest initio esse distentionis, mollis, dura in fine: aut contra primo dura, in exitu mollis. Quare haecenus quidem ab hoc pulsus genere duritiei & mollitudinis, duo genera dissident priora, motus & contentionis.

De inaequalitate ab infusa materia in cavitatem arteriae.

*ualitas
us ab in-
mate-* Pulsuum genus quod efficit infusa materia, in quo quidem pulsus plenus & vacuus est, easdem habet quaestiones ac superius quod quantitate distentionis constabat. Videbitur namque hic quoque obtinere diversas partes posse in uno pulsu inaequalitas: unam autem eandemque non posse. Porro quia evidentius in arteriae sede febris calor qui sit, quam si aliam tangas partem, cognoscitur, ideo probabatur quibusdam, inter alia hoc etiam genus pulsuum annumerari, quo caloris qualitatem pernoscamus. Cujus quidem generis aequalitas & inaequalitas in una distentione versantur. Ac inaequalitatis erunt differentiae, prima, tum quae diversas partes, tum quae singulas tenet. Quas iterum si praedictis rationibus seces, alterae particulares plures nascentur.

De inaequalitate a sede arteriae.

*ualitas
s pulsus
e arte-
profecta.* Est & aliud genus diversum inaequalitatis in uno pulsu, quod a sede arteriae proficiscitur: ubi pars quidem ejus dextrorsum, pars sinistrorsum, pars sursum, pars deorsum deflectitur: id quod accidit aut in duobus locis, aut pluribus.

De pulsu undoso & vermiculante.

*fus pul-
uomodo* Aliud item inaequalitatis unius pulsus genus est, quod vocatur undosum. Ad cuius sane generationem minimè videtur arteria in ea inaequalitate simul distendi universa: sed primo prima ejus pars, deinde secunda, mox tertia, & sic consequenter: idque cum elevatione quadam undosa, altera unda semper priorem excipiente. Prioris siquidem partis arteriae dilatationem, secundae consequitur, ut interveniat pars a motu libera nulla: verum propemodum quieti similis est finis undarum. At non reperias tamen ullam partem prorsus quiescentem. A vermiculante porro hic pulsus magnitudine differt. Neque enim eos qualitas sed quantitas separat. Utrique tamen, omnibusque eorum speciebus aliquid inest commune, sicuti & aliquid proprium commune, unde nomen uterque invenit, undoso quidem, exurgere quasi undas in arteria alteram ab altera: vermiculanti vero, esse vermis gressui consimilem. Differentiae autem eorum hoc modo speciatim fiunt. Quibusdam enim recta fertur unda: quibusdam in obliquum deflectit. Quidam etiam brevi longitudine, altitudinem insignem sortiuntur. Sunt co-

tra, qui longiores altitudinem humilem: aliqui lati sunt, nonnulli angusti, alij etiam pari celeritate praediti, alij secus. Et contentionis haec etiam unda plus, illa habet minus: interim simul est istarum differentiarum inaequalitas. Habent autem utrique hi, tum undosi, tum vermiculantes pulsus, ut tales sint, a sola distentionis inaequalitate ipsius quantitatis. Una enim haec inaequalitas, adjuncto sibi, ut partium motus alter antevertat, alter cunctetur, hujusmodi pulsus gignit.

De pulsu formicante.

Jam vero ut undoso pulsui succedit vermiculans imminuto ita formicans vermiculanti, ubi multis amissis motibus, in unum eundemque prorsus parvum defiverit. Quare inaequalitas ejus praexiguitate nos fugit. Est porro hic pulsus parvus (quo nec alius est minor) languidissimusque & creberrimus: non tamen (ut quibusdam visus est) celer.

De vibrato & convulso pulsu.

Superiunt autem vibrati & convulsivi, qui haecenus quidem sunt inter se similes, quod unum locum arteria non teneat, sed sursum deorsumque agitur, naturali sese deserta. Distant tamen vel hoc ipso, quod non adeo is affectus in convulsivo vos cadat: in vibratos magnoperè, admodumque perspicue: ac praeterea, quatenus ex terminis utrisque retrahi, contendique & convelli convulsivi videntur. Vibrati omnino vacanti. Ad haec magna frequenter est dilatatio vibratis, at convulsivis parva. Et partes arteriae quaedam superiora petere, quaedam demitti uno eodemque tempore aperte in vibratis cernuntur: convulsivis vero id perpauca & obscure accidit. Breviter senitas vel uti fidem quandam intensam in convulsivo pulsu, quae illi res cum nullo alio convenit. In vibratis nihil simile animadvertas. Maximè enim jaculis motum eorum, quae magna vi emissa, celeri impetu vibrantur, assimiles. Omnes autem hosce pulsus qui praeter quinque illa prima genera in una distentione inaequales sunt, horum duorum accessio constituit, quae sunt, genus inaequalitatis in arteriae sede, & cum maturius aut serius motum partes auspicantur.

De pulsu caprizante.

Pulsus etiam caprizans inter inaequales in uno pulsu refertur: estque etiam compositus, expers tamen inaequalitatis utriusque, quae primis quinque generibus adjuncta erat. Verum ubi motum arteria interpellat quapiam in parte, tum potissimum generatur, licet non semper, sed ubi motus a quiete alter celerior primo & vehementior oritur.

De inaequalitate crebritatis, raritatis & rhythmici, in diversis pulsibus: quae collectivam inaequalitatem appellant.

Ubi omnia ordine aequa ictuum sunt intervalla per omnes pulsus, aequalem dicitur haud ab re tunc pulsus esse: ubi vero partim majora, partim minora, inaequalem in crebritate, raritateque. Rhythmicum jam etiam eodem modo ex portione temporis ictus ad intervalli tempus constantem, cum deinceps maneat eadem, aequalem eum esse ajunt: quemadmodum inaequalem, ubi talis proportio variatur.

*Undoso pul-
sui succedit
vermiculans
vermiculanti
pulsui suc-
cedit formi-
cans.*

*Formicans
pulsus est om-
nium mini-
mus, non tamè
est celer.*

*Convulsi
pulsus.*

*Vibrati pul-
sus.*

*Caprizans
pulsus quan-
do gignatur.*

*Collectiva in
aequalitas.*

*Inaequalitas
in crebrita-
te, raritateque
secundum di-
versos pul-
sus.*

*Rhythmicus
quado aequa-
lis, & quan-
do inaequalis
dicatur.*

De inaequalitate crebritatis, raritatis, rhythmiq, in uno pulsu.

Inaequalitas crebritatis, raritatis & rhythmi, in uno pulsu contingens examinatur

Partes arteriae aut omnes una motum exordiuntur, aut haec quidem maturius, illae autem tardius. Si igitur moveri omnes simul coeperint, postea autem motae, minus æquis temporibus dilatationem alteram aggrediantur, duorum generum in uno pulsu inaequalitas erit: quod videlicet illa sit quidem cognita, ubi primum secunda distentione coepit, in secunda tamen ipsa minimè cōtineatur: sicuti neque ipse *rhythmus, nec genus crebritatis, & raritatis, cum & haec ipsa fiant in uno pulsu, *quamvis ut cognoscantur, omnino secundum desiderant: quandoquidem ante huius initium, prioris nequit finis cognosci: quo incognito, nec crebritatem, nec raritatem, nec rhythmum valeas cognoscere. At verò tempus partis quæ *præ cæteris prima motu deficitur, minimum est: maximum ejus quæ ultima: proportionem autem media, in quantum aut à prima, aut à postrema absint. Contra ac tempore motus, quietum tempora, longiora sunt illis quæ prima à motu desistunt: in illis quæ postrema, breviora. Quare tempus motus quem habuit pars, quæ prima moveri desuit, minimum, cum maximo tempore quietis ejusdem comparatur. Et ultimæ tempus, quod maximum erat omnium motus temporum, ad minimum confertur quietis ejusdem partis. Atque ita rhythmus in singulis commutatur, quatenus proportio temporis motus ad quietis tempus non eadem in omnibus manet. Si itaque dilatatio quidem prior, in omnibus simul partibus auspicetur motum, sed non pari in omnibus tempore: secunda autem deinde & ipsa motum incipiat, non tamen simul omnium partium, sed prius quidem ejus quæ prior quieverat, secundo autem illius quæ secunda, atque ita deinceps: inaequalitas quidem ita rhythmi fiet, crebritatis & raritatis non item. Nam quies cum in omnibus æqua sit, differentiam in crebritate & raritate efficit nullam: non respondet tamen motus tempus, tempori quietis. Siquidem motionis tempus non erat omnibus par: quietis erat, ac proinde non idem omnibus rhythmus erit. Quod si cum moveri arteriae simul omnes partes coeperunt, non item simul omnes alteram distentionem ordiantur, nec priorem terminaverint simul, sed ne quies quidem in omnibus æqua sit, binas in eo necesse est differentias esse. Nam crebritatis & raritatis in alterutra differentia inaequalitas fit, at non rhythmi tamen necessario. Possunt quippe omnium partium tempora motus, quietum temporibus respondere. Et si hoc, erit quidem rhythmus æqualis. Sin autem eadem in omnibus partibus proportio non constet, simul perdetur rhythmus. Jam verò ubi una omnes partes moveri coeperint, motaeque æquo sint tempore, si secunda dilatationis non idem omnes initium partes ordiantur, sed quaedam maturius, quaedam inceperint serius, non erit jam rhythmus æqualis, nec crebritatis raritatisque differentia. Hanc enim impares quietes inaequalem efficiunt: rhythmum verò, proportionum commutatio. Ac tot sunt inaequalitatis utriusque uno in pulsu generis differentiae, cum omnes una partes arteriae disten-

Rhythmi inaequalitas quomodo fiat.

Rhythmum efficit inaequalem proportionis commutatio.

di coeperint. At ubi haec primò, illa secundo distendi coeperit, si omnes simul quieverint, ac dein distentionem unam alteram auspicatae sint, necessario inaequalitas in altero tantum genere fiet rhythmi. Quod si alteram distentionem arteria juxta orsa sit, ac priorem, ut in utraque distentione eadem pars prior altera pari intervallo incipiat, idque sit in omnibus partibus constans: atque illae etiam simul priorem distentionem absolverint, *necessario utique in utroque genere inaequalitas erit. Nam omne tempus quod est ex motu & intervallo conflatum, omnibus est æquabile arteriae particulis. Sed motuum proportionem, quod totum tempus in æquas partes non distribuatur, non respondet proportionibus quietum. Quare simul inaequalis rhythmus necessario erit singularum partium: & quatenus tempora intermissionum differunt, etiam crebritatis raritatisque coniungi cum iis inaequalitatem est necessarium. Si verò altera distentione, perinde ac prior fecerat, initium motus partium sit orsa, non sit autem prioris distentionis finis omnibus idem, duae differentiae orientur. Potest enim & longè quidē quiescere prius, quæ prius motum est auspicata: potest etiam posterius. *Si igitur tantò quieverit prius, quantum coepit, fiet ita æqualis in utroque genere pulsus. Sin multò prius atque est auspicata quieverit, duorum generum inaequalem pulsus efficiet. At si quæ prior coepit desistat posterior, duorum generum omnino inaequalitatem creabit: si videlicet aut multò tardius, aut paulò, quieverit. At verò si nec prioris distentionis initium ex omnibus simul partibus fiat, neque secunda, est cum rhythmus possit esse inaequalis, nec non crebritatis & raritatis genus. Verum si sic motuum tempora temporibus quietum respondeant, rhythmus æqualis erit. Si verò tempora sola paria fuerint intermissionum, æqualitas erit in altero genere. Sed haec infrequentia sunt: inaequalitates verò permultae. Nam omnes possunt simul partes à motu cessare, & non simul. Et cum non cessant simul, haec prius, illae posterius: jam etiā vel longè prius, vel longè tardius.

GALENI PERGAMENI de differentiis pulsuum, lib. II.

Non eundem usum hic liber pollicetur, ac primus: sed quam veratrum rationem habet, vel scammoniū cum pane, & carnibus eandem quæ nunc dicemus, cum superioribus habent. Nutrire enim mentes illa sanas, haec rescare pravas sententias valent, ut morbos quosdam. In primis autem mihi cum sophistis est bellum circa usurpanda nomina. Illi quippe ipsas res negligentes, barbaras quasdam voces, undique citra delectum contractas, Graecorum commiscent nominibus: neque iis sanè integris, legitime, sed corruptissimis: atque ita nobis aures obtundunt, qui perpetuò sumus solliciti, ut nominibus quam purissimis sensum interpretemur: ut clarissime quis mentem suam possit significare, ita sermone uti eum optime, existimantes. Ad haec verò, illi priusquam homonymiam distinxerint, singula definire conantur: unde necessum est eos quam turpissime hallucinari. Neque enim nominum sunt, sed rerum definitiones. Proinde quando

Sophistae ipsas negant, de nominibus an & solliciti

definitio sunt rerum

non non

quando ab uno nomine res indicantur multæ, tot definitiones, quot res, necessariò desiderantur. Ubi verò unius rei plura nomina habentur, una tantum definitione est opus. Porro ubi Archigenes etiam de octo qualitatibus pulsuum temerariam illam suam nobis sententiam protulit, debuisse aliquam addere, si non firmam demonstrationem, at certè rationem validam: ut ne quis initio statim, veluti in Mosis & Christi scholam impingens, leges audiret nulla stabilitas demonstratione. Olim etenim homo duarum linguarum peritus, ostendebatur digito, omnibusque erat admirationi. At sophistæ hodie nos multas ediscere volunt, cæterum barbarissimas, cum tamen præstaret ipsos doceri unam græcam adeò ornata & culta, præterea communem omnibus, ac plenam humanitatis. Qua quidem si imbutus fueris, nequaquam ut illi fateberis, omnia prima genera pulsuum, qualitates existere. Siquidem inter differentias ipsorum referri tum magnum, tum parvum, tum medium constat: necnon longum, brevem, latum, angustum, atque alios denique aliter nominatos: quorum quidem omnium unum esse commune genus consistens in qualitate, nemo sanæ mentis fateatur. Quippe ipsius magni pulsus & parvi, non qualitatem, sed aut quantitatem, aut ad aliquid, aut conjunctam cum ad aliquid quantitatem esse genus, rationi consentaneum videtur. Neque enim sumus nescij multis generibus esse commune Ad aliquid. Siquidem albius & nigrius sunt in coloris genere. Atque color qualitas est. Jam superius & inferius etiam in genere Ubi: maturius item & tardius, in genere Quando. In aliis etiam pluribus generalibus prædicamentis, versatur Ad aliquid. Proinde mirum non est, si in prædicamento quantitatis illi adsit etiam locus. Quare optimè sanè valeas moderatum pulsuum, qui desideratur, ostendere, si exquisitè moderatū cognoris. Cæterum in majori pulsu, qui videlicet moderatū excellit, satisfuerit constituere quinque aut sex differentias. Etenim illum qui omnes superet, maximum appellabimus. Qui medius est inter maximum & mediū, simpliciter magnum. Jam interponendi huic & illi utrinque bini alteri: unus paulo major moderato, alter qui magno paulum concedit. Alius item qui magnum superet: sicuti & alius qui sit proximus maximo. Dicimus itaque maximum & parvum pulsuum, sub prædicamento Ad aliquid esse, & quantitatem significare: inesseque utrique magnitudinem, ut magno magnam, ita parvo pusillam. At longus dicitur, qui longitudine excedit medium: latus, qui latitudine: altus, qui profunditate: quorum intelligitur nullus in tribus dimensionibus arteriæ, citra quas nulla magnitudo constiterit. Siquidem quantitas unius extensionis, non magnitudo, sed longitudo est: ex qua nonnullos longos & breves dicimus, non magnos vel parvos. Nec verò ita lineam unquam appellamus, sed aut longam, aut brevem. Verum corpora quæ trinam dimensionem sortiuntur, ea magna & parva appellamus. Proinde pulsus qui ab una dimensione cognominantur, à magnitudinis quidem genere rejiciuntur: sub eo autem qui secundum quantitatem est, continentur. Ubi igitur

à proportionem tres illæ dimensiones discedunt, atque aliqua vel aliquæ illarum minuuntur, vel superant, quatuor & viginti pulsuum differentia nascuntur: quas nos, quò vigintiseptem esse obtinenti tres dimensiones pulsuum differentias ostenderemus, cum prædictis tribus in tabella proposuimus. Quibus omnibus unum commune genus, quantitatē scilicet distentionis arteriæ, invenimus. Quod si liceat etiam contractionē tactu discernere, & in hac quoque reperiatur totidē differentia. Enimvero qui nullū ajunt longū se simpliciter pulsuum posse animo comprehendere, cum omnino is aliqua sit præditus latitudine & profunditate, mihi rudes primarum disciplinarum videntur: quandoquidem nec magnū etiam sic concipere possent, quod videlicet is simplex non datur, nisi simul celer vel tardus, vel vehemens, vel languidus, vel particeps sit aliarum differentiarum. Etenim quæ sine aliis esse non possunt, nonne mera fatuitas est, ne cognitioni quidem repræsentari citra illa profiteri? Porro ex unica dimensionem pulsus, multa nos cognoscere possumus. Nam ut certā rem demonstrare magnus pulsus potest, ita etiam altus solus, non simul cum ipso conceptis aliis dimensionibus animo. At verò pulsus binarum dimensionum, nec ad viam & rationem quicquam faciunt eorum, qui trinis simul dimensionibus intelliguntur, & à dividendi sunt methodo abducti. Porro ubi ex omnibus differentiis volumus intelligere compositū ipsum, tunc ars jubet, ut propositæ rei totam perspiciamus naturam. Eam itaque nos in simplices differentias resolvimus, quod absque eo, compositum exactè intelligi nequeat. Nisi verò totam rei naturam in unum complecti, neque in una differentia & simplici consistere valeas, nulla erit ars, nulla via, vel ratio, nulla denique utilitas. Quamobrem nos primum pulsuum universam naturam diduximus in differentias, quæ ipsam constituunt: atque hanc quantitatem distentionis vocavimus, illam qualitatis ictus, aliam qualitatis tunicæ, aliasque ordine commemoratas. Deinde in his rursus simplices notiones investigavimus: ut quam habet rationem differentia quantitatis distentionis ad totam pulsuum ex omnibus conflata naturam, ita inveniatur aliud, ad hanc ipsam se similiter habens. Sunt autem differentia omnes uniuscuiusque dimensionis, aliarum omnibus copulanda: ut in unaquaque binarum dimensionum copulatione existant novem differentia, omnes vigintiseptem. Adscribam unā, postea de reliquis etiam licebit discere.

Pulsuum differentia vigintiseptem.

Compositum non posse intelligi absque ipsius resolutione in simplices differentias.

1	Longus	latus
2	Longus	moderatus
3	Longus	angustus
4	Latus	moderatus
5	Moderatus	moderatus
6	Angustus	moderatus
7	Brevis	latus
8	Brevis	moderatus
9	Brevis	angustus.

In hac ergo tabella tres longitudinis differentias coplicantes cum tribus latitudinis, novē ef-

ficimus differentias. Altera erit eodem modo tabella, cum tribus longitudinis differentiis, conjunctas profunditatis tres habens. Tertia præterea, in qua profunditatis tribus, copulabuntur tres latitudinis. Erunt itaque omnes differentiae vigintiseptem, cum singula tabellæ novem contineant. Cæterum hos omnes pulsus, qui concipiuntur bini, ob dictas causas omisimus: tradidimus autem eos, qui singulis dimensionibus intelliguntur, numero novem: atque eos qui trinis simul, quos in tabella descripsimus, vigintiseptem: quorum omnium fecimus commune genus quantitatis distentionis. Porro excessus pulsuum atque defectus, qui una dimensione intelliguntur, à principio dividere poteris: ut in magno nobis est demonstratum. Nam moderati soli singulis generibus indivisibiles sunt: alij autem, plures divisiones recipiunt, ac sua quidem natura infinitas. Quod enim genus majorem & minorem excessum & defectum obtinet, infinitas necesse est differentias sortiatur, non tamen secundum sensum. Ergo esse quoddam genus pulsuum, qui in quantitate distentionis consistunt, satis ostensum est. At quandoquidē celer quidam est, & tardus, & moderatus, in arteriæ motu pulsus: atque horum commune genus qualitas est motus: num aliquod invenire commune genus valeamus qualitatis & quantitatis, nobis est attendendum. Quod si nequeamus, in prima referemus genera, tum quantitate distentionis, tum qualitatem motus. Cum autem qualitas motus differat à qualitate corporis ipsius arteriæ, certè qualitatis prædicamentum commune erit utrique generi: tamen genus haud item ambæ qualitates ullum commune obtinent. Nam per homonymiā utraq; affectio qualitas dicitur. Neque enim eadem est in ambabus qualitas, sicuti in albo & nigro, atque frigido & calido. Genus autem pulsuum in quantitate distentionis, à genere motus, corporisq; arteriæ, planè distat: quantitas siquidem à qualitate dissidet: atque idcirco etiā à genere contensionis, necnon à rhythmo, & à genere ordinis & perturbationis illius, sicuti & à qualitatis inæqualitatisq;. Quæ quidem prædicamento Ad aliquid attribuuntur omnia. Proinde superest, ut illud cōparemus cum genere crebritatis & raritatis: nam hoc constituere videtur quantitas temporis quietis. Sed sub idem sic rursus prædicamentum reducuntur: genus amborum tamen non erit idem. Nam genere toto quantitas dimensionis corporis, à quantitate abest temporis. Ac nullum sanè esse, apertum est, in pulsibus genus altius, quantitatis genere distentionis. Verum differentia ipsæ interdum quidem atque communiter accipiuntur, tum pro generibus, tum pro speciebus: peculiariter autem pro illis quæ in divisionibus reperiuntur, quæ nec species sunt, nec genera. Differentia tamen nomen potest omnibus assignari qualitativis, quantitativis, relationibus, & uno verbo, universis. Nam ab eo quod differat unum ab altero, nomen differentia factum est & conceptum. Differunt autem quædam statim primis generibus prædicamentorum, ut homo, album, bicubitale, dextrum. Nam unum illorum est substantia, alterum qualitas, aliud quantitas, aliud Ad aliquid. Quædam subiectis

generibus sub his: ut album & triangulare. Color enim, illius est genus: hujus figura. Hæc rursus ambo prædicamento subiecta sunt Qualitatis. Itaque albo primū prædicamentum cum triangulari convenit: est enim utrumque qualitas: cæterum generis sunt diversi, hoc figurarum, illud colorum. Alia jam specie differunt, cum non differant genere: ut album & flavum. Similiter alia differunt numero: ut, gratia exempli, album ab hoc albo, peculiari quadam differentia dissidet, sed eidem speciei subditum est, albo: præterea utriusque idem genus est color, & commune prædicamentum Qualitas. Atque ita sanè quodlibet à quovis, alterum ab altero prorsus aliquatenus differt. Quando igitur differentia à differendo appellata est, & inventa: differre autem tum individua, tum species, tum genera inveniuntur sub alterna, & semel omnia quæ aliquo modo sunt: differentiaque rebus omnibus inest, non autem qualitas: malè utique Archigenes prima genera differentiarum pulsuum, qualitates vocavit: nos autem rectè, atque ordine, cum hæc, tum alia omnia, differentias. Quare etiam universo operi titulum fecimus, De differentiis pulsuum.

GALENI PERGAMENI

de differentiis pulsuum, lib. III.

S I amor sapientiæ atque honesti singulis juxta placeret (ut ait tragicus) nulla foret mortalibus contentio ambigua. Nunc quia non videtur omnibus idem nec honestum, nec sapiens esse, neque etiam verum, necessario controversia nascitur. Cæterum qui in dubia opinione versatur: quod non assequatur scientiam, ei condonandum fuerit. At qui de nominibus digladiantur, nec ullum hic faciunt finem aut modum, minime mihi venia digni videntur. Nam rerum cum sit ea obscuritas, ut si vel in triplum hæc vita nostra prorogaretur, ne tum quidem exactè cognoscere omnia possemus (qua ratione adductus Hippocrates, vitam ait esse brevem, & artem longam) quo modo, qui in iis quæ ab re sunt tempus conterit, absurditatis impudētiaque notam abjicit? Etenim de nominibus laborare est prorsus operam ludere: res autem ipsas expendere, artes locupletare. Perinde siquidem est si vocemus ipsum pulsuum Dionem: dicamus autem illum dignosci exactè, si comprimamus arteriam, nec leviter attingamus: necnon pulsuum proficisci à robore facultatis vitalis, esseque signum salubre in morbis: & præterea quales indicationes soleat promittere. Porro ipsius robur ictus, in tactus impulsu, repulso, subversioneque positum esse, omnibus in professo est: at à qua causa fiat, controversum existit, unusquisque siquidem propriam opinionem tuetur. Citius autem Mosis asseclæ & Christi sua deserant dogmata, quam qui sectis addicti & consecrati sunt, tum medici, tum philosophi. Itaque inter pulsus est quidam, qui tactum ipsum subvertit: id est, valde & cum renixu quodam pulsat. Dignoscitur autem is, ubi plurimum infigimus digitos, non leniter palpamus. Causa ejus existit, facultatis robur pulsus efficientis. Proinde si de medicis vocabulis primò omnis nostra potestas sit instituendis,

Moderati
pulsus soli
singulis gene-
ribus indivi-
sibiles sunt.

Differ-
entia
nomen
sit dicitur

Pulsuum
differentia
genera
ma, A
nes ven-
qualit-
sacra

Contro-
versia
scatur.

Vita bre-
vis long.

Differentias
interdum ac-
cipi pro gene-
ribus specie-
busq;
Differentia
nomen qui-
bus possit ac-
commodari.

Pulsuum p-
ficisci à ro-
re facultatis
vitalis.

Robur ip-
sius, in q-
nam posita
sit.

Christiano-
rum consue-
tudinem sum-
Galenus ex-
primit.

tuendis, contentum eum pulsum, non vehementem vocemus. Nunc quia à pluribus jam pridem vehemens est vocitatus, nomen nihil mutamus: tamen si non sumus nescij, vehementiæ nomen actioni semper tribui, contentæ simulatq; citatæ. Jam verò dum vacuum pulsum appellant, cum nihil omnino vacuum in orbe detur, bifariam illum interpretabimur. Nam aut arteriam sic intelligemus vacuum, ut quæ aërem tantum contineat, & quanquam sit plurimum inflata & distenta, vacua tamen sit appellanda, ut inflatus culeus vacuus dicitur vino: aut ita illam vacuum esse dicemus ut utres ipsos, quādo aëre expulso, eorum tunicae confidunt. Ac prima sanè significatione erit pulsus talis, qualem Erasistratus natura eum semper asserit esse: altera nihil à parvo differet. Itaq; necessum videtur, ut aut parvum pulsum, aut aëreum, vocemus vacuum: itemq; contrarios iis plenos, magnum scilicet, atq; eum qui humidam speciem refert. Præcipue tamen infusæ substantiæ ratione appellare licebit plenum aut vacuum vas: ratione autem tunicarum arteriæ, aliter: quas rectius sanè duras & molles, non plenas vel vacuas appelles: cum simile corpus (nisi per metaphoram, quæ à disciplina artificiosa ableganda est) quod vacuum vocetur vel plenum, sit nullum. Quādoquidem autem omnia corpora, ex terra, aqua, igne, & aëre conflata sunt: in quibus exuperat quidem vel terre elementum, vel aquam à gelu concretum, non possunt ea non dura esse: in quibus verò igneum, vel aëreū, vel humidum elementum excellit, non concretum, necesse est ea mollia existant. Præterea si prædita foraminibus sint, vel meatibus, si superior ibi sit terrestris substantia, vel aquosa concreta, facit necessario ad totius duritiem corporis: si subtilis vel humida, sed non concreta, ad mollitiem. Est autem in nobis tactus iudex corporis duri mollisq;. Quē quidem dum applicamus objectis, quæ offendimus illum admittere, & quasi subeunti cedere, mollia appellamus. Contrā, quæ vim afferunt cuti nostræ, & protrudunt, si hæc cedens urgentia intus excipiat, dura illa vocamus. At si omnino cedat & deiciatur ab urgente, id quod concidit, imbecillius omnes: quod deiecit, validius appellant. Porro Aristoteles elimatius quā Plato non id quod cedit, appellat molle: sed ei addit, modò, quod in seipsum: modò, quod loco non dimoveretur. Quod si simul utrumq; addamus, ut in secundo libro de Generatione & interitu Aristoteles fecit, ac molle dicamus esse, quod in seipsum cedit, nec migrat aliò, adhuc definiemus apertius: utrumq; siquidē soli accedit molli. Nam cedere quidem, cōmune symptoma est mollis, & imbecilli: at in seipsum, solius est mollis: ut nō in seipsum, imbecilli tantum. Præterea, ut in vicinum locum migratio, propriū infirmi est: ita nō demigrare, unius mollis. Jam verò, ut tangibile est corpus durum, sic durities est qualitas tactilis. Siquidem qualitates tactiles sunt, calor, frigus, humiditas, siccitas, gravitas, levitas, durities, mollietates, lentor, friabilitas, asperitas, levor, crassities atq; tenuitas. Quæ omnes exprimi tangibiles qualitates possunt, & corpora non secus

iis prædita. Quippe horum pariter septem sunt oppositæ conjugationes, & nomina quatuordecim. Prima est oppositio calidi & frigidi. Secunda, sicci & humidii. Tertia, gravis & levis. Quarta, duri & mollis. Quinta, lenti & friabilis. Sexta, asperi & lævis. Septima, crassi atq; tenuis. Durum igitur corpus, quod sic propriè & primariè appellatur, renititur, & nihil tangenti cedit. Quia verò multa corpori duro accidunt, unumquodque eorū metaphoras nobis suppeditat: inter quas sanè ut repudiamus obscuras & tectas, sic probamus illas, quæ apertam illustrēq; similitudinē præ se ferūt. Ut, dum legem duram & iudicē dicunt, qui à venia danda sunt omnino alieni. Corpus itaq; arteriæ, vel durum, vel molle primò & præcipue est dicendum. At pulsus ejus statū denuncians, non propriè, nec primò, sed per accidens venit durus aut mollis vocandus.

Tabellam corporum septem oppositones.

Durum corpus simpliciter.

Metaphora quæ nam sint recipienda.

Pulsus dici durum aut mollem ex accidens.

GALENI PERGAMENI

de differentiis pulsuum, lib. IV.

At verò, ubi etiam ante definitiones, ipsæ res notæ existunt, nullus profectò est usus definitionum: quemadmodum in pulsus appellatione, quam intelligunt etiam omnes mortales, nedū medici. Proinde inculcandi sunt, qui circa definitionem pulsuum inter se maxime digladiantur, alij aliud esse pulsum sentientes. Sunt porro definitionū prima genera duo: alterum quod planè rei notionem explicat: alterum, quod ipsam essentiam docet. Virtus est suæ utrique definitioni: illi quæ notionem explicat, ut omnibus sit testata, qui eodem sermone utuntur, & ad rei essentiam ne aspiret. Huic quæ essentiam docet, ut ei quæ notionem subicit, cōsentiat, non sit tamen cum ea eadem. Ac prima quidem debet ex seipsa fidem habere, res perspicuas explicans, manifestasq;. Unde Aristoteles eam definitionem nominis appellavit: sicuti alteram esse definitionem ait, quæ quid sit, explanat. Etenim quibusdam in partibus cutis, nō modò tactu, sed etiam oculis, motum quandam percipimus. Qui quidem in iis qui rectè se habent, in multis corporis partibus cernitur: de quibus est carpus manus. Palam siquidem illic deprehendimus ascensum quandam atq; descensum, præterea mediam intermissionem. Quam sanè motionem omnes pulsum appellant. Hunc qui brevibus possit interpretari, optimè definitionem ille notionis effecerit, si nec omittat quicquam, nec superflui aliquid addat. Ut si dicat, eum talem motum, esse arteriarum pulsum. At si quis tunicas arteriæ explorarit, facultatēq; repererit quæ arteriarum motionem excitat, ipsiusq; motionis vsum cognorit, is certè ut prætergressus notionem est, sic universam essentiam pulsum generationis tenuerit. Verū tamen ista quidem nequeas definitione universa completi. Unde fit, ut nulla pulsum definitio prorsus essentialis constitui possit: aut certè prælonga erit. Sensibilis itaq; ille arteriarum motus (quem quiete interpellari diximus) pulsus vocatur. Nihil autem apertius est, quā motum ipsum in altum, latum & longum extendi, in gracilibus corporum, atque in maximis pulsibus. Ceterum

Definitionū prima genera duo, notione & essentiali.

Definitio nominis. Definitio quid sit explanans.

Arteriarum motus in carpo esse oculis perceptibilis.

Pulsus essentialis definitio, quæ breviter sit, nulla constitui potest. Pulsus quid.

*Pulsus usus
est tutela in-
nati caloris.*

*Arteria at-
trahit dum
dilatatur:
expellunt
dum contra-
hantur.*

*Pulsus defi-
nitio essentia-
lis.*

*Convulsio &
tremor, in so-
lis consistit
nervis.
Palpitatio-
nem, fieri es-
t in cute.*

*Rarum &
crebrum dici
pulsus, ut re-
spirationem,
pro differen-
tia quietum
interciden-
tium motib.*

*Pulsus esse
mixtum mo-
tum, ait Ze-
no.*

*Definitio re-
rum qua in
generatione
consistunt,
qua habeat-
ur optima.*

integram pulsus definitionem feceris, si usum eo-
rum generationis adjunxeris, quæ tutela innati
caloris existit. Facit autem ad procreandum ani-
male spiritum, illa spiritalis substantia, quam
arteriæ continent. Atque attrahunt quidem arte-
riæ, dum dilatantur: excernunt autem dum con-
trahuntur. Igitur definitio essentialis, quæ ora-
tio est rei essentiam edocēs, necessario est genus
explicatura, & differentias, & usum generatio-
nis: causam item efficientem, & materialem, aut
instrumentalem, aut utcumque appellare volue-
ris: ut Genus, aut motum, aut actionem, aut pas-
sionem arteriarum. Differentias, quod per disten-
tionem & contractionem, quodque sponte. Usus,
quod innati caloris nomine, vel spiritus vitalis
gignendi, aut herclè etiam animalis. Causam ef-
ficientem, quod vis sit quædam cor distendens
& arterias, aut vitalis, aut animalis, aut utraque.
Materialem denique & instrumentalem, confor-
mationem arteriarum ad actionem, videtur de-
monstratura. Atque ita suam quæque secta rationa-
lis, sortiretur definitionem. Nos verò dicemus
pulsus esse peculiarem actionem, cordis præci-
puè, deinde arteriarum, quæ distentione & con-
tractione moventur à facultate vitali, quò calo-
ris nativi mediocritas retineatur, generetur au-
tem in cerebro spiritus animalis. Verum apud ty-
rones cujusvis disciplinæ, minimè sanè proferen-
dæ substantiales definitiones sunt: sed ubi à no-
tione exoritur, ad essentiam eos notitiam ducemus,
hic jam, promptæ memoriæ gratia, rem univer-
sam limitata complecti ratione fuerit expediens.
Cum valemus igitur, cordis & arteriarum mo-
tus, quando illa distenduntur undequaque, rur-
susque in se confidunt; pro dignitate obeuntur.
Sic autem ægrotemus, ut palpitans, vel concu-
tiens, vel convulsivus, vel tremulus motus arte-
riarum appareat, nil novi est, si pulsus vocemus
modò convulsivum, modò vibratum, interdum pal-
pitantem, interdum tremulum. Quamquam cer-
te convulsio ipsa tremorque, in solis contingit ner-
vis. Nam palpitatio perspicue etiā fieri in cute
cernas: sicuti & in carnosissimis partibus, quæ por-
tiones sunt musculorum. Porro quietes pulsus lon-
gè obscuriores sunt, quàm respirationis: ob idque
nonnulli eas inter partes pulsuum minimè annu-
merarunt. Quiescit autem thorax & pulmo id tem-
poris quod intercedit inter ingressum spiritus,
& ejusdem exitum. Ac pro tempore quidem ha-
rum quietum, raram appellant, vel crebram re-
spirationem. Similiter dicuntur rarus & creber
pulsus: suntque unà cum æqualitate sua & inæ-
qualitate, cumque ordine & illius perturbatione,
ex eorum genere, quæ non parva nunciant. Iti-
dem intermittens pulsus & intercurrentes, ex eo-
dem hoc genere, futurorum sunt haud negligenda
signa. Non perperam autem Zeno mixtum
quendam motum ait esse pulsus, non simplicem,
neque uniformem: cum ex contrariis motibus con-
stet, ut motus respirationis. Porro quod comu-
ne est omnibus pulsibus, id debet in definitione
proferri: nempe res per quam pulsus concipiun-
tur, dicunturque, non per quam certi quidam pul-
sus. Ad hæc, rerum quæ in generatione sunt, de-
finitio causam efficientem complectens, optima

habetur: de quibus est pulsus, qui ut ceteri mo-
tus, dum fit, est. In universum igitur, definitione
quidem significationem explicare propositi no-
minis, si quidem proposita rem non omnes pla-
nè assequantur, non dico conducit, sed necessa-
rium est. Necessarium etiam, ubi quis vel versu-
tia de industria, vel præ stupore imprudens, signi-
ficationes commutet nominum, tribuens aliis rebus,
ac omnes homines. At si absque utroque horum sit,
omnino res non est aperienda definitione: quod
suum ipsam nomen abundè declararet. Nam defini-
re omnia velle, ad sophisticam pertinet disci-
plinam.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus, liber primus.



Peculatio autem hæc quæ ad pul-
sum dignotionem spectat, minimè
quidem orationem prolixam deside-
rat, sed tempus aliis simul omnibus
longius: quandoquidem tactu est
nobis opus exercitato, ut vel parvam eorum ex-
actè differentiam sentiamus: nec in nostra manu
est illius exercitatio. Itaque ad exercendum tactum
medicus plurimum temporis postulat, ut pote cui
plurimi uno eodemque tempore affectus arteriæ
sint perpendendi: primum distentionis quantitas:
dein qualitas & tempus motus: quin & moven-
tis facultatis contentio, ac denique ipsius tunicæ ar-
teriæ status. Hæc enim simul atque illa attollitur,
omnia sunt cognoscenda. Quinetiā caloris qua-
litatem, impulsus, qui in arteriæ motione fit, a-
pertius indicat: & etiam æqualiter an inæquali-
ter illa quæ memoravimus omnia, una in parte
& in diversis fiant. Atque in distentione hæc con-
sideranda sunt. In contractione sanè similia illis:
præterea tempus inter utranque mediū, quo quie-
scit, duplex illud: unum à distentione ante contra-
ctionem: alterum à contractione ante distentionem:
& horum mutua proportio, videlicet temporis
motus ad tempus motus, temporis quietis ad
tempus quietis, & utriusque simul ad utrumque. Quæ
sunt universa ante alterum arteriæ ictum cognos-
cenda, cōfecto jam primo pulsui. Nam cum jam
alter incœperit, cum ipso prima sunt attenden-
da, quæ declarata in priori fuerunt: tum verò quo
æqualitatem eorum & inæqualitatem perspicias,
omnesque differentias, quæ in illo sunt exposita,
cum iis quæ in hoc, conferenda sunt. Inde tres,
quatuor, quinque, atque adeo multi deinceps
sunt pulsus videndi, ut ordo tibi atque confusio sit
explorata. Ad quorum omnium absolutissimam
cognitionem, totam humanam requiri vitam exi-
stimo. Quamquam certè exercitatio assidua, usum
tandem scientificamque cognitionem conciliat,
cum maximo emolumento: ubi quispiam fuerit,
ut veritatis studio accensus, sic ab immensa divi-
tiarum siti, ac gloriæ cupiditate (quæ hodie do-
minatur inter mortales) alienus. Neque verò deli-
ciis deditos, sed egregiè navos industriosque, hæc
cōmendatio desiderat. Porro dum pulsui admo-
vetur manus, hic quidem firmitus est infigenda,
illic applicanda levius, ut in vehementi & lan-
guido pulsui. Nam illum, nisi premas arteriam,

non

non dignoscas: hunc tantum abest ut cognoscas premendo, ut semel etiam si ita facias, videatur immotus. In convulsivo autē pulsu, aut minimē sentiri distētio, aut parum certē & obscurē videtur: arteria nimirum ipsa in fide modum sursum deorsumque jactata. Similiter etiam fit & vibratus pulsus, ubi arteria propriam sedem deseruit. Si tamen animum intendamus, non modō ictus (ut opinantur Empirici) sed distētio etiam omnium pulsum, tactu ipso cognoscitur. Quod autem contractio etiam sentiri possit, his rationibus evadet perspicuum. Quandoquidem tangentia corpora partim leniter sese ac mutuō tangunt, palpitantia duntaxat: partim verō urgent, impellunt, evertuntq; atque ita quod fortius est & durius, veluti subit imbecillius & mollius: alterum autē cedit, evertiturq;, ac veluti amplectitur id quod urget: sanē discessus eorum mutuus nō potest eodem modo effici: ceterum quæ in superficie tangunt, discedunt subito. At quæ cedente molliore, longius progressa, veluti intrant illud, nō revertunt item subito: sed quantō à primo concursu progressa penitus urgebāt, tantum illis discedentibus sensibile superest. Tempus namq; intercedet inter primū impetum discedēdi, & extremū finem, secundum quem nō discedere amplius, sed subsistere jam dicuntur. Quo tempore toto, paulatim discedente altero, paulatim etiam alterius remisso pressu, utriusq; sentietur motus. Jam si hoc accedat, ut quod ab imo moveretur, feratur sursum: & quod tangit, superne incubat: præter hoc, quod pressus ei quod incumbit, detrahetur, etiam accidet ei, ut veluti subsidat: quia quod prius excipiebat, & sursum impellebat, nunc defertur. Quorum sanē omnium in vesicis ipsis & utribus, possis periculum facere, cognoscereq;, sic se habere contactus corporum, atque recessus, ut diximus. Sentimus itaq; ab impressione vehementium pulsum, carnem nostram, unā cum ambiente illam cute, repelli: huic autem est adjuncta moti & prementis cognitio. Quinetiam recedente arteria sentimus in ipso corpore nostro motum. Siquidem intrō compressa, sive ea cutis est, sive carnis pars, comitatur descendente arteriam, pristinam sedem, qua dejecta erat, occupans: simulque fit, ut in recessus cognitionem veniamus. Nam sentimus primos omnium, affectus nostrorū corporū: deinde, quæ hos induxerunt foris objecta. Ubi igitur à premendo recedit arteria, sola inæqualitas pressus, reditum & contractionē eius annunciat. Porro languidos pulsus, si quis leniter tangendos illos ignoret, fortasse abolitum homini pulsum dicet: qui quidem mentietur inde, q̄ nō rectē ipsos tetigerit. Contrā planē vehementes, quō ipsorū deprehendatur robur, requirunt ut qui tangunt, digitos validē infigant. Repelli enim hoc tibi magis videbuntur, quō eos urgeas magis. Unde etiam contractionem omnes vehementes pulsus habent sensibilem: languidorum verō nullus. Ceterum qui maximus simul & vehementissimus durusq; sit (quatenus conjungi cum magnitudine durities valeat) non autē velox, hic apertissimā habet contractionē. Omnes alii, quatenus plus vel minus de illorū aliquo ha-

beant adjunctum, eatenus percipientur aut facilius aut ægrius. At verō non ut maximos simul & vehementissimos, ita durissimos eosdemque maximos unquam pulsus reperias: ac ne duos pariter & maximos: sed qui inter durum & mollem medius est pulsus, cum maximo connexus invenitur frequenter. Etiam durum simul ac vehementem non rarō eundem cernas: sicuti & durum simul & vehementissimū. At vehementissimus & durissimus nunquam idem pulsus existit: nec maximus, vehementissimūq; atque idem tardissimus. Quippe maximi & vehementissimi majori ex parte sunt celeres: sin minus, at nō tardi. Vehementissimus ergo & maximus, qui nec mollis sit, nec velox, clarissimam contractionem adducet. Claram etiam vehementissimus certē, & magnus, & durus, & etiam vehementes simul & magni, & duri. Minus autem quā horum, sed evidens tamen contractio vehementis, magni, & mollis existit. Manifesta adhuc vehementis simul & moderati magnitudine atque duritia. Imō verō qui tribus differentiis est moderatus, perspicuam adhuc contractionem sortitur. At non facile contractio vehementis & parvi, qui omnino etiam durus est, cognoscitur. At parvi, durique, sed contentione moderata, etiam obscurior est. Jam si parvus nec durus sit, & moderato robore, ut deprehendatur is, sensum flagitat probē exercitatum. Languidus pulsus, neq; cum magno conjunctus, neq; cum parvo, apertam obtinet contractionem. Is si cum duro jungatur, necessariō erit minimus. Itaque non cuiusvis pulsus potest contractio sentiri: nec quorū potest, perinde omnium est evidens. Ceterum vel vehemens, vel non languidus is pulsus sit, est necesse, qui sensibilem tangentibus contractionem fuerit repræsentaturus. Porro ex sanis, qui moderato sunt corpore, & temperata natura, in flore ætatis, maximē Vere inter anni tempora, regionemq; incolunt temperatam, atque robusti sunt, & omni mœrore, metu, saturnitate, motuq; vacui, hi pulsum vehementem magnūq; omnes habent. Qui si se moderatē exercuerint, fottiq; sint modicis balneis, vel vini non permultum hauserint, vel irati sint, vel aliquam operam strenuam navaverint, non magnos jam & vehementes tantum, sed quāmaximos, vehementissimosq; pulsus habebunt. Iidem si laborent syncera tertiana, vel ardenti, miti, & simplici, vel qua alia magnoperē calida, & veluti fervente febris: præterea diariarum aliqua, quæ ex bubone proficiuntur, & ex adustionibus, modicisq; lassitudinibus, maximos etiā tum, & vehementissimos pulsus habebunt. Quorum quidem si arterias contingas, clarissimē contractionem persenties. Nam ut maximū recessus arteriæ spatium & tempus in illis est, sic apertissima eius erit cognitio. Sed nō nihil etiā conducit durities, ad percipiendam systolem, quum ad vim ictus magnoperē conferat. Quōd igitur distentionis violentiæ semper respondeat contractio: sensus, hoc contractiones dignoscuntur clarius, quō violentiorib. succedēt dilatationib. Magnus tamē pulsus haud facile cū duro miscetur. Ceterū quib. valida vitalis facultas est, sed in victu

Durissimum simul & maximum pulsum non reperiri unquam. Pulsus inter se coeuntes, & qui coire non possint.

Contractio arteriarum in quibus conspicua sit pulsus, & in quibus obscura.

Contractio nem exhibitur sensibilem pulsus, qualis nam esse debeat. Pulsus vehementis magnusq; quibus adsit.

Diaria febris unde proficiantur.

Arteria duritiem conferre plurimum ad percipiendam systolem.

*Applicatio
manus ad
carpum qua
lis molienda
sit.*

delinquunt, ac præcipuè in vini intempestiva po-
tione, ijs tales pulsus cōtingunt, conspicuaq; est
in eis ipsius arteriæ cōtractio. Jam tarditas, quan-
tum auget recessus tempus, tātō manifestiorem
motum ostendet. Quod verò ad manus applica-
tionem pertinet, si comprimendo applicemus ta-
ctum, nulla differentia sensibilis ex manus super
arteriam, vel subter, applicatione invenietur. Vel
si palpatum tantum, veluti suspensis digitis, ne-
tum quidem ullam differentiam animadvertamus.
At tertius applicandi modus, qui medius
est inter compressionem & palpitationē levem,
ne obiri quidem potest, si infernè tangas arte-
riam. Siquidem libere oportet tum manum
omnibus voluntariis motibus, & veluti languidā
admovere. Quod nifecerimus, delabatur ma-
nus à gravitate depressa, ut minus contrectare
possit arteriam. Proinde supernè attingere tan-
tum licebit, infernè autem nequaquā. Quatenus
igitur in vehementibus magnis, nec velocibus
pulsibus, ab arteriæ distentionibus tactū repel-
li accidit: hætenus recedente illa, sensibilis con-
tractio fiat, necesse est. At verò contractionē ma-
gis comprimendo, quàm leniter attingendo, di-
gnosces: nec minus si infernè tangamus, quàm
si supernè: quod perinde utrobique arteriæ con-
tractionem tactus sequatur. Verum manus ipsa

*Contractio
arteriæ qua-
liter discer-
nenda sit.*

*Manus tan-
gendo apta
qualis nam
esse debeat.*

*Applicatio-
nis manus
ad carpum
sides differen-
tia.*

*Arteria dor-
salis pulsus
in tabulis ad
abdomen di-
scerni.*

*Crassus pul-
sus exiguus
cur adsit.*

*Gracilibus si
mul & vali-
dis pulsus
esse omni di-
mensione con-
spicuum.
Initium dila-
tationis arte-
riæ et contra-
ctionis finē,
cur nostrum
sensum effu-
giat.*

quæ tanget, non modò promptè sentiat oportet, verum etiam sit mollis: sic enim vel minimos motus dignoscet. Similiter etiam, si per longius intervallum feratur, clarius contractionem percipiet. Etenim media applicatio quæ citra ultimam vim fit, hætenus motum sentiet in pulsibus minimè certè languidis, quatenus visus: in languidis verò sentiendis, etiam visui concedet. Altera, cum premimus, in languidis, supra primam, motum arteriæ obscurabit: in vehementibus percipiet præ cæteris. At tertia, qua veluti suspendimus manum, motum sanè quam brevem sentiet. Jam verò maximæ quidem arteriæ, quæ secundum dorsum est sita, cuius fugit pridem motus, simulatque contabuit animal, ad abdomen motus percipitur. Arteriæ quippe, leviora corpora, ubi distenduntur, facile secum attolunt: graviora ægrius, prægravia autem ne movent quidem. Hinc fit, ut crassis pulsus exiguus insit, quod videlicet longitudo eius minuatur, & latitudo fiat limitior, cōstricta nimirū à multa carne. Ascensus item in illis ubertate corporū incumbentiū supprimitur. Gracilium verò, ceterarum robustorum, insignem latitudinē & longitudinem pulsus habet, conspicuum etiam ascensum. Verum enim verò initium distentionis nostrum sensum effugere, cum ob corpora quæ degravant arteriā, tum interdum etiam ob internæ quietis magnitudinē, nemini obscurū existimo: quemadmodum & ipsius contractionis finem. Nam cum maiorem motum in contractionibus nō sentiamus, sed vel parē ac in distentionibus, vel quod verum est, minorem: omnem autem in distentionibus non percipimus: planum est utiq; nec totum nos percepturos in contractionibus. Tanta autem pars distentionis nō sentitur, quanta inter arteriæ primum impetum motus, & ictus usq; ad nostrum tactum distributionem

intercedit. Similiter quando tantā sentimus contractionis partem, quantā distentionis, aut paulò minorē: erit etiam contractionis pars illa quæ nō sentitur, par distentionis parti, aut aliquantō major. At verò arteriæ internæ & externæ quies, per accidens pulsus partes dicuntur. Quarū externam quidem, simpliciter manū admovens, quanta illa sit, maximè deprehendes: aut si etiā premere libeat, idq; in vehementissimis pulsibus, videlicet urgendo hætenus, ut motum ipsum nō lædas. Internam autem si premas, quoad tibi per præsentem liceat vehementiam, ita maximè illam dignosces. Atque externam quidem totam quietem, si ordine attingas planè animadvertes: internam verò, unā cum partibus quæ senti-ri nequeunt, utriusq; motus, sine videlicet contractionis, & distentionis initio. Ubi igitur dignoscere externā quietem est animus, citra ultimam vim applicare tactum debemus. Contra, internam, ni urgeas comprimāsque, non cognoscas. Nam contractioni arteriæ constantissimè debet hære tactus. At premere minimè nisi in vehementioribus licet. Liquet itaq; in his etiam solis internam quietem posse dignosci: imò ne hic quidem exactè, sed plerunq; sanè multo maiorem quàm revera sit: interdum paulò, attamen adhuc illam maiorem animadvertes. Necessariò enim duo ei tempora accedūt partium insensibilium utriusque motus: & quod ad finē contractionis est, & quod in distentionis principio. Quæ cum alias aliam longitudinem habeant, nec parem semper accessionem tempus internæ quietis habebit, nec exactè unquam dignosci poterit.

GALENI PERGAMENI de difficultate respirationis, li- ber secundus.

DEinceps autem quæ partibus pulsuum insunt, accuratè exponamus, à distentione auspicati: quod princeps hæc pulsuum pars sit, & plurimam habeat cognitionis in se varietatem, plurimumq; ad prælagiendum sit utilis. Porro cum multa sint quæ distentionibus insunt, inter ea omnia motus principalissimas partes occupat, ex ratione substantiæ pulsuum maximè ad illas pertinens. Omnis autem motus tempus habet, quo fit: præterea celeritatem vel tarditatem, vel æqualitatem, vel inæqualitatem: ad hæc, ubi feratur, spacium. At aliter videtur tempus dignosci, aliter tarditas & celeritas. Neque enim si motionis sit brevius tempus, continuo pulsus dixero celeriores existere. Est autem pulsus celer, qui in paucis tempore motum finit: tardus, qui multo. Cæterum motus præditi longiori tempore pulsus, est nō raro velocior eo, qui brevius obtinet. Hallucinatur igitur qui formicantē pulsus, quod imbecillus, creber, & parvus sit, celerem esse existimant. Siquidem ad iudicandum motus alicuius celeritatem, non modò temporis, sed spacii etiam in quo fit motus, ratio est habenda. Nam fieri non potest, quin arteria quæ brevissimo intervallo vehitur, minus consumat temporis, quàm quæ maximo. Si igitur

Si igitur & spaciū spacio, & tempus respōdeat tempori, æquē celeres fieri motus dicemus. Si verō major sit proportio spaciū ad spaciū, quā temporis ad tempus: vel temporis ad tempus, quā spaciū ad spaciū: hos motus minimē existimamus pari celeritate fieri. Siquidem si spaciū cum spatio collati major sit proportio, quā temporis comparati cum tempore, manifestum est eum motum necessariō celeriorē existere. Contra, si prioris motus spaciū minorem habeat proportionem ad spaciū alterius, quā tempus, prior necessariō erit tardior. Fingamus igitur jam duos ascensu impares pulsus, sitq; profunditas profunditatis decupla, & tempus temporis duplū: pulsus certē, cuius altitudo erit decupla, multō erit celerior altero. Nam humilis si in eodem constās motu, decuplo in profunditatis dimēsiōne increverit, fiet ille quidem æquē ac alter altus, sed tēpore longē majori, q̄ ille. Inventus itaq; est humilis pulsus brevi tēpore durans, qui alto diuturno sit tardior. Jam verō vermicans atq; formicans pulsus mutuō inter se cōvertuntur: quippe ut vermiculantis extremus delapsus formicantem gignit, ita formicantis incrementum generat vermiculantem. Quamplurimū autē interest, tardiorē dicas aliquem motum, an tardum: celeriorē, an celerem. Si quidem celer & tardus proferuntur absoluto sermone: at celerior tardiorq;, referuntur ad alterum, similisq; in aliis differentiis esse ratio videtur. Porro magnus & parvus, sicuti & major & minor pulsus, si non ad relationis, at certē ad quantitatis prædicamentum spectant. Dicimus autem unamquāq; rem magnam vel parvam, non absolute, sed cum aliis sui generis comparatam. Atq; hoc sanē inter magnū & majus interest, quod majus quidem omni minori possit majus dici, magnū verō nō quolibet majus, sed tantum cognatis. Eadem de minore & parvo distinctio est: necnō de celeri & celeriorē, tardo & tardiorē, duro & duriorē, molli & molliori, crebro & crebriori: ac si de cæteris omnibus, quæ partim cum altero quolibet cōparata, partim cum ijs tantum cum quibus conveniunt, talia vel talia dicuntur. Nec verō si cum omnibus quæ sunt eiusdem generis magnum comparemus, statim sic nominabimus. Cæterum cum medio ipso, moderatoq; in unoquoq; genere, ceu cum regula, singula comparantes, quæ illud quidem excedunt, magna esse dicemus omnia: quæ contrā, parva: id quod usu venit in omni vita, & præcipuē in artibus universis. Nam ad moderati omnes examen referuntur. Verum pro ratione ætatum, habitudinū corporum, temperamentorum, anni temporum, locorum, statuum, institutorum vitæ, ac deniq; animi affectuum, alios magnos, alios parvos, alios moderatos pulsus dicimus esse. Jam hos celeres, illos tardos, quosdam moderatos: pariq; modo in cæteris differentiis. Siquidem pro singulis earum causarum indies ipsi pulsus variantur. Quæ causæ quum sæper mutuō permistæ sint, difficilē, ac potius impossibile fuerit, reperire distinctam aliquam differentiam pulsus, quæ omnino & sigillatim earū cuiuspiam respondeat. Quare satis fuerit à

tali inquisitione supersedere: per singulas autē earum causarum exercere hominē, cuius pulsus ipse jam exploraris: ac si perpendere, quam in illum mutationem eiusdem pulsus moliatur: id quod etiā in aliis atq; aliis hominibus est faciendum periculum. Cæterum si neq; id quod commune est, in suas dividerimus partes, nec causas quæ per se & primariō agunt, ab ijs quæ ex accidenti sunt distinxerimus, haud dubiē in iudicio pulsuum turpissimē hallucinabimur. Nam si dixeris exercitatorum tales pulsus existere, nec ad dideris quorum exercitatorum, nec explicaveris ipsius exercitii speciem, nec modum, nec qualitatem, nec deniq; quantitatem, utiq; magnum lapsum committes, quod videlicet rem cōmunem minimē in suas differētiās secueris. At verō si qui plethoricus sit, ac thorace & pulmone affecto, simul ut cœpit exerceri velociter, in dyspnœam inciderit, utique pro dyspnœa ipsi pulsus variantur: quorum alterationem tu exercitationi attribues, quod causam ex accidenti minimē à propria distinxeris. Ergo ne inexperiundo fallamur, corpus propositum designabimus ad experientiam, cum sanum sit, ac nulli externæ obnoxium alterationi: tum exercitationem qua ad id utemur, moderatā quantitate servabimus: præterea in mutatione id attendemus, ecquid casu inciderit, non ex ipsa exercitationis natura. Si enim tria hæc respicias, nullo negotio invenies, quemadmodum & quatenus omnis adventitia causa pulsus ipsum immutet. Itaque si in omni genere causæ, alterationem experientia didiceris, non est quod sis sollicitus, ut qualis sit, qui natura moderatus est pulsus, præscias. Sed si, qui sit singulis, de quibus agitur, peculiaris, teneas, quatenus mutatur hic est, cum ab aliis causis, tum verō ab ipso morbo, noscas licebit. Porro moderata exercitia pulsus in magnitudinem, celeritatem, vehementiam & crebritatem cōvertunt. Pro ætatibus autem, maximi sunt juvenum pulsus: senum minimi: eorum quorum ætas declinat, majores quidem quā senum, minores tamen quā juvenum: senum deniq; minimi. Exoriri autem quæstio possit, cur parvus pueris sit pulsus: quanquā certē nullam reperio causam, cur debeat in eis esse talis. Proinde moderatum pulsus cognoscere, adhuc magis necessariū videtur. Potest quippe vel pueri pulsus moderatū excellere. Quare nisi moderatū prius pulsus invenerit, ne Empiricus quidem ipse observationem accuratē instituere poterit: cum nō omnium ægrotorum usus sit consuetudine per sanitatē, quo experientia naturam illorū agnoscat, indeq; memor illius, cum ægrotatibus eam comparet. Ubi igitur optimam constitutionem humani invenerimus corporis, primū animadvertendum est, qui nam eius sint pulsus: idque nec obiter, nec negligenter: sed in eo statu hominem accipiemus, ubi suum proprium motum pulsus, à nulla externa causa immutari, retineat. Hoc fiet si homo ipse ab omni excessu & defectu sit immunis & liber. Postea investigandæ sunt corporū vitiosæ constitutiones: earumq; excessus atq; defectus, cum moderata & optima conferendi. Dein verō, ubi quantum oporteat earum naturarum

Pulsus examini qualiter incundus sit.

Pulsus cogniturus per mutationes, tria spectanda esse.

Exercitia moderata quomodo immutent pulsus. Pulsus differentia secundum ætates. Pueris cur pulsus sit parvus.

Pulsus moderatum esse inveniendū.

Pulsus moderatum immodicosq; inveniendi ratio.

Pulsus natura optima, aliorum omnium regula & mensura existere.

Arterias inter se mutuo, et simul cum corde similem motum servare.

Arteria sua distentio.

naturarum pulsus dissidere ab inculpatissimæ pulsu perpenderis, longoq; usu exercueris rationem simul & tactum, jam demum certò putabis te moderatū tenere in omni genere pulsuum: illosq; etiam, qui aliquo modo ultra hunc sunt, & citra. Idcirco quicumq; aut corporis nostri optimam naturā, aut vitiosas non novit, aut ratione quidem perspexit eas, sed usu ut dignosceret nō laboravit, nihil huic fructus feret hic sermo: siquidem illa prius sunt ediscenda, postea huc veniendum. Naturæ igitur optimæ pulsus, aliorum omnium medius, ac veluti mensura & regula quædam existit: cum quo ubi cæteros comparamus, celeres, tardos, magnos & parvos dicimus esse. Ipse verò qui medius & est & dicitur, nullo nomine quod immoderationē significet, nominatur: sicuti neq; homo eo ipso præditus: quem quidem non crassum, non gracilem, non calidum, frigidum, humidum, aut siccum dicimus, sed omnibus partibus corporis temperatū. Cæterum dubitaverit quispiam in hunc modum: Cum omnes quæ in corpore sunt arteriæ, esse æquales non possint, ac proinde nec etiam distendi æqualiter, utique non poterit pulsus unus in quantitate distentionis moderatus existere, ne si optima quidem natura fuerit: sed in motu & robore, cæterisq; generibus unus esse per omnes arterias potest. Quippe similem cum inter se mutuo, tum cum corde motum, omnes necesse est habeant: magnitudine verò, ut earum differunt corpora, sic distentiones par esse diversas. Verum hæc qui dicit, ignorat, æquē in magnis corporibus ac in parvis constare eandem naturam posse. * Quod quidem si exploratū haberet, neutiquam amplius requiret, nec arteriarū quæ in singulis partibus sunt, nec item ipsarū dilatationum, parem magnitudinē esse in universis inculpatis naturis, cum pro magnitudine & parvitate corporū, illa etiam variet. Porro vesicarum, follium, utrius, omniū deniq; rerum quæ prædita cavitatem aliqua sunt, magnas & parvas distentiones solemus dicere. Dicimus etiam interdum vesicam esse distentam maximē: utrem autē & saccum, qui viginti eiusmodi vesicas faciliē capiant, nondum maximam distentionem esse consecutos. Censemus siquidem distentionem ad cuiusque cavitatē corporis esse æstimandam, non absolute pronūciandam ad eundem ubiq; modū. Nam est certus in re qualibet modus, in quo nec contendi tunicas, quæ cavitatem ipsam completuntur, nec remitti cōtingit. Ubi igitur aut tensio, aut cavitas in ipsis percipitur, tum magnas dicimus eis aut parvas distentiones inesse. Ubi verò, nec sensibilis cavitas sese ostendit, nec tunicæ laborant tensa sub ipsa dilatatione, modicam sanē & moderatam, nativamq; corporis distentionem illam censemus existere. Similiter igitur est iusta quædam ipsius arteriæ distentio, ita ut nec contendatur, vel laxam aliquam sui partē relinquat. Nam ut omnino confidat, tunicarum dura natura prohibet. Atq; eam sanē distentionē moderatā & naturalem dicimus. Etenim in naturis optimis hætenus dilatatur arteria, quoad usus expleatur largiter, & nihil lædantur tunicæ. Proinde qui regulam velit attendere in ma-

gnis pulsibus & tardis dignoscendis, optima natura inventa, cognitaq; unius in illa arteriæ cuiuscunq; magnitudine corporis atque distentionis, recordandum illi & æstimandū est, arteriam hac majorē, quantò oporteat majorē distentionem habere, in naturis optimis. Quæ si tanta reperiat esse, quantā fore conjiciebat, sic moderatum pulsus appellabit: sin vel majorē hac, vel minorem, magnum vel parvum. Arteriæ deprehendet in optima natura magnitudinē, aut per dissectionem, aut ex collectione signorū. Quod si nesciat etiam quanta sit arteria præditis optima natura, certē eorum pulsus memor, si in alterum postea incidat, & colligere possit, num par sit majores hunc aut minores, q̄ illum habere arterias: cum magnitudine jam distentionis cōferre poterit, conjectareq; an magnus, an parvus, an moderatus sit pulsus. * Etenim si quantò videtur arterias majores habere homo qui comparatur, tantò majorem etiam distentionē fortatur, moderatum esse illius dicemus pulsus. Quod si arteriæ magnitudo videatur superare magnitudinē distentionis, aut minor quā illa sit, magnum tunc, vel parvū pulsus vocabimus. Præterea si arteriæ corpus videatur esse majus quā pulsus, parvum: sin arteriæ minus, & pulsus major, magnum. Haud secus in reliquis generibus pulsuum: ut in ipsius motus genere, in quo celeritatem & tarditatem dignoscimus: in genere quietis, in quo crebritatem & raritatem: contentionis, in quo vehementiam & remissionem: ad hæc, corporis arteriæ, in quo duritiem & mollitudinem. Nam per hæc omnia, tum moderatum inveniemus in optima natura, tum immoderatos vel ob excessum, vel ob defectū, non inter se, sed cum moderato comparabimus.

GALENI PERGAMENI
de dignoscendis pulsib. Liber
tertius

Celer autē pulsus vocatur, qui paucotempore suum motum absolvit: quemadmodum tardus, qui multo. Etenim si hoc prius nobis constet, moderatus pulsus quanto tempore, quantum confecerit intervallum: deinde alterius offendamus, qui par habuit tempus, spacium minus: multo tempore dicemus hunc motum fuisse. Siquidem si duo pueri dimissi in diversos locos non æquē distantes sint, & simul reversi: alterum, quod iter paucotempore absolverit, collaudamus: alterum increpamus, quod multo. Nam ex viæ longitudine æstimamus, quum paucum vel multum temporis dicimus, non absoluto sermone. Cæterum ad dignoscendum celerem pulsus vel tardum, nec quantitatem temporis, nec intervalli (ut jam quod verum est fatear) considerandam censemus: imò ne proportionem quidem illorum, de quibus (ad extirpandum errorem quorundam, qui ex solius temporis quantitate, iudicium ipsorum pulsuum ferebant) verba fecimus in superiori libro. Nam celeritatem quidem & tarditatem, ut primum occurrit arteria, notamus: rationem verò temporis ad tempus, & intervalli

intervalli ad intervallum, ut exploremus, opus nobis est longo tempore. Quemadmodum itaque si ab oculis moveri quempiam videamus, impetus ipse indicare potest motus celeritatem: sic & in arteria contingit. Nam aut incitatum, aut remissum eius motum invenias. Omnia enim corpora quæ moventur, ex locis ubi semper moventur, quo modo moveantur, dignoscimus. Siquidem si in iis immoretur, tardum esse motum eum dicimus: si verò descendat leviter, celerem. Unus itaque sensus celeres & tardos pulsus declarat, ex ipso locorum transitu iudicium nobis confirmans. Quare celeritatis & tarditatis facile notitiam consequimur: non perinde consecuturi, si quantitate temporis & intervallorum aucupata, eorum proportionem observare sustineremus. Atqui non sustinemus: nam ut primum aciem intendimus, momento temporis objectum motumque corpus deprehendimus, ex quo conijcimus transitum. Quæ igitur eminus cernimus, ea diutius videntur nobis consistere, vel si agitentur celerrime. Unde liquet, ratione nos motum colligere, minimè sensu deprehendere. Quia verò sensui ratio conjuncta est, & transcursus mentis est velocissimus, sæpè numero non ratione, sed deprehendi sensu videtur. Non est itaque temporum neque intervallorum quantitas inspicenda, sed ipsa qualitas motus, licet explicatu difficilis: à qua etiam dignotio inæqualium celeritate et tarditate pulsuum ducit originem. Quippe unius distentionis sæpe initium motus planè celerius videtur: proximum tardius: iterum finis celerior. Quo minus leviter palpan dum est, ubi genus hoc pulsuum perpendimus: alioqui extremum motus finem sentiemus duntaxat, non integrum motum. Ex quibus liquet, ejusmodi pulsus nec parvos, nec languidos esse. Neque enim trifariam possis secare motum, nec in parvis intervallis, nec in viribus imbecillis. Quamobrem nec in pulsibus lethargicis deprehenderis inæqualitatem. Porro maximus & vehementissimus pulsus validam fert compressionem: atque alius quisque, quantum à vehementia vel magnitudine abest, tanto minorem. Quare qui cuique pulsui inveturus sit contrectationem appositam, hunc singulari prudentia esse, & expertum in dignoscendo oportet. Moderatus igitur motu pulsus in optima constitutione, non ex intervalli aut temporis quantitate est, sed ex ipsa qualitate explorandus. Quo quidem qui percipientur celerius decedere, celeres: qui tardius, tardos vocemus. Cæterum si pulsus æqualis sit, universam distentionem non expectamus, sed ex parte eius facere de tota conjecturam licebit. Si verò in æqualis, integram assequi expediet, tactumque pro magnitudine pulsus & vehementia variè applicare. Deinceps de quantitate distentionis agamus. Enim verò cum corporis arteriæ dimensiones sint tres, longitudo, latitudo & profunditas: nullam earum possumus totam sentire. Ac de longitudine quidem apertissimum est. Utrique enim arteria, plerumque longa tres cubitos, usque ad extremum terminum pulsatur, cum tamen tribus aut quatuor duntaxat digitis motus ipsius percipiatur. Sed nec in dimensionibus cæteris, quo diximus obscurum videtur, cum à corporibus incumbenti-

bus adeo circumvallentur & contegantur arteriæ, ut nec latitudo, nec profunditas motus exactè deprehendi possint. Est tamen in singulis corporum naturis aliquid sub ipsa cute elucescens, verum in natura optima, moderatum. Etenim si quid supra hoc secundum longitudinem sit, longum: si quid infra, brevem pulsuum efficiet, qui definiri numero digitorum non potest. Eodem modo juxta dimensionem secundam, tum latos, tum angustos pulsus cum moderato collatos deprehendes: similiter altos & humiles juxta tertiam: sicuti in tribus simul dimensionibus, magnum & parvum. At verò singulos esse in singulis aliis pulsuum generibus moderatos, sed in sola quantitate non planè unum, sed suum cuique corporis parti, antea explicatum est. Quandoquidem igitur dimensiones pulsuum non facile deprehenduntur, danda nobis opera est, ut comonstremus rationem qua in optimam singularum cognitionem veniamus: ac primum sane de illa dicemus, quæ circa longitudinem tota versatur. Esse autem eam censendam optimam, quæ motus maximam partem sentiat, clarissimum est. Porro in tribus his, natura videlicet, exercitatione, & applicationis modo, sensibilibus cognitionum omnes differentie sunt sitæ. Nam qui naturam habet appositissimam ad sentiendum, & probe ipsum tactum exercitatum, quem sensibilibus etiam decenter admoveat, optimus hic explorator fuerit eorum quæ intus sunt condita. Atqui hoc aliquatenus est inferior, quam maxime ab illo abest, tam pessime absolutam cognitionem consequitur. Qui igitur ad tangendum fuerit optimè comparatus, is cogniturus longitudinem pulsus, omnino non premat, imò sæpe contrectet leniter, ac veluti suspendat manum. Qui modus accommodatus in primis est, parvis pariter & imbecillis pulsibus. Quorum quidem, si eos aliquatenus premas, magna ex parte motus exolvitur, imò verò perit sæpe universus. At modicum pressum non graviter ferunt quidem pulsus vehementes: non læduntur tamen ne hi quidem, si nihil premas. Qui modus tangendi cum optimus sit languidis pulsibus, nec incommodus vehementibus, nulli alteri est postponendus. Porro ubi diversas partes secundum arteriæ longitudinem premis, non perinde videtur in omnibus lædi motus. Sed si cordi viciniore premantur, magnam injuriam subjectis inferunt: si remotiores, sæpè numero nullam, quæ animadverti possit, si bene pulsus sit vehementes: interim tamen manifestam, in non vehementibus. Porro ut sensu percipimus differentias latitudinis & profunditatis, sic nos sæpe circularem figuram deprehendere in pulsu manifestè fatemur. Quod igitur ad dignoscendas eas duas dimensiones pertinet, si leniter palpes, aut pluribus in partibus necessum est arteriæ occursum percipias, aut in paucioribus. Quo cognito, ad sensum ratio adjuncta nobis magnam distentionem suggeret esse, quæ multis partibus movet tactum: parvam, quæ paucis. Agè fac circularem eius occursum esse: quid, nonne clarum est, si insigni sit circumferentia circuli magnitudine, totam etiam crassam esse distentionem arteriæ?

Pulsuum dimensiones deprehendi ratio.

Sensibilium cognitionum omnes differentie, in natura, exercitatione, & applicationis modo, consistunt.

Arteriæ contrectandi modus.

Arteria circularem figuram in pulsu deprehendi posse.

Distentio magna qua sit.

arteria? & universam distentionem gracilem, si circumferentia sit parva? Quod si gibbosiores ac praeuptiores videantur obliqui occurfus arteriae, praeterea cavior quodam modo & humilior in profunditate, adeo ut ne circuli quidem circumferentia cernatur amplius, sed veluti recta linea: profecto apertum est talem pulsum latum fore atque humile. E diverso, si motus obliqui partes, longe citra medium constiterint, ac medium ipsum satis gibbosum appareat, plane is pulsus altus & angustus existet. Si semel angustus eius in latitudine occurfus evadat, ut non modo imminutus esse obliquus motus, sed & totus perisse omnino videatur, difficilis cognitu est, vel potius cognosci non potest, quantum in his est, qualis sit pulsus. Jam vero opportunum est & de rhythmo etiam aliquid dicere. Qui quidem cum in collatione temporis distentionis, cum tempore contractionis consistat, prius paranda nobis separatim utriusque temporis notitia est, id quod fuerit laboriosissimum: quandoquidem initium distentionis, & contractionis finis, cognosci non possunt. Jam quatenus aliquid motus nos latet, eatenus etiam praeteribit & tempus. Caeterum ad explorandam quantitatem motus, quantum promota spacij sit, perpendimus. Quod si finem distentionis accurate teneamus, ratio cum sensu conjuncta, nobis eius quantitatem subijciet. Possumus itaque (nisi partem aliam praeter finem motus sentiamus) quantum habeat temporis ignorare: scire tamen quantum intervalli pervecta sit. At vero in vehementioribus pulsibus, si modice arteriam compresserimus, perspicimus quidem initium motus, sed quantitatem ignorabimus intervalli. Non potest autem simul & examinari quantitas temporis motus, & celeritas vel tarditas percipi. Porro ad dignoscendum rhythmum, solum quantitatem temporis quae in motu absumitur, exploramus. Quare instituenda manus ea applicatio est, quae arteriae omnem motum intuetur accuratissime. Si igitur pulsus magnus, sed languidus fuerit, in eo certe non possis deprehendere totius dilatationis motum, sed externi finis duntaxat. Sic etiam contractionis initium duntaxat, recessumque, praeterea nihil. Proinde leniter istiusmodi pulsus sunt palpandi: qua tactus applicatione quantitatem animadvertere intervalli distentionis poteris: temporis motus non poteris. At vero in contractione non tantum temporis motus non invenies quantitatem, sed ne ipsius quidem intervalli: cuius etiam vel qualitas nobis ignota erit. Qui enim motus etiamnum qualitas dignoscatur, universo sensum latente motu? Nimirum requiritur prius essentia rei, quam ipsa qualitas. Quae quidem si fugiat sensum, parari nequit ipsius qualitatis notitia. Quandoquidem igitur motum distentionis & contractionis arteriae noscimus in ijs tantum pulsibus, qui minime languidi existunt, in eorum sane solorum notitiam rhythmi veniemus, digitis ita moderate applicatis, ut nihil motus externi interpellent. In solis itaque vehementissimis pulsibus exacte rhythmus dignoscitur: quod in caeteris magna pars initii distentionis, & contractionis finis, nos fugiat, id quod maxime rhythmum offendit.

Rhythmus in quo consistat.

Distentionis arteria initium, & contractionis finem, imperceptibilem esse.

Rhythmus dignoscendo quid explorandum.

Essentiam rei prius requiri quam qualitatem.

Rhythmus in solis dignoscitur vehementissimis pulsibus.

GALENI PERGAMENI

de dignoscendis pulsibus. Liber

quartus.

Est autem in distentione arteriae veluti quidam ictus, qui dum tangimus, tactum fuerit. Huc si violentus sit, proprie existimabis ictum vocari: at si violentia careat, non item. Comitatur porro ictus ipse multas ac varias species pulsuum. Duri siquidem pulsus, vehementis, magni, celeris, alti, convulsivi, & vibrati est comes, atque commune symptoma. Quare confundendi illi pulsus non sunt, sed discernendi suis notis. Cum igitur tactum impelli a pulsu, si illius debeat sentire occursum, necesse sit (impellitur enim non perinde semper, sed nunc plus, nunc minus, interdum ut palpet tantum) quicumque motus eum protrudunt, & longe submovent, ij sane violenti ictus specie referunt. Ac protrudere quidem longe potest motus arteriae durae, veluti tactum contundens: & qui robore moventis eam facultatis veluti evertit: praeterea qui magnitudine distentionis progreditur plurimum: jam etiam, qui qua fertur celeritate impellit valenter, & qui praeter altitudinem veluti subit ac intrat: quique quod tensus sit, aegre moveretur: ac denique is, qui ob vibrationem, simul tensionis & duritiei, celerisque occursum imaginem repraesentat. Caeterum incidas in multos quotidie medicos, qui illos omnes pulsus vel maxime discrepantes, dicant vehementes esse. Etenim occursum celeritas, non eadem sit cum violentia ictus, hinc cognoscere licet, quod nec longius celer pulsus impellere valet tactum, nisi simul sit manus. Unde liquet, non hoc eum sua sponte obtinere symptoma, sed ob magnitudinem iunctam. Quippe longe impellere magis ad magnitudinem pertinet: vel etiam ad hanc per accidens, videlicet vehementiae rationis. Magnitudo siquidem, non quod longius intret, sed quod multis in partibus longitudinis pariter & latitudinis & profunditatis attingat tactum, cognoscitur. Si enim pulsus circumferentia quae satis magna est perceperimus, ex ea facile ascensum, qui ex multa profunditate sit, cōjiciemus: * vel si tactus totum intervallum assecutus non fuerit, sed externum tantum finem persenserit. Si vero * a primo dilatationis impetu, velimus motum ipsum sentire, magna ex parte magnitudinem interpellabimus, ita ut ne magnus iam esse pulsus videatur: idque ubi magnitudini vehementia est adjuncta. Nam si in pulsibus qui citra vehementiam sunt magni, aut ascensui occurras, aut ipsam arteriam comprimas, mox totus pulsus perierit. Jam vero si magnus pulsus tribus dimensionibus praeditus, nisi etiam vehemens fuerit, minime tactum protrudit longius, manifestum utique est, nec altum id sua natura effecturum, qui una tantum dimensione operatur, sed quod simul aut vehemens sit, aut certe minime languidus. Omnes itaque illi pulsus, ut longe propulserint tactum, plane vehementiam desiderant. Quanquam & alii etiam, a quibus divelli durities non potest, violenter fuerint, ut vibratus, & convulsivus. Qui quidem non aliunde comparamus ictus violentiam, quam a duritie perperua. Quamobrem duo tantum genera habentur pulsuum violenter ferientium: nempe vehementium

Ictus qui mittitur suo.

Tactus stru qui rep.

Impellitum magnitudo est vehementis continui Magni pulsus cognoscitur.

Pulsus longum ab hementi se tactum protrudit Pulsus vehementer ferientium tantum habent.

tium, atq; durorū. Etenim quibus carnis nostrae natura cedit, ea dura vocantur: quæ verò carni, ut aqua, hæc mollia dicuntur. Fingamus itaq; manum nostram nunc aquæ rapido fluctui ex adverso occurrere: nūc lapidi, quem altera manus sensim admoveat: nōne ab aqua perspicies planè ipsam everti, non pressam tamen: & lapidem ab hac everti, sed pressa ab illo? Nam durum quidem, quò minus progrediamur, obstare per se non potest: sed aut per pondus, aut motum acquisititium impedire interdū poterit: vehemens autem, suapte natura reprimere, cohibere, repellere, ac deturbare intelligit. Liquet igitur, aliud nos cum vehementia tangimus, aliud cum dura, sentire: nam hæc premunt carnem tantū, illa impediunt progressum. At quia sæpe fit ut ambo convenient, atq; id quod occurrit sit durum, pariterq; vehementer moveatur, non potest sensus etiam non duplex nobis offerri: unus veluti prementis, alter veluti evertentis. Quæ si sint ita, ut sunt certè, duri pulsus, in premendo tactu, cognitio ponenda est, ut utrisq; ictus violentia conveniat: sed proprium duri sit premere, evertere vehementis. Hallucinatur autem Archigenes, dum pulsum, cum arteriæ status cognoscitur, plenum pulsum appellat: potius is durus, aut mollis, aut moderatus dici mereatur. Dum verò ait, secundo alio pleni pulsus genere cognosci qualitatem substantiæ in arteriis cōtentæ: quam qualitatem intelligat, haud pro dignitate explicat. Cæterum gravissimè peccat tertium aliud genus pleni pulsus assignans, cuius vi, ea quæ in arteriis sunt, innotescant nobis. Quippe tactus, spiritusne in arteriis tantum sit, an simul humores aliqui, indicare nō valet. Quinetiā nullus prorsus est sensus, qui cōmonstrare valeat, in arteriis contentus sanguis, quàm sit multus & qualis. Imò verò in ipsa aqua inter cutem neutiquam licet nobis, humorne sit an spiritus, qui in regionibus continetur ventris, ipso tactu explorare, nisi pressu cute cavata: quam nec frequenter cavari conspicias in synceris ascitis, & in eo hydrope, quem tympanitem appellant. Sed ad veram notitiam comparandam pulsare cogimur abdomen, ut attendamus si veluti tympanū resonet: secundo loco aliter componere hominē, convertereq; in latera, quò fluctuationem aliquam exaudiamus. Siquidem ut strepitus in motū tympani spiritū nobis annunciat, sic fluctuatio humorem. Uno autē admoto tactu, haud facillè deprehenderis, flatusne an aqua sublit, tamen si cutis his contabuerit: tantū abest, ut per crassam arteriæ tunicā, & quæ peritonæi est sexcupla, quod latitat in ipsa arteria, noscamus. Præterea ex magnitudine quidem pulsus, copiam contenti humoris cognoscimus. Sed nō perpetuò hinc nobis (quod ille arbitratur) humidum esse ipsum humorem constat. Solæ itaque fluctuationes & strepitus sunt, ex quibus cognosci possit quid sit, aut quale, quod contineatur. Sensus autem tactus, manet sui semper similis.



Uæ immutant pulsus, partim eorū generationis sunt causæ, partim tantum alterationis. Ac generationis quidem, tum usus, cuius gratia fiūt: tum facultas abs qua, tum instrumenta per quæ distenduntur. Alterationis, cæteræ omnes, & quæ præcedentes vocantur, & quæ harum sunt procatarctica. Nam triplex sanè, nō in pulsibus modò, sed in aliis cunctis, causarum genus existit. Unum quidem primū atq; præcipuum, quod cōtinens ideo appellatur, quia eorū essentiam complectitur, nimirum generationis (ut modò diximus) existens causa. Reliqua verò duo genera, ut fiant pulsus, in causa nō sunt: causæ tamen existunt illorū qui jam sunt, mutationis. Quippe humorum crassitudo, abundantia, lentor, acredo, efficere nō valent pulsus, alterare valent. Ita frigidum balneum, vel calidum, & hyems, æstasq;, breviter frigus & calor, alterandorum pulsuum sunt, non gignendorū, causæ. Cæterum quas ultimò cōmemoravimus, procatarctica sive præincipientes dicuntur. Quas verò ante has, illæ nempe quæ circa humores versantur, antecedentes. In summa autem, quæcunque extra corpus posita, quicquam in corpore immutāt, procatarctica causæ, sive præincipientes vocātur, * ceu incipientes prius quàm dispositiones corporum. * Quæ quidem ipsæ dispositione, quando continentes excitant, ipsarum antecedentes causæ redduntur. Densetur enim ab occurso externi frigoris, cutis: cuius densitas, naturalem halitus digestionem reprimat. Repressus ille coacervetur, tandemq; febrim accendat, ob quam usus pulsuum mutetur, ipsiq; similiter pulsus. Hic certè occurso externi frigoris est procatarctica causa: cæteræ usq; ad usum pulsuum omnes antecedentes. Causa igitur procatarctica, antecedentibus causis mediantibus, quia usum pulsuum permutat, quæ una ex continentibus causis existit, dicitur etiā pulsus ipsos variare. Neq; enim possit ulla cōtinēs causa mutari, ut constans maneat eius effectus. At priusquàm continentes alteratio attingat, pulsus immutari non possunt. Ideoq; principes hæ, & præcipuæ sunt, primæq; causæ pulsuum. Cæteræ sunt harū gratia, nec per se alterare ipsos pulsus possunt. Quare illum qui peritus evadere artis de pulsibus velit, in omnibus causarum generibus apprimè esse exercitatum oportet. Porro quatenus gignendorum pulsuum origines sunt continentes causæ, eatenus etiam alterandorum. Siquidem differentia causarū in quantitate qualitateq;, pulsuum differentias in qualitate & quantitate constituunt. At verò cum perpetuò cor ipsum unā cum arteriis omnibus, quandiu superstes est animal, cernamus habere motum illum pulsatilem: homine autem jam vita functo, tum arterias, tum cor, ipso pulsu destitui: sanè constat aliquam fuisse causam, à qua ille motus excitaretur. Quam quidem causam, licet eius essentia nos fugiat, quod facultatem tamē habeat faciendi pulsus, illam facultatem vocamus. Quam

Pulsus à quibus mutantur.

Causarum genera tria.

Causæ continentes.

Causæ procatarctica.

Causæ antecedentes.

Causarum quæ pulsus mutant, generalis uno exemplo radiatio.

Causa continens alterationis pulsuum, est usus eiusdem.

Causæ præcipuæ pulsuum, sunt continentes.

Anima essentiam ignorat sit Causa.

autem omnis facultas, alicuius facultas sit, haud dubiè eius notio erit relationi subjecta. Cæterum dum robor facultatis, virtutemve dicimus, aut contra infirmitatem & vitium, hæc nomina ad functionem referimus. Siquidem quæ obit efficitur; functionem causa, interim ad eam melius est apposita, interim deterius. Quo fit, ut modò præclarius: postea si res ferat, deterius, functio ipsa obeatur. Ac præstantior ad functionem dispositio, facultatis virtus & robor est: deterior, in-

Pulsus fuisse institutos gratia tuendi di. universi caloris gignendi, animalis spiritus.
 Arteriarum corpus annu merari inter continentes pulsuum generationis causas.

firmitas atq; vitium. Quod verò ad pulsuum usum spectat, gratia tuendi caloris universi corporis, instituti videntur, ut videlicet illū refrigerent: & si quid sit fuliginis ex succorū adustione contractū, id e vestigio excernant. Conferunt etiā ad gignendum animale spiritum. Reliqua & ipsa est arteriarū corpus. Siquidem omnis facultas quæ alicujus causa agit, instrumenta quaerit ad opus apposita. Erat autem hic instrumentum accommodū, quod spissis tunicis esset, atq; intus cavum. Ubi igitur illa facultas refrigerantem substantiam trahit, arteriarū corpus distenditur. Ubi verò fuliginosum expurgat, contrahitur. Nunc itaq; præpollet dilatationis usus, nunc contractionis: consequiturque omnino alteram motus partem reliqua. Cum ergo ex his causis

Pulsuum variationes, pro causarum alterationibus fieri.
Pulsuum tot esse primas differentias, quot causarum.
Mediocritates efficere naturales pulsus.

pulsus proficiantur, omnes variationes illorū pro causarum alterationibus fieri est necesse. Unde tot sunt primæ & generales pulsuum differentia, quot causarum. Et facultatis quidem differentia sunt, robor & imbecillitas. Nativi caloris, adustio, refrigeratioq; Arteriarū tunicæ, durities, & mollitudo: atque præ his omnibus, in singulis generibus, cōmemoratorū mediocritates: quæ ut naturales efficiunt pulsus, qui medium locum inter excedentes sortiuntur, ita excessus ipsi, pulsus gignunt præter naturam. At facultatis robor necessario pulsuum vehementem facit, infirmitas languidum: sicuti instrumentorū durities, durum, mollitudo mollem. Ut autem incremento vel decremento nativi caloris consequatur semper unum & idem genus pulsuum, non est necesse. Nec enim celer, nec magnus, aut creber incidit semper, ubi natura adurit: nec dum extinguatur, tardus, vel parvus, vel rarus.

Pulsuum alterationes, quæ à quibus causis magis proficiantur.

* Disputat autem contra magnum Archigenes, quod celeritas pulsus non à robore potius, quā à facultatis imbecillitate proficiatur. At neutrum sequitur necessario. Magis tamen peculiaris celeritas robori facultatis est, abundantiaq; caloris, nec non mollitudini instrumentorū: tarditas autem contrariis. Eodem modo validæ facultati magnitudo, & copiae caloris, tum etiā mollibus instrumentis familiaris existit: parvitas verò contrariis. At crebritas nulli necessario ex cōmemoratis inhæret: magis tamen facultatis imbecillitati est propria, copiaeq; caloris, ac duritiei item instrumentorū. Similiter raritas magis ad contraria declinat, non tamen illis perpetuò annexa. Si amplior in corpore fuerit collectus calor, animanti cum majori erit opus respiratione, tum majoribus pulsibus: & quia majoribus: cōtinuò etiā celerioribus & crebrioribus. Ut enim qui sitibundi sunt, nō multū modò, sed & celeriter po-

tant, & crebrò: ita qui refrigerio indigent, copiosum simul & celeriter, crebroq; attrahunt. Quamobrem peculiare dixi esse pulsus copioso calori, magnū, celerem, crebrumq;, nō tamē illi perpetuò annexos. Postulāt enim ut tales evadant, facultatē validam, atq; ipsa instrumenta mollia. Quod si infirma facultas sit, aut instrumentū durum, nec magni esse, nec celeres possint, cum instrumentū quidem sit per duritiā adversus moventem facultatē contumax: illa verò attollere quatenus oportet arterias, per imbecillitatē impos. Quare ut celer pulsus vel magnus fiat, tria oportet causarum genera inter se coeant: nempe, ut usus illorum generationis urgeat: facultas valida sit: mollesq; arteriarū tunicæ, aut certè nō rigida. Porro ubi solus calor increverit, & manserit facultas, tunicæq; arteriarum immotæ: pulsus necessario majores & celeriores fient, unaq; cum calore augebuntur, donec ad maximam distentionem pervenerint. Celerrimi verò ne sic quidem prius erunt, quā calor ipse superaverit maximam distentionem, ita ut ab ea satis refrigerari non possit: tunc enim celeritate refarciatur motus defectus, atq; sic evadent pulsus celerrimi. Cæterum neq; hæc satisfaciunt calori vehementer incenso. Nam quod temporis inter duos motus antea quiescebat, nunc id præsecat etiā, adeoq; efficit breve, ut totus unus esse motus continuus nulla interceptus quiete videatur. Hoc tamen accidit, ubi extremè calor fuerit accensus: tunc enim, cum tres sint præsidii rationes in excessibus universis, omnibus simul utitur. Nam & plurimum consequitur refrigerantis substantiæ, celerrimeq;, & in primis assidue. Quorum primū maximos pulsus, secundum celerrimos, tertium creberrimos reddit. Nec ubi liberaliter illum magnitudo distentionis refrigerat, irritat celeritatē: sicuti nec crebritatem ubi ab ambabus auxilium recipit: sed alterius illarū semper defectus, corrigitur altera: magnitudinis, celeritate: celeritatis, crebritate. Quid multis? crebritatis pulsuum causa una est, prioris actionis defectus. Jam quoq; defectum naturalis caloris nullus comitatur ex necessitate pulsus: familiaris sunt tamen ei parvus & tardus præcipue, mox etiam rarus. Nam ut natura quæ jam pridem refrigerata est, nec multū requirit, nec celerè refrigeriū, sic nec brevibus intervallis. Porro inter magnū pulsuum & parvum, naturalis intercedit & moderatus: cum quo comparantes & æstimantes reliquos omnes, qui majores sunt eo, hos magnos vocamus: qui minores, parvos. Itidem inter celerem & tardum medius moderatusq;, naturalis existit. Sic inter crebrum & rarū, durū & mollem, medii sunt naturales. At naturalis nō item videtur, qui inter vehementem est medius & languidum. Validæ quippe facultatis est opus, vehemens pulsus: veluti infirmæ, languidus. Cujus sanè nō est contra naturam firmitas: imò hæc virtus est, & secundum naturā: infirmitas verò facultatis, vitium, atq; præter naturam. Jam verò vino modicè epoto, cum majores & celeriores, tum vehementiores aperte pulsus evadunt. In ira autē, & exercitationibus modicis, nō perinde aperte: imò si quid illis accedat vehem-

Calori so quim.

pulsus familia

Pulsui vel mag gignendo spirare unum causad

Celerrimi pulsus do gign

Pulsus creberrimi causa extremis

Crebritas pulsuum causa est prioris actionis defectus.

Caloris naturalis defectus qui pulsus sint familiares.

Pulsus omnes medii sunt naturales, excepto illo qui habetur inter vehementem languidum.

Vino modico epoto, quibus pulsus gignuntur.

Iracundia mites pulsus quales.

vehementiæ, id adeo est minutum, ut animadverti
 ægrè possit. Cum igitur in cōfesso sit, à facultate
 distendi arterias, probabile est ipsam plus & ce-
 lerius eas attollere validam, minus autem & tar-
 dius infirmam. Ut autem priora repetam, quorū
 pulsū postulat generatio unā causam, huic per-
 petuo illi adhærebunt, eiusq; fidelissimum signū
 existent: ut vehemens, valentis facultatis: langui-
 dus, imbecillæ. At quorum nisi plures interfint
 causæ, constitui generatio nequit, hos familiā-
 res causis esse dicemus, non autē significare cer-
 tam ex illis aliquam. Eodem modo, si ex una ali-
 quando causa pulsus proficiatur, sed non sem-
 per ab ea, familiaris quidē omnibus causis erit,
 quæ efficiunt eū: constanter verò nullam ex eis
 indicabit. Neq; enim si celeritas pulsuum adsit,
 statim robur quoq; necessariò facultatis adfue-
 rit. Imò est, cum major sit usus generati anima-
 lis spiritus: & est cum caloris sit copia, vel in-
 strumentorū mollities, vel horum quædam, vel
 omnia simul. Haud aliter si magnitudo sit pul-
 suum, erit vel facultatis robur, vel impendū ani-
 malis spiritus majus, vel calor in corde abun-
 dantior, vel mollitudo organorū, vel quædam
 horum, vel universa. Qui igitur optimè constitu-
 tus ac temperatus fuerit, is homo si calidior soli-
 to evaserit, atq; hac re sit alteratus duntaxat, ve-
 hementiā pulsuum non immutaverit: imò nec
 duritiæ, nec mollitudinis genus: sed in magnitu-
 dinem & celeritatem vertet, interim etiā in cre-
 britatem, prout magis vel minus eius calor in-
 creverit. At si frigidior justò sit factus, primū ra-
 ritas perspicua erit, deinde tarditas, postremo
 parvitas. Nam cum valida facultas existit, etsi
 paulò minor sit usus, primam actionem nec par-
 vam necesse est, nec tardam esse: secundam ve-
 rò post longius tempus, quam si urgeret usus, est
 consentaneū rationi. Jam si major fuerit refrige-
 ratio, eoq; magnoperè usus ipse remissus, unā e-
 languescet celeritas motus, atq; minor statim e-
 rit distentio. Si plurimū sit refrigeratio progres-
 sa, necessum est pulsus ipsos rarissimos quidem
 esse, cæterum nec tardissimos, nec etiā minimos.
 Nam perfectè tardi vel parvi, si valida facultas
 sit, vel si admodū sit ipse usus remissus, nunquā
 fient pulsus. Eadem & in respiratione est ratio.
 At verò ubi non modò usus, verum etiā facultas
 mutatur, quatuor tum differentiæ diversæ in uni-
 versum erunt. Quarū prima quidem circa facul-
 tatis imbecillitatem, calorisq; augmentū versa-
 tur. Si igitur magnoperè sit imbecillis facultas,
 calor autē igneus, parvi & tardi pulsus, creberri-
 miq; orientur. Sin noxa sit moderata, æquè fiunt
 crebri, sed in distentione & motu mediocres. Se-
 cunda conjugatio in imbecillitate & perfrigera-
 tione consistit: cui pulsus competit cum imbecil-
 lus, tum parvus, tardusq; sicut pulsus prioris con-
 jugationis: sed nō æquè ut illi, ad extremam de-
 venit crebritatem, nisi ubi omnino facultas pro-
 strata fuerit: tunc enim pulsus minimus erit, in-
 termittetq; & deficiet frequenter. At si modicè
 sit facultas infirma, validaq; refrigeratio, creber
 minimè evadit pulsus, q; videlicet usui faciat ta-
 lis facultas satis. Tertia cōjugatio sit, ubi calor si-
 mulatq; facultas augētur: quā qdē conjugationē

vehementissimi pulsus & maximi comitantur,
 sed non perinde celerissimi. Creberrimi verò ferè
 non sunt apertè. Quarta conjugatio est, in qua
 coeunt robur facultatis, & caloris penuria: cu-
 jus sanè sunt pulsus magnitudine moderati, sed
 tardiores, & satis rari. Nam cum sit parvus tum
 pulsuum usus, totumq; facile magnitudo disten-
 tionis tueatur, haud immeritò diutissimè quie-
 scunt arteriæ: tamen ob facultatis robur, disten-
 tionis nō impeditur apertè vel dilucidè quanti-
 tas. Qua ratione etiam, nec multū præpollet tar-
 ditas. In universum autē, ipsius ictus qualitas,
 ferientis naturæ respondet. Porro molle instru-
 mentū, quia promptè in omnē partē extenditur,
 facile dilatatur: durū non absq; magno negotio.
 Jam comes est promptitudinis distentionis, ma-
 gnitudo: renixus & cōtumaciæ, parvitas: itemq;
 celeritas, prioris generis: sicuti alterius, tarditas:
 non tamen ex æquo & magnitudo & parvitas.
 Paulò enim celerior est pulsus profectus à molli-
 tudine instrumentorū, eo quem procreat duri-
 ties: major autē permultò: quia tunica ipsius ar-
 teriæ, quavis duriores interim sint, ad celeritatē
 quandā motus sunt faciles: ad magnitudinē ve-
 rò distentionis, ineptissimæ omnium. Nam opus
 est, ut in omnē partē extendatur facile, quod ma-
 ximā dilatationē sit effecturū: hujusmodi enim
 est molle. Cæterū ubi à natura longissimè aut ad
 mollitudinē, aut ad duritiē, corpus arteriarū re-
 cesserit, tardior mollis pulsus fit duro: magnitu-
 dine tamen nō modò eum etiam nū superat, sed
 illum etiam qui secundum naturā habet. Jam ve-
 rò cum durorum instrumentorū dura distentio
 sit, ac proinde minus expleatur usus: molliū con-
 trā, insignis distentio fiat, & quæ usui par sit ex-
 plendo, meritò cum duris pulsibus crebritates,
 cum mollibus raritates cohærent. Quod si quan-
 do incidat, ut cum duritie concurrat refrigera-
 tio, & calor cum mollitudine, tum pulsus duri,
 mollibus evadent rariores. Si igitur durum cor-
 pus arteriarum sit conjunctum cum innati calo-
 ris refrigeratione, pulsus efficiet justo minores,
 tardioresq;. Si superet durities, minores quàm
 tardiores. Sin autem refrigeratio, contrā tardio-
 res quàm minores. Ad eundem modū crebrio-
 res, si durities refrigeratione superior sit: sin vin-
 cat refrigeratio, rariores. At si par sit utrisq; à na-
 tura flexus, tantò fient pulsus minores, quantò
 tardiores: à raritate verò & crebritate nō abdu-
 centur. Est altera conjugatio, in qua cum calore
 superat mollitudo. Quæ etiā tres necessariò pri-
 mas differentias pducit. Interim enim par mol-
 litudinis est & caloris mutatio: interim præpol-
 let vel mollitudo, vel calor. Quare si quantū na-
 turam mollitudo reliquerit, tantundē desciscat
 etiam ab ea calor, magnos necesse est, & celeres
 fieri pulsus: nō tamen statim crebros, sed ubi ge-
 nerandorum eorum usus vincat magnitudinem
 distentionis. Si mollitudo præstet, magnitudo
 etiam superabit celeritatem. Si vero ita præpol-
 leat calor, ut usum actio complere nequeat, cele-
 riores ut fiant necesse est, quàm majores pulsus,
 simulq; etiā crebri. Quod si abundè natura frua-
 tur usu, æquè magni atque celeres. Sed & tertia
 erit causarum complexio, quæ pulsuum in hoc

*Ictus quali-
 tas, ferientis
 naturam se-
 quitur.*

*Molle instru-
 mentum fa-
 cile dilatari,
 contraquam
 durum.*

*Pulsuum dif-
 ferentia, pro
 mollitudine
 vel duritie
 organorum.*

*Duris pulsi-
 bus crebrita-
 tes, mollibus
 raritates co-
 nexas esse.*

*Calore coeun-
 te cum molli-
 tudine in-
 strumento-
 rum, quæ pul-
 suum diffe-
 rentia oritur.*

Calori si sit adiuncta instrumentorum durities, quas pulsus differentias admittat.

Frigiditati mollietis organorum si coniungatur, qua pulsuum differentia proveniant.

Pulsus omnes qui moderati sunt, non continuo & naturales existunt. Pulsuum differentia, pro miscella modis quibus facultas & instrumenta miscentur.

Continentiū causarū & variantiū pulsus, octo conjugationes.

Actiones omnes reddi crebriores ob defectum qui accidit illis.

genere variant, ubi calori sit adjuncta durities. Quum igitur uterque plurimum à natura declinat, pulsus erunt celerrimi, creberrimiq;: minimi autem nequaquam (nisi simul facultas oblata fuerit) sed aliquatenus iusto minores. At si immodicus calor sit, & instrumentum non magno perè durum, verum paululum à moderato variet, tantum abest ut iusto fiat distentio arteriarum minor, ut etiam major evadat. Erit autem celeris, ultra causarum excellat: maximè tamen cum calor: quo tempore luculentior erit & brevitas. Superest conjugatio ex mollietate & frigiditate. Quia verò magnus pulsus hinc quoq; est molitudini affinis, & parvus frigiditatibus, ultra longius à natura deflectat qualitas, illi necesse est pulsus assimilentur. Enimverò omnes naturales pulsus inter excessus moderatos & medios annumerantur: non tamen quicunq; sunt moderati, etiam naturales existunt. At verò quot excellentiam caloris affectus sequuntur pulsuum, tot etià usus generandi animalis spiritus. Sic instrumentorum durities facultatis imbecillitati conjuncta, parvos pulsus, & tardos, & crebros concitat: robori, parvos & crebros, non etiam tardos, imò longè interim quàm par sit, celeriores. Verum si instrumentum sit molle, facultas autem valida, majores quidem manifestò pulsus fiunt, at aliquantò tardiores, rarioresque. Quòd si ad molitudinem instrumentorum infirmitas adjuncta sit facultatis, si quidè æquus utriusq;, simulq; modicus fuerit à natura flexus, moderati simul & naturales videbuntur ij pulsus esse, nisi quòd erunt mollietis varii. Sin valdè immodicus sit, parvi, tardi, atq; crebri fient. Si verò imbecillitas multò præpolleat, tunc etiam erunt parvi, tardi, crebriq;. Si superior sit mollietudo, accedent pulsus ad moderatos. Restat jam ut omnes simul committamus differentias continentiū causarum pulsuum: ex quibus octo conjugationes constantur. Duæ, quum remissa facultate pariter & usu, modò mollius solito sit instrumentum, modò durius. Duæ alteræ, ubi languescat facultas, & usus auctus sit, instrumentaq; vel mollia, vel dura. Præterea aliæ duæ, quando valida sit facultas, sed remissus usus, unà cum variante instrumentorum differentia. Reliquæ duæ, quum valens facultas sit, auctus usus, accedatq; instrumentorum, quam diximus, differentia. Ac languida quidem facultate simul & remisso usu, omnino in parvitatem & tarditatem mutantur pulsus, in utraq; differentia instrumentorum. Cæterum non redduntur necessariò crebri vel rari. Sed si parva facultatis offensio sit, nec insignis instrumentorum duritia, nihil crebritate pulsus variant: si quidem non pulsus modò, sed universæ actiones crebriores ob defectum evadunt, qui earum accidit singulis. Jà defectus, usu æstimatur. Quum ergo remissus hic fuerit, parvaq; læsio facultatis, nisi per instrumentorum nimiam duritiem, nihil in actione desiderabitur. At si facultas sit magnoperè læsa, modicè usus remissus, instrumentaq; bene dura evaserint, non poterunt non pulsus fieri, quàm postulat usus, minores: itaque imperfectum simul officium: ac quantò quidem imperfectius, tantò etiam crebrius. Verum prout

facultas plus vel minus, aut usus offensus est, etiam pulsus ipsi necesse est plus vel minus ad parvitatem transeant & tarditatem. Nec verò existimandum est, alterationem pulsuum quæ ex omnibus simul causis moderatè oblatis procedit, majorem oportere ea esse, quam facit una. Possunt siquidem, vel ob unicam tantum causam exactè affectam, ad ultimam devenire ipsi pulsus alterationem. Igitur facultas extremè dejecta, minimos efficit pulsus, etià si molles quidè tunicæ instrumentorum sint, urgeat autem necessitas. Itaque ad pulsus extremos constituendos, interdum plures causæ desiderantur, interdum satis est una. Maximus quippe pulsus neutiquam fieri possit ob facultatis robur summum, citra opem aliarum: minimus autem nonnunquam ob imbecillitatem sit solam. Quare ante omnia in pulsuum alterationibus, attendenda quantitas est causarum offensionis. Ut autem ad tertiā & quartā conjugationem explicandas nos convertamus, ubi languescat facultas, urgeat usus, durumq; instrumentum sit, potissimum ad crebritatem, deinde ad parvitatem, postea ad tarditatem, pulsus videbis vergere: non necessariò tamen, nec perpetuò, nec etià in quolibet illorum, nec simul concurrunt omnia. Etenim ubi læsa insigniter sint omnes causæ, minimi, creberrimi, & tardi ipsi pulsus fiunt. At si offensio sit instrumentorum & facultatis parva, ac generationis eorum multus usus, hi non erunt iusto minores, nec tardiores: imò interdum manifestè celeriores: majores autem si non aperte, pares certè perspicue moderatis. Si verò infirma facultas sit, & major usus, unà cum molitudine instrumentorum (quod in quarta conjugatione contingit) si quidem permultum usus non crescat, nec longè à natura absint facultas & instrumenta, multò magis increscet pulsus in magnitudinem, quàm in celeritatem. Crebrior etiam iusto erit, sed non perinde ac ille tertii complexus, quòd usui quàm ille magis hic satisfaciat. Quòd si paululum usus & facultas à naturali statu deflectant, instrumenta verò multum ad mollietatem desciscant, ad mediocritatem pulsus horum affectuum accedet, tum quantitate distentionis, tum qualitate motus, præterea quietis tempore, tantumq; una occursum molitudine statum naturalem excedent. Sin verò non ita deflectant multum usus & instrumenta, facultas autem vehementer laboret, tales pulsus admodum parvi erunt & crebri, modicè verò tardi. Si autem durum sit instrumentum, facultas valida, & usus remissior (hoc enim erit quintum conjugium) minores pulsus gignentur, non tamen necessariò tardiores, sicuti nec crebriores. Verum si admodum remissus sit usus, & instrumenta modicè dura, non minores modò, verum & perspicue tardiores atq; rariores fient. Si vitium usus, à vitio instrumentorum vincatur, abundè fuerit is pulsus parvus, & creber. Si verò instrumenta sint mollia (quemadmodum per sextam conjugationem) neutiquam minor quàm naturalis, quòd quidem conspici possit, pulsus ipse videbitur, nisi singulariter usus sit imminutus: & omnino hoc rarior apparebit, quòd dissolutior sit usus. Porro si usu aucto facultateq; valente, mollia sint instrumenta (hanc enim constituo

Facultas tremè delecta, min efficit p

constituo conjugationē septimam) prorsus magni erunt pulsus & celeres: crebri verò non semper, sed ubi modicè ipse usus increverit. At si arteriarum duræ sint tunicae (quæ octava & ultima est conjugatio) si parva quidem durities sit, sed usus insignis mutatio, majores, celeriores, crebrioresq; quàm justum sit, ipsi pulsus evadent. Sin autè æquo utraq; causa, nec illo admodum longo intervallo, à natura deflexerit, pares quidem naturalibus, sed celeriores atq; crebriores fient. Jam si insignis læsio usus & instrumentorū sit, ut hæc planè duriora sint reddita, ille urgeat impensè, celeriores etiamnum moderatis erunt, minoresq; & crebriores. Cum igitur à valida facultate vehemens discludi pulsus non possit, nec mollis à mollibus instrumentis: si quando pulsus deprehenderis celerem (qualem diximus familiarem esse robori facultatis, usuique urgenti, & mollitudini instrumentorum) si quidem cum neutro illorum celeritas sit conjuncta, intelligas eum pulsus oriri à solo usu urgente: si verò cum altero, omnino ex illo orietur, quod signum tale producat, necessarioque etiam ex incremento usus. Non possunt siquidem celeres pulsus existere, sicuti nec magni, nisi usus postulet. At quatenus ad robur, vel imbecillitatem facultas transit, ex propriis eius pulsibus dignoscas licet. Eadem est ratio & in qualitate instrumentorum noscenda. Quantus autem pulsus generationis sit usus, colligendum est ex commutatione magnitudinis, crebritatis atque celeritatis. Si enim pulsus maximus sit, creberrimusque & celerissimus, summè urget usus. Sin magnus tantum, & paulò celerior sit, non tamen maximus, nec creber, usus non erit magna immutatio. Ex aliis etiā signis, citra pulsus, ipse usus cognoscitur. Nam si ve copiosus sit calor, si ve exhaustiatur animalis spiritus, id haud magno negotio exploratur: quod videlicet calor quidem tactum non fugiat, ac præterea spirandi difficultate, siti, atq; interno laborantis sensu prodatur: animalis autem spiritus absumatur in iis qui exercentur immodicè, ac per halitum digeruntur: & quibus humores fluunt ad interna.

GAL. ENI PERGAMENI de causis pulsuum, liber II.

Inæqualium pulsuum quidam in arteriæ uno motu labefactant æqualitatē, alii illam everunt in pluribus: quam medici collectivam inæqualitatem appellant. De cujus sanè causis primo loco considerabimus. Comitantur enim ejuscemodi pulsus inæqualem cordis temperiē, vitiaq; instrumentorū & facultatis. Nam aut obstructionibus, aut compressionibus, aut duritiē, aut plenitudini superveniunt, sic ut intelligas plenitudinem quæ æstimatur ad vires, seu facultatem. Cum igitur tres causæ sint continentes pulsus generationis, instrumentum, facultas & usus: non potest ex usus alteratione constitui collectiva, quæ aperta sit, inæqualitas: quod nec repente, nec cumulatè adeo unquam immutari usus possit, ut pulsus (verbi gratia) prior sit magnus, vel celer, vel crebrior: alter tardus, vel parvus, vel rarus. Cæterum non quos ratio colli-

git esse impares, vocare inæquales solemus: sed quos dilucidè comperimus sensu tales existere. Porro iracundia (quæ videtur innati caloris esse veluti quidam fervor) habet sanè interdum & ipsa inæquales pulsus: non illos quidem sua sponte (semper enim haberet tales) sed ubi adjunctus ad eam aliquis timor fuerit. Jurè ergo tunc & inæquales apparent, cum non tantum à diversis alterentur causis, sed etiam natura contrariis. Nam propter vindictæ cupiditatē, alti, magni, celeres, vehementes: quia verò timor est major accipienda mali, quàm spes inferendi, parvi, humiles, languidi, & tardi fiunt. Quare invicem utrique pro causæ præpollentis natura, videntur variari: ac ex cellit modò quidem ira, modò metus. Quinimò ipse timor vehemens existens, inæquales efficit pulsus, idq; non usu, sed facultate oblata, nec imperante omnibus instrumentis. Non tamen omni facultatis læsioni succedit collectiva inæqualitas. Siquidem cum per se infirma est, gignit pulsus non ita crebro inæquales. Ubi verò suapte natura est valida, opprimitur aut à copia humorū, aut etiam cōtumacia instrumenta sortitur, tunc illa inæqualem efficit. Cum itaq; delapsa in imbecillitatē insignē facultas arteriæ fuerit, pulsus additur languidi, parvi, tardiq;. Sin illa, quantum in ea est, valeat, sed aliqua copia opprimatur, variosa ita & inæquales conficit pulsus: plurimos quidem languidos, tardos & parvos, cum videlicet gravitate onere est pressa: plurimos autē vehementes, celeres atq; tardos, ubi leviori. Quod si nec admodum gravis, nec nimium levis offensio sit, contrarij ex æquo, paresq; numero ipsi pulsus conspirant.

At instrumentorū vitia, in hunc modum gignunt inæqualitatē. Ubi enim circumjectas regiones arteriæ, quæ ad hoc destinatae sunt, ut illam distentionem excipiant, aliud corpus infederit, non possunt per illud restrictæ arteriæ distendi satis. Itaq; singularū actionū defectus, tandem confertim unum magnū opus absolvit, quod alioqui usus non expleatur. Quo tempore violenter & vehementer agere ipsa facultas cogitur, ut explodat omnino illa, quæ sua instrumenta obsederunt, & prohibuerunt motu. Ac sic sanè majorē prioribus, & vehementiorē, & celeriorē, necesse est pulsus evadere, qui etiā crebrior * vel ab ipso principio fuerat: quando quidem impariū usui actionum, necessario comes est crebritas. Si igitur parem impetū facultas in omnibus quæ consequuntur distentionib; retineret, æquè magni semper fieret, & vehementes, & celeres pulsus: quia verò non retinet, sed refert se ad pristinum motū, ne in casu defatigetur, varia oritur & cōtinua inæqualitas. Accidit etiā interim inæqualitas ob sanguinis copiam, aut in venas, aut in arterias ipsas infusam. Ea tamen facillimè sanguinis detractione sedatur. Siquidem sanguinis copia in venis, vicinas arterias non secus ac tumor præter naturā cōstringens & premens, si per venæ vacuetur sectionem, subito arteriis amplius exhibet locū. Quod verò sanguis in ipsas arterias influens, præcipuè si crassus vel lentus sit, viam intercipiat spiritus, variasq; & difficillimas edat inæqualitates, nemo est qui nesciat. Ubi igitur aut validè comprimentur, aut obstruuntur arteriæ, vel si integra sit

Iracundia est veluti innati caloris fervor.

Iracundia, dum illi est timor adiunctus, pulsus inæquales efficit.

Timor esse affectum iracundia contrarium.

Timor vehemens quatenus ratione pulsus inæquales efficit.

Facultas arteriæ extreme imbecilla, vel aliqua mole humorum oppressa, quos pulsus edat.

Instrumentorum vitia quomodo inæquales pulsus efficiant.

Pulsus inæqualitatem accidere interdum ob sanguinis copiam in venas aut in arterias infusam.

facultas, inæqualitas corripit pulsus. Quod si una cum instrumentorum affectu, facultas etiã perpeffa fuerit, clarissimũ est magis variam inæqualitatẽ existere. Verũ si instrumentorũ illæsus status sit, sed magnoperẽ facultas infirma, decurtata inæqualitas fiet. Ab admotis enim digitis victa facultas, minores semper imbecillioresq; pulsus creat. Cæterum ipsarũ facultatis imbecillitatum, quæ quidem prima & exigua existit, minores languidioresq;, nõ autem decurtatos pulsus efficit. Quæ verò est hac tantò major, ut jam facultati sint oneri applicati digiti: hæc pulsũ decurtatorũ est causa. Quorũ ii quidem, qui ad pristinũ revertũtur motũ, reciprociq; vocantur, minorem imbecillitatẽ ostendunt: qui verò alicubi resistant, majorẽ. Quemadmodũ si perfectẽ pulsus deficeret, extremam imbecillitatem nunciaret. Verũ hæc omnia exploranda esse applicitis arteriæ digitis, non suspensis, apertissimũ est. Differt autem abolitio pulsus, ab eo deficiente: quod illa quidem veluti privatio sit totius functionis: hic, dimidiã tantũ amissio. Qui sanẽ deficiens pulsus quantò decurtatis est gravior, tantò levior existit ipsa pulsus abolitione. Atque hi quidem tres status quãtitate noxæ differũt. Quartus est reciprocorũ decurtatorũ: nempe omnĩ levissimus. Quintus his additur intermittentiũ, qui præcedit deficientium statum. Quod enim in uno aut altero erat, aut certè in numero pulsuum certo, id status deficientium in omnibus efficit. Porro intercidentes pulsus, contraria ratione ac intermittentes, noscuntur: qui quidem etiam inter æquales, qui acervatim fiunt, consistunt: incidũtq; ubi valens facultas copia humorum, vel instrumentorum obstructione impeditur. Ut ergo ad repellenda quæ molestant, majores sæpe & vehementiores ædit, celerioresq; pulsus: ita plures quoque in eiuscemodi præsertim statibus, atq; alti pulsus fiunt: itaq; decretoriam excretionem portendunt. Nec verò tantum facultatis infirmitas inducit intermittentem pulsus, sed instrumentorũ etiam valida obstructio, compressioq; & constrictio, ubi in se nihil prorsus arteriæ allicere valeant. Nunc verò de causis inæqualitatis in uno pulsũ est agendum. Solet igitur celeriter quidem primũ concitata arteria, deinde parva interposita quiete, motu quodam tardo reliquũ distentionis absolvere, dum & usus urget, & facultas, quantum in ea est, obsecundat: interruptitur tamen ab instrumentorũ vitio, aut ab humorum insigni abundantia. Etenim facultatis robur, prioris motus celeritas indicat: sicuti urgentem usum, motus qui sequitur quietẽ. Quippe nisi usus urgeret, nunquã inceptũ motũ facultas absolveret: sed ubi inhibitus primũ eius motus esset, ibi desineret distentionem, unumq; hunc faceret parvũ pulsus. Est & alia differentia distentionis per mediam quietem distincta, in qua motus utrinq; est celer. Videturq; tunc facultas propriam contentionem tueri, copiaq; humorũ reluctari: quare differentia hæc omnĩ est saluberrima. Est præterea quidam alius status medius inter utrumque, ubi motus secundus medius est inter tardum & celerẽ, hoc est, moderatus. Hæ sunt tres differentia di-

stentionum quiete interpellatarum. Sunt præter has & tres aliæ, ubi tardo priore motu, alter trifariam variat: ut aut tardus, aut celer, aut moderatus fiat. Ex quibus pessimus est, qui pulsus utrinq; motũ tardum habet. Ac longè hoc commodior, in quo celer alter: medius inter utrinq; ubi sit moderatus. Haud aliter cum à primò motu moderato, alter tribus modis convertitur: commodiorem significabit statum celer motus: perniciosiorem tardus: medium moderatus. Quintetiam tempus quietis, quò fuerit in singulis harum differentiarum longius, hoc est deterius. E diverso, diuturnius motuum tempus meliorem declarat statũ. Præterea utriusq; distentionis magnitudo, optima: contrà pessima est parvitas. Similiter vehementia optima, remissio pessima. Quod si omnia quæ cõmemoravimus mala, in uno pulsũ convenient, hic illorum pessimus erit: contrà, si omnia commoda, optimus. Transcundo autem ad eos pulsus, qui totius distentionis habent quidem perpetuum motum, non universum tamen pari celeritate, certè qui jam inde ab initio in celeritatem insurgunt, minus onerari facultatem annunciant: qui contrà, magis. Cæterum facultate oppressa, nullus horum existit. Est autẽ proprius qui in contraria affatim mutantur, non solum gravari facultatẽ, sed etiã obstrui & premi instrumenta. At in cõtraria affatim mutari intelligo, si cum moveantur celeriter, subito fiant tardi: aut si ex tardo primò motu evadant celeres. Oriuntur enim hi, cum ex obstructionibus & compressionibus, tum ob facultatem humorum & colluvie oneratam. At verò vibratus pulsus sit, facultate existente valida, instrumento duro, usq; urgente. Quorum si absit quicquid minimè vibratus existet. Cæterũ violenta duræ arteriæ distentio, proximè illius generationẽ cõstituit. Urget autẽ usus, ubi functio ipsi nõ satisfacit, idq; aut ob propriã imbecillitatẽ, aut contumaciam instrumentorũ, ut etiam majorẽ usum. Cum igitur in proposito pulsũ genere facultas requiratur vegeta: relinquitur ut vel usu incresecẽte, vel redundantibus instrumentis, vel utrisq; junctis, distentio in vibratis pulsibus ipsi usui sit impar. At usus, abundantia caloris augetur, vel exhausto animali spiritu. Contumacia instrumenta fiunt, ob obstructiones, cõpressiones, atq; duritiem. Quæ sanẽ durities inflãmat, scirrhus affectis, resiccatis, perfrigeratis, ac denique distentis accidit instrumentis. Itaq; jam omnes invenimus causas originis vibratorũ. Nam intemperata inæqualitas, si ppgrediat, vibrationẽ quidẽ augebit, nõ tamen causa est eorũ generationis. Dicrotus autẽ pulsus (qui fieri nõ potest, quin sit vibratus) in hũc gignitur modũ. Ubi parte illa arteriæ, quã tangimus, duriores sint frigidioresq;, atque ita difficilius moveantur partes utrinq; sitæ, quas nõ attingimus: ac deinde partẽ mediã distentione sua cõcitaverint, retraxerintq; intrò, ac secum rursus extulerint, bis necesse est ipse tactus feriatur. Atq; hujuscemodi pulsus est dicrotus tantum, nõ autẽ vibratus perspicuẽ. Alter verò qui juxta & satis vibratus est & dicrotus, fit ad hunc modũ. Ubi enim arteriæ sublata cum vibratione pars illa quæ sola cute est intecta, jactetur facile,

Distentio
pulsus
te inter
tarum
differen

Pulsus
contrari
fatim p
mutatio
quid pro

Vibratus
sus unde

Usus pul
quando
geat.

Usus pul
abundant
caloris au
tur, sele
hausto an
mali spir
Instrumen
contumac
quomodo
ant.
Dicroti p
sus (qui
cessario et
vibratus
generatio

Dicrotus
tum pulsa
qui dicat
Dicrotus
bratm un

alia

Facultatis
oblesiones di
verse, & a
rias pulsus
inæqualita
tes produ
cunt.

Decurtatorũ
pulsuum de
scriben.

Pulsuum a
bolitio a defi
ciente pulsũ
quomodo dif
ferat.

Pulsus decur
tati recipro
ci
Pulsus inter
mittentes.

Pulsus inter
cidentes.

Decretoria
excretionem
qui pulsus in
dicent.

Intermittens
pulsus a qui
bus causis
oriri possit.

Inæqualita
tis in uno
pulsũ cause.

aliæ autē partes utrinq; sitæ, crassitudine numeroq; oneretur corporū incubentium, adeo ut ne motus quide earū occurat tangentibus: necesse tū est, parte hac, quæ est aperta, omni jam sublata, reliquas non manifestas, quæ utrinq; sunt, adhuc attolli: ac proinde etiā media, quæ delata jandudū est, de integro unā cum illis quæ utrinq; sunt, attolletur, ita ut redeat, occurratq; iterū foris ipsam tangentibus. Planū est igitur dicrotum pulsū, interim ex magna intemperie ortū trahere, parvaq; duritie arteriæ: interim ex ingenti duritie, cōiuncta cum intēperie aliqua, vel crassitudine, vel colluvie humoris, vel carnis. Caprizanti verò pulsui hoc cū dicroto convenit, quod bis pulsat, causa autē nō cōvenit. Neq; enim cum instrumentorū duritia necesse illi est, nec cum intemperie, ut jungatur. Verū ubi facultas cōtentionē nativā retinet, arcetur autē à motu, vel ob humorū colluviem, vel obstructionem, vel compressionem instrumentorū, quies tū distentionē intercipit. Cujus altera pars post quietē, jurē robustior est illa, quæ eam antecedit, quod ab impetu collectæ facultatis oriatur. Quod si etiam ille secundus impetus inferior atq; imbecillior fuerit, erit sanē is caprizante deterior pulsus, non tamē dicetur caprizans. At undosi & vermiculantes pulsus, sola differunt quantitate, sub uno cōprehensi genere. At sunt sanē inter eos nonnulli, qui in diversis partibus arteriæ, inæqualitatē, idq; in una distentione, sortiātur. Sunt aut illorū generationis causæ, imbecillitas facultatis, vel cōpia humorum vel instrumentorū summa molli- ties. Nam cum vis à principio in arterias permeans, totum vas attollere pari firmitudine nequeat, hīc quæ propinquior est parti principi, motum primò auspicatur: sicuti quæ remotior, serius: id quod Erasistratus perpetuò fieri, cæterorū falso, arbitratur. Siquidem nemo ignorat, omnes arteriarum partes naturaliter eodem modo veri tempore. Rarò autē, idq; præter naturā, partes cordi viciniores movētur prius, ac dein remotiores. Qui pulsus nec undosus, nec vermiculans est, nisi etiā hoc illi accesserit, ut quod fluere per arterias videtur, sisti alicubi, & quiescere appareat: mox verò iterū fluere ac iterū retineri, atq; hoc per universam arteriā. Porro qui ex his à cōpia humorū gignūtur, ab illis quos imbecillitas facultatis, citra humorū copiā, induxit, sola magnitudine differunt: unde hī ob parvitatē, vermiculantes, illi ob magnitudinē, undosi appellati sunt. Et causam habēt illi facultatis languorē, hī abundantia humorū. Sed consequūtur etiam extremā molliitudinē instrumentorū hujuscemodi pulsus. Cujus rei molles ac tenellæ virgæ, quæ undoso modo tendūtur, nobis exemplū suggerūt: Validam itaq; facultatē undosus habet: cujus nimirum ope, magnas poterit arteriarū partes attollere: imbecilliorē vermiculans, quod parvis intervallis tum * ipsa facultate moveatur. Quem certē necesse est, inæqualem alioqui, etiā intermittentem evadere. Decurtati etiam pulsus cōsequūtur imbecillitatē ipsius facultatis, à qua nimirum pulsus creantur. Ubi enim à corde vis per meās in arterias singulas, magis ac magis dissolvitur in partibus remotioribus, minores tunc

languidioresq; necessario earum motus fient. Si autem verum sit illud, reperiri nonnunquam minores motus in partibus origini propinquioribus, ad inæqualitatem intemperiei arteriarum causa id genus pulsuum est referenda. Siquidem instrumentū à pari robore, eodemq; si humiditate & calore sit modico temperatū, facilius ac magis movetur. Squalidum autem, aut impense humidum, aut frigidum, lentius minulq; Annuētes autem & circumnuentes pulsus, fieri aliquādo simili modo possunt: sæpe aliis de causis accidere. Si enim valida sit facultas, corpora autē incumbētia arteriis marcescant, qua parte illorum maximē marcida, atque eo leviorē, emicare motus possit, ibi etiam maximē illius magnitudo elucescit. Quod si hujus partis dilatationē aliis utrinq; minoribus compares, decurtatum motum in utrisque partibus cernes: id quod fieri in facultatibus validissimis nequit. At verò ex situ arteriæ fit inæqualitas pulsuum, ubi tenduntur in illas corporis partes, in quas distorquentur. Porro inflammationes, scirrhi, abscessus, & crudorum quorūdam generatio tuberculorū, ac breviter omnes præter naturā tumores, vicinas partes ad sese trahere valent. Squallida præterea durities, frigusq; immodicum, necnon convulsiva intentio, ac breviter intemperatura inæqualis, arterias ipsas distorquet. Convulsivus autem pulsus ab ipsa specie, & affectu, quæ denotate solet, rectē nomē accepit. Tendi enim ad utrumque arteriam putaveris, statimq; homo convulsione corripitur. Est enim confluxio una (ut rectē dixit Hippocrates) & conspiratio una, & omnia consentiunt omnibus estq; omniū natura cōmunis. Nam nisi hoc esset, duo animalia esset, non unum, quisq; nostrum. Cor igitur cerebro arterias, vinculum societatis, transmittit: cerebrum nervos cordi, pari vicissitudine: qui quanquam non magni sint, mandatū tamen rationis perferre possunt. * Singulis præterea arteriis fibræ à nervis deductæ societatem coherent, per quas fit mutuus quidam, non modò actionum, sed affectuum etiam consensus. Nihil itaq; mirum, si cū universum nervosum genus conjunctum arteriis sit, cōmunis appareat affectus. Ut autem de alti, humilis, lati, angusti, longi, & brevis pulsus etiam generatione dicamus, sciendum est, in valentibus omnibus & ægrotantiū plerisq; dum dilatatur arteriæ hos earum superficiem * supernam multò clarius percipere, quam partes obliquas, & quod illa propius ad nostrū accedat tactum, & quod eum * paucioribus interpositis corporib. feriat. Proinde si rectē expēdas, naturalis pulsus est altior, q̃ deficiat semper ejus in latū motus, præpolleat autē in altum. Verū quia is aliorū omniū nobis est mensura, & veluti regula quædā, nec altū, nec angustū vocamus, sed moderatū, atq; inter omnes excessus mediū. Etenim lōg⁹ & brevis ad hūc collatus dicitur. At verò dū moderatū eū pulsū dicimus, nō sensum, sed naturalē p̃portionē ei mediocritatē, cōstituiamus æqualitatis normā. Nā si p̃ sensu judiciū facias, in illo pulsū lōgitudo præstat p̃funditati: quēadmodū hæc latitudini. Equidem altos pulsus in iracūdia & ante iudicationes

Annūentes
pulsus, circū
nūentesq; ubi
de gignuntur.

Inæqualitas
ex situ arteriæ
causa.

Conspicui
pulsus causa

Confluxio in
toto corpore
est una.

Membris
principalibus
necessitudo.
Arterias sin-
gulis inesse fi-
bras à ner-
vis deductas.

Pulsus natu-
ralis cur al-
tior semper
videatur.

Pulsus modē
varius quā di-
citur.

Pulsus alti,
lati, ubi cer-
eantur.

*Pulsus alti
qui sunt di-
cendi.*

fieri manifestè cōperio: latos autē ut plurimū in excretionibus decretoriis. Pulsus igitur modera-
ti memores, si quādo offendamus ipsius motus admodū altitudinē auctā, latitudinē autē aut ni-
hil, aut parū, rectē vocabimus eos pulsus altos. Quod si latitudini manifestū incrementū acce-
dat, eos magnos simul & altos dicemus. Si am-
bo increverint, altitudo simul & latitudo, sed nō multū latitudinē altitudo superet, hos magnos appellamus duntaxat. Cum verò eadem propor-
tione altitudo adaucta latitudinem vincat, qua etiam in naturali pulsu superaret, is pulsus ean-
dem, qua moderatus, retinebit speciē. Itaq; non altus, ut neq; ille, sed major tantum illo videtur. Quinetiā eadem est & in longitudine ratio. Nam ubi eadem proportionē augetur, qua profunditas & latitudo, universum, pulsum, uti diximus modō, repræsentat majorē. Quare ut magnus sit pulsus non requiritur, ut pares, sint motus qui in dimensionib. trinis augentur, sed tantum ut pro-
portione æquales existant. At constat eorū pro-
portio, ubi nulla. præter naturā insignis in crassi-
tudinē mutatio, aut in gracilitatē corporis fiat: præterea nec siccitas immodica, vel humiditas. vel maximē distentionis necessitas. Perit autem, aut perturbatur, cuiuspiā horū præsetia. Ut, si cætera omnia se rectē habeant, facultas autē cōpel-
latur ita magnā facere distentionē, ut ejus tumo-
rem circūjecta arteriis loca nō capiant, in eo affe-
ctu necessum est altus pulsus appareat. Dū enim in eā attollitur magnitudinē distentio arteriæ, ut nusquā coarctetur, naturalē trium dimensionū proportionē tuebitur. At coarctata, tantū detra-
het de illa dimensionē quantū est progressu pro-
hibita. Quocirca iratis, licet corpore sint optimē cōparato, fit pulsus altus. Distentionis enim sum-
mum excessum, ne is quidem cōmodē ferat habi-
tus, sed jam ex imo premitur, & ex obliquo arte-
ria. Sola ergo pars illius ea, quæ instrata sola cu-
te est, nempe superna, omnē calorē excipit: qua-
re necessariō fit altus pulsus. Cæterū multis gra-
cili corpore, nec facultate admodum firma, pul-
sus, si irascatur, magni, & nō alti videtur esse. Nā cum in altis pulsibus tantū facultatis robur desi-
deretur, ut maximā distentionē moliri possit, & quā loca arterias ambientia excipere nequeant: manifestū utiq; est, in cōmemoratos affectus nō posse altos pulsus incidere. Jam verò ubi natura-
li robore facultas aliquatenus deficiatur, & lati-
tudo sit insignis locorū, pondusq; accedat arte-
riis ex superioribus partibus, hic pulsus collatus ad moderatū, est latior. Etenim aut altitudo im-
minuta, aut latitudo aucta, potest latum pulsum efficere. Invenitur aut motus nonnunq̃, qui qua-
tuor occurrat digitis, sed ita angustus & obscu-
rus ut subtilis fidis speciē referat: atq; is quidem pulsus lōgus vocatur. Ac talis quidē pulsus, qui videlicet fidem aut pilum refert, nō solum tuni-
carum maximā siccitatē ostendit, sed etiam indi-
cat facultatē imbecilliorē, quā quæ possit con-
tumax instrumentū distendere. Quid igitur si hæc vera sunt, * non statim talis pulsus fit brevis? an quod hujuscemodi pulsus, in tenui corpore, cō-
tentaq; & aliquatō duriori cute accidat? Etenim si cutis remissa & crassa, magnā partem motus *

*Pulsus ma-
gno gignendo
quid requi-
ratur.*

*Iratis fit pul-
sus altus.*

*Pulsus latus
quando ac-
cidat.*

*Pulsus lōgus
qualis, &
quid signi-
ficet.*

obscurat, utiq; tenuis simul cōtentaq; totū om-
nino servabit. Unde liquet conspirare gracilitatē totius corporis oportere, & duritiem cutis simul & instrumentorū, cum facultatis imbecillitate, nō summa tamē, ad talem pulsum gignendū. Ac vocatur quidem per excellentiam longus: pro-
priē autē tenuis & gracilis. Nam propriē & abso-
lutē dicitur longus, cuius neutram aliquarum di-
mensionū percipimus. At verò brevis fit pulsus, ubi in parva quapiam particula, arteria sola cute contegitur, ob idq; sensibiliter pulsat: partes au-
tem ex utroq; illius latere omnes in profundum merguntur, unde prodere motū nequeunt sensi-
bilem. Dicitur etiam per excellentiam hic pulsus brevis. Propriū tamen ejus nomen est, crassus & turgidus. Nam qui simpliciter brevis est, vel ex corpulentia nascitur, vel ex parvitate. Proximū est ut de ordinatis & inordinatis agamus. Qui quidem quandoquidem inæquales omnes sunt, sed in eo variant, quod æqualitatē hi certis orbi-
bus servant, illi cōfusi undequaq; sint: intelligen-
dum est, causam, quæcunq; inæqualitatē efficiat, semper firmam in ordinatis & fixam esse: in inor-
dinatis autem, nequaq̃. Insuper ordo, ut æquali-
tas naturæ, si quid aliud, est familiaris. Quare si alterum eorum sit cōturbatum, minorem signi-
ficat offensam: sin utrunq; majorem. Concur-
runt autem ambo in inordinatis, alterum in or-
dinatis qui sunt inæquales. Quod verò ad mu-
tationum rhythmorū causas pertinet, si rectē qui-
dem est demonstratū, allici per arteriarum dila-
tationes æream quandam substantiam: in con-
tractionibus autē excrementa excerni, & quasi fuliginem adestorum humorū: certē necellum est, cum distentionis usus instet, majorem fieri, celeriorēq; distentionem: cum contractionis, contractionem. Quamobrem, quibus in ætati-
bus plurimi infumuntur humores, ac proinde plurimum excrementi colligitur (semper enim quantitati confectorū succorum, excrementorū responder quantitas) quæ sunt usq; ad juvenu-
tem, in iis nonnihil cedit contractioni distentio. In quibus autem paucissimi (quod contingit in senibus) longē majus est distentionis tempus tem-
pore contractionis.

GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. III.

Quandoquidē pulsuum alterationes, quæ ex primis & præcipuis causis, p̃ficiscuntur, abundē * sermo antē habitus enarravit, illas nunc explicabimus: quæ ab aliis omnibus sunt, quæq; non per se planē, sed quod mutant primas, causæ pulsū vocantur. Cæterū quia hæc partim præter naturā sunt, partim naturales, partim etiam inter has mediæ, quas nō naturales appellant: rationi videatur consonū, ut à naturalibus exordiamur, idq; eundem sequētes ordinē, quē in libro tyronibus descripto observavimus. Viri igitur * in universum, mulieribus habent pulsum lōgē & majorem, & vehementiorē, paulo tamen tardiorē, sicuti & satis rariorem. Si quidem cum mas sit calidior & siccior fœmina, necessum est usum generationis pulsum, & instrumentorum * constitutionē, differre in illis: ac proin-

*Pulsus
qui quæ
priē dicitur*

*Pulsus
plicare
qui quæ*

*Pulsus
nati
natiq;*

*Ordo
tasq;
famulus
existit*

*Rhythm
mutant
causas*

*Arteri
tata tr
aerem*

*tracta
lunt fi
nem.*

*Excre
rum q
tas res
quant
confect*

succorū

*Causa
differen
triplex*

*Viri in
versum
lseribant
bent pu
longē &
iorem &
hement*

proinde ipsos pulsus. Atqui copiosi caloris magnus pulsus esse familiarem ostendimus. Igitur cum mas sit non calidior modo, sed multo calidior femina, utique; maiores, ac multo maiores quam illa pulsus habebit. Siquidem pro naturali temperamento, major tantum, non multo maior erit ipsius viri pulsus: si autem accesserit à peculiaribus vitæ institutis utrique; differentia (illa enim in ocio vivit, hic in multis laboribus.) ut sanè multo ita calidior vir redditur, sic pulsibus est quæ femina longè majoribus. Addidimus autem sermone particulam illam, *in universum*, ut studiosis vice stimuli esset, ad totius rei perferendum naturam. Sic enim statim de naturali differentia viri & mulieris meditabuntur, reperientque universum genus in omnibus animalibus, masculinum valentius femineo esse. Cæterum secundum alias differentias præter naturam (ut videlicet si hominem frigidum præditum temperamento, molliterque educatum, cum biliosa viragine cõferas) certè in muliere ipsa reperies quam in viro pulsus longè majorem. Naturalis itaque differentia, ut maris quidem ad femellam, majores tantum, atque vehementiores: ut viri autem ad mulierem, multo majores ac vehementiores pulsus producit: quod nimirum viris naturale robur laboribus crescat. Quinetiam & facultatis robur, quod maribus adest, & ipsum aliquid conferat ad magnitudinem pulsuum. Quippe validis facultatibus magni pulsus peculiares existunt. Taceo totum corpus virile, ad perspiratum esse optimè comparatum: purum: excrementisque; vacuum, neque cõpressum: feminis autem cõtrario modo dispositum. Quare ut illorum habitus ad magnitudinem, sic harum ad parvitatem pulsus videtur aptus. Nam etsi ipsis adsit instrumentorum mollities, quæ ad pulsus magnitudinem facit, plures tamen fortiores quam aliæ, sunt parvitatibus causæ: nec plurimum viri à mulieribus dissident mollitudine. Quod si multo mulieris instrumentum sit mollius, cum facilius sic sit cessurum humoribus infestantibus, id ipsum erit etiam in causa, ut minores in eis pulsus fiant. Est autem mulieris pulsus celerior quidem pulsu virorum, non tamen excessu insigni. Si quidem cum earum pulsus sit multo minor, quam ut possit usum explere, augeat quantum potest celeritatem: cui eandem ob causam accedit crebritas. At verò infans masculus majorem tantum, vehementiorem, rariorem, non item multo, pulsus habet, quam infans femella. Qui natura calidi sunt, multo habent majorem, celeriorē, atque crebriorem pulsus: non autem multo vehementiorem. Cæterum impræsentiarum calidos (ut moris est) dicimus, qui humiditate, siccitateque temperati cum sint caliditate exuperant. Hi igitur quo calidiores sunt temperatis, eò majores habent, celeriores, atque crebriores pulsus. Cur autem non multo vehementiores, id quidem jam exposuimus prius, de ipsoque; nonnihil postea dicetur. Graciliores citra ullum affectum alium, majorē, rarioremque; multo, vehementiorem paulo pulsus sortiuntur. Nam cum gracilitas ipsa, regiones arteriarum magis dilatat, levioraque; incumbencia corpora reddat, pulsibus magnitudinem haud con-

temnendam conciliat. Atqui, ubi pari relictò usu, crescit magnitudo, rariores tunc necesse est pulsus fiant, idque; tantò, quātò scilicet sunt majores. Majores verò erāt multo, proinde rariores etiā multo erunt. At vehementiores esse apparebunt, non quòd ullum acquisierint robur, sed quòd magis prodant quā habebant tensionem. Pro ætatibus hoc pacto pulsus variatur. Infans pulsus creberrimus est, rarissimus senis: omnes qui inter hos intercedunt, proportionē servant, prout vel ad puerum, vel ad senem accedunt propius. Celerimus item pueri pulsus, tardior senis existit. Reliquarum ætatum pulsus ambigunt inter hos. At senex à puero, longè magis raritate, quam celeritate distat. In vehementia & magnitudinis differentia maximus est, ut in ætatibus, pulsus juvenum, minimus senum, medius & paulo major pulsus puerorum. Jam vehementissimus juvenum, languidissimus senum, medius inter hos, puerorum est pulsus. Etenim cum calore non paucò pueri præditi sint, substantiā quoque; quæ refrigeret illū, non paucā postulant, Quinetiam substantiā animalis spiritus in illis non tantum nutriri oportet, ut in adultis, sed etiā unā cum instrumentis augeri. Itaque; his nominibus pueri magnis dilatationibus egent. Quia verò etiā humores exhauriunt plurimos (videlicet nutrimenti & incrementi ratione) ob idque; fuliginosorum excrementorum acervum per totum corporis habitum contrahant, utique; desiderant etiam arteriarum maximas cõtractiones. Maximum ergo, simulque; celerrimum pueri utrumque; motum requirunt: sicque; infra usum est functio in iis. Nam licet quæmaximè celeres sint, & magni, usum tamen non explent: quare hic crebris opus est motibus. In senibus autem planè contrā habet, calor paucus, cui par est generatio fuliginosorum excrementorum, spiritusque; animalis nutritio. Jurè itaque; habent contrarios illi pulsus, parvos, tardos & raros. Sunt ergo pulsus puerorum magni, si cum magnitudine eos arteriarum cõferas: parvi autem, si quantitatem tantum distentionis spectes, eamque; ad pulsus juvenum cõferas. Sed tamen non maximos pulsus sortiuntur pueri, ne si ad magnitudinem quidem eos arteriarum perpendas. Siquidemque; nec facultas eorum perveniat ad summum robur, & coarctetur in eis molles arteriarum tunicae, multum de maxima distentione detrahatur, tametsi pulsus eorum mediū superet. Porro mollitudines instrumentorum, quæ remotæ à coarctatione sunt, ad pulsuum magnitudinem conferunt: quæ verò premuntur atque; gravantur, ad parvitatem: præcipue si facultas destituatur robore. Cum autem utriusque; motus plurimus infestantibus usus sit, minimus senibus, & omne interpositum tempus ætatum utrumque; usum remittat, magis autem cõtractionis: rationi consonum est, ut quantum à pueris recedant ad senes, tantum semper utrumque; motum habeant tardiorē: magis autem cõtractionis. Atque; ex his nascuntur differentie rhythmorum pro ætatibus. Est autem vehementissimus juvenum pulsus, & languidissimus senum quoniam illis quidē facultas validissima est, his debilissima. In aliis etiā ætatibus, pro robore illarum vel imbecillitate, pulsus remissione & vehementia differet. At verò pro anni temporibus, medio quidē Verè pulsus maximi & vehementissimi sunt, ut in temporibus:

Pulsus secundum ætatem discrimina.

In senum pulsus est maximus.

Puerorum pulsus celerissimus, magnus & crebris.

Senum pulsus parvus, tardus, atque rarus.

Mollities instrumentorum quando ad pulsus magnitudinem cõferat.

*Autumno
quales fiant
pulsus.*

*Hyeme qua-
les fiant pul-
sus.*

*Pulsuum dis-
ferentia secu-
dum tempo-
rareferun-
tur ad usum,
facultatem,
et instrumen-
ta.*

*Ver medium
esse tempera-
tissimū: quo
tempore ha-
bent optimē
corpora.*

*Pulsus pecu-
liares opti-
ma constitu-
tioni corpo-
ris, quales.*

*Aestate cre-
scit usus pul-
suum, sed la-
guescit facul-
tas.*

*Hyeme auge-
tur facultas,
sed pulsuum
usus miti-
tur.*

*Crescentia
plurimum
habent cali-
di innati.*

*Calor innatus
est tempe-
ratus, ut ac-
quisitivus
intempera-
tus.*

*Calor ad ven-
tū functio-
nes reddit
imbecilliores.*

*Pulsus im-
mutari a re-
gionibus, no-
tus quam a
temporibus.*

poribus: celeritate verò & crebritate commode rari. Pari modo medio autumno. * Progrediens autem Ver, non nihil de magnitudine & vehementia detrahit, sed auget celeritatem & crebritatem, ita ut ineunte æstate jam languidi, parvi, celeres, crebriq; fiant. Autumni progressus cuncta imminuit, magnitudinem, vehementiam, celeritatem & crebritatem. Sic ineunte hyeme, in parvitatem convertuntur, remissionem, tarditatem, & raritatem. Respondet autem initium veris, extremitati autumnus: illius finis, initio huius. Aestatis item principium, suo, & principium hyemis, suo fini. Proinde quæ pari spacio à media æstate & media hyeme in utraque deflexerunt partem, similiter variant. Porro media æstas, partim convenit cum media hyeme, partim dissidet. Nam parvi utrobique & languidi sunt, sed celeres: crebriq; æstate: tardi, rariq; hyeme. Non perinde tamen parvi æstate ac hyeme: sed æstate minus.

Nec ita hyeme languidi, ut æstate. Quæ igitur secundum tempora accidunt, ad has referuntur tres causas: ad usum, facultatem, & instrumenta. Nam prout in ipsis horum singula variant, mutantur pulsus. Ac medio quidem Vere, aeris status nos amplectentis, temperatissimus est: itaq; corpora etiam sunt sana. Siquidem eo præcipue tempore, facultas est robustissima, & moderatissimus calor, necnon instrumenta ipsa libera ab omni excessu. Unde & pulsus corporibus quidem optimè comparatis, maximi & vehementissimi fiunt. Nam hi peculiares sunt validæ facultati, & moderato usui, instrumentisq; naturali lege constitutis. Si verò usus non nihil mediocritatem excedat, non modo magni & vehementes, sed etiam celeres fient. Quod si ne sic quidem functio expleat usum, mutatio transibit in crebritatem. Aestate porro crescit usus, sed languescit facultas. Quamobrem aliquatenus decrescit illa vehementia simul & magnitudo: sed tamen hæc minus. Nam quia urget usus, augetur non nihil: unde etiam celeritati & crebritati accedit momentum non contemnendum.

Hyeme contra, quam æstate, est validior facultas non æquè tamen ac Vere: sed usus remittitur generationis pulsuum. Quare languidiores pulsus hyeme quam Vere sunt, & vehementiores quam æstate: cæterum satis sunt parvi, quod & facultas infra summum sit robur, & usus remissus admodum: quæ ipsa in causa remissio est, cur tardi, rariq; existant. Jam verò ubi Hippocrates dixit, Quæ augentur, plurimum habent calidi: non simpliciter calidi dixit, sed innati addidit, ut qui alterum sciret calidum acquisitionem esse, cuius magna copia juvenibus suppetit. Est enim temperatus calor natus, acquisitivus autem intemperatus: & quasi igneus. Similiter quando inquit, Ventres hyeme & Vere naturaliter calidissimi sunt: de calore nativo intelligit. Quæ quidem cum obtineant æstate paucissimè, adventitio calore abundant: unde marcescit potius, quam nutritur corpus. Ad hæc, is adventitius calor tantum abest, ut functiones meliores reddat, ut eas etiā longè inferiores efficiat illis, quæ à moderato proficiuntur. Pro regionibus etiam perinde ut pro natura temporum. In vehe-

menter calidis, sicuti media æstate: in magnopere frigidis, ut media hyeme: intemperatis, ita ut medio Vere. Ad harum proportionem, quæ medii locum sortiuntur. Similiter alij status aeris nos circundantis, calidi quidem, temporibus calidis, frigidi frigidis, medij medio Veri respondent.

Prægnantium pulsus, majores, crebriores & celeriores sunt: cætera verò tumentur. In eis siquidem, præter usum, priorum mutatum est nihil. Increscit autem is, & augetur, quod mulier non sibi jam soli respiret ac pulset, sed foetui etiam cogatur: quare celeriores, majores, & crebriores fiunt pulsus. Somni etiam, si quid aliud, inter naturalia censentur, qui & ipsi variant pulsus: initio siquidem minores, languidiores, tardiores, rarioreq; illos efficiunt: procedentes, tarditatem pedetentim augent, & raritatem, præsertim à cibo: tunc tamen sunt majores, vehementioresq; pulsus: tandemq; si diuturni ij fuerint, ad remissionem & parvitatem redeunt, tarditatem & raritatem servantes. Etenim facultas concoctrix per somnum se intro recipit magis. Cum ergo intro moveatur, conficiatque materiam, primo quidem veluti imbecillior red datur, oneraturq;: paulo autem post, dum alimento fruitur, quod conficit, confirmatur ipsa, calorq; animantis augetur. Quia igitur oneratur facultas initio somni, atque debilitatur, oportet minores pulsus languidiores existere: at mox ea confirmata, è diverso majores, vehementioresq;. Cur autem concoctiones per somnum exactius fiant non in ventriculo modo, sed in arteriis & venis, non est huius loci explicare. At verò quandoquidem dormientibus motus caloris qui foras tendit, est imminutus: viget autem, qui intro: contractionem quidem oportet celeriores fieri, distentionem verò tardiores: ac proinde totus ille pulsus non est absolute tardus, potius quam velox, sed tantum altera parte tardus. Nam si motus qui intro pergit, præpolleat, prorsusque confideat: ac rursus inde incipiat, qui foras tendit, haudquaquam hic pulsus distentionem producet plurimam. Si verò præpolleat motus qui cõcitur foras, contrario existente debili, minimè sanè tunc ab extremo orditur collapsu in distentione, ac summam tandem assequitur magnitudinem. Porro dormientium pulsus qua parte foras movetur, similis est vigilantium pulsibus: qua intro, permultum videtur distare, quod terminos internos motuum sensus noster non assequatur. Minor tamen est & languidior, præsertim in ipso principio. Præterea tardus in distentionibus est, & in contractionibus velox, introq; recurrens magis. Quare si vehementem eum in contractionibus dicas, nihil erres. Etenim excrementum fuliginosum, quod tunc ex confectis succis copiosius colligitur, arteria excernere vehementius desiderat. At verò ubi absolute succi confecti sunt, si in somno permaneat homo, immoderatus erit utique talis somnus: ob idque merito uterque motus erit minor, tardus, imbecillus & rarus, cum nimirum somnus sit mortis frater. Nam si alimenti elaborationem excipias, quæ communis somno cum ventibus adeit, cætera mortem referunt: non

videre

videre, non audire, nihil intelligere, vel cogitare, vel sentire, ratione carere, ac breviter, projectum esse. Quid itaq; aliud est somnus, illo communi ablato, quam ad interitum via? Qui expergiscuntur, evestigio pulsus magnos, vehementes, celeres, crebros, & cum quadam vibratione habent: qui mox mediocritatem assequuntur. Non perinde autem in somnum incidimus vigilantes, ac ex somno evigilamus: quod hoc ferè subito, illud omnino pedetentim fiat. Etenim turbulenta insomnia, vel si quis vociferetur, perstrepat, aut ipsum dormientem tangat, celerem sic, & subitanam concitat mutationem. Quare tunc pulsus illi quos nuper commemoravimus, clarissime percipiuntur. Fit autem somnus, ubi natus calor aut ex fatigatione, & nimia siccitate ad alimentum sese convertit: aut ob immodicam humiditatem foras nequit progredi. Quorum primus quidem saluber & naturalis existit: secundus autem, qualis est in comatibus & lethargis. Cui opposita est phrenitidum & vigiliarum non naturalium vigilantia, ubi desiccatus natus calor est, & quasi inflammatus, atque idcirco foras etiam movetur immodicè. Ascititiae habitudines corporis, perinde pulsus ut naturales immutant. Nam gracilis natura, si quadratus evaserit, ei qui talis natura est, assimilem pulsum habet: ac sic de ceteris habitudinibus est dicendum, semota tamen omni virium immutatione. Jam etiam temperamenta corporis ascititia, pulsus naturalibus temperamentis mutant similiter. Calida siquidem calidis, frigida frigidis, assimiles pulsus creant. Nam temperamentorum in humiditate & siccitate discrimen, continetur in habitudinibus corporis. Siccis quippe gracilitas, corpulentia est humidis familiaris. Præterea duritia corporis, sicca temperamenta: mollitudo, humida comitatur: atque ita pulsus his mollis est, illis durus. Ut autem mutationes alias, quæ causis naturalibus carent, recenseamus: exercitationes quidem, si moderatæ sint, vehementes, magnos, celeres & crebros pulsus efficiunt: si autem multæ viresq; laborantis excedant, parvos, languidos, celeres & crebros in summo. Nimiùm immodicæ, adeo ut ægrè jam se possit homo movere, & multis interpositis quietibus, aut nihil prorsus possit, sed remissæ vires impenitentes sint, pulsus mirè parvos & languidos, tardosq; & raros. Quod si perventum eo sit, ut vires oppressæ sint, pulsus creant illis proprios. Etenim facultas in exercitationibus, universam adhibet contentio-

languidos, tamn adhuc celeres & crebros. Quod si hic non cessetur, parvos languidos, tardos & raros. Etenim ex balneis commodatis, si quis eis opportunè utatur, videlicet ubi defessi fuerimus, incaluerimus, refrigerati, reficcati, nausæ affecti, aut inæquali intemperie fuerimus, aut denique evacuatione desideraverimus, manifestè corpus juvatur. Nam corpori restitunt mediocritatem temperamenti, vires corrigunt, opportunum calorem augent, ac denique unà cum sudoribus nonnihil * flatuum discutiunt. At immodicæ balneæ, ipsam facultatem dissolvunt, usumq; præter modum intendunt. Frigidæ balneæ, ilico parvos & languidiores, & tardos, rarosq; pulsus efficiunt. Postea, prout id sit quod induxerunt, omnino vel torporem conciliabunt, vel robur. Quæ torporem induxerunt & refrigerarunt, parvos & languidiores, & tardos & raros efficiunt. Quæ excalfecerunt, & robur concitarunt, magnos, vehementes, celeritate & crebritate moderatos. Etenim balneæ frigida statim refrigerant omnino: postea verò vel confirmant, vel obruunt facultatem, unaq; perfrigerant. Itaq; & pulsus proportionem immutantur causarum. Porro in lotionne frigida, arteriarum motus plus intro quam foras fertur: quod & calor illuc ilico magis feratur. Cibus adeo copiosus, ut opprimat facultatem, pulsus inæquales atque inordinatos concitat. Modicus, magnos, celeres, crebros, vehementes. Parcior quam qui satis nutriat, non æquè ac moderatus, ceterum minus mutat, neque id diu. Vinum pulsus cetera ut cibus variat: hoc verò interest, quod ilico immutet, & citius mutatio à vino profecta recedat, quam illa quæ à cibo: quod item celeritatem amplius & magnitudinem, quam vehementiam & crebritatem augeat. Etenim appositio quam facit vinum celeris est, quod humidum sit & calidum. Præterea, quæ affatim ac subito nutriunt, hæc celeriter permeant. Quamobrem, ut celerem, ita minimè diuturnam è vino appositionem corpora accipiunt, cum facile digeratur per halitum. Porro quod nutriat, pulsus ita ut cibus variabit: quod autè amplius quam ille calfaciat, insigniorum addiciet illis & magnitudinem, & celeritatem. Jam verò in choleris, magnis alvi fluoribus, ac omnibus deniq; iis, quæ immodicè corpus vacuantia, ipsam facultatem debilitant, continenter pulsus vermiculantes accidunt. Ubi autem oppressa est à febre cacoëthe facultas formicantes oriuntur. Siquidem ut pulsus vermiculans sit, tardus omnino esse atque rarus debet. At in acutis febribus (cujusmodi necessarii sunt cacoëthes) non sustinet pulsum caloris copia, vel tardum in summo, vel semel fieri rarum. Ceterum tardus est, aut certè non celer pulsus, ubi facultas opprimitur.

GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. IIII.

In hoc autem libro, de causis pulsuum præter naturam dicamus, ab animi perturbationibus orsi. Ira igitur altus est pulsus, magnus, vehemens, celer & creber. Siquidem

Balneorum
moderatorum
commoda.

Balneæ im-
modica facultatem dissolvunt.

Balneæ frigida quomodo pulsus immutant.

Pulsuum pro
cibi variis
modis mutatio.

Vinum quam
celeritatem
ipsos pulsus
immutat.

Vini appositio ad corpora, ut celeris, ita minimè diuturna existit.

Vinum cur pulsus, quæ cibus, maiorem & celerem reddat.

Vermiculantes pulsus quibus effectibus accidunt.

Formicantes pulsus quando gignantur.

Cacoëthes febres.

Ira pulsus quæ sit.

faculta-

facultates animalis moderatrices, si quando impendeat necessitas, majore vi suas obeunt functiones: id quod in iracundia conspiciatur. Similiter etiam per bonas judicationes, pulsus fiunt manifeste vehementes. Tunc siquidem facultas, ut molesta explodat, seipsam excitat. Lætitia magnus, rarus, & tardus est pulsus: at nihil differt vehementia. Lætis enim diffunditur per universum corpus calor, ac plus foras ejus motus effertur, ut tristibus intro. Unde major fit merito pulsus illorum, non tamen vehementior. Cæterum ea quæ diximus, * de moderata lætitia, & quæ propria ratione pulsus ipsos immutat, non de immodica, quæ vires ipsas * resolvit, intelligenda veniunt. Tristitia parvus, languidus, tardus & rarus est. Nam cum tristitia ipsa refrigeret, caloremque intro concitet, merito contrarios pulsus superioribus efficit, quæ lætitiâ sequuntur. Timoris recentis vehementisq; celer, vibratus, inordinatus, atq; inæqualis est pulsus. Nam inveteratus, similem habet tristitiæ. Neque enim quicquam à tristitia abest diuturnus timor. Omnibus autem his, si diuturna, aut vehementia fuerint, pulsus succedunt, quales viribus dissolutis: cum nimirum dissolvant omnia hæc facultatē: brevis quidem, vehementia: tempore verò contraria. Dolor, qui quidem variat pulsus (variatur autem ingens, aut qui principes occupat partes, quem admodum & inflammatio) si parvus sit, atq; incipiens, pulsus ædit majorem, vehementiorem, celeriore, crebriorem. Auctus verò jam, admodumq; validus, ut etiam vitale robur offendant, minorem, languidiorem, celerem, atq; crebrum. Et quod diuturnior sit aut vehementior, hoc illorum quodque increfcet magis. Qui verò jam facultatē dissolvit, in remissionem & parvitatem ementitāq; celeritatis speciem, atq; ingentem, crebritatem commutat. Siquidem ut in omni molestia facultas, ita in doloribus sese solet, ad rejiciendum id quod infestat, accingere. Quare in magnitudine & celeritate, vehementiamq; ipsos pulsus permutat. Quæ si in eo nihil proficiat, veluti ex inani labore vis ejus atq; contentio opprimitur: ac sic pulsus in remissionem recidit. Inflammatio omnis habet communem pulsus, veluti ferrantem: ut alia pars attolli arteriæ, alia haudquam videatur. Habet etiā vibrationis aliquid hic pulsus, ac celer quidem & creber est, non tamen perpetuo magnus. At singulis est suus proprius. Orientibus quidem, major justo, vehementior, celerior & crebrior. Augescentibus adhuc, cum illa omnia increfcunt, tum clarè jam durior, magisq; vibratus est. Vigescantibus autem manifestior est, duriorq; atq; vibratus magis, sed minor est quam dudum, non tamen languidior, nisi superet facultatē affectus: quinetiam crebrior fit, atque celer. Quod si diuturnior sit inflammatio, atq; durefcatur in scirrhum, accedet dictis gracilitas pulsus, duritiesq;. Atq; hæc quidem in inflammatione cernuntur, quæ pulsus per totum corpus immutat, vel quia magna est, vel quia principem partem obsidet. Si verò minimè universum corpus afficiat, talis erit pulsus in parte inflammata, qualem descripsimus. At verò partes nervosiores, duriores ædunt pulsus, magisq; ferran-

tes, & minores: quæ pluribus venis præditæ sunt, & arteriis, contra. Atq; inter hos major est, dum arteriæ in partem abundant: sitq; tunc inæqualis, ac facile inordinatus. Porro quibus septum transversum est inflammatum, hi convulsionibus sunt obnoxij: quibus pulmo, suffocationibus: quibus os ventriculi, syncopis: quibus jecur, atrophia: quibus ventriculus, cruditati: quibus renes, urinæ suppressioni. Ad hæc, partes insigniori præditæ sensu, pulsus etiam dolorum nomine mutant: quæ minus sentiunt, pro affectu tantum. Etenim omni parti quæ inflammata est, hæc necessario duo accidunt, calor immodicus, & tensio: quæ corpori universo communicatur, ubi aut pars nobilis inflammata fuerit, aut insigni prædita inflammatione. Atqui immodicus calor qui universum corpus occupet, febris est, quæ usum pulsuum alterabit dilucidè. At partis inflammata tensio pervadet arterias: quamobrem pulsus durior reddetur, præcipuè in nervosis partibus, quod præ cæteris hæc tendantur inflammationibus, ut quæ sunt sua natura jam tensæ, atq; una secum partes vicinas contendunt. Nihil autem est mirum, si inæquales in arteriosis partibus inflammatis fiant pulsus, cum eorum facultas effectrix, opprimatur humorum colluvie, ipsaq; sint affecta instrumenta. Pleuriticorum celer est pulsus & creber, nec admodum magnus. Videri etiam possit vehemens. Est tamen nec vehemens, nec languidus, quod ad affectum attinet. Etenim pleuriticorum pulsus, quia nervosiorè duriorēq; arteriā prodit, imperitis imponit, ut videlicet durum pulsus, esse vehementem existiment. At verò illa inæqualitatis species, quæ ferrantis præbet imaginem, pleuritidis in primis proprium est signum: si quidem remissa sit, mollis & facile maturanda: si verò magna, difficilis, & admodum cruda pleuritidis. Tales cum imbecilli facultate conjunctæ, periculosa existunt: cum firma autem, aut tardè coquantur, aut ad suppurationem deflectent, aut tabidus eas excipiet marcor. Acilius sanè quæ maturefcit, pulsus pedetentim deponit omnem mutationē præter naturam. Quæ vergit ad suppurationē, pulsus suppuratorum proprios sortitur: sicuti & marcorum illa, quæ in tabem degenerat. Est autem ipsa pleuritis inflammatio costas succingentis membranæ. Itaq; febriunt acutè, quia pars affecta, cordi est vicina. Quia verò eo modo febricitant, ideo habent & pulsus celerem: durum autem insigniter, quod pars nervosa affligatur. Jam quia ita habet, ideo minor est pulsus, quam febri expediat. Quare ut & creber fiat, par est quod magnos pulsus calor postulet, refragetur autem durities. Siquidem quantum ab usu abest magnitudo ipsius pulsus, tantum a crebritate pensatur. Inæqualis autem in iis est crebritas, quod neq; humorum qui inflammationem committunt, una sit species. Quare si sint biliosiores, etiam febris acutior erit, consequeturq; facultatis offensio quædam. Sin pituitosiores, & levior erit febris, & ad soporem proclivior. Nunquam enim in pleuritide & peripneumonia sit, ut tamen non afficiatur, quod humorum excipiat in illis inflammationibus putrescentium fuliginē. Verum si putris humor fuerit biliosus, vaporem edit instar

*Pulsus reddi
vehementes,
per bonas in-
dicationes.*

*Lætitia pul-
sus.*

*Lætis diffun-
di calorem
per univer-
sum corpus.*

*Tristibus in-
tro converti
caloris mo-
tum.*

*Tristitia pul-
sus.*

*Tristitia re-
frigerat.*

*Timoris pul-
sus.*

*Timor in ve-
teratus a tri-
stitia non dif-
fert.*

*Pulsuum pro
dolorum va-
rietate mu-
tatio.*

*Pulsuum pro
ratione infla-
mationum mu-
tatio.*

*Nervosiores
partes pul-
sus duriores
dunt.*

*Inflam-
nes da-
rum
Suri-
ptoma-
ducum*

*Inflam-
partib-
cidit
rio im-
cus ca-
tensio-
Febris*

*Arteri-
partib-
flam-
cur in-
les fia-
sus.
Pleur-
rum p-*

*Pleur-
propri-
gnum-
rans
tas p-*

*Pleur-
inflam-
costas
gentis
brana-
Pleur-
cur ac-
bricite-
Pleur-
pulsus
durus
quam
expedi-
non ex-
existit
Pleur-
Suri-
ptoma-
differen-
humor-
quibus
tur.*

*Pleurit-
peripne-
nicus cu-
put per-
afficiat-
instar*

instar fuliginis acrem, qui mordicat & erodit, irritatq; cerebrū: itaq; ad delirium perducit. Si pituitosus sit, nec fumo acri similis, sed caliginis crassa turbulentaq;, quasi nubem quandam ad caput attollens, humectat id gravatq; cerebrū, cogitq; in gravem somnum deferri, atque sopiri hominem. Recte ergo, cum pulsus in maiorem crebritatem mutantur, aut peripnevmonia, aut syncope nunciant. Peripnevmoniam, quod occupet semper, offendatq; lateris inflammatio vicinas partes, ut quæ à calido gignatur ferventeque humore, atq; facile mobili: syncope verò, ex affecta facultate, vel per nervorum læsionem, vel soporem, cum ex pituitosis humoribus vaporantibus cerebrū ipsum repletur. Quod si læsio progredi ad ramulos valeat, consequetur offensio nervorū: sicuti sopor, si nequeat. Ac talibus quidem humoribus, rariores: contrariis, puta biliosis, crebriores justo modo pleuritidis pulsus eveniunt. Porro autem medius est inter raritatem & crebritatem modus in pleuritide, ubi qui morbum committit humor sanguineus sit. Sic etiam modus medius duritiei ex tali humore, ac moderata inflammatione oritur. Augetur verò, aut ob inflammationis immodicam magnitudinem, aut ob humores biliosos. Itemq; per contraria imminuitur, Suppuratorum pulsus initio statim pulsus refert vigescētis inflammationis nonnunquam est inæqualis & inordinatus ob instrumenta & facultatē imbecilliorē omnibus hecticus. Ubi verò jam pus adfuerit, cætera quidem sit pulsus similis, æqualior tamen. At quum erumpit, languidior, latior, tardior & rarior. Qui igitur multum puris inter thoracem & pulmonem collectum habent, ij suppurati appellantur. Qui fiunt, ubi maxima juxta costas inflammatio, pervenit ad suppurationē. Interim affectus is comitatur peripnevmonias. In universum autem, omnes quibus inflammatum viscus aliquod conversum ad suppurationem est, suppurati sive purulenti dicuntur. Marcoris nomen translatum à marcescentibus flammis est, quæ * penuria alimenti extinguuntur. Ubi igitur animantium nativus calor eodē modo marcescit, oportet esse languidos pulsus. Siquidem sic affectis, redditur facultas languida, ac proinde etiam fiunt parvi. Jam celeritate etiam quadā videntur præditi, quod neq; hæc abesse à febribus possit. Quia verò & febricitant, & facultate sunt imbecilla, itaque pulsus habent parvū, necessario jam simul & crebrum obtinent. Porro facultatis imbecillitatem comitatur etiam circumnuens pulsus, qui in utraq; parte decurtatus existit. Planum autem est, sic affectos habituros pulsus semper unde quaque similem, quod non ex humoribus morbus, neq; spiritu oriatur, sed in ipsis consistat solidis partibus. In his enim corporis habitus universus, ut carbo quidam, est factus: qua de re hecticos neoterici medici hos pulsus appellant. At quibus jam calor extinctus est totus, quod accidit potissimum senibus, rarior quoque sit pulsus. Hunc marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quo * præcipue occupantur proveciores ætate, & interim etiam juvenes. Qui igitur unā cum inflamma-

tione, quæ nondum discussa sit, emarcuerunt, languidos & celeriores, mireq; crebros pulsus habent, ac decurtatos magnitudine in uno ictu. At verò hecticus pulsus omnibus marcescentibus inest: estq; eis communissimus. Post illum autem inæqualitas distentionis magnitudine decurtata: quæ etiam adest plerisq;, deinde crebritas: etenim hæc quoque omnibus qui ex inflammatione marcuerint, perpetua adhæret. Paucis autem marcescentibus in aliam inæqualitatem pulsus, ac illam quæ penes magnitudinem est, permutatur. Phthifici habent pulsus parvum & languidum, ob facultatis imbecillitatem: at non nimium celerem, ut plerique febricitantes, quod urente febre non detineantur. Cæterum habent & hi, ut febrim, sic pulsus hecticum. Peripnevmoniarum magnus est pulsus & languidus, mollisq;, similiter atque lethargicorum pulsus, nisi quatenus præpollet inæqualitate, & in uno pulsu, & collectiva, quam vocant: In uno ictu, nam veluti interpellatur, undosusq;, ac interdum bis feriens redditur. In collectiva autem, cum alias differentias sortitur, tum modò intermittit, modò intercurrit. Neq; enim est mirum, vel magnum esse pulsus illorum, vel languidū, vel inæqualem, ob pulmonis inflammationem, visceris tam laxi & mollis, fistulisq; inanibus undiq; infinitis cavi, tamq; vicini cordi. Nam quia laxum est & molle, & undiq; vacuum, à pituito fiore atq; crassiore inflammatur sanguine. Talis enim fluxio, tunicam vasorum irrigat, frangit cutem vim facultatis, quæ in illis est: quo fit ut magnos simul & languidos pulsus efficiat. Quia verò cordi est ipsum viscus conjunctum, multiformis inæqualitas gignitur: nimirum pulmonis arteriis oppressis, constrictis, atq; languidis redditis. Raro itaq; in peripnevmoniis pulsus dicrotus accidit: quod is vasorū duritiem postulet. Jā pro offensæ magnitudine, vel intermittentes pulsus, vel intercurrentes cernentur. Cum autem febre teneantur acuta omnes peripnevmonici, atque habeant adjunctum non nihil comatis, si insignior esse videatur febris, pulsus erit admodum creber: sin majus coma, minus creber existet.

Lethargicorum pulsus, pulsui peripnevmoniarum est similis, magnitudine, remissione, molitudine: sed eo est tardior, rariorq;, ac minus inæqualis, intermittens potius quam intercurrentes. Est cum dicrotus fiat. At undosus semper in altis quidem soporibus est. Gignitur autē lethargus etiam ex pituitoso humore. Unde merito ejus pulsus simillim⁹ est peripnevmoniarum pulsui: verū hoc tardior, quod procul sit à corde remotum cerebrum. Est autē intermittens potius quam intercurrentes, cum longè frigidior sit, atq; ut ita dicā, letalior morbus lethargus, quam peripnevmonia. Etenim affectui frigidus, facultatiq; valde refrigerata, proprius pulsus intermittere existit. Phreniticorum pulsus est parvus, modiceq; contentus. Rarissimè autem conspectus est magnus. Est præterea durus, nervosus, mireq; celer & creber. Habet præterea non nihil undosi: atq; interim subtemere tibi videbitur: interim etia præcisus cum convulsione quadam. Etenim febriū propriū celeritatis symptoma hic obtinet

Marcidiorū
simul cum in
inflammatione,
quales
sunt pulsus.

Phthificorū
pulsus.

Phthifici habent ut febrim, sic pulsus hecticum. Peripnevmoniarum pulsus.

Pulmonis substantia laxa, mollisq;, cum sit, à pituitosiore inflammatione inflatur sanguine.

Peripnevmoniacis omnibus adesse febrem acutam, non nihilq; comatis.

Lethargicorum pulsus.

Lethargum gigni ex pituitoso humore.

Lethargum esse perniciosiorem morbum peripnevmonia. Phreniticorum pulsus.

*Phrenitico-
rum pulsus
immodica
crebritas, pro-
ximam de-
nūciat synco-
pam.*

*Phrenitim a
bilioso produ-
ci humore.*

*Lethargum
ab humore
pituitoso ex-
oriri.*

*Lethargum
gigni in cere-
bro.*

*Phrenitim gi-
gni in tenui
meninge, &
in septo tras-
verso.*

*Phrenitico-
rum pulsus
quidnam ad
sit perpetuo.*

*Cataleptico-
rum descri-
ptio & pul-
sus.*

*Catochorum
pulsus.*

*Catochorum
lethargico-
rumq; descri-
men.*

*Convulsorum
pulsus.*

evidentissimè, in utroque termino distentionis, præcipuè extremo. Invenias etiam inæqualitatis in positi genus, insigniter aliquando in illo apparere. Imò totam subinde arteriam, sua sede deferta, cōspicias attolli potius cum vibratione ebulliente, quàm more pulsus distenti. Pari modo detractam potius, quàm cōtractam. At verò immodica ejus crebritas proximā denūciat syn-
copam. Nec sanè causas illorū quæ diximus invenire magni laboris fuerit, si scias generari à bilioso humore phrenitim, ut lethargum à pituitoso. Præterea lethargum * præcipuè gigni in cerebro: phrenitim verò in tenui meninge, atq; septo transverso. Quæ si memineris, etiam parvos meritiò pulsus & duros esse, nō habebis necesse discere. Atqui si affectus calidus est, pulsus autem parvi, omnino etiam crebri sunt. Porro phreniticorum pulsus rarissimè undosus percipitur, q̃ mollitudine vacet. Quod verò subtemere imbecillæ facultatis sit signum, alibi à nobis ostensum est. Ubi enim arteriarum facultas ob caloris copiam distendere illas amplius nōatur, idq; tunica durities prohibeat, quodammodo videtur pulsus subtemere: id quod tunc potissimum accidit, ubi syncope imminet: quo modo ubi convulsio, etiam motus pulsuum est convulsivus. At hoc phrenitici pulsus habent perpetuum, ut cū convulsione quadam motus eorum abruptatur, non autem paulatim desinat: calor siquidem viget, suntque dura instrumenta. Jam verò insignis illa crebritas, cum ab imbecilla facultate exoritur, syncopem instare portendit. Est & alius quidam affectus ex phrenitide & lethargo conflatus: quo quidem qui tenentur, * ut plurimum oculis connivent, somnolentique sunt & stertunt. Rursus oculis fixis, inconniventibusque diutissimè, ut catochi, intuentur. Quod si illos ad colloquium compelles, difficiles sunt, ad respondendumq; tardi: plerunq; etiam stultè loquuntur, temereq; respondent. Horum igitur pulsus sunt celeres crebriq;, perinde ut phreniticorum, minus tamen: & roboris item minus q̃ illi obtinent. Lati autem sunt, ac breves. Externum motum non habent subito truncatum, sed alio modo veluti intrò se proripientes subterfugiunt, ac concitant contractionem, & quasi suffurantur distentionem. Catochorum pulsus cetera lethargicis similes sunt, magnitudine, tarditate, crebritate: ut nec totius hujus affectus species latè ab illo diffidet. Catochorum tamen nō imbecillis est pulsus, nec mollis, sed in his sanè multum differt: ut etiam in hoc, quod laxatur lethargicis atq; intumescit totus habitus, contra stipatur cogiturq; catochis. Præterea æqualis est catochorum pulsus, inæqualis lethargicorum. Convulsorum ipsum corpus arteriæ videtur compactum, & undiq; coactum esse, veluti instrumentum cavū ex utroq; sine distentum. Motus autem ipsius arteriæ est in modum chordæ sursum deorsumq; agitata, inæqualis, idq; minimè certis temporibus. Cæterū vehemens & magnus convulsorum pulsus videtur. Est verò hic non imbecillus nec parvus: non perinde tamen ut videtur, vehemens vel magnus. Ictus enim imponit, dum ob tensionem validus, ob vibra-

tionem exilire apparet. Paralyticorum parvus pulsus, languidus, tardusq; est. Nōnullis rarus quoque, aliis creber, sed nonnihil inordinate intermittens. Est enim parvus & tardus, quia morbus est frigidus: languidus, quod facultas infirmior. Comitialium & attonitorum pulsus sunt similes: quare quæ de comitialibus exponemus, eadem de attonitis, sed cumulati, sunt accipienda. Dum affectus non usque adeo invaluit, nulla insignis in pulsu mutatio cernitur. Tantum est convulsis intenta jurè utrinque arteria. Sin autem affectus superet facultatem, inæqualitatem atq; tensionem validam sibi contrahit pulsus: necnon minor, languidior, rarus, tardusq; efficitur. Si morbus opprimat facultatem, languidos, parvos, celereq; pulsus conciliat. Anginæ pulsus tensione quadam præditus est, convulsivo persimili. Magnus est & undosus, ut pulsus peripnevmonicorū. Cæterum si peripnevmonica species superior sit, in peripnevmoniam: si verò convulsiva, in spasmum angina desinet. Quicumque autem ex anginosis suffocantur vehementer, parvum hi habent & rarium pulsum: ubi verò jam animam agunt, crebrum atq; inæqualem. Plus autè vel minus tensionis habet anginæ pulsus, prout humor in fauces influens aut biliosior, aut pituitosior fuerit: necnon pro ipsorum instrumentorum in aspre-dine diversitate. Siquidè nervosiora & con-tiora vehementius pulsum tendunt: carnosiora & remissa, illum undosiores efficiunt. Orthopnœa acuta (talis enim est, quæ diuturna) inæqualem habet pulsum, & inordinatum, deficientemq; nonnihil. Quæ mediocriter est gravis, crebrum. Quæ violentissima, tardum & deficientem. Quæ jam perimit hominē, crebrum, & languidum. Cæterum pro diversitate offensæ, vel creber magis, vel rarus sit pulsus. Nam celer, ob facultatis imbecillitatem fit nunquam. Uteri suffocationis pulsus, ut si convelleretur, protensus est, atq; rarus. Quod si exitialis sit suffocatio, creber, inordinatus, & nonnihil deficiens. Cum enim nervosus sit locus affectus, par est ut protendatur pulsus, quasi cōvulsus existat. Quia verò affectus est frigidus, adjuncta est raritas. At ubi oppressa jam prorsus facultas sit, rectè fit creber, inæqualis, & nonnihil deficiens. Os ventriculi affectum, si duntaxat sit inflāmatum, ita pulsum immutat, ut solet corporis nervosi inflammatio, si comprimatur, vellicetur, langue-scat, singultiat, vomat, nauseat, fastidiat, doleat, pro genere cujusque symptomatis. Nam vellicationes, vomitus, nausea: singultus, languor, non solum parvum & languidum reddunt, & interim modicè celeriores, sed etiam admodum crebrum. Sola verò compressio, rarium, tardum, parvum, & languidum, qualis etiam per caninam famem conspicitur. Porro omnes affectus qui in crebritatem mutant, si sint diuturni, vel graviores evaserint, pulsum gignunt vermiculantes. Qui verò in raritatem, non solum commemoratas differentias adaugent, sed speciem etiam inæqualitatis in uno pulsu generant, ut multis locis pertusum corpus arteriæ videatur: nimirum ob ipsius in-

Paralyticorum pulsus.

Paralyticorum pulsus.

Anginæ pulsus.

Orthopnœa pulsus.

Uteri suffocationis pulsus.

Pulsus ventriculi affectu.

Fames pulsus.

strumenti intemperiem. Aquæ inter eutem pulsus: Ascitæ parvus crebrior, subdurus, & cū quadam tensione est. Tympanitæ longior, non imbecillus, celerior, creber, subdurus, cum quadā tensione. Illius quam anasarca vocant, undosus, latior, mollisque. Ascites siquidem, copiam acervans nō modicam secundum ventrem humoris aquosi, simul magnas arterias intendit, gravat, refrigeratq;. At tensionis quidem nomine meritō reddit pulsū cum tensione quadam subdūrum. Quia verō facultas læsa & refrigerata est, minorem. Jam quō minorē iusto, hoc etiam crebriorem, præsertim ubi adjuncta sit febris, Tympanites minus gravat, verū nō minus tendit: quare pulsus etiam subduros gignit, cum nōnulla tensione, sed aliquantō celeriores, minusq; imbecillos, quā ascites: at crebros, iisdem de causis ac ille. Longiores, ob levitatem regentium arterias corporū, quæ quidem in tympanite adest: etenim spiritu universum corpus replet. Anasarca autē, quia imbuīt universum corporis habitum humiditate copiosa, tunicas reddit arteriarum molles, ac proinde pulsus molliores, undosus, latiorēsq; efficit. Elephantiasis pulsus parvus, languidus, tardus, crebërq; est. Ictericorum pulsus est, si absit febris, minor, durior, crebrior, non languidus, nec celer. Vim enim possidet deficcandi flava bilis, ut muria, & mare. Quamobrem tunicam arteriarū indurando & deficcādo, pulsū quodq; reddit duriorē atq; minorē, ac proinde etiam crebriorem. Cæterū nec languidus est, nec celer, quia nec imbecillitas, nec febris adest. Qui sumpserunt veratrum, hi paulō ante vomitum, ubi comprimuntur, pulsū habent latum, rarum, languidiorem, atq; tardiorē: interea dum vomunt & divelluntur, inæqualem & inordinatum. Cū rectius habere cœperint, ordinatum quidem, sed inæqualem adhuc, minus tamen quā antea. Ubi verō jam ad naturalem revērtuntur statum, æqualem ac majorem quā dudum, vehementioremq;. Qui horum syncoxa corripuntur, convelluntur, atque singultunt, parvum hi, & languidum, inordinatūmq;, & celeriorē, atq; multum crebrum sortiuntur. Qui ex his suffocantur, parvum, languidum, inordinatum, inæqualem, non autem crebrum, nec celerem, sed potius tardum. Repræsentat etiam nonnihil undosi & lati, atq; interdum parvā arteriæ tensionem.

GALENI PERGAMENI

de præcognitione ex pulsibus,
liber primus.



Uōd non tantū futurorum præscientia sit, sed præsentium etiam atq; præteritorum, satis id Hippocrates demonstravit. Cujus quidem qui peritus futurus sit, eū in iis quæ de dignoscendis pulsibus, deq; differentiis, & causis pulsuum à nobis tradita sunt, prius exerceri oportet. At verō causarū pulsuum diximus esse unum genus, eorū generationi conjunctū, quod scilicet naturale existit: alterū autem contrariū, nempe causarum præter naturam: ac tertium de

nique causarum non naturalium. Quæ tria genera referuntur ad illorū essentiam veram: aliud autem quartum, ad apparentem. Quod quidem quia proprium est in primis præfagiendi commentationi, diligentissimè est explicandum. Porro nullus pulsus mutari potest, nisi effectrix ejus facultas, vel tunica arteriæ, vel usus, quamobrè fit, in aliqua sint mutatione & alteratione. Ubi igitur pulsus, exempli gratia, major equo videatur, expendendum est, facultasne sit robustior: an hæc eadem manserit, mollis autem evaserit tunica arteriæ: an quod increverit usus, talis mutatio acciderit. At si facultas robusta sit, pulsus erit vehementior: posuimus autem eum majorem duntaxat videri. Quod si tunica tantum arteriæ emollita fuerit, pulsus necessariò erit mollior. Si igitur neutrum appareat, clarum est mutatū, ali quatenus esse usum pulsuum generandorū, quæ esse docuimus duplicē: primum atq; maximū, tutelam nativi caloris: alterum, animalis spiritus generationem. Sic voco illum quo utitur anima ad voluntarias functiones. Cæterū si parva fiat à natura *alteratio ob usum, sola perspicua erit magnitudo, nōdum autē celeritas. Si major, increscet magis magnitudo, & clarè celeritas apparebit. Sin adhuc amplificabitur, magnitudo celeritasq; augebuntur, atque accedat præterea crebritas. Sin autem nō sit factus major pulsus, sed talis esse videatur, gracilius solito aliqua de causa evasit hominis corpus. His cognitis, in eundem statum est, primum in corporibus simpliciter sanis: mox in iis, ubi adjunctus est aliquis ascititius motus: postea in corporibus *simpliciter ægrotantibus: ac postremo in iis, quibus alteratio quæpiam adest externa. Etenim in corporibus inculpara valetudine præditis, docebit magnus pulsus & temperamētum hominis, & corporis habitudinem. In corporibus ubi adjunctus est ascititius status, illum præpollere motum, cui magnus pulsus est peculiāris. At in iis qui ægrotant simpliciter, indicabit magnus pulsus calidam *morbi cōstitutionem. Si unā cum morbo recens aliqua *externaque alteratio adsit, illum vincere motum, cui magnus pulsus sit familiaris. Revocandus autē ad memoriam pulsus est moderatus (qualis reperitur in corporibus optimè temperatis, atq; ab omni qualitate adventitia alienis) & quæ nunc invenimus, magnus, ut in comparatione illius considerandus est, ex qua causa in magnitudinem ipsam excreverit. Aut enim ex gracilitate corporis, aut ex calore temperamenti, aut ex ascititio motu. Cæterū motus ascititii mox desinunt: permanent vero amplius ob gracilitatem & temperamētum. At verō omnium alterationū quæ corpori accidunt, certissimā assequimur in illis corporibus cognitionem, quorum naturam noscimus. Hæc autem non agnoscimus semper, quare nec in exactam ubique cognitionem veniemus: verū à cognitione absoluta tantum aberimus, quantū ab ipsius naturæ cognitione. Igitur mutationes pulsuum ex causa externa, in hunc modum sunt discernendæ: Quæ ex balneis, cursibus, frictionibus, cæterisque motibus fit, non est diuturna, sed mox ad pristinum statum revertitur. At ma-

Pulsuum usus esse mutatum, quæ ratione deprehendamus.

Pulsuum generandorum usus est duplex: tutela innati caloris, & animalis spiritus conservatio.

Pulsus moderatus in quibus nam reperitur.

Ascititii motus mox desinunt.

Pulsuum mutationes à causa externa, quomodo discernendæ sint.

*Causarum
dignoscenda-
rum qui sint
artificiales
modi.*

*Causarum di-
gnoscendarum
modi extra
medicam ar-
tem positi.*

*Fraudulenti
quorundam sy-
cophantarum
mores.*

*Pulsuum mu-
tationis in
parvitate
tres numero
sunt differē-
tiae.*

gnitudo pulsuum ex vino & cibo profecta, di-
turna existit. Hæc ex vehementia exploratur,
quæ illi conjuncta est. Nunc tantum is propo-
situs est, qui duntaxat sit major. Jam etiam ma-
gnitudo quam ira concitat, adjunctam habet
vehementiam: quæ alioqui prudentem non la-
tet, si oculos irati respiciat, universumq; corpus.
Etenim calor quidam copiosior secundum pe-
ctus iratorum, non secus quam exercitatorum,
percipitur. Atq; hi sanè sunt artificiales modi cau-
sarum dignoscendarum. Externos autem, ubi mi-
nimè in tentatores, ac pessimos sycophantas,
fraudentosve incideris, partim per investiga-
tionem, partim ex eo quod non discesseris ab æ-
groto, quam optimos fore judico. Nam qui sunt
dum medicus non semper ægrotis adest, nec il-
li volunt veritatem exponere, hi sunt difficilli-
mi, & medicum requirunt acuratè prudentem.
Cui sanè ad veritatem pervestigandam esse pri-
mus scopus debet ipsius accessionis tēpus: dein
ægrotantis cōsuetudo & mores. Sunt siquidem
qui medico imponant, nihilq; magis habeant in
votis, quam ut coarguant illum, eumq; nihil fir-
mi scire demonstrent. Quare tunc habenda om-
nia suspecta sunt, distinguendaq; , tum quæ pro-
pria artis ratione pertineant ad dignoscendum,
tum quæ adveniunt extrinsecus. Alij contrā sunt
candidi, modestiq; , nec celāt quicq; , dissimulant-
ve: quare in his nil clām factum, est suspiciandum.
Porro cum magnus pulsus nūc ad moderatum, 30
nunc ad alium quemlibet referatur: cumque du-
plex sit hic quilibet, aut minor moderato, aut
major: deinceps de incremento ad magnitudinē
est dicendum utriusq; pulsus: dico enim mino-
ris eo qui mediocris est, & majoris. Commune
igitur est omnis ad magnitudinem incrementi,
solum auctum calorem esse, quo scilicet tempore
nec facultas affecta sit, nec instrumenta, sitq; im-
motus ægrotans. Proprium autem est defluxui
illius à natura, unius magnitudinis incremen-
tum. Reliquorum duorum etiam, nempe celeri-
tatis & crebritatis nonnunquam. Cōmutatio-
nis etiam pulsuum in parvitatē, tres numero sunt
differentiæ. Aut enim ex moderato, aut ex majore
quàm hic sit, aut ex minore, mutationes in par-
vitatē contingit fieri. Vocatur autē qui mode-
rato est major, absolutè magnus: qui minor, par-
vus. Sit igitur pulsus cuiuspiam homini minor q̃
dudum, mutatione præditus præterea nulla ul-
lius generis. Etenim minor solito pulsus sit, aut 50
cum imbecillior facta sit facultas, aut instrumen-
ta duriora, aut usus remissus. Nunc autē nec im-
becillior facta facultas est, alioqui conjuncta sit
cum parvitate remissio: nec corpus arteriæ du-
rius (neq; enim tum minor tantum, sed & durior
pulsus esset) superest ergo solum esse alteratum
usum: ac si id tēporis quietus homo fuerit, quan-
titati refrigerationis quantitatem respondere mu-
tationi. Quæ quidem mutatio accidit ex majori
pulsu, q̃ qui sit naturalis. Nam de naturali statu
ob frigiditatem mutatio ad parvitatē, simul etiā
rariorem eum atq; tardiolem reddit. At immi-
nutio ex magno supra modum aucto, statim ad-
jungit sibi celeritatis & crebritatis aliquid: quod
qui multum ultra modum sit auctus, tribus in gene-

ribus variet. Quamobrè qui magnitudinē tantum
imminuit pulsus, & reliqua servat immota, hic
est qui paulò major sit justo, solusq; ex parvo in-
cremento caloris constat. Jam verò, quemadmo-
dum ubi corpus calfit præter modum, magnitudo
planè prima, mox celeritas, inde crebritas appa-
ret in pulsu: sic etiam ubi refrigeratur, raritas pri-
mò percipitur, dein tarditas, ac ultimo loco par-
vitas. Porro causæ refrigerantes totidem numero
sunt, quod numerantur calfacientes. Aer siquidē
frigidus nos circumstans, inspiratusque, & aqua
frigida, vel balneum, vel medicamentum corpori
inunctum, refrigerat. Quinetia longa quies, & vel
uti latebræ, & pituitosus cibus, medicamina
refrigerantia, ac breviter, metus diuturnus, cor-
pus frigidius efficiunt. Ex contentis in corpore
humoribus, qui frigidi tēperamento cum antea
quiescerēt, nūc cōmoti, aut tenuiores quodam-
modo calidis sunt effecti, etiā corpus refrigerat.
Arteriæ altitudo semper æqualem latitudini
distentionē habet: sed sit ut occultetur aut arcea-
tur sæpe à corporibus circumjectis & oppositis,
vel universus motus, vel certè ejus quæ pars:
idq; aut in profunditate magis, aut in latitudi-
ne, aut simul in utraq; dimēsiōne. Ubi igitur per
totum corpus sensu nostro pulsare nulla arteria
percipitur, is affectus dicitur pulsus privatio: re-
vera tamē in corpus vivum nunq̃ cadere potest.
Neq; enim est unquā, quin cor unā cū arteriis, in
omnib; agitur. At verò longi dicuntur pulsus, 30
quibus sensibilis motus longitudo naturalē ex-
cedit: breves, quibus infra naturalem statum est:
quibus par est naturali statui, moderati. Tantum
enim animadvertitur semper de motu arteriarum,
quantum permittunt adjacentia corpora. Unde
fit, ut corpulenti breves pulsus sortiantur: graci-
les verò, longos, & quadratis, moderatisq; , esse
moderati videantur. Jam etiam apparentis mo-
tus his, non æquè semper ut profunditas, latitu-
do impeditur. Verum ubi arteriarum regiones in
obliquo, vel adipis, vel carnis, vel vaporum, vel
humorum sint plenæ, ac incumbens supernè cutis
nihil eas oneret, latitudinis tantum obscuratur mo-
tus: & magis si vehemens pulsus & magnus, quan-
tum in ipso est, fuerit. Cum verò regiones vicinæ
sunt mundæ, rugosa autē quæ eas tegit cutis, ma-
gis profunditatis motus later in eo corpore, ac
potius si non vehemens pulsus & magnus, quod
in eo est, sit. Si igitur pulsus invenias longiorē
justo, siquidem unā latitudo ejus, profunditasq;
increverit, vide gracilior homo solito, an cali-
dior evaserit, remoto motu adventitio. Nam si
factus gracilior sit, idq; tantum, quantum est pulsus
major, unum hoc tantum eum immutavit. Sin au-
tem non tantum, non hoc modo est causa, verum
etiam calor. Quod si in eadem constiterit habi-
tudo corpus, solus mutatus est calor. Sin cras-
sior evaserit, duplo auctum calorem aestima. Sin
longior sit factus pulsus, & latior, non autem per-
inde auctus profunditate, sed moderatus, huic
præter superiores notas, necesse est rugosiorē
evasisse supernè arteriæ incumbentē cutem. At
si convertas membrum, ut quæ ejus pars modo su-
perior erat, nunc sit inferior, nulla tum profun-
ditas videbitur impedita. Atque hi quidem duo
pulsus

*Refrige-
tes cau-
sas numero
quot cau-
sas.*

*Timor
turnus
pus refri-
rat.*

*Pulsuum
ratio an
pus
quam c
re potest*

*Pulsus
qui nat
cantur.
Pulsus
ses qui
Pulsus
deratus*

*Latitudo
motus q
do in p
obscurat*

pulsus, in primo libro de eorum differentiis, omnium primi inter vigintiseptem pulsus constantes ex dimensionibus ternis, sunt in tabellam relati. Reliquorum autē vigintiquinque; haud difficile fuerit causas simili etiam methodo investigare. Igitur ubi supra proportionē profunditatis & latitudinis longitudo fuerit extensa, corporis significat gracilitatē: non tamen ubi * imminuta infra proportionem profunditatis est, corpulentiam denotat, sed vel naturalem quandam conformationem, vel situm arteriæ inæqualem. At verò quæ quidem in omnium primo, ac magno distincta sunt pulsu, eadem etiā in ultimo, nempe brevi, angusto, humiliq; (qui nimirū vocatur parvus) sunt distinguenda. Nam si naturaliter comparata sit corporis habitudo, hic pulsus nō solū videtur parvus, sed etiā talis existit. At cum crassior sit, si * quanto homo seipso crassior evasit, tantō sit pulsus minor, erit tum quidem quod ad ipsum attinet, moderatus: sed ob corporis crassitudinem minor moderato videtur. Si longē sit crassior quā pulsus minor, is pulsus quantum in ipso est, mediocri erit major. Si autē minus sit crassus quā parvus pulsus, hic, si ejus naturam spectes, naturali erit minor. Quod si gracilius corpus sit, quā videatur pulsus parvus, is sanē est parvus natura, sed non perinde videtur parvus, ac verē est: quod gracilitas, quatenus à natura recessit, hactenus ei speciē magnitudinis augeat. Similiter etiam in aliis pulsibus omnib; 30 adhibenda eadem est distinctio, quæ de parvo & magno pulsu est adhibita: sciendumq; illorum quēq; vel parvum esse natura, vel magnum, vel moderatū. Ac tres hi pulsus in quantitate distinctionis positi sunt, quod ad ipsius rei naturā attinet. Videntur verò esse vigintiseptem, ob crassitudinem vel gracilitatē corporis, vel ob rugosiorē cutem, vel regionū arteriarū inæqualem angustiam, vel proprietatē conformationis. Jam verò longus, angustus, & humilis pulsus, quod qui 40 dem ad suam naturam pertinet, idem erit & parvus: nimirum longitudine ipsa accedente ob tenuem habitudinem corporis. Quod autē & languidus sit, hinc evadit perspicuum, quod nunq; facultate valente, pulsus esse parvus ad summū possit. At duritiem nihil est necesse conjunctam esse huic pulsui. Oportet tamen cor unā cum arteriis esse refrigeratū, atq; etiamnum perfrigerari. Quod verò refrigeratū esse, læsam esse facultatem sit: refrigerari autē, mutari usum, utiq; intel- 50 ligere oportet. Facultatis essentia singularum partium, in singularū illarū posita cōmodo temperamento est. Nam tum demū suū quæq; munus obit strenuē, ubi sit temperatissima. Contrā malē fungitur, si intemperata sit: atq; hactenus malē, quatenus sit intemperata. Ad eundem modum cordis corpus cum immodicē fuerit refrigeratum, calfactum, humectatū, aut exiccatum, pulsus pro suæ intemperiei modo facit languidos: id quod illi est facultatē oblāsam esse. At ve- 60 rō consuetudinē habere cum sanguine in ipsius contento sinibus, & cum spiritu, qui calidior longē ac naturalis status requirit, sit, aut cum eo qui in involucri cor ambiente cōsistit, vel in pulmone, aut cum ipso etiam involucri cor ambiente,

& pulmone: usum est tantū variasse, citra facultatis offensam. Ac si eandem rationē habet, refrigeratum esse, & refrigerari. Nam si in ipsa cordis temperie frigidum elementū præpolleat, facultas læditur. Sin verò in tunica cor ambiente, & in pulmone, sanguineq; & spiritu, quos ejus ventriculi continent, usus est remissio. Jam humiditates & siccitates, si in ipso corpore cordis constant, nocēt facultati: si in quopiam vicino, non immutant usum. Siquidem proba temperatura, 10 intemperiesq; ex quatuor sunt elementis: usus verò incrementa vel remissiones, duntaxat ex calido & frigido. Porro ubi jam ad ultimam usus dissolutionē deveniat, corporibus vicinis cordi vehementer refrigeratis, non poterit etiam cordis corpus nō intemperatū existere: id quod nihil est aliud, quā facultatem debilitari. At verò ubi cum duritie conjunctus est pulsus ille oblongus, angustus, & humilis: necessariō etiā ei adest 20 vel languidus, vel medius inter languidū ac vehementē: declaraturq; esse is affectus in corpore, qui reddit arteriam duram. Hæc est siccitas, vel constrictio à frigore, vel tensio. Siccitas quidem in ardentissimis febribus, ubi pessimē inveterarint: ac præcipuē * in marcere torrido, certisq; melancholiæ & quartanæ febris generibus. Constrictio fit à rebus refrigerantibus. Tensio ab affectibus convellentibus, & ingentibus inflammationibus. Ex scirrhis verò constrictio arteriarū & tensio nascitur, cum aliās, tum vel maxime ubi lien & hepar scirrhus induratur: Sed tactu ejusmodi affectus deprehenduntur, & per urinas, & alvi excrementa, perq; tum linguæ, tum universi colorem corporis, atque adeo etiam per febrium genus. Qui autē alij corporis affectus pulsum creant durū, partim originem ex recentibus offensionibus repentinam trahunt, reliqui omnes pedetentim. Offensiones quæ inducunt ejusmodi affectus, sunt vini potio & frigida in- 40 tempesta. Sape etiam fructus refrigerantes, balneumq; frigidum. Deprehendes noxam è vino illatam, cum subito pulsus non durus modò, sed major etiam sit, celerior & vehementior. Cæteras à vino in cōmuni discernes, quod nec magnitudinem adjunctam, nec vehementiam, nec celeritatem habent: singulas autem seorsum, ubi symptoma aliquod apparuerit, eorum quæ fructibus id genus ingestis solent supervenire: ut delirium, exempli gratia, quod à vinosis fructibus proficiscitur. Jam verò si nervorum originem aliquis dictorum affectuum occupet, 50 convulsivas dispositiones inducit. Sic enim illas appello, quas ante mortem, convulsionis aliquod necessariō comitatur symptoma. Ac moriuntur sanē omnes in hunc modū affecti, etiamnum calidi, contrā ac illi, qui corripuntur syncope: hi siquidem vehementer etiam frigidi, vivunt adhuc. Est autem operæ pretium nosse, omnes duos simul & parvos pulsus, quamcitis- 60 simē fieri vibratos: & si qui vibrati non sunt, eos aut ob vitalis facultatis imbecillitatem, aut remissionem usus, aut utriusque concursum, non admittere vibrationem. Nam si quidem usus magnam postulet distentionem, visq; operari valeat vitalis, sed unum refragetur corpus

*Temperiem
intemperiem
que cordis, ex
quatuor ele-
mentis, com-
flari.*

*Siccitas in
quibus mor-
bis arterias
inadat.*

Constrictio.

*Noxa illata
a vino, quo-
modo depre-
hendenda.*

*Convulsivæ
dispositiones
quæ sint.*

*Duos simul
et parvos pul-
sus, omnes fe-
re fieri vi-
bratos.*

*Vibratio pul-
sus quando
accidat.*

*Vibratus pul-
sus si adsit,
nonnihil ro-
boris faculta-
tem possidere
declarat.*

*Moderatus
pulsus quot
modis dica-
tur.*

*Celerior pul-
sus, calidius:
tardior, frigi-
dius tempe-
ramentum
declarat.*

*Celeri pulsui
modo, magni-
tudo modo
adiungitur
crebritas.*

*Mutationes
primæ & sim-
plicissimæ
pulsuum in
celeritatem
& tardita-
tem.*

arteriæ, quod attolli in magnam distentionem præ duritie non possit, vibratio in eum statum incidit. Nulla præterea ratione fiat arteriæ vibratus motus. Quocirca hic pulsus qui videtur vibratione carere, aut extremam imbecillitatem virtutis, aut remissionem usus declarat maximam. At vibratus si sit, nonnihil roboris facultatem possidere portendit, nec pulsuum usum prorsus dissolutum existere. Adeundem modum si pulsus citra vibrationem * longior sit naturali, angustiorq; & humilior, non longissimè tamen à natura in singulis his recesserit, sed aliquantulum: si quidem etiam sit durus, frigiditatem, vel facultatis imbecillitatem indicat, vel utrunq; simul. Atq; hæc ex cōsequentibus discernuntur. Sin, verò simul & durus sit, & vibratus, illos significabit affectus, à quibus durus pulsus producit: facultatē tamen nō imbecillā, ut in illis, nec dissolutū usum. Quanta verò utriusq; sit noxa, in facultate indicabit vehementiæ & remissionis differentia, unā cum quātitate ipsius vibrationis: in usu, differentia celeritatis & crebritatis, cum vibrationis item quātitate. Reliqua ex antedictis conjicito. Haud aliter si nō paulum, nec multū tribus differentiis pulsus ille à naturali recedat, sed mediocriter & moderatè, ex dictis notato discrimina. Celer etiam pulsus dicitur, interim cōparatus cum moderato, interim cum quo liberalio. Præterea ille ipse moderatus, nūc absolute dicitur, quem in optima natura conspiciamus: nunc de unoquoq; homine, qui inculpta sanitate fruatur. Atq; hic ex comparatione absolute temperati æstimatur, docetq; quale nam sit ipsum temperamentum. Ac celerior quidem calidius, tardior frigidius temperamentum declarat. Verum solam non est reperire mutationē in celeritatem & tarditatem, nec in sanis, nec in affectis corporibus. Nam qui calidiore est temperamento, quā simpliciter moderatus, si videatur habere celeriorē pulsū, eum habet necessariō majorem. Et cui pulsus est aliqua ex occasione celerior solito, omnino etiam est major: neuter tamen horum necessariō est crebrior: si quidem crebritas illis, ubi calor accumuletur copiosior, accedit. Itaq; cum celeritate, modō magnitudo, modō etiam crebritas est conjuncta. Si militer mutationes in tarditatem pulsuum, parim ex moderato statim in raritatem simul mutantur: subinde etiam in parvitatē, ubi amplius usus sit imminutus: partim ex statibus nō naturalibus, nunc aucto usu, sæpe unā cum mutatione in parvitatem, interim cum raritate, nonnunquam cum mutatione in utranq;. Cæterum mutationes pulsuum ob imminutū usum, in tarditatem fiunt, cum raritate & parvitate. Habes primas & simplicissimas pulsuum mutationes in celeritatem & tarditatem: * quarum causæ antecedentes & primitivæ, eadem inveniuntur ratione, atq; illæ quas de magnitudine & parvitate exposuimus. Mixtæ verò mutationes atque compositæ, cum vehementia, vel remissione, vel duritie, vel mollitudine coeunt. Quæ etiam examinandæ discernendæq; sunt eadem via & ratione, quā cum de longo, angusto & humili disputaremus, declaravimus. Ut, exempli gratia, si simul & ce-

lerior esse & mollior videatur pulsus, animadvertendum est, tantōne celerior sit, tantō mollior, an magis. Nam si tantō est mollior, tantō etiā celerior sit, à sola mollitudine ipsa mutatio est facta. Sin celerior q̄ mollior, nō à mollitudine tantū, sed etiam ab usu aucto. Contrā si mollior quā celerior, tantō mollior est, tantum detraxit solius usus remissio. Similiter in aliis cōjugationibus danda opera est, ut præpollentem causam investigemus: magnitudinē quarum ex proportionis excessu deprehendes. Cum igitur in distentione arteriæ quatuor generales sint differentiæ: prima, eademq; inter omnes maximè pulsuum propria, quæ in qualitate consistit motus: secunda, quæ in quantitate distentionis: tertia, quæ facultatē: quarta deniq; & ultima, quæ tunicam arteriæ indicat: hoc certè postremū genus, non est proprium pulsuum, sed adventitiū. Cæterum tum ipsum, tum penultimum genus, causam semper à qua gignuntur, manifestè declarant: duo autem reliqua genera superiora, nō perpetuò. Etenim duobus obvenit generibus posterioribus, ut ab una utrunq; causā constituantur: primis verò duobus, ut ab omnibus causis, quas tres demonstravimus esse: quare in primis illis ad inveniendam causam, q̄ in ultimis, pluribus opus est distinctionibus. Porro secundū genus, quod circa distentionis quantitatem versatur, hoc præter cætera habet, quod septem & viginti pulsuum differentias cōplecti videatur, quæ tamen sunt tres duntaxat. Porro vehemens pulsus à facultatis semper robore fit: proinde * tantō vehementior fuerit, tantō facultatis majus esse robur significabit: languidus, ex facultatis imbecillitate: quare * tantō languidior sit, tantō facultatem ostendet imbecilliorē. Haud aliter durus pulsus efficitur ab arteriæ tunica dura: mollis à molli. Præterea quantitas pulsus duritiei mollitudinisq;, quantitatem duritiei mollitudinisq; arteriæ declarat. Cæterum qui medius est inter durum & mollem (qualis dicitur moderatus) primus natura est inter eos, solusque dicitur naturalis. At inter languidum & vehementem hac ratione medius est nullus: quod languidus sit oriundus ex facultate imbecilla, & desiciente à natura: vehemens autē à firma & rectissimè habente. Verum alio modo, inter languidū & vehementē medius aliquis esse possit. Modus autē dignoscendi per tactum adhibitū est. Nam cum à pulsu evertitur, eum vehementem vocamus: ubi tactus evertit pulsū, languidum: ubi neutrum fit, medium eū pulsū dicimus inter vehementē & languidum: qui quidem nō aliter atq; languidus, præter naturam est. Porro alterationes pulsuum, * quæ quidem in remissionem & vehementiam fiunt, illæ certè & solæ frequenter fiunt, hoc est, citra ullam aliarum differentiarum miscellam, atque etiam ab una causa: ut si cæteris causis naturalem modum servantibus, facultatis robur sit paululum auctum, aut imminutum: interdum tamen ab una quidem causa gignuntur, at non solæ: quemadmodum ubi facultas aut imbecillima, aut robustissima effecta fuerit. At mutatio pulsuum in duritiem & mollitudinē, si quidem ab una causa procedat,

*Distentionis
arteriæ
quorū gen-
les sunt
rentia.*

*Quantitas
tem disten-
tionis ar-
ria, septem
viginti p-
suum dis-
rentia
plecti.
Vehemens
pulsus
cultatis
per robo-*

*Pulsus du-
s mollis
de profici-
tur.*

*Medium
sum qui
turalis si
ri nullum
ter langu-
& vehem-
tem posse
Medium p-
sus inter
quidum
& vehem-
quomodo
noscatur.*

omnino aliquod unum generum aliorum mutabitur. Quod si sola constet, ex concursu plurium causarum gignitur. Simul autem & sola & ab una causa nequaquam fiat, nisi minimo plane spacio à natura recesserit. Causæ antecedentes quæ robur facultatis adaugent, partim in ipso insunt corpore: ac humores quidam sunt semicocti & crudi, qui jam concoquantur: & naturæ ad iudicationem impetus: ac præterea iracundia. Partim adveniunt extrinsecus, ut vinum, cibus, modica exercitationes, & omnia quæ intemperies corrigunt. Deprimunt verò facultatem inedia, vigiliæ, sollicitudines, mœrores, vacuationes immodicæ, vehementes dolores, vel cum quadam proprietate accidentes, ut quem stomachicū affectum appellant, qui animi deliquium inducit. His adijunge omnia quæ cordis vel arteriarum creant intemperiem. Mollem reddunt arteriam humidi cibi, frequentiores balneæ, somni multi, mollior vita, & deliciæ: quæ omnia intra septa naturæ manent. Præter naturam autem sunt, simulq; idem moliantur, lethargus, coma, hydrops, & si quæ sint alia quæ largo humore ac maxime pituitoso arteriarum tunicas imbuunt.

Igitur præsentem constitutionem singularum conjunctarum causarum pulsus primam omnium indicat: qua cognita, antecedentes & externæ causæ, quæ conjunctas introduxerunt deprehenduntur. Atq; in hoc præteritorum præcognitio consistit. Nam futurorum, ex ijs quæ comitantur dispositiones, præagia sumuntur.

G A L E N I P E R G A M E N I
de præcognitione ex pulsibus, liber
secundus.

Contractio etiam habet quatuor genera pulsum, quot scilicet dilatatio. Siquidem velocior & tardior, major & minor, vehementior & languidior (si naturam ipsam spectes rei) sit contractionis motus: ac præterea etiam arteriæ corpus, aut durum, aut molle redditur. Haud dignoscas tamen horum generum, præter tarditatem & celeritatem, ullum. Porro tum distentio tum contractio arteriarum, naturalis caloris tuetur mediocritatem: distentio, veluti inspiratio quædam, excessum caloris refrigerando, & ventilatione quod extinguitur incendendo: contractio in modum expirationis fuliginem expurgando. Ergo celeritas contractionis indicio erit fuliginosorum excrementorum ingentem colligi multitudinem, expurgariq; id temporis, quando cunque inveniatur. Tarditas contra, nec eius multum coacervari excrementi, eoque neque evacuationem desiderari. Atque acervatur quidem magna copia fuliginis, ubi humores putrescunt: quo tempore necessum est febres accendi: pauca autem, dum corpus bonos humores continet. In aliis statibus qui medii inter hos sunt, pro portione singulorum statuum. Inter edendum & dormiendum, plus: per vigiliæ & inedia, minus. Eadem plane ratione pro ciborum natura, ex illis qui prave humores gignunt, plus: minus ex ijs qui probos. In febribus ad eundem modum, in accessionibus plus: aliis temporibus mi-

nus: adeoque plus ex crassis & lentis humoribus, qui pituitosi sunt, & quos crudos appellant: ex biliosis minus & melancholicis: medio modo ex sanguine, qui & ipse putrescit in inflammationibus: unde oriuntur febres, cum aliæ, tum illæ, quarum adeo est immodicus ardor, ut cutem deurant, & carbunculum generent. Eiusdem ferè naturæ sunt herpes depascentes: in omnibus quippe his, ipsi humores putrescunt. Alio autem modo putrescentes in asperis arteriis succi. Pulmonem enim suo vitio contaminant: quod viscus tempore etiam ipsum putrescit. Colliguntur autem in asperis arteriis id genus succi, vel per destillationem à capite, vel ex pleuritide, vel peripneumonia, vel pulmonis affectu, vel angina, vel ex translato pure. Originem hinc ducunt putredinis, quod minus probe expuantur. Nam ut sunt vitiosi & locus calidus, maturam desiderant evocationem. Subinde etiam fit, ut cum pulmonis rumpitur vas, immittat sanguinis aliquid in ipsas arterias asperas: qui quidem diuturnitate putrescens, tabem excitat. Quod etiam devenit celerius, quem vasa emittunt exulcerata. Ergo in omnibus his, contractio arteriarum secundum quantitatem augetur, etsi sensu id plane non percipiatur. At celeritatis clarè incrementum dignoscitur. Nunc ad crebritatem, raritatemque nos convertamus: quarum duplex est utraque, quod etiam quietibus contigit arteriæ duplicibus esse: uni ab distensione ante contractionem: alteri post contractionem ante distensionem. Atque idam ambabus est commune: aliquid proprium utrique. Comune, quod duabus de causis abbreviatur, vel quod prior productus sit motus, vel quod sequens anticipet. Contra protenduntur, si vel brevior fuerit prior motus, vel si remoretur posterior. Utrique proprium, quod denotare possunt. Illud autem ab eis constat significari, quod ex producto altero motu, vel anticipante altero potest prodire: aut contra, ex abbreviato altero motu, & morante altero. Quando enim syncerus calor, paucissimisq; excrementis pollutus, distensionem majorem & celeriore concitat: contra qui confusus excrementis est putribus, contractionem: ubi ex anticipatione vel magnitudine distensionis pulsus creber fuerit, calorem purum indicabit plurimum increvisse in corpore. Ubi vero quod maturum incipiat contractio, impuri copiam, atque excrementis referti caloris, arguet. Nec aliter, cum rarior pulsus externa quiete sit: siquidem ob distensionis brevitatem, indicabit esse refrigeratum calorem: si ob contractionis moram, fumosa imminuta esse excrementa. In quiete interna è diverso, si ex productione contractionis creber sit pulsus, suppullulare abundantiam fumosorum excrementorum: si ob maturiorem distensionis exorsum, auctum calorem esse. At verò cum rarior in hac quiete pulsus est, si ob imminutam contractionem, pauciora excrementa annunciabit: imminutum calorem esse, si ob distensionis moram. Quod si conjuncta ambo sint, ut & protendatur motus prior, & alter anticipet, sive in externa hac quiete, sive accadat in interna, compositum declaraverit affectum ex illis, quorum sigillatim significabat utrumque.

Sanguis in inflammationibus compurrescens, quæ febres gignere solent.

Humores in asperis pulmonis arteriis delitescetes, unde illuc consuevit, quæ de causa putrescant.

Tabes, unde contrahitur.

Quies arteriæ duplex. Quietibus arteriarum quid sit commune.

Quies arteriarum utriusque quid sit proprium.

Idem si pulsus sit rarior, in utra hi coierint ambo quiete, contractus prior motus, & alter nimis tardatus, erit status tunc quoque duplex, atq; ex utroq; compositus. Cæterum externa quies clarè sentitur, interna autem ne obscurè quidem. Eam tamen cōjectura quis assequi possit, ex utriusq; motionis impetu. Jam verò cōtractio ipsa, interim nō tam diuturna est, quàm distentio: interim æquè diuturna est, cum diuturnior sit, non

Herophilus.

Collectiva in aqualitas. Inaqualis pulsus unde gignatur.

Intermissio arteria periculosa est aliis inaqualitatibus omnibus. Intermittentes pulsus unde exoriantur.

Intemperies cordis est mitior inflammatione. Cordis intemperiei comes est imbecillitas facultatis.

Inaquali pulsus gignendo qua requirantur.

Pulsus duorum motu intermisso Galenus dubitat an quispiam scire possit. Valida facultates ratiū deiciuntur a maximis occasibus.

Imbecillia corpora cur ubi incidunt in morbos, facillimè restituantur.

tamen quintuplo (ut ait Herophilus) sed paulò major. Inaqualium pulsuum quidam in uno ictu inaqualitatem sortiuntur: alij verò in plurimum acervo, quam collectivam inaqualitatem appellant. Omnes autem in universum, aut ex obstructionibus, aut ex compressionibus instrumentorum, aut abundantia humorum, ad facultatem collata, aut cordis inaquali intemperie constant: estq; inaqualitas incōmodior, quæ circa unum pulsuum, quàm quæ circa acervum, versatur. Jam verò intermissio motus arteriæ, sive in uno pulsu, sive contingat in pluribus, periculosior est aliis inaqualitatibus omnibus. Ut igitur à collectiva (quæ apertior est) auspicemur, facultas ipsa gignit intermittentes pulsus, vel gravata, vel impedita ob crassitudinem aut copiam humorum obstruentium, aut opprimantium arterias, aut etiam occupantium spacia, in quibus illæ distendi solent. Est cum inflammatio scirrhus corpora incumbentia arteriis infestans, earum distentionem coercet. Si verò ipsarum arteriarum tunicas tale quid occupaverit, majus periculum imminet: sicuti extremum malum, si cordis corpus invaserit: nam ij subito syncope corripiuntur. At intemperies cordis nō est perinde exitialis, sed est longè mitior inflammatione. Cuius quidem intemperiei comes facultatis imbecillitas est: pulsusque languidus, præter talem affectum, indicat nihil. Nam moderato cor præditum temperamento, pulsus edidit vehementem: parvo, languidum. Parvum itaque & languidum pulsuum sola intemperies reddit: non tamen continuo inaquaalem, nisi humoribus contentis in ipso corde, & in arteriis & venis conjunctis illi, sit facultas inferior: aut etiam ipsius cordis corpus, inaquali intemperie affligatur. Sunt autem raris pulsus intermittentes finitimi: hoc ab eis differentes, quòd rhythmum universum amittant. Qui quidem eò periculosiores existent, quò fuerit ipsa intermissio major. Porro sit arteria duorum pulsuum tempus moretur, haud scio an quispiam esse superstes possit: at unius pulsus tempus, aut paulò amplius, intermittente arteriarum motu, sæpe numero conspeximus hominem liberari, præsertim quum ætatem senilem ageret. Etenim facultates languidæ, à parvis sæpe occasionibus offenduntur: firmæ autem, tantum deiciuntur à maximis. Proinde qui habitu sunt valente, diuq; à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eisprehendantur. At imbecilli, quique assidue objecti ad omnes sunt causas, facillimè restituntur: quòd scilicet horum nemo, quum à qualibet lædatur vel minima, magnam causam expectet. Itaque intermittentes pulsus minus perniciosos possident senes quàm juvenes: mox

pueri ab illis, quòd concoquant digerantq; per halitum, humorum copiam & crassitudinē, quæ intemperies inaquaales produxit: cum nimirum concoctrice facultate sint validissima, corporeq; mollissimo, ac facillè perspirabili. Jam verò naturalis arteriæ motus, sanitatē refert: vitiosus, morbum: omnino intermissus, mortem. Et quem admodum solvere apoplexiam ingentem quidem est impossibile, levem autem non facillè: sic intermissio diuturna pulsuum ut tollatur, fieri non potest: brevis autem potest, haud tamen citra negocium. Cæterum diuturnam voco, quæ excedit duorum pulsuum curriculum: brevem, quæ intra duorum pulsuum tempus manet. Jam mors à pulsibus intermittētib; repentina corripit, nō aliter ac ab apoplexia. Utrobique enim cordis calor extinguitur, destituitur respiratio. At raritas quidem ab intermittente pulsu discernitur diuturnitate temporis: interdum etiam, quòd raritas interim habet æqualitatem cōjunctam omnium ictuum: intermittens autem pulsus necessariò inaqualis existit. Ad hæc, ingens frigiditas raris pulsus producit: quæ quidem vel corpus cordis, vel sanguinem spiritumque illius, vel * consentientem ei aliquam partem occupat. Si igitur corpus ipsum cordisprehendat, ita languidos, tardos, & parvos reddit pulsus, ut ipsa præpotens est. Quæ verò à parte proficiscitur alia, raritatē longius quàm cætera genera, à natura avertit. At mors tum minus potest declinari, ubi frigiditas corpus cordis invaserit: quanq̃ & repentina etiā in altera differentia oritur. Ac moriuntur quidem priores illi inter dormiendum potius. Alteri autem, hi cum illo modo, tum etiam inter loquendum. Intermittentes pulsus perniciosiores sunt raris: * siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem, est reditus quidam per raritatem, in commodationem pristinam. Raro pulsui adversatur creber, sicuti intermittenti intercurrentes. Fit autem ipse intercurrentes ex crebritate inaquali, quòd functionem obeat cor minus plenam, quàm usus postulet: id quod fit sanè, ubi ab humorū colluvie oneratum est cor, aut instrumenta obstructa, aut in arctū coacta. Quæ quidem causa erat etiā intermittentiū. At dissident inter se, quòd repugnat in intercurrentibus, ac decertat cum noxiis causis facultas: in intermittētib; autē, hoc nō sustineat facere. Quare judicationem sæpe attulerunt pulsus intercurrentes. Iam verò omnes ardentissimæ febres, pulsus crebrum sortiuntur: quarum quædam extra periculū sunt. At qui in syncope sunt cerebri pulsus, propter remissionem (quæ perpetuò cōjuncta est cum omnibus syncopis) existunt periculosi. Cæterum raritas nunquam vacat periculo, sicuti nec remissio, nec parvitas. Sola autem extrema vehementia in pulsibus, non modò vacat periculo, sed est etiam maximè utilis. Magnitudo autem summa, ubi cōjuncta est cum mollietie morbosa, periculum nunciat: sin cum salubri aliquo arteriæ statu, nihil subest ei mali. Præterea veloces pulsus tardis sunt securiores: siquidem summa celeritas, summa tarditate est securior. Summa quippe tarditas, non secus ac raritas, res-

tum

tum incidit, cum calor natus extinguitur. Celeritatis incrementum procedit ab usu urgente, atque a valida facultate. Verum formicans pulsus, nec omnino est celer, nec summum attingit crebritatis. Durissimus pulsus perinde est, ut molliissimus, periculosus. Nam ex scirrhus ille, aut inflammatione insigni visceris, aut ex constrictione per frigus, aut ex siccitate ab ardentissima febre profecta, aut ex valida convulsione: hic ex alto comate, & leucophlegmatia, atque ex 10 immo modica humiditate habitus gignitur. In summa vero, omnes pulsus, qui longe a naturae modo recedunt, non sunt laudabiles. At languidissimus, tardissimus, rarissimusque, omnium pessimi sunt: ab illis, minimus, molliissimus, durissimus: inde creberrimus. At non celerrimus vel maximus: sed sunt hi modice periculosi. Unus vero inter omnes extremos optimus est vehementissimus. Inaequalitas etiam intermittens in uno pulsu, omnium periculosissima est, praesentemque mortem annunciat. Hæc fit, ubi distentionem interpellat quies. Ubi igitur vehementior secundus motus sit priore, commodius est: ubi languidior, periculosius. Jam tardior item, signum periculosius existit: celerior, tutius. Gignuntur quippe hi pulsus, dum simul & cetera natura, & impeditur ab insalubribus causis. Est etiam melior motus vehemens, & celeris languido & tardo. At vero prior motus alterum nihil excellit ferè, in magnitudinis parvitatibusque differentia: sicuti neque in duritia, aut mollicitate: etsi quod interdum vibratus sit, durior alter occur- 30 sus videatur. Etenim vibratio est duræ arteriæ symptoma, ubi amplius cogitur vi distendi. Pessimus autem est pulsus is intermittens, cuius tempus quietis prolixius fuerit. Inaequalitas igitur intermittens in uno pulsu, causas habet genere easdem, ac collectiva: sed quam illa est deterior longe. Corpus cordis facultatem quandam obtinet, quæ distendit & contrahit, tuendi gratia innati caloris. Hæc in contractionibus fuliginosum excrementum effundit: in distentionibus allicit refrigerium. Ubi igitur ex æquo calidum, vel frigidum, vel purum, vel turbidum, ipsum cor fuerit, omnes ejus partes pari impetu ad functionem contendunt. Ubi vero aliæ calidiores, aliæ frigidiores extiterint: ac hæc omnino munda, illæ abundantia excrementorum confusæ: non eodem omnes impetu ad munus feruntur, sed hæc antevertunt, illæ cunctantur. Ut autem 40 plures & majori vi ad actionem properantes fuerint, universum cor excitant: ita contra, ubi pauciores sint quæ ad motum festinant, quæ consistunt plures, universum in longiore quiete continent. Jam vero calidiores si motui præsent, maturior simul & celerior, majorque distentio editur: si frigida, serior, tardior & minor. Motus itaque principatus majori numero partium defertur: sæpe etiam magnitudini usus. At vero si alteræ partes alteris vel paulo sint plures, vel plane pares, vicissim vincunt, atque vincuntur, variisque efficiunt & inaequales totius visceris motus. Caprizans pulsus ex genere est illorum, qui intercipiuntur quiete: succeditque interdum talibus cordis affectibus, quemadmodum etiam

dicrotus, qui ex genere est intro retractorum: & comitatur nonnunquam inaequalem cordis intemperantiam. Etenim si una contingat, ut quædam sint partes cordis præcalidæ, aliæ fumosa fuligine præfocentur, ad contrarios proficiunt motus, ut hæc quidem distentionem moliantur, illæ confidant. Ac tunc sanè distentioni contractio potest succedere tribus modis. Primo, cum distentionem, prius quam mensuram impleat, contractio exceperit: secundo, ubi prorsus completa succedat, externa quiete deperdita: tertio denique, dum distentionem nodum perfectam contractio retrahit, ceterum debilior reddita, reliquum permittit compleri. Haud aliter etiam contractionem distentio, nunc absolutam consequitur, nec permittit consilire: nunc etiam prius quam sit completa, impeditam & victam excipit: nonnunquam retrahit nonnihil, superatur tamen. Atque hi arteriarum motus sunt interdum vel citra affectum cordis, aut propter earum inaequalem intemperiem, aut facultatis imbecillitatem, aut etiam duritiem tunicae. Porro ipsius facultatis essentiam, nihil aliud putamus esse, præter qualitatem temperamenti. Tres autem affectus hactenus, originesque bis ferientium pulsum invenimus: unam vibratorum, hæc sola re ab illis distinctam, quod cum brevem pulsum longitudinem habeat ex utraque parte arteriæ, obscura vibratio sit: quam obrem dicrotus, non vibratus videtur. Alteram, in qua non vibratus est pulsus, sed arteria dura, & imbecilla facultas ut a corporibus decumbentibus opprimatur, aliqua tamen parte juxta cutem sita, attollatur liberè. Atque hi quidem duo pulsus tum dicroti sunt, tum duri. Tertius qui ex intemperie nascitur, haud est dicrotus, sed bis modo pulsans, nec necessario durus: possumus tamen eum dicrotum appellare. Etenim intemperiem qua cordis corpus affligitur, comitatur pulsus bis feriens: 40 consequiturque etiam ille, cuius externa quies est amissa, & cuius impeditur distentio. Est & aliud frequens genus inaequalitatis in uno pulsu, ubi arteriæ principio propinquior pars, prius movetur. In quo genere undosus atque vermiculans pulsus consistunt, à molli arteria & non valida facultate profecti. Ac vermiculans quidem, non modo non validam, sed infirmam etiam facultatem denunciat. Undosus autem, interdum non satis firmam, ac nonnunquam mediocriter validam, cum præsertim sudorem decretorium promittit. In humidis enim reperitur & pituitosis morbis: in quibus etiam tarditatem & raritatem, magnitudinemque solet acquirere. Quod si altitudinem præterea, & vehementiam sit nactus, decretorium haud dubie sudorem significabit. Magis hic sperandus est, si plures vehementes & alti appareant, quàm contrarii. Qui si æqualiter etiam fiant, salubre simul & brevi pollicentur sudorem, maximè si concoctionis morbi appareant indicia. Undosus itaque pulsus, ex humida mollique arteria oritur, simulque ex facultate modice affecta: vermiculans autem, ex molli quidem, verum ex imbecilla insigniter facultate. Quæ obrem etiam sine febribus solet supervenire universis largis evacuationibus. Decurtatorum pulsum duplex

Dicrotus pulsus.

Essentiam facultatis nihil esse aliud præter qualitatem temperamenti. Pulsus bis ferientium generationes tres.

Vermiculus pulsus infirmam facultatem denunciat. Undosus pulsus quando sudorem decretorium promittit.

Undosus pulsus ex humida mollique arteria nascitur. Vermiculus pulsus solet citra febrem accidere.

*Decurtato-
rū, pulsuum
duplex ge-
nus.*

*Decurtatorū
pulsuum di-
gnoscendorum
ratio.*

*Pulsus abo-
leri bisariam*

*Pulsus defici-
ens recipro-
cus.
Pulsus reci-
procus decur-
tatus.*

*Arterias tā-
gendū ratio.*

duplex est genus: alterū in unica distentione, al-
terum in acervo. Quod in unica distentione fit,
facultatis imbecillitatem unā cum corporis gra-
cilitate arguit. Est autem ad modum digitis ar-
teria tangenda. Deinde si animadvertatur inte-
rea in arteriæ primis partibus major pulsus, vel
vehementior, vel uterq; in postremis minor, vel
languidior, vel ambo: primus digitorū applica-
torum est attollendus, perspicendumq; utrum
similē illi qui antea erat, quā hic sustolleretur,
sequentes digiti motū percipiant, an vehemen-
torem atq; majorem. Ergo si motū similem, di-
giti sequentes sublatū digitū, sentiant, sua spon-
te arteria decurtatā distentionem habebat: quod
nobis infirmæ facultatis à corde prodeuntis, ve-
stigium erit. Nam illa quando rectē se habet, us-
que ad finem arteriarū omnium contentio quæ
attollit eas, similiter permeat. At in pulsibus de-
cortatis, paulatim remittitur, tantoque efficitur
imbecillior solito, quantum est à principio remo-
ta. Quod si elevato tui primo digito, postea motū
percipias validiorem, ac majorem quā antea:
declarat ille quidem etiamnum facultatis arte-
riæ imbecillitatem, sed minorem certē quā al-
ter: quod illic facultas remitteretur à principio
discedens: hic maneat, quantū in ipsa est, par, sed
gravata ab injectis digitis, imbecillius movea-
tur arteria: quod quidem minus habet pericu-
li. Neq; enim ita ipsius cordis, ut arteriæ quam
tangimus, ostendit affectum. Alterum autē, po-
tius cor esse imbecillum significat. Porro si om-
nino pulsus deficient, tum multo magis declara-
bunt facultatis imbecillitatē: quo tempore sunt
submovendi omnes digiti, ac dein spacio par-
vo interposito, de integro admovendi. Bisariam
autem ipse aboletur pulsus: vel quia prorsus nō
pulsant arteriæ, id quod extremum est malum:
vel quia pulsant quidem, sed ita languidē & pa-
rum, ut fugiant sensum: estq; sanē hic affectus, si
citra deliquium aliquod animi repētinum acci-
dat, difficillimus. Reciprocatur autē motus, mo-
dō ex ultima pulsus abolitione, modō ex parvo
pulsu & languido. Sed ille quidem * deficiens re-
ciprocus dicitur, hic reciprocus decurtatus. In
hujusmodi æstimandis, sic debemus partem
componere, quancunq; tangamus, ut subter ar-
teriam noster sit tactus. Omnium verō sunt pessimi
pulsus, qui ab amisso motu minimē recipro-
cantur inverso membro. Minus his, qui inverso
illo videntur moveri. Quibus etiam minus, qui
sunt decurtati, non tamen perdunt planē omnē
motum. Jam etiam his minus reciproci decurta-
ti, adeoq; si multis simul occurrant digitis. Cæ-
terum numerus digitorum, quibus motus sit oc-
cursurus, suus cuiq; est arteriæ. Ad quā rem ma-
gnoperē refert naturam tenere ægotantis. Qui-
busdā enim natura sua pulsus existit minor: sic-
uti & aliquibus brevior. Quod si nos naturæ
ipsius ægroti proprietates lateat, ex communiori-
bus differentiis conjecturam faciemus, tempera-
menti scilicet, & habitudinis corporis. At in tem-
peramento, præsertim calidi & frigidi differen-
tiam expendimus: in habitudine, gracilitatis &
corpulentia. Ac fit interdum, ut ambæ inæqua-
litates pulsuum, tum quæ in uno pulsu, tum quæ

in acervo consistit, concurrant. Sæpe quoq; illa
quæ in uno pulsu consistit, nō addest: quæ autem
in acervo manifestē conspicitur. Latet autē inæ-
qualitas unius pulsus, aut ob affectionis exigui-
tatem, aut ob ipsorum pulsuum brevitatē. Utrum-
que itaq; genus decurtatorū pulsuum, significat
facultatis imbecillitatem. Verum si in una fiat di-
stentione, etiam gracilitatem indicat. Fit igitur
decurtatus pulsus in quibusdā, ex causis
præter naturam: in nonnullis tamen invenitur
ex propria reformatione: quo modo innuens
& circumnuens pulsus. Qui quidem fit, si arteria
ita sit conformata, ut eius pars duntaxat media,
nudæ cuti subjecta sit: partes autē utrinq; altius
demergantur. Quanquam fit etiam ob faculta-
tis imbecillitatem, quæ attollere onus non po-
test. Ex horum etiam genere est pulsus tremu-
lus, qui non perinde est conspicuus. Quia verō
imbecillitatem facultatis sequitur tremor, neces-
sarium est ideo etiam tremulum pulsuum langui-
dum simul & parvū esse: quæ de re fugit sensum.
Pulsus igitur tremulus, facultatem imbecillam,
tunicam arteriæ mollem, corporisque gracilem
nunciat habitum. Videtur autem quilibet ordo
perturbationi eiusdem generis præstare, propte-
rea quod ordo naturæ nostræ in primis familia-
ris existit. Ordo etenim fixam quodammodo cau-
sam esse & perpetuam, indicare videtur: pertur-
batio autem illius, variantem, nec in una manen-
tem vel magnitudine, vel specie, vel regione. Cæ-
terum talis causa non perniciosior, sed incertior
censenda est. Itaque nihil certi, nihil ordinis per-
turbatio firmi habet: nec tale, quale ordo, vel bo-
num, vel malum.

GALENI PERGAMENI de præcognitione ex pulsibus, li- ber tertius.

DEinceps agendum de ijs pulsibus est, qui
dispositionibus præter naturam peculia-
res existunt. Etenim quicquid præter na-
turam est, aut affectus sunt, aut causæ horū, aut
symptomata. Cum igitur ex affectibus, hi qui
dem simularium, hi autem instrumentalium par-
tium sint proprii: exordiar à simularium affecti-
bus, qui quidem sunt octo numero, ab intempe-
rie omnes profecti. Quorum quatuor dicuntur
simplices, calor, siccitas, frigiditas, humiditas:
quatuor compositi, frigiditas siccitati, caliditas
siccitati, frigiditas humiditati, caliditas humidi-
tati conjuncta. At verō pulsus per intemperiem,
nisi arteriæ sint affectæ, vel cor, alterari nō queūt:
possunt tamen arteriæ nihil læso corde affici. At
affecto corde ut innoxia permāneat arteriæ, im-
possibile est. Cæterum frigida & calida intempe-
ries cordis promptē in omnes arterias permeat:
humida & sicca ægrius. Peculiares igitur pul-
sus copioso calori sunt, magnus, celer & creber.
At magnus, non tantū calorem excellentem, sed
& instrumenta requirit mollia, facultatemq; va-
lidam: itaque non erit calidæ intemperiei perpe-
tuus. Celer etiam firmam postulat facultatem, ac
instrumenta quæ distendantur promptē: quare
ne hic quidem perpetuus erit. Creber similiter,
si largē

si largè usui à magnitudine & celeritate sit factum satis, nulla fiat ratio: si non expleatur usus, fiat: proinde perpetuus ne hic quidem fuerit. Quamobrem ex peculiaribus nullus erit inseparabilis. Si igitur calor solus increverit, & in naturali statu maneat facultas, instrumentaque, quum mutatio ipsa est parva, magnitudo tantum pulsum augetur: quum major, etiam celeritas: ubi insignis, jam etiam crebritas. Proinde maximus pulsus, idemque celerimus & creberrimus, summum incrementum caloris significabit. At si celerrimus & creberrimus sit, non autem maximus, hoc nisi facultas sit imbecillior, vel arteria durior, accideret nulla alia ratione possit. Similiter ubi ingens sit crebritas, nec simul celeritatis & magnitudinis par incrementum, calorem quidem etiam tunc oportet esse copiosum, sed vel facultatis imbecillitatem, vel instrumentorum duritiam. Cæterum imbecillitati erit adjunctus languidus: duritiei durus pariter & vibratus. Si durus citra vibrationem sit pulsus, ac summè creber, imbecillam facultatem unà cum calore magno nuntiabit: & quum talis languidus sit, minabitur syncopem. Est autem aliud, cor & incallescere & incaluisse. Etenim ubi à substantia quam in suis ventriculis continet, ipsum cor calfit, potest firma facultas esse: ubi verò & incaluit, & in eandem incidit caloris intemperantiam, qua tenebantur sanguis & spiritus ventriculorum, tunc sanè eam intemperiem sequitur necessariò imbecillitas facultatis. Quod si incaluerit largius, & per ipsum totum calor febrilis permeaverit, febrem excitat hecticam. A calore itaque cordis ipsi pulsus variantur. Qui quidem calor duplex quum sit, aut est certè à putribus humoribus genitus, unde acrem qualitatem atque fumosam contrahit: aut cum *vapida quadam & suavi humiditate conjunctus, sola quantitate à natura recessit. Ille igitur prior constans & *agrè solubilis est: secundus autem, nō usque adeo obfirmatus: qui quidem balneis, exercitationibus, cibo calido, vini potui, atq; ex animi affectibus *timori & iracundiæ solet supervenire. Porro calor qui diversus est à nativo, brevem habet externam quietem: celeriores autem, quàm pro portione distentionis, contractionem. Qui quantitate sola variat, majorem simul & celeriores distentionem contractionem. Atque etiam fuliginosus est, longè citiores distentionem, contractionemque celeriores reddet. At verò si cor quidem calidius sit, frigidiores autem arteriæ, ipsa motuum exordia simul utrobique fient, si modò venæ à corde facultatem citra læsionem recipiant. Cor tamen singulis arteriis majorem, celeriores, vehementioresque pulsum habebit. Etenim motus principium à corde illæ omnes habent: ejus autem speciem sortiuntur singulæ, prout cū ipso corde temperatura consenserint. Porro nonnunquam accidet, ut arteriæ eodem tempore nō accipiant ex corde influentem facultatem: verum quæ cordi propiores sunt, primæ: posteriores, quæ remotiores: quod potissimum evenit, si arteriæ frigidiores & cor unbecillius coi-

verint. Nonnunquam etiam in corde ipso percipitur temperamentorum pugnantia. Nam modò frigidius visceris corpus æquo est, & in ventriculis contenta substantia calidior: modò è diverso, substantia frigidior, cor autem calidius: ubi etiam pulsus fiunt moderatis similes. At ubi aer quem inspiramus, infectus putredine sit, putredoque ipsa ad cordis corpus pervenerit, febrem pestilentem ac letalem accendit: quæ quidem ex caloris acredine, ipsoque caloris genere agnoscitur: & ex pulsu etiam, qui parum à naturæ modo recedens, in eodem statu perpetuò manet: quemadmodum in hecticis febribus, quarum sanè duo hæc propria sunt signa, si perpetuò sibi illæ videantur similes, nec invasionem ullam accessionis, nec incrementum, nec vigorem, nec remissionem habeant, nec febricitare se percipiat ægrotus. Hos pulsus nihil est necesse majores iusto, atque interim nec crebriores quidem esse: at omnino celeres tamen, cum febrientium pulsibus universis adsit perpetuò celeritas. Cæterum quibus putridus ille calor, non cordis corpus invasit, sed humores in ventriculis illius contentos, (deprehenduntur enim affecti hac peste, si febrem primum percipiant, nec dein æqualiter semper febricitent: ad hæc, si pulsum non habent pervalidum) multi horum servantur. Frigidæ intemperaturæ ipsius cordis, pulsus parvos, tardos, atque raros efficiunt. Ac primum sanè crebritas immutabitur, dein celeritas, ac ultimò magnitudo, si quidè illæ facultas sit: nam si ipsa fuerit offensa, ad parvitatem & tarditatem potius, quàm ad raritatem pulsus mutabitur. Cæterum ubi facultas laboret plurimum, etsi conjuncta frigiditas sit, pulsus extremè quidem fiunt parvi, sed non tardi extremè: imò nonnunquam moderatis similes: crebritatem tamen non abjiciunt pristinam, sed etiam adaugent. At ubi paululum debilitata facultas sit, & frigiditas vigeat plurimum, longissimè ad raritatem pulsus deflectunt, parum ad parvitatem, medio modo ad tarditatem. Eodem etiam arteriæ modo, si in nativo temperamento consistent, movebuntur. Nam si corde frigidiores existente, ipsæ calidiores sint æquo, tantum alterabunt pulsum illius, quantum à natura recesserint. Vacant hujusmodi affectus febre, quod fiant refrigerato corde à succis frigidis, ipsdemque lentis & crassis. At verò si perinde ut cor arteriæ etiam iusto sint frigidiores, remissionem motuum illius augebunt: idque in genere eodem. Accidit autem interdum frigidius iusto esse cor, fumidumque excrementorum plenum: quo tempore pariter & minor & rarior distentio fit, contractio verò celerior. At si ipsum corpus cordis inciderit in intemperiem aliquam inæqualem, necessum est pulsus ipsius cordis, adeoque arteriarum omnium, variè inæquales fieri. Si quidem & collectiva, & circa unum pulsum in æqualitas, in omni genere accidit: quod *subita fiat in magnitudinem, parvitatem, celeritatem, tarditatem, remissionem, crebritatem & raritatem mutatio. Verum in duritiem & molitudinem, subita mutatio fieri unquam non potest

Cordi inesse nonnunquam varia temperamenta.

Pestilentium febrium pulsum parum à naturali recedere.

Hecticarum febrium duo signa propria.

Febrientium pulsibus universis adest semper celeritas.

Frigidæ cordis temperiæ qui continentur pulsus.

Cor, si laboret inæquali intemperie, pulsus universos variè inæquales efficiere.

*Pulsus bis fe-
riens, intem-
periei corpo-
ris cordis pro-
prium sym-
ptoma est.*

*Pestilentes
non paucas
febres esse ab
initio hec-
ticas.
Hæctica fe-
bres quam
ab initio fiat*

*Hæcticarum
februm noti-
tiam ex uri-
na investigari
non posse.*

*Diaria febre
vel putrida
quando febris
crescit homo*

potest. Non vibratus autem interdum & vibra-
tus, subita quadā vicissitudine sese in affectibus
excipiat, adjuncta ad cordis intemperiem duri-
tia vel tensione arteriarum. Porro pulsus bis fe-
riens, intemperiei corporis cordis propriū sym-
ptoma est. Cæterū si durities accesserit, jam hoc
indiciū labefactatur: nam in dicrotum conver-
titur cōmunem plurium affectuum. At vibratus
dicrotus gignitur, ubi pulsus qui absolute est vi-
bratus, deminuta sit longitudo. Dicrotus verò
non vibratus, æquē est ac vibratus durus: sed ta-
lis per suam tarditatem efficitur, & corporū o-
nus incumbentium. Jam verò ubi cordis corpus
præter modum est calidum, materiæ autem con-
tentæ in eo frigidiores, aut etiā partes illi adhæ-
rentes, tribus id contingere differentiis potest.
Aut enim illud tantò calidius est, quanto hæ fri-
gidiores: aut multò illud calidius, quàm hæ fri-
gidiores: aut minus illud calidius, quàm hæ fri-
gidiores. Quarum prima differentia pulsū re-
præsentat ad unguem moderatū, magnitudine,
celeritate & crebritate. Ad remissionē autē tan-
tū depellit, quanto spacio naturalem tempera-
turam viscus ipsum reliquit. Sunt autem pestilē-
tes non paucæ febres inde ab initio hæcticæ, di-
stantq; ab omnibus aliis febribus, quæ ex magna
putredine oriuntur. Præterea mœrorem inter-
dum sequuntur & iram à principio quædam hæ-
cticæ febres: aliter nescio an inde ab initio fiat hæ-
ctica. At successu temporis, multis aliis succedūt
hæcticæ, quas perpetua æqualitas satis manife-
stè declarat. Notitia autem firma in huiuscemo-
di affectibus ex urina quidem investigari nō po-
test: ex pulsibus autem initio adhuc atq; primis
diebus per febres hæcticas non facile cōparatur,
cū speciem cōmunem habeant tunc cum dia-
riis febribus. Verū elapso triduo, jam clariores
fiunt etiam pulsū iudicio. Siquidem apertè hæ
celeriores, quam deceat, pulsus habent, tantoq;
languidiores iusto, quantum calor increverit.
Deinceps de illis febrib. dicamus, in quibus cor
calidius est, quàm vicina frigidiora. Nam in hu-
iuscemodi affectibus, pulsus celeriores simul &
maiores, & crebriores, languidioresq; iusto erūt.
Longius tamen ad remissionem & celeritatē, mi-
nus ad crebritatem & magnitudinē, divertent à
natura. Stabilis & cōstans harum generatio est,
ut cæterarum hæcticarum. Quod si non ita lon-
gè viscus à natura desciscat ad calorem, vicina ei
longius ad frigiditatē: minores pulsus in his &
rariores erunt: at celeritate vel similes erunt na-
turalibus, vel tardiores. Similes, si non multò fri-
gidiora vicina sint: tardiores, ubi multò longio-
ri intervallo, hæc ad frigiditatem à natura defle-
xerint, quàm ad calorem cor. Remissio hīc etiā
quantitati caloris respondebit. At verò si frigi-
dius iusto sit ipsum cordis corpus, materia por-
rò, reliquaq; vicina, eo calidiora, erūt & hīc tres
numero differentię, & variabunt pulsus in una-
quaq; sicuti superiores. Primū æquē refrigeratū
sit cor, ut incaluerunt vicina: tardior æquo erit
is pulsus, si insignis fuerit alteratio: cui etiam re-
missio respondet. Cæterū si viscus sit frigidius
omnino, quàm postulet naturalis modus, & vi-
cina similiter calidiora, febricitabit utiq; homo,

nō hæctica tamen febre, sed vel diaria, vel ea quæ
humorū putredinem sequitur. * Utriusq; autem
sunt propria signa. * Diariæ quidem conjunctæ
cum frigidior corpore cordis, si ex æquo à na-
tura uterq; pulsus recesserit, nihilq; magnitudi-
ne à naturali differat, nec crebritate ferē, nec ce-
leritate, ni utraq; insignis sit mutatio. Erit etiam
tunc tantò languidior pulsus, quanto viscus fri-
gidius. * Eius autem quæ humorum putredinem
sequitur sunt indicia, par semper magnitudo in
pulsu: nō tamen ut in eo qui secundum naturam
erat: nec eadē erit paritas in aliis generibus. Ve-
rū ubi à natura * parum recessum est, nihil fe-
rē: ubi majori intervallo, apertè in contractione
pulsus celerior sit. Jam etiam clarè in extrema
quiete crebrior & languidior apparet tantò, quā-
tū refrigeratum est cor. Fingamus rursus, ma-
gis refrigeratum cor esse, quàm vicina incalue-
rint, sitq; febris ephemera: horum pulsus manife-
stè languidiores erunt, & minores: at tardi non
perinde apertè, sed * pro ratione excessus, quo
vicinis partibus est cordis corpus frigidius. Si
verò sit febris putrida, pulsus languidus aderit,
perinde ut superior: sed illo etiā minor in disten-
tione, tardiorq;: at contractio naturali celerior
erit. Ponatur rursus tertium genus cōmutatio-
nis, hoc est, minus ad frigiditatem cor declinasse,
q̄ ei conjuncta ad calorem: ac febrem esse diariā:
pulsus habebit hoc corpus tantò q̄ par est imbe-
cilliores, quātò corpus cordis fuerit intempera-
tius: ac majores & celeriores naturali, sed majores
q̄ celeriores: ad hæc crebriores erunt. Hæc
omnia sunt accipienda, pulsib. nec in duritiā, nec
in mollitudinem apertè mutatis, Omnes febres
diarię, in magnitudinē, celeritatē, crebritatemq;
pulsus, quantū in ipsis est, mutant. Nam si cōcur-
rat alius affectus, mistam oportebit mutationem
esse, ex illa, & hac, quæ comitatur febrem. Simili-
ter febres hæcticæ, pulsus in easdem differentias
convertūt, quantū in ijs est, ampliusq; in ijs mu-
tatur celeritas. At quæ ortæ sunt ex putredine
humorū, in vigoribus utrunq; habent motū ce-
lerem, & distentionis, & contractionis. Præterea
crebritatem ex æquo mutant, cū externæ quie-
tis, tum internæ. In initio accessionis, non perin-
de, sed magis augent contractionis celeritatem.
In incrementis cū hanc, tum etiam externam
quietem plurimū concitant, ut pulsus in illa cre-
berrimus esse videatur. Atq; hi pulsus febriū per
se sunt proprii. Reliqui omnes qui febrientibus
accidunt, alios potius affectus, quàm febres, se-
quuntur. Quorū etiam affectuum sunt duo ge-
nera: aut facultatis, aut instrumentorum vitium.
Quippe ad causas inveniendas, quæ immutant
pulsū, tria hæc sunt animadvertenda, instru-
mentū, usus, & facultas. Porro pulsus qui ab in-
flammatione excitantur, ab ijs quos humorum
putredo effecit, sola distinguuntur duritia. Siqui-
dem pulsū ortorum ex inflammationibus, du-
rus occursum existit. Quare si durum occursum,
quem efficit tensio arteriæ, discernere ab eo va-
les quem generat frigiditas atq; duritia, tres præ-
dicere hinc causas præteritas poteris, potum fri-
gidę, meracius vinum, inflammationē. Siquidem
indurescunt ex immodicis frigidæ potionibus
arte-

*Diaria
bris in
propria*

*Febris
da prop-
signa.*

*Diaria
bres quæ
pulsus
tent.*

*Febres
da quæ
pulsus
antur.*

*Causæ
tes pul-
ut in-
tur, co-
rare o-
instrum-
tum, ut
et facit
Arteri-
quibus
sis dura*

arteriarum tunica, & à vino immodicè potò ex-
 iccantur. Jam verò febris hectica * rarissimè à
 principio oritur, quanquam eo tempore non-
 nunquam sint ortæ. Ad hæc, nec magnus pul-
 sus, nec vehemens, unquam cum febribus hec-
 tics coeunt: sed si alterutrum habeant horum, mi-
 nimè sanè sunt hectica. Si simul utrūq; habeant,
 planè sunt diariæ, si quidem eorum contractio
 non properet. Propria est enim eius quæ sequi-
 tur putredinem humorū, celeritas. Cæterum in
 remissionibus accessionū, celeritas contractio-
 nis exolvitur: initio autem gignitur, ac per incre-
 mentum augetur. At ubi jam propè vigor adfue-
 rit, ingens incrementū suscipit distentionis cele-
 ritas, contractionis pari celeritate manente. Ubi
 verò vigeat jam planè febris, in illa accessione
 ad summā celeritatem distentio pervenit, immi-
 nuiturq; celeritas contractionis. At verò pulsus
 in utranq; partem mutatio (si adjecerimus * di-
 stinctionē) accessionis initium nunciat. * Distin-
 ctio autē ipsa erit, si mutatio citra alienam occa-
 sionem acciderit. Atq; occasiones quidem ipsæ,
 partim externæ sunt, partim ab ipso corpore o-
 riuntur: quarum utraq; sunt notæ. Verum cla-
 rioris doctrinæ gratia, appellabimus quæ proce-
 dunt ex corpore causas, unde vel facultas, vel in-
 strumenta alterantur, antecedentes: harum autē
 ipsarū causas, quæ extra corpus positæ induxe-
 runt alterationem, externas, seu procatacricas.
 Porro inæqualitas pulsū, quæ ferè invadit unā
 cum accessionibus, compressarū vel obstructa-
 rum modò arteriarū, vel copię humorū oppri-
 mentium facultatē, est signum. Quæ igitur pul-
 suum mutationes fiunt, dum cordis calor auge-
 tur, aut confluunt intrò humores, apertè acces-
 sionis initium annunciant, si quidem ab aliis oc-
 casionibus sint remotæ. Existimare autem con-
 venit, ubi acervus materiæ humidæ initio acces-
 sionis ad cor pervenerit, in primis quidem, mor-
 tis periculū esse: quod periculum maxima muta-
 tio pulsuum in raritatē, tarditatē, parvitatemq;
 prænunciat. Nam si his insignis remissio succe-
 serit, ex templo peribunt. Sin autem absit remis-
 sio, contendit natura eam superare, atq; arteria-
 rum motū majorem, celeriorē, crebrioremq; ex-
 citat: ut uterq; motus celerior quidē fiat, sed cla-
 rius contractionis, increseatq; hic brevi manife-
 stē, donec augeat accessio. Tandem ubi mate-
 riam superaverit, calor quasi flamma succeditur:
 atq; is est vigor accessionū, ubi fuliginosum na-
 tura excrementū, expiratione & contractione ar-
 teriarū expellit. Quod verò est veluti cineritū,
 non perinde, quia crassum est, potest excernere,
 sed per insignes quosdam meatus educit. Hoc in
 partibus inflammatis, pus est: in ipsis vasis, sedi-
 mentū urina. At si cor siccius quàm pro mo-
 do naturæ evaserit, unā secum omnes alterabit
 arterias: id quod interdum in una animalis par-
 te ipsis arteriis accidet, interdum autem in pluri-
 bus. Est cum sint contrā quàm cor affectæ ipsæ
 arteriæ, sed tamen eius affectionē recipiāt: ita ut
 conflatur illis medius quidam affectus in humi-
 ditate siccitateq;. Præcedentes causæ quæ indu-
 rant arterias, sunt aqua sulfurea aluminosaq;, &
 omnia breviter quæ exiccandi vim possident.

Quæ quidem intemperies ubicunq; arterias in-
 vaserit, pulsus reddit duriorē. * In corde au-
 tem siccam intemperie producit sicca victus ra-
 tio, diutius administrata: præterea medicamen-
 torum exiccantiū tum esus tum potio, in quibus
 est vinū merum: ad hæc cibi potionisq; abstinen-
 tia, immodicus labor, senii, sollicitudo, tristitia,
 diuturnæ vigiliæ, febris hectica, præq; cæteris,
 marcida. Causæ humidæ intemperiei sunt œde-
 mata, quæ partes diutius tenuerunt: leucophle-
 gmatia, quæ ipsum etiam cor mutāt: omnia de-
 niq; principum viscerum œdemata cum arterias
 humectant & cor, tum pulsus efficiunt molles.
 Pulsuum causæ mollitudinis mediocris sunt, ci-
 borum copia humorū, multū ocium, somnus
 longus, balneæ à cibo. At durorū pulsuum antea
 ostendimus esse parvitatem, ut mollium magni-
 tudinem * comitem: quas quidem celeritas atq;
 tarditas, crebritasq; & raritas cōsequuntur. Sunt
 autē primæ ac veluti cōjunctæ causæ generatio-
 nis pulsū usus atq; facultas. Porro in corde nō
 excitatur tumores, qui pulsus duriorē efficiant,
 quemadmodū in aliis visceribus inflammationes
 & scirrhi: siquidem prius homo correptus syn-
 cope intereat, in illorum tumorum auspiciis.

GALENI PERGAMENI
 de præcognitione ex pulsibus, Liber
 quartus.

Reliquum autem in hoc libro fuerit, cæte-
 rarum partium dispositiones, quibus cor
 consentiens commutat pulsus, omnes ex-
 plicare suo ordine: ubi hoc ante omnia admoue-
 rimus, totius corporis pulsus, antequā cor con-
 sentiat parti prius affectæ, fieri nō posse ut in cō-
 munem alterationē trahatur: in parte tamen ali-
 qua, licet offensionē cor non percipiat, arteria-
 rum motus variari posse. Partes animalis respi-
 rationi servientes duæ tantū sunt, pulmo & rho-
 rax. Nutritionis multò plura quàm duo instru-
 menta, jecur, ventriculus, intestina, lien, renes, &
 utraq; vesica. Celerrimam cordi & omniū maxi-
 mam noxam, dat pulmo. Sedem habet enim om-
 nium ei conjunctissimā, illiq; vasisq; maximè af-
 finis est, & confluens per maxima ostia in ventri-
 culos eius. Quamobrem si quando solito cali-
 dior evaserit, continuo cor calfacit: sicuti & re-
 frigerat, frigidior effectus. At humiditatis & sic-
 citatis intemperiem, non perinde ac illas, sed ci-
 tius etiam has tamen, quàm cætera instrumenta,
 impartit. Ubi igitur ob pulmonē exalfectū, cor
 pravum calorem contraxerit, pulsus efficit, qua-
 les solet usus auctus efficere. Qui affectus si sit
 diuturnior, in periculū vocabitur illud, ne in fe-
 brem hecticam incidat. Atq; perinde respiratio
 & pulsus alterabuntur, siue solum per se cor in-
 temperatum sit, siue consentiat pulmoni. Majo-
 rem tamē in toto sinu thoracis æstum percipiet,
 qui ex pulmone laborat, calidumq; planè expira-
 bit, & sitiet etiam altero magis & calidioribus e-
 rit faucibus atq; lingua, eaq; majori ex parte sic-
 ciores: quæ, si ingravescat malum, cum aspredine
 quadam nigrescet. At si pulmo refrigeratus sit,
 cor ei consentiens, pulsus primò in eam altera-
 tionem adducet, quæ usum exolutum consequi-

Cor exiccare
 quæ possint.

Humida in-
 temperiei
 causa.

Pulsus mol-
 les & duos
 quæ efficiant.

Pulsuum ge-
 nerandorum
 prima causa
 sunt, usus
 atq; facul-
 tas.

Cordi nun-
 quam obori-
 ri tumores
 qui pulsus
 duriorē ef-
 ficiant.

Pulsus totius
 corporis, an-
 tequam cor
 consentiat
 parti prius
 affectæ, per-
 trahi in com-
 munem alte-
 rationem nō
 posse.

Respiratio-
 nis organa.
 Nutritionis
 organa.
 Pulmonis
 situs.

Cor pulmonis
 consentiens
 quales pul-
 sus solet ef-
 ficere.

Pulmonis ca-
 lida intempe-
 rie affectu
 nota.

tur: processu temporis, ubi hecticam frigiditatem contraxerit, pulsus excitabit, quales huic, si polleat, tribuuntur. Cæterum quibus primus refrigeratus est pulmo, frigidam respirationem persentiunt. Si siccitate fuerit intemperatus pulmo, à primo pulsus penè nihil mutabit: tandè cõsentiente illi corde, ipsos duriores efficiet. His fauces, tametsi nihil sitiant, promptè arescunt. Humida intemperies uvidas reddit fauces, sitim extinguit, temporeq; ad mollitudinem pulsus ipsos traducit. Atq; ex simplicibus his, discernere cõpositas intemperies licebit. At verò fluxionum omnium quæ in pulmonem impingunt, communis est inæqualitas pulsuum: verum minor quidè, à subtilibus simul & paucis: insignior autè à crassis & viscidis copiosisq; fluxionibus, pficiscitur: quod videlicet hæc magis obstruant, gravent, & cõprimant. Durioresq; oporteat fiunt pulsus, per intemperiem siccam, & inflàmatos induratosq; tumores pulmonis: contra molliores, per œdemata. Frigida intemperies parvâ, tardam, raramq; respirationem gignit, non aliter ac pulsus. At fluxiones frigida, pulsus similiter mutant: respirationem autem, nec parvâ, nec tardam, nec rarâ reddunt. Quia enim constrictus pulmo est, paucus spiritus recipitur: qui cum naturæ nõ faciat satis, contingit ut altera actio, statim celeris efficiatur & magna. Respirationis itaq; species est omnibus fluxionibus eadem: at non omnibus accidit similiter suffocatio, * sed calidioribus omnibus magis: quandoquidem largior rem attrahi spiritum natura tum postulat. Solâ intemperiem nullum suffocationis periculum excipit. Porro si arteriæ tantum asperæ sint oppletæ, nihil pulsus duritia variant: sin læves, quia totius animantis arteriæ intenduntur, pulsum efficiunt duriorum. Intemperies thoracis easdem alterationes inducunt, ac paulò antè illæ pulmonis: tumores, pro multitudine & genere humorum qui efficiunt eos. Variant aut, quod citius cor, ac magis pulmoneq; thoraci consentiat: & quod interim pars thoracis affecta sit * musculus, interim succingens costas membrana. Major siquidem tensio oritur, ubi duræ partes & spissæ intumescunt. Unde etiâ pleuritici semper duriorum pulsum quam peripnevmonici habent: æqualem tamen, nõ ut illi inæqualem. Jecinore affecto pulsus ex intemperie variant, ut superius docuimus. Si excitati sint tumores præter naturam, conveniunt ferè etiâ in his, sed minus ex inflàmationib. indurescunt, quam ex thoracis inflàmationibus, & tantò quidem, quanto quam ex pulmonis magis. Nunquam autem ex thoracis vel jecinoris tumore pulsus mollis gignitur, quod nec instrumenta ea unquam œdemate pituitoso affligantur. At cor consentit jecinori, vinculo cavæ venæ. Consentit aut septo transverso cor præter omnes alias thoracis partes, quod ex ipsa cava vena in illud venæ inserantur. Tensionem verò nulla perinde alia pars infert arteriis, præcipue si nervosa eius pars sit affecta. Quod si à solis excrementis * quæ in eo gignuntur, absq; febre intendatur, dolor ac dyspnœa ab ipso principio orietur, postea putrescentibus excrementis febricitabit. Si ex fluxione quæ aliunde in ipsum decumbit (omnino autè hæc sit vel flavæ bilis, vel calidi sanguinis & tenuis oportet:

nam crassum sanguinem & pituitam lentam, propter densitatem, nunquam recipiat) necessario hi delirabunt, pulsumq; habebunt insigniter durum: itaq; etiam parvum, ac proinde creberrimum, cum nimium etiâ copiosus sit calor. Jam verò omnia quæ magnis pleuritidibus accidunt, respondent symptomatibus partis nervosæ septi transversi: tum quod succingens costas tunica multis nervis prædita sit, tum quod adhæreat septo transverso, membranisq; thoracem intersepietibus, per quas ad cor continuatur. Ac maximum sanè indicium ex tialis pleuritidis est, si pulsus sit magnoperè durus, ob idq; similiter parvus, & ob ambo hæc, caloremq; creberrimus. Pleuriticus namq; cum tali pulsu est nullus unquam servatus. Cæterum hi minus, quam quibus inflàmatus est septum transversum, delirant: siquidem propius accedit ad cerebrum, diaphragmatis nervorum exortus. Ventriculus intemperie affectus, pulsus ita ut superiora immutabit. Si tumore secundum fundum, aliorum more. Si ad ejus os is constiterit, pulsus ob nervorum multitudinem erit durior: non ita durus tamen ut ex septo transverso, aut costas succingente membrana. Siquidem quia ij nervi insigni sensu præditi futuri erant, ob id molles & magni sunt conditi, atq; à principio ipso producti. Igitur ob mollitiem ipsorum, & quod ea pars sit carnosâ, nunquam ex ore ventriculi ita durus sit pulsus, sed tum parvus, tum creber: quia propter eximium sensum defatigatur quæ primus, deijciturq; facultas: quæ quidem ne paulisper quidem illic copiam humorum sustinet, sed degravatur, pulsusq; inæquales, atq; interdum languidos efficit. Cætera instrumenta nutritionis, quæ propiora quidem sunt cordi, & magnis vasis ei copulata, celerius & magis id in cõsensum trahent: quæ remotiora sunt, & parvis affixa, minus & tardius. Eodem modo quæ dura & contenta, nervisq; prædita sunt plurimis duris, faciliè hæc duros pulsus efficiunt: quæ contra, molles. Quæ sensu vigent, utroq; incõmodo facultatem afficiunt. Porro qui inclusi in spissioribus corporibus & constipati sunt humores, ij majorem dolorem, quam qui in rarioribus & mollioribus sunt, concitant. At verò si cerebrum, aut illius etiâ meninges, laborèt inflàmatione, necessario febris atq; delirium sequitur: non necessario autem per aliarum capitis partium inflàmationes. Nam musculorum temporaliu inflàmationes, si magnæ sint, febres, deliria, spasmos, soporesq; frequenter inducunt, non tamen semper: quippe si parvæ sint, nunquam talia symptomata excitant. Cerebrum ipsum ubi in morbosam intemperiem incurrerit, symptoma necessario, quod intemperiei familiare est, inducit: in caloribus immoderatis, si quando soli per se acciderint, delirium: si siccitati conjuncti, una cum vigiliis. Vigilia siquidem proprium est siccitatis symptoma: ut humiditatis, somnus profundus: ac refrigerationis, fatuitas. Cæterum si cum frigiditate humiditas coeat, altus sopor inducitur. Si verò longè calidius humidiusq; cerebrum, quod sit æquum, evaserit, sopor vigiliis atq; delirio junctus orietur. Vehemēs frigiditas cerebri, siccitati cõjuncta, motu privat universum corpus. Si cerebrum admodum calidum sit, nec adsit siccitas, * in cõsistètia arteriæ pulsus moderati erunt: magnitudine

verò,

Fluxionum
omnium in
pulmonem ir
ruentium,
cõmunis est
inæqualitas
pulsuum.

Pulmo frigi
da fluxione
infectus
qualem edat
respirationem.

Fluxiones cu
ras pulmo
nis eadem co
mitatur spe
cies respira
tionis.

Thoracis in
temperies, tu
moresq; qua
lem pulsum al
terationem
inducunt.

Jecinore affe
ctum quales
pulsus produ
cat.

œdemate
nec thora
cem nec ie
cinorem infestari
unquam.
Cor consen
sit hepatis,
vinculo ca
væ venæ.
Cor qualiter
consentiat se
pto trans
verso.

Septi
transv
er. a
ut pul
sient.

Pleuriti
cis: sal
pulsus
ficer.

Diaphr
ma in
matum
deliria
tur.

Ventri
affectu
les pulsu
ficiat.

Oris &
culi ner
quales.

Cerebri a
menignu
inflamm
nes necess
rio febris
que delir
sequitur.

Cerebrum
temperie
fectum qu
lia sympt
mata indu
cat.

Vigilia un
Somnus pr
fundus.
Fatuitas.
Vigilans po.

verò, celeritate, & crebritate hætenus superabunt, quatenus pravus calor nativus excesserit. Si non modò sit calidius, sed siccus præter naturam, statim utique etiam tenuis meninx, quæ tegit cerebrum, in eandem affectionem incidit, unaque cum ea omnes nervi atque arteriæ inde pulsum nanciscuntur duriorē, quæ earum tunica & exsiccentur & contendatur. Quod si ex bilioso humoris affluetia cerebrum in affectum calidum & siccum devenerit, etiam magis tenduntur arteriæ: si verò ex calidi ac veluti ferventis sanguinis, siccitas minor & major tensio cum ipsas meningas corripit, tum nervos atque etiam arterias. Si igitur arteriæ corpus cum siccitate videatur durius, alterutrum est existimandum obfidere ipsum cerebrum, vel intemperiem calidam & siccam, vel copiam bilis: inflammationem autem, si cum tensione. At si cum ambabus dispositionibus, affectum puta conflatum esse ex sanguineo & bilioso humore. Ac delirant sane omnes in hunc modum affecti: modicè tamē qui sola intemperie laborant, habentque ii infirmas omnes voluntarias actiones. Qui verò à bilioso humore affliguntur, non eas habent infirmas, sed delirant impensius. Qui ex atra bile fervere ob putredinem id patiuntur, facile mente alienantur: quorum pulsus etiam sunt duri, siccitatis atque tensionis ratione: simulque parvi ob duritiem, & justo celeriores, quia febriunt: nec non crebri, quod usus non fiat satis. Humida intemperantia cerebri, molles tempore efficiunt pulsus, somnolentumque hominem. Si ad illas febrilis calor accesserit, morbus appellatur lethargus, pulsusque specie referet arteriæ contectæ, quamquam illa sit mollis. At magni pulsus in morbis hisce omnibus hætenus erunt, quatenus auctus sit calor. Celeritas aut omnino minima est, aut his nihil prorsus inteditur, crebritasque similiter. Si verò ex bile simul & pituita ipse affectus sit mistus, nec prorsus vigilant, nec alio sopore tenentur, sed somnolenti desipiunt, genasque attollere nequeunt: quare pulsus eorum etiam sunt miscellanei. Si morbosa frigiditas citra materiam in cerebro oriatur, cui cor consentiat, minores, tardiores, atque rariores æquo pulsus ædantur, idque absque ulla tensione. Sin autem cum ea intemperie materia etiam melancholica affluerit, aut crassa & glutinosa pituita, fiet ut arteriæ tendantur, ac proinde pulsus durior videatur. Si humida & flatulenta pituita comitata sit intemperiem, sine tensione molliter pulsabit arteria. Si mista fuerit pituita, simul mollis erit, & non nihil intetus pulsus. Neque autem obscurum est, quin si pulsus sit mollior, erit etiam major quam antea. Subtilis meninx quæ disjungit cerebrum, absque illo perpeti dictorum quicquam non potest, neque etiam absque meningis cerebro: sed statim sibi affectum ultrò citroque communicant. At dura meninx, quia longissime à cerebro dissita est, affecta esse sola potest. Cujus affectus si insignis sit, ut cor consensum atque arterias sollicitet, pulsus, quemadmodum in affectibus cerebri, alterabuntur. Calidi itaque affectus illius usum augent: frigidi cum huc remittunt, tum arterias sensim indurant, præcipue eas quæ corde sunt altiores. Sicci intentum & durum pulsum efficiunt, humidi molle: attamen non ita molle & durum, ut cerebrum, sed duriorē & minus mollem. Siquidem corpora sua sponte dura, si in affectus indurantes

inciderint, maximam contrahent duritiem. Quæ autem natura sunt mollia, si in humectantes & solventes incurrant, semel remittuntur atque mollescunt. Sin dura arripiantur affectibus humectantibus, aut mollia indurantibus, nequaquam assequuntur extremum sibi contrarium status. Porro qui cerebri & pulmonis gratia molles sunt pulsus, ita sunt molles, ut nullus alius. His præ cæteris vicinior est ille, qui ex jecinore & liene oritur œdemate affectis. Nam scirrhus etiam hæc viscera obsessa, pulsus satis du-
Pulsus molli-
simos esse,
qui ex affe-
ctu cerebri
& pulmonis
oriuntur.
ros efficiunt: minus, si sint inflammata, quam si laborent scirrhus. Cerebrum atque pulmo, fortassis ne scirrhum quidem admiserint: duris enim corporibus & spissis hic affectus, non raris & mollibus familiaris existit. Igitur affectus supra omnem modum frigidi, pulsus duros efficiunt, alioqui nequaquam. Ad hæc arteriæ viciniores affectui, promptius in molli-
Scirrhus du-
ris tantum
corporibus
familiaris
existit.
tudinē atque duritiem transeunt. Quæ verò longius dissita sunt, aut si cor interpositum adsit, minus. Quod si teneas, non est quod dubites in cæteris morbis faciei, colli, & artuum, quales pulsus gi-
Partes spis-
sas & duras,
pulsus duros
efficere.
gnantur. Nam pars affecta si sit spissa atque dura, pulsus efficiet duros, sive inflammata, sive scirrhus affecta, sive supra modum refrigerata ipsas arterias sollicitet. Si sit carnosior, eaque vel inflammata sit, vel scirrhus induruerit, duros quidem, sed minus superioribus. Sin œdema habuerit, molles. Consistent autem arteriosis celerius vicina omnes arteriæ, & cor venosis secundum has: tardissime autem nervosis. Jam verò cum insigni lien scirrhus esset affectus, frequenter conspeximus non consecutam aquam inter cutem, quæ indurato jecinori necessario succedit, sitque tum pulsus præditus signis utriusque affectus, existens partim mollis, partim durus & tensus. Oritur porro hydrops ob hæmorrhoidum mensuramque immodicam vacuationem, aut suppressionem insolitam. Testes, etsi extra inguina sint, statim tamē febres propter vasorum vicinitatem accendunt. Etenim superne à renu regionibus vena & arteria descendunt per peritonæi foramina ad testes vasa sane magnitudine insigni. Præterea ipsa erythroides tunica adnata peritonæo est: ob idque si sit inflammata, pulsum efficit durum, ac proinde minorē. A testibus inflammatis non perinde durus oritur, sed magnus tamē, febris ratione. Quæ enim partes arteriosæ & venosæ sunt, majores pulsus excitant: quæ nervosæ, aut omnino nihil, aut parvos: at tetanos & spasmos generant. Ac præsentium quidem cognitio nihil est aliud, quam affectuum inventio. Cognitio autem præteritorum est inventio causarum, quæ induxerunt affectus. At ex præsentibus præfagia futurorum sumuntur. Unum igitur ac primum quod præcognoscere cupimus, est, quale exitum habiturus sit morbus. Secundum, quo tempore judicabitur ad salutem aut mortem. Tertium, quinam modus erit aut salutis, aut mortis. Quæ omnia ex dispositionibus iis præfagiuntur, ex quibus morbi genus, & facultatis imbecillitas, vel robur, dignoscitur. Morbus porro cognoscitur ex loco affecto, eiusque dispositione. Facultas ex comodo temperamento, vel intemperie corporum solidorum. Nam si imbecillitates quadam ob spiritum accidant animalē, breves sunt illæ, & symptomatum ratione consequuntur. Ergo si facultas vigori morbi sit sustinendo, homo necessario servabitur: si

Pulsus molli-
simos esse,
qui ex affe-
ctu cerebri
& pulmonis
oriuntur.

Scirrhus du-
ris tantum
corporibus
familiaris
existit.

Partes spis-
sas & duras,
pulsus duros
efficere.

Aquam in-
ter cutem ne-
cessario suc-
cedere indur-
ato jecinori.

Hydrops
cause.
Testes inflam-
mati cur sta-
tim febres ac-
cendunt.

Cognoscere
qua unice
optemus.

Morbus un-
de cognosca-
tur.

Facultas un-
de cognosca-
tur.

Salutis spes
quando adsit,
et quando sit
deplorata.

quidem nihil * delictū fuerit extrinsecus. Sin autem facultas sit impar, moriatur is necesse est. Jā verò qui sunt evasuri, eo liberabuntur tempore, quo natura morbum superaverit * absolutissime. Qui autē sunt morituri, tunc peribunt sanē, cum facultas adeo vincetur à morbo, ut functio aliqua necessariarū ad vitā penitus extinguatur. At ratio tum salutis, tum morbi, indidem etiā præscietur. Porro functiones requisitæ ad vitam, ubi extinguuntur, hæc quidē suffocant, hæc vitalem facultatē prosternunt: aliæ simul & hanc prosternunt & suffocāt. Quæ igitur facultatem vitalem suffocant, à thoracis, pulmonis, asperæ arteriæ, gutturis, fauciumq; procedunt * dispositionibus, nonnullæ etiam in ipso corde consistunt. Quæ facultatē prosternunt, ab stomachicis dispositionibus (quas sequitur syncope) hepaticisq; diuturnis, ob quas * ciborū usu nō pmovetur, præterea ex longis doloribus, vel vehementibus, ad hæc ex omnibus hæcticis febribus, ac breviter cordis ingenti intemperie ortæ, dejiciunt illam. Similiter animalis facultatis imbecillitates quidē comitantur maximas intemperantias cerebri: quæ verò veluti suffocationes sunt, tum repletiones ventriculorū illius, obstructionsq; meatuū illuc ducentium. Proinde cui status facultatis ad unguē perspectus sit, locusq; affectus, ac illius dispositio, hic ad futura prænosceda peritissimus erit. Cognoscitur autē ipsa facultas & ex actionibus, & ex intemperie agentium. At verò ubi omnes pulsus per se languidi sunt, facultas vitalis est imbecilla: id quod accidet per universum corpus, si ipsum cordis corpus intemperatū fuerit: in una parte, si sola illa pars. Ubi verò earundē arteriarum nunc languidus pulsus sit, nunc vehemens, facultas non est per se quidē imbecilla, sed abundantia humorum degravatur: quæ inæqualitas ob eandē occasionem fit & in cæteris differentiis pulsum. Cæterū si pulsus vehementes & magni, numero contrarios vincāt, minus facultas à copia ipsa offenditur: si parvi & languidi, magis. Præterea inæquales in uno ictu, si fines motuum validiores & celeriores efficiāt, nuntiāt facultatē robustiorem cæteris, qui languidiores & tardiores effecerint. Si verò in tali cōstitutione altus pulsus videatur, statim is magnus erit, ostendetq; naturam plenitudine superiorem. At languidus pulsus nunq̃ altus existet. Verum magis & minus vehemens, quò altior simul & vehementior evaserit, robur facultatis, motumq; minimè impeditum declarat. Omnes igitur hujuscemodi pulsus iudicium morbi cum excretionē futurum indicāt. Quare contractionis motus est spectandus: ea siquidē semper abjicit priorem illam celeritatem, idq; nunc magis, nunc minus. Melior autē judicatio expectari solet, contractionis celeritate plus exoluta. Quòd si etiā signa cōcoctionis accesserint, optimam judicationem hīc status pmittit. At pulsus magnus & vehemens, si non præcedat eum inæqualitas, non semper excretionem portendit. Altus autem semper quidem, sed si inæqualitas nō præcesserit, modicas excretiones præcunciat: copiosas, cum multas sequatur inæqualitates, quæ declarent facultatem copia onerari. Non est autem eadem facultas vitalis & nutritiva, natura-

lisve. Illius siquidem hoc unū opus est, generatio pulsus. Naturalis, id q; familiare est ad nutritionem, allicere, & q; est alienū, excernere: præterea retinere, alterareq; familiare alimentū. Hæc quippe ad nutrienda corpora desiderantur, sicuti ad nativi caloris mediocritatem tuendam, distentio & contractio cordis & arteriarū. Quam facultatem neq; in stirpib. invenias, neq; in animalibus frigidis: cujus generis sunt ostrea, & quæ petris, vel aliis solidis corporibus adnascuntur. Animalia calida, maximè sanguine prædita, apertissimā hanc facultatē, & vehementissimā obtinēt. Hæc in contractionibus pulsum tantum ejicit excrementum fuliginosum, q; obesse potest caloris mediocritati: in distentionibus item, q; se refrigeret, allicit. Altera facultas nutritiva, conveniēs attrahit alimentū, excernitq; incommodum. Distincta igitur facultatum principia sunt, ipsæ tū mutuo in singulis instrumentis inter se confunduntur. Nam arteriæ, quatenus nutriuntur, facultate nutritoria gubernantur: cujus excernere alimentum excrementa est munus: quemadmodum alterius vitalis, fuliginosa excrementa expellere. Quæ cum abundant, maximā simul & celerrimā contractionem ipsæ arteriæ moliunt. Ubi verò nulla hæc excrementa fuerint, humores autem, qui putrescebant antè, si assecuti coctionem, ab altera naturali vi concoctorū excrementa expelluntur. Quæ facultas sanē nō per solas arterias & venas dispergitur, sed per omnia animantis membra, perq; carnem, nervos, ligamenta & ossa, disseminatur. Hæc igitur est illa facultas, quæ iudicationes efficit: cujus quatenus arteriæ participes sunt, nutrimenti excrementū expellunt. Altera facultate pulsatrice, quam solæ ipsæ obtinent, in cōtractionibus recrementū fuliginosum expellunt: distentionibus autem refrigerium alliciūt. At usus nō perpetuò par utriusq; est actionis, sed præpollentis usus excellit nonnunq̃. Itaq; ex se etiam pulsum figurat, si quidem ei facultas respondeat. At verò si humidum excrementum præpollent, cōtrahitur plurimum: distenditur autē nō plurimum cor cum arteriis, sed hæcenus duntaxat, ut satis refrigerari ab extrema contractione suppetat iis. Sin autem paucus fuerit fumosus calor, copiosissimus autē mundus & purus & quasi flammeus, in plurimum distenduntur: at contrahuntur eatenus, quatenus satisfiat alteri usui. Quare semper æqua magnitudine distentio fit & contractio, nisi casu nobis admoventibus digitis, fiat repentina mutatio. Unde altus pulsus excretionem significat, concoctis qui inducebant febrē humoribus superveniens. Semper enim omnis excretio, naturæ lege pfecta, sequitur cōcoctionem: quippe secundum ventrē conspicitur naturā excrementū à cōcoctione excernere. Cæteras excretiones quæ ibi cōcoctionem præcedunt, nunc q; vellicetur ab illis quæ cōtinet, nunc q; degravetur, antè tempus cōcoctionis moliri cogitur. Haud aliter totius corporis facultas, posteaquam satis familiarem succum singularum partium concoxerit, tum demum excrementū excernit, nisi quid eam irritet importunè. Copia excrementorum, tum ex plethoricis signis quæ præcesserunt, tum ex præsentis caloris inflammatione

Functionum
requisitarū
ad vitam,
tres differen-
tia.

Prænoscedis
futuri qui
sit peritissi-
mus medi-
cus.

Facultas un-
de noscatur.
Pulsū lan-
guor quando
per universū
corpus, &
quando in
unica parte
accidet.

Crisim mor-
bi cum excre-
tione, qui pul-
sus indicent.

Faculta-
tis quæ
negata
quibus
mentis
data si
malis
Contra-
ne arter-
excer-
ginem.
Dilata-
arteria
attrahi-
tum.
Faculta-
principi-
stincta
ipsas au-
misceri
gulis in-
mentis.

Expulsi-
faculta-
esse, qua
se facit.

Altus pul-
sus quan-
excretion-
significet.
Excretio
naturalis se-
per sequi
cōcoctionem.

Excremen-
tum copia
unde depre-
hendatur.

excre-
tiones
ma qua.

tione prænoscitur, ob quæ ipsū calorē pulsus ma-
gni videntur & alti. Quare pessimæ omniū sunt
excretiones, in quib. pulsus est minimè magnus:
ac celer in contractione. Porro autē si etiā se plus
intrò recipiat, fumidi excrementi affluentis in pri-
mis est nuncius, simulq; morbi crudi. Si præterea
sit pulsus languidus, syncopæ periculum immi-
net. Si verò pituitosior sit morbus, cum ab inæ-
qualibus pulsibus mutatio fiat in plures vehe-
mentes & magnos, judicatio fiet per abscessum. 10

GALENI PERGAMENI
de diebus decretorijs, Lib. I.

tionis
borum
qua a-
debeant.

idiva
bi quan-
timenda.



Uò solutiones morborum qui non
paulatim, sed subito finierūt, certas
esse cognoscamus, aliqua excretio
copiosa, vel insignis abscessus * desi-
deratur. Nam qui morbi citra hæc fi-
niuntur, in iis recidiva timenda est. Quare tunc
agrū modis omnibus observare oportet, ne quæ 20
omnino sanis vel in cibo, vel in potu, vel balneis,
vel motu, vel deniq; in aliis quibuslibet concedi-
mus, agere ipsum permittamus. Si nanq; cōquie-
scens morbus exiguus fuerit, forsan ob tam exa-
ctam victus rationem prorsus subsederit, ut po-
stea nunq; revertatur. At si malignior existat, etiā
tunc, cum hoc vivēdi modo usus fueris, redibit,
sed tamen non cum summo discrimine. Si verò
tanq; planè solutū neglexeris, evadet multò gra-
vior quàm antè. Firmā itaq; solutionē vehemen- 30
tis morbi, oportet solutoria signa præcedāt. Præ-
cedunt autem ipsas creticas excretiones absces-
susq; gravia quædam symptomata, ac nō medio
cris in ægri corpore perturbatio: adeò ut nihil il-
le ab iis distare videatur, qui in foro de capite ju-
dicātur. Quam sanè turbationē subitam, nos ap-
pellamus crīsim: eamq; finire interdum quidem
ad salutē, interdum autē ad exitium, affirmamus.
At verò ipsæ crīses singulis diebus accidunt, sed
neq; pares numero, neq; ex æquali fide. Hoc in- 40
tercedit etiā discriminis inter illas, quòd aliæ sa-
lubres, aliæ perniciosæ accedant. Quædam enim
cum pluribus & difficilioribus symptomatibus,
& majori certamine, nōnullæ statim ab initio tu-
tissimè eveniunt. Quinetiā in hoc plurimū diffe-
runt, quòd hæc deficienter, illæ perfectæ sunt: nec
minus, quòd aliæ certis statisq; diebus judicatæ
prius, fiūt: aliæ repentē, & ex improvīso eveniāt.
Tot autē judiciorū, quot dierum decretoriorū,
differentiæ existunt. Cæterū in duodecimo & de 50
cimo sexto, nullum unq; judicatum vidi. In septi-
mo, ne vel numerare omnes adhuc possum. In
sexto judicātur, sed cum difficilibus symptoma-
tis, & periculo nō mediocri: ad hæc, absq; fide,
imperfectè, obscurè, sine notis, & ad perniciem.
Etenim multi morbi judicātur septimo die abso-
lutè pariter & securè, aperteq; & cum signis salu-
bribus: duodecimo autē rari adeò, ut nobis non-
dum sint visi. Porro imperfectā judicationē vo-
camus, ubi ex morbo quippiam relinquitur: infi- 60
dam sive incertā, quam morbi sequitur recidiva:
periculosam, quæ cum gravibus symptomatibus
accidit: obscuram, quæ citra excretionē, vel evi-
dentem abscessum evenit. Sine signis evenire di-
citur, quæ à nullo priore die indicata est: mala,

uticas ex-
tiones gra-
præcedūt
symptomata,
q; maxi-
perturba-
tis quid.
ses accide-
singulis
bus.

diciorum
differen-
quot die-
m decreto-
rum exten-
unt.

primū
esse opti-
mū decre-
torium.
xum die
decreto-
m pessi-
mū.

dicatio-
m diffe-
ntia varia.

quòd in ægri perniciem omnino desinat. Rur-
sus absolutam eam dico, quæ ex morbo nihil fa-
cit reliqui: fidam, firmā, securā, certam, quæ re-
dit nunq; tutam, quæ sine periculosis symptoma-
tis accidit: manifesta, cui excretio quædam, aut
abscessus insignis atq; cōspicius adest: cum bo-
nis accidit signis, quæ ab * indice die præmonstra-
ta jam fuerit: bona deniq; est illa, quæ in sanitatē
desinit. Cæterū nō sat est, rarò vidisse diem ali-
quem judicantē morbos, ut is decretorius dica-
tur, sed oportet in illo crebrò judicia fieri: præte-
rea ut crīsis sit bona, perfectā, securā, manifesta,
tuta, necnō præmonstrata. Quis igitur vel septi-
mum, vel undecimū, vel decimum quartū, vel a-
lios quosdam eis similes, nō dixerit decretorios?
nemo, opinor, cum omnes notæ judicationū in
illis adsint. Est enim decretoriorū dierū natura
quædam propria & eximia. Quare cognitio ipso-
rum, ad curationes morborū nō leve momentū
adfert: ne videlicet iis timeamus, qui fidis die-
bus sunt judicati: aut tenuem victum eis injun-
gamus: neve perfidis judicatos diebus, parū ac-
curatè observemus. Primū igitur omniū dierum
decretoriorū septimū dicimus, idq; nō numero,
aut ordine, sed dignitate & potentia: omnes
quippe decretoriorū notas sortitur. Nam pluri-
mos judicat, & absolute: item cū manifesta ex-
cretionē, vel abscessu, & sine periculo vehemen-
ti: estq; ut plurimū quartus index illius. Nam si
urinæ, vel sputi, vel dejectionis, vel appetentiæ,
vel cogitationis, vel sensus mutatio manifesta in
quarto die cōtigerit, rationi consonum est, ut si-
milis judicatio cōsequatur illam in septimo: bo-
na videlicet, si ad salutem: mala, si ad mortē mu-
tatio illa aspiraverit. Plerunq; itaq; bona judicia
eveniunt in septimo: quanq; nōnulli etiam in eo
morianur, alii evidenti conversione ad priora
vergentes, in sequenti quodam decretorio inter-
eant. Sextum verò diem, quantò pauciores in eo
judicantur, quàm in septimo, tantò eum mali-
gniores inveniō, ut qui ferè ex adverso natura
septimo oppositus sit. Quinetiam qui in quarto
ad peiorē statū recidunt, pleriq; sexto moriūtur.
E cōtrario rursus si bona conversio cōtingat, se-
ptimū expectabit. Quòd si rarò interim ad me-
liora conversionē in quarto die factā excipiens
sextus, eam judicaverit, dici nō potest quanta cū
perturbatione, periculo, & metu id fiat, quasi æ-
ger statim adeò fato sit functurus. Nam si quæ
excretio accidat, omnino consternantur, pulsus
ipsoꝝ concidunt, color abit, tremūt & collabun-
tur. At septimus dies, pro excretionis portione
reficit semper ipsos magis ac recreat. Præterea
sexto die maligna, acria, fœtidaq; * majori ex par-
te tum dejiciūt, tum vomūt: rarò autem sudores
æquales, toto manantes corpore, calidiq; visun-
tur: quales si quando oboriātur, * intercipiūtur.
Interdū parotides malignæ, vel arcuat⁹ morbus,
vel alius quidam abscessus, alterū certamē, quo
discutiatur requirens, emergit. Sed neq; in urinis
boni quicq; inveneris. Etenim crudæ, decolores,
tenues, boni nihil, quod subsfideat, habentes, sed
copia tantū conducēs, in die sexto visuntur. Atq;
hæc moderatissima levissimaque sunt, quæ illo
die incolumi futuro contingunt. Nam plurimos

Decretoriū
dies qui exi-
stant.

Decretoriorū
dierum co-
gnitio ad cu-
rationes mor-
borum non
leve momen-
tum adfert.
Septimus
dies est inter
decretorios
præcipuus.

Septimi
quartus est
index.

Sextus dies
quanto ma-
lignior sit se-
ptimo.

Sexto die
qualia excre-
nantur.

*Septimus
dies assimila-
tur regi.
Sextus dies
tyranno si-
milis.*

*Quartus
dies ut septi-
mi, sic sexti
etiam est in-
dex.*

*Septimum
qui dies imi-
tentur.
Sextum die
qui referant.*

*Dies qui subi-
to morbos non
solvunt.*

*Principium
morbis in ve-
nire, laborio-
sum existit.
Initium mor-
bi quod sit.*

*Undecimus
quartideci-
mi est index.
Quartus se-
ptimi est in-
dex.*

*Accessionis
proportio
quomodo ex-
ploranda sit.
Iudicia ma-
iori ex parte
in accessioni-
bus fiunt.*

alios syncope statim corripuit, vel sanguinis lar-
ga effusione, aut evacuatione immodica exani-
mavit, vel in catochem aut insaniam perduxit: aliis
denique perniciem insanabilem conciliavit. Mihi sane
frequentem in mentem venit septimi diei naturam
regi cuiuspiam assimilare, sexti vero tyranno. Ille
siquidem longe clementior, seu benignus aliquis
princeps, iis quos iudicat, vel supplicii partem adi-
mit, vel illustrat victoriam: hic est contrarius, vel per-
niciem illius, quem iudicandum suscipit, gaudet, vel
salute dolet, queritque ubi animum expleat, & male
aegrum, qui in ipsum incidit, tractet, & longa pu-
nitione exerceat. Est itaque sextus dies decreto-
rius quidem, sed malus: quemadmodum septimus,
bonus. Ceterum sexti diei ut septimi quartus etiam
est index. At vero naturam septimi, maxime imita-
tur decimusquartus. Proximi his sunt nonus, un-
decimus & vigesimus: prope hos vero * septi-
musdecimus & quintus: post hos quartus: hunc
sequuntur tertius & decimus octavus. Sexti autem
naturam nullus exacte aliorum dierum imitatur. Si ali-
quando in octavum diem, vel decimum, subita mor-
bi solutio incidat, similis ferè ei est, quæ sexto ac-
cidat. Verum raro in his solvitur, nec cum fide, nec
bene, nec perfecte, sed obscure simul & citra no-
tas: quare alterius esse naturæ cum supradictis
apparere. Quemadmodum autem in his subito mor-
bus non solvitur, ita neque in duodecimo, sextode-
cimo & nonodecimo. Medius autem inter eos qui
subito morbum non solvunt, & eos qui subitam ju-
dicationem faciunt, videtur mihi esse decimuster-
tius. Atque huiusmodi quedam dierum dierum, ad
vigessimum usque, differentia est. Ceterum cum exactum
morbis principium statuere semper sit laboriosum:
morbis iis, in quibus obscura principia sunt, om-
missis, decretorios dies in manifestissimis expe-
riamur: initium morbi tempus illud in universum
existimantes, cum ægri manifestè incipientes fe-
brile decubuerint: id quod cœnatis, & exercitatis,
& lotis, facillimè subitoque plerisque contingit. In quæ
sanè modum Hippocrates iudicationes ipsas, a
primo die quo febricitavit homo, non ab illo quo
doluit capite, vel eiusmodi aliud quippiam est pas-
sus, accuratè exploravit: quod in principis huiusmo-
di experientia dierum decretoriorum sit medicis si-
ta. Porro quemadmodum undecimus quartidecimi
est index, ita septimi quartus. Si igitur vel quarto
vel undecimo facto indice, crisis quolibet modo
attigerit vel septimum, vel decimumquartum, illorum
ipsam crisin esse, arbitrari est opus. At si iudicium
extra illos dies cadat, ut neque in illis incipiat neque
completeatur, constat non adhuc esse dicendum,
morbum in septimo aut decimoquarto iudica-
tum fuisse: verum in alio quopiam die, qui totam
crisin in se comprehendat. Quod si nullo indice
prius habito, crisis contingat subito, duos attingens
dies, utriusnam sit distinguere, proportionem
accessionum, natura dierum, numero decretoriorum
temporum, ac tempore iudicii exploratis. Sic autem
exploratur accessionum proportio. Nam si æger die-
bus imparibus laboraverit magis, diei imparis
erit magis proprium iudicium: quemadmodum paris,
si paribus: quandoquidem in accessionibus iudicia
majori ex parte contingunt. Dierum autem natura ob-
servatur hoc pacto: Si ambigas utrum noni diei,

vel decimi sit iudicium, si quidem salubre, perfectum,
atque sine periculo sit, non est magis: si imperfec-
tum, malum atque periculosum, decimi. Quod ve-
rò ad numerum decretoriorum temporum pertinet
(sunt enim tria: nempe decretoria accessionis ini-
tium, decretoria motionis principium, ac denique
ipse iudicii finis) qui dies sibi tempora duo ven-
dicaverit, magis sibi iudicia assumit. Sic & ipsum
tempus iudicii, utra die longius fuerit, illi magis
iudicium attribui debet. Si itaque quatuor hæ notæ
uno die introducatur, huic tu quoque iudicium attri-
bues. At si una ex his reliquatur, ei ascribes simi-
liter, sic tamè ut jam alterum etiam diem existimes
ipsius crisis esse participem. Si verò æquales sint
notæ, iudicium utrique diei putabis esse commune. In-
terim non duos modò, sed tres etiam dies iudicium
attingit. Ac tunc sanè, quantum ad temporis longi-
tudinem attinet, medius est præferendus: non tamè
universum ei iudicium tribuendum. At verò si præ-
ceps ac subita in ægrotantis corpore perturba-
tio, morbi solutionem præcedens, crisis sit appellan-
da, utique nec primum, nec secundum diem, decreto-
rios esse censebimus. Sin autem solutio simpliciter
appellanda est crisis, hi quoque erunt decretorii.
Quare omnes febres diariæ solutionem partim pri-
mo statim die, partim secundo nanciscuntur. Ad
hanc perturbatio illa, quæ fit ante exactam solutio-
nem morbi, absoluto sermone dici crisis meretur:
aliarum autem nulla absolute: verum quæ ad perniciem
tendit, mala crisis: quæ autem insignem quidem mo-
mentum attulit, morbum verò exactè non solvit, defi-
ciens crisis dicatur. Alia quæ insigniter ad pejo-
ra declinat, imperfecta simul & mala. In univer-
sum autem, quæ omnium crisionum notas sortitur, cri-
sis absolute vocatur: alia autem, cum appositione
nominis appellabitur. Quod pertinet ad decreto-
rios dies post vigesimum, equidem vigesimo vige-
simum primum postpono, licet eum illi præposuerit
Archigenes. Similiter vigesimum septimum vigesi-
mo octavo antepono. Habet præterea & trigesi-
musquartus vim neutriusque negligendam: atque hoc
maior quadragesimus. His minus decernunt vi-
gesimusquartus & vigesimus primus, & multò
adhuc minus trigessimus septimus: ita ut in dierum
decernentium, & eorum qui non decernunt, medio
collocatus esse videatur, magisque ex non decernen-
tibus esse. Reliqua multitudo dierum inter vigesi-
mum & quadragesimum, prorsus facultatis decer-
nendi est expertis. Si sunt duodecim numero: nem-
pe vigesimus secundus, vigesimus tertius, vigesi-
mus quintus, vigesimus sextus, vigesimus nonus,
trigesimus, trigessimus secundus, trigessimus tertius,
trigesimus quintus, trigessimus sextus, trigessimus
octavus, ac trigessimus nonus. Atque usque ad quar-
tumdecimum quidem, magnæ sunt probationes
in morbis: proximo loco succedunt, quæ usque ad
vigesimalium habentur: quæ post hunc ad quadragesi-
mum pergunt, paulatim vehementiam remittunt. Dies
autem omnes post quadragesimum, prorsus languet,
coctione potius morbos & abscessibus, quam cri-
sibus, terminantes. Accidunt in his quoque per ex-
cretionem iudicia interdum, sed raro, nec magnam
habentia efficaciam. Et frequenter iudicia ipsa plu-
ribus diebus complentur, maxime cum in abscessum
desierint. At ceteros quidem post quadragesimum
dies

*Decretoria
tempora*

*Iudicia
in accipien-
sunt, quæ
diebus su-
tribuend.*

Crisis qui

*Dies prin-
cipis, secun-
dæ, appella-
tici quom-
possint.
Ephemera
quando so-
santur.*

*Dierum om-
nes post vige-
simum.
Dies facul-
tatis decern-
di omnino
pertinet qui-
sunt.*

*Dies omne-
post quadra-
gesimum co-
ctione po-
tius morbo-
& abscessi-
bus, terminan-
tibus.*

dies continere videtur Hippocrates: sexagesimi tamen, octogesimi, centesimi; rationem habet. Ab aliis alios quidem septem mensibus, alios septem annis finiri ait, alios vero in binis annorum hebdomadis, vel in ternis. Ubi igitur morbus acutus nullum signum periculosum portendat, & quarto die evidens quaedam concoctionis nota apparuerit, septimo crisis futura est. Quare signa periculosa salutariaque in primis sunt cognoscenda, una cum concoctionis indicia, ut hac praesagire valeamus. Porro si periculosa symptomata quarto die adsint, una, cum nota concoctionis iudicium, si paribus diebus accessio fiat, sexto expectandum est: quod si hunc excesserit, octavo: si imparibus diebus, septimo. Bonis signis apparentibus, septimo die discutietur morbus: at letalia signa cum concoctionis notis coibunt nunquam. Haec autem non minus quam periculosa & salutaria inspicienda sunt: quia si quarto apparuerint, septimo aderit mors: quae crisis est mala. Ceterum animi advertere necesse est letalium signorum magnitudini & copiae, si namque multa & magna die quarto evenerint, accessionibus distinguendum erit de morte futura, cognoscendumque hominem sexto die moriturum, si diebus paribus ipsa accessio sit facta: quae admodum si imparibus, septimo. Interdum sextus hominem jugulat, vel si accessio contigerit in imparibus, idque propter morbi celeritatem, magnitudinem, & symptomatum in quarto die eventuum copiam. Est itaque quartus dies suapte natura index septimi: hoc est, si nihil extrinsecus accidat, quod inclinationem illius intercipiat. Etenim ubi malum aliquod extrinsecus praeter spem evenerit, morbusque peracutus fuerit, & vires aegri imbecillae, signum malum, quod quarto die se ostendit, septimum diem non expectat: verum sexto morietur aeger, praesertim si paribus diebus accessiones invaserint. Quod si nihil extrinsecus sit erratum, & morbi motus haud ita praecipuus & velox, egerque validus sit, si quidem manifestum in quarto die malum indicium fuerit, septimo interibit die: si vero obscurum, excedet hunc quoque. Jam vero si accessiones paribus diebus contigerint, octavo: si imparibus, nono aeger decedet. At si quarto die bonum indicium videatur, in nullo autem aeger versetur discrimine, fieri non potest, quin septimo die iudicetur morbus, si nihil extrinsecus sit peccatum. Committuntur autem quaedam peccata interdum quidem ab aegro, interdum ab ipso medico: est cum assistentium culpa, & ob ea quae extrinsecus accidunt, similiter delinquatur circa aegrum, unde virtus diei obscuratur: id quod perpendens Hippocrates ait: Natura quidem sufficit, peccatur tamen in hanc extrinsecus causa plasmate, unctione, totiusque & partis fomentis. Praeterea rursus in ipso statim aphorismorum initio, id exactius confirmans, ait: Oportet autem non solum ipsum, medicum scilicet, quae res postulat facere, sed & aegrum, & assistentes, & exteriora. Quo in loco exteriora intelligit omnia illa, quae extrinsecus accidunt, aut obesse, aut prodesse aegrotanti. Haec igitur quatuor genera, quae plures habent differentias particulares, si naturae motus praepediant, ordinem circuituum subvertunt. * At ubi quartus dies evidens iudicii signum attulerit, si nec medicus quid peccaverit,

nec aeger, nec ministrorum quisquam, ad haec etiam nec extrinsecus error admissus sit necessario morbus die septimo iudicabitur. Cum autem omnis circa victus rationem error, iudicium ipsum impediatur, nec victus ratio proba sine praecognitione vigoris & crisis morbi unquam institui possit, utique non alius quisquam medicus recte curaverit, alius praesagiet exacte: sed quicumque praestantissimus fuerit, is simul persagieturque & medebitur. Porro si levis error quarto die una cum bonis indicia contigerit, eveniet sane etiam die septimo crisis, non tamen exacte inculpabilis: si magnus, ut a septimo insequentium aliquem differatur, magnitudo ipsius noxae indicabit, an nono vel undecimo die, morbus sit iudicandus. Itaque morbi qui omnino sine periculo sunt, diuturni esse ob delicta solent: qui incolumitatem promittunt, non tamen vacant periculosis symptomatis, ob errata letales fiunt. Immo vero qui minimè existunt periculosi, multis magnisque deinceps commissis erroribus, in letalium naturam degenerant: id quod mirum esse non debet. Nam si in recte valentibus delicta gravia, morborum letalium fiunt causae, quid in aegrotis est expectandum? At vero si in letali morbo dies quartus signum letale habuerit, septimo die mala expectanda est crisis. Ceterum si peccatum aliquod non ita exiguum interea temporis accidat, septimum diem crisis non expectabit: sed si accessiones quidem ipsae fiant diebus imparibus, morbus autem sit peracutus, & peccata non admodum levia in ipso quarto contigerint, miraculum non est in quinto hominem interire. Sin autem accessiones fiant paribus diebus, nec morbus sit peracutus, nec magna laesio erratorum, sextum diem expectabit. Ubi vero diem mortis cognoveris, considerandum est inde, in qua potissimum cuiusque accessionis parte aeger gravetur maximè, gravioraque adsint symptomata. Quippe non ignorandum est, in pessimo accessionis tempore hominem moriturum. Ac proinde non magni negotij fuerit, uti diem, sic etiam crisis horam praedicere. * Si igitur secundus dies (exempli gratia) & quartus, longè vehementiorem accessionem, quam primus, tertius & quintus, afferant, ad sextum diem mors praedicenda est. Quod si etiam cuiusque accessionis pars (gratia exempli) sit circa sextam horam gravissima, non fuerit difficile praesagire, in die iudicationis, illa eadem hora hominem moriturum. Nam tametsi speculatione hac interdum falli possimus, majori tamen ex parte hoc verum esse deprehendemus. Ceterum in omni principio non licet futura cognoscere, nisi quis morbi speciem adamussim perspectam habet. Porro si quis primo die acuta febre infestetur, nullum autem ei adsit signum periculosum, sed in urinis aliqua concoctionis nota apparuerit, intra quartum diem solvetur morbus. Si vero multa letalia signa primo statim die deprehendantur, aeger intra quartum morietur. At si acutè febricitet: nullum vero adsit signum letale, sed nec aliqua concoctionis nota, fieri non potest, ut hic quartanus decedat. Quod si nec concoctionis, nec longitudinis morbi indicia adsuerint in secundo quaternione morbus statim accipiet.

Victus ratio proba sine praecognitione vigoris & crisis morbi, nunquam institui potest.

Morbi faciles ob delicta producuntur, atque interdum letales fiunt.

Moriuntur homines in pessimo totius accessionis tempore. Horam crisis posse etiam dinosci.

*Nutriendi
modus unde
colligi possit.
Cibum ube-
riorem eò dā-
dum quò lon-
gius abfue-
rit status, &
morbus cle-
mentior fue-
rit.
Decimus se-
ptimus est in-
dex vigesimi
& vigesimi-
primi, magis
tamen vige-
simi.*

Si longitudinis indicia adsint, secundum quater-
nionem excedet, hoc est, diē septimū: ex qua qui-
dem præcognitione, qualis debeat esse nutrien-
di modus, perdisces. Siquidem quò longius ab-
fuerit status morbi, ac morbus ipse clementior
fuerit, eò nutries uberius, At morbi qui ad deci-
mum quartum omnino sunt crudi, tardiusq; mo-
ventur quodammodo, nō finiuntur ante quadra-
gesimū diem. Quare signorum vires maximè co-
gnoscere oportet. Ut igitur quartus septimi, sic
undecimus decimi quarti est index. At vigesimi
et vigesimi primi, index est decimus septimus: ma-
gis tamē vigesimi, ut decimus octavus * solius vi-
gesimi primi. Cōsiderare aut in universum opor-
tet, totius morbi motū, omniaq; indicia & sym-
ptomata, ut ritè crisim præfagire valeamus.

GALENI PERGAMENI

de diebus decretoriis, lib. II.

*Natura in
singulis pro-
videntia.*

Quanta sit providentia naturæ, quātus or-
do & ornatus in motionibus suis anima-
liū generationes, ortus, & incrementa in-
dicant. Siquidem cujusq; animantis conceptui,
suū tempus est statutū, natura scilicet ordinatos
semper motus servante. Post partū etiā animan-
tia singula crescunt, perficiuntur atq; fatiscūt,
idq; præfinitis temporibus. Cæterū si recorderis
quantoperè providentia & ordine superetur ca-
duca hæc atq; inferior natura, ab ætherea illa &
cœlesti, utiq; hujus nostræ substantiæ motui non
ordinē, sed illius perturbationē tribueris: necnō
quicquid in ea pulchrum ordinatumq; est & arti-
ficiosum, omne id à superna illa natura omnino
emanare putabis: sicuti inordinatū omne & er-
raticum, à nostra proficisci materia. Est autē na-
tura in nobis quædam res ordinata. Quæ quidē
ubi superavit materiā proportionibus quibusdā
certis, ordinatisq; periodis, suas motiones perfi-
cit. At quæ aliquando præter rationē eveniunt,
ordinemq; cōfundunt, tunc ipsi obveniunt, cum
nō planē materiā vicerit, sed impeditur ab ea,
prohibeturq; moveri proportionib. suis. Si igitur
cœlestes substantiæ, necnō quæ terrenis ani-
mantibus insunt, certa quadā proportionē ma-
nifestè movetur, nemini sanè debet videri mirū,
si decretorij dies numerū ordinatum sortiantur.
Constat aut unāquāq; septimanā esse perfectā
periodum. Quippe medium ipsius ab utroq; ex-
tremo æqualiter distat, ob idq; ad ambo similem
cōmunionem sortitur. Etenim quartus dies mor-
bos qui primo die non cessarunt, solvit: undeci-
mus rursus, quos septimus nō discussit. Quòd
si morbus major sit, q̄ ut judicari quarto die pos-
sit, solutio quidem ipsius in eodem * præparabi-
tur, finis autem septimo die adjicietur. Pari mo-
do qui septimo nō desierunt, eos natura solvere
undecimo die molitur: quare aut in ipso eos ju-
dicat, aut decimo quarto disponit. Verū septima-
næ præcipuas sibi vendicant vires, dein quater-
niones. Nec negligere tamen oportet dies inter-
calares, tertium puta, quintum, sextum & nonū.
Porrò si in vigesimū diem tres septimanæ finiun-
tur (ut Hippocrates arbitratur) oportet haud du-
biè decimus septimū diem esse vigesimi indicē:
excidere autem primo dierum decretoriorum

*Naturam
hanc inferio-
rem à cœlesti
magis opere
superari, ab
eāq; quic-
quid habet
boni, recipere*

*Natura
quid.*

*Septimanā
esse perfectā
periodum.*

*Septimum
diem absol-
vere quod
quartus non
potuit.
Intercalares
dies.*

*Vigesimum
diem esse fi-
nem trium se-
ptimanarū.
Decimum se-
ptimū diem
esse vigesimi
indicem.*

ordine, decimus octavū & vigesimū primū. At
si integræ hebdomades connumerandæ sint, de-
cimus octavus vigesimi primi erit index: rationē
verò nullam decretoriam habebunt, decimus se-
ptimus, & vigesimus dies. Cum autem nō solum
judicari morbos decimo septimo die, sed firmi-
ter judicari & absq; recidivæ timore, profiteatur
Hippocrates, sanè inter validos & primos decre-
torios debet annumerari. Quare si cōstituiamus
decimus quartū diem ut finem secundæ, sic ini-
tium tertiæ septimanæ existere (quod Hippocra-
tis doctrinæ est consentiens) utiq; decimus sepi-
mus primi quaternionis in tertia septimana erit
finis, atq; index vigesimi, tertiam hebdomadam
terminandis. Quippe vigesimo die plures abso-
lutè fuisse factas morborū judicationes, experiē-
tia didicit etiam Hippocrates: id quod naturam
decimi septimi satis abundè cōprobat. Quinetiā
in permultis aliis diebus, qui ex ordine decimi-
septimi sunt post vigesimum, fuisse morbos inte-
grè ac feliciter judicatos meminit: ut in vige-
simo quarto, vigesimo septimo, trigesimo quarto,
quadagesimo, & octogesimo: in nullo autē eo-
rum, qui à decimo octavo procedunt, facta sup-
putatione per septimanas integras, tale quid cō-
tigisse prodidit: excepto vigesimo primo, in quo
aliquando morbi facta fuit crisis. Constat itaq;
decimi septimi ordinem altero longè fortio-
rem existere: ipsumq; decimus septimū decimo octa-
vo, & vigesimū vigesimo primo, quod pertinet
ad judicandi vim, multis numeris antecellere.
Porrò quantò ulterius morbi processerint, diu-
turnioresq; evaserint, perturbatio quæ præcipi-
tem immutationem præcedit, tantò magis con-
quiescit, judiciorq; ipsa tunc paulatim venientia,
duos aut tres dies in totum occupant. Unde me-
dicorum nonnulli diuturnos morbos minimè ju-
dicari pronunciant. Quāq; certè nihil aliud esse
judiciū, q̄ solutionē morbi, vel testimonio Dio-
clis, liquet. Non tamen putandum est, diuturnio-
res morbos necessariò absq; ulla conspicua judi-
cari excretionē: aut eorum crisim plures semper
dies occupare. Aliquando siquidē morbi diutur-
ni fuerūt judicati die unico, idq; per excretionē.
Differūt autē hujuscemodi omnes inter se dies,
tum natura, tum usu. Natura sanè, quia omnib.
pulchrè evenientibus ad quaternionis circuitus
judicia omnino perveniūt: erratis autē quibus-
dam in coincidentes recidunt. Usu verò, nam ad
futuræ crisis cognitionē quaternionis circuitus
sufficit. Cæterum ad jam factā crisim judicandā,
omnibus semper opus est cognitis. Est autē lōgè
tutior crisis quæ nono die accidit, quàm quæ o-
ctavo. Porro certitudo judicij, ad bonā victus ra-
tionem judicatis morbo præscribendam condu-
cit. Prænoscere autē quando crisis adveniet, ad
nondum judicatos est necessarium. Dierum igitur
differentias haud ignorās Hippocrates, me-
ritò eorū tantū in prognosticis atq; aphorismis
meminit, qui secundum quaterniones inter se cō-
plicantur. Ait quippe in prognostico: Febres, si-
ve sanus ab iis quis evadat, sive pereat, æquali
dierum numero finiuntur. Verū ut saluberrimæ
febres quæ videlicet tutissimis fulciuntur notis,
die quarto vel antea quiescere solent: ita pesti-
ma

*Decim-
quar-
tis
finis
sic in-
tertia
mana
Vigesi-
plures
te fuit
et as
rum
tione*

*Decim-
mi or-
alter-
decim-
so fit
fortio-
sere*

*Crisis
aliud
quā
tione*

*Dier-
torion-
feren-
plex.*

*Judici-
facti
endi
tio, ad
confer-*

*Hippo-
de die-
cretor-
tentia*

ma quæq; & quibus periculosissima signa ad-
sunt, die quarto, vel citius interficiunt. Primus
itaq; earum insultus sic finitur. Secundus quater-
nio in septimū diem producit. Tertius in un-
decimū. Quartus in decimumquartū. Quintus
in decimūseptimū. Sextus in vigesimū. In apho-
rismis etiam sic ait: Septimorū quartus est index.
Alterius septimanæ octavus initiū. Contempla-
torius autē rursus undecimus. Hic enim est quar-
tus secundæ septimanæ. Cōtemplatorius iterū de-
cimūseptimus. Hic enim quartus est à decimo-
quarto, ut septimus ab undecimo. At in primo
Epidemiōn, omniū dierū mutationē fecit, sic di-
cens: Est autē primus decretorius circuituū, qui
paribus diebus decernunt, quartus, sextus, deci-
mus, decimusquartus, decimusoctavus, vigesi-
mus, vigesimusquartus, vigesimusoctavus, trige-
simus, trigessimusquartus, quadragesimus, sexa-
gesimus, octogesima, centesima, ceterisimū vi-
gesimus. Eorum qui imparibus circuitibus judi-
cant, primus est tertius, dein quintus, septimus,
nonus, undecimus, decimusseptimus, vigesimus
primus, vigesimusseptimus, trigessimus primus.
Decretorius itaq; fortissimus omniū est dies se-
ptimus: quē dies quartus prænunciat, hæc duo
habens, ut decretorius sit minor, & index se-
ptimi. Deinde undecimus & decimusquartus,
eandem naturā & proportionē invicē cōservan-
tes, quā cum septimo quartus. Post hos frequen-
ter quidē decimusseptimus ad vigesimū, raro au-
tem decimusoctavus, ad vigesimūprimū, eadem
rationē habet, quā cum septimo quartus, & un-
decimus cum decimoquarto. Hi igitur quaterna-
rio aucti, ad viginti perveniūt. Coincidūt eis no-
nus, quintus, & tertius. Ac plurimos quidem no-
nus judicat, secundam vim quintus obtinet, &
post hunc tertius. Sextus malus est decretorius.
Decimustertius omniū imbecillimus decretorio-
rum, ceterum omniū qui nō decernunt fortissi-
mus, in medio quodā virtutis utrorūq; est situs.
Vehementissimæ itaq; sunt crises, quæ ad decimū
quartū diē veniūt: minus his, quæ ad vigesimū
usq; pertingunt: inde ad quadragesimū produ-
ctæ, adhuc imbecilliores evadunt, sed in illo ab-
solutē exolvuntur. Proportio autē dierum decre-
toriorū ppetuō servatur. Ut enim decimusquar-
tus & secundæ septimanæ finis est, & tertiæ prin-
cipium, ita vigesimusquartus quintæ terminus
est simul, & sextæ initiū. Quare tres septimanæ
viginti diebus semper describuntur: ideoq; sexa-
gesimus, nō sexagesimustertius, decretorius exi-
stet. Pari modo octogesima, & centesima, &
centesima vigesima. Respondebit ergo trige-
simusquartus decimoquarto circuitus, cū ex
duabus septimanis disiunctis fiat: & quadragesi-
mus vigesimo, ut qui tertiam hebdomadam cō-
iunctā expleat. Dicuntur autē minores circuitus
illi, qui diebus quaternis fiunt. Secundas partes
obtinēt, qui diebus septem cōplentur. Hoc ac-
cedunt qui septimanis duabus constant, licet im-
perfecti quodammodo. Omnium perfectissimi
sunt, qui ex trinis septimanis conflantur. Morbi
tamen ipsi, partim quidem diebus, partim men-
sibus, partim annis sortiūtur suas judicationes.
Atq; in horū singulis, differentiæ quædam parti-

culares existunt. Proponatur igitur adolescēs va-
lido morbo correptus, qui in primo quaternio-
ne sit discutiendus, in eo certē est aphorismus il-
le imitandus: Ubi morbus est peracutus, statim
etiā extremi dolores adsunt, tenuissimoq; victu
est utendum. Quare nihil ei alimēti exhibueris:
imō etiā ab aqua, quantum potest, ipsum abstinere
jubeto. Si verō septimo die crīsim sit habiturus,
paululū hāc victus rationē immuta, vel mulsam
ei exhibens, vel aliā quampiā potionē morbi na-
turæ familiarē. Quod si æger facilē dissolvatur in
edia, eiusq; offendatur vētricus, ptisanā cremo-
rē exactē percolatū quotidie modicē ppinabis,
memor illius præcepti. Sed aliquid tum cōsuetu-
dinis gratia, tum ne vasorū magna fiat inanitio,
ingerere oportet. At si jam septimus dies instet,
nequaquā agrū nutrire cōvenit, sed pridie, vel an-
tea, minus est exhibendum. Rursus, si tertio vel
quarto die morbū finitū iri spes adsit, nec mali-
gnitatē stomachi, nec suspiceris inanitionē habi-
tus, ipseq; etiā æger validissimis virib. sit, facileq;
longā inedia tolleret, nec morbus aut oxymeli,
aut mulsam requirat, is certē ad septimū usq; diē
à cibis poterit abstinere. Quod si ad tertium vel
quartū quaternionē crīsis futura videatur, nō ita
abstinere potest, nec sola potione servari. At ve-
rō peracutus morbus vocatur, qui tantū ad septi-
mū usq; diē extenditur. Qui longius procedit, sim-
pliciter acutus. Ceterū exactē peracutus is est, q-
usq; ad diē quartum progreditur: nō exactē, qui
ad septimū usq; producit. Similiter qui usq; ad
decimūquartū extēditur, exactē acutus vocatur:
nō exactē verō, q- durat usq; ad vigesimum: quā-
q- est & ipse etiā acutus. Est & aliud morborū ge-
nus, ad quadragesimum usq; diē pveniens, q- ab
acuto nō integrē iudicato ducit originē. Nōnul-
li præterea, statim ab initio tanquā prohibiti, ad
quadragesimum pducuntur, quorū duplex natu-
ra est. Aut enim remissiones paroxysmorū in ex-
actā integritatē desinunt, aut semper cōtinua fe-
bris perdurat. Novi enim cōplures ad quadragesi-
mum usq; diē cōtinua febre cōflictatos esse: sic e-
nim voco illā, quæ nunquā remittit: de quib. sermo
nē videtur fecisse Hippocrates in prognostico,
ubi ait: existimare autem oportet, q- facilis spira-
tio in omnib. acutis morbis, quibus febris copu-
latur, quiq; intra quadraginta dies judicantur,
magnum ad salutem habet momentum. Atque
hoc sanē ultimō prædictū genus, acutum ex-
decidentia vocari debet. Nullus autem morbus
à primō acutus in vigesimum diem illabitur, qui
nō prius iudicium expertus sit. Qui verō ab ini-
tio submersi lentiq; apparent, & inde ad quadra-
gesimum perseverant tales, sed rursus intendi vi-
dentur, hos jurē diuturnos appellaveris.

Curatio ado-
lescentis Sa-
lido morbo
correpti.

Consuetudi-
ni esse ali-
quid cōdō-
nandum.

Peracutus
continenter
dicitur mor-
bus qui tan-
tum ad septi-
mum usque
diem exten-
ditur.

Peracutus
exactē morbo
qui.
Acutus ex-
actē morbus
qui.

Morborum
qui ad qua-
dragesimum
usq; perve-
niunt diem
natura du-
plex.

Continua fe-
bris dicitur
quæ nunquā
remittit.

Spiratio faci-
lis in quibus
acutis mor-
bis ad salutē
magnum ha-
beat momen-
tum.

Acuti ex de-
cidentia mor-
bi.

Diuturni
morbi qui.

GALENI PERGAMENI de diebus decretoriis, lib. III.

Gitur non omnes dies de morbis decernere,
experimento cōstat: sicuti & q- septimani cir-
cuitus validissima sunt virtute præditi: post
hos quaternarij, quidam verō extra hos coinci-
dant. Imō quod nec omnes septimanæ invicem
separentur, sed aliquæ ipsarum etiam conjungā-
tur: nec omnes quaternarij, sed horum aliqui
separen-

*Acuti mor-
bis impari
dierum nu-
mero, longis
pari iudicia
adveniunt.*

*Inferiora haec
omnia recipe-
re ornamen-
tum a superio-
rioribus.*

*Sol autor te-
porum, ani-
malia etiam
gignit.*

*Luna opera
Solis effecti-
bus inferio-
ra*

*Luna men-
ses atque dies
eius disponit*

*No. lunium
quando fiat*

*Luna quā-
do deficit lu-
men.*

*Luna a so-
lis recessu su-
as omnes mu-
tationes re-
cipere.*

*Lunares for-
mae.*

*Luna opera
invalescere,
quum ipsa
est plena.*

*Luna eis qui
sub lumine
ipsius immo-
rati diutius
fuerint, pal-
lorem, & ca-
pitis gravita-
tem cōciliat.*

*Luna Solis
auxilio eger.
Sol nullius
astri opem de-
siderat.*

*Temporum
ortus.*

*Sol & luti-
rex quispia
maximus est
Luna est & luti-
nti princeps
inter solem
atque nos me-
dius.*

*Mutationū
quae a facul-
tate luna pro-
ficiuntur
differentia
multiplices.*

separentur, aliqui cōjungantur. Insuper, quod acu-
tis morbis impari dierū numero, longis pari, ju-
dicia omnino accidunt. Porro causas horū ratio-
ne nobis indagantibus, duo prima omnium quae
fiunt primordia esse statuenda videntur: inordi-
natum videlicet, quod ex hac mūdi materie pro-
ficiscitur: ordine verò ornatūq; procedens, quod
coelestibus originē fert acceptā. Omnia siquidē
hanc inferiora ab illis venustatē & ornamentum
fulcipiunt. Fruimur namq; superiorum omnium,
astrorū virtute. Verū Sol maximē hunc orbē ex-
ornat, & cōcinnē disponit. Quippe veris, aestatis,
autumni, & hyemis autor nemo alius extat: nec
alius tā manifestō vel ex terrestri face animalia
gignere potest, vel maturare fruges, vel ad coitū
& generis propagationē animalia incitare. Ma-
gna sanē & Lunę opera in hac rerū substantia ap-
parent, verū Solis effectibus inferiora. Etenim
mensēs hęc perpetuō atq; omnes ejus dies dispo-
nit, idq; evidēter adeo in marinis belluis: quanq;
& hoc ipsum Solis beneficio debet. Novū enim
lumen sortitur, cū Sole primū fruitur: tātaq;
semper ejus portio illucescit, quātam Sol aspicit.
Prorsus autē deficit, lucisq; expers redditur, ubi
terra suo intervētū ipsam obtenebrarit. Quapro-
pter a Solis recessu omnes sustinet mutationes.
Etenim plena est, cū diametro apparet. Aequa
portione divisa, cū est quadrangula. Gibbosa,
cū triagula. Falcata speciem refert, sexangularis.
Actū primū recens est, cū post Solis congressū
ostenditur. Obscuratur omnino, * cū sub ipso
Sole coruscat. Igitur fructus auget, in crassatq; a-
nimantia implet, mēstruorū statutū tempus cō-
servat mulieribus: comitialiūq; circuitus gignit,
* quatenus Solis plus, vel minus participat. Om-
nia siquidē quae facere nata est, ubi falcis figuram
repraesentat, languida fiūt: invalescūt, cū ple-
na fuerit. Quapropter & fruges interea adaugēt
& maturat celerrimē: ferarū occisa corpora in ta-
bem visu suo resolvit: somnoq; sopitis sub ejus
lumine, vel aliter immoratis diutius, pallorē, &
* capitis gravitatē cōciliat. Ceterū ut Luna Solis
auxilio in omnibus indiget, ita Sol nihil vel ma-
ximi alterius cujusdā astri, vel ipsius Lunae, opē
desiderat. A nullo enim impeditur, quo minus
aestatē faciat, cū in vertice nostro cōstituerit: aut
frigus adducat, si humilis ejus cursus fuerit: aut
æquinoctiū utrunq; cōstituat: cū modicē obli-
quus videtur. Sed ipse veluti rex quispiam maxi-
mus est: Luna verò, ut princeps nō mediocris in-
ter illum & nos medius cōstitutus, meritō terre-
strem hanc regionē gubernat: nō potentia cæte-
ros planetas, sed vicinitate exuperās. Porro ve-
hementiores mutationes eveniūt, ubi ipsa cum
Sole coit: dein autem, in apparitionibus plenilu-
nij: minores his cōtingunt, dum medio orbe ap-
paret: obscurā, dum curvata in cornua, & falca-
ta videtur. * Etenim diametra Lunae statio, ceu di-
stinguens dispescensq;, maximē cōtrarias ipsius
Lunae dispositiones (maximē enim Lunae incre-
mentū, ejusdem imminutioni adversatur) earū
omniū est validissima. Dein verò duae dispositio-
nes dichotomi, in quibus Luna per mediū vide-
tur secta, utranque ipsius differentiam, dico au-
gmentū & decrementū, ad æquilibrium secant

prior quidem augmentum, decrementū secunda.
At omnium extremā obscurissimāq; aeris nos am-
biētis* permutationes in facultatis, incurvisq; ap-
paritionibus fiunt: magis autē, in ipsis incurvis.
Jam verò plenitudinis Lunae celerrimas muta-
tiones efficiunt: novilunia verò, inaequales, diu-
turnasq;. Nam quid ante Lunam apparentē ma-
nifestē pronūcies, nō est. Longum autē hoc tem-
pus occultationis est, integri ferē signi cursum
explens. At mutationē ex incremento ad immi-
nutionē, punctum exactē distinguit: quod pun-
ctum a Luna quasi momento absolvitur. Qua-
re breves plenilunij conjunctiones existunt, diu-
turnae conjunctionales. Tuta igitur crisis eva-
det, quādo in toto mense status secūdo die fiet,
quo primo & manifestō Luna, & longo satis tē-
pore super terrā jam apparet, & lumen sensibile
de se mittit, ad hanc umbram evidenter ostendit.
Primus autē dies tandiu Lunā supra terra vagan-
tem habet, quandiu adhuc Solis etiā lumen post
occasum retinet. Quare in hoc Luna simul cum
Sole occidit: subinde verò & prior est occidua, &
secunda die prius elucescit: nūc minus, nūc ma-
gis apparet. Atq; hoc ei accidit longitudine a So-
le recessus. Plerūq; autē Luna triduō in coitu So-
lis morata, planē invisibilis est: quo nōdum hęc
terrena immutare potest. Cujus circuitus vice-
nis diebus septenisq;, & tertia ferē diei parte per-
agitur. In tanto enim tempore totū signiferi cir-
culum percurrit. At quod is circuitus, quo nobis
lucescit, eidē quoq; numero cōveniat, perspicuē
intelliges, si occultationis tempus ex toto men-
struo tempore eximas. Quod autē menstruū tē-
pus nō omnino triginta diebus constet, sed mi-
nus unius ferē diei dimidio: quodq; mensium a-
lius quasi mutilus & imperfectus, dies vigintino-
vem sortiatur: alius verò, nēpe absolutus, trigin-
ta, liquidō constat. Quemadmodū igitur annū
integrū Sol absolvit, ita Luna mensem, immuta-
tione per septimanas ei accidente. Nam utrunq;
tempus, & quo post primā apparitionē in mediū
orbem accrescit, & quo inde plenā efficit, septē
diebus absolvitur, ambo quatuordecim. Simili-
modo, si inde, cū aequali portione est divisa, ad
secundā divisionē ejusmodi rationem subduxe-
ris, & hos dies, reliquosque, cū planē ob oculis
Luna declinata est, septē invenies. Quod autem
aēr nos circūstans, maximas mutationes sortia-
tur, dum Luna primū occultatur, ac dein rursus
se ostendit, nemo mortaliū ignorat. Itaq; mēsem
a Luna immutari secūdu septimanas, ac proin-
de cætera omnia, admodū est perspicuū. Jam ve-
rò quae omnib. subsistentibus accidunt, horum
causam Luna habere observata est, maximē in te-
tragonis & diametris stationibus ea immutans.
Nam si Luna in tauro existente semen conceptū
fuerit, vel etiā partus cōtigerit, magnas ejus mu-
tationes invenias, cū in leone, scorpio, & aqua-
rio signiferū ambit. Verū in leone tetraganos se-
ptimanæ unius existit: in scorpio deametra duas
septimanas habet. Ita quoq; in aquario, secunda
quadrangularis statio necessariō in tertiam se-
ptimanam procedit: quod Luna vicenis diebus,
septenisq; & particula quadam adjecta, maximē
tertia diei parte, universum signiferi ambitum
peragat.

*Luna occu-
tioni tea
quam
sit.*

*Plenilu-
nium
breves
fiunt d-
na con-
ditione
Crisis
quand-
dat.*

*Luna c-
tus sig-
ptem d-
et ierit
dispar-
agitur.*

*Mensis
omniū
stat tra-
diebus.*

*Sol ann-
absolvit.*

*Menses
na im-
ri per se-
manas,
alia om-*

*Luna m-
esse cau-
omniū
mutati-
quae in
ribus a-
dunt.*

peragat. Nec verò agris tantum luna, sed etiā fa-
 nis, dies quales tandē futuri, sint prænūciare po-
 test. Etenim Luna, si planetas salutes ac tēpera-
 tos aspexerit, faustos ac bonos producet dies: mo-
 lestos autē, si intemperatos. Ad hęc, alterationes
 magnas, quas in tetragonis & diametris per se-
 ptimanas fieri diximus, in letalibus quidē mor-
 bis letales & ipsas: in salubribus, bonas evenire
 est necesse. Lunę igitur tetragonę, diametręq;
 stationes, in principiis bonis, bonas faciunt alte-
 rationes: in malis, malas. Circuituū autē alij nu-
 mero quodā dierū constāt, alij mensibus. Cate-
 rūm qui diebus cōstant, septimani sunt, & Lunę
 modo incedūt. Qui mensibus, ad Solē referūtur,
 eodem modo evenientes. Ac sic illud intelligen-
 dum est, q̄ ait Hippoc. æstivos morbos hyeme,
 hyemales æstate solvi. Hoc enim diuturnorū an-
 naliūve morborū judicationis tempus statum
 est, quēadmodū acutorū decimusquartus. Cum
 enim à mensis principio ad usq; pleniluniū tem-
 pus, totius lunaris circuitus dimidiū existat, ean-
 dem rationē habet cum intervallo, q̄ ab hyeme
 ad æstatē usq; intercidit. Quinetiā à plenilunio
 ad occultationē tempus, spacio q̄ ab æstate ad
 hyemē usq; porrigitur, p̄portione respōdet. Sed
 horū utroq; bifariā secto, in acutis morbis est se-
 ptimana: diuturnis, clarissimorū syderum exor-
 tus: quorū ratione ver, æstas, hyems, & autum-
 nus, describūtur. Quemadmodū autē septimana
 acutorū morborū est decretoria, sic temporis an-
 nui mutatio, diuturnos morbos discutit: ut hye-
 me q̄dem cōstitutum morbū ver dissolvat: in ve-
 re cōflatum, æstas. Simili rationē per æstatem cō-
 tractum, autūnus: in hoc paratū, hyems. Cæterū
 anni tempora singulis partib. bifariā divisīs, mē-
 sis quaternionib, p̄portione respōdent. Et quē-
 admodum anni temporis cuiusq; & initium et fi-
 nis, syderum manifestorū ortu & occasu descri-
 bitur: ita etiā medietas singuli, alterius rursus sy-
 deris exortu distinguitur. Itaq; universas particu-
 lares morborū mutationes, vel tanq̄ ad propriū
 ipsoꝝ principii, vel ambientis nos aeris conver-
 sionē, evenire est necesse. Qui igitur ex proprio
 principio mutatur, Lunā sequūtur: qui verò ceu
 ab aere nobis circumfluo immutatur, in toto qui-
 dem anno, Solem: in singulis mensibus, Lunam.
 Hinc jam accidit, mutationes validissimas esse
 quę cuiq; per septimanas dies propriē cōtingūt:
 q̄vis ipsis ferē cōmisceatur, quas aer excitat. Atq;
 in acutis q̄dem morbis coincidentes decretorij
 sunt plures: quoniā & corpus mutationi accom-
 modum, in motu & perturbatione vehemēti cō-
 stitutum est: in longioribus, via & ordine magis
 septimanarū circuitus procedit. Principiū igitur
 dierū qui acutē decernunt, & cum quadā pertur-
 batione morbos immutāt, tertiū diē ab ipso prin-
 cipio statuere oportet: quippe qui nullā jā cum
 prima septimana cōmunionē habeat, sed ex co-
 incidentib. sit. Jam verò perturbationis violētia,
 naturā ea quę molestant, etiā ante tempus pro-
 pulsare cōpellit: id quod alioqui neutiq; factura
 fuissent ante coctionē perfectā, qua interdum jā
 absoluta, sapius tardari solet, propter facultatis
 (quę aliena excernit, & crises in morbis efficit)
 infirmitatē. Fiūt itaq; judicationes optimę, cum

jā omnia in animantis corpore fuerint accuratē
 cōcocta. Perniciosum autē est, si quando ipsa cri-
 sis præveniat. Nam idonea simul cum iis quę læ-
 dunt, excernuntur: id q̄ fit natura incitata, vel ab
 exteriore quodam, vel ab iis quę in ipso corpore
 detinentur. Atq; unum q̄dem ex illis quę naturā
 stimulant, & veluti provocant, accessio est, nullā
 quietem, nec moram cōcedens, verū incitans,
 movensq; & ceu pugnā indicēs. Unde acutorum
 morborum in diebus imparibus judicium con-
 tingit. In his enim & accessiones fiunt. Nā secun-
 da accessio ab initio ad tertium diem delabatur,
 tertia ad quintum, quarta ad septimum, quinta
 ad nonum, omnes deniq; in imparibus fiunt. At
 dies ipsi primariā decernendi virtutē nō habent,
 sed per accidēs id cōsequuntur: q̄ videlicet in ac-
 cessionib. judicentur morbi, illę autē in dies im-
 pares incidant. Neq; enim septimi, vel quarti nu-
 merus, crisis est autor: sed quod Luna innovan-
 te, & terrena immutante, motuū quoq; circuitus
 ad hos principes numeros venire contingat, me-
 ritō in ipsis tanq̄ stata alterationum tempora in-
 veniuntur. Quippe mutationes nō numeris, sed
 Lunę terrena debent. At cum id quod mutat in
 motu cōsistat, tempus mutationib. necessariō cō-
 junctū est: quare necessariō & numerus. Luna i-
 taq; omnia terrena immutat, atq; in septimanis
 præcipuē magnas mutationes inducit: dein autē
 parvas in quaternionibus. Porro tertius & quin-
 tus dies decernunt, non ex lunari circuitu talem
 facultatē sortiti, sed quod tertius violenta acces-
 sione crisim quarto die futuram prævertat: natu-
 ra autem quarto die defatigata, minimeq; irrita-
 ta conquiescat, ac postea in quinto ad judicium
 moveatur. Jam verò & nonus, inter duos decre-
 torios septimum & undecimū medius, vel nō fa-
 ctum in septimo die judicium, vel undecimo fu-
 turum, ipse sibi vendicat: at rarius quidem septi-
 mi, sæpius undecimi assumit crisim. Porro in diu-
 turnis morbis, ut accessionis vehementia, sic nu-
 merus coincidentiu dierū minuitur. In omnibus
 autem ferē dieb. peracutos morbos judicari con-
 tingit, quoniā ultimus decretorius ipsoꝝ est
 septimus: & ante hunc nō quartus modō, sed ter-
 tius, quintus & sextus aliquando decernunt. At
 peracuti omnes morbi vel continuam febrem, u-
 niformemq; à principio usq; ad crisim sibi habēt
 comitem: vel aliā, quę etsi manifestas habeat de-
 clinationes & accessiones, nō tamen tertio quo-
 que die manifestas tantum habet, verū in ipsoꝝ
 rum quoq; dierum mediis, quemadmodū & se-
 mitertiana. Proinde prima peracutorū differen-
 tia, veluti una quādā accessio est. Quamobrem
 nihil (quantum ad accessionem pertinet) impa-
 res paribus præstant, cum febris singulis diebus
 æqualis existat. At in altera differentia, cum qui-
 dem veluti ad septimum diem festinat, & secun-
 dum ipsius rationem in eodem finiturus est: me-
 dię verò accessionis magnitudo, naturā ante suū
 tempus venire ad crisim compellat, vel si extrin-
 secus aliquid eveniens ipsam irritet, crisis haud-
 dubiē sexto die prærumper. Etenim in secun-
 do die natura aliquo modo est valida: item in
 quarto magis quā in sexto: sed nondum in cer-
 tamen venire audeat: in sexto autem accessionis
 vehemen-

*Crisis opti-
ma quando
fiat.*

*Accessio mor-
bi naturam
commovet.*

*Acutorum
morborum
judicia in
diebus impa-
ribus fiunt,
quia & ac-
cessiones.*

*Dies non pri-
mario, sed ex
accidenti de-
cernunt.*

*Dies tertius
& quintus
qua ratione
decernant.*

*Noni diei fa-
cultas.*

*Peracutos
morbos (qua-
rum ultimus
decretorius
est septimus)
in omnibus
ferē diebus
judicari con-
tingit.*

*Peracutorū
morborum
duplex differ-
entia.*

vehementia frequenter eam ad certamen provocat: quare vel in eo dejicitur prius, quàm quæ infestatur excreverit, extinguiturque; vel eorum magnam partem propulsat: reliquum verò adhuc non potest, sed imbecilla & defatigata prorsus cadit & victa jacet. Deinde si postero tempore recreari ac refici possit, morbum paulatim concoquit. At si morbi reliquæ robore illius majores sint, tandiu æger supervivet, quâdiu natura sufficere poterit: morietur tamen postea. Decernit autem vigesimus, & vigesimus primus, sed multò magis vigesimus: quoniam huiusmodi morbus diuturnus jam est, & paribus diebus accessiones fiunt: dein, quia septimana non integris septem diebus constat. Etenim uti annus ad trecentos sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarta adjectam habet: ac mensis ad triginta dies absolvendos, unius dimidium desiderat: sic & septimana, sexta maxime diei parte, ut septem integros habeat, indiget. Quam obrem tres septimanæ non unum & viginti dies integros, sed minus fere unius tota dimidia parte consequuntur. Ob quod etiam numerum huiusmodi non magis viginti, quàm uni & viginti diebus vicinum, utriusque parti convenire videas. Quoniam igitur vigesimus exactam periodum propinquam sibi vendicat, tales jam morbi inveterascunt, & accessiones paribus diebus accipiunt. Quorum autem accessiones in imparibus accidunt, horum iudicia ad vigesimum primum delabuntur. Non solum autem Lunæ circuitus, sed menstruum etiam tempus apparitionis, virtutem quandam in nos possidet. Quod quidem tempus, septem & viginti dies propemodum necessario continet: ideoque septimana ejus minor ad huc prius dicta merito evadet. Sive enim à triginta, tres illos coitionis dies, in quibus nihil de aëre decernitur, auferre cogites, sive à viginti novem cum dimidio, reliquum tempus, quo luna manifestum de se lumen præbet, priore modo septem & viginti dies, altero vigintisex & dimidium habebit. Cum ergo apparitionis manifestæ efficacisque tempus sit dies vigesimusextus & dimidius: significari verò circuitus expleant vigintiseptem dies cum tertia unius parte, liquet medium ipsorum fore vigesimum sextum diem, ad hæc dimidium, & tertiam maxime & duodecimam unius diei partem. Horum itaque nihil supputari potest per dies integros citra fracturam, nec septimana, nec quaternio, nec mensis, nec annus, nec aliud quicquam omnium. Quoniam verò inter septimanas ipsas duæ solum primæ separantur, tertia copulatur: perspicuum est quaterniones quoque, nonnullos necessario coniungi, alios separari. Itaque secundus ternio & primus conjunguntur, quod unius septimanæ primæ bifariam divisæ particula uterque sit. Tertius à secundo disjungitur, quoniam & septimana secunda à priore distincta est. Tertius autem quarto copulatur, quoniam secundæ septimanæ uterque particula est. Hinc itaque, rursum quartus propter tertiam septimanam secundæ conjuncta, quinto copulabitur. Adjungitur etiam sextus quaternio quinto, in decimo septimo die, tantquam tertiæ septimanæ pars uterque existens. Porro falluntur nonnulli medici, omnem morbum brevem esse acutum existimantes: sicuti & omnem tardum, diuturnum. Siquidem omnis acutus (qui ex motus celeritate hunc in modum vocatur) plane exigui est temporis: & omnis diuturnus, necessario tardus. Non tamen si brevis temporis sit, acutus statim fuerit (cum multæ ephemeræ longè brevissimæ sint, omni quoque periculo vacet) nec si tardus, longi temporis.

GALENI PERGAMENI
de crisis, lib. I.



Otius morbi tempora sunt quatuor in universum: principium videlicet, augmentum, statum, & declinatio. Quædam verò ægritudines ob earum malignitatem, atque agrotantis imbecillitatem, in ipso statim augmenti tempore hominem jugulant: sicuti & quædam aliæ in vigore. Definiuntur autem ea tempora minimè dierum numero. Porro an ipse morbus augeatur, non ex eo tantum conjecturari oportet, quod accessiones anticipent (sæpe enim talis anticipatio, morbi proprietatem consequitur, potius quam incrementum, cum & quartanæ, & tertianæ, & quotidianæ febris quidam circuitus usque ad integræ solutionem ita anticipare sint visæ) sed quod etiam longiores & maligniores existant: id quod similiter est in intermissione & declinatione considerandum. Voco enim intermissionem, quando febris in quietem desierit: declinationem, omnem ejus partem, quæ vigorem ipsi subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium. Etenim si accessio (exempli gratia) consue tam anticipet horam, longior etiam fiat, & vehementior, maligniorque, & cum multis pravisque symptomatis accidat: ad hæc, ipsum declinationis tempus fiat breve, nec omnino facile, nec symptomatum accessionis omnino expers, is certe morbus ad magnitudinem crescit. Si verò accessionis initium tardet, longitudo autem ejus ac magnitudo minor existat, cessetque etiam malignitas, necnon intermissio vel declinatio sit facilis tolerata, longiuscula, omniaque accessionis delens symptomata, haud dubie declinationis morbi hæc fuerint aperta indicia. Ubi verò quæ ad accessiones duas pertinent, æqualia fuerint, morbum demonstrant consistere. Quare Hippocrates ait, ad morbi incrementum noscendum, esse accessiones invicem conferendas. Jam verò sæpe quidem in morbis nullum reperitur sensibile ipsius vigoris tempus: sed habente adhuc quarta (si ita coiterit) accessione indicia augmenti, quinta superveniet accessio, declinationis habens principium. Simile quiddam accidit in morborum augmentis. Nam sæpe prior accessio principium simul habuit, ascensumque & vigorem: dein secunda videtur manifestè inclinare. Generosi autem medici est munus, futurum statum præcognoscere, cum omnem victus rationem ad ipsum inspiciens instituat. Eadem ratione principium atque augmentum morbi, non ubi jam perfecta sunt, sed multò antea præstat cognoscere. At accessiones & constitutiones (quemadmodum inquit Hippoc.) morbi indicant & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive in longiori tempore fiant. Præterea si in laterali morbo sputum statim appareat, incipientem morbum facit breviorē: si verò posterius, longiorem. Porro quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo invadunt, incipiuntque: reliqua verò omnia mox apparent.

Vigesimus
cur decernat
magis quam
vigesimus-
primus.

Annus.

Mensis.

Septimana.

Vigesimus
dies quos
morbus in-
dicet.

Apparitionis
lunæ tem-
pus quantum.

Quaternio-
num qui se-
parentur, &
qui invicem
coniungan-
tur.

Acuti morbi
omnes sunt
temporis exi-
gui, non ta-
men omnes
breves morbi
continuo exi-
sunt acuti.

Tempo-
tus m-
sunt q-
tuor.

Tempo-
morbi
finiri
nume-

Antio-
acces-
non se-
morbi
menta-

gust.
incre-
morbi
conje-
portet

Inter-
Decli-
Morbi
tis ad
tudine

Declin-
nis m-
gume

Morbi
tis ma-

Statu-
bi doc-
lis et q-
videtur
esse de-

ret. Invadunt igitur una cum laterali morbo febris acuta, lateris dolor pugenti simili, tussis, & difficilis respiratio. Mox autem apparet quaedam, ut ipsi morbo propria nonnulla, ut communia omnibus febricitantibus. Propria sane ipsius morbi, primum quidem, si nihil cum sputo educatur: quod sufficiens crudi morbi est indicium. Secundo autem, si educatur quidem, sed non bonum. Est autem & hoc duplex: unum quidem, quod solum caret coctione: alterum vero, quod etiam pravam existit. Ab his omnibus, id quod coctum est, separatur: quod etiam proprie sputum appellatur. Si igitur hoc statim appareat, morbum facit breviorē: cum vero nullo modo educitur, aut crudum, longitudinem morbi ostendit. Si quid autem pravam expuitur, periculum imminere significat: mortem vero, si prorsus malignum fuerit. At quae proprie expuitiones vocantur, ex his, quaecumque subflave, & subruffae, & subpallidae, & subspumosa, & tenues existunt, sola cruditate significant: nullum vero insigne malum praenuntiant. Quae vero sine alia commistione sunt flavae, ruffae, crassae, spumosa, virides, viscosae, rotundae, atque his etiam magis nigrae, sunt perniciosae. Præterea facilitas expuitionis, bona est: ut difficultas, mala: id quod pulchre in prognosticis docuit Hippocrates, dicens: Sputum oportet in omnibus doloribus, qui pulmonē & latera infestant, celeriter expui ac facile commistumque vehementer videri flavum sputo. Eadem autem & in urinis, & in alvi excrementis facienda distinctio est, quam in ipsis sputis fecimus. Siquidem nonnulla eorum, coctionis sunt signa: nonnulla vero cruditatis: quaedam mortis indicia existunt. Etenim ut nigrum sputum, præter id quod crudum est, etiam mortem portendit: sic & urina nigra, non cruda solum, sed etiam letalis existit. Est autem simpliciter crudum, quod album est ac tenue: quod aquosum vocamus. Porro quoties de principio morbi fecit sermonem Hippocrates, non de indivisibili illo primæ accessionis insultu, in quo nihil possumus observare, sed de alio quodam principio, quod sensibilem habet latitudinem, nobis suam mentem exposuit. At vero principium secundum latitudinem, communi quadam imaginatione, absque ullo artificio, continetur in prima accessione. Atque idcirco quaedam statim cum incipiunt, statum accipisse dicuntur, quemadmodum in primo Epidemiarum, ubi ait idem Hippoc. Statim enim continua est, quæ incipiens florescit ac viget. Nam verbum illud, *incipiens*, non dicitur hoc loco de vero morbi tempore, sed de eo quod subsequitur expositum principium, quod ut plurimum ad tertium diē extenditur. Cuiusque itaque partis superfluitas, eam quæ illi inest dispositionem ostendit: si cocta quidem fuerit, salubre: cruda autem, ægram. Alvi excrementa (Hippocrate autore) optima sunt quæ mollia & coherencia existunt: & quæ eandem exitus hora servat, quam in sanitate habuerunt. Quantitas vero esse debet pro ratione cibi, qui assumitur. Nam si exsuperant talia fuerint, ventrem inferiorem sanescere indicant. Et sputum quoque cum fuerit exquisitè simile illi quod sanis advenit, integrā sanitatem instrumentorum respirationis significat. Si quo modo autem à naturali modo recesserit, tantum ea lesa esse demonstrat, quantum ipsam formā naturalem amiserit. Quod vero illi

quod secundum naturam est, maxime contrarium videtur, existit crudum, magnamque patientium membrorum imbecillitatem indicat. Quod vitiosa causa aliquod signum habuerit, quemadmodum nigrum, est perniciosum. Ita etiam in urinis res habet. Nam & hæ, quæ sanis similes sunt, venosum instrumentorum genus satis robustum esse indicant. Quæ vero crudiores sunt, ejusdem imbecillitatem significant. Rursus quæ maxime sunt sanis contraria, hæ quidem omnino sunt crudæ, & maximam universi venosi generis imbecillitatem declarant. Quæcumque vero & superantis causæ pravitate ostendunt, veluti nigra, hæ sunt penitus exitiales. Hæc itaque tria signorum genera, singula quæque, coctionis præbent indicium: urina quidem, ejus quæ fit in venis: dejectiones autem, ejus quæ in ventre: sputa vero, ejus quæ in respirandi instrumentis. Sanguinis autem profluvium è naribus, sudores & tumores, qui juxta aures fiunt, reliquique defluxus, si in tempore quidem fiat opportuno, prodesse possunt: intēpestiva autem, nihil juvant. Non sunt autem eadem decretoria signa, & quæ coctionis indicia dicuntur. Siquidem fieri non potest, quin ista omnino vel bene, vel male se habeant. At cōcoctionis signa, salutem, quidem hominis: non tamē per crīsim omnino, futuram nobis ostendunt. Porro in febribus, universis, quoniam venosi generis sunt passionēs (nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad urinas præcipue attendere oportet. In iis autem qui laterali morbo afficiuntur, primum quidem sputa, secundo loco urinas: quoniam is morbus omnino cum febribus jungitur, ut in passionibus ventris, si sine febre fuerint, sola excrementa inspicere oportet: si autem cum febre, etiam urinas. Proprium igitur uniuscujusque morbi principium, coctionis signis determinatur: potestque usque ad multos quaterniones extendi. Ceterum tunc finietur, cum primum cōcoctionis signa apparuerint. Reliquum vero deinceps tempus usque ad statum, jam alterum tempus est, quod augmentum & ascensus vocatur. Dein posthac, si status: qui est vehementissima totius morbi pars. Ultima vero omnium est declinatio. Coctionis igitur signa (sæpius enim quæ utilia sunt, repetere cōvenit) nunquam male apparent: decretoria autem, est ubi malè: neque enim in augmentis, neque in principis, sed in statibus illa apparere convenit. Quippe nec sudores, nec vomitus, nec alvi excrementa, nec tumores post aures, nec profluvia sanguinis, ante cōcoctionem morbi venientia, unquam per crīsim finierunt morbos. Hæc igitur jam veluti causa, morbos creduntur solvere: quæ vero veluti horum indicativa sunt signa, deliria existunt, vigilie, graves sopores, dolores, lachrymæ, respirandi difficultates, oculis tenebræ obortæ, & quæcumque similia: quæ omnia si absque coctionis signis in morbi principio appareant, pessimorum sunt dispositionum indicia. At reliqua tria quæ coctionem ostendunt signa, etiam si in prima protinus accessionis hora apparuerint, ad bonum apparent. Sicuti igitur non habetur exquisita principij cōgnitio, antequam incipiat ascensus: ita neque ascensus, antequam status invadat. Exercitandum itaque hoc in loco est, ut ingruentem cognoscamus statum: deinde, ut præcognoscamus. Quod vero principium morbi intellexerit Hippocrates esse, totum illud

Urina indicant concoctionem quam fit in venis.

Decretoria signa à signis concoctionis quomodo differant.

Febres esse affectus venosi generis.

Urinæ esse spectandas in febribus.

Sputa esse inspicenda in pleuritide.

Principium proprium cuiusque morbi.

Coctionis signis determinatur.

Augmentum tempus quod sit.

Status est vehementissima totius morbi pars.

Declinatio.

Decretoria signa ante concoctionem venientia, nunquam per crīsim finierunt morbos.

Coctionis indicia, quocumque tempore apparent, salutem apparent.

Statum morbi esse cognoscendum atque præcognoscendum.

*Inflammatio
pes non esse
statim in
principio sol
vendat.*

*Incrementi
terminus un
de possit di
gnosci.*

*Vigoris lati
tudo in mor
bis, quanta
esse soleat.*

*Excrementi
alvi lauda
bile quale nā
esse debeat.*

*Excremento
rum color, nō
magnā vim
habet ad in
ferioris ven
tris indicandam disposi
tionem.*

*Excrementū
incoctū alvi,
quale nām
esse soleat.*

*Excremento
rum alvi spe
cies complu
res præter na
turam.*

*Excrementū
vehementer
fatidum, &
vehementē pu
trefactionem
indicat.*

tempus quo ipse morbus est crudus, colligere ex hac ejus dictione licet: Cōcocta medicari & mo vere, nō cruda, nec in principiis, modō non gli scant. Eō dē illa pertinet. Quicūq; inflammationes statim in principio morborū solvere tentant, ex eo quidē quod distentū est atq; inflāmatū, nihil adimūt: neq; enim cedit cruda adhuc passio: quē verō morbo resistunt, & sana sunt, colliquescere faciūt. Præfinies autē manifestū aliquē terminū ultimæ parti ascensus, quemadmodum fini, si sta tus indicia inspexeris, meminerisq; Hippocrati carum admonitionum, qb^o ait: In principiis quidem omnia sunt imbecilliora, in statu verō, for tiora. Ad hæc: Ubi morbus peracutus est, statim extremos habet labores. Cōtingit autē nōnunq̃ duas accessiones, ubi maximæ aliarū factæ fue rint, invicem verō æquales, circumscribere ipsius vigoris tempus: nōnunq̃ verō unā omniū aliarū præcedentiū reliquarūq; sequentiū, esse maxi mam. Ad res autem extendi accessiones vigoris tempus, in morbis acutis nō admodum accidit: in diuturnis verō, nō modō ad totidē, sed ad lon gē plurimas. Alvi igitur excrementū optimū (ait Hippocrates) est molle atq; conjunctū, quod ea hora exierit, qua tempore sanitatis consueverat.

Quantitas verō ejus, sit pro ratione cibi assumpti. Tale enim vim cōcoquendi in inferiori ven tre validā liquidō ostendit, ac digestionē optimē fieri, nullamq; ventris partibus inflāmationem inesse. Nō meminit autē coloris ipsius excremē ti, quoniā nō magnā vim habet ad inferiores vē tris indicandam dispositionē. Jam verō tale ex crementū cōjunctū cum sit, necessariō etiā erit & læve. Quod si præter dicta, etiā subrufum fue rit, & nō admodū fœtidum, exquisitē secundum naturā se habebit: ac neq; in vētre, neq; in circun stantibus organis, aliquod erratum esse significa bit. At si vel rufum purū, vel nullo modo subru fum extiterit, sed etiā secundum ciborum colo rem, alterū duorū significat, scilicet plus rufæ bi lis in ventrem defluere, aut nihil omnino. Horū verō primū quidem si circa initia fiat, biliosiorē morbum ostendit: si verō declinationis tempo re, corpus expurgari integrē. Incoctum autē al vi excrementū est album, tenue, asperū, humoris expers, ac ciborū retinens qualitatē. Secundum præter hæc est excrementorū genus, quod nō ex ciborū sit dispositione, sed ex cōfluentibus à toto corpore ad ventrē superfluitatibus q̃ aliquid etiā indicare potest. Etenim si sit viride, indicium bilis æruginosæ existit: si autē nigrū, vel atræ bi lis, vel sanguinis eo in loco perusti. Si autē veluti humidū quodā in excremento apparuerit, ubi nō fuerit tale aliquid intra corpus assumptū (id quod semper subintelligere oportet) partiū in ternarū validū frigus, ac veluti mortificationem ostendit. Si verō pingue, pinguis colliquationis est signum: quemadmodū etiam si glutinosum, colliquationē solidarū partium portendit, quæ longē periculosior existit. Præterea q̃ vehemen ter fœtet, vehementem putrefactionem indicat. Excrementū stridēs, flatū quidem sibi cum tenui humiditate permistū esse declarat: organa autē in unū coacta, atq; in angustū restricta. Spumo sum verō fit, vel re aliqua fervente, vel cū aliquis

flatulentus spiritus colluctatur cum humiditate. Ac primū sanē immoderatæ caliditatis corpus colliquantis: secundū verō, est inæqualis pertur bationis effectus. Variū autē, variis corpus affe ctibus esse obnoxii ostendit: & ob hoc ipsum, & diuturnū & malignū existit. Etenim simplex af fectus facilius cōcoquitur, & minus est, q̃ multi formis, periculosus. Urinarū autem illa optima est, quē urinę sanorū simillima. Quæcūq; verō nō est talis, simpliciter est incocta, vel præter hoc, etiā perniciofa. Urinā igitur optimē coctam, in iis qui supremū sanitatis obtinent gradum explora re oportet. Talis enim est subrufa, vel subflava: magisq; subrufa q̃ subflava: statim enim & hæc mediocrē crassitudinem possidet. Nam quæ hac ipsa crassior est, aut tenuior, coctionem imperfe ctam significat. Siquidem altera nondum in hu more conversa est, altera verō adhuc cōturbata existit. Cæterū cum triplex sit urinarū turbidarū differentia: q̃a vel cum tales mictæ fuerint, pau lō post residēt, vel semper similes permanēt, vel puræ quidem minguntur, postea verō conturbā tur: prava quidem ex dictis tertia, bona autē pri ma, media verō inter utranq; est secunda: Siqui dem quæ statim residet, parum aliquid inæqualis turbulentia superesse demonstrat: quæ verō sem per manet similis, vigere adhuc quæ est in sangui ne agitationē ostendit. At quæ extra cōturbatur, debet incipere cōcoqui: quare * meritō deterri ma est: nam longiori tēpore, & virtute forti, indi get ad coctionē. Porro quæ ad summū incocta est, has omnes malignitate superat: est .n. aquo sa exquisitē: ac, pinde veluti desperatæ coctionis accidens, affectioq; venosæ naturæ existit: * quæ admodū ventris, cruditas. Ubi verō urina ipsa * celeriter mingitur (hæc enim passio *ὀδρεος* & dia bete vocatur: estq; talis, qualis circa alvum inte stinorū lævitas: nempe extinctio utriusq; virtu tis, retentricis simul & alteratricis) tunc sanē in ter omnes urinas crudas ea pessima existit. Sed post ipsam est aquosa, quæ quidē solius faculta tis alteratricis imbecillitatē demonstrat. Huic pro xima est altera urina, quæ in multis apparet mor bis, ut videatur mistā habere formā vini tenuis & albi. Gignitur autem ex ipsa alba & aquosa, ut quæ paucum liquore ex bili rufa susceperit. Atq; hæc sanē urina proximē accedit ad crudam. Post hanc est suppalida. Pallida verō jam & subrufa est. Optima autem omniū urina, subrufa & sub flava existit. Etenim cum adhuc coquitur sanguis, urina quæ mingitur, levem, æqualē, albū ac mul tam facit hypostasim. Perfecta coctione, color quidem urinæ intenditur, minus autē subsidet. Quod si diutius homo à cibo abstineat, urina magis rufa reddetur: siquidem qcquid alimenti supra modum calfit, præsertim si dulce fuerit & pingue, in amaram bilem convertitur. Porro co lor rufus ad flavū proximē accedit: in hoc autem differunt, quō rufus quidem magis ad albū, fla vus autem ad splendidum vergit. Quantū verō flavo rufum est albius, tantū illo pallidū. Quan tō rursus minus album est flavum q̃ rufum, tan tō flavo rubicundū. Jam verō in pueris ferē om nibus, & perfectam ætatē habentibus, qui ocio sam vitam degunt, aut quovis alio modo sunt pleni,

Excre.

Variu

ris com

fecti

obnox

ostend

Urina

qua su

ma.

Urina

bidar

ferent

plex.

Urina

Diabe

Urina

darun

exist

ma.

Urina

sa.

Urina

pallida

Urina

da.

Urina

sa & j

sa, on

optima

stis.

Coloris

flavusq;

men.

Color fl

Color r

cundus

in qui
beant
ntia
nam.
ntia
horde
asio-
les
ignifi-
ami-
rasen
furfu
uid
t.
nigra
nim
color
lo fiat
vi-
zili-
oleagi
pri-
is si-
ea
uain
que
bus,
item
xitia
lant.
insti-
pote-
ra-
sta-
bi.

pleni, satis multā habent urinae subsidentiā: quia in his omnib. plurimū crudi humoris colligitur. Quare iis qui ex ocio & repletionē febricitant, si sanitati restitui debeant, in urina plurimū necessariō subsidet. Contra iis, qui ex inedia & labore rubida simul & biliosa urinae excernuntur. Solvitur quippe morbus plerunq; priusquā subsideat aliqd: sufficitq; in his & nebula, & suspensio optima, qualis est alba, laevis, aequalis. Nec verō urina rufam, simpliciter vituperavit Hippocrates, sed quamdiu rufa simul atq; subtilis esset: quod tunc cruditatem significaret. Ceterū quae farinae hordeaceae crassiori in urina sunt subsidentiā similes, grandis colliquationis & ardentissimi incendii sunt signa. At quae folia repraesentant, sunt vasorum partes superficiales, quae scilicet contabuerunt. Ita & furfureae; nisi quod illis crassiores atq; minores sunt. Nigrae verō subsidentiā, vel excedentē caliditatem, atq; igneam ostendunt: vel ex frigidityte vehementi, extinctionē. Pessima igitur est omnis denigrata urina, adeo ut neminem unquam servatum viderim, ex iis qui talem minxerūt. Minus verō perniciofa est, si sola sit hypostasis nigra: atq; adhuc minus, si solum id quod in medio pendet, ac multo minus etiam si nebula. Color verō viridis fit in transitu ad nigrum, estq; veluti quoddam initium nigri. Nam si morbus malignus fuerit, & vomitibus, & alvi excrementis, & urinis viridibus, postmodum nigra superveniūt. Color autē lividus, est tantū frigiditytis effectus: odor gravis, putrefactionis. Quod si veluti oleū mingatur, colliquationis est signū: tales quidem urinae pravae sunt. Quae autem bono colore sunt praeditae, & subsidentiā habent albas, & laeves, & aequales, aut nebulas quasdam, aut suspensa similia, omnes urinas bonitate praecellunt: & praesertim in quibus subsidentiā laevis fuerit. Secundū bonitatis obtinent locum, in quibus suspensa sunt talia. Tertium in quibus nebulae. Haec igitur coctionis sunt signa. Reliquae verō omnes partim cruditatem, partim perniciem portendunt. Nam quae alba, & quae tenuis, & quae turbulenta, cruditatem. At quae farinae hordei crassiori, aut foliis, aut furfuribus similia habet: quaeq; nigra, aut virides, aut livida, aut oleaginea, aut foetida est, perniciem significat. Subrufa & subflava, si tenuis sit, media est inter exacte coctas & crudas: sicuti & illa etiam, in qua alba quaedam & laevis supra efferuntur, aut subsident: divulsa verō, minimēq; sibi continua, siquidem morbum semicoctū ostendunt. At subrubrae urinae, habentesq; statim subrubeam atq; laevem hypostasim, sunt quidem salutare satis, sed semicoctis iis diuturniores. Jam verō in viris quidē atq; mulieribus, urinae nigrae sunt pessimae: in pueris autem aquae similes. Quoniam igitur neq; signum ullum ita fidele est, ut exquisitē ostendat singula ex futuris temporibus: nec quae secundum cōcursus signa sunt complicata, sola possunt judicari experiētia: idcirco necessum est signi cuiusq; naturā accuratē considerare, si quis vult recte praegnosce, ut ex vi uniuscuiusque praecognitionē faciat. Etenim saepe unum signū forte, multis debilibus fidelibus existit. Omnino autē malē quis victū instituet, nisi per fida signa,

statū futurū praecognorit. Triplex in universum signorū omniū est differētia. Nonnulla siquidem cruditatis & coctionis sunt signa: nonnulla salutis & mortis: tertium autē signorū genus est, quod crisisibus adjacet. Coctionis igitur cruditatisq; signa, alvi excrementa, & urinas, & sputa, statuere oportet. Mortē autē atq; salutē nunciantia sunt, quae una cum his excernuntur, & quae per totum apparent corpus. Quantū ad crises attinet, aliqd quidem valent nonnulla ex his: est tamen propriū atq; praecipuū eorū signorū genus. At cruditatis atq; coctionis signa, propria vim habent semper stabile, sive statim in primo die, sive in sequētib. apparuerint. Quaedam itaq; horū signorū in urinis, & alvi excrementis, & sputis apparent: quaedā in dispositione totius corporis inveniuntur: quaedam in naturalib. & animalib. cōspiciuntur operationib. Haec tamen nō omnia fidelia sunt, in omnib. morbi tēporib. Etenim criticorū symptomatū duplex natura est. Siquidē eorū aliqua sunt tanq; causae & signa: aliqua tanq; signa duntaxat. Infida verō est universa eorū natura, & contraria significans in diversis morbi temporib. In his autem totum est praecognitionis studium. Nam in alio quidē tempore secundum aliā dispositionē critica sunt: secundū verō aliā dispositionē, symptomata, vel signa prava fiunt: critica autem nō item omnino. Coctio igitur celeritatē crisis, & salubrem securitatē significat: cruda autē & incerta, & in malos cōversa abscessus, crisiū defectū, aut vehementes labores, aut mortes, aut eorundem malorū reversiones. Porro si quis primo statim die, nullū habens signū periculosum, sed potius salutaria omnia, acutē quidē febricitet, urina autem mingat bene coloratā, ac mediocriter crassam: is certē in primis quatuor diebus crismus est habiturus: & eō magis, si nebula aliqua vel suspensio optima in urina videat: magisq; adhuc, si hypostasis bona se ostendat. Cujus rei nō ignarus Hippocrates, ait: Mitissimae febres, quae cum signis securissimis fiunt, quarto solvūtur die, vel prius. At quae malignitate excellūt, & cum signis gravissimis accidunt, quarto die vel citius occidunt. Sicuti igitur quae omnia habet signa tutissima febris acuta, in primo periodo decretoriorū dierū solutionē habet: sic quae isti proximē adjacet, diē septimā nō transcendet. Similiter etiā maligna, & cum gravibus facta signis, quantū absit à malignissima, & cum gravissimis accedente signis, tantō tardiorē mortē inducet. Sit itaq; primo die urina quidē exquisitē aquea, febris verō debilis, haec sanē in longum protrahet tempus. Sed quātum hoc erit, in primis diebus cognosci non potest, nec cognitu est utile. At praesens principij tempus nō solum internoscere dat, sed etiā sepius praecognoscere quo finietur. Atq; in his quidem adeo diuturnis, sufficienter est tempus principij longū: in peracutis extremē angustū. Nam si statim in prima die, in urinis appareat aliquod signū coctionis, jam hīc principij transgressum est. Similiter etiā acuti principij, ne praecognitionē quidem finis inquirere oportet: sed satis putare, si dum adest, cognosci possit: & cum quāprimum ad ascēsum cōvertit, manifestē deprehendat. Si itaq; aliquod manifestū appareat coctionis signū

Signorum
differentia
triplex.

Coctionis
signa.

Signa mortis
& salutem
nunciantia.

Decretorio-
rum signorū
genus habere
propriū.

Criticorum
symptomata
duplex na-
tura.

Criticorum
symptomata
naturā esse
infidam.

Crisis celeri-
tatem conco-
ctio indicat.

Cruditatis
quid com-
munstret.

Crisis in pri-
mis quatuor
diebus accessu
sua, exem-
plum.

Principij in
acutis mor-
bis cognosci
de ratio.

*Amphimeri
na febris diu
turna.*

*Concoctionis
absoluta im-
becillitas si-
gna.*

*Principij fi-
nem qua in-
dicant.*

*Sputa in
pleuritide,
urinam sub-
sidentis sunt
per similia.*

*Statum tem-
pus in pleuri-
tide quando
iam adesse si-
gnificabitur.*

*Declinatio
in pleuritide
quando adsit
Undecimum
esse indicem
decimiquar-
ti.*

*Vigesimali est
index deci-
mi septimi-
mus.*

*Pleuritidem
iudicari pos-
se die triges-
imo quarto.
Primi dies in
morbo bre-
vibus Valen-
tiores sunt ul-
timis: contra
in longis.*

quicquid interjacet temporis, erit principium mor-
bi. Quantum autem desit ad perspicuum illud con-
coctionis indicium, & a morbi motu, & natura
& anni tempore, & regione, & ætate, & tempera-
tura ipsius laborantis, invenies. Nam si morbus
natura longus extiterit, quemadmodum febris
amphimerina, & videatur tardè in hoc ægrotan-
te moveri: tempusq; anni sit hyems, & regio fri-
gida, ætasq; & natura laborantis ad frigidum decli-
narit, multum interim temporis ad manifesti signi
generationem desiderabitur: quod totum tempus prin-
cipio erit contribuendum. At verò perfecta coctio
est, quando in urinis subsederit aliquid album, læ-
ve, æquale, & continuum: debilis autem est, quando
ex aquosa mediocriter suppallida facta fuerit:
aut etiā turbulenta existens, talis permaneat. Ru-
fa etiam & tenuis ad idem genus spectat. Sed ni-
hil horum jam principium esse finitum ostendit.
Hoc enim manifestius indicium semper expetit,
vel solam nebulam albā, vel suspensionem aqua-
lem, continuā atq; albam. Præterea rubens nube-
cula, & subsidentia talis, & absq; subsidentia pro-
bè colorata urina, & crassitudine mediocris, prin-
cipij finem declarat. Sic & in laterum & pulmo-
num passionibus, ea quæ propriè sputa vocantur, u-
rinarum subsidentis assimilantur. Nihil verò om-
nino expuere, sed rursim tantummodo siccā habere,
tale quiddam est, quale in urinis extremè cru-
dum, quod nominamus aquosum. Quod si ab eo
quod est nihil expuere, *ad expuendum quidem, 30
verū liquida, & omnino cruda, fiat transmutatio,
debilis, & occulta ea permutatio erit: nec absolu-
tum erit tum ipsum principij tempus. At ubi æger
cœperit expuere pauca cōcocta, ac reliquo omni
tempore hinc usq; ad statum, plura & meliora, & fa-
cilis excreverit, tunc sanè expirabit principium, au-
gmentumq; morbi invalescet. Cum verò exqui-
sitè cōcocta fuerint & multa,eductaq; sine diffi-
cultate, tunc status est tempus. Quando verò simi-
liter exquisitè cocta, & sine molestia educta, sed 40
eorū copia imminuta fuerit, dolorq; nō amplius
adsit, tunc cessare statum oportet, sublevari autem de-
clinationem. Sciendum autem est, secundum ipsas
præcognitiones temporum, undecimum diem esse
indicem deci mi quarti: sicuti & vigesimali deci-
mi septimum. Cōtingit autem laborantem pleuri-
tide, die quidem decimo septimo pauca quædam
concocta expuere: sequi autem crissim, sed imp-
fectam vigesimo: ac postea tandem judicari ab-
solutè morbum trigesimo quarto: quemadmodum 50
contigit in Anaxione, cujus Hippocrates memi-
nit tertio Epidemiorum libro. Porro primi dies
tum indices, tum decretorii, valentiores quidem
sunt ultimis, ubi morbus est brevis: eo tamē pro-
ducto, longè imbecilliores redduntur. Igitur per-
fecti ac jam finiti principij manifestum & firmum
est signum manifesta concoctio. Finituri autem,
& morbi natura, & tempus anni, & ætas laboran-
tis: ex abundanti verò, & regio in qua ægrotat,
& modus ejus qui antecesserit victus, cum non-
dum morbo correptus esset. Specialiora verò in-
dicia futuri finis primo ægritudinis tempore, co-
coctionis indicia sunt. Cæterum si integræ crudita-
tis indicia in primis quatuor diebus morbi per-
maneant, longum erit huic morbo principij tem-

pus: si verò debilis mediocriter in ipso apparue-
rit, longum quidem & hoc erit, sed nō priori simi-
liter. Si autem parva fuerint cruditatis signa, futurum
etiā principij tempus erit exiguum. Meminisse au-
tē cōvenit illius aphorismi: Frigidi sudores cum
acuta quidem febre, mortem significant: cum mi-
nori verò, morbi prolixitate. Quæ sanè prolixita-
tas universis ipsius morbi temporibus comuni-
cabitur. Jam verò post summi vigoris tempus sæ-
pe quidem nulla sit crisis, sed paulatim solvitur mor-
bus, longo tempore concoctionem recipiens: at hu-
jusmodi solutionem absolutè crissim non no-
mino. Si qua verò confertim fiat permutatio, &
multo magis adhuc *agitationem quæ illam præ-
cedit, ita appellare consuevi.

GALENI PERGAMENI de crisis, lib. II.

DEinceps autem, quo pacto quis primo sta-
tim die possit morbi naturam cognoscere,
est adjiendum. Cæterum diem per totum
hunc sermonem nostrum, in ea significatione acci-
piemus, ut nō solum lucem, sed etiā noctem cō-
plectatur. Sicuti et mensem ex triginta diebus cō-
stare dicimus: nō id tempus tantum, quo Sol su-
pra terram fertur appellantes diem, sed noctem
etiā ei copulantes. Atq; in hunc modum annum
quodammodo dicimus trecentos & sexaginta
quinque dies continere. Morbus est dispositio quæ
dam functiones lædens: quæ quidem duplex sæ-
pe consistit. Simplicem tamen dispositionem, nemo
qui perspicaci sit ingenio, in primo die ignora-
bit: habet enim propria indicia. Eam verò quæ
cōmixta est, nō omnibus per initia cōtingit agno-
scere. Oportet autem in omnib. simplicibus dispo-
sitionibus sic exerceri, ut earum singulas seorsum,
& jam perfectas promptè noscamus. Simplicem
ita morborum singulorum dispositionem, ante
omnia ipsam per seipsam cognoscere expedit: pri-
mum quidem ac maximè, ex iis quæ secundum
propria ipsi insunt substantiā: deinde jam ex iis
quæ sæpius ei accidunt. Veluti in ea febre quæ ter-
tiana dicitur, non hoc tantum advertas, si tertio
quoque die fiant accessiones desinentes integræ.
Nam si duæ tertianæ fierent, aut duæ quintanæ:
duæ quidem tertianæ quolibet die, per tertium
autem duæ quintanæ accederentur. Quare vel duas
tertianas unam sic quotidianam putares, vel duas
quintanas unam tertianam. Forma itaq; accessio-
num maximè inspicenda est. Porro exquisitæ ter-
tianæ longissimus terminus, septem absolvitur
circuitibus. Fiunt autem tertianæ plurimæ, ut etiā cō-
tinuæ & ardentes, æstivo tempore, ubi secundum
naturam se habet. Etenim quemadmodum hyems
præ omnibus anni temporibus humidissima &
frigidissima existit: sic æstas, siccissima simul &
calidissima, dummodo propria naturam retineat.
Nec enim debes existimare, quod propter anni tem-
porum appellationes, singulæ ægritudines accidant
tales scilicet vel tales: sed propter ambiētes aeris
temperaturam. Nam qualem hic naturam sortitur,
ita etiam nos afficit. Similiter etiam regio & tem-
peries hominis calida & sicca, plurimorum febrium
feracior est, iis quæ temperamentum contrarium pos-
sident. Quod si etiam victu calidiori & sicciori
usus

usus aliquis fuerit, hoc est, laboribus, vigiliis, curis, & anxietatibus, cibisq; paucioribus & biliosioribus, nōne etiam in hoc ipse seipso biliosior reddetur, ac proinde calidior & siccior? Atq; hæc sanè quæ diximus, cōmunia sunt ardentium febrium & tertianarū generationis. Etenim tertiaria accessio ab acutissimis maximèque adurentibus febribus nullo modo relinquitur: sed hoc discrimen interest, quod in hac, per totum corpus bilis deferitur, atq; ideo vehemens fit rigor, bilisque supervenit vomitus, atq; urinae & sudores biliosi adsunt: in aliis verò adurentibus febribus, quæ nullam habent intermissione, flava bilis in vasis unà cum sanguine cōtinetur: id quod certè est in causa, ut in tertiana febris per sudores vomitusq; finiatur: in adurentibus autè, singulæ accessiones ad infebriationem non pveniant: quoniā qui earum est causa humor, non expurgatur. Sed quādo in his bilis agitur vehementius, ac veluti effervesceat, à naturaq; invalescente impellitur, tunc rigor supervenit, & febris solvitur. Nā ardens febris, si superveniat ei rigor (ut inquit Hippocrates) solvitur. Quod verò non modò causa frigida, sed acris etiam & calida, rigorem faciat, in libro de symptomatum causis ostendimus. Etenim acres & mordaces humores vehementius emori agitatiq; & per sentientia corpora violenter delati, stimulant, pungunt & feriunt: atq; hinc sensum inæqualem, rigorem, cōcussionemq; invehunt. Tertiaria itaq; febris, quæ ex flavabile motu ortū habet, rationabiliter statim ab initio rigore affert nō mediocrè: hoc ipso primū à quartanæ rigore differente, quoniā in illa quidem pungi videtur ac percuti corpus (talis enim est in tertianis febribus sensus rigoris) in quartana autè febre similem frige factionē habet, qualis per gelu, tempore hyberno sentitur. Quippe in quartana febre atra bilis redundat: sicuti in quotidiana, pituita. Tertiaria igitur febrem * minimè quidem licet absq; rigore vehementi, pungente atq; feriente carnem, oriri. At quartana febris nō primo statim die cum rigore invadit vehementi, sed progrediente ipsa, atq; aucta, unà etiam rigor quidam gravis, ac veluti ossa cōtundens, augetur. Quotidianas autem nō comitatur rigor, nec in initio, nec in progressu, sed frige factio dūtaxat. Præterea quartanæ febres parvos, debiles, tardos & raros adeò pulsus efficiunt in invasionibus, ut nulla altera dispositio: tertianis verò parvi quidè ac debiles, tardiq; ac rari, cum invadunt, pulsus necessariò adsunt. Verū tarditas ac raritas nō parvo ab iis intervallo relinquitur, quæ in quartanis accidunt. Nam in quartanarum principiis videbitur tibi arteria quodam modo ad interiora retracta, impeditaq;: in tertianis verò, nec aliqd tale percipitur, tarditasq; propè accedit ad eum qui secundum naturā est motus: ac præterea certus ordo æqualitasq; pulsibus inest. Habet etiam tertiaria febris per incrementa, æqualem liberamq; celeritatem: statimq; ad magnitudinē atq; vehementiā excitatur, hisq; omnibus frequentia correspondente: neq; ipsi ullū adest inflammatiōis signū. Jam igitur & sitim invehit, & hominē exurit, & paulò post in vigore consistit: calor æqualiter quaque versus extendi-

tur nihiloq; plus thorax extremitatibus calet: & si manum imposueris, in primo occurso quidem percipitur calor multus & acris, quiq; velut quodam cum vapore efferatur: paulò post verò superatur à manu: non ut in febribus malis & adurentibus accidit. Ac jam sanè bibendi tempus ægrotanti instat, statimq; post potum plurimus vapor calens per cutem exhalat, sudoris nuncijs, bilisque supervenit vomitus, venterq; solvitur, & biliosum mingunt. Incipit itaq; sudor vapidus calidusq; veluti in balneis: totum verò ipsis corpus æqualiter sudat, talisq; est pulsus, qualis in iis qui rectè valentes exercitantur & balneantur velox scilicet, magnus, vehemens & creber. Sed præter hæc omnia statim ad infebriationē desinit, universum accessiois tēpus ultra duodecim horas nō protrahēs. Sæpius aut septē horas accessio cōtinet. Nōnunq; citius aut tardius, sed non multò, finitur. Descripsimus itaq; veram & exquisitā tertianam. Quod si urina reddatur rufa, aut subflava, appareatque crassitudo mediocris: ac paulò post, vel albam nebulam, vel suspensionem optimam fecerit, febris ipsa ultra quartū circuitum non progredietur. Rufiore verò urina existente, neq; suspensione aliqua, nec nebula in primo circuitu apparente, ad septimum extenditur. Quod si præter alia signa, in urinis appareat subsidencia lævis, æqualisq; circa primū statim diem, ultra tertium circuitum ipsa febris nō divagabitur. Ingruente autem accessione quartana, eximia quædam ad tarditatem ac raritatem fit pulsuum conversio. Solet porro quartana febris maximè oriri in autumnō, præcipuè si tempus ipsum frigidam & siccam, & inæqualem fortietur temperaturam. Quod si etiam regio talium febrium sit generatrix, & ægrotantis natura atræ bili obnoxia, talisque victus ratio antecesserit, quæ huiusmodi aggregarit humorē: & si eo tempore quartanæ febres populariter fiant, homoq; lienosus fuerit, vel febres erraticas passus: si augmentum & status plurimum cōtraria fuerint, tenuesq; & albæ & aquosæ urinæ reddantur: si in quā hæc omnia indicia in prima accessione adsint, quartanam esse febrem non dubites. Sed quotidianam à tertiana distinguere facilius est. Neq; enim primo statim die cum rigore invadit, sed progressu temporis refrigerationes potius quàm rigores ipsis adveniunt: neque ullus ordo aut æqualitas pulsibus affidet, cum primū accessiones fiunt. Sed nec deurunt laborātes, nec denudare corpora, & pallia jactare cogūt: nec multum ac frequenter respirare, ac veluti flammam ex ore efflare, frigidumq; potum expetere. Verū isti cum febricitant, minimè sitiunt: urinæq; ipsis in primis diebus tales sunt, quales quartanis incipientibus adsunt. Atq; in primis diebus minimè sudant: sed progrediente tempore hoc etiam illis advenit. Eget autem hæc febris, natura humidiore, vitaq; ociosa, & plena crapulis. Quare in pueris assidue fit: ac perrarum est, quin & os ventriculi, & hepar in ipsis malè afficiatur. Sed et cruditates antecedunt plurimæ, & coquēdi moræ, & acidi ructus: & cum primū febre incipiūt præcordia ultra naturalem habitū intumescunt. Color hic cum pallore albus: taliumq; morborū

Tertianæ correptis quo accessiois tempore est potio danda.

Tertianæ accessio ultra duodecim nō protrahitur hora.

Tertianæ exquisita descriptio.

Tertianæ brevem solutionem quæ urina indicent.

Quartanarum febrium signa & symptomata.

Quotidianæ & tertianæ febris discrimin.

Quotidianarum febrium indicia.

Quotidianæ cur assidue pueros in vadant.

*Quotidiana
quo prae
gignatur
tempore.*

hybernum tempus est ferax, & status temporis humidus, & ejusdem naturae locus: fitq; accessio num principium circa vespeream. Ita quidem quotidiana, tertiana, & quartana, prima die invicem discernuntur. Continuas autem febres, quae idem genus cum ijs quas diximus habet, similiter primo die vir exercitatus cognoscet. Etenim exquisita ardens, cum omnia alia servet exquisitae tertianae indicia, eo solo differt, quod neq; cum rigore invadit, neq; ad infebrecitationem desinit.

*Ardentium
exquisitarum
& tertiana
febris discrimen.*

*Continua quo
tidiana de
scriptio.*

Qua vero quotidie accessionem facit, quando temporis statum, & aetatem, & naturam corporis, & victus rationem antecedentem, ac praeterea pulsum formam, coloremq; eundem habuerit cum exquisitis quotidianis, non pervenerit autem ad infebrecitationem, idem genus cum illis obtinet. Eodem modo & quae quarto quoque die accessionem facit sine ulla intermissione, nulla interposita febris quiete, ejusdem est generis cum quartana. Et palam est, quod nec rigor in ea

*Continua
quartana de
scriptio.*

*Continuarum
& intermittens
februm discrimen,
secundum
modum
generationis.*

igitur in sola flava bile febris accenditur, sine aliquo affectu visceris, si quidem manente adhuc intra vasa bile accendatur, exquisita febris ardens dicitur: si vero per totum corpus deferatur, tertiana. Sic & si ab atra bile fiat febris, cum per totum corpus delata fuerit, quartana efficitur: cum immobilis, illa quae quarto quoque die excrecit: quae admodum si ex pituita ortu habeat, vel quotidianae sunt, vel quae acceduntur singulis diebus.

*Febris continua est, quae
ad infebrecitationem,
prius quam
solvatur, non
desinit.
Deurentis
febres.*

In universum autem voco continuam febrem, quae ad infebrecitationem, antequam ex toto solvatur, non desinit: etsi declinatio aliqua sensibilis in ea deprehendatur. Cum vero nec declinatio aliqua sensibilis fiat, semper vero a primo principio febris usque ad crismum similis perseveraverit, erit haec ex genere febrium deurentium, ab iisdem vero acutie differet. Sed nec in primo die, nec in secundo est huiusmodi febrem praecognoscere, nec aliter utile. Sat enim est genus agnoscere, quod scilicet biliosa sit, deurens, & peracuta. Atque huius generis febres omnes in prima septimana dijudicantur: si vero tertiana pura fuerit, intra septimum circuitum. Omnino autem diuturnae sunt, & quotidiana intermittens, & illi adhuc continua, sicuti & quartana, & quae per quartum excrecit. Quare tria erunt universa simplicium febrium genera. Singula vero ipsorum in duas primas differentias scinduntur: vel enim intermittentes, vel febres continuae erunt. At si morbus compositus fuerit, non aequè facile cognoscetur. Dupliciter vero genus febris compositum constituitur: in prima quidem sectione, vel quia ex quas diximus febres citra alicujus membri affectum miscentur: vel quia ex membri cujuspiam inflammatione accenduntur. Quae igitur citra membri affectum consistunt, dupliciter comiscentur: aliquando implicatae, nonnunquam vero per se totas confusae. Sic quoque membra inflammata: nam ex ipsis quaedam sanè veluti complicantur tantummodo, quaedam vero veluti confusionem quandam habent dispositionum. Ac febres sanè, quaedam complicantur unius generis cum aliis ejusdem generis, vel unius speciei cum aliis ejusdem speciei. Contingit vero nonnunquam, ut etiam differentes misceantur. Nam

*Tertiana prae
sertim intra se
ptimum cir
cuitum ab
solvitur.*

*Febres diu
turnae quae.*

*Febrium sim
plicium tria
genera.*

*Febrium ge
nerum composi
tum, consti
tuit duplici
ter.*

*Febres quo
modo inter se
misceantur.*

quotidianae tertianis, & his quartanae, & quae eadem speciem servant, invicem plerumque implicantur. Quo fit, ut idem homo tres interdum habeat quartanos circuitus: sed hos quidem non est difficile agnoscere. Quandoque vero aliqua ex intermittenti genere cum continua, difficillimam vixque explorabilem facit missionem. Porro quemadmodum febres, ita & patientia loca missionem recipiunt: vel quia differentia membra propria singula febrim accendunt, ut lien & jecur: vel quia dispositio mista, veluti inflammatio cum erysipellate, aut erysipelas cum inflammatione miscetur. Pro differentia enim affectuum particularum, atque etiam earum affectuum, solent etiam ipsae febres variari. Ubi igitur singula accuratè distinxeris, tunc sanè facile missionem deprehendes. Nulla autem est nec species, nec genus, quod circa tertiam vel quartam diem, cujus naturae sit, innotescere nequeat. Invadat igitur febres aliqua horrida, atque omnino inaequalis in pulsibus, & in eo qui per totum corpus sentitur calore, ut saepius propius statum esse existimetur, vel medium augmenti obtinere. Rursus vero horrida fiat, & pulsus minores, debiliores, tardiores, atque rariores habeat: & calorem quidem ab extremis partibus recedentem, circa vero ventrem atque thoracem, copiosum. Hanc non absque ratione quispiam hemitritum fore speraverit, vel potius jam esse: à multis autem tertio die noscetur. Sed haec quidem mixta est, ex biliosa pituitosaque febre, non invicem complicatis, sed per se totas confusis. Quae autem ex complicatione fit, quadrupliciter consistit. Vel enim tertiana quotidiana commista: vel ea quae quotidie accessionem habet continua, illi quae per tertium continua est: vel tertiana ei quae singulis diebus accessionem facit continua: vel quotidiana ei quae per tertium continua est. Si qua vero febris in primo die exquisita tertiana deprehensa, deinde sequenti die similem priori omnino fecerit accessionem, haec duplex tertiana existit. Sic autem & duae & tres quartanae saepius invicem complicantur, quas accessionum forma à quotidianis distinguit. Tria igitur sunt omnia quae ex humorum putredine febrium accenduntur genera: quaedam enim ex flava bile (haecque plurimae sunt) quaedam extra, quaedam ex pituita consistunt. Aliarum autem omnium febrium varietas, ex miscella humorum nascitur. At ephemerae et hecticae febres alia duo constituunt genera, ab iis, quae dicuntur acutae febres, distincta. Porro febris acuta, vel aliquo dictorum humorum coputrescente, vel membro phlegmone obfesso, gignitur. Mirantur autem nonnulli, quod possit intermittens febris cum continua misceri, quodque nulla intermissione accedente febris, interdum solae intermittentes mutuo inter se misceantur: idque accidit non in tertianis tantum, aut quotidianis intermittentibus, sed etiam in ipsis quartanis. Cum enim plures invicem complicantur, sive ejusdem generis, sive diversi, accidit ut febris secunda plurimum anticipet advenire, antequam prima in exactam integritatem desinat. Deinde rursus tertia eidem succedit, antequam perfecte solvatur. Hoc vero maxime accidit in longioribus accessionibus. Etenim trium tertianarum complicatio, in secundo statim die nobis mani-

manifestatur. Quam circum tribuunt demum homini. Patientia quae effectum impli-

Quam

circu

tribu

untur

demum

homi

ripi.

Patie

ca quae

effectum

impli

Hemi

febris

ptio.

Hemi

consta

biliosa

tosae

per se

confus

ex ijs

ter se

catu:

fieri q

placite

test.

Tertia

plex q

adesse

tur.

Febris

tribu

ex occa

bus pos

manifestè est conspecta. Earum verò febrium quæ ex locis parentibus accidunt, forma composita est. Quædam enim loci indicia præ se ferunt: quædam autem ejus, ob quam consistunt, causæ. Veluti in morbo laterali locus quidem patiens est, costas succingēs membrana. Quæ quidem cum inflammata sit, necessario dolorē invehit, quoniam nervosa est: sed hunc pungentem, & longè extensum, quoniam pars affecta, est membrana. Quæ quidem cum unum sit ex spirandi instrumentis necessario difficilem habebit respirationem animal. Quia verò & cordi & pulmōni proxima est, necessario & febricitabit, & statim instabitur tussi: nō tamen statim expuet. Sed si quidem multū ac crassum ab inflammatione defluerit, tunc tussi expuet: si verò paucū & tenue, irritabitur quidē necessario, ita ut tussis moveatur: nō tamen expuet, anteq̃ collectum simul atq; cōcoctum ad multitudinē crassitudinemq; pervenerit. Nunquid verò magis pituitosus sit, vel biliosus humor, is qui inflammationem facit, ex forma sputorū cognoscas. Nam si sputa sint spumosa, fluxum maximè pituitosum ostendunt: flava autem, biliosum impermixtū: quæ verò rufa sunt, amarā quidem & ista referunt bilem, sed non paucā serosā humiditatem cum bile misceri significant: & multo ampliorem, quando pallida quis expuerit. Sic & nigra, atræ bilis fluxum ostendunt: sicuti quæ magis rubida sunt, plurimū quidem sanguinis: minimum aut amaræ bilis, in eo qui inflammationem facit, contineri significant. Atq; ideo inter omnia sputa hæc sunt mitiora: sicuti nigra, magis exitialia. Pulsus igitur pleuriticorum, quā quidem durā præ se fert tensionē, nervosum esse locum affectum ostendit: quā verò serræ similis est, inflammationis affectum. Quā velox simul & frequens, ac magnus, ad inflammationem consequi febrem. Quā singula quæ diximus, majora aut minora sunt, vel magnā esse, vel parvā ostendit dispositionem. Igitur aut simplex est febris, aut cōposita: vel cum loco patiēte, vel ephemerā, vel hecica. Si simplex omnino fuerit, humoris indicia affert, ex quo genita est. Si verò composita, ex quot simplicibus febribus composita est, totidem numero humorū multitudinem indicabit. At si hoc indicet, illud etiam significabit, nūquid morbus diu durabit, an citò finietur. Nam si humor pituitosus extiterit, necessario diuturnus erit: longè verò magis, si atræ bilis naturam referat. Quod si ad flavā bilem inclinet, minimè quidem diuturnus erit. Sic & locus patiēs, qui quidem motu multo exercetur, calidusq; est, ac rarus, & principatū gerit, acutiorem fore morbum portēdit. Qui verò neq; in motu continuo est, frigidusq; ac densus, & sine principatu existit, ad longius tempus debere extendi significat. Eodem modo & dispositio, si quidem difficilem motum habuerit, frigidiorq; fuerit ac densior, diu duraturum: sin autē facile moveatur, calidiorq; fuerit, & rarior, citò solutum iri. Similiter & de causis est judicandum. Eas igitur quæ cum magno ac repentino certamine fiunt solutiones morborum (quæ præcipuè crises vocantur) febrium earum quæ ex calidis humoribus accenduntur, proprias esse est putan-

dum. Post has, earum, quæcunq; membrorum sunt principatū habentium, facile mobiles calidæq; dispositiones. Ephemeræ verò & hecicæ febres, sine magna perturbatione, & minimè subitas faciunt permutationes. Ergo in omnibus inflammationis particulis constipatio ipsa, quæ locum probè diffilari prohibet, statim quidem putrefacit humores, simulq; quendam calorem excitat, qualis & in reliquis omnibus putrescentibus gignitur. Cujus caloris modus, cum simplex fuerit, necessario alicui earum, quas diximus, febrium assimilatur: vel potius una ex illis est, vel ad a-

Constipatio febrem quæ ratione gignat.

Inflammationem gignit vel flavā bilis, vel atrā, vel pituitā.

Bilis quos edat tumores.

Atræ bilis quales tumores gignat.

Pituita gignit oedemata.

Sanguis producit propriam dictam inflammationem.

Sanguinem putrescentē ad amarā bilis naturam transire.

Humorum generationes atque permutationes.

Febrium missionem non ignorabit, qui singulas simplicium cognovit.

Ephemeræ febres, solius spiritus sunt passionēs.

Ephemerarum febrium causæ.

Ephemerarum febrium indicia.

Curabilibus morbis. Quæcunq; verò ingruente pituita in tumorem attolluntur, hæc oedemata nuncupantur. At qui sanguis atræ bilis est permixtus, duras gignit inflammationes: erysipelatibus verò similes, qui amaræ inflatas, qui pituitæ. Cum verò ipse secundum naturam se habens sanguis, trusus in locum fluxioni obnoxium putruerit, hic quidem affectus inflammatio est. Simplex verò ex ipsa febris accenditur, maximè ephemeris similis, quæ ex inflammationibus inguinum accidunt: nam & ipsa inguinis inflammatio ex optimo sanguine fit. Liquet autem, quæ cum hic putrescere cœperit, non amplius bonus remanet, sed jam ad amaræ bilis naturam transit. Atq; in hoc illud servatur, triplex esse genus universum simplicium febrium. Quæ enim ex sanguinis putredine fit, jam quodammodo biliosa est. Etenim sanguis ex moderato calore gignitur: flava autē bilis, ex majore: atræ verò ex impensè immodico. Quicquid igitur pingue ac tenuē in sanguine est, fit flava bilis: crassum verò, ac veluti sæx, quando immodicè exaruerit ex calfactum, atræ. Flava etiam bilis quandoq; in atram cōvertitur, cum assata fuerit. Omnes igitur quæ in particula aliqua accenduntur febres, unum aliquem ex dictis, vel simplicem, vel cōpositum characterem habebunt. Qui verò singulas per se febres exquisitè cognovit, earum is missionem nō ignorabit. Ephemeræ febres solius spiritus sunt passionēs, absq; humorū putredine, aut membri inflammatione, nisi inflammationis inguinibus accidant. Earum autem generationis sunt occasiones cōmunes, vigiliæ, cruditas, tristitia, timor, curæ, iracundia, deustio, refrigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcunq; similia. Cōmuniter omnium pulsus promoveretur ad parvitatē atq; frequentiam, & nonnunq̃ ad magnitudinē. Exquisitè autē servat eam quæ secundum naturā est, æqualitatem, mollitiem, & ordinem. Sic & urinæ, nōnullæ quidem, suspensiones, nōnullæ verò subsidentias bonas habent, quædam autē nebulas. Omnes verò probè coloratæ sunt, sicuti & in omnibus calor vapidus est: atq; ab omnibus ipsis absunt maligna accidentia. Cōmunes autē sunt omnib. & urinæ rufiores. Cæterū iis qui ob tristitiam febricitant, acrimonia potius

*Tristitiam
qua signa
quant.*

*Oculorum ex
signis, in sa-
nis etiā ani-
mi affectus
cognosci.*

*Vigiliis ma-
ceratorum si-
gna.*

*Iracundorū
signa.*

*Febrientium
ex lassitudi-
ne signa.*

*Ephemerā
ex densata
cutē.*

*Ephemerā
ex bubone or-
tas qua ar-
guant.*

*Hæticarum
februm nul-
la fit statim
in primis die-
bus, sed in
progressu.*

*Crisis per ex-
cellentiam
dicitur sub-
ita permuta-
tio morbi ad
salutem.*

*Crisis mala
Crisis imper-
fecta.*

*Crisis optima
fit cum sub-
itis excretio-
nibus aut ef-
fatu dignis
abscessibus.*

*Crisim præve-
nientia sym-
ptomata.*

adeſt, q̄ multitudo caloris: ſicuti iis qui ob iram, contrario modo. Sed & tenuitas corporis in iis qui triſtitia, q̄ in iis qui curis vexati ſunt, mani- feſtius apparet, & oculorum cōcavitas, & inſolita quædā decoloratio. Et hæc quidem cōmunia o- mniū etiā aliorū, qui quocunq; modo cogitatio nibus impliciti fuerint, indicia ſunt. Sed præci- pue ex oculis ſunt diſcernendi: licet enim ex his etiā in ſanis animi affectum cōjicere. Eos qui ni- miū vigilaverunt, diſtinguit decolorationis mo- dus: ſubtumida præterea iſtis eſt facies, palpe- bræq; nō facile attollūt, oculosq; habent præhu- midos. Iracūdis neq; oculorū cōcavitas, nec ma- niſteſta ineſt decoloratio. Sed nec magnitudo pul- ſuū aufertur. Eorū verò qui febriūt ex laſſitudi- ne, cutis eſt ſiccior, q̄ in aliqua alia febrium ephemerarū. Quæ ex denſata cute febres oriūtur, ſo- læ inter omnes ephemerā in paſſione aſtricta cōſiſtunt, facileq; dignoſcūtur ex tactu: ſicuti & aridæ febres quæ ex laſſitudine fiūt. Caliditatis aut motus in iis quodāmodo augeſcit. Earū ve- rò febriū ephemerarū, quæ ex bubone accendū- tur, pulſus maximi ſunt, veloces atq; frequentes, calorq; plurimus, qui poſt ſtatum ſtatim ex pro- fundo attollitur, ſed ſuavis. Præterea rubea fa- cies magna ex parte iſtis ineſt, & major tumor, & urinæ ſubalbæ. Cōmunis autē his febribus in- eſt æqualitas pulſuū. Quia verò nulla hæticarū febrium in primis diebus, ſed in progreſſu tēpo- ris fit, de illis non agemus impræſentiarum.

GALENI PERGAMENI de Crisibus, lib. III.

UBi morbus ſubitò ad ſanitatē pervenit, ea permutatio omniū optima eſt, atq; i- deo ipſam per excellentiam criſim voca- mus. Ex aliis autē permutationibus, quæ quidem ad ſubitam mortē fit, mala criſis exiſtit. Quæ ve- rò aliquam effatu dignam mutationē efficiunt, non tamen integram ſolutionē, imperfectæ cri- ſes vocātur: ſicuti & quæ ſenſim emoriente vel virtute, vel morbo contingunt: quæ ſolutiones ſimpliciter, non criſes vocari debent. Sola igit ſubita ad ſanitatē converſio, ſimpliciter criſis vo- catur: quæ fit ſubitis quibuſdam excretionibus, aut effatu dignis abſceſſibus. Quicunq; enim ali- ter quieverint, retrocedunt malignius. Anteced- it aut huiuſmodi excretiones abſceſſusque non mediocriſ perturbatio in ægrotantis corpore. Nam anxietates, vigiliæ, dementiæ graves ſom- ni, reſpirationes difficiles, vertigines, ſenſuum difficultates, dolores capitis, colli, ſtomachi, & multorum aliorum membrorū: nonnullis verò aurium ſonitus, & vanæ ante oculos apparent imagines, & lachrymæ involuntariæ effluunt, & urina retinetur, & labrū agitatur, & aliquid tre- mulum fit: obliſio præterea, & præſentiū igno- rantia, & vehemens rigor accidit, & plurimum accēſſio conſuetam anticipat horam, & multus æſtus, ſitisq; inexpugnabilis ſequitur: clamant & ſaliunt, ſicuti furentes, nec poſſunt in eodem ſitū recumbere. Deinde repente multus ſudor e- rumpit, aut vomitus nō exiguus inſequitur, aut venter ſubitò ſolvitur, aut abundans fit fluxus ſanguinis, aut hæc omnia ſimul contingunt, un-

de non parvus invadit timor adſtantes. Ut igit- tur qualē ſit habitura exitū præſens criſis, agno- ſcas, prævideas autem futurā, primū ac maximē omniū expendendæ coctiones ſunt ex urinis, al- vi excrementis, atq; ex ipſis ſputis. Quippe nemi- nem vidi intereuntē, qui præcedentibus coctio- nibus, criſim ipſam habuiſſet. Non tamen æqua omniū ſignorū dignitas exiſtimanda eſt: ſed in morbis quidem thoracis atq; pulmonis, præci- pue ſputa ſunt exploranda: non tamen urinarū contemplatio explodenda: ſed & excrementa ſunt inſpicienda. Si verò tantum febricitet abſq; alicujus viſceris affectione, * aut ſi etiam aliquid eorum quæ circa hepar, renes, veſicam, atq; ſple- nem habentur, phlegmone obſeſſum ſit, maxi- mē urinæ eſt intendendus animus. Sicuti ſi cir- ca venicū paſſio conſiſtat, primū excre- menta alvi inſpicienda: ſed neque interim ſunt negligendæ urinæ. Primū itaq; & maximum in- ſtantis bonæ criſis indicium, ſunt cōcoctiones, Secundum autem, quòd ab aliqua die indicato- ria, indicata prius fuerit, cui annexa ſit diei ipſi⁹ judicantis facultas. Deinceps verò inſpicere o- portet, & ſpeciem morbi, & morem: ac poſtea, ſi formæ morbi, ipſa excretio reſpōdeat. Etenim ſi febris exurens ſit, vel ſanguis ē naribus pro- fluet, vel poſt vehementem rigorem ſudor mul- tus & calidus per totum corpus manabit: aut per vomitum, aut per alvum, bilioſum aliquid excer- netur. Ita & tertiana vomitibus & excremen- tis bilioſis, & ſudoribus toto corpore fluentibus, finiri debet. Plurimum autem pituitē in febribus excernitur quotidianis, & multi per totum cor- pus ſudores fiunt. Finit autem & phrenitidem ſu- dor multus, præcipue ſi calidus ē capite fluxerit, ſudante ſimul reliquo corpore. Contingit etiam interdum, ut per ſanguinem fluentem ē narib⁹ phrenitis etiam ſolvatur. Non tamen lethargus, aut peripnevmonia fluxū ſanguinis amāt. Inter ipſas autem pleuritis medium obtinet locū. Lie- nis etiam hepatisq; ſolvit inflammationes, ſi ſi- mul adſit acuta febris, ſanguis ē naribus pro- fluens: ſicuti & reliquas omnes, quæ ſub præcor- diis fiunt, ferventes & acutas inflammationes. Oportet autem per directum fluere ſanguinem, ex dextra quidem nare, patiente hepate, vel lo- cis ſub dextris præcordiis poſitis: ex ſiniſtra autē, liene, & locis vicinis. Juvat etiā & ſudor bonus omnes quæ ſunt juxta præcordia inflamnationes calidas & acutas. Hepatis verò cōvexæ quidem partes patientes, fluxibus ſanguinis ē nare dex- tra, ſudoribus bonis, copioſisq; urinæ ſolvuntur. Cavæ autem partes excrementis bilioſis atq; ſu- doribus: nōnunq; verò & vomitibus. Sudores ta- men omnibus febribus proprii ſunt, & præcipue exurentibus. Finiunt autem quartanas febres, ſi atra ſimul cum eis atq; varia excernantur: ſemi- tertianas verò, ſi bilioſa ſimul & pituitoſa. Sol- vunt etiam parotides, lethargos, reliquosq; om- nes affectus capitis. Porro cæteri abſceſſus, fe- bres omnes diuturnas ſecurè ſolvere conſueve- runt. At verò ægrotantis ætas atq; natura, præte- rea victus ratio antecedens, locus in quo ægro- tat, anni tempus, præſenſq; ſtatus temporis, ve- niunt cōſideranda. Atq; ex his quæ diximus licet exer-

*Concoctio
eſſe expen-
das ad cu-
ſcendam
ſentem*

*ſim, ac præ-
dendam
turam,*

*Interiſſe
liquem*

*criſim præ-
coctione
præceden-
habuiſſet*

*vidit G.
nus uno*

*Excretion
corporis,
in quibus*

*morbus præ-
cipue ſint
pendendū*

*Criſis bonæ
& inſtan-
indicia.*

*Ardentia
bris ſolvi-
cum quæ*

*excretion
bus fiat.*

*Tertiana
lutionem
cretio bilio-
ſatur.*

*Quotidian
rum ſolvi-
quas exi-
tiones am-*

rat.

*Phreni-
tis quib. ex-
cretionibus
ſatur.*

*Sanguis
ribus atq;
directo*

*fluens, quæ
ſolvat in-
flamnationes*

*Hepatis præ-
cordiis quibus
cretionibus
ſolvi ſoleant*

*Sudores
omnes ſunt
bribus præ-
cipue*

prej.

*Sudores, quæ
diſſolvunt
ſectus.*

exercitatis viris præsentē crīsim cognoscere. Ad præcognoscendam verò futurā, illa quæ nuper diximus, unā cum natura morbi similiter expendenda sunt. Post hæc autem & accessionū circuitus veniunt considerandi, an per tertium, vel per quartum, vel per singulos dies eveniāt, vel nullo modo eveniāt, sicuti in synochis accidit. Si enim properaverint, ac semper proportionabiliter anticipaverint horā, aut multò vehementius infestaverint, & per tertium occurrerint, citò crīsim subsecuturā denunciāt. Si verò lentē moveātur, atq; eadē invaserint hora, & singulis diebus fiāt, post longius tempus crīsim futurā portendunt. Præterea coctiones inspicere oportet: quarū insignes permutationes, si in diebus indicatoriis accidant, indicia sunt, quòd sequentes judicatorii dies ægroto absolvēt morbo. Minimè autem contingit, febrem omnia signa securissima habentem, nec illam, in qua sunt omnia maximè pernicioſa, alteram quidem nō liberare, alteram verò non occidere in primo quaternario ægro-
rantem. Cum autem unaquæque accessio quatuor habeat partes, principium, augmentum, statum, & declinationem: vel has omnes brevi tempore accessio percurrit, vel tardo: vel nonnullas quidem citius, nonnullas verò serius. Si omnes igitur celeriter peragat, manifestū inde fit, quòd ad crīsim properat: omninoq; huiusmodi febris est de numero intermittentiū. Neq; enim contingit, ut illa quæ omnes celeriter peragat, amplius continua permaneat: sicuti neque ut quæ in omnibus partibus prolixitatem servat, sit intermittens. Voco febrem intermittentem, quæ ad infestationē pervenit. Porro febris synocha longus est status: imò verò tota hæc febris status est. Cum igitur morbi species, & magnitudo, & motus, & mos, inter se distinguantur: & species quidem sit ex propriis accidentibus cognita: magnitudo verò, ex eorundem quantitate: motus, ex tempore accessionis partiū: mos, ex accidentibus supervenientibus: his quoq; adjuncta consideratione temporis anni, & naturæ, & regionis, & similitum: nunquid morietur æger, aut servabitur, ad hæc tria respiciens invenies, ad speciem, & morem, & magnitudinem: sed præcipuè morem expendere oportet. Utrum verò per crīsim terminabitur morbus, an non, primum quidem ex motu ac magnitudine perspicies: deinceps autē ex ipsius specie: postea ex anni tempore, & ex aliis quæ eiusdem sunt ordinis, & ex supervenientibus accidentibus, quæ vel unā cum crīsi ab initio invadūt, vel paululum anticipant. Nā cum supervenientia accidentia dividātur trifariam: in ea scilicet quæ morē morbi natura ostendere apta sunt: & in ea quæ affuturam proximè crīsim denunciāt: & in ea quæ non solum signa, sed etiā causæ crīsis existunt: primum quidem ex his simplex est genus: secundum verò & tertium nō semper, neq; idem facere neq; ostendere est aptum, sed variatur secundum tempora. Si æger igitur primo die habeat signa salutis manifestissima, huic in primo quaternione solvetur morbus. Utrum verò per solutionem vel crīsim, magnitudine & parvitate distinguitur. Magna siquidem, judicantur omnino: parva autem duntaxat

solvuntur. At dies crīsis ex ipso motu invenietur. Nam si febris synocha fuerit, nullusque acciderit error, sperandum est crīsim quarto futuram die. Si verò continua fuerit, magnitudinē ac motum inspicere oportet. Convenit namq; in tertio vel quinto die crīsim fieri: in tertio quidē, si morbus sit magnus, ac motum habeat velocem: in quinto autem, si nec valde magnus sit, nec moveatur velociter. Oportet enim crīsim in idem tempus incidere cum accessione. Ob idq; raro accidit, ut in quarto die continuarū crīsis videatur. Continuae itaq; febres, quæ in accessionibus crīsim habent, tertio die, vel quinto, rationabiliter finiuntur. Adjuvat motus celeritatē morbi magnitudo, & anni tempus, & regio, & ætas, & quæ cunq; alia amarā bili conveniunt. Tarditati autē motus insunt contraria. Cæterū principii signa, si diutius perseverarint, diuturnū fore morbum significant. Augmenti verò, si in quarta vel septima die apparuerint, sperandum aliquid in quartodecimo est: id tamen undecimo designabitur. Nam si hæc tria in eo die conjuncta fuerint, & motus velocitas, & febris magnitudo, & manifestum coctionis indicium, fiet crīsis in quartodecimo. Si verò solum manifestum coctionis signum die undecima appareat, nec tamen morbi magnitudo, aut morbi velocitas festinarint, tunc ultra diē decimum quartū differetur crīsis. At si nec die decimo quarto aliquid innovatū fuerit, qd sit exquisitum, tunc ad diē decimū septimū est respiciendū. Si enim in eo apparuerit aliquod signum, id fidissimū erit, quāvis sit perexiguū, crīsimq; vigesimi diei præmostrabit. Quæ igitur crīses post signa optima, & exquisita factæ fuerint coctionē, eæ necessariò erunt optimæ; quoniā & sola coctio, crīsis celeritatē salubrē ostendit. Exquisita verò sit coctio tēpore status. Cum igitur forma victus ad statū instituatur, & crīsis optima in illo fiat, utiq; omniū crīsum ipse erit regula. Quæ enim huic est proximior, altera magis distans est potior. Quare in nulla re adeò exercitandus est medicus, ut in status præcognitione. Etenim quicūq; morbi status tēpus præterierint injudicati, hi sine crīsi perseverāt, & paulatim solvuntur: nullūmq; periculū est, status tempore elapso, quantū iudicio assequi possum. Qui verò perierunt in declinationibus, omnes ij aut proprio sunt, aut errore medicorū extincti, nequaquam vi morbi. Ubi enim natura superior evasit, restititq; vehementiori morbi coactui, & quæ infestabant oppressit (hoc enim est ipsa coctio) fieri non potest, ut deinceps succumbat. Quòd si à morbo non vincatur natura, mortem subsequi nullo modo contingit. Siquidē nihil aliud mors est, quàm omnimoda naturæ prostratio. Igitur aut moriturus sit æger, nec ne, præcognoscet nemo, nisi status tempus præsciverit. Ut autem scire non possumus, an portando oneri quispiam sufficiens erit, hominis robore, oneris magnitudine, ac vitæ longitudine antea nō exploratis: sic nihil de ægroantis salute prius pronunciaré licebit, quàm magnitudinē morbi, naturæ robur, ac futurū statum investigaverimus. At verò si ex tribus ijs cognoverimus, nunquid liberabitur aut morietur æger, colligere ita poterimus aliquid

Synochas diversas esse & continuas febribus.

Crīsis in idē tempore tempus debet cum accessione.

Continuæ febres, quare tertio vel quinto die solvantur.

Motus celeritatem tarditatemq; adinquant.

Crīses optimæ quæ.

Victus rationem iuxta statum institui.

Status morbi, omnium crīseō est regula.

Status præcognitio maxime cura esse medico debet.

Status tempore elapso, solvi paulatim morbos, omneq; abesse periculū.

Mors est omnimoda naturæ prostratio.

Prædicturus salutem vel mortem, debet prius magnitudinem morbi, naturæ robur ac futurum statum investigare.

de crisis tempore & modo. Nam si morbus inve-
niatur salubris, & neq; eius acumen, nec magni-
tudo festinent, nec error aliquis committatur cir-
ca ægrum, status tempus crisis expectat: quæ sanè
optima erit, ut quæ morbo cōcocto fiat. Si verò
vel propter morbi magnitudinē, vel motus cele-
ritatem, ante statum crisis venire cogatur, tātò hæc
deterior optima erit, quantū statim anticipaverit.
Quod si neq; usq; ad statum sufficere possit,
necessum est ægrum ex hoc morbo interire, non
tamen omnino propter statum. Crisis enim vel in
statu, vel parum ante ipsum fit: mors autē in tri-
bus temporibus, principio, augmento, & statu.
Porro ubi quis subito liberatur a morbo, omni-
no huic aliqua evacuatio effatu digna, aut ab-
cessus contingit, præcedente tamen insigni qua-
dam perturbatione. Atque hunc sanè solutionis
modum vocamus crisim. Est & alius solutionis
modus, ubi scilicet nō omnino absolvitur æger:
quæ crisis dicitur imperfecta. Ubi verò morbi
paulatim & citra perturbationē solvuntur, solut i
illa per abusum crisis vocatur. Ac tres quidem hi
sunt modi* permutationis morborum, cum ægro-
tus est evasurus: tres verò alii istis proportiona-
les, cum videlicet est moriturus. Vel enim subito
moritur, cum perturbationibus, evacuationib.
vel abcessibus momentaneis: vel mortem non
subit quidem ex istis, sed multò deterius evadit.
Vocentur autē hæc duæ crises nō bonæ: quarum
prima quidem perfecta, secunda imperfecta exi-
stet. At tertia species malæ permutationis, quæ
hominē paulatim ducit ad mortē, arefactio dica-
tur. Est & quartus modus subitæ permutationis
ad pejus, sine magnis excretionibus, vel materiæ
in aliquē locū affluxibus, quam neq; crisim ap-
pello. Statuens igitur aliquā esse vitalem poten-
tiam, stude ut agnoscas* ipsius ita in robore, ut
in imbecillitate, dispositionē. Ubi verò in his ex-
ercitatus jam fueris, cura deinceps, ut omnes
morborum tam in magnitudine, q̃ in more diffe-
rentias, & post hæc, futuri status præcognitionē,
perdiscas. Quæ ubi accuratè didiceris, tunc te ex-
erceas oportet in cōprehendenda per exquisitā
conjecturā, tam morbi magnitudine, q̃ ægro-
tis robore: & quanto hæc tempore possint per-
durare. Sicuti enim qui signa omnia bona præ-
fert, in primo quaternione integrè liberabitur:
ita qui omnia mala, intra primū quaternarium
moriatur. Cæterū qui quidem liberatur, omnia
morbi tempora universaliter pertransit. Moritu-
rus verò ad declinationis tempus perungere mi-
nimè potest: * imò nec necessariò ad statum. Con-
tingit quippe ipsam in augmētī & principii etiā
tempore mori. Crisim verò subire nō est necessa-
riū, & maximè si in principio morbi moriatur.
Hoc autē accidit, ubi natura a morbo plurimum
superatur. Tunc siquidem nec certare adversus
ipsum aggreditur: atqui sine certamine non fit
crisis. Hic igitur est quartus modus mortis, qui
nulli salutariū assimilatur. Nemo siquidē subito
morbū evasit sine crisi. Multi verò sine hac subi-
tò intereunt, plurimiq; in accessionū principiis, il-
li præsertim qui propter materiæ multitudinē &
crassitiem, aut inflammationis magnitudinē exi-
tialiter laborant. In accessionū etiam particula

rium declinationibus, ob virium imbecillitatem
moriuntur. In totius aut morbi declinatione, nul-
lus unquam extinguitur propria morbi ratione,
sed ob errorē commissum. Quandoquidē ubi mor-
bi status præterit, natura evasit superior: alio-
qui nō declinasset morbus. Fit aut semper vehe-
mentior pulsus, æqualiorq; & ordinatior, in opti-
ma declinatione. Debiliior verò, inordinatior, &
inæqualior, in exitiali. Tres itaq; sunt omnes mor-
tis modi, iis qui sine crisi moriuntur. Primus qui-
dē in accessionū principiis, q̃ in magnis inflama-
tionibus principaliū membrorum contingit pluri-
mū, vel ob humorū multitudinē, crassitudinem,
& tenacitatē. Secundus in tempore status, a mor-
bi vi natura superata. Tertius in declinationibus,
qui rarissimè accidit, vigore soluto vitali. Horū
verò nullus cōtingit cum crisi. Neq; enim mor-
bum depellere in huiusmodi mortis modis ab
initio natura tentavit. Ubi verò tentaverit, sed
succubuerit, malam crisim talem eventū appello:
fitq; omnino cum excretionibus, aut abcessi-
bus momentaneis. Sicuti autē in malis crisis
est plurima incertitudo cōjecturaq; ita in bonis
scientia, & firmitas prævalet. Determinati siqui-
dem sunt, atq; ordinati naturæ motus, si & vali-
da sit, & dominetur materiæ, propriasq; perficiat
operationes. Indeterminati verò, inordinatique
& incogniti, si quando succumbat. Porro si mor-
bo pernicioso existente, quarto die letalia signa
se ostendant: si quidem imparibus diebus acces-
sio fiat, septimo accedet crisis: si verò pluribus, se-
xto. Certiorē tamen expectationem faciet ipsius
morbi motus. Nam si is acutè moveatur, crisim
sexto die venturā significat. Sin verò tardè, ad se-
ptimā differetur. Cum verò dies indicatrix nul-
lum de mala crisi futura signū ostenderit, præco-
gnitio eius minimè facilis erit. Est autem primū
& maximū morbis mortalibus signū, quod sine
crisi mors sit subsequutura, virium imbecillitas. Se-
cundum verò, si nullum adsit signum coctionis:
& præter hæc, si magnus sit morbus malignusq;
& moveatur celeriter. Cum enim hæc affuerint,
omnino absq; crisi mors subsequetur. Mortis au-
tem dies præcognoscitur, quantò superet mor-
bus naturam considerando, & graviores acces-
siones inspiciendo. Si enim effatu dignus fuerit
excessus, & parū resistere adhuc vis naturæ videatur,
mors citò subsequetur. Si verò cōtraria affue-
rint, tardius. Sit igitur, gratia exēpli, multus ex-
cessus, nō tamen manifestus: an ad unum diem,
vel duos extendi poterit, hoc certè distinguetur
accessionū circuitibus. Quo enim die debet ac-
cessio fieri, in illo morietur. Constet rursus mor-
bum esse exitialem, nec multam prostrationē vi-
rium adesse: liquet primū ex hoc, mortē nō esse
propinquā. Deinde inquirendū est, an crisis fie-
ri possit. Si igitur virtus robusta fuerit, & mor-
bus moveatur velociter, & aliquod signū coctio-
nis affuerit, nō extra rationē est, quod natura ten-
tabit crisim. At si virtus quodāmodo succubue-
rit, ac morbus tardū habuerit motū, nullūq; ad-
fuerit coctionis signū, in hoc subsequi haud cri-
sim cōtinget. Itaq; optimæ crises in statibus fiūt:
in augmentis verò, si salus sit subsequutura, vel im-
perfecta, vel nō securæ. At in morituris, vel inte-
rimunt

*Crisis quo morbi tempo-
re fiat.*

*Mors quo morbi tempo-
re accidat.*

*Permutatio-
nis morborū
tres differen-
tia.*

*Crisis perfe-
cta quid.*

*Crisis imper-
fecta.*

*Crisis per ab-
usum quan-
do dicitur.*

*Permutatio-
nis morborū,
cum æger est
interiturus,
tres modi.*

*Crisis non
bona.*

Arefactio.

*Evasurus
morbum, ne-
cessariò de-
bet transire
illis univ-
ersalia tēpora.*

*Moriturus
ad declina-
tionis tem-
pus perungere
reminimè
potest.*

*Crisim ut mo-
riatur qui-
spiam, non es-
se necessaria.*

*Crisis non fit
absq; certa-
mine.*

*Nemo absq;
crisi subito
morbum eva-
sit.*

*Mori absq;
crisi quibus
contingat in
accessionum
principiis.*

*Mor-
bi
decli-
ne, ne
rorer
missa*

*Mor-
tres
is q̃
crisi
tur.*

*Natu-
tus q̃
deter-
ti, ora-
fint, q̃
do ite-
trary*

*Mor-
crisi
ram
discern*

*Mor-
qua
gnosca*

*Crisim
do tem-
natur*

*Crisis
mas
statu*

rimunt subito, vel magnam ad pejus mutationē efficiunt. In principio autem morbi, crises non fiunt. Quando igitur futura crisis ostenditur, & nox præcedens molesta fuerit, & post ipsam accessio citius invaserit cū quibusdā insolitis accidentibus, necesse est in eadem accessione fieri crisin. Qualis autem futura sit crisis, utrum per sanguinis fluxum, vel vomitum, vel sudorem, vel per aliquod aliud ex ijs, quæ sæpe enumeravimus antea, autor bonarum disciplinarū Hippocrates accuratissimè exposuit, cum in primo Epidemiarū libro, tum vel maximè in cōmentario prognosticorū. In universum autem, nihil aliud oportet considerare in modo crisis, præter naturæ ipsius inclinationē. Distinguendum autem est, an calidus & acutus sit morbus, crisisq; in primis fiat periodis: quippe necesse est tunc post crisin, nō abscessum, sed excretionem subsequi. At tardi & diuturni morbi per abscessus quiescere consueverunt: præcipuè si urinæ tenues & crudæ longo tempore exierint. Nam si mutam & optimam subsidentiam habuerint, rationabile est morbum potius paulatim concoctum iri, non per abscessus solvendum esse. His præfinitis, deinceps considerandum est, si quidem per excretionē debeat terminari morbus, nūquid profluvium sanguinis, vel vomitus, vel sudor, vel alvi subductio sequetur: si verò per abscessum, quodnā membrū, & quis articulus abscessum suscipiet. Cæterū in ijs qui per excretionem debent terminari, dupliciter distinguere oportet: & futuræ excretionis signis, si affuerint: & aliorum, si minimè adsint. Si igitur præter rationem alvus supprimitur, vel urina, jam propè crisi existente, rigorem sperare oportet. * Qui si accidat, distinguendū tunc est, nunquid sudor post ipsum sequatur, vel vomitus, vel subductio ventris, vel aliqua horum, vel omnia. Et primū quidem ad morbi speciem est inspiciendū. Si enim exquisitè fuerit incendens, statim certior erit rigoris ipsius præcognitio. Quod enim incendit, biliosum est. Atqui biliosus humor, ubi vehementius movetur, rigorem facit. Post hæc autē & illud considerandum est, nunquid urinæ tantum, vel etiam alvo cōpressa, riguit. Si enim ambobus, necessariò rigor plurimus subsequetur. Si urinæ solis, considerare oportet, nunquid alvi excrementa plura quàm priora, vel pauciora ante crisin exierint. Si enim * plura, manifestius motus naturæ ad hunc locum est agnoscendus: si pauciora, ad sudores. Si verò & vomitus signa adfuerint, per has ambas crises judicabitur. At si vomitus signa non adsint, solos sudores expectare oportet, & magis quando ægrotantes deliraverint in crescente accessione, & partes exteriores calidiores ac rubidiores extiterint, & vapor quidam calidus exeat, qualis antea nō aderat. Quod si pulsus etiam undosus fiat, & insigniter mollis, adhuc etiam amplius sudores expectare oportet. Durus autē pulsus, vomitus magis quàm sudores præostendit. At altus, omnimodæ excretionis est index, perinde ac vehemens. Si verò magnus extiterit, motus ad exteriora potius, quàm ad interiora, signum existit. Cum verò uterq; fiat modo duplici, hic quidē qui ad exteriora, per flu-

xum sanguinis è naribus, atq; sudores: alter autem qui ad interiora, per alvum atq; stomachū: undosus quidem pulsus, sudores: magnus autem simpliciter sanguinis fluxū præostendit. At motu superante ad interna, cum non aderunt signa vomituum, p ventris excrementa fiet crisis: si verò affuerint, & venter insigniter subducatur, per utraq; perficietur. Inæqualis autē pulsus in plurimis quidem crisis fit, & præcipuè cum non fiunt sine periculo & pugna. Vomituum signa sunt, oris ventriculi morsus, unā cum dolore capitis, obortæ vertigines, agitatio labri inferioris, magnusq; sputi tenuis defluxus. Propria verò signa profluvii sanguinis, quidam fulgoris motus oculus apparentes, quoniā humor est flavus. Obtusiones autē, quoniā multus, & totus simul elatus ad superiora, spirituum meat⁹ obserat. Ita autē & oculi lachrymatur, ob multitudinem fluxus. Eodem modo rubidi aliquando videntur in malis: nonnunquam & naribus. Proprium verò signum sanguinis fluxus è naribus est, etiam præcordiorū tensio sine dolore. Nam & hoc nō parvum indicium est sanguinis ad superiora tendentis: sicuti etiā difficultas respirationis, quæ cōtingit sanguine transeunte in thoracē. Si verò præcordia cum dolore extendantur, non modò fluxum sanguinis nunciant, sed etiam aliquam ibi adesse inflammationē significant. Sed & dolores capitis, qui quidem veluti mordaces sunt, vomitum: qui verò quodammodo graves atq; extendentes, pulsantesq; & calidi, sanguinis fluxū propriè significant. Sic etiam viscerum sub præcordiis existentium inflammationes, causæ sunt ac signa sanguinis fluxuū, quando morbus per excretionem est judicandus. * Cæterum si ex cōtraria parte fluat sanguis, malum est: bonum autē, si secundum rectitudinē visceris, ut inquit Hippocrates. Quare præcordia dextra per dextrā narem bona afferunt crisin: p sinistram autē, sinistra. Si verò per excrementa alvi sit crisis subsequutura, manifestum quidem nullum est signum: sed ex eo quod adsunt quidē crisis signa, desunt autē vomituum, & fluxus sanguinis, & sudorum, colligere licet. Quanquā vel si nullum horū signorum adsit, nō hoc tantummodo, sed etiam per hæmorrhoidas, fieri crises contingit, & mulieribus per purgationes menstruas. Non tamen impossibile omnino est talia distinguere. Gravitas quippe lumborum effatu digna, & tensio, & dolor, menstrua hīc antecedit. Hæmorrhoides verò, non omnibus sunt consuetæ. Quibus autē sunt consuetæ, in ijs difficile fuerit distinguere. Igitur aliis omnibus, quando adfuerint signa coctionis & crisis, vomitus verò nō adfuerint, vel fluxus sanguinis, vel sudorum, omnino venter turbabitur. Si verò morbi ad abscessus converti videantur, communia quidem omnia indicia sunt, ubi ægri salus deplorata non est, quod neq; morbus solvatur, neq; urina multa, & multam habens subsistentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria verò non admodum diuturnorum morborū, si æger in difficiliorem respirationem repente incidens, brevi quidem liberetur à tali respirandi difficultate: sed excipiat ipsum statim dolor, capitis gravitas, inexpugnabilis dormiendi necessitas, surditasq;

Inæquales
pulsus quan-
do per crises
fiunt.

Vomituum
signa qua
sunt.

Sanguinem
fluxurū per
nares qua
præindiciunt.

Præcordiorū
dolor tensi-
us, sangui-
nis fluxum è
naribus, in-
flammationē
nemq; illius
partis indi-
cat.

Sanguis præ-
futus in-
flammationē
bus viscerū,
secundum eo-
rum rectitu-
dinem effluere
debet.

Menstruas
purgationes
criticas, qua
signa præce-
dere soleant.

Crisis per ab-
scessus futu-
ra signa qua
sunt.

surditasq; Huic siquidem in glandulosis post aures partibus, necessum est abscessum oriri. At si moribus fuerit inveteratus, neq; ullum ex his signis affuerit, sed in ægroto ex locis inferioribus vel gravitas, vel tensio, vel *incendium, vel dolor aliquis apparuerit, huic abscessus, ad partes inferiores est expectandus.

GALENI PERGAMENI
de præcognitione, lib. unus.

CAPUT I.



Ieri quod nequeat, ut quæ in singulis morbis sunt ventura agris, præcognoscatur, quamplurimi medici existimant, ô charissime Epigenes.

Postquæ enim multos reperire est nō in medicina modò, sed etiam in cæteris artibus, qui apparere, quàm esse, maluit: si quid in disciplinis inest optimũ, negligi capit: contra exquiri ea, è quibus vulgo plurimi fiant: dicere in quæ & agere in alienâ gratiam, adulari, divites & primarios cives manè officiosissimè salutare, comitari postmodum, domumq; reducere: cœnâibus insuper satellitum instar astare, scurrasq; agere.

Atq; hinc est orta cõmunis illa omniũ artiũ infelicitas, quæ nostra ætate irrepfit. Nam quod quidem ad medicam professionẽ pertinet, si quando aliquis medicorũ qui rectè p̄fiteatur artem, aliquod symptoma ægroto affore prædixerit, rarum quiddam & mōstrosũ ipsi vulgo videtur: tantumq; abest, ut admirationi sit, qui hoc prædixerit, ut etiã bene secũ is agi putet, ni veluti impostorẽ aliquem averfentur. Jam verò aliorũ medicorũ invidiam adeò grandem in se concitabit, ut ab eis tandem circumveniantur veneno (quo illi præcipuè insidiari solent) aut pro splendido eruditionis suæ præmio, cogatur in exilium abire: id quod olim fuit Quintus passus, qui cùm Romanis medicis, multis nominibus antecelleret, Roma tamẽ est pulsus, idq; falso quodam prætextu, quod ægros perderet. Quare multi syncerissimi viri, pravitatẽ, qua hæc nostra ætas detenta est, exploratã habentes, à turba & frequentia hominũ, ceu à valida quadam tempestate & procella, in solitudinis salutarẽ portũ sese recipiunt.

Atq; erunt profectò hi multitudini ignoti: cæterũ noti & amici primũ & maximè diis immortalibus, deinde viris quoq; optimis. *Quinetiam vitam tranquillam agent, sinentq; versutos illos *esse apud vulgus admirationi. Porro divitũ & præpotentium mollities, malorum omniũ esse causa videtur: qui voluptatem præferentes virtuti, eos quoq; nihili faciunt, qui quæ verè bona sunt, norunt, & alios docere possunt: sed potius totos sese ijs dedunt, qui voluptatem cõciliant, hos ditant, hos admirantur, hos evehũt sublimes adeò ut saltatorum & aurigarum imagines inter deorum simulacra erectas videas. Viros autẽ eruditos eatenus suspiciũt, quatenus eorũ opera indigent. Geometria igitur & arithmetica, ea duntaxat ratione in precio sunt, quod ad supputandas sumptuũ ratiõculas, aut domos extruendas, usum ferunt. Astronomia verò & divinatoria, ad præsciendas hæreditates utuntur. Musica, quatenus oblectare potest auditũ. Philosophiã

autẽ harũ omniũ dominã, & demonstrativã disciplinã, omnino negligunt: nisi quando rhetoribus sophistica arte, instrumento sanè maligno, uti in oratione est animus. Hi etiã in medica disciplina necessariũ illum usum tãrũ modo spectant, neq; hunc satis exactè: sed, ut Plato quandoq; ait, si quidem pueri & insipientes, de medicis & coquis ferre iudicium debeant, non parum proculdubio coquus medico præferetur.

CAPUT II.

Cũ igitur primũ Romam veni, horum omnium ignarus, nihilque eiusmodi suspicatus, stuidi non equidem ex solis verbis, sed ex operibus ipsis, & morbos curando, & futura præcognoscendo, omnibus innotescere, quousq; mihi tandem evenerũt quæ paulò antè dicebam. Etenim tunc in Eudemo Peripatetico mirè quartanam febrem ab aliis ignoratam prædiximus: qua quidem ubi se manifestè correptum sensit, me miris laudibus extulit, ceu in contrectando pulsu admodum consummatum. Nam antea in iola philosophia me credebatur præcellere, medicinam verò obiter attigisse: tamen si nō ignoraret patrem meum a pertis insomniis admonitũ, ex professo me ipsam medicinam docuisse. Cũ igitur cæteris medicis videretur, ut summo mane eius diei, in quo febris invasura erat, Eudemus Theriacẽ biberet, ipse, ubi illi abierunt, rogavit me, ecquid mihi spei in pharmaci usu foret. Ast ego nihil cunctatus, respondi, pharmacum non modò nihil præsidii allaturũ, sed potius ex simplici quartana duplicem effecturũ. Eam quippe illius medicamenti vim esse, ut vitiosis succos adhuc crudos movere, & ad perturbationẽ perducere valeat: concoquere autem, aut per halitum digerere, nequeat, præsertim ineunte jam hyeme. Nec verò aliter contigit, q̃ ego ei affirmaram. Nam postridie summo mane accedentes medici, propinarunt illi Theriacem, & ex una simplici, non modò duplicẽ, sed triplicem reddiderũt quartanam. Cũ igitur omnia, ut prædixeram, evenissent, obstupuit Eudemus, cunctisq; astantibus, ordine singula exposuit. Aderat enim forte quadam, si qui in urbe Roma dignitate & eruditione erant celebres: ut puta Sergius, & Paulus, qui paulò post prætor creatur: Flavius quoq; & ipse vir consularis, & Aristotelicæ disciplinæ studiosus: præterea Boethus, & Barbarus (erat enim hic Lucii Imperatoris aviculus, qui tũc Mesopotamiæ præturã gerebat) cum ipsisq; Severus etiam vir cõsularis, & Aristotelicæ disciplinæ addictus.

Dein verò, posteaq̃ ex tribus illis quartanis, quanam die singulæ solvendæ essent, prædicerem, quemadmodũ etiam earum ortus prædixerã, nō modò ex prædictione ipsa (quæ ad votũ successit) sed ex curatione etiã insignẽ gloriã sum consecutus, Atq; inde prima mihi invidiæ origo extitit, cũ jam & ob artis opera, & ob vitæ integritatem, esse admirationi cœpissẽ. Porro Antigènes medicus, unus ex Quinti discipulis, qui mirum in modũ me irriserat, quod Eudemum tres & sexaginta annos natum, triplici afflictum quartana, hyemeq; media, curandũ suscipere, parum absuit quin postea, ubi vidit eventum rei, obrueretur terra. At Martianus salũari cœpit

meas

Discipline omnes unde negligi inciperint.

Artium omnium infelicitas unde emanat.

Romanorum medicorum insidia.

Quintus medicus ab insidia olim fuit pulsus Roma. Viri optimi cur subducant se in solitudinem.

Præpotentium mollities malorum omnium esse causa videtur.

Coquum dico præferatur si deus que ipsi pueri & insipientes re iudicare debeant.

Galenus demo Peripatetico quartanam febrem prædixit.

Galenus somniis peritis allectus nãdasse medicam.

Theriacem posse crudos succos movere, concoquere autem, aut per halitum digerere, nequeat, præsertim ineunte jam hyeme. Nec verò aliter contigit, q̃ ego ei affirmaram. Nam postridie summo mane accedentes medici, propinarunt illi Theriacem, & ex una simplici, non modò duplicẽ, sed triplicem reddiderũt quartanam.

Barbarus Lucii Imperatoris aviculus.

Galenus quartanam febrem prædixit.

Galenus Antigènes medicus.

Martianus meas

meas prædictiones, ceu non ex Medica disciplina, sed ex divinatoria quapiam arte profectas.

CAPUT III.

Cognovi autem atque prædixi Eudemo, crifim illius quartanæ triplicis certa quadam nocte futurâ, ex pulsu ipso. Siquidem arteriarû motus plurimû se efferebat in altû, secundû utranq; dimensione: quod nimirû contingere solet, cum natura infestantes succos è corpore excernere nititur. Recensens igitur illi omnia ea, quæ cæteras excretiones prænunciant: excretionis verò eius quæ per dejectione sit alvi, nullas neq; proprias, neque efficaces esse notas asserens: tandem quia nullius ex cæteris excretionibus signa tunc apparebant, dixi alvi profluviû esse expectandû. Cujus rei successum ubi vidit philosophus, jam nō solita moderatione, sed clamans dicebat omnibus, En amici, Pythius Apollo per os Galeni vult, nō sanitatē modò ægris, sed diem etiā vaticinari, in qua omnino sint liberâdi. Ipse enim oportuno usu Theriaces me tribus quartanis afflictum, in sanitatē asseruit, quas ex intempestiva illius exhibitione incideram: nec quicqua præterit, quin omnia uti prædixerat, evenirent.

CAPUT IIII.

Cum verò apud Eudemû conquererer de illa animi pravitate, quam medicis inesse videbam, qui in urbe Roma clari habebantur: Nolim, inquit ille, persuasum sit tibi, viros natura probos, cum in hanc urbē venerint, malos aliqua ex parte fieri: cæterû qui jam antea pravo animo extiterant, cum hic & negotiorû materia abundant, mercesq; multò amplior, quàm in aliis urbibus, undiq; alliciat eos, cernantq; quotidie multos sibi ditari similes, multiplices actiones eorum accurate imitari contendunt: itaq; multis de causis ad summam illam improbitatem deveniunt. Quod si fortè improbi ab aliquo deprehendantur, habent alios in tanta urbe quos adorianatur, utpote suorum morum ignaros. Unde maximè fit, ut eadē semper perpetrare flagitia possint. Qui verò parvas civitates incolunt, capi lucri magnitudine nequeunt: tum quales sint, facilius à suis concivibus dignoscuntur: nec si quid delinquant vel minimum; crimē ipsum ita callidè operire norunt. Contra evenit ijs qui hic degunt. Nam quæ improbè agunt, plurimos latent, unde innata illa malitia facilè augefcit. Etenim ignotis atq; imparatis imponere est facile. His auditis, me brevi Roma discedere jam constituisse respondi, ut quàm citissimè fieri posset, illorum declinarem improbitatem. Ad hæc ille: Non rescivere, inquit, hoc decrevisse te. Quamquam si rescissent, cum ipsi assiduè mentiri soleant, eadem de te quoq; suspicarentur. Quemadmodum enim ipsi, indocti pariter atque inopes, idcirco urbem hanc petunt, quòd in patria vitam agere nequeant (neq; enim quæ committunt quotidie, illic diu latere possent) alios etiam eadem de causa huc cōfluere existimant, nec nisi pecunia onustos, abituros sperant. Cum hæc & alia multa dixisset, adjecit postremò, veneno quoq; mihi molituros insidias, ubi ad nocēdum alia via deesset. Sic quippe juvenem quendam in arte maximè exercitatum, unâ cum duobus fa-

mulis fuisse ab ipsis extinctum. Ad hæc ego: Gratiâs tibi ago præceptor longè charissime, quòd mihi adeo exquisitè, cuncta quæ ad eorû improbitatē pertinent, enarraveris. Ego enim posthac mihi cavebo sedulò, tum ipsis cedens, tum inscitiam ipsoꝝ dissimulans: atq; ex hac urbe maxima, populiq; frequentia admirabili, in parvam & paucorû civium cōcedam, * in qua omnes invicem novimus, genus, eruditionem, mores, rem familiarem, ac demû omnem vitæ rationē civis uniuscuiusq;. Hæc cū ita facere decrevissem, inscitiam eorû & improbitatē * redarguere desisti. Restitui tamē interim præter cōplures alios, tum Charilampis familiarē, tum Diomedem rhetorē in Sandalario, morbo diuturno afflictum. Quæ omnia, digna magna laude sunt visa. Quare me omnes magnoperè suscipiebāt atq; venerabātur: magnumq; ubiq; erat Galeni nomen. At veluti indies gloria, sic pari quoq; passu augebatur invidia.

CAPUT V.

Eo tempore Flavius Boëthus, vir consularis, summus virtutis amator, atque discendi avidus, petiit à me, ut nōnulla ex dissectionibus, hoc est, qua ratione vox cōformetur, animantiaq; respi- rent, exponerem: In quem usum hoedos atq; porcellos non paucos jam comparaverat. Siquidem non hæc modò animalia, sed & pedestria ferè universâ, eandem earum partiû structurâ sortiuntur. Ad illud igitur spectaculum omnes sunt convocati quicunque Romæ vel in Medicina, vel in Philosophia clari habebantur. Inter cæteros autem aderat Adrianus rhetor, qui nondum causas actitabat, sed adhuc cum Boëtho familiariter vivebat. Aderat & Demetrius Favorini amicus, necnon Alexander * Damascenus, Boëthi præceptor, ad cōtradicens promptus. Cum itaq; multis diebus haberetur conventus, monstravi primû, inspirationem thoracis elevatione fieri: depressione verò, expirationē. Dein musculos quibus attollitur, & nervos qui ex spinali medulla procedunt, ostendi. Præterea, quòd spiritus, si absq; violentia foras feratur, tacitam facit expirationē: cum verò vi multa, strepentem atq; sonoram, quam etiam efflationē vocamus. Monstravi insuper, aërem solum, dum efflatur, ac circa gutturis exitum à cartilagineis corporibus re- percutitur, vocem efficere. Cartilagine verò ipsas à musculis, musculos à nervis moveri: qui si abscindantur, aut excipiatur vinculo, animal mutum redditur. Quæ omnia Boëthus per notarios cursim conscribi jussit, eorum commentaria apud se habere percipiens.

CAPUT VI.

Jam verò rogatus interea sum, ut mulierem quandam inviserem, quæ noctes integras insones ducebat, ac subinde decubitus formam permutans, sese in lectulo huc & illuc jactabat. Quæ quidem cum febre omniq; affectu corporis vacare perspicere, hinc illâ Pyladis cuiusdam amore detentam cognovi, quòd eius nomine audito, non vultus illi modò permutabatur, sed pulsus etiâ cōtrahebant sibi omnimodam inæqualitatem, ut qui satis perturbatû animû indicaret. Ejusmodi nanq; pulsus in ijs invenias, quib. rem arduâ aggressuris fluctuat animus. Nec dissimili quoq;

Galenus pusillanimitas.

Galenus de agēti Roma, cū gloria ex equo augebatur invidia. Flavius Boëthius.

Adrianus Rhetor. Demetrius.

Inspirationē fieri dilatato thorace.

Expirationē fit thorace depresso.

Expirationē tacita, sonoraque, quomodo fiant.

Efflatio quid sit. Aer solus efficit vocem.

Nervi & musculos, si abscindantur, aut excipiuntur vinculo, mutum animal redditur.

Galenus quæ ratione quædam matronam Romanam ex libidine agrotare cognovit.

Inæquales pulsus inesse qui facinus aliquod magnū sunt aggressuri.

quoque ratione divitis cuiusdam œconomum, non morbo, sed mœrore cōfici deprehēdi, quod universæ administrationis, ad quam cogebatur, rationē reddere pro dignitate non posset. Ex animi enim conflictatione & timore, pulsus statim evariant.

CAPUT VII.

Haud absimili industria Boëthi filium, qui sæpius recidebat in morbum, animadverti, ob edulia, quibus clam explebatur, id ipsum perpeti.

CAPUT VIII.

Cum aut Boëthi uxor laboraret muliebri profluvio, cui supervenit postea grandis in ventre tumor, tractareturq; ab obstetricibus, perinde ac si pragnans esset, cōgit ut in prima balnei domo, gravissimus dolor subito eam invaderet. Ab eo verò aquosæ humiditatis vim adeò grandem excrevit, ut animo protinus linqueretur. Igitur clamo

Boëthi uxore laborantem suffocatione uteri, quæ ratione restituerit Galenus.

more muliercularū audito, in silio actutū, eamq; in ulnas excipiens, nardino unguento os ventris perfricui: iussiq; astantibus, ut partitis officiis, hæc manus concalfaceret, illa pedes, aliæ bene olentia naribus admovent. Atq; ita sanè q̄ celerimè illam restitui. Erāt autem inter fricandū quæ spectabant ad ventris regionem, admodum mollia & præhumida. Fuit porro visum medicis universis, qui illuc confluximus, optimū fore, si immodicā illam humidi affectus sobolem exiccaremus, ita tamē ut curatio nō per siccantia tantum, sed quæ excalfacere simul possent, procederet. In maris itaq; arena, & quidē excalfacta, eam

Boëthi uxori qualem & rationem instituerit Galenus.

reclinavimus. Talem autem ipse illi victum institui, ut q̄ minimo potu uteretur: frictionesq; & unctiones universo admovent corpori, quæ solo melle cōstarent: primū quidem elixato q̄ optimè, dein instar fontanæ per æstatem aquæ, refrigerato. Sicuti verò superfluas humiditates percutim cōmodissimè digeri iudicavi: sic & ad vesicam, per ea quæ urinas proritant, deduci, & per alvum dejici. Atq; hæc quidē diebus septem à vacatione illa magna, sumus experti. Postea vero, ubi mihi soli Boëthus uxorem suam permisit pro arbitrio meo tractandam: primū quidem aquam ducente medicamento illam curavi. Dein propinavi illi, a sari, apiiq; decoctum. His duobus diebus peractis: cum nihil jam profluvii apparet, rursus die tertia modicū quippiā ex medicamento alvum purgante exhibui. Post hæc diebus singulis melle illevi, corpusq; perfricui, ex mollissimo primū linteo, postmodū ex asperrimo. Victus interim, vel ex carnibus montanarū aviū erat, vel ex saxatilibus piscibus. Quibus per dies quindecim peractis, cum ne minima quidem affectus nota extaret, præcavendi modū postulavit Boëthius. Mense demū exacto, cum adeò bene colorata foret, ut distaret nihil à naturali habitu, quadringentos aureos mihi dono dedit.

CAPUT IX.

Cæterum invidiā apud illos insignes medicos nō parum Boëthus auxit, magnificè de me prædicans. Jamq; sibi in animo erat, de me loqui apud Imperatorē M. Aureliū Antoninū, qui tunc Romæ agebat. Nam Lucius urbe aberat, ad Parthicū bellum cōpescendum. Dum hæc fiūt, bellicos tumultus in patria sedatos audio: quare sta-

tim Roma digredior, simulans me proficisci in Campaniā. Primū itaq; Capuā petii, dein Brundisium, ut ibi navim quæ Dirrachium, mox in Græciam transveheret, expectarem: metuens ne quis ex urbis primatibus, aut ipse quoq; Imperator, ubi discessum rescissent meū, missis qui me prosequerentur militibus, Romā quasi fugitivū reducerent. Postero deniq; die, Casiopolim apuli. Non multo post, cum Lucius Romā reversus esset, alterū bellum, quod cum Germanis est gestum, initiū habuit. Cum itaq; mox urbe exissem, bellum aggressuri, Aquileiæ, ut delectus haberent, & copias cogerent, hyemare placuit. Interim ad me mittunt, qui imperēt, ut illō me cōferam. Cum verò Lucius hyeme media migrasset ad superos, frater cadavere Romam asportato, & iustis mortuorū peractis, apparatus in Germanos suscepit, meq; insequi iussit. Quod autem uti probus, & benignus foret, facile persuaderi potuit, ut me Romæ dimitteret, cum præsertim brevi rediturus videretur. Igitur toto expeditionis illius tempore, satis memor insitæ pravitatis tum medicorū, tum philosophorum, qui Romæ agebāt, optimum iudicavi ab eis secedere, modò in hunc, modò in illum locum: idq; Cōmodum ipsius filium secutus, qui sub Pitholao educabatur. Nam huic Imperator Antoninus iusserat, ut si quando puer ægrotaret, curam mihi illius cōmitteret. Cum verò ultra opinionem protraheretur bellum Germanicū, scripsi interim multa, partim ad rem medicā spectantia, partim ad philosophicam. Quæ omnia post Imperatoris reditum amicis efflagitantibus tradidi, persuasus nemini alteri ea esse legenda. Nam si vel minimum suspicatus fuisset in manus indignorum ea perventura, profectò nec iis dedissem.

CAPUT X.

At verò Sextus Antonini filius, acutissima febre detinebatur, adeò ut septimam diem citra iudicationem pertransire non posset. Sæpe nanq; irritata crisis eam diem prævenit, quæ tutò morbum erat iudicatura: id quod Sexto evenire posse, quarta die cognorā: remq; omnē Pitholao prædixeram, affirmans morbū septimam diem pertransire non posse, sed sexta vel septima die affuturam crisim. Quod si sexta, morbum omnino reversurum prædixi: si septima, crisim habiturum firmissimam, eamq; omnino per sudores. Postquam igitur sexta die, quo prædixeram modo, morbus iudicatus est, rursus decimaquarta illum febris invasit. Interrogante verò Claudio Severo, ecquid de recidiva illa sperarem: respondi (quod & Sexto & Pitholao paulò antè dixeram) accessionem illam post triduum habiturā suum finem, affuturūq; sudorem post decimū septimū diem, ad secundam noctis horam: quod præsagium ne tantillum quidem fefellit.

CAPUT XI.

Credidit etiā aliquando ipse Imperator, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febrilis accessionis sibi adesse. Ascitus sum itaque & ego, atq; in palatio cubare iussus. Venit autem primis facibus quidam * missus ab Imperatore, qui nos vocavit. Igitur cum ex tribus medicis qui manē ipsū inviserant, duo

Galenus Patriarchus.

Lucij in.

Marci lii clem.

Galenus stat.

Commodus.

sequeba.

in Italia.

lenus, d.

Marcus.

relus in.

bat bella.

German.

Crisis, d.

irritatur.

prævenit.

cretoriū.

Galenus.

to Anton.

filio præd.

modum.

ram, & r.

di & a mor.

Boëthi uxorem quæ ratione curaverit Galenus laborantem profluvio muliebri.

Boëthius ob restitutam uxorem quadringentis aureis Galenū donavit. Galenus vixisse Romæ imperante Marco Aurelio Antonino.

duo pulsus tetigissent, ambobus pariter visum est febrem jam adventare. Vbi verò me quoque pullum cōrectare jussisset, equidem bona quadam fortuna tactū natura exquisitissimum natus, pensitatis omnibus, habitaque tum ætatis, tum naturæ ipsius ratione, ac semotum pulsū sentiens, qui accessionū principia significare solet, me nil tale suspicari dixi: sed potius ab assumpto cibo stomachum angorem quendam sentire. Ille verò quanti agnitionem hanc faceret significavit, ter statim repetēs. Ita est ut dicis: Profecto id ipsum: Ut dixisti res habet. Nam à frigidiori alimento gravari me sentio: Quid igitur (subjunxit) oportet me facere? Cui sic respondi: Si quando in quemvis alium ita affectum incido, vinum injecto pipere propinare consuevi. Quia verò medici in regibus, securissimis medicamentis utuntur, satis erit lanam calido nardino imbutam, ori ventris apponere. Consueverat & ipse, si quando & venter malè haberet, ex purpurea lana unguentum nardinū calidum applicare. Quare Pitholao, ut hoc faceret, imperavit, nosq; dimitteret. Dum autē unguentum ventri applicuisset, pedesq; incaluisse, calidis manibus perfritari, Sabinum vinum cum pipere bibit: dixitq; Pitholao, eo epoto, Singularem sanè medicum nacti sumus, eumq; valde ingenium. Nec de me loqui cessabat, & medicum præstantissimū esse affirmans & singularē philosophū.

CAPUT XII.

At Commodus aliquando è palestra reversus, octava hora prius quàm cibum caperet: febre admodum calida correptus est. Cum igitur pulsū tetigissem, particulam ipsius quampiā phlegmone laborare sensi: neque id injuria: quippe fauces habebat maximè rubētes & asperas, quas etiam gargarismate ex rhoë & melle magis exasperaverat. Jussi itaq; ut pro eo, mulsam sumeret, rosas incoctis: qua per noctem, & insequentem diem, & quæ huic successit noctem, crebrò uteretur. Tercio die manè phlegmone omnis sedata erat, & puer quasi febre liber. Suasi itaq; Pitholao, ut ipsum in balneū duceret, ac postea eum victu consueto reficeret. Quod consilium tamen Ania, Faustinae cognatione conjuncta, non usq; adeo probavit: ut quæ diatrīto methodicorū faveret. Porro Faustina* me ipsum prehensum manu ducebat, irridēs quendam methodicum, eiq; dicens: Quantoperè præstet doctrina hujus Galeni, vestra, modò satis apparuit. Nam cum puer regius, absente patre, vehementi febre perciduum detineretur, non utiq; passus est (ut vobis placet) octavam horam jejunum ipsum & sordidum expectare, sed & manè lavit, & cibū dedit. Cui quidem in scensurę currum, ipse valedicens, subjunxi: Multò magis exosum reddidisti me apud hosce medicos, o Imperatrix. Igitur affectuum corporis agnitio, speculatione investigatur: ex cognitione verò exquisita affectionū, futurorum præcognitio colligitur.

CAPUT XIII.

Jam verò, cum semet in quodam agro, quintum morbi diem agebat, universi medici secare venam, & rectè quidem, deliberarent: ipse præsens submonui, si paululū cūctaremur, na-

turam ipsam per moliturā sanguinis evacuatio-nem, idq; per dextram narem. Etenim æger ipse, cum perinde ac si fugere vellet exiliret è lecto, interrogatus qua de causa id faceret, respondit, videre se rubrū anguē proserpentē è tecto. Ad hæc dextrā narem ad gena usq; cernebam esse rubore magno perfusam, q̄ satis firmū esse solet indicium, quòd illac sit erupturus sanguis. Ubi igitur ægrum vidi, quasi nares scalperet, digitū in ipsas immittere, ac postea sanguinolentum extrahere, jussi ut vas subderetur (jam, n. effluebat sanguis) subjunxiq; vacuationē eam fore vehementē. Vires siquidē validæ erant, necnō morbus crudus: quibus sanè causis immodicę vacuationes solens succedere. Cum itaq; ad quatuor librarū & dimidiæ pondus, sanguis jam effluxisset, tunc resupinum ægrū statuens, jussi ut frigidam poscam naribus exurgeret: fronti q; spongiam frigida posca madetē apposui, artūs q; devinxi. Verum cum neq; his profluentis impetum possem suppressere, affixa demum dextro hypochondrio cucurbitula, fluorem statim compescui.

CAPUT XIII.

Cum verò æconomus quidam incidisset in morbum, foretq; eius cura aliis quibusdam medicis demandata, crīsim in septima per sudores habuit. Postridie autem cum pulsū eius tetigissent, ubi intermittētē sensere, malignū quempiam affectū delitescere suspicati, magnoperè sunt decepti. Nam cum me ob eam rem cōsuluissem, perduxissentq; ad ægrum, ipse pulsū eius cōrectans: monui ut ad refectōrium victum traducerent: esse enim tutò & integrè judicatum. Quippe illam pulsus intermissionem, naturalē ipsi, non ex maligno quopiam affectu, existere: id quod postea sic esse deprehenderūt. Ubi enim pulsus vel in unica tantummodo pulsatione, vel pluribus sibi invicem subsequētib; unā comprehēnsis, nil aliud intermissione illa excepta, præter naturam habere videatur, scire licet, affectum illum ab ortu ipso extitisse.

GALENI PERGAMENI

de præsagio ex insomnijs sumendo, liber.



St etiam ex insomnijs, corporis dispositionem cōjecturis quibusdam deprehendere. Si igitur incendium quis per somnum videat, eum flava quidem bile infestari significatur. Si verò fumum, aut caliginem, aut profundas tenebras, atra bile gravatur. Rursus si imbres somniet, in eo frigidam humiditatem redundare indicatur. Sic qui nivem, qui glaciem, qui grandinem, phlegmatis* frigidi est plenus. In his autem & tempus, & consueta vivendi ratio observanda venit. Etenim si nive aliqua conspergi sibi videatur, si quidem id post invasionē paroxysmi cū horrore, rigore, frigoreq; venientis, somniet, tum plus est tempori, q̄ corporis affectioni tribuendū. Sin verò remittente jam paroxysmo, hujusmodi somnium sese offerat, firmiorem nobis præbet* significationem, frigidos in eo humores prævalere. Quæ certior fuerit, si præterea cibis

Galenus quā ratione prædixit cui-dam affuturum sanguinis fluxū per nares.

Vacuaciones immodica quibus causis soleant succedere.

Galenus sanguinis fluxū vehementem è nare dextra, affixa cucurbitula hypochondrio dextro, compescuit.

Intermissio in pulsib; sine naturalis an præter naturam, quomodo dignoscenda.

Insomnia multum lucis adferre ad cognoscendas dispositiones corporales, exemplis variis Galenus comprobavit.

cibus pituitosis usus non fuerit: quibus sumptis, huiusmodi solent evenire phantasia, vel si per unum corpus talis dispositio non adsit. Cum igitur in somniis quidam crus sibi alterum factum lapideum cerneret, preter omnium opinionem eo crure factus est paralyticus. Palæstritam autem qui in cisterna quadam sanguinis plena stare sibi erat visus, sanguine abundare eiecitimus, vacuationemque indigere. Quidam crisi instate sudaturi, lavare, calidarumque aquarum lacus se natare somniabant. Sic inexplēbiter bibere, visio est sitibundorum hominum frequens: quemadmodum insatiabiliter edere, famelicorum: & veneri indulgere, eorum quibus semen abundat. Videtur namque in somniis anima corporis profundum ingressa, externis relictis sensibus, eas quæ corporis sunt, dispositiones sentire: & omnibus quæ ipsa cupit, tanquam jam presentibus, per hanc imaginationem perfrui. Quæ quidem animalis vis interdum adeo multitudine humorum gravatur, ut vix movere se posse, aut gravia quædam ferre onera, nonnulli sibi videantur. Eo vero quoque accidit, ut adeo sit levis temperataque complexio corporis, ut nunc volare, nunc velocissimè currere, per insomniū se putet. Sic etiam in cœno stercoreque agere quidam se somniant, quod eos nimirum, corruptos, foetidos, putridosque humores habere, aut intestina stercore oppleta, est indicium. Contra alii in odoratis locis versari se putant, propter diversam ab illa dispositionem. Quapropter quæ in somniis se facere putant ægri, quæ sapientissime nobis & ad defectus, & ad excessus, & qualitates denique humorum cognoscendas, conducunt.

GALENI PERGAMENI

quomodo morbum simulantem sint
coarguendi, lib. unus.



Um multæ sint causæ, quas propter egrotare se homines simulat, videtur & in istiusmodi omnibus veritatis inventio ad medicum spectare. Etenim phlegmonem, erysipelas, & tumores laxos, per pharmaca apposita extrinsecus, ex industria excitatos, medico ab iis quæ ex ipso corpore perficiuntur, licet discernere: sicuti & sanguinem ex oris partibus profluentem, ab eo qui ex stomacho, ventre, organisque spiritalibus provenit. Nam deprehensi sunt quidam, qui sub finē tussis, quoties vellent, sanguinem excrearent: venucla quadam in hoc prius circa gingivas aperta, sicque comparata, ut quando videret, lingua illam fugeretur, statimque post tussientes, sanguinem, quasi ex inferioribus redditum, expuerent. Sic & delirare nonnulli, desipereque se & alios, simulaverunt. Fit autem sæpe, ut dolor quispiam ita simuletur, ut ingens, fereque intolerabilis esse videatur. Equidem ipse quendam novi, in concionem vocatum à civibus, qui postquam id sibi minimè ex usu fore vidisset, proptereaque interesse nollet, colica se passione torqueri fingebat: id quod ego certis conjecturis deprehendi. Nam & remedia respuebat, quibus fuerat alias eodem in morbo adjutus: & concione dimissa, exemplo conqueri desiit. Quin & ipsa vivendi ratio quæ præcesserat, talis erat, ut colicam in eo dispositionem generare non posset: quandoquidem ex cruditate refrigerationemque, huiusmodi gigni solent affe-

ctus: quorum neutrum in illo præcesserat. Hoc igitur, quod non ratione antea acti victus, ortus morbus ille esset, potuisse cognoscere, medicæ erat experientia opus. Alterum vero istud, quod ob concionem simulare hæc illi suspicatus eram, medicinæ proprium non fuerat, sed captus, & rationis eius, quæ communis dicitur: quæ licet omnibus sit communis, pauci tamen exactam, perfectamque habent, ut invenire in quoque negotio possint, quid faciendum, dicendumve sit. Experientia igitur medicæ si conjungatur hæc externa facultas, alia quoque similia fingentes, validosque dolores simulantes, deprehendere licet. Quemadmodum ipse nuper, cum utroque genu vehementissimè dolere se pedissequus quidam diceret, statim doloris eius fictionem deprehendi: ex eo partim suspicionem sumens, quod ad illam forte diem dominus ex urbe profecturus erat: partim ex adolescentis moribus, qui talis esset, ut facile in huiusmodi mitteretur, quod amore mulierculæ cuiusdam flagraret, ob quam in urbe restare cupiebat. Quocirca per thapsiam admotam, sibi in genu tumorem maximum excitaverat. Ego vero, cum profecto domino pharmacum imposuissem, quod dolorem quidem nihil leniebat, verum thapsia solum qualitatem infrigidare poterat, post horam unam illum confitentem habui, nihil amplius se doloris sentire. Quod si ex phlegmone doloris natus fuisset, non solum per id infrigidans non resedisset, sed etiam redditus fuisset vehementior. Potest vero quis ex eo, quod levius morbum ferant, indicium ficti doloris sumere. Accidit enim istud omnino sæpe (non advertentibus iis qui morbi vehementiam simulat) quod in alium se, aliumque habitum, illi qui verè laborant, magnitudine videlicet doloris agitari, transjiciunt. Præterea si revera morbo vehementi prematur, quodvis perpeti auxilium parati sunt, accersuntque ipsi ultro medicos, ut agant quod illis lubeat, quo affectus ipse curetur. Sin vero leviter, penitusve non dolent, huiusmodi auxilia refugiunt: neque longiora jejunia, neque mordacium pharmacorum oblationem ferentes. Quæ sola quidem, cum graviter se laborare dicunt, huiusmodi dispositionibus conferre, nos illis affirmare oportet: quemadmodum & sectiones, & ustiones, & omnis cibi potusque, cui videmus eos esse obnoxios, abstinentiam. Morbum igitur simulantes, & magnitudo doloris arguet, & nos ipsi deprehendemus, cum ex aliis multis, tum ex medicinalis experientie notionibus: in quibus sunt languere, infrigidari extrema, pallere, interdum quoque frigidum sudare, pulsus inæquales (qui quidem iis etiam accidunt, qui mediocriter dolent) pluresque minorum, quam magnorum: & obscurorum, quam vehementium, habere: præterea interrogatum de morbi specie, peculiarē affecti membri dispositionem explicare posse. Quædam namque, dolores longè lateque se diffundentes habent: quædam verò tanquam fixos, unice tantum parti inhaerentes. Sic alia pungunt, pulsantque: alia quasi divellunt: alia quodammodo obstupescere, alia gravare videntur: nonnullæ denique vomitus, quædam ventris perturbationes, quædam caliginem inferunt.

EPITOMES GALENI OPERUM SECTIO
NIS SECUNDÆ FINIS.

Anima in somniis corporis profundum ingressa seditur solas corporis dispositiones sentire.

Ratio communis.

Thapsia culas.

Doloris unde p. indicium.

Simulans dolorem ratione prehensum sint.

Morbis species di.

Colici affectus ex cruditate refrigerationemque gignuntur.

EPITOMES OMNIUM GALENI OPERUM

SECTIO TERTIA,

ILLUSTRISSIMO ET CLEMENTISSIMO PRINCIPI,
COSMO MEDICES TUSCORUM DUCI OPTIMO ET MAXIMO;
ANDREAS LACUNA Secobiensis, Doctor Medicus, miles
Sancti Petri, S. D.

HUMANI CORPORIS FABRICAM CIVITATI OPTIME INSTITUTÆ ESSE similem, divinus ille Plato professus est, clementissime Princeps: neque id iniuria. Nam si constitutionem utriusque, dispensationemque accurate expendamus, nihil planè reperiemus in civitate, quod longè cumulatius absolutiusque, humano etiam non insit corpori. Etenim fortissima quæque civitas solet esse valido cineta muro, quo incursiones hostium atque insultus arceantur. Vice muri cuiusdam est corpori etiam extima cutis, quæ tuetur ipsum ab iniuriis extrinsecis. Civitatem qui volunt inexpugnabilem reddere, minimeque insidiis obnoxiam, solent semper optimi duces unam tantum illi portam amplam relinquere, excipiendis comitatibus perviam: plures autem veluti canales & aquæ ductus, ad illius expurganda excrementa. Similiter etiam natura os unicum corpori humano indidit, per quod nimium ingrederentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas pertinent: sermo autem elideretur, instruendis animis hominum pietate & doctrina, maxime necessarius: ac præterea varios meatus, per quos excernerentur quæ non erant futura ex usu. Optima quæque civitas, præsertim si duratura sit, unico tantum, sed prudentissimo, iustissimo, & clementissimo debet esse Principi subdita: quandoquidem Polyarchia semper fuit seditioni opportuna. Princeps autem ipse à civium commercio abstractus, à fidisque stipatoribus custoditus, in sublimiori fortiorique urbis parte se continere, ut illinc, veluti ex quadam specula, universos cives suos contueri, & si qua coniuratio oriatur, eam facile restringere possit. Non aliter, dubio procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium facultatum est imperatrix, in cerebro, sublimiori corporis parte, veluti in arce quadam consistens, membris universis sibi subditis imperat, eisque vivendi leges imponit. Eius autem stipatores, ac veluti incorrupti quidam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam non facientes excubias, explorantesque singula, quæ aut rationi ipsi, aut cuiuspiam subiectorum illi membrorum, obesse aliqua ex parte possint, quicquid tandem perceperint, acutum sensui communi renunciant: qui ceu dux quidam, ipsi rationi coniunctus, illis præfectus est. Jam verò ut Principibus adsunt nonnulli viri à secretis, qui eos in expediendis negociis magna solitudine liberant: sic adstrationi memoria, universa quæ illi occurrunt, si alicuius ponderis sint, quam fidelissime asservans: eaque dum occasio postulat, subito, veluti ex promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sacramentarios, tum ad repellendas iniurias extrinsecas, tum ad continendos in obsequio & fide ipsos animos civium. Non secus profecto divinus ille architectus noster, rationi vim irascibilem, à Platone ἡμωδὴν vocatam, adiunxit: ut si quando ratio immerito ab aliquo infestaretur, confestim hæc excandescens, illi ferret manus auxiliatrices, omnemque vim propulsaret. Collocavit autem natura hanc ipsam, qua irascimur, facultatem, in corde: ut media exquisita esset inter rationem atque cupiditates, quæ in iecinore sitæ, atque illinc varias excursions facientes, admodum seditiosæ existunt, rationique plurimum negocii facessunt. Quocirca inter ipsas & vim irascibilem, natura etiam vallum firmissimum, diaphragma nempe, interiecit, ne videlicet imparatam illa iracundiam opprimerent, insurgentesque postea contra rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in civitate opificia hominum varia: cum alij, gratia exempli, conficiant panes: alij culinariam exerceant: alij recrementa omnia expurgent: alij denique diversas merces per totam urbem in communem usum traducant. An non etiam in corpore humano ventriculus cibos concoquit, hepar sanguinem gignit, melancholicum succum expurgat lien, vesicæ urinam, venæ per universum corporis habitum (veluti bauli quidam) sanguinem copiosissimum rivant, arteriæ vitalem spiritum, ac breviter, nervi animalem, qui autor est motus & sensus? Corporis itaque nostri harmonia civitatis optimam refert constitutionem: imò verò respublicæ, civitatesque universæ, ad exemplum corporis humani sunt conditæ, cum arti natura ipsa tempore & dignitate antecellat. Quemadmodum igitur si in aliqua civitate princeps quidem, ut par est, dominetur: cives autem omnes, militesque, eius decretis audiant: atque unusquisque opifex suo rectè fungatur munere, salus reipublicæ constat: labefactatur verò, si contraria accidant: sic etiam quandiu in nostro corpusculo ratio ipsa gesserit habenas imperij, affectus autem omnes atque cupiditates obtemperaverint: singulaque particula pro dignitate sua munia exercuerint, nec interim prava alimenta ingeruntur: tandiu certe integrè sanitate corporis animique perfruemur. Si verò aut ratio ipsa in consilium admittat cupiditates, aut irascibilis facultas in unum cum his adversus rationem conspiret: aut ex organis quæ usui communi inserviunt, unum, plura, vel omnia, præter suas obeant functiones: vel denique materiae unde particulae aluntur sint cacochymæ: pro concursu harum causarum necesse est aut mentis, aut corporis, aut utriusque, morbum contrahamus. Atque ita sanè varia in corpore morbum genera oriuntur, dissoluta videlicet alterataque, variis modis habitudine illa & temperie, quam inter se mutuo universa membra, dum naturaliter ordinè responderent, tuebatur. Quorum universa curatio eadem adhibetur methodo, qua curari solent etiam morbi Reipub. Quippe ut in hac peccata leviora nunc vinculis, nunc virgis, nunc auxilio, nunc succisa auricula coercentur: in graviora autem, laqueo, securi, flamma, atque ferventi oleo, acerbissime animadvertitur: sic exiguos quidem affectus corporis, leviusculis quibusdam præidiis, utputa purgatione, atque interdum sola tenui victus ratione, curamus: contumaces verò immedicabilesque, (cuiusmodi tum sphaæli, tum cancri existunt) fero, canterioque, ne in sanas partes grassentur, exterminavimus. Ceterum quem

admodum ad stabiliendam Rempublicam plectendosq; facinorosos homines, leges fuerunt inventae: sic ad conservandam temperiem corporis, rescindendosq; morbos, è caelo delapsa nobis est Medicina. Quo munere nullum haecenus mortalium generi à Deo ipso datum est maius, nec (si Galeno credendum sit) dabitur unquã. At vero quum hanc ipsam artem atq; industriam medendi, olim sola experientia constantem, Hippocrates primus omnium methodo tradidisset, reliquisset tamen incultam, imperfectamq;: postea superveniens Galenus, multis illam modis excoluit, eiq; extremum ornatum addidit. Qui cum ob illam quidem admirandam doctrinam ac sermonis fecunditatem, qua planè refertus est, magno exciperetur omnium ferè studiosorum applausu: ob prolixitatem autem immensam (qua in tanta vite brevitate est exosa) nonnulli à lectione illius abhorrent: equidem ut ad votum omnes eo fruerentur, universa viri illius opera in breviusculam quandam periochen, verum admodum succulentam, ea fide & diligentia contraxi, ut ex iis qua iuvare lectores poterant, nihil prorsus omiserim: multa autem qua depravata & perversa in codicibus tam Latinis, quam Graecis erant, accuratissime restituerim. Ex quibus nostris lucubrationibus placuit sub splendore Excellentiae tuae Illustrissime Princeps, partem maximam adere, nempe quadraginta commentarios Galeni, qui in se omnes differentias morborum, atque eorum curandorum generales methodos continent: utique sperans fore, ut cum ipse inter omnes Italiae Principes optimorum ingeniorum sis promotor & altor, eisq; semper ceu propitiũ quoddam sydus affulgeas, vel ex sola tui nominis praefatione, studiosi omnes ad eorum lectionem inflammarentur. Adco siquidem tuam Celsitudinem, cum ob alias planè regias virtutes, tum vel maximè ob ardentissimum istum sapientiae amorem, quo semper accensa est, docti omnes ubiq; locorum suspiciunt, colunt, & venerantur, ut se non minus debere tibi, quam ipsis Musis, universi uno ore pronuncient: qua (ut ego reor) opinione minime hallucinantur. Siquidem non modo studiosi, sed artes etiam, atq; scientiae universae, si non maiorem, ac certè non minorem iis gratiam debent, qui sua munificentia fovendo ipsas, ut subinde crescerent, summumq; suae dignitatis fastigium attingerent, effecerunt: quàm illis, quorum industria primum inventa, ac in usus hominum adita sunt. In maximam itaq; sibi felicitatem ascribunt omnia bonarum literarum studia, quod hisce turbulentis calamitosissq; temporibus, dum Italia penè universa varijs aestuat disidiis, versaturq; in assiduo strepitu armorum: dum optima quaq; instituta infirmis titubant pedibus: dum virtus pudorq; exulat omnis, nacta sint clementissimum & serenissimum Principem, qui explosa undiq; ea in suos sinus excipiat, exceptaq; adversus iniurias omnes tueatur. Haud ab re igitur illustrissimus & reverendissimus. D. D. Franciscus à Bovadilla & Mendoza, sanctae Romanae Ecclesiae Senator vigilantissimus, meusq; patronus unicus, nec non illustrissimus & sapientiss. D. D. Joannes Furtadus à Mendoza, apud Venetos Orator Caesareus, uterq; Celsitudini T. addictissimus, nunquam desinunt heroicas istas tui animi dotes magnificis encomiis efferre: Florentiamq;, tuam istam florentissimam urbem, nimium felicem vocare, quod obtigerit illi Princeps iustissimus, clementissimus, sapientiaq; simul & pietate integerrimus. Ergo si, Illustrissime Heros, hasce nostras vigilias tuo patrocinio dignaberis, ego quidem videbor hand luisse meam operam. Galenus autem, ad pristinam dignitatem quam gerebat olim, dum in summa esset auctoritate apud priscos Imperatores, deesse sibi nihil prorsus existimabit: quin potius herens apud C. T. auctam plurimis modis beatitudinem suam arbitrabitur. Vale. Venetiis, ex adibus Illustriss. viri, D. D. Joannis Furtadi à Mendoza, in hac Repub. Caesarei Oratoris longè dignissimi. IIII. Idus April.

M. D. XLVIII.

GALENI



GALENI PER- GAMENI DE DIFFEREN- tijs morborum, Liber.



VNIVERSI tunc se sanos existi-
mant, cum optimè ad vitæ fun-
ctiones ministerio particularū
utuntur. At eam partē ægrota-
re arbitrantur, cujus operatio sit
laxa. Cum igitur sanitas inve-
stiganda sit, aut in ipsis operationib⁹, aut in fabri-
ca instrumentorū: manifestū utiq; est, morbū es-
se vel operationis, vel structuræ oblationē. Cæ-
terum sanitas nō operationis actu, sed aptitudi-
ne potius est definiēda. Sanitas itaq; moderatio
quædam existit: morbus autē, utpote sanitati cō-
trarius, in immoderatione eorū consistit, quorū
sanitas est moderatio. At verò cum animalium
corpora magis & minus suscipiant, pati q; & alte-
rascere possint (id quod fieri nō posset, si ex ele-
mento cōstarent unico, aut ex atomis nulli alte-
rationi obnoxii) tot nimirū genera morborum
simplicium cōtrahent, quot sunt elementa ex qui-
bus cōstantur. Etenim cōpositio & formatio tri-
plex reperitur in corpore. Prima quidem simila-
rium particularū est: ut arteriæ, venæ, ossis, ner-
vi, cartilaginis, ligamenti, membranæ & carnis:
secunda autē, instrumentaliū: ut cerebri, cordis,
& consimiliū: tertia deniq; totius corporis. Cor-
pus siquidem ex instrumentalibus cōstat: instru-
mentales autē partes, ex similaribus: illæ deniq;
ex simplicissimis elementis cōstituuntur. Porro
si elementa cōstituamus impassibilia esse (ut nō
nulli autumarunt) duobus tantū morbis particu-
læ similes prement: meatuū videlicet astrictio-
ne, & eorundem relaxatione. Fruentur autē sani-
tate absoluta, dum eorū elementorū constructio
fuerit cōmoderata. At si nostri corporis elemēta
mutuō inter se patiant⁹, & tota per tota implicē-
tur (id quod incōcussè est tenendū) totidē sim-
plices morbi dicēdi sunt, quot primaria elemen-
ta censent⁹. Primaria autē elemēta sunt quatuor,
calidum scilicet, frigidum, humidum, siccum: ex
quibus moderatè confusis, oritur sanitas: immo-
deratè verò, ægritudo. Erunt itaq; similarium par-
ticularū simplices morbi quatuor numero: cali-
ditas videlicet, frigiditas, humiditas atq; siccitas,
ubi earum qualitatum singulæ, naturæ modū ex-
cesserint. At morbi partiū instrumentaliū, tum il-
lis qui ex impatientibus constare corpora dicunt:
tum nobis, qui ex elementis affectioni subiectis,
ea cōflari arbitramur, prorsus existunt cōmunes.
Sunt autē eorū genera quatuor. Primū enim est,
ubi forma cōveniēns membro fuerit vitiata: se-
cundum, ubi in numero reperitur vitium: ut si qd
desit, qd haberet oportunitū: aut redundat ali-
quid minimè necessariū. Tertiū genus consistit
in organi magnitudine, ubi aliquid impenitus a-
dultum sit, aut similiter diminutū. At quartū ge-
nus refertur de prava cōpositioni: quæ fieri so-
let aut naturali positi variato, aut mutata partis
copula. Porro prima instrumenta dicuntur, quæ
cum conflent⁹ ex particulis similaribus, unius o-
perationis gratia sunt cōstituta: ut musculus, at-

que vena. At quæ rursus ex his cōstantur, ut digi-
tus, atq; hoc magis pes, instrumenta secunda di-
cuntur. Verū utriq; instrumentis erūt ipsi morbi
cōmunes. Aliud autem genus morbi, præter jam
dicta, nullū est reperire, quod sit propriū vel sim-
plicibus, vel cōpositis partibus. Est autem unus
morbus cōmunis corporibus similaribus juxta
& dissimilaribus, nempe unitatis divortium. Ad
reliquas tamē simplicium morborū in partib. si-
milaribus differentias examinādas nos converta-
mus. Igitur impatientiū elemētorū autores, duas
in similaribus corporib. ægritudines statuebant:
nempe aut astrictionē, aut relaxationē meatuū:
quarū singulæ, in alias rursus differentias secātur.
Astrictio siquidem sit, cum aut totū corpus simul
cōtrahitur, aut soli obstruuntur meatus: relaxatio
autē, ubi universum corpus simul in omnē par-
tem laxatur, aut soli aperiuntur meatus. Similiter
juxta opinionē secundā, morborū partiū simila-
rium duplex differentia nobis oritur. Nam inter-
dum quidem solis qualitatis, alterantur: interdū
autē, cum humorū affluxu: qui sanè secundus mo-
dus, tumorem conspicuū excitat. Cæterū una &
item altera harum differentiarū, varias differen-
tias sortitur. Ut autē ad partium instrumentaliū
(quarum sanè imbecillitas vel ob meatuū ame-
triam, vel ob intemperiem nascitur) discutiē-
dos morbos nos convertamus. Totius instru-
menti functio tunc præcipuè vitiabitur, ubi pars
ipsa, quæ functionis est causa, ægrotarit. Quan-
& reliquarū partiū, illi inservientiū, vehementio-
res affectus, actionem ipsam impediunt. Obla-
siones igitur quæ omnino propria ratione, im-
mediateq; operationē totius organi offendunt,
aut saltem impediūt, ægritudines sunt putandæ.
At si minimè id p seipsas moliatur, sed ea solum
ratione, quod primi instrumenti officiūt opera-
tioni, causæ morborū sunt, nō item morbi. Dupli-
citer autē solet unusquisq; morbus cōtingere in
partibus instrumentalibus. Nam aut sequitur alios
morbosos affectus, aut cōtrahitur à prima gene-
ratione. Porro ubi pars aliqua in tumore attolli-
tur, atq; idcirco meatus illius occluduntur, si qd
talis particula nullā habeat propriā operationē,
obstructio ipsa meatuū dicitur morbus dunta-
xat: tumor verò nequaquā, sed obstructionis cau-
sa. Cæterū si affecta pars aliquod munus propriū
obtineat, hac ratione tum obstructio ipsa, tum
particulæ tumor, morbus est appellandus. Quæ-
admodū (exempli gratia) si tunica alicujus venæ
quæ in gibbis hepatis est, adeò intumescat, ut e-
jus cavitas obstruatur: tumor quidē ipse, morbi
dicitur, q sanguificationem oblat: obstructio
autē similiter, quod impediatur distributio. Si-
quidem qui affectus primò lædūt operationē, ii
& sunt, & verè dici morbi merentur. At operatio-
nis oblatio, passio aut symptoma, non morbus,
est appellanda. Qui verò ipsam induxit affectus,
morbus absolute vocatur: sicuti & causa morbi
ca, quicquid ipsum morbū pepererit, si aliā læsio-
nem nō adferat. Attulimus itaq; exemplū mor-
bi, q in genere formationis cōsistit. At in nume-
ro, duas differentias morborū assignaveramus:
cū scilicet aliqua particula crescit, aut superab-
undat. Quarū differentiarū utraq; rursus in bi-

*Instrumenta
secunda qua-*

*Solutio contra
nisi est mor-
bus commu-
nis tam simi-
laribus quā
dissimilari-
bus partib⁹.
Similarium
partiū mor-
bi, secundum
constituentes
impassibilia
elementa,
astrictio &
laxatio.*

*Similarium
particularū
singuli mor-
bi sunt dupli-
ces, quaten⁹
aut solis qua-
litatibus,
aut acceden-
te humorum
affluxu, affi-
ciunt.*

*Instrumenti
functio quā-
do vitietur.*

*Affectus pri-
maris læden-
tes functio-
nem, sunt
morbi.*

*Causa mor-
borum quæ
dicenda.*

*Instrumenta-
lis morbus
duplitter ac-
cidit.*

*Morbus in
formatione.*

*Functionis
læsis, nō mor-
bus, sed pas-
sio aut sym-
ptoma voca-
tur.*

*Causa morbi
quæ sit dicen-
da.*

*Morbus in
numero du-
plex, cuius
utraq; diffe-
rentia bifor-
mam scindi-
tur.*

nas alias secatur. Siquidem eorū quæ superfluūt, nonnulla planè sunt ex genere naturali: ut si cui sextus adnascatur digitus: nonnulla verò toto genere præter naturam: veluti si in ventre gignantur vermes, aut in vesica lapis. Similiter deficientiū particularum, nonnullæ quidem penitus abolitæ sunt, nonnullæ verò ex dimidio præcisæ: utrunq; autè, aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quæcunq; functionem impediunt, eadem ratione in morborū genere cōtinentur. Quæcūq; verò par-

Gurgulio præcisus perturbat vocem, pedusq; & pulmonem refrigerat.

Morbus in magnitudine.

Morbi in depraßata compositione.

tem aliquam operationi dicatam, vel refrigerat, vel non satis ei alimenti transmittit, causæ morborum dicuntur. Quædam tamen & morbi, & morborū causæ censentur: ut si gurgulio radicatus præcidatur. Nam & vocem perturbat, & pedus & pulmonem refrigerat. In magnitudine etiam varii morbi contingunt: ubi scilicet totum corpus, vel pars aliqua, aut in prima generatione, aut ob aliquem affectum præter naturam, vel prodigiosam contraxit molem, vel præter modum est imminuta. Qui morbi in depravata cō-

Unitatis solutio utrisque partibus existit morbus communis.

Solutionis continui species diversa, pro differentia particularum.

Similarium morborū compositionis differentia quatuor, iuxta constituentes patibilia elementa.

Affluxus humorū gignit quatuor differentias morborum compositorū. Solutio continui.

Inflamata simul & exulcerata particula, quot morbos simul patiuntur. Inflammatio quid.

positura consistunt, varias differentias sortiunt. Alii siquidem sunt, ubi naturalis partiū situs variatur: alii ubi ligamenta nimis solvuntur, ac relaxantur: alii ubi illa impensè fuerint astricta. Quippe immodica linguæ vincula, loquendi mādendi; impediūt functionē: pudendorū verò, ob aversum meatū, impedimento sunt, quo minus procul rectaq; excuriatur semen. Reliquum autè est quintrū ægritudinis genus, nempe unita-

tis solutio, quæ tam similaribus q̄ dissimilaribus partibus accidere potest. Nam si in manu (gratia exēpli) nervus aliquis præcidatur omnino, talis solutio erit cōmunis & toti instrumento, & ipsi præcisæ particulæ. Quod si nō integrè, sed aliqua ex parte præcisus fuerit, solius nervi propria judicatur affectio, instrumenti verò nequaquā, nisi ex accidenti. Sed pro differentia particularū, conti-

nui solutio varia sibi nomina vendicat. Siquidem quæ in osse sit, ab omnibus fractura vocat. Quæ verò in carne cōtingit, ulcus, vulnus, atq; ruptura. Quæ nervosis particulis accidit, cōvulsio nominari consuevit. Diximus itaq; simplicium differentias morborū: superest autè nunc, ut ad compositorū dignotionē veniamus. Erit igitur juxta hæresim priorē in particula simili morbus cō-

positus, dum illius, hi quidē adstringuntur, hi verò relaxantur, meatus. At juxta eos, qui elementa esse alterationi objecta cōtendunt, quatuor numero cōpositi morbi censentur: nempe calidus simul & humidus, calidus simul & siccus, frigidus juxta & humidus, frigidus atq; siccus: dum utraque videlicet qualitas excellit plus q̄ naturæ cōveniat. Quod si etiā qualitatibus illis plus iusto auctis, accedat pariter humorū affluxus, totidem morbi nascetur, differentes nimirū ab illis, qui invadūt sine humorū colluvie. Similiter solutio cōtinui miscetur morbis cōpositis secundum unam & alterā sectam, necnon simplicibus, quorum à principio mentionem fecimus. Porro omnes inflammatæ simul & exulceratæ particulæ, tres quidē necessariò, nōnunq̄ quatuor morbos patiuntur. Voco autè impræsentiarū inflammatio-

mores, mutuò inter se cōmiscentur, raroq; reperire aliquē ipsorū purū atq; syncerū licet, necessariò dicendum est, erysipelas, herpetem, carbunculum, cancrum, atq; alios id genus tumores, esse compositas ægritudines. E quibus carbunculus quidē semper cum ulcere invadit, cætera verò interdum citra ulcus infestant. Gignitur autè erysipelas à rufabile, ab atra cancer, inflammatio à sanguine, à pituita deniq; œdema, existens tumore laxus & cedens. Qui humores tamen si specie sint humidi, potentia tamen nō omnes humidi sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: flavæ, calida & sicca: ut pituita, frigida & humida: ac sanguis deniq; humidus simul & calidus. Igitur de morbis cōpositis similariū particularū dictū nobis cū sit, ad eos qui instrumenta discruciat, sermonē jam convertamus. Proprii dissimilariū partium dicuntur morbi cōpositi, qui plures atq; diversas partes simul affligerint: ex accidenti autem, qui unicā tantum instrumentorum particulam occupaverint. Etenim si lippitudine oblideatur tunica incumbēs corneæ, cū lippitudo quidem sit inflammatio ipsius partis, inflammatio autem omnis existat cōpositus morbus, nemini dubiū est, lippitudinē futurā etiā morbum compositum, tunicæ quidē ipsi proprium, ex accedenti verò universo instrumento. Cæterum si pterygiū, suffusio, ac deniq; angulorum coarctatio simul ipsum oculum presserint, constitutio talis totius oculi dicetur ægritudo composita, cū nimirū uno eodemq; tempore diversæ particulæ contristentur. Nihil autem refert si dixeris, unicam esse compositam ægritudinem, an plures, sed in diversis partibus constitutas.

Carbunculus in semper ulcere.

Tumor ter natus.

Singuli humores.

Humores quatuor.

Si quis perie sit.

Diffimilium partium.

bi comp.

qui sin.

cedendi.

Lippitudo inflama.

tunica bēti co.

GALENI PERGAMENI

de causis morborum, Lib.



Unc verò ad morborū qui secundum sectā generosiorē partes similes invadūt, causas discutiendas nos cōvertam, idq; à calore immoderato auspiciati. Universa corpora pl^o æquo incallescere solēt, vel ex motu improbo, vel ex putredine, vel ex cōsortio alterius corporis fervidioris, vel ex astrictione, vel ex alimēto ad accēdendā caliditatē accōmodo. Cæterum ubi q̄s immodica exercitatione usus fuerit, si calor inde ortus non occupaverit totum corpus, lassitudinē tantum inducit, videlicet articulorum & muscutorū, ad quos præcipuè movendum spectat. Si verò extēdatur per universum corpus, febrem accēdit. Ex ira etiā, quæ caloris iuxta cor, est veluti quidā fervor, ubi is per totum corpus dispergitur, solet febris succēdi. In tumorib. etiā præter naturā, ubi humores putrescunt, calor interdū cordi sensim cōmunicatur, ac deniq; excitatur febris. Quare hīc venit intelligēda secunda & tertia causa caloris præter naturā. Nā ob putredinē, & ob viciniā partis cōtabescentis, in iis tumorib. febrilis calor accēdit. Quarta species causæ consistebat in astrictione, & quidem meritò. Nam si ob astrictam cutim cohibeantur diffilari ea, quæ prius diffilari cōsueverāt, si quidē fuliginosa fuerint, in specus cordis conversa, eos exurunt, protinusq; febrem accendunt. Calido-

Calor in discus à bus acc.

occasion possit.

Morbi ad i.

culos & sculos pe.

net.

Ira est ca.

ris qui in cor est & quidam.

vor.

Febris ex astrictio.

quomodo oriatur.

rum

rum etiam alimentorū usus (in eo enim quintū genus constituebamus) interdum febrim accendit. sicuti & acria medicamēta, sive remedia sint, sive delēteria & contraria. Non autem ex æquo omnes hasce ob causas febricitāt: quod nec semper illis cōtingat par quantitas aut activitas causæ: quodq; animantiū corpora plurimū alterum ab altero differant. Etenim ad hoc ut accendatur febris in corpore, oportet ut corpus ipsum sit accommodatū & habile ad excipiendam febrilem caliditatē: causa autē efficiens existat valida, tempusq; & patiētis proximitatē sortiatur, ut videlicet in actione immoretur diutius, & passuro corpore superior evadat. Porro causæ quæ in corpore humano præter naturā oriuntur, causæ antecedentes vocantur: procatarticae verò, sive evidentes, quæ extrinsecus advenientes occurrant. Frigiditatis etiā plurimæ existunt causæ: veluti frigidorū propinquitās, alimentorū quantitas atq; qualitas, adstrictio etiā atq; laxatio, oculi deniq; & motus immoderatus, quibus ex occasionibus constat etiā ipsum ignē extinguī. Prima igitur species causæ occurrans extrinsecus, sive contactu ipso, sive etiā potentia, solet frigiditatis morbum inducere. Ob secundam verò, nempe ob frigidiora alimenta, nonnullos correptos vidimus attonito aut epileptico morbo, aut alio quopiam modo refrigeratos: id quod ex ebrietate vel maximē accidere solet. Quāq; vinū modicē hauritū, cum familiare alimentū sit, mirē calorem augeat. In universum autē omnes optimi cibi, qui animali plurimū nutrimenti adferūt, si supra modum sumantur, frigidos morbos generant: sicuti & cætera, quæ natura refrigeratoria cum sint, similiter ingeruntur. Juxta tertium genus causæ, nempe adstrictionem, sæpissimē corpus habitus etiam refrigeratur: ut quæ interdū sopores graves, veterumque & apoplexiam inducat. Adstrictione autem tunc præcipuē torquetur corpus, dum venæ ipsæ & arteriæ adeo turgent & intumescunt sanguine, ut nullus relinquatur locus inanis, in quem, ubi dilatantur, ambientem aërem possint excipere. Quo quidem dum defraudantur, nativus calor subito ferē extinguitur. Proinde qui sic sunt affecti, actutum destituuntur motu simul & sensu: id quod Hippocrates significasse videtur, dicens, Venarū (hoc est, arteriarū) interceptiones statim vocē eripere. Igitur cordis calor, per meatū gutturis cum ambiente nos aëre commercium habet. Quam viam si præcluseris, illico præfocaveris animal. Calor autē qui in omnibus est arteriis, per cor quidem, quatenus viam habet ad fauces, & per universam cutem, in circumfluū aërem transpirat: ac ventilatur quidem, dum attolluntur arteriæ: purgatur verò a fuligine, dum contrahuntur. Atq; utroq; horum, naturalis ipsius modus servatur. Si igitur tali motionis vicissitudine ob adstrictionē destituantur arteriæ, necessum est calorem extinguī, corpusq; omnino refrigeratū emori. Cæterū si corpus referatū fuliginoso excremento astringatur, aut excitabitur febris, aut extinguetur calor nativus: si vero halituoso vapore sanguinis, aut fiet corpus ipsum plethoricū, aut eius calor incrementum. Sed quemadmodū adstrictio sæpius frigefactionis est

causa: sic etiam & rarefactio, ubi plus quā ex usu sit dissipat dispergitq; nativum calorem, frigidius efficit corpus. At verò perinde ac adstrictio ipsa interdum universo corpori, nonnunquā alicui eius parti accidere solet: eodem etiam modo habet & rarefactio. Porro quæ extrinsecus admoventur, partem ipsam raram vel constipatā reddere possunt. At vincula arctissima, & vita membrū pri- vant, & ipsum impensè refrigerant. Sed jam de siccis affectibus opportunum est ut dicamus. Si quis multo magis diffletur, quā pro modo alimentum assumpti, utaturq; cibis siccioribus, facile in siccam ægritudinē delabetur: præsertim si curis & anxietatibus, necnō vigiliis torqueatur. Sicca etiā tēperies aëris, balnea quæ desiccandi vim obtinent, necnō medicamenta, quæ intus & foris administrata, exiccandi possident facultatē, similiter corpora exiccant. Humidorū morborū omnes sunt causæ cōtrariæ: nempe maxima ciborū humectantiū colluvies, molliuscula vivendi ratio, animi summa tranquillitas, ac deniq; balneorum dulciū usus immoderatus, maximeque post cibū. Ad idem facit desidiofa vita, pluviarum copia, humida temporis cōstitutio, ac breviter, humectantia medicamēta. Jam verò causæ cōpositorum morborum, similiter cōpositæ sunt. Si. n. calida simul & sicca in unum aliquādo cōspirēt, calidus simul & siccus sequetur morbus. Itidē est cogitandum & in aliis combinationib. At sæpius causæ natura similes, corpus ipsum immutāt. Plurimūq; tamen viribus pugnant contrariis, ita ut aliquādo cōtingat corpus simul fieri calidum atq; frigidum, sicuti & siccū & humidum, plus quā naturæ cōveniat, etiam si minimē id fieri posse videatur: quæ inæqualis intēperies vocatur. Advertendum autē est rursus, corpora ipsa interdum a solis qualitatib. alterari, quandoq; etiā ab illis quæ de, sed accedēte aliquo affluxu, humido quodē specie, facultate verò non item. Flava siquidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca & frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita deniq; frigida & humida. Quorum humorum singuli, interdum synceri & puri, interdum invicē misti, solent in imbecilliorē partē cōfluere: ob idq; tumores partiū variātur. Etenim cum quatuor sint facultates, quib. quælibet pars tum animalis, tum plantæ, prædita est: attractrix, retētrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate offendat: nec sit par robur omni parti singularum: semper quæ fortior est, excrementum ipsum ad imbecilliorē, pellit. Omnium aut imbecillima est cutis, totius corporis excrementa recipiēs. Assignatis jam causis morborum similium particularum, ad organicos deinceps nos convertamus, exordium a formatione vitiata sumētes. Evariat enim interdum naturalis figura, dum ob maximā materiæ colluviē, aut ob qualitatem incōmodā impedito seminis motu, in utero depravatur ipsius foetus formatio. Secundò autē potest vitari alicuius particulæ forma, dum infantes nō rectē ab obstetricibus excipiuntur (facile siquidē pervertuntur, molles fluxilesq; cum sint) aut ruditer involvuntur fasciis, aut lac tabefactum sugunt, aut perperam educantur, sive inepta victus ratione, sive exercitiis intempestivis:

Rarefactio qua ratione refrigeret.

Admotā extrinsecus.

Vincula arctissima, & vitæ membrum pri- vant.

Sicca intemperies causa.

Humida intemperies causa.

Compositorum morborum causa composita sunt.

Contrariis intemperantibus corpus nostrū simul posse affici. Inæqualis intemperies quæ sit dicenda.

Humorum singulorum temperies.

Tumores partium variari pro humorum differentiis fluentiū.

Facultates naturales sunt quatuor.

Excrementū omne qualitate aut quantitate infestare: semperq; a fortioribus ad partes imbecilliores protrudi.

Cutis est omnium imbecillima pars.

Forma membrum cōveniens a quibus causis possit vitari.

Crura quippe, ob incumbentiū eis corporū pondus, interdum, in exteriorē, nōnunq̃ in interiorē partē torquentur: idq̃; pro nativā ipsorū inclinatione. Nam quibus rectiora sunt, q̃ ordo naturæ postulet, magna ex parte fiunt vatiū: vari autē, quibus magis curvata. Voco enim vatium, cui in exteriorē partē crus vertitur: varū, cui ē converso. At posteaq̃ adoleverint, sæpe ob repletionem immodicā, aut ob alimēti penuriā, figurā naturalem permutant, idq̃; primaria ratione. Illud enim in elephantiasi, hoc in tabe perspicuū est. At ob resolutionem nervorū, distentionem, inflammationē, aut scirrhū, naturalis membri figura ex accidenti vitiatur. Siquidem in iis qui altera parte sunt resoluti, membrū trahitur a musculis actionem facientibus: at in iis quos in altera parte convulsio exercet, aut phlegmone, aut scirrhū, aut dura cicatrix, pars sana trahit ab affectis musculis. Cavitates partiū atq̃; meatus pereunt, vel offenduntur, q̃ nimirū coalescant, aut constipentur, aut obstruantur, aut cōfringantur, aut in sese cōcidant. At facultatis retentricis motus immoderatus, solet esse causa cōstipationis: quēadmodū laxitatis, operatio expultricis immodica, retentricisq̃; languor. Exasperantur lævia, & lævigantur aspera (nam hæc ad formā viciatā pertinent) illa quidem ob acres humores, aut medicamēta abstergentia; hæc verò ob pinguitudinem succi, viscositatēve. Secundi generis, hoc est, viciati numeri causæ sunt, si quidem numerus sit diminutus, sectio, aut putrefactio, aut immodica refrigeratio: sin autē aliquid supercreverit, quod nō sit ē numero partiū natura constantium, formamque naturalem sortiatur, abundantia optimæ materiæ erit causa. Quod si id ipsum præ se formā nō naturalem ferat, materiæ qualitas non naturalis etiam erit in causa. Utrobique tamen vires validas esse oportet: alioquin nec conformari poteritq̃; est utile, nec extrudi q̃ vitiosum existit: natura enim utrūq̃; molitur. Magnitudo partiū augetur (in ea enim oblata tertium genus constituebamus) a copia materiæ benignæ, necnō a potentiæ robore: imminuitur autem a causis cōtrariis, vel ob sectionem, vel exustionem, vel putrefactionem, vel deniq̃; ob frigectionē ingentem. Quartum verò morborū instrumentalium genus quod in prava compositione consistit, interdum ob repentīnam improbamq̃; agitationem contingit: interdum ob articulorū humiditatē immodicā: quandoq̃; ob eversionem superciliorū in ipsis articulis: est cum ob relaxationē compositio vitiatur, quemadmodū in intestinorū lapsu, quæ laxato peritonæo in scrotum descendūt. Ex his itaq̃; & aliis plurimis occasionibus, organorū compositio pervertitur. Nunc verò alterius generis causas examinemus, quod utriusq̃; tam corporibus similaribus, q̃ instrumentalibus, cōmuniter accidit: id enim est unitatis solutio. Quæ quidem si carni accidat, ulcus aut vulnus vocatur: sin autē ossi, dicitur vel fractura, vel caries, quæ ab erodentibus oritur humorib. Ad capitis ossa, complura instituta sunt nomina. Collisio magna ex parte accidit carni: quanq̃ & in osse nōnunq̃ etiā cōtingit, idq̃; maximē in pueris, subirruente ex-

trinsecus aliquo violento, valido ac duro corpore. Ad solutionē etiam continui pertinent & ruptio & cōvulsio, hæc in nervis, illa in carne consistens: quæ causam suæ generationis habet, repentinum, validum atq̃; inæqualem motū. Ut igitur paucis expediam, omniū huiusce generis ægritudinum causæ, nōnullæ quidem occurrūt extrinsecus, nōnullæ ab ipso corpore emanant. Porro extrinsecæ sunt, ea omnia quæ percutere, collidereq̃; sunt apta. Quæ verò a corpore emergunt, sunt immodicæ inordinatæque animalis morioves, ac præterea humores vitiosi, erodendi vim possidentes. Hæ itaq̃; sunt simplices ægritudines similarib. partibus organicisq̃; cōmunes: ac præterea ipsarū simplices causæ. Compositas autē ægritudinū causas, nō est admodū invenire difficile, cum nimirū ex his quas diximus, cōstituātur.

GALENI PERGAMENI
de symptomatum differentiis, Liber
unus.



Mnis præter naturam affectus, aut morbus est, aut morbi causa, aut illius symptoma. Est autē morbus, affectus quidam præter naturam, functionē lædens. Cæterū differt affectus a morbo: nam ille quidem extenditur etiam ad sanos & neutros: hic verò solum circa ægrotantes versat, cum nimirū sanitati cōtrarius existat. At ab utrisq̃; dissidet, quod Græci pathos, Latini passionē appellāt. Est enim passio, motus qui ab altero fit in alterū: ita ut agentis motus dicatur actio: motus verò, eius quod affectum est, passio. In summa, ipsum affici, quodammodo idem quod pati est. Differt itaq̃; ab affectu passio, ipsius tantū motionis ratione. Quandoquidem in ipso verti & mutari, præterea alterari & moveri, passio habet generationem: in eo verò q̃ manet, prorsus affectus consistit. Propriè igitur affectus dicitur passio jam facta, non aut quæ etiam nū fit. Sed quemadmodū ad sanos & ægros ipse affectus extendit, sic etiā & passio: quo quidem nomine a morbo similiter differt. Rursus affectus ipse, alius quidē naturalē actionem efficit, alius verò evertit & labefactat. Est igitur sanitas, naturalis quidā affectus functionis autor: morbus autē, affectus præter naturā, oblata functionis causa. At passio, motus est in materia, qui ab agente fit: actio verò, ipse motus agentis. Quod autē suapte natura aliquid cōfert ad ejus quod fit generationē, causa vocat: quæ quidē & ipsa multiplex est. Nam materia, utilitas, scopus, instrumentū, initiū deniq̃; unde pficiscitur motus, hæc omnia causæ dicunt. Quæ verò nihil cōferunt, se tamen ab iis quæ conferūt sejungi non possunt, hæc ejus sine quo non, rationē obtinent. Adverte autē, aliquid fieri per se, idem esse quod primò: ex accidenti verò, q̃; secundò. Ut, si quis digito unū calculū moveat, a quo moveat & alius, per se quidē dicitur movere primū, ex accidenti autem secundū. Ad eundē igitur modum, qui affectus præter naturā suapte ratione actionem nō labefactant, sed per morbos a se productos, ij non morbi, sed morborū causæ, sunt appellandi. Morbi enim sunt, qui primò lædunt actionem.

Vari qui
sunt, & qui
dicantur.
Vari qui.

Elephantia-
sis.
Tabes.

Resolutis al-
tera parte
musculis, me-
brum trahi-
tur a reli-
quis, qui in
actione ver-
santur.
Constipati al-
terius partis
musculi, ad
se partem & a-
lentem alte-
ram trahūt.
Constipatio-
nis causa.
Laxitatis
causa.
Numeri de-
præcati cau-
sa.

Magnitudi-
nem partis
quæ causa
possint auge-
re, ac minue-
re.
Compositio
partis vitio-
sa unde acci-
dat.

Enterocæles
generatio.

Soluta unita-
tis causa.

Caries unde
gignatur.
Collisionis
causa.

Ruptio
Convulsio

Affectus
ter natura
est triplex
Morbus
affectus
ter natura
functionis
lædens
Affectus
morbus
differt
Passio
Actio

Affici
modo
quod pati
Passio
Fit in
natura
Passio
nos exten-
ditur.

Sanitas
quid.

Causa
Causa
multiplex
est.

Causa
nemine
ne quo
obtinere
Fieri per
ex acci-
ti, quid

Morborum
causa
Morbi præ-
ludent fun-
ctionem.

actionem. Porro quod morbum veluti umbra sequitur, id morbi symptoma vocatur: quæadmodum functionis læsio. Est autem symptoma largè sumptum, omnis à naturali statu mutatio: ob idque quicquid animali præter naturam accidit, ea significatione est symptoma. Quamobrem morbus quadantenus etiam symptoma dicitur, sicuti & causa præter naturam. Differt autem passione symptoma (tametsi interdum in idem coeant) quæ passio quidem omnino in motu versetur, sitque interim secundum naturam: symptoma verò non in motu tantum, sed in habitu etiam & permanentia esse possit, omnino præter naturam. A morbo verò differt, quoniam neque affectus necessario est, neque actionem ex necessitate lædit: quæ sanè ad constituendum morbum desiderantur. Porro symptomata propriè strictèque sumpta (de quibus agere est animus) differentia triplici continentur. Alia siquidem nostri corporis sunt affectus, alia functionum læsiones, alia ambo hæc comitantur: ut sunt excrementorum immodicè tum excretiones, tum suppressiones. Cæterum sub actionis læsione, privatio quoque mihi inaudiatur, quemadmodum immobilitas, insensibilitas, atque cruditas: quæ quædem actionum læsiones sunt. Has igitur symptomatum differentias deinceps examinemus, ab actionis læsione auspicari. Actionum læsio duplex est: altera enim ad animale, altera verò ad naturalem functionem pertinet. Actiones siquidem duplices potissimum numerantur, naturalis videlicet & animalis. Rursus animalis dividitur in sensibilem, motivam atque gubernatricem. Quorum membrorum singula rursus in alia secantur. Sensibilis quippe animæ functio, quinque differentias sortitur, usivam scilicet, olfactoriam, gustatoriam, auditoriam, atque tactricem. Motiva autem facultas, cum unicum instrumentum habeat, unum tantum habet motionis modum: variatur tamen pro particularium instrumentorum diversitate. Ultima functio animæ, quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem, ratiocinatricem, ac denique memoratricem dilucitur. Igitur noxæ omnium actionum sentiendi, communes quidem universalesque sunt, insensibilitas, & difficultas sensus: particulares autem, quæ in singulis sensibus reperiuntur: quemadmodum in oculis cæcitas: & caligo: in auribus surditas: & hebetatio: atque in aliis similiter, ubi videlicet actio abolita est, aut depravata aut diminuta. Cæterum tactus in actione sua, quam reliqui sensus, multo gravius symptoma, cum ab extrinsecus occurrantibus, tum vel maxime ab affectibus interioribus, solet recipere. Etenim alij sensus non ab internis, sed ab externis affectibus, in functionibus suis contristantur: ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod videlicet in se habeant facultatem tangendi. Est enim tactus omnibus sensoriis sensus quidam communis: reliqui verò quatuor, suo quisque tantum est proprius. Quamobrem oculi sæpissime gravi dolore cruciantur: contristato sensu tangendi. At verò vigilia & veternus, sunt ipsius communis sensus symptoma. Motricis facultatis triplex reperitur symptoma: immobilitas, diminutus motus, ac denique depravatus motus. Cæterum depravatus, alius tremulus est, alius convulsivus, alius palpi-

tans, alius denique vibras. Porro si convellatur universum corpus, animæque princeps potentia simul sit impedita, id symptoma epilepsia vocatur: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulque principes actiones cohibentur. Hæc itaque motivarum actionum sunt vitia. Proximum est, ut gubernatricium functionum jam offensas tradamus, ac primum imaginatricis. Hæc enim interdum tota corrumpitur exolviturque, quæadmodum in catalepsi: interdum autem vitatur, ut in delirio: est cum deficit atque debilitatur, quæ in lethargo contingit. Sic etiam ratiocinatio, nunc exolvitur penitus, ipsumque symptoma est amentia: nunc deficit atque remittitur, vocaturque id symptoma fatuitas: nunc læditur ac depravatur, quæ symptoma vocatur delirium. Plerumque siquidem in utrisque simul consistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando. Est quando duntaxat in altero. Interdum quippe ratio vitatur, imaginatione simul atque memoria illæsa. Quemadmodum etiam ratione integra, contingit tum imaginationem, tum memoriæ vitari. Quod autem in memorandi potentia consistant vitia, nemini opinor obscurum. De animalium itaque actionum symptomatum dictum nobis cum sit, ad naturalium symptomata examinanda nos convertamus. Methodus autem eorum inveniendorum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolitæ functionis, alterum non rite obitæ: quod quidem hoc est duplex: alterum quod in diminuta, alterum quod in vitata actione consistit. Exemplum autem ponamus in concoctione ventriculi: quæ interdum quidem tota corrumpitur, interdum remittitur ob imbecillitatem, interdum vitatur. Quorum primum symptoma dicitur cruditas: secundum, concoctionis tarditas: tertium pravitas & vitium vocatur. Porro appetitricis functionis symptomata sunt, abolita appetentia, & immodica cibi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si scopum minimè attigerit, atrophia & phthisis accidunt. Vitiatam verò nutritionem sequuntur, leuce, ophiatis, alopecia, & reliqua id genus symptomata. Cum igitur naturales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, sanè in singulis naturalibus organis, quatenus naturalia sunt, duodecim oriri possunt symptomata: tribus videlicet in unaqueque facultate cõgestis: in animalibus verò, quindecim. Quod si animale instrumentum simul & movendi & sentiendi vires obtineat, duodeviginti symptomatum formas habere poterit. Ventriculus igitur duodecim sortitur symptomata, quatenus est concoctionis organum: totidemque quatenus pars similis, quæ nutriri desiderat. Siquidem omnes particulæ quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata: nempe tria (ut diximus) secundum singulas facultates, ubi videlicet aut nihil trahunt, aut languide, aut vitiosè: ubi id quæ attractum est, aut non retinent, aut languide, aut vitiosè: ubi quæ jam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut diminutè concoquunt, aut in alienam qualitatem convertunt: ubi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut languide, aut perperam: hoc est, citius aut tardius, quam animali expediat. Ex quibus ta-

Motus depravati species. Epilepsia quid. Apoplexia.

Imaginatricis facultatis Symptomata.

Ratiocinatricis facultatis Symptomata.

Amentia quid.

Fatuitas. Delirium.

Rationem interdum vitatam, imaginationem atque memoriæ illa sicuti contrahit.

Naturalium facultatum singulis duplex tribuitur Symptomata, nempe abolita & non rite obita.

Ventriculi actionis Symptomata sunt, cruditas, concoctionis tarditas pravitas.

Appetitricis facultatis Symptomata.

Nutritoria actionis Symptomata. Facultates naturales sunt quatuor.

Naturalium instrumentorum singulis, duodecim attribuitur Symptomata.

Animali instrumento quindecim inesse posse Symptomata.

Similium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

Similarium particularium singulis quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim attribuitur Symptomata.

utiq; accidit, particulas non nutriri, aut imbeciliter, aut perperam & vitiose. Quod verò in facultatibus similariū particularū dicimus, id etiā intelligendū est in iis quæ ad instrumentales spectant. Porro alteratrix facultas in ventre tunc abolita censetur, ubi cibus talis relinquitur, qualis assumptus est. Imbecilla autē dicitur, quæ tardè concoctionē absolvit: sicuti de pravata, quæ in malignam qualitatem cibos ipsos permutat. At absoluta concoctio dicitur, ubi cibus in qualitate animati familiarē mutatur. Animadvertendum tamen hoc loco magnoperè est, alteri symptomati alterū nōnunq̃ succedere. Si quidē injustum cōplectendi tēpus, cōtinuò sequitur diminuta cōcoctio. Præterea celeris dejectionis ciborum inseparabilia symptomata sunt, excrementorum humiditas, alimentiq; per corpus immutata digestio. Corruptelā cibi sequitur necessario quidem excrementorū fœtor, nō necessario verò mordicatio & inflatio. Atq; horū sanè omnium jam dictorū symptomatū, quæ in actione oblata consistunt, sicuti & aliorū duorum generum, sciendum est morbos causas existere. Symptomatum quæ in corporum cōsistunt affectibus, primæ differentię sunt quatuor. Siquidem alia ad visum, alia ad odoratū, alia ad gustū, alia deniq; ad tactum pertinent. Etenim quæ ad visum spectant, ea sunt quæ cōsistunt in colore præter naturam, sive is universum corpus occupet, ut in arcuatis: sive aliquā ejus partem, ut in carbunculis. At quæ pertinent ad odoratū, ea in respiratu ac perspiratu deprehenduntur: ut si (gratia exempli) quod indies expirat ē corpore, sive per arteriam asperā, sive per universam cutim, gaveolens ac putre sentiat. In gustu autē symptomata sunt, omnes sapes qui ægris præter solitū accidunt: ut si alienas qualitates percipere sibi videantur. Tangibiles differentię sunt, ubi ea quæ subjiuntur tactui, genuinā mutarunt constitutionē: ut si cutis quæ antea erat mollis, deprehendatur dura, rigidaq; aut ē converso. Cum igitur omne quod naturale est, ex cōmoda temperatura nascatur: utiq; id quod præter naturā existit, ex aliqua intēperie orietur. Quāobrem cum hæc omnia quæ diximus, prorsus præter naturā sint, meritò intemperiei feruntur accepta. Atqui intemperies omnis est morbus: ergo liquidò constat has quatuor symptomatū differentias, à morbis generationē cōtrahere. Quæ verò vel excernuntur à corpore, vel retinentur in eo præter naturā (hæc enim ad tertiū pertinebant genus symptomatū) aut tota quidem substantia, aut qualitibus tantū, aut deniq; quantitibus, à naturæ ordine digrediuntur. Atq; ipsa etiā vel immediatè sequuntur morbos: vel mediatè: intercidētibz scilicet symptomatibus aliis. Jam verò hæmorrhagia, quod ad excretam substantiā pertinet, toto est genere præter naturā, fitq; aut aperto vasis osculo, aut rupto vase, aut eroso. Etenim vulnus, ruptura, erosio, proprii similariū partiū sunt morbi: at apertio osculorū, ad instrumenta pertinet. Accidit enim interdum ipse sanguinis fluor ob retentricis facultatis infirmitatē: interdum quia expultrix immodicè movet: nōnunq̃ ob utriusq; functionis noxam. Sic fit etiā mulie-

bre profluvium, aut ob dictarū functionū symptomata, aut quia sanguis est nimis serofus atq; subtilis redditus. Sciendū tamen est, nihil eorū quæ tempestivè, hoc est, ad animalis cōmodum, circa corpus cōtingunt, etiā si toto genere præter naturam sint, verè dici symptoma (quale utiq; est id quod sequitur morbum, atq; in læsione actionis consistit) cum nimirū unumquodq; eorū sit elegans & absolutū opus naturæ, tametsi ad alterū symptomatū genus, nempe ad affectum præter naturā, reduci possit: ut si sanguis per nares, aut hæmorrhoidas, commodè erumpat.

GALENI PERGAMENI

de symptomatum causis, lib. I.



N sensibili actione triplex symptomatum genus dephēditur. Unū, cum primū sensus instrumentū quippiā perpeffum est: alterū, cum sentiendi potentia: tertiū, cum ministratium primo sensus instrumento partium aliqua fuerit affecta: ut, in oculo primū sentiendi instrumentum, est chrystalloides humor, qui coloribus alteratur. Vis sentiendi est quæ à cerebro per nervum opticum, qui solus manifestum habet foramen, in ipsum descendente, procedit. Illius verò gratia creatæ sunt reliquæ omnes oculi partes. Quicquid igitur ex enumeratis sit, læsum animal vel malè vel nihil omnino videbit. Solet chrystallinus humor octo intemperaturis à naturæ modo discedere. At facultas visoria offenditur, vel nervo affecto vel cerebro. Hæc aut, quatenus similia sunt, octo morborū generibz cōflictantur: quatenus instrumentalia, tū obstructione, tum aliarū rerū innixu, atq; adeo divortio cōtinui, q̃ quidē tam similaribus, q̃ ipsis instrumentalibus semper adest cōmune. Jam verò si chrystalloides humor pervertatur ad alterū angulorū, haud ita notatu digna succedet noxa: sin verò vel ad superiora, vel ad inferiora declinet, tūc quicqd cernitur, duplicem esse videtur. Illa porro quæ ex usu sunt primo instrumento, variis modis etiam cōtingit lædi: ut puta si albugineus humor, spiritusve, q̃ ante chrystalloidē locatur, usque adeo copiosus sit, ut visoriam facultatem impediat: aut similiter si foramen rhagoidis vel relaxetur, vel coarctetur, magis q̃ expediat visioni: aut si in aliquā divellatur partē, aut deniq; si rumpatur. Cæterum relaxatio illius, sive ab ortu sit, sive postea præter naturam accesserit, semper visui incōmodat: adstrictio autē & imminutio, si quidē à nativitate contracta fuerit, acutissimæ visionis est causa: sin verò ex morbo talis coarctatio contigerit, visionē impedit manifestè: idq; nō quatenus coarctatio est, sed quatenus à pessimis causis inducta. At reliquorū neutrū, sive à primo ortu sive postea quā quis genitus est, acciderit, visioni incōmodū notatu dignū adferre potest. Etenim ubi alterū oculum claudimus, dilatatur alterius pupilla & spiritus antea ambobus particulatim distributus, universus in unū cōfluat. Idcirco quibus suffusus altero oculo clauso pupilla clarior apparet, ij sperare debent fore aliquādo, ut visum punctione facta, recuperent. Quibus autem non dilatatur, ij omni spe recuperandi visus sunt destituti. Unde liquidò

Alteratrix facultas ventriculi, quando abolita & imbecilla & depravata dicatur.

Symptoma unum succedit alteri.

Deiectionem ciborum celerem quæ sequantur.

Corruptelā ciborum quæ sequantur.

Morbi, quorum sint causæ symptomatum.

Symptomatum quæ in corporum cōsistunt affectibus, prima differentia est quadruplex.

Naturalia omnia ex cōmoda temperie nascuntur.

Intemperies omnis est morbus.

Hæmorrhagia quibus modis fiat.

Symptomata dici non debent quæ tempestivè atq; ad animalis cōmodum circa corpus cōtingunt. Sicuti de pravata, quæ in malignam qualitatem cibos ipsos permutat. At absoluta concoctio dicitur, ubi cibus in qualitate animati familiarē mutatur. Animadvertendum tamen hoc loco magnoperè est, alteri symptomati alterū nōnunq̃ succedere. Si quidē injustum cōplectendi tēpus, cōtinuò sequitur diminuta cōcoctio. Præterea celeris dejectionis ciborum inseparabilia symptomata sunt, excrementorum humiditas, alimentiq; per corpus immutata digestio. Corruptelā cibi sequitur necessario quidem excrementorū fœtor, nō necessario verò mordicatio & inflatio. Atq; horū sanè omnium jam dictorū symptomatū, quæ in actione oblata consistunt, sicuti & aliorū duorum generum, sciendum est morbos causas existere. Symptomatum quæ in corporum cōsistunt affectibus, primæ differentię sunt quatuor. Siquidem alia ad visum, alia ad odoratū, alia ad gustū, alia deniq; ad tactum pertinent. Etenim quæ ad visum spectant, ea sunt quæ cōsistunt in colore præter naturam, sive is universum corpus occupet, ut in arcuatis: sive aliquā ejus partem, ut in carbunculis. At quæ pertinent ad odoratū, ea in respiratu ac perspiratu deprehenduntur: ut si (gratia exempli) quod indies expirat ē corpore, sive per arteriam asperā, sive per universam cutim, gaveolens ac putre sentiat. In gustu autē symptomata sunt, omnes sapes qui ægris præter solitū accidunt: ut si alienas qualitates percipere sibi videantur. Tangibiles differentię sunt, ubi ea quæ subjiuntur tactui, genuinā mutarunt constitutionē: ut si cutis quæ antea erat mollis, deprehendatur dura, rigidaq; aut ē converso. Cum igitur omne quod naturale est, ex cōmoda temperatura nascatur: utiq; id quod præter naturā existit, ex aliqua intēperie orietur. Quāobrem cum hæc omnia quæ diximus, prorsus præter naturā sint, meritò intemperiei feruntur accepta. Atqui intemperies omnis est morbus: ergo liquidò constat has quatuor symptomatū differentias, à morbis generationē cōtrahere. Quæ verò vel excernuntur à corpore, vel retinentur in eo præter naturā (hæc enim ad tertiū pertinebant genus symptomatū) aut tota quidem substantia, aut qualitibus tantū, aut deniq; quantitibus, à naturæ ordine digrediuntur. Atq; ipsa etiā vel immediatè sequuntur morbos: vel mediatè: intercidētibz scilicet symptomatibus aliis. Jam verò hæmorrhagia, quod ad excretam substantiā pertinet, toto est genere præter naturā, fitq; aut aperto vasis osculo, aut rupto vase, aut eroso. Etenim vulnus, ruptura, erosio, proprii similariū partiū sunt morbi: at apertio osculorū, ad instrumenta pertinet. Accidit enim interdum ipse sanguinis fluor ob retentricis facultatis infirmitatē: interdum quia expultrix immodicè movet: nōnunq̃ ob utriusq; functionis noxam. Sic fit etiā mulie-

liquidò constat, spiritũ aliquẽ animalẽ à cerebro demitti ad oculos. Si igitur pupilla amplior fuerit, spiritus implere illa nõ potest: quare diffundi ipsum, dissolvi, dissipariq; est necesse. Si verò angustior, cogitur & cõstringitur, ac densior fit spiritus. At coactus spiritus cõstrictusq;, ad facilitatẽ sensus conducit plurimũ. E diverso dissolutus dissipatusq;, sentiendi difficultatẽ inducit. Est aut albugineus humor veluti ppugnaculum crystal-
lini, cuius etiã nonnihil essentiã iuvat. Quãobrem
si imminuatur quodãmodo, ipse crystallinus a-
rescit ac super ipsum rhagoides tunica corruga-
tur & cõcidit, sic ut visio ipsa oblædatur: nimirũ
externo lumine p̄ exiguũ mediũ humori crystal-
lino occurrente. Jã verò instrumentum visionis,
citra tãdiũ tolerare splendorẽ nõ potest: ob idq;
rhagoides tunica illi est objecta, nigra existens
simul atq; cœrulea, quibus colorib. oculus potis-
simum recreatur, quẽ infestavit splendor. Verũ
coarctatio pupillæ, quẽadmodum amplitudo, si
quidem ab humiditate superflua trahat ortũ, faci-
lem: sin verò à siccitate quadã inexpugnabili, de-
speratã curationẽ sortitur. Porro si rhagoides tu-
nica ita sua cõtinuitate solvatur, ut tenuis ille hu-
mor prolabatur ad exteriora, maximẽ visio labe-
factatur. Ad hæc si humor ille albugineus seipso
crassior sit redditus, exactã cernendi, aciem mul-
tò obtusiorẽ reddet. Quod si plurimum aucta sit
crassitudo, visum omnino prohibebit. At si non
totum foramen à cõtento ibi crasso corpore ob-
tenebretur, sed relinquatur ejus aliqua particula
pura, videre licebit, per illã externas res, idq; ni-
hilo deteriusq; antea, sed unam quamlibet solã.
At si in pupillæ centro exigua consistat suffusio,
maneantq; partẽs quæ in circuitu sunt, puræ: qui
sic sunt affecti, quicquid aspiciunt, id veluti fene-
stratum putant. Ubi verò humor inter crystallo-
idem atq; rhagoidem medius, proprium colorẽ
mutarit, si quidem ad fuscum declinet, arbitrabi-
tur quis se per nebulã, vel per fumum etiã vide-
re. Sin alio quovis colore inficiatur, hujus quoq;
imaginem, ea quæ spectantur, referent. Præterea,
quibus adeò absoluta est cernendi facultas, ut ne
minimum quidem visibile eos latere possit, si va-
pores à ventriculo sursum ferantur, hos sympto-
mata suffusioni similia infestabũt. In universum
autem, vel parva, vel magna symptomata acce-
dent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spiri-
tus animalis simul & multus fuerit, & æthereus,
is, res quæ porro distant, & videre, & discernere
potest. Cui verò paucus quidem fuerit, sed purus,
is ut res propinquas planẽ discernit, sic distantes
haudquãq; videt. Quod si humidior simul fuerit
& multus, res distantes videt quidem, sed nõ ad
unguem discernit: quẽadmodum cui humidior
simul fuerit & exiguus, is neq; exactẽ, neq; porro
videre põt. Ceratoidis tunicæ pars illa quæ pu-
pillæ est objecta, si crassior densiorq; sit, acie he-
betem reddit. Si verò humidior densiorq; fuerit,
nõ modò reddit visum obtusum, sed etiam effi-
cit, ut qui sic est affectus, putet se p̄ tenebras, aut
nebulã, aut vaporem aliquem, aut per fumum,
res ipsas cernere. At si humores nõ multitudine,
sed colore peccaverint, secundum ejusdem colo-
ris naturam ipsa cæcutientia oborietur. Proinde

qui morbo regio laborant quicquid vident, id
pallere arbitrantur. Quibus autem ea ceratoidis
pars insigniter ulcerata est, aut vulnerata usque-
adeo, ut ipsum vulnus ad interiora perringat, ij
magna ex parte obcæcantur. Vidi tamen equidẽ
puerum, cum juxta pupillam punctus fuisset sty-
lo, sic ut aquosus humor efflueret, ac tota omni-
no cornea corrugaretur, visum (incredibile qu-
piã) recuperasse, instaurato scilicet paulatim hu-
more qui per vulnus effluerat. Solius etiam cor-
neæ ipsius corrugatio (qualis senectute confe-
ctis solet semper accidere) similiter visum offen-
dit. Cæterum si pupilla simul sit imminuta, scire
licet, aquosum quoq; humorem imminutũ exi-
stere: sin verò æqualis permanferit, ad solã cera-
toidem affectus pertinet. Corneæ igitur morbi,
si fuerint magni, in totum visionem impediunt:
maximẽ si vel phlegmone, vel supputatione, vel
scirrho (quatenus instrumentũ est) infestetur. In
hærens verò membrana phlegmone obsessa, ex
accidenti quoq; impedire potest visionẽ. At chy-
mosis, unguisq; nõ ex accidenti, sed primaria ra-
tione pupillã ipsam obscurat: quemadmodũ ge-
narum ingentes tumores præter naturam. Gra-
vis auditio surditasq; animãti evenire solent, aut
ob auris partẽ aliquã, aut ob nervũ à cerebro de-
scendentẽ, aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte,
unde nervus oritur, affectum fuerit. Igitur nervi
cerebriq; offensa in his, haud aliter quã in ocu-
lorum affectibus, accidit. Reliquarũ verò par-
tium noxæ, illis ad portionem respondent: ve-
rũ non omnino similis læsio existit. Partes ita-
que ad auditum pertinentes, quatenus similes
sunt, octo intemperaturis vexantur, ac præterea
solutione continui: quatenus autem instrumen-
tales, tum hac, tum obstructionibus invadun-
tur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut
ob sordem obturantem auditorium meatum.

Cum autem lingua sit duplici facultate prædi-
ta, ac per unam quidem sentiat, per alteram vo-
luntariẽ moveatur: contingit sanẽ ipsam aut mi-
nimẽ sapes percipere, aut depravatẽ: idq; ob
tunicã, quæ illam involvit, vel corporis ipsius,
vel mollium nervorum, vel ejus cerebri partis,
unde illi exoriuntur, affectum aliquem præter
naturam. Etenim depravata saporum dignotio,
ubi lingua alieno quopiam humore fuerit imbu-
ta, evenire consuevit. Nam quemadmodum per
suffusiones, ipsa visoria facultas foris videtur ea
cernere, quæ in oculo apparent: ita & gustan-
di vis internam linguæ affectionem rebus sensi-
bilibus tribuit: quemadmodum etiã, ubi sonum
aures percipiunt, nulla re extrinsecus obstrepẽ-
te, sed ipsa circa membranas motione, phantaf-
mata transmittente. Quod verò spectat ad ol-
factoricẽ potentiam, odorandi sensoriũ est prin-
cipium anteriorũ cerebri ventriculorũ: inservit
autẽ nasus odoratui simul & respirationi. Si igi-
tur vel contundatur ipse, vel ejus obstruatur mea-
tus, idq; vel ab humore aliquo, vel è tumore præ-
ter naturam, olfaciendi facultas vel minus pro-
bẽ odores percipiet, vel eos omnino nõ sentiet.
Obstructiones etiam ossium colatoriorũ, præ-
terea cerebri membranarum, atque adeò illæ
quæ in processibus anteriorum cerebri ventri-
culorum

Itterici pu-
tant omnia
objecta pal-
lere.

Visum recu-
perasse pue-
rum, cui al-
bugineus hu-
mor efflue-
bat, corneaq;
omnino cor-
rugabatur,
Galenus vi-
dit.

Chymosis.
Unguis oculi.

Audit⁹ Sym-
ptomata un-
de proficiũt-
tur.

Lingua ines-
se duplicem
facultatem,
censuricem
atq; motricẽ.

Gustandi & vis
ob quarum
partium af-
fectus corrup-
pi, aut vitia-
ri possit.

Odorandi sen-
sorium esse
principium
anteriorum
cerebri ven-
tricularum.
Nasum inser-
vire odora-
turi & respi-
rationi.
Olfaciendi
facultas
is à quibus
soleat labe-
factari.

*Tactus inest
omnibus sen-
sibilibus.*

*Hæmodia un-
de proficiſca-
tur.*

*Torpor affe-
ctus compoſi-
tus, à quibus
causis oriri
ſoleat.*

*Nervi ipſi
ſintne fora-
minibus præ-
diti, an mini-
mè, Galenus
hæret.*

*Paralyſis à
torpore ſola
magnitudi-
ne differt.*

*Spina quin-
ta vertebra
affecta, reſol-
vi manus.*

*Vox quibus
percat.*

*Motum qua-
rundam par-
tium ſolun-
tarium exol-
vi, prout ſi il-
lo ſenſu, ſic
ut econtra:
id quod acci-
dit in omni-
bus partibus
qua per di-
verſos ner-
vos utraq;
facultatem
recipiunt.*

culorū oriuntur, ac deniq; inſignes dictarū par-
tium tum contuſiones, tum ſectiones, olfactricē
vim maximè labefaciūt. Ob intemperiem etiam
ipſarū partium, ſolet fieri olfactus vitioſus. Por-
rò tactus (qui ſenſus cōmunis eſt omnibus par-
ticulis ſenſibilibus) varia ſymptomata recipit: in-
ter quæ annumeratur tū hæmodia, tum torpor.
Eſt enim hæmodia dentiū ſtupor, qui ob acidus
acerboſq; cibos magna ex parte oboritur. Tor-
por autē in toto corpore cōtingere ſolet, ex ſen-
tiendi movendiq; difficultate affectus quidam
cōpoſitus. Qui quidē manifeſtè videtur tum à re-
frigeratione, tum à compreſſione corporū ner-
vorū, ac deniq; à torpedinis marini animalis
contactu, procedere. Ubi verò citra aliquam hu-
juſcemodi cauſam ultrò torpor acciderit, tūc vel
vitæ ignaviam, vel ciborum multitudinē, craſſi-
tiem, lentitudinē, aut ſolitæ ſecretionis ſuppreſ-
ſionem antecēſſiſſe necelle eſt. Igitur ejus cauſa
cōjuncta, affectus nervi eſt talis, ut facultatē illi
à principe parte miſſam impedire poſſit. Atqui
impedietur, ſi nervus meatu aliquo præditus, vel
obluctus ſit, vel compreſſus. Si verò meatū nō
habeat, ſed uti Solis radij per aquam, aëremve
tranſeunt, eodem modo facultas à principio per
nervorum corpora permeet, ipſa in tranſitu præ-
pedietur, ſi ad immodicam craſſitudinē nervus
ipſe pervenerit: id quod illi cōtinget, aut craſſis
viſcidisq; ſuccis nutrito, aut violēto frigore per-
frigerato. Torpeſcunt etiam nervi, ubi vel la-
queo, vel manibus conſtringuntur: aut extrinſe-
cus à vicinæ partis phlegmone, vel ſcirrho com-
primuntur: aut ubi luxatis fractisve oſſibus ſiūt
arctiores. Principiò igitur ſtupidi ſiunt, deinde
omnino & ſenſum & motum amittunt: quod vi-
tium ipſorū, dicitur paralyſis, à torpore ſola ma-
gnitudine differens. Quod ſi omnes occupave-
rit nervos, repente univerſum corpus ſenſu &
motu privabitur, ſuccedetq; citiſſima mors, q̃
prohibita ſit reſpiratio, Si ſpinæ principiū læda-
tur, ſolæ partes capitis, quoad vixerit animās, &
ſentire & moveri poſſunt. Si tamē cerebro quoq;
noxa ipſa acciderit, qui ſic afficiuntur, iſ omnium
partiū perit ſimul & motus & ſenſus. Vivere au-
tem poſſunt utriq; tanto tempore, quanto vivūt
ij qui præfocati ſtrangulantur. Spina verò in in-
feriori loco affecta, nempe ſub ea nervorū pro-
pagine, à quibus thorax attollitur, ſi quidem in-
gens fuerit affectus, partes inferiores omnes ſubi-
tò & ſentendi & movendi facultate privantur. Si
verò nō ita vehemēs affectus videatur, ſtupo-
rem inducet. Atq; ij ſanè mortē effugiūt, quando
quidē in ipſis reſpiratio ſervatur. At quibus quin-
ta ſpinæ vertebra affecta eſt, corū manus omni-
no & ſenſum & motū amittunt. Vox autē omni-
bus illis perit, quibus ea ſpinæ pars quæ in cervi-
ce eſt, fuerit inſigniter læſa. Porro qui nervi, dum
rectè valent, facultatē ſentendi ſuppeditāt, jidē
lædūt ipſam ſi affecti fuerint. Cæterū cum partes
aliquæ per quem nervū volūtariè moventur, per
eundē ſentendi quoq; vim habeant, duplex ne-
ceſſariò noxa orietur ex ipſius nervi affectu: qua-
rū altera quidē ſenſum, altera motū impediet. In-
terdū tamē quarundā partiū motus voluntarius
exolvitur, ſenſu prout illa ſo: ſicuti e converſo e

tiā contingit ſenſum perire: incolumi functione
movēdi, ut in lingua & oculis planè videre licet,
ac breviter in omnibus partibus. quæ per diver-
ſos nervos, hoc eſt, molles & duros, illas faculta-
tes recipiūt. At in quibus mēbris duri duntaxat
nervi inveniuntur, per quos utraq; facultas de-
fertur: ex ipſorum vehemēti læſione functiones
ambæ labefactātur. Nam ſi ablata cute ſubjectus
muſculus, qui nudus eſt, videatur immobilis, ſen-
tiat tamē tāgentes, exigua ei accidit noxā putā-
dum eſt: nempe q̃ tantā animalis facultatis partē
ſuſceperit, quāta ad ſenſum excitādū ſufficiat: ad
muſculi verò motū, nō item: quippe tangēdi ſen-
ſus, pati aliquid potius q̃ agere, deprehenditur:
proinde ab exigua facultate functio ejus perfici
potēſt. At muſculorū motus in agendo, nō in pa-
tiendo actionis efficaciam poſſidet. Is enim totū
corpus transferre debet: quāobrem plurima in-
diget facultate animali. Delectatio autē & dolor
omnibus accidit ſenſibus: ſed in oculis minus q̃
in cæteris evidēter perſpicitur: in tactu & guſtu,
luculentiffimè: ab iis deinceps in odoratu: atq;
hunc tandem auditus ſequitur. Jā verò affectio
præter naturā violenter affatūq; incidens, do-
loris (ut Plato inquit) eſt cauſa. Ubi verò corpus
ad naturalem habitum redit, idq; rursus affatū,
oboritur voluptas. Porro vehementes eveniūt
in tactu à naturali habitu tranſmutationes, ob
violentem calidi frigidiq; occurſum: atq; ob eas
res, quæ cōtundere, ſecare, extendere, aut erode-
re poſſunt. Nam ſiccitas humorq;, niſi calori
frigorivē jungatur: occurſu ſuo inferre vim mi-
nimè cōſueverunt. Cæterū ſectio & ruptio dolo-
rē inferit, nō ubi facta eſt (niſi fortē ex accidēti a-
liquo) ſed ubi etiamnum ſit. Jam inſtrumentū gu-
ſtandi quatenus habet facultatē tangēdi, à jam
dictis cauſis divellitur: quatenus verò ad guſtum
propriè pertinet, ab amaris, acidis, acerbis atque
acribus: quandoquidem horū ſingula continuū
dividere poſſunt. At ab humoribus acribus reſo-
luti vapores, vim olfactricem infeſtant: nam &
ipſi continuū divellunt. Auditū vox turbat aſpe-
ra, gravis, maximaq; & celerrima: quemadmodū
omnis violentus ſtrepitus. Viſum autē illuſtriſſi-
mi ſplendores offendūt corrumpuntq;, eò quod
nimium diſgregent. Paſſio itaq; moleſta quatenus
dictū eſt, oriri in omnibus ſenſibus ſolet: delecta-
tio autem illi adverſa, à cōtrariis naſcitur cauſis.
Etenim ut cæruleus color jucundiſſimū eſt ocu-
lis ſpectaculum, ita ſplendor candicās, qualis in
ſole cernitur, maximū ipſis dolorem inferre po-
teſt. Poſt hos ſecundo loco moleſtus quidem eſt
calor albus, delectat verò ſufcus: nam ille viſi-
cam eſſentiā diſſolvit, hic eam cogit citra violē-
tiam. Color ſiquidē niger hoc nomine viſionis
eſſentiæ adverſatur, q̃ cogat ipſam violentius,
quā ut eam reducat ad naturālē habitū. Cæte-
rū id quod nigerrimū eſt, ſplendiſſimo mi-
nus viſum offendit, quia craſſiori cōſtat ſubſtan-
tia, ob idq; minus efficaciter agit: cum nimirum
omnis res tenuis craſſam activitate ſuperet. Sic
igitur ſol valde tenuis cum ſit, protinus viſum
diſſipat. Quare ſi quis diu in deſiſſimis tenebris
verſatus fuerit, poſtea luci reſtituatur, occæabi-
tur iſ quodammodo. Merito itaq; cæruleus color,
ut viſio-

Tactus

videtur

im quæ

agere.

Tangen-

functio

ab exig-

uitate

fici poſſ-

Motus

plurim-

uitate

gent.

Delecta-

dolor q̃

ſenſibus

ior, &

minor a

Doloris

ſa.

Volupta-

quando

Dolores

ſiccitas

humida

inferit p̃

priara

Guſtandi

ſorum

bus nan-

ciatur.

Olfactū

acres &

res infeſ-

Auditū

qua obi-

dant.

Viſum a

offendat

Cæruleus

lor eſt op-

ſimus oc-

Niger co-

quarati-

ſiſui ad-

ſetur.

Tenuis

mnis, cra-

actiſſima

perat.

Sol cur &

diſſipet.

ut visioni iucundissimus est, ita maximam quoque præbet utilitatē: sed nō illi, quæ a sole discussa fuerit. Huic enim utpote jam ægrotanti, cōtrarium remedium (videlicet color niger) est adhibendū: ei verò quæ sana, sed fatigata est, color cœruleus, fuscusque, saluberrima spectacula existunt. Porro fuscus color, ex albo nigroque, contemperatis nascitur: cœruleus verò, ubi candor splendori iunctus, non ita parum in nigrum degenerat. Medii siquidem moderatique colores (ut inquit Plato) ex contrariis invicem confusis oriuntur. In auditu verò nō malè affecto, ut iucundissima vox censetur quæ & lenissima & tardissima est: ita asperissima, citissimaque, maximā inferre solet molestiā. Ubi autem fatigatus auditus fuerit, præter lenē ac tardam, exigua quoque est amica. At cum ægrotat, lenissima simul & tardissima, atque perquam exigua, iisque multo magis absolutum silentium. In hoc sensu manifestior conspicitur delectatio, quia crassior constat essentia: manifestiorque ad huc quam in hoc, voluptas percipitur a sensu olfactus, quod ipsius quoque essentia sit crassior. Et enim ut aer splendorem crassitudine vincit, ita vapor (qui extenuatus est humor) aere crassior existit. At qui splendor ad videndi, aer ad audiendi, vapor ad odorandi sensum pertinet: quem admodum ad gustum, natura humida: ad tactū verò, solidū corpus. Gustui igitur, cum a naturali habitu nō declinat, maximā voluptatē adferunt omnes succi dulces, pinguesque, ceu corporis essentia familiarissimi. Si verò ab aliquo ipsum infestante nuper vitium contraxerit, pingues. Nam iis exasperatas partes maximè lenire consuevit. At ubi jam morbo afficitur, tunc succi contrarii iis qui morbum excitarunt, delectare videntur. Venter enim visceribus & venis inservit, huiusmodi succos appetens, quales illis sunt necessarii. Præcedit tamē iudiciū linguæ, quæ iis potissimum delectatur succis, quibus ventriculus indigere videtur. Cōsensus autē huiusmodi potissima causa est, vestiens ipsam membrana. Porro odorandi vis, quod ad ea pertinet quæ extrinsecus vel voluptatē, vel molestiam adferunt, gustandi facultati proportionē respondet. At vapores qui intrinsecus continentur, si molesti fuerint, possunt sensu percipi: suaves verò & omnino delectabiles, sensum latent: quæadmodum in visu quoque, & auditu, qui in se nullum patiuntur vehementem affectū. Delectamur in id genus sensibus, ad naturalem habitū redeunt: hoc autē fit per idonea cōtraria. Idoneū autē voco id, quod primario & per se, nō per mediū alterius rei interventū, fuerit effectus causa. Quare procatactice causæ impræsentiarū spectandæ nō sunt. Jam verò genitales partes proprio quodam & eximio sensu afficiuntur, unde & validissima prædita sunt facultate, expultrice quidem seminis genitalis, in masculis: in foeminis autem tum hac, in testiculis & seminariis vasibus, tum attractrice per totum uterum. At genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionē, ingens comitatur & cupiditas & voluptas. Molestia autem quæ ex redundante atque intus retento semine oritur, paulatim & longo temporis tractu increfcit. Nulla autē est pars quæ vel adeo exactē sentiat, vel principum par-

tium utranque pro suarū affectionū modo perinde afficiat, atque orificium ventriculi, qui stomachus appellatur. Siquidem syncope, cardialgia, dyspnœa, apnœa, morsus, epilepsia, delirium, insaniam, huius partis occasione evenire solent, idque confortii lege. Abolitam verò, difficilem, & depravatam appetentiam, ipsa per se sustinet. Abolitam voco appetentiam, dum quis nihil omnino appetit: difficilem, eam quæ est imbecilla. At depravata, partim ad immoderatam cibi portionisque exhibitionē vertitur, partim ad alienæ qualitatis desiderium. Etenim cum nutritoria functio nō vitalis, sed naturalis sit: haud aliter in animalibus quàm in plantis perficitur. Idcirco animalibus vice terræ fabrefecit natura ventriculum, veluti promptuarium cibi. Addidit insuper facultatē qua penuriam sentiret: ut animalia ad cibum portionemque excitata, eodem impleretur tempore: vocaturque huiusmodi plenitudinis desiderium appetentia. Hæc ortum habet a penuriæ sensu, cum venæ ex ipso ventriculo trahunt, veluti mulgentes, sugentesque. Igitur suctionis sensus est fames. Primum itaque symptoma omnium est inanitio. Secundum est inanitarū partium naturalis appetentia. Hanc sequitur per venas, quæ porriguntur in ventriculum, suctio. Deinde suctionis sensus. Postremo ipsa animalis appetentia omnium ultima. Quam sanè functionē aboleri contingit, si vel suctionis sensus pereat, vel suctus non fiat, vel corpus non inaniatur. Imbecilla verò erit, si jam dictæ affectiones accedere proximè ad abolitionē videantur. At depravata sit appetentia, si vehementiæ modum excedat: vocaturque a nonnullis canina, ubi vel ob acidi humoris vitium ventriculus mordicus infestatur: vel dum totū corpus exhaustum, assiduam nutritione indiget. Quippe frigidi humoris vitium, rorsionem quæ suctui proportionē respondeat, inducit: ac appetentiā, non aliter quàm naturale pathema, excitat: magis tamen cibi quàm portionis desiderium affert, idque propter refrigerationem. Si verò falsi aut biliosi humoris vitio ventriculus mordicationē senserit, portionem magis quam cibum desiderabit. Itaque ad excitandam famem frigus in ventriculo non parū confert. Inter potissimas autem causas, quibus fames impeditur, calor annumeratur, ut qui solida quidē corpora laxando dissolvat, atque ad attractionis functionē reddat imbecilliora: humida verò fundendo, supra modū extendat. Pravas autem qualitates appetunt iis, quibus ventriculi tunica sunt pravo aliquo excremento imbutæ. Qui affectus citra, seu pica dicitur, & mulieres vitiosis succis refertas infestare cōsuevit, præcipuè ubi utero gestant: quanquā viris etiā nonnunquam accidit, ubi ipsis quoque vitiosi humores ad osculū ventriculi confluunt. Similiter circa potū accidit quasi privatio appetentiæ, ubi corpus nulla omnino eget portione, ob frigoris atque humoris excessum: vel ventriculus propriā affectionē non sentit. Deficiens verò appetentia apparet, ubi hæc eadem fuerint imbecilliora. At depravata portionis cupiditas, depravatæ appetentiæ ciborum proportionē respōdet. Siquidem immoderata portio appetitur, quando contenti in ventriculi tunicis vitiosi humores, aut falsi sunt, aut biliosi:

Os Ventriculi quorum affectum conforij lege propriam ratione sit causa.

Nutritoria functionem non aliter perfici in animalibus quam in plantis. Venter promptuarium cibi. Appetentia quid.

Fames quid.

Appetentia quando aboleri vel imbecillam reddi, vel citari contingat. Canina appetentia a quibus causis proficiatur. Frigidi succi appetentiam excitant.

Sitim falsi humores atque biliosi gi-gnant.

Fames cur a calore impediatur.

Citra morbus quos maxime infestet

Appetentia portionis quibus de causis aut pereat, aut minuat, aut depravetur.

Cardialgia unde exoritur.

Bulimos quādo accidat.

Oris Ventriculi cū principibus membris cōnexio.

Sensationes quomodo fiant.

Cerebrum quorsum cōditum.

Cerebrū Sim sentiendi partibus per nervos largitur.

Facultas animalis per somnū quiescit: naturalis operatur vehementius.

Exercitati vehementi, cur alius dormiant.

Cibo ingesto cur promi ad somnū reddamur.

Cerebrum quā possint implere.

Capitis repletio conciliat somnū.

Veterni causa.

Lethargi causa.

Somnifera sunt humectantia.

Soporifera dicuntur quā extremē refrigerat.

biliosi: interdum etiā, cū veluti fervet in eo nativa ipsius humiditas. At pravās potiones nonnulli appetunt, pro vitiosi humoris, qui in ipsis vincit ratione. Est præterea & aliud symptoma nōnunq̃ osculum ventriculi infestās, nempe cardialgia vocata, quæ à mordacibus succis oritur. Bulimos etiā, sive inexplēbilis fames, symptoma est ejusdē particulæ, ubi penuria, imbecillitate, atq; refrigeratione afficitur. Mirandum autē nō est, si ob oris ventriculi affectus, animalia maximis iisdemq; vehementissimis affectibus affligātur, cū nimirum pars illa, per nervos quidem cerebro, per arterias autē cordi, vicino sibi, suas offensiones cōmunicet. At verò singuli sensus in singulis particularim instrumentis à sensilibus alterati, perficiuntur. Hanc verò alterationē pars alterata sentit, eò quod à cerebro suscipit facultatem, quæ ad ipsam per nervū derivatur. Quippe cerebrum nō ut sit sentiendi instrumentū, sed ut sensuum instrumentis vim sentiendi largiatur à natura institutū est. Nam quod singulis animalis partibus per nervos sentiendi facultatē transmittat, liquidò patet, ubi nervus aliquis est dissectus. Siquidem pars ea in quam nervus ille distributus est, protinus sensum amittit. Taceo sensus inter dormiēdum, aut ociosos omnino esse, aut debiliter agere: quod tunc exigua facultas à cerebro in reliquas partes defluat. Quiescit itaque per somnū animalis facultas, naturalis autem validius operari videtur: cū tunc cibis multo melius coquatur nō in ventriculo modò, sed etiā per universum corporis habitū. Est etiā ratio ni consonū, illud animalis membrū, in quo anima rationalis, veluti in arce habitat, aliquando quiescere. Cor siquidem exigua admodū habere quietē videtur, quod longiori nō magnoperè indigeat. At res aliter se habet in cerebro: quod quidem per vigiliās officio suo semper fungitur, per somnū verò feriatur. Quamobrem profundius videtur dormire ij, qui fatigati multa exercitatione fuerūt: utpote quibus inter exercitandū plurimū facultatis à principio defluebat: quocirca cerebrū & requie & virium instauratione indiget, tum ob facultatis, quā transmisit, inani tionē: tū ob labores, quibus per multas functiones defatigatū est. Quemadmodū autē exercitati & prouiores sunt ad somnū, & gravius dormiūt: ita illi quoq; qui cibum ingesserūt. Atq; hi eò graviore detinentur somnō, quò ingestus cibus humidior suapte natura fuerit. Itidē & ij qui plurimo se vino ingurgitarunt, aut balneis multis, calidisq; liberaliter circa caput sunt usi. Quippe hujuscemodi omnia implere cerebrū suo mādore videtur: qui alioqui non est inutilis ei quem multa exercitatio & lassum & aridum reddidit. Etenim q̃ repleto capitis somnū conciliet, satis Aristoteles demonstravit. At verò si à frigida multa; opprimatur humiditate ipsum cerebrū, veternosum lethargicūq; somnū inducit. Igitur ea quæ duntaxat humectāt, nō ab re somnifera nominātur: quæ verò refrigerāt, ea nec somnū cōciliare, nec indolentiā inducere verè dicētur: sed pro somno veterinū, gravēq; soporē: pro indolentiā autē, vel abolitionē, vel difficultatē sensus efficient: idq; ob frigiditatis excessum. Rursus sic-

citas immoderatio, & calor, veluti in phrenitide, vigiliās infert: quas neq; mœstitia, neq; solitudo peperit. Sed apoplexia etiā & morbus comitialis affecto cerebro fiunt. Verū ut profundus somnus sentiendi functiones: ita apoplexia eas actiones quæ pendent à voluntatis imperio, offendit. Ad hæc, qualis est insomnietas sentiendi functionibus, talis est cōvulsio per morbū comitalem motibus voluntariis. Porro convulsio quæ per totum corpus fit citra delirium, aut soporem, à spinalis medullæ, quæ in cervice continetur, morbo dependet. Si verò vel manus, vel crus, vel musculus distendatur, aut convellatur violenter, ad illum semper nervum, qui partem movet, referenda est noxa.

GALENI PERGAMENI

de symptomatum causis, lib. II.

Quandoquidē jam exposuimus symptomata quæ circa sensum versantur, operę precium fuerit deinceps illa etiā examinare quæ sub depravato motu, seu cōmuni genere continentur: cuiusmodi sunt convulsio, tremor, palpitatio, singultus, tussis, ructus, sternutatio, pandiculatio, & stridor dentiū. Quorū sanē nonnulla quidem naturæ sunt opera, sed cōtæ ab aliqua causā præter naturam: alia morbidos sequuntur affectus, nihil ad ipsorū generationem cōferente natura: alia deniq; à natura & morbo simul cōeuntibus ducunt originem. Porro naturæ opera sunt, sternutatio, tussis, oscitatio, pandiculatio, & singultus. Solius morbi, palpitatio, convulsio, resolutioq; Sicuti amborum cōeuntiū, omnis torpor & tremor. Ad quorū sanē omniū particulares propriasq; differentias investigandas, sciendum est, quatuor esse facultates, quibus omnia quæ aluntur corpora gubernantur: attractricem videlicet, retentricem, alteratricem & expultricem. Cū igitur juxta naturæ leges animal gubernatur, nullus ipsarum motus esse symptoma censetur. Quod si quippiā in corpore præter naturā cōsistat, insurgatq; ad ipsum deijciēdum expultricū facultatū aliqua, fit interim ut ipsarū motus sensu minimè percipiātur, interim ut nō lateāt sensum, utriq; tamē in naturam symptomatis transeant. Igitur functionis à voluntatis imperio prodeuntis noxa est, nervorum resolutio, convulsio, tremor, stupor. Cæterum si instrumentorū quibus respiratio perficitur, resoluti sint nervi, apnœa, hoc est, abolita spiratio: si verò vocales nervi, aphonia, id est, vocis privatio, vocatur. At linguæ paralyssis, etsi sermonem, voluntatis opus, omnino tollat, nullū tamen proprium obtinuit nomen. Rursus ischuria, hoc est, urinæ suppressio, haud absimile quiddam apnœæ significare videtur: q̃vis per ipsam functio, à natura, nō à voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis invitus cogatur meje-re, voluntariæ functionis offensū est. Haud aliter alvi excrementa, si supprimantur ad naturalem: si deijciantur, idq; homine invito, ad voluntariam functionē noxā referri debet. At si paralyssis totum corpus invadat, symptoma ipsum apoplexia vocatur. Convulsio etiam ipsa pro varietate particularū varias appellationes sortitur. Nam si man-

Vigiliæ cit sic calor in deratur

Apoplexia qualis sit

Epilepsia qualis sit

Sensus variis materia

Symptoma quomodo motu

Natura & morbo cōeuntibus

Quatuor facultates

Facultates naturæ sunt quatuor

Motus variis

Apnœa aphonia quid sit

Lingua paralyssis

Ischuria naturalis

Excrementa

Apoplexia est paralyssis totum corpus

si in adibularū musculi cōvellantur, stridor dentium: si verò oculorū, tum perversio, tum strabismus, symptoma dicitur. Jam verò si rigido pene semen effluat, veluti cōvulsio quādā ipsa gonorrhœa existit: si non rigeat penis, referri debet ad retentricis facultatis imbecillitatem. Non desunt & quibus videantur tum singultus, tum duplex inspirandi aeris refractione, aliquādo ex cōvulsione musculorū qui inspirationi inserviūt, procedere. Epilepsia autē est cōvulsio universi corporis. At stupor imperfecta quādā est resolutio nervorū: estq; ferē mistum symptoma, cōeuntibus in unū pugnantibusq; morbo simul & facultate. Omnes autē affectus qui nervos intendere possunt, in duo capita reducūtur: plenitudinem scilicet, atq; etiā inanitionē. Ac phlegmona quidem plenitudinē pariūt: ardentissimæ autem & aridissimæ febres, inanitionē. Quod verò ad motum immobilitatemq; pertinet naturalem, si manū extendere, extentamq; immobilem servare valeamus, animalis facultatis hæc functio est: qui status, & motus & immobilitas dici potest. Sin autem supra rem aliquam solidam, rectē valentē manū deponens, omnes musculorū actiones laxaveris, hanc manus quietē neq; ad morbum, neq; ad facultatē, sed ad innatam animalibus gravitatem referre oportet. Quemadmodum autem extenta manus duobus æquē valentibus regitur motibus: sursum quidem ferente facultate, trahente verò deorsum insita gravitate: sic etiam tremor perficitur duabus motionibus: una, qua cogitur membrū ob gravitatem ad inferiora dehiscere: altera, qua sursum fertur à facultate. Pugnat itaq; per tremorē manifestē facultas cum gravitate: vicissimq; facultas nunc vincit, nunc imbecilla vincitur. Quāobrem contrariorū semper inter se motuū successione, tremor fieri videtur, cum sit motus cōpositus, quē admodum arteriarū pulsatio. Patet ergo hujus quoq; symptomatis generatio, & quod omnino cum conatu sit movendi, secundumq; voluntatis imperiū, cum facultatis tamē infirmitate. Porro maximū onus validam dejicit facultatē: invalidam verò, nō solum hoc, sed parva quoq; prostermit sarcina. Quod si ad multā imbecillitatem devenerit, vel sub proprio opprimetur corpore. Quemadmodū autē animi affectus, qui motricem facultatē imbecilliorē reddūt, tremulas functiones efficiūt (ut in timore videre licet) sic morbi corporis incōmodates viribus, tremoris symptomata inducunt. In primis itaq; & omniū maximē officit facultati, quicquid in intemperie cōsistit. At senectus quoq; intemperies quādā est, ad frigus & siccitatē proclivior. Quāobrem senes faciliē tremore vexantur. Ex juvenibus verò corripuntur ij, qui vehementer fuerunt refrigerati, & qui multo meraco vino se replevere, aut multas subinde cruditates congesserunt, aut qui diu multis cibis ingestis, nullo usi sunt exercitio, sed ignavi in ocio vixerūt, aut qui intempestivē frigidam aquam biberūt. Præterea crassi lentiq; succi, facultatis meatus obstruentes, tremorem efficere possunt. Palpitatio autē est dilatatio præter naturam, omni parti, quæ dilatationē suapte natura admittit, accidere potens, alia verò nul-

li. At dilatari sunt nata, omnia quæ naturaliter mollia existunt. Palpitationē itaq; nonnunq; cuti, subjectisq; illi musculis, & visceribus accidere cernimus: quemadmodū ipsi cordi & arteriis, alio in eis præter pulsum (qui ab insita facultate fit) deprehenso motu. Cum autē palpitatio ipsa celeriter oriatur & evanescat, necessum est illius causam esse æream essentiā. Quæ quidem si pauca fuerit & tenuis, ilico à corpore defluet. Proinde videtur esse vapor crassus ac multus, idq; pro captu spacij in quo cōtinetur. Dilatat igitur, attollit, atq; inflat partem, donec violenter explosus, in cognatū sibi ærem expiret. Verisimile autem est, refrigeratis quomodolibet partibus, atque interdū etiā obstruētis, palpitationes accidere. Porro universus palpitationis motus, quo in utranq; partē agi videtur membrū, existit præter naturam: quā ratione à tremore distinguitur, & q; etiam majora intervalla, quā tremor ipse, sortiatur. At verò, ut in membrorū palpitatione fit motus paucus, parvus, & rarus: ita in rigore fit multus, citus, & frequens. Atqui multū, voco ex ipso motionū numero: citum, ex motionis impetu: frequentē, ex brevi tempore quietis. Cæterum motus hic nō est universus præter naturā: ut palpitatio & cōvulsio: sed potius totus ad expultricem facultatē est referendus: etsi ipsam irritans causa, cogensq; ut violenter moveat, præter naturam esse censeatur. Est itaq; rigor motus quidam cōpositus ex causa præter naturā, & facultate animantis, sed in quo virtus, quā in tremore, est vegetior. Ut autē exempla facultatis expultricis proponam, uterus nō alio pacto ad fœtus additionē insurgit, quā ut retentam expellat molem. Cum enim novē mensibus sustineat tum fœtus gravitatē, tum suam ipsius extensionem, atq; toto hoc tempore osculū ipsius adeo exactē claudatur, ut ne specilli quidem aculeum admittat: absoluto fœtu, ad ipsius secretionē accedit, diversa omnino cōstitutione affectus. Nā fauces quidem ipsius antea clausæ, adeo patent, ut facile per ipsas totus fœtus erumpat. Tunica verò plurimū antea extenta, & cōtrahūtur undiq; & fœtum explodunt, utq; celeriter ab uteri cervice decidat. Corruptū verò fœtum ejicit illa facultas expultrix, aut tertio, aut quarto, aut alio quolibet mense, haud aliter q̄ instante pariendi tempore, matricis fauces aperiēs. Similiter etiā ventriculus, ingestis cibis, claudit inferius osculum, ac nihil egredi sinīt, priusquā accuratē concoctum fuerit: si modò nihil aliud intercideret ipsam cogat functionē: quemadmodū corruptela fœtus in utero. Sic siquidem solet ventriculus natantes cibos evomere: ad inferiora verò tendentes, per inferiora dejicere. Sine cibis etiā insurgit sæpe vētriculi facultas ad vomitū: idq; ob pravam aut bilem, aut pituitā, aut aliū hujusmodi succū, aut saniem. Jam verò qualis est per vomitiones in vētriculo expultricis actio, ejusmodi etiā per tusses, est in pectore, & in pulmonib. beneficio spiritus qui ad exteriora vehementer movetur. Nullū aut animal aut nauseare, aut vomere, aut tussire didicit. Verū si causa præter naturam, aut ventriculi osculum, aut respirationis meatū obsederit, protinus animal vel vomitiōe,

Palpitationē esse diversū motum à pulsu.

Palpitationem fieri à vapore crasso simul & multo incluso in palpitante particula.

Palpitationis motus existit præter naturam. Palpitatio à tremore quo differat.

Rigori adesse motum multum, citum atq; frequentem.

Rigor est referendus ad vim expultricem.

Rigor est motus cōpositus ex causa præter naturam, et facultate animalis.

Uteri cōnitiō & relaxatio oportuna.

Ventriculū retentricem, expultricemq; facultas.

vel tussi vexabitur. Ad horū genus refertur etiā
Sternutatio. sternutatio, qua expelluntur quæ retenta in na-
Nares sunt ribus hærent: quæ & ipsæ, meatus respirationis
meatus respi existūt. Spiritus igitur vehementer motus, earū
rationis. meatus expurgat, tibicinum exemplo, tibias fi-
 stulasq; expurgantium. Itaq; huiusmodi motus,
 naturæ opera existunt: annumeratur tamen sym-
 ptomatis præter naturā, ob causas naturā ipsam
 ut sic moveatur cogentes. Tussis porro nihil est
Tussis quid aliud, q̃ vehementissima efflatio, qua plurimus
fit. spiritus celerrimè foras erumpēs, impetu suo ex-
 trahit exploditque excrementa, meatum ipsius
Humores qui obstruentia. Expelluntur autem faciliè, quorum
a pectore edu nec nimis aquosa, nec lenta essentia fuerit. Cæte-
catur facile rum illos humores qui in arteria contumaciter
 hærent, & qui difficulter expectorantur, magis
Sternutame evellunt sternutamenta: utpote quæ validiorē,
ta, quam tuf q̃ tussis, habent spiritus impetū, licet aliam gene-
sis, velidius rationis suæ causam sortiatur. Quippe nō ob ea
a pectore im- quæ asperis arteriis, sed naribus molesta sunt, spi-
rius & vellunt ritus violenter emittitur, cum quo ex prioribus
 ventriculis cerebri explodi nō nihil solet. Proin-
Tussis nihil de tussis capiti nihil conducit. Sternutatio verò,
conducit ca- nisi ob destillationem acciderit, haud mediocre
piti. præsidium affert capiti repleto vaporib. Nec mi-
Sternutatio rum videri debet, spiritū unico impetu & ex pul-
in & at capiti. mone & ex capite emitti: nā cum principiū insur-
Sternutatio git, ut expellat quæ infestant nares, utroq; utitur
plurimum expirationis meatu. Hæc igitur sunt facultatis à
caput, nisi ob voluntatē pendenti symptomata. Vomitus ve-
destillationē rò, q̃vis illis proportionē quadā respondeat, ad
accidat. facultatē naturalem refertur. Ut autē vomitum
 nausea præcedit, sic tussim cerchnos, exiguus ad
Nausea præ- tussendum impetus. Porro quicquid spiritū in-
cedit vomit- terceperit, id tussi rejicere oportet: siue humor
tum. sit à capite defluēs, siue illapsa portio cibi vel po-
Cerchnos præ- tus, siue aliquid in asperis arteriis collectū, ut in
cedit tussim. peripnevmonia, pleuritide, & in convexarū jeci-
Tussi rejici- noris partium phlegmone, aut in gutturis ipsius
enda esse, asperitatibus. Est & aliud tussis genus, quod ac-
qua spiritum cidit respirationis organo refrigeratis. Sed ita
intercipiunt. affecti nihil inter tussendū expuunt: adeoq; est
Tussis ob re- exigua ea tussis, ut spiritus cohibitione suppri-
frigerata or- mi, & ne eveniat, prohiberi possit. Quippe auge-
gana, spiritus tur in instrumentis respirationis calor, ob cohibi-
cohibitione tā animā: spiritusq; sub thorace violēter oppres-
prohibetur. sus, in omnes arētos meatus penetrat. Hæc autē
Spiritus cohi- utraq; dum fiunt, omnia lævigant, ad tempera-
bitio calorē menti q; æquabilitatē perducūt. Jam verò intem-
in organo re- peries ipsa, interdū simplici qualitate, interdum
spirationis duplici cōstat: nonnunq̃ ejusmodi qualitates comi-
adanger. tatur id quod intemperatū est, veluti ros qui-
 dam. Sedenim æqualis intemperies nullo dolo-
Æqualis in re affligit, cum nimirum particulæ affectæ adlit
temperies cur jam veluti acquisititia quædam natura. Nullum
nullo afficiat autē corpus à sua ipsius natura infestatur. Nā ij
dolore. quorum natura mutatur, corrumpiturq; dolore
 afficiuntur: nō quorū jā mutata aut corrupta est.
Dolor quan- Ubi verò in corpore quopiam sentiendi vi præ-
do accidat. dito, inæqualis suboritur intemperantia: quan-
 ta fuerit intemperiei magnitudo, tanta etiā erit
Inæquales in molestia. Quare per tales intemperantias inæ-
temperies do- qualitatē quandam sentire se ajunt ægri, & pan-
lores secum diculātur, omnesq; partes distendūt, sese tuendi
inducunt. gratia. Distenduntur aut maximè à somno exper-

recti, utpote carnibus vaporatā excrementa sen-
 tientes, tum ob cōgesti cibi coctionē, tum ob hu-
 jusmodi motionū quietē. Triplex autē in lassitu-
 dine potest oriri sensus: cōtundens scilicet, tensi-
 vus, & ulcerosus: idq; à causis præter naturā om-
 nes corporis partes quassantibus, distendentibus,
 exulcerantibus. Igitur ubi tēdi videtur corporis mo-
 les citra quampiā exercitationē, affectus is lassitu-
 tudo tensionis spontanea vocatur: quemadmodū
 10 ulcerosa, ubi ulceris sensus transcurrere per cor-
 pus appareat: idq; motis magis accidit, q̃ quie-
 scentibus, nisi admodū magna sit lassitudo. Per
 tertiu verò lassitudinis genus, quo ajūt sibi quas-
 sa esse ossa, ne minimū quidem motū tolerare æ-
 gri possunt: sicuti nec per lassitudinē ulcerosam,
 ubi nimū increverit. Cæterū quemadmodū ubi
 ulcerosus fit sensus horrent ægri, si cōmoveatur:
 ita horroris affectus, si aliquis motus accesserit
 in rigore transit. Atqui hæc omnia oriūtur ab ex-
 cremētis mordacib. Differūt verò inter se excre-
 mentorū multitudine & motu: propterea quod
 alia magis, alia minus erodant: quodq; ex corpo-
 ribus ipsis alia sint imbecilla, alia facilius, alia æ-
 grius & afficiantur & sentiāt. Facit etiā discrimē
 causa, ubi citius vel tardius movetur. Ad hæc idē
 etiā homo, dum quiescit, solā interdum sentit in
 æqualitatē: dum movetur, horrore: dū verò exer-
 citatur, rigore. Quāobrem sic affectis consulunt
 medici, ut ab omni motu se abstineāt. Quinetiā
 sol, balneū, exercitatio, ad motū excitant excre-
 20 menta, alioqui quiescentia: quemadmodū & ex
 animi affectibus ira. Porro à seipsis ad motū ex-
 crementa insurgūt, si vel calfiāt, vel extenuētur,
 vel in spiritū dissolvātur. Causa itaq; emota lon-
 gè est molestior quiescente, præsertim ubi defer-
 tur per corpora sensibilia. Cum enim quippiam
 per hæc transiens, violenter ad cutem fertur, in ip-
 so p carnem cutemq; transitu necesse est ut sti-
 mulet, pungat, dividat, vulneretq; eas partes o-
 40 mnes, quib. obviū fuerit. Omnis autē causa mor-
 dax motaque, siue frigidissima, siue calidissima
 fuerit, & horrore & rigorem animanti inducere
 potest. Cæterū febres tertianæ, ut omniū maxi-
 mē biliosæ calidæq; sunt, ita præ cæteris maximē
 horrore possunt efficere: & quò fuerint syncerio-
 res, eò in ipsis vehemētiore fit rigor. Porro arden-
 tem febrem rigor superveniēs solvit, q̃ bilis quæ
 interim in venis cōtinebatur, à natura p carnes
 ad cutem decretoriè excutitur. Quare motio-
 nis ejus, rigor & symptoma est & signū. Nam hu-
 jusmodi rigore affecti, postea sudāt, & liberātur
 à febre, nimirū ejecta bile. Quæ interdum etiam
 nō ad cutem, sed ad internas partes impetum fa-
 ciēs, vel vomitione, vel alvi solutione dejicitur.
 Sæpenumero & intrò & foras eadē die defertur,
 ut simul & sudore & vomitu & alvi dejectione
 bilis vacuetur. Ubi igitur erodēs q̃piā in parti-
 culis cōtinetur, contristantur sanē, præcipuē si il-
 lud moveatur: quare maximè ad ejus expulsionē
 60 festinant. Cōtrahunt itaq; atq; cōstringunt sese,
 mox quælibet impellit eam quā cōtinet excre-
 menti portionē. Atq; in hunc sanē modū motis
 universis particulis, totum corpūs concussione
 quassationeq; vexatur: qualis videtur in iis, qui
 sunt rigore correpti. Similiter etiā concutuntur
 thoracis

Experre
somno cur
distendunt
Lassitudi
triplex pot
oriri sensu
Lassitudo
sensitiva sp
tanea qua
Lassitudo
cerosa mot
magis acci
dit, quæ q
ejcentibus
Lassitudo
contundit
Horror tr
fit in rig
si motus
fit.
Excreme
à quibus
causis m
antur.
Causa e
ta longe
molestior
escente.
Mordax
taq; om
causa, j
frigida j
ca idaj
rit, v
rigorem
ducere p
Rigor an
tem sob
illis p
mens, c
sat.
Cōcus
modo co
accidat

thoracis musculi, ea quæ carnibus ipsorū molesta sunt, per pulmonū arterias expellere properantes. At verò nonnulli ægri cum egeant rejectione sputi per regionē pulmonis, nec eam ob imbecillum thoracē moliri queant, sibi sternutationem provocāt, naribus irritatis: ut ob violentum motionis impetum, ea expuāt, quæ tussiendo antea rejicere haudquā poterāt. Illa autē tussis, quæ ob intemperie organorum respirationis accidit, ad horroris rigorisque genus pertinere videtur. Ubi verò quæ corpus infestāt, humida suapte natura fuerint, per tussim ac rigore ab expultrice facultate impulsæ, ultrò citroq; feruntur, donec applicuerint ad convenientē evacuationi locū. Sin autē solus spiritus sine humore, immodicè vel calidus vel frigidus per corpus trāseat, is tunc horrorem excitat, ac nonnūq; rigore: nulla tamen sequitur cōspicua evacuatio. Cum igitur & frigida & calida causa possit excitare rigore: calidæ quidā, si aëra fuerit, refrigeratio satis efficaciter auxiliatur. Si verò sit humor, eam febris necessario sequetur. Curatur autē evacuatione. At frigida si aërea fuerit, remediū est calfactio. Sin verò sit humor, interdū sola cōcoctio sufficit, interdum vacuatio, nonnūq; ambæ cōveniunt. Etenim citra febrim nonnūq; oriuntur rigores ob pessimam victus rationē, ubi quis per ociū se impleverit, & subinde a cibo laverit. Quā rigoris speciem veteres ignorarunt medici, q̄ homines superiori illo seculo, nec tā intemperater viverent, nec tā crebro lavarēt. Attamen rigor ille quo partes vehementer quatiuntur & cōcutiuntur, ob frigidos succos nunq; excitari videtur: q̄ ij ob crassitudinē vehementer moveri nō possint. Jā verò si rigor per febrē nō intermittētē acciderit, idq; egro imbecillo, est letalis, ut inq̄ Hippoc. Siquidem in ejusmodi rigorib. insurgit natura cōtra res noxias, quò eas expellat: sed victa cadit, extinguiturq; atq; hāc ob rem redditur perniciosum symptoma. Porro in quartanis febribus succus ex calido frigidoq; mixtus, rigorem excitat, quippe a bilis suapte natura frigidus succus censetur. Ubi verò adeo putris effecta est, ut febrim inducat, quāta adfuerit illi putredo, tātus & calor in erit. Cum autē rigor a calidis simul & rodentibus succis fiat, mirari haudquā oportet, si partes extremæ omnes refrigerātur, declinante animali facultate unā cum sanguine ad interiora: qualem motum videre licet in cōplurib. animæ affectib. Quod verò ad animæ essentiam pertinet, quæcunq; illa fuerit, è duobus alterum fateri oportet: aut qd̄ ad omnes functiones ut primis instrumentis utitur & spiritu & sanguine, ac vel alterius, vel utriusq; calore: aut qd̄ in his ipsis cōsistit. Per timorem etiā & spiritus & sanguis incus sese recipiūt: quo fit ut algeāt partes in superficie positæ: idq; adeo interdum vehementer, ut nonnulli rigore quoq; arripiantur. Per iram verò solvuntur ac disperguntur, proindeq; exteriora incallescunt. At agonia, affectus ex utrisq; cōflatus, inæquales habet motiones. Jam & cordis & arteriarū pulsationes, & minimæ, & perq̄ debiles in trepidantibus esse videntur: sicuti in iratis maximæ & validissimæ. At in agonia sunt inæquales. Per verecundiā, animalis facultas in primis

quidē ad interiora movetur, sed rursus affatim redit ad exteriora. Nam si nō redierit, nō verecundia, sed timor censeretur debet. Ut autē in timore cōfertim, sic in tristitia paulatim ad interiora fit mor: magnitudine duntaxat ac vehementia, nō toto genere differentibus inter se pathematis. At qui nonnulli ob subitum timorē perierunt: id quod solet cōtingere, ubi debilis suapte natura animula, sub valida perturbatione confertim & extinguitur & suffocatur. Etenim extinctio, affectum ex refrigeratione ortum consequitur: suffocatio autem, concursum sanguinis universi ad ipsum principium. At ex iratis nemo mortuus est unquā: utpote quibus neq; calor refrigeratur, neque robur dissolvitur. Præ gaudio autē nonnulli supra modū pusillanimes animā exhalarunt, quemadmodū & timentes. Jam dolor è diverso cogens moveri animā, haud leviora symptomata, q̄ maximus timor, inducit. Quippe laborantes dolores fiunt, refrigerātur, cōcutiuntur rigore, tremunt, pulsus habet minores, exolutosq; ac tandem similiter iis qui perterrentur, moriūtur. Nā & in iis fugit insitus calor ad suum principium: animaq; simul & soluitur, & extinguitur. Per rigorem itaq; frigus nō internarum, sed externarū partium sentitur. Quamobrē tunc nonnulli vehementi siti cruciantur, nimirū ipsis interno calore servato. Conflictatur igitur, pugnatq; per rigores cōtra ea quæ infestant, facultas, donec relictus evallantur, excutianturq; * Ob incursum febrimq; a rigore accendit, in eo certamine materiam habens auxiliatricē: unde & febris evadit vehementior. Quod si aliquando in pugna defatigetur anteq̄ dimovere res noxias possit, necessario mors subsequitur. At pruritus, qui excrementorū leviter mordicium est sensus, eos vexare solet, qui aut balneum negligunt, aut strigmentis redundāt, aut cruditatibus sunt referti, aut pravi succi cibis vescuntur: sed præcipuè affligit infectos psora vel lepra. Ut autē prædictorum symptomatū causas accuratius exponā, exigua quidem est, tenuis, falsa, & immota in pruritu. Exigua, tenuis, erodens, immotaq; in lassitudine ulcerosa. Multa, falsa, crassa & immota in lepra, psoraq; Pauca, tenuis, mordax, ac brevem motum possidens, in horrore. Si verò aut vehementius moveatur, aut multū abundet, aut sit mordacior, jam nō horrore, sed excitare rigorem est nata. Pro intensione autē aut remissione ipsius causæ, intenduntur aut remittuntur symptomata. Jam tussis causa in pulmone, gutture ac thorace consistit: sternutamentum, in naribus: singultus verò, in ventriculo & gula. Atq; in his omnibus expultrix facultas, quò excutiat molesta, se ad motus vehementissimos excitat. Porro sternutamentū ipsum nonnūq; ex accidenti, humorū in pectore delitescentiū, remediū existit, licet ejus rei gratia excitatū nō fuerit. Similiter purgat ventrē & gulam: qua ratione etiam singultui auxiliatur. Sed jam opportunū est ut de iis dicamus symptomata, quæ circa principes functiones versantur. Quorū sanè tria genera deprehenduntur. Primum, ubi perit omnino functio. Secundū, ubi illa ob-

Tristitia
quam motio
nem sortia-
tur.

Timor sub-
itus quando
perimat.

Extinctio
quid.
Suffocatio
quid.

Iratorum
cur nullus
obierit.

Gaudio fuisse
nonnullos
exanimatos.

Dolor qualia
inducat sym-
ptomata.

Rigori ex-
terna refrige-
rantur, & in-
terna incal-
lescent.

Rigori febris
cur superve-
niat.

Pruritus
quid, & quæ
infestare so-
leat.

Pruritus
causa.
Ulcerosa las-
situdinis cau-
sa.

Lepra psora-
que causa.

Horroris cau-
sa.

Rigoris cau-
sa.

Sternutatio
nonnunquā
ex accidenti
conducit ex-
crementis pe-
ctoris educen-
dis, purgatq;
ventrem &
gulam.

*Stultitia ori-
tur à frigore.
Oblivio à fri-
gore gignitur*

*Apoplexia
causa.
Epilepsia
causa.*

*Delirium
quid, et unde
ortu habeat.
Phrenitis
quid.
Mania.
Melancholi-
ca alienatio-
nes.
Phrenitis di-
gignenda, re-
quiritur phle-
gmone in ce-
rebro, aut in
membris
illis.*

*Atra bilis se-
dem rationis
occupans ti-
morem, mœ-
stitiā, ac
mortis expe-
ctationem in-
ducit.
Tenebra per
terrefaciunt.*

*Hypochon-
driacus affe-
ctus.*

lèditur. Tertiū, quādo in alienā speciem degene-
rat. At perit quidem functio in stultitia, oblivio-
nēq; qui affectus à frigore oriuntur. Quippe me-
dicamentis quæ huiusmodi symptomata facere
possunt, refrigerandi facultas inest. Hæc itaq; sym-
ptomata cerebri corpus esse refrigeratum decla-
rāt. Apoplexia verò epilepsiaq; ex subitanea col-
lutione pituitę, replentis ventriculos cerebri, na-
sci videtur. Proinde horum symptomatū subita
est generatio & discussio, qualis esse per corpo-
rū intemperies nō posset. At modica offendicu-
la, ac veluti torpores tum rationis, tum memo-
riæ, ob minorem refrigerationē eveniūt. Porro de-
lirium omne, depravatus est principis facultatis
motus, à pravis succis, aut cerebri intemperie or-
tum habens. Cæterum phrenitis dicitur, si febris
adsit: ut mania, si absq; febris accidat. Solæ autem
melancholicæ alienationes, à frigidiori succo pro-
duci solent. Nam phrenitis non simpliciter ob
calidos succos accidit, sed cum phlegmonem vel
in cerebro, vel in ipsius membranis producant.
At quæ deliria in acutissimarum febrium vigore
oriuntur, mordacem calidumq; vaporē habent,
cerebrum occupantem. In omnibus autem ani-
mi alienationibus, si timor atq; tristitia diu per-
severent, atram bilem in causa esse est iudicium.
Quod verò atra bilis rationalem animæ arcē oc-
cupans, timorē, mœstitiā, ac mortis expecta-
tionem inducat, nihil mirandum est, cum videamus
in rebus externis nihil magis nos, q̃ tenebras
ipsas, perterrefacere. Si igitur quippiam tene-
bris simile rationali parti animæ circumfundatur,
hominem semper timere est necesse, ut qui
timoris causam semper in corpore secum ferat:
ut in flatulento illo morbo, quem hypochondriacum
nominant, indies videre licet.

GALENI PERGAMENI
de symptomatum causis, lib. III.

*Concoctio
quid.*

*Alterationis
error est con-
coctionis sym-
ptoma.
Cruditates
quid.
Concoctionis
vitium con-
tingit bis-
ariam.*

*Facultas bi-
fariam ladi-
tur.*

*Essentia fa-
cultatis la-
siones pro-
pria, sunt in-
temperies.*

Einceptus autē de symptomatis quæ circa
tum actiones, tū facultates naturales ver-
santur, dicendū est. Quādoquidē igitur cō-
coctio nihil est aliud q̃ alteratio secundū qualita-
tem, quā ventriculus nimirū molitur, dum sibi ci-
bos assimilat: nemo sanē negaverit alterationis
errorē fore cōcoctionis symptoma. Cæterū si nul-
la penitus alteratio fiat, hoc symptoma absolute
vocatur cruditas. Si verò fiat q̃dem alteratio, sed
nō qualem fieri expedit, vocabitur & hæc crudi-
tas, nō q̃dem tanq̃ privatio, sed ceu vitium cōco-
ctionis existens. At vitium ipsum, bifariam accide-
re solet. Aut enim tardē alteratur cibi, ut vix pro-
priam transmutationē suscipiat: aut corrumpun-
tur omnino, ut nullā cōcoctionē admittere pos-
sint: atq; huiusmodi sunt cōcoctionis noxę. Qua-
rum causa cōmunis quidem est alteratricis po-
tentia ab scopo aberratio. Cujus aberrationis
duo prima sunt genera. Unū, quod in potētia læ-
sa: alterum, quod in externo aliquo errore cōsi-
stet. Cæterum potētia bifariam ladi-
tur: aut per suā
ipsius essentiā, aut per aliquē morbū instrumen-
torū. Error autem externus tripliciter accidit. Nā
aut ab excrementis vētriculi, aut à cibis, aut à som-
ni tempore oritur. Jā in propria essentiā noxę, in-
temperies quædā agentium qualitatum existunt

*Instrum-
rum mo-
Crudit-
aut cō-
nis su-
causa,
ventric-
Cydoni-
edenda
timus.
Intemp-
tus cib-
usus.
Corrupt-
fumosu-
da q̃ a
bis cib-
quantu-
Conco-
tardis-
de.
Alter-
nis cib-
causa
peries
culi.
Sympt-
tum ge-
tria re-
in uni-
action-
pe abo-
functio-
remiss-
depra-
Succi
quos ap-
produc-
Atroph-
Gracil-
Leuca-
Elepha-
sis.
Imbeci-
tes facu-
tis quos
bos sequi-
tur.*

Ad morbos instrumentorū pertinent tumores
præter naturā, abscessusq; & alij affectus cōsimi-
les, quib. si crucietur ventricul⁹, impeditur facul-
tas ejus cōcoctrix. Quod si cum intempie coeant
ipsi instrumentorū affectus, utroq; modo facul-
tas illa patietur noxā. Atq; ob hæc omnes cau-
sas ventriculus malē cōcoquit, vel nullo extrin-
seco errore incidente. E cōverso autē ventriculo
nō malē affecto, interdum nō coquit animal, aut
ppter ciborū portionumq; immodicam quantita-
tem, aut qualitatem alienā, aut quia intempes-
tivē, aut nō recto ingeruntur ordine, aut ppter ex-
crementū inutile, aut somnū brevē. Ordinē præ-
posterū voco, ubi q̃s aut cydonia, aut punica ma-
la in primis ingesserit, mox olera sumat ex oleo
& garo. Intempesitivus aut dicitur, ut si in aurora
anteq̃ hesternus cibus descēderit, aut corpus fue-
rit modicē exercitatum, prædium sumatur. Por-
rō corruptelæ ipsæ, quæ q̃dem fumosæ sunt, ex ca-
lidioribus, magisq; fumosis oriuntur cibis: aci-
dē verò, ex iis qui frigidiores natura sunt, magis-
que pituitosi. Similiter etiā & in excrementis cō-
tingit. Aciditas siquidem creāt, quæ pituitosa sunt
& frigida: fumosæ, quæ biliosæ & calida. Nec se-
cus venter, sub frigidiorib. quidē morbis aciditas:
sub calidioribus, fumosæ mutationes efficit. Tar-
da cōcoctio fit, quia cibi difficulter corrumpuntur:
vel quia illos facultas nō superat: vel quia som-
nus fuit brevior, q̃ ut eos vincere posset. Ubi ve-
rō citra corruptelam cibus omnino cōcoctione
privatur, sciendum est ventriculum planē esse vi-
ctū, vel ab immodica multitudine, vel ab ingēti
frigore. Ad eosdem reducuntur modos quæ in
valis cruditates cōtingunt: illæq; etiā quæ in ter-
tia cōcoctione gignuntur. Atq; hæc omnia indica-
vit nobis præcognita cōcoctionis ratio. Cū e-
nim temperiem huiusmodi, quæ ex quatuor ele-
mentis cōflatur, & quæ corporis ventriculi pro-
prietatem cōstituit, sciverimus esse causam alte-
rationis ciborū, quodq; ad hac rem nō mediocri-
ter cōfert calidum elementum: facile nobis via
ostendetur, qua cruditatis causas quoq; invenia-
mus. Igitur in universis actionibus tria sympto-
matum genera reperiuntur. Quorum q̃dem pri-
mū est, abolita actio. Secundū, imperfecta, dimi-
nutaq;: tertiū deniq; vitiosa seu depravata. Vētri-
culus itaq; actione privatur, ubi ne minimū qui-
dem immutat cibos. Imperfectē concoquit, ubi
tardē concoquit. Depravatē verò, ubi cibos cor-
rumpit. Eadē etiā habenda est ratio, & in coctio-
ne quæ fit in venis, & in universo corpore. Por-
rō ex vitiatis succis gignuntur erysipelata, cæcri,
gangrænæ, phagedænę, carbones, herpes, aliq;
id genus affectus. Circa nutritoriā autem actio-
nem, privatio quidem actionis, atrophia est: de-
ficiens nutritio, gracilitas, at vitiosa, in leucis, &
elephantiasī cōsistit. Quorum sanē causæ, alię ad
potentiā imbecillitatem: aliæ ad errorē qui cir-
ca cibos cōmittitur: aliæ ad studia sive exercitia,
& ea quæ extrinsecus animali accidunt, referun-
tur. At verò imbecillitates potētiæ, quæ quidē
propriæ sunt, similariū intemperie: quæ verò nō
p̃prię instrumentales sequuntur morbos. Error
autē circa cibos exhibitos, ad multitudinē, succo-
rūq; qualitatem refertur. Quemadmodū & stu-
dia,

dia, & ea quæ extrinsecus occurrunt, ad ordinem præposterum, & intempestivum usum pertinere videntur. Oportet autem non modo symptoma nosse, verum ejus semper causam investigare. Nam si ventriculus ciborum causa nihil omnino concoxerit, facile id symptoma corrigitur. Si vero ob extremum potentie lapsum, in lienteria, aut in tympanitum mutabitur. Similis etiam & in sanguificatione, & in concoctione illa quæ per totum corporis habitum fit, est inquisitio facienda. Omnis autem intemperies, si vehemens fuerit, vires dejicit. Quod si frigus vicerit, frigidos affectus efficit: contra, si calor: nec secus in reliqua oppositione. Si itaque ventriculus calore immodico aestuet, illico corrumpuntur. Quæ quidem corruptela nidore communiter refert: privatim vero quilibet cibus id nidoris genus reddit, quod naturæ suæ proprium existit. Nullus autem cibus, si immodice fuerit excalfactus, putredinem effugere potest. At qui sic sunt affecti, siti cruciatur, atque interdum parvis tenuibusque; hecticis corripuntur. Si ob frigoris vehementem intemperiem cibus omnino crudus permanferit, ita affecti nec siccantur, nec febriunt: sed ciborum qualitate percipiunt, sive ad ructum, sive ad vomitum provocentur. Quod si leve aliquod cibus imprimatur coctionis vestigium, fueritque ciborum natura aut modice temperata, aut frigidior, acidi ructus incitabuntur. Si vero calidiore intemperie fuerint, aut suapte natura flatum excitare possint, vapore spirituque ventriculum replent. Atque in hujusmodi intemperies facile ventriculus labitur. Ad tantam autem vel siccitatis, vel humiditatis intemperiem, ut actio ejus aboleatur, ventriculus nisi in multo tempore, pervenire non potest. In retentrice potentia, triplex etiam reperitur symptoma. Nam aut nihil omnino complectitur, aut debiliter, aut depravate. Cum igitur vel nihil penitus, vel debiliter retinet, tum inflationes, tum fluctuationes sequuntur. Porro ultimæ imbecillitatis ventriculi causa aliquis morbus existit. Morborum autem qui accidunt illi, alij veluti similes, alij tantum instrumentalem partem, ipsum solent affligere. Miscentur autem interdum & morbi, & symptomata tum retentricis, tum expultricis potentia, ut in ea ventriculi commotione, quæ veluti convulsio illius est, eique per singultum accidit. Ventriculus siquidem per singultum, prave cibos amplectitur: conaturque depravato illo convulsivoque motu, etiam molesta expellere. Etenim quemadmodum per vomitiones expelluntur ea quæ in capacitate fluctuant: sic per singultum illa, quæ imbuerunt ipsius ventriculi corpus. Quobrem pipër, si in tenuissima comminutum (ut possit penetrare ipsius ventriculi corpus) sumatur, bibaturque postmodum calida potio, singultum vel maxime excitat. In universum autem, sive calida sint, sive frigida, quæ permaneant ventriculi corpus, excitabunt singultum: qui primum quidem expultricis, dein retentricis facultatis est motus. Nausea quoque, expultricis facultatis est depravatus motus, quo per gulam celerimè vacuetur, quod ventriculi infestat. Inter hæc numeratur lienteria: ubi a re quapiam sic irritatur ventriculus, ut eam per inferius osculum expellere cupiat. Illo siquidem ad expulsionem utitur orificio, in quo humores contristantes inclinant. Quod

si in utrumque repat, ut in cholera morbo, utrumque orificium accommodat. Attractrix etiam facultas, aut omnino nequit cibos attrahere (quod symptoma dicitur gulæ paralytis) aut difficulter trahit, ubi incipit gula resolvi: aut depravate trahit: de quo motu jam sæpe diximus. Est cum ob innatam carunculam tota gula aut ejus pars obstruatur: qui morbus instrumentalis vocatur. Cum igitur ventriculus naturaliter habet, supernis partibus ad sese trahit, atque per inferiores dejicit. Ubi vero præter naturam affectus est, etiam ab infernis assumit aliquid. Siquidem nonnullis clysmi vomitione sunt redditi: sicuti & stercus, per letales volvulos. Satiustamen est dicere, ventriculum per id genus affectus, non trahere, sed recipere ab intestinis excrementa violenter compressa. Id quod solet contingere iis, quibus ob negocia non licuit, quando expediens erat, dejicere. Nonnunquam etiam fit volvulus, ubi intestina suo illo naturali constitutionis motu privantur. Quinetiam induratum stercus tumoresque præter naturam, obstant aliquando, ut vel nihil excrementorum feratur deorsum, vel non satis copiose deiciantur. In summa vero, omnia symptomata intestinorum, ad ea quæ de ventriculo diximus, referuntur. Alimenti per corpus digestio (quæ & ipsa naturalis opus existit) tunc ad amissum perficitur, ubi qualibet pars peculiarē sibi allicit cibum. Accidunt autem tria symptomatum genera. Nam vel imbecilla est, vel depravata vel omnino cessat. Quorum sanè symptomatum causa dicuntur, aut trahentium partium intemperies, aut instrumentorum morbi, aut digerendi alimenti pravitas. Ac per intemperies quidem, facultas redditur imbecilla. Instrumentorum vero morbi, alimenti meatus restringunt. Pravitas autem dicitur, si vel crassior, vel glutinosior sit cibus: similiter impeditur expulsionis excrementorum, triplices causæ inveniuntur. Una, cum partes quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ: altera, viarum angustia: postrema est excrementi malitia. Imbecillitatem intemperies parit, angustiam vero, vel obturatio, vel aliquis instrumentorum tumor. Atqui tumorum causa est humorum affluxus. Obturationem facit humorum vel crassitudo, vel lentor, vel innatum tuberculum. Excrementorum autem malitia, est multitudo, crassitudo, & viscositas. Per concoctionem in venis facta, tria redundant excrementorum genera. Unum bilis amara, quæ ab hepatis vesica expurgatur: alterum atra bilis, quæ a liene: tertium veluti serum, quod attrahitur a renibus. Cum autem viarum duo sunt genera: unum per quod excrementum trahitur, alterum per quod expellitur: utriuslibet angustia excretionem lædere potest. Nonnunquam etiam horum nullum est læsum, sed excrementi multitudo cum immodica est, ut tota expurgari non possit, una cum sanguine per totum corpus defertur. Hujus vero immoderationis duplex affertur causa: nepe alteratrix potentia male affecta, & alimentorum pravitas. Jam vero pallida bilis, si redundet per universum corporis habitum, regium morbum: si autem in una tantum parte consistat, erysipelata & herpes excitat. Atram bilem, si universo adsit corpore, elephas: si in una aliqua parte, cancer sequitur. Pituita, si per universum corpus in-

Cho'era morbus.

Attractrix facultatis symptomata.

Volvulo morbo affligente, Ventriculus ab intestinis excrementa suppressa recipit. Volvulus unde solet oriri.

Digestionis ciborum symptomata, atque ipsorum symptomatum causa.

Expulsionis excrementorum non respondentis causa triplex.

Excrementorum per vagantium venas cum sanguine, tria genera.

Excrementorum via duplex.

Bilis pallida quos morbos gignat, per corpus fusa. Atra bilis quos morbos pariat. Pituita quos morbos gignat.

Serum sanguinis quos affectus producat.

Nutritio est naturalium actionum prima. Assimilatio alteratio est. Nutritoria facultatis symptomata.

Atrophia.

Elephas quid.

Alphi.

Alimenta ad suam naturam immutant carnem, & immutatur ab illa. Persica planta.

Coniuncta afficiuntur. Alimenti privatio unde accidat. Expultrix eius quando immodicè moveat.

Expultrice facultate existente imbecilla, quid accidat.

Sanguinis excretiones omnes, menstrua excepta, præter naturam existunt.

Sanguinis quotupliciter effluere possit.

Vasa quibus modis dirumpi possint.

creverit leucophlegmatia comitatur. Sin aut in una parte, œdema. Serosa excrementa si redundant, ascitè aqua inter cutim inducunt. Quæ si unam aliquam partem invaserint, in ea pustulas gignunt. Pro miscella autem ipsorum excrementorum, variari solent & morbi, & symptomata. Porro nutritio, ut naturalium actionum est prima, sic perquam necessaria existit: quippe quæ species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio siquidem alteratio est: quæ quidem, licet nomen diversum à nutritione sortiatur, idem tamen utriusque est opus. Nutricatio autem à scopo aberrat, sed vel nihil omnino agit, vel ab actione perfecta deficit, vel vitiosè agit: idque ob altricem facultatem, quæ sub alterationis genere continetur, vel ob materiæ tum defectum, tum pravitatem. Ob defectum quidem, ut in atrophis, sive hæc ex defectu, sive ex privatione dicatur. Hic autem in atrophis defectus, non propriè ad cibum qui ingeritur, sed ad materiæ membro dicatæ, est referendus. At pravitas cibi, leucas & elephasia, ejusque generis alios affectus gignit. Verum ubi caro nigra pallidaque fuerit, elephas nominatur. Nec aliter affectus hic gigni solet, quam leuce. Jam alphi haud diversam à prædictis habent generationem. Cæterum per hos non caro universa afficitur, sed corporis superficies duntaxat, veluti squamis quibusdam inspergitur. Atque albi quidem ex pituita, nigri verò ex melancholico humore prodeunt. Siquidem alimenta carnem maximè permutare ad suam ipsorum naturam possunt (etenim Persica planta, cum in Persia fuisset letalis, postea in Ægyptum translata, quod inerat noxium amisit) quantum à carne etiam, alimenta ipsa immutantur. Omnis siquidem res, vel si longè potentior sit, ab illa cum qua versatur, afficitur. At non solum ob alteratricis facultatis imbecillitatem, pars aliqua alimento privatur: sed etiam ubi attrahendi vis imbecillior fuerit, aut expultrix immodicè moverit. Atque tunc immodicè movet expellendi vis, ubi retentrix potentia gravatur, vel ob excrementorum multitudinem, vel acrimoniam, vel ob propriam imbecillitatem. Tunc siquidem necesse est, ut cum eo quod redudat, simul etiam id quod utile est, excernatur: ut in lienteria, dysenteria, choleraque fieri contingit. Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse est carnem tunc humidior fieri, pluribusque excrementis impleri. At redundantia multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quantitate, tum qualitate, aliàs aliter caro immutatur. Quod verò ad sanguinis excretiones pertinet, si excipias eam quæ foeminis per singulos menses accidit, reliquæ omnes toto genere præter naturam existunt. Profluvia autem uteri, ubi modum in quantitate excesserint, tunc solum præter naturam censeantur. Omnium autem sanguinis florum causa, trifariam potest accidere. Quippe vel facultas ora vasorum aperit, ut in sanguinis fluore è naribus. est videre: vel sanguis est male affectus, vel vasorum aliquod etiam male affectum, vel ruptum. Etenim vasa rumpi contingit, aut ob plagam acceptam extrinsecus, aut ob saltum, aut ob causam ab alto, aut ob vociferationem vehementem. Sanguinem male affectum

dico, vel cum adeo vitiosus est, ut vasa quibus con-
tinetur, erodat: vel adeo auctus, ut à vasis contineri non possit. Vasa male affecta dicuntur, si vel molliora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Si quidem quod immodicè molle est, facile ob imbecillitatem rumpitur: sicuti & valde durum, quia non facile multum extendi potest. At tenue, ob huiusmodi has utrasque affectiones, non solum ab internis causis, verum etiam ab externis ut rumpatur facile, est habile. Verum non omnia vasa erodi similiter possunt. Nam durum crassumque, erosum est contumax. Similiter de reseratione est dicendum. Nam vasa imbecilla, mollia & tenuia, prona sunt ut oscula ipsorum pateant: robusta verò, & crassa & dura, sunt ad talem reserationem inepta. Cæterum reseratio accidit ab iis quæ ora vasorum irritant, & à plenitudine gravante: sicuti quandoque à natura, cum excernit ea quæ sibi molesta sunt. Sed jam de iis quæ vomitu rejiciuntur dicamus. Excernuntur igitur hæc interdum, quæ quantitate & mole sua ventriculum gravent: ut cum plurimum cibi est ingestum: interdum, quæ sua mordacitate contristant: ut si nutrimentum assumptum vel acidum, vel nidorosum, vel amarum, vel acre, ob vitium concoctionis evaserit. Eodem genere continentur & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, vel inibi nata, vel ex universo corpore illuc confluentia. Tertium causarum genus ventriculum ad vomitum incitans, est quod haudquaquam irritans, in illo continetur præter naturam: ut videlicet sanguis. Communiter autem dicuntur esse præter naturam, quæ etiam si sint concocta, minimè possunt alere. Jam verò recrementorum ad infernas partes expulsio, nonnunquam solitum tempus prævenit, vel quia venter copia multi cibi gravatur, vel pungitur, vellicaturque: ut à re mordente, quam ut alienam expellere nititur. At dicimus multum cibum, vel quia facultas seipsa imbecillior est reddita, vel quia existit assumptum alimentum immodicè: vel ob utramque causam. Præter jam dictas causas, alimenta tum humidiora, tum viscosiora ingesta, ipsam dejectionem accelerant. Quæ tum celerius delabuntur, cum leviter post eorum assumptionem deambulaveris. * Cum autem complura sint intestinorum volumina, per quæ deferri alimenta est necesse, cibi sanè ipsi ob gravitatem diu immorari non possunt: quod si eorum quippiam in ipsis circumvolutionibus fixum inhereat, id subito ab actione intestinorum (quibus inest vis expellendi instantia) propellitur. Tardius quam pro consuetudine excernit venter, aut ob intestinorum vel imbecillitatem, vel obtusum sensum: aut ob alimentorum tum paucitatem, tum qualitatem. Sed musculorum abdominis imbecillitas etiam dejectiones retardat, præsertim si duriora sint excrementa: quo tempore thoracis muscoli etiam auxilio sunt. Pauciora quam pro ratione assumptorum excrementa excernuntur, ubi plus ex cibis per corpus digeritur. E contrario plura deiciuntur quam pro portione ingestorum, interdum ob defectum digestionis per corpus, interdum ob excrementi quædam è supernis ad regionem ventris defluxa. Porro assidue excretiones, vel ob imbecillitatem, vel ob morsum eveniunt. Imbecillitatem intemperies inducit.

At mor-

At mordicant humores contenti. Est & alius assidue dejectionis modus, quæ fit ob sedis musculos resolutos. Quippe huiusmodi dejectiones à voluntatis imperio non pendent: proinde & intempestivæ, & inordinatæ, & assidue sunt. Jam verò solet flatu in ventriculi spaciis oriri, cum vel humores pituitosi illic contenti, vel cibi, in vapores ab imbecillo calore solvuntur. Etenim ut absolutum frigus vaporem haudquaquam excitat, sic vehemens calor exactius magna ex parte cibum ipsum comminuit, quæ vaporis generationi conveniat: nisi forte is suapte natura sit flatulentus. Quemadmodum enim frigidissima constitutio, maxime spirante borea, aerem sereniorum reddit: ac rursus calidissima constitutio æstatis, efficit aerem nos ambientem purissimum: mediæ verò constitutiones nebulas pariunt: sic in animalium corporibus, à solo moderato, imbecilloque calore, flatulentum gigni excrementum contingit. Hoc igitur si per os excutiat, ructum efficit: si autem per sedem, flatum molitur, interim strepitum, interim sine strepitu. Cum verò per neutram deferatur partem, inflationem, symptoma ventriculi imbecilli, producit: quæ etiam mora per vacua intestina, in illis varios gignit strepitus: qui quidem eo acutius atque tenuius resonant, quo purior spiritus fuerit, magisque per intestina tenuiora & superiora delatus: eo autem minor, sed gravior resonatio sentietur, quo spiritus magis ad inferiora intestina descenderit. Quod si intestina ipsa aliqua humiditate contineant, strepitus murmurillus dictus gignetur, qui humidi excrementi dejectionem nuntiabit. Si verò strepitus æditus, purus & clarus resonet, aut intestini ipsius inanitionem, aut in superiori eius parte excrementa dura contineri significabit. Qui strepitus cum stridore fit, is ab instrumentorum angustia, & inflante spiritu, atque paucâ humiditate procedit. Defluxus à supernis partibus in ventriculum fit, ubi facultas prævalida, redundantia excrementa expellit: interdum ubi adeo imbecilla existit, ut ne id quidem quod utile est, ferre possit. Excernitur id quod reducat, tum per crises, tum per integrâ valetudinem: ut in mulieribus singulis mensibus, & in ijs quibus aliquod membrum est mutilatum: id quod etiam per definitos circuitus contingere in aliis multis videmus, qui prioris vitæ exercitia, cum ignavo ocio mutarunt. Atque excrementum huiusmodi sola quantitate est alienum. Alterum qualitate aberrat, magnaque ex parte in acutis morbis solet excerni per crissim. Inter hæc duo excrementorum genera, est aliud tertium genus medium: ut in ventriculo semicoctus cibus. Hoc autem per hepaticas affectiones maximè excernitur. Cæterum nominatur hepatici, quos ob jecinoris imbecillitatem infestat morbus, etiam si nulla adsit phlegmone. Hepar igitur, si quando alimentum, quod per meseraicas venas attraxerat, nequeat conficere, per easdem rursus id semicoctum ac simile aquæ in qua fuerunt abluta carnes nuper mactatæ, respuit. Quod si alimentum in hepate accurate concoctum fuerit, ob aliquod autem impedimentum distribui in corpus non possit, ut ad ventrem redeat est necessarium. Quo tempore excretus sanguis apparet nigrior, splendidiorque illo, qui naturalis existit: utpote ex

sanguine & atra bile commistus. Etenim sanguis solus per se ob refrigerationem nigricans, tantum abest ut splendor ullum acquirat, ut etiam eum quem ab initio habuit amittat. Atra autem bilis eo splendidior existit: quale maris mortuoribus men Judaicum. Siquidem non ex refrigerato sanguine, ut grumus, sed ex immodicè assato, fervidoque, veluti quidam cinis, gignitur atra bilis. Cæterum ipsa est frigida, quia terrestris: non tam caloris expers: quemadmodum nec cinis, nec etiam acetum. Igitur cruentorum excrementorum quatuor sunt differentie. Prima est, ubi sanguis quatenus dictum est, per circuitus quosdam emanat. Secunda, cum ob imbecillitatem jecinoris, haud absimilis lavacro ablutarum carniū sanguis dejectur. Tertia (quæ nuper diximus) ex melancholico splendenteque sanguine constat. Ac per has tres differentias, & multum est excrementum, & affatim excernitur. Per quartam verò (quæ ex ulcere intestinorum oritur, præcipueque dysenteria vocatur) paulatim & brevibus intervallis dejectionem fieri contingit, nonnunquam synceri sanguinis, nonnunquam grumosi: cum quo interdum puris quoque, non nihil excerni solet: quemadmodum & ramenta, & partes quædam membranarum intestinorum consimiles. Sæpenumero densum quoque sterces excernitur cruentis guttis respersum. Eiusdem generis cum prædicta dysenteria est tinesmus vocatus, ob recti intestini ulcus eveniens: qui quidem cætera symptomata dysenteriae similia habet: tensionis verò vehementia, dysenteriam longè superat. Urinæ tum suppressiones, tum depravatæ expulsionem, excrementis quæ vel in ventre retinentur, vel præter morem naturæ ejiciuntur, proportionem respondent. Supprimuntur igitur, vel ob vesicæ imbecillitatem excernere non potestis, vel ob ostioli ipsius angustiam. Quorum duorum morborum ischuria est unum commune symptomata. Est & aliud symptoma, cum nihil penitus urinæ in vesicam delabitur, abolita nimirum renū actione. Alius itaque effectus censendus est, cum oppleta vesica, alius cum vacua, nihil urinæ redditur. Nam in ea affectione qua vesica est plena, oportet aut orificium eius angustum, aut naturam imbecillam existere. Os igitur fit angustum, quia obstruitur & conivertitur. Atque obstruitur quidem à grumo, vel crasso pure, vel lapide, vel callo, vel tuberculo, quod in meatu crevit: cuiusmodi in externis partibus omnibus accidere cernimus. Conivertitur autem, aut ob tumorem præter naturam, cuiusmodi est phlegmone: aut ob siccitatem ingentem, qualis per febres ardentissimas gignitur. Sunt verò deprehensi quidam vesicæ oppletam habentes, qui veriti surgere à cæna, ut illam exoneraret, postea meiere nequiverunt: qualis etiam affectus ventri & intestinis solet interdum accidere. Igitur jam dicti affectus, vim excernendi urinæ, sua functione defraudant. Qui verò ab iis magnitudine relinquuntur, actiones efficiunt obtrusas, torpidasque. Reliquos affectus tertium genus symptomatum (quod in motibus depravatis consistit) comitari consuevit: cuius multæ species habentur. Primam stranguriam appellant, quæ vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob acrolotium fieri videtur. Secunda species profluvio

Atram bilē esse excreto sanguine splendidiorem.

Atram bilē gigni ex sanguine immodicè assato, esseque frigidam, non tamen caloris expertem.

Cruentorum excrementorum differentia quatuor.

Dysenteria signa.

Tinesmus oritur ab ulcere intestini recti.

Urinam unde supprimi accidat.

Ischuria, quorum symptomata existat.

Urina meatu ex quibus obstrui occasionibus possit.

Vesica osculum quæ ex causa conivertatur.

Stranguria fit vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob acrolotium acrimoniæ.

*Colliquatio-
nes partium
quibus mo-
dis solentur.
Renum fa-
cultas.*

*Aqua inter
cutem quo-
modo genere-
tur.*

*Syncope
quid.*

*Sudores cre-
tici robustas
vires annun-
tiant.*

*Sudores reti-
nent odorem
& colorem
eius, quem
purgant, hu-
moris.*

*Sudoris tum-
nimis fluen-
tis, tum sup-
pressi, causa.*

*Essentia par-
tis illaesa, fun-
ctio impedi-
ri non potest.
Calor Sici-
nas res omni-
um maxime
alterare po-
test.*

*Calidum &
humidum cor-
pus quam ce-
lerrime pro-
prium sibi
alimentum
assimilare.*

*Frigida et sic-
ca corpora
cur nutrian-
tur infelici-
simè.*

Concoctio.

Nutritio.

Appositio.

Adhæsi.

*Pueri & im-
becilliores ha-
bent imbecil-
liorem ex-
pultricemq;
non admodum
fortem.*

ventris est similis. Solet autem fieri quædam vel-
uti resolutio, colliquatiove, interim universi
corporis, interim succorū tantū, quos venæ con-
tinēt. Deinde quod ita liquatū est, modò in ven-
trem, modò cum urina defluit: nōnunq̃ in sudo-
rem degenerat. Igitur venarū succos in serosam
saniem solutos, renes ad sese trahūt, ubi integrè
valent, continenterq; ad vesicam transmittunt.
Si verò invalidi fuerint, ut ipsos trahere ne-
queant, tunc venæ ejusmodi serum aut in ventrē
demittunt, nimirum si crassius sit: aut in univer-
sum corpus pellentes illud, ubi est tenuius, subi-
tò totum habitum ad aquam inter cutem trans-
mutant. Quòd si raro liquata sit, tum vel venter
fiscipit ipsam fluxionē, si sit crassiuscula: vel su-
dores profluēt, si in vapores solvatur. Reliquorū
lotii symptomatū, alia quidem vesicæ aut renū
quosdam affectus indicant: alia quantū vel cru-
ditatis vel cōcoctionis accesserit sanguini, osten-
dunt. Ut verò ad sudores transeamus, ubi ii reso-
luto corporis habitu eveniunt, affectus vocatur
syncope: cuius sanè rei contrarium, per sudores
creticos accidit, quippe qui robustas vires an-
nunciāt. Eis autē sudores sunt similes, quos mo-
dica exercitatio, & balneū, & calor æstivus evo-
cat. Per exercitationes autē immodicas, nō nihil
utilis humoris excernitur. Odorem verò & co-
lorem excrementi quod expurgant, sudores ob-
tinent. Cæterū multus sudor effluit, aut ob cor-
poris raritatem, aut excrementi tenuitatem, aut
abundantiam. At detinetur, si paucū, viscidum,
crassumq; excrementū fuerit, aut cōstipati mea-
tus: id quod accidit ipsis, quia vel obturantur,
vel connivent. Ac obturantur quidem à succis
crassis & viscidis. Connivent ob nutritionē ple-
nionem, vel ob refrigerationem, vel ob molliti-
em. Ad hæc, sudoris tum excretio, tum suppressio,
ob virium in carne imbecillitatem interdum
accidere solet. Porro nullius partis functio, ma-
nente ipsius essentia illaesa, impediri potest. Nul-
la autem qualitatū agentium, res vicinas perin-
de alterare videtur, ac calor. Quare corpus cali-
dum simul & humidum, q̃ celerrimè proprium
sibi alimentū cōcoquet, assimilabitq;. Quod ve-
rò ita sit durū ut & flectatur facilè, & firmiter in-
nitatur, id & trahere vehemēter quidlibet, & im-
pellere violenter, & detinere fortiter poterit. O-
ptimè itaq; nutriuntur calida & humida corpo-
ra, ut quæ & celerrimè immutent, alliciantq; ad
se, reponantq; & assimilent alimentū. Pessimè o-
mnium frigida, & sicca, ut quæ nec alterare, nec
fiscipere, nec apponere, nec assimilare sint apta.
Quod verò humidiora corpora tum facilius,
tum celerius adhæreant, coalescantq;: duriorum
autē alia nequaq;, alia nō facilè id perpetiantur,
nemini obscurū existimo. Cæterū concoctio &
nutritio, alterationes esse censentur. Appositio
fit, cum cibus in roris speciē redactus, à nutrito
fiscipitur. Adhæsi, est alimenti cum alito con-
glutinatio quædam, dum in unum coalescunt.
Atq; in his omnibus pueri, aliq;, quorū tempe-
ramentum calidius est & humidius, optimè de-
gunt: nec infelicitè in illis distributio perficitur.
Retentricem tamen facultatem pueri habent im-
becilliorē, ob idq; excernunt celeriter. Similiter

etiam expellendi facultas, ut retentrix, modicè il-
lis est imbecilla. Eget autem longiori tempore
facultas retentrix, quò suo fungatur munere: ex-
pultrix verò breviori. Pueri igitur, ut alteratricis
facultatis robore juvenes superant, sic attrahen-
di vi sunt ipsis longè inferiores: atq; ab eis etiam
in duabus reliquis facultatibus superatur. Quan-
quam expultricis imbecillitas in eis minimè de-
prehenditur, idq; ob temporis brevitatem, quo
suo fungitur munere. Quippe crebrius & deji-
ciunt & vomūt, q̃ juvenes, nō ob expultricis po-
tentia robur, sed ob retentricis imbecillitatem.
Atq; in cōcoctionibus quæ ad ventriculum per-
tinent, si humida molliq; sumpserint, ea perin-
de ac juvenes concoquunt: dura verò deterius
conficiunt. Siquidem puerorū calor, ad vaporis
naturam: juvenum, ad siccitatem magis accedit.
Atqui humidiora corpora humidioribus indi-
gent alimentis: sicciora, siccioribus. Senes ad o-
mnes ferè actiones corpus malè affectū sortiun-
tur: quippe qui juvenibus aridiores sint, præter-
ea etiam frigidi. Quare nec probè concoquunt,
ob caloris penuriam: nec ritè nutriuntur, partim
ob siccitatem, partim ob imbecillitatem altera-
tricis potentia. Jam digestio per corpus ipsis &
tarda, & imbecilla est, nimirum instrumentis vel-
uti torpentibus ob frigiditatem. Porro ad fun-
ctiones activas calidum instrumentū & siccum,
magis idoneum est: frigidum verò & humidum,
imbecillius. Reliquæ duæ conjugationes me-
dium inter has locum obtinent. At verò si æta-
tes ipsas spectes, naturaliter frigidum & humi-
dum corpus minimè deprehenderis: quanq̃ ob
affectum præter naturam, talia reperiri contin-
gat. In universum igitur, frigidum ubiq; est debi-
lius & torpidum, siue humori, siue siccitati jun-
gatur. Haud aliter inter naturales potentias, re-
tentrix robustior quidem videtur in aridioribus
calidioribusq; instrumentis: imbecillior verò, in
humidioribus frigidioribusq;. Similiter nervi,
tendones, syndesmi, & muscoli, quātò sicciores
tātò robustiores evadent: nisi adeò modum ex-
cesserint, ut ob duritiem vix flecti possint. Nam
si sic sint affecti, corripientur spasmus. Contra na-
turalia instrumenta, quò sunt humidiora, eò sunt
ad nutritionem magis idonea, vel si ad extre-
mam humiditatem pervenerint: ad concoctio-
nem verò nō sunt aptiora, nec seipsis, nec aridio-
ribus, quibus similis adsit caro: nisi siccum ali-
mentum quando cibū exhibeas instrumento sicco & squa-
lido, nō liberaliter ei tribuens humiditatē. Cæte-
rum & ad digestionē per corpus, & ad excretio-
nes, corpora admodum dura, ineptissima exi-
stunt: quòd haud facilè vel dilarantur, vel cōtra-
huntur: quorū alterū attractionē, alterū excre-
tionem molitur. In summa verò, calor auctus ad
omnem alterationē efficacissimus est, nisi ad tan-
tam, ut colliquet, vehementiam increverit. Siccitas
ad robur & firmitudinem cōfert, nisi adeò sit
cruda, ut corpora rigida, immobilia, ac friabilia
efficiat. Humiditas ad nutritionem quidem
mirificè facit: cæteris verò functionibus omni-
bus adversatur, excepta qua corpus augeat. De-
inceps autem de fluxionibus à cerebro oriundis
aliquid etiam dicamus. Destillationis igitur &
gravedinis

*Pueri quæ
facultas
superem
senes, &
bus ab
perentia*

*Puerili
senilis
laris di-
men.
Nutritio
omnia
bus
Senes ca-
rè ad p
sas func-
nes corp
malè ap-
fortitudo*

*Acti
tionibus
qua
menta
commo-
Frigidum
humidum
naturaliter
nullam
pus rep-
in at
Frigidum
ubiq; est
bilis, &
dumq;*

*Natural
instrum-
quo sum-
midiora
sunt ad
tricationem
magis ta-
neat ad
coctionem
rò inept
aridiora
quibus
similis*

*Qualita-
qua in q
sint effi-
res func-
nibus, et
inutiliter*

gravedinis (hæc coryza, illa Græcis catarrhus dicitur) cerebrum causa existit: ut pars quidem si milaris vel à frigore, vel à solis ardore in intemperie ad actum: ut instrumentum verò, quatenus infestatur à plenitudine. Cæterum destillatio fit, si ad os excrementum defluerit: gravedo: si ad nares: quæ admodum & raucedo, si ad fauces decumbat. Quod si fluxio gurgulionem invadat, aut uvam pariet, aut ipsum in tumorem attollet. In glandulas quæ ad finem oris utrinque, adjacet, si decumbat, antiadas procreat: sicuti & paristhmia, invadens ea quæ illis proxima sunt. Ac defertur quidam fluxio à capite nonnunquam in ventrem, nonnunquam in asperam arteriam, utrilibet maximè nocens. Quod verò ad uteri corpus spectat, si solidum fuerit aut durum, causa est, cur supprimantur menses. Duratur autem vel illico à primo ortu, aut tractu temporis post ipsam generationem: videlicet ob intemperie aut affectus alios præter naturam. At intemperies uteri interdum à natura oritur, interdum sequitur morbos, perinde ac densitas. Detinentur etiam nonnunquam menses, ob materiam ipsam vacuandam, ubi vel crassa est, vel viscida: necnon ubi à crassis humoribus vasa, quæ ad uterum descendunt, obstruuntur. Ad hæc, uterus nihil omnino excernit, ob multas exercitationes, & victum tenuem, & cum ad alias partes repunt humores. Minus excernit æquo, ob easdem causas, sed remissiores. Plus autem, ob diuturnum ocium, & victum opiparum. Cæterum depravatae uteri fluxiones (quod symptoma fluxus muliebris dicitur) sunt expurgato per hæc partem universo corpore. Actalem semper specie refert id quod excernitur, quale est quod in animali redundat. Est & aliud ex utero depravatum profluvium, ob affectum aliquem ipsum infestantem eveniens. Insuper interdum cohibentur menses sanguine, ob robustas vires in alias partes irruente. Ad hunc autem sermonem pertinet meminisse mulierum minimè foratarum, quibus uteri meatus coaluit. Iam priapismus est, cum invito intumescit inflaturque masculinum pudendum: cuius symptomatis causa existit flatulentus spiritus. Porro gonorrhœa si pudendo non intento acciderit, retentricis facultatis in seminariis vasibus imbecillitatem sequitur. Si verò intento pudendo eveniat, convulsioni quodammodo erit affectus similis. Colorum vicissitudinem (ut summum dicam) faciunt succi à sua naturali specie aberrantes, aut in profundum subeuntes, aut cutem veluti illuētes. Particulatim verò causæ, ob quas succos ad huiusmodi tum motus, tum affectus pervenire oportet, sunt affectiones animi: aeris nos ambientis vel ad calorem, vel ad frigus mutatio: corporis affectus vel calidiores, vel frigidiores: item sanguis vel paucus, vel plurimus, tum foras elatus, tum intro revulsus. Huc accedit etiam quodlibet humorum vitium, ad suam ipsius speciem universi corporis colorem permutare potēs. A naturali autem figura deflectunt partes, immodicè vel repletæ, vel inanitæ, vel à propriis sedibus turbatæ, aut revulsæ. Ut autem hunc jam commentarium claudamus, operæ precium mihi videtur addere, quænam symptomata sibi mutuò & necessario succedant, & quæ item non necessario. Igitur id quod fit, unanè ex causa fiat, an

ex pluribus, considerandum. Nam si ab unica tantum fiat, necessario causæ efficienti succedet: si à pluribus, non necessario. Symptoma itaque quod ab uno alio dependet, necessario consequitur illud. Ubi verò aliæ quædam causæ ad secundum symptomatis generationem accedunt, ipsum non necessario ad primum consequitur. Neque enim cruditatem (gratia exempli) inflatio ex necessitate sequitur, vel mordicatio, vel nausea: quanquam tum horum, tum reliquorum symptomatum ferè omnium nullum est, quod non aliquando cruditates sequi videatur. Verum & cruditatis magnitudo, & differentia, tum hominis natura, tum sensus vel acutus vel obtusus, item singularum corporis partium & robur & imbecillitas faciunt, ut alias aliud symptoma cruditatem sequatur. In summa verò, quæcunque pars cruditatem fecerit, illa noxam percipiet, quæ maximè imbecilla fuerit. Proinde nullum symptoma necessario sequi cruditatem, possumus asseverare. Ubi autem alimentum minimè per corpus digeritur, sive privatio, sive imbecillitas fuerit actionis, atrophiam necessario inducet, quemadmodum in singulis partibus alteratricis potentie noxa. Præterea expultricis facultatis circa excrementa, aut sanguificæ potentie aberratio, necessario producit pravi coloris symptoma.

GAL. ENI PERGAMENI

de causis procatarcticas, lib. unus.



Uas procatarcticas, sive externas, sive præincipientes appellat, ut magnus calor, frigusve ambientis, aut etiam aliquis animi affectus, invalida solùm corpora commovent: ac pro-

inde à nonnullis non causæ, sed morborum occasiones vocantur. Videmus etenim mille simul in theatro sedentes, è quorum numero quatuor duntaxat æstuant, & in eis à febre unus solus arripitur: quod nuper familiari nostro Menandro contigit: quem nos secunda die invisentes, iussimus caput rosaceo foveri, mox dormire: postmodum impensè lavari: ac sic tandem est restitutus. Alios etiam complures, ob æstum & labores febrientes, reclamantibus cæteris medicis, plurimis balneis ac victu humidiori usus, similiter persanavi. Non desunt tamen, qui varia connectentes sophismata, quas nuper causas procatarcticas diximus, eas morborum causas esse inficiantur: quod videlicet nec semper, nec omnia corpora lædant. Qui quidem non secus habendi sunt odio, ac illi, qui spinas & hamos in viis, per quas sunt transiuri homines, seminant. Nos itaque horum impedimentorum nonnulla jam rescindamus, aliqua emendemus, alia coteramus, ut antiquam viam, quæ non ad civitatem, sed ad artem omnibus civitatibus utilissimam ducit, purgemus. Quod igitur tum frigus, tum immoderatus calor, & contristare, & morbos gignere soleant, id indies natura rerum nos docet: cum nimirum vel ipsa animalia bruta, soleant loca & regiones mutare, ut æstate quidem calorem, frigus verò hyeme declinet. Quod si hæc noxia quidem, non tamè morborum esse causas fateatur, quod nec semper, nec omnibus noceant, jam non de re, sed de nominibus disputant

Cruditatem nullum necessario Symptoma sequitur. Atrophia sequitur necessario aimenti defectum.

Procatarctica causa invalida tantum corpora immutant.

Menandrum ex insolatu febrientem, qua ratione sanavit Gal.

Bruta animalia tantæ regiones ut æstum & frigus vitent.

disputat: quāq̄ ne sic quidem effugere poterūt quin cōvincantur, sicut illas esse causas nocuētijs, quibus nocent. Porro. Sunt porro duæ primæ causæ ac maximè principales in universum, scopus videlicet, sive finis, cuius gratia fiūt omnia quæ fiunt: ac præterea id, à quo ea fiunt. Has dignitate sequuntur tertia & quarta, instrumenta nimirū quibus, & materia ex qua. Etenim in humanis artibus, nisi causæ omnes cōspirent, nullus unq̄ effectus absolvi poterit. Nam nisi aliqua esset lecticæ utilitas, nunq̄ faber illā cōstrueret. Sed si aliqua sit illius utilitas, careat autē do- labro, serra, terebello, aliaq; supellectili instrumentorū, nec sic lecticā coagmentabit. Et si hæc illi omnia præstō sint, & mox ligna deficiāt, neq; ita componetur lectica. Sed nec si instrumenta & materia parata sint, & utilitas urgeat, absit autē artifex, quicquā unquā compingi possit. In ijs tamen artibus quæ casu fiunt, interdum finalis causa desideratur, cum ea nullius gratia fiant, & etiā ubi id per quod fiunt, abest. At nihil invenire licebit, quod materia nō egeat, ex qua constet: & efficiente, à quo fiat. Semper si quidem est necesse, ut sit conventus alicuius patientis, quod vicem materiæ subeat: & alteri⁹ quod circa ipsum agat, & efficientis rationem obtineat. Hoc autē nonnunq̄ instrumento eget, si alicuius gratia operetur. Interdum sine instrumento agit, ubi nullius gratia, neq; ex proposito agit. Ubi igitur ex frigore vel æstu aëris ambientis aliquis læditur, aëris ambiēs dicitur causa effectrix: materia, corpus affectum. Nullus itaq; effectus oriri poterit, nisi efficiens & materia jungantur. Unde oportet ut hæc utraq; aliquid ad generationē rei conferat. Quæ autem ad rei generationē cōducunt, merito causæ appellandæ sunt. Reperire autem licet præter jam dictas, etiam alias causas, accidentales tamen: veluti intermedium spaciū minimè impediens, quo faber indiget, ut circa lignum agere possit: idque non quā artifex est, sed quā corpus, quod alium ab eo qui continet materiam circa quam operatur, occupat locū. Hæc si quidem ex accidenti dicuntur, & tanq̄ ea sine quibus nō. Solidum quippe corpus interjectum inter fabrum & lignū, impedimento est, quo minus operari artifex possit. Quod si de medio tollatur, ex accidenti consequitur, ut aër in illius locum succedat, cum nusquam in hoc orbe vacuū possit cōsistere. Proinde constat fabri aëre ex accidenti indigere. Similiter ambulationis causæ sunt, ipsius utilitas, vis animalis, atq; etiā crura: at causæ sine quibus id fieri nequit, aër circumfusus cedens, pavimentumq; renitens. Quod autē ait Erasistratus, Si refrigerari febricitandi causa est, qui magis refrigerit, ille magis febricitabit: maximè absurdū videtur. Nam si effectrix causa ipsa id absq; patiente apto efficere posset, qui magis refrigerarentur, magis quoq; febricitarēt. At si frigus non omni corpori febrē adferre potest, sed illi tantū, quod ad eam excipiendam est habile, utique non amplius erit necesse, ut qui friguerunt magis, magis quoq; febricitent: imò facile nonnullos reperias, qui ne semina quidem febris cōcipiant, fiant tamē attoniti, vel torpidi, vel tremuli, vel cōvulsi: ut accidit Alexandro, dum æsti-

vo tempore in Cydno, Ciliciæ flumine se laveret. At verò nec illud etiā revera cōfici potest, ut qui magis frigescit, magis quoq; lædatur: sicuti neq; hoc etiā, ut si magis lædatur, magis febricitet: cum aliquando contingat aliquē magis lædi, qui tamen nō modò non magis, sed nec omnino febricitet. Idem etiam dicendū est de labore plenitudineque, & aliis id genus causis, quas eodem paralogismo, ab ordine procatacticarum febris causarū exterminabat. Sed cur interim operā ludimus, dum hæresim Erasistratorū cōvellimus, qui asserunt patriam potius prodendam esse q̄ propriū dogma? Adeò enim stupidi simul & pertinaces sunt, ut etiam omnes febres à phlegmone exoriri contendunt: ob idq; nec potū frigidæ, ijs qui ardenti febre tenentur, cōcedant: cum tamen ea opportunè exhibita, nisi obster viscerum inflammatio, ægri cōfestim sudant, liberiq; à morbo reddantur. At si in discernenda hypostasi purulenta, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres conspicitur, essent exercitati, convincerentur. Quippe in sanis, & ubi febres solutæ fuerint, id quod residet, album est, nec foetorem habet, nec colorem, nec lentorem, qualis cernitur ubi phlegmone in suppurationem cōversa solvitur. Sed hæc etiā est summa impudentia Erasistrati, quod cum fateatur repletionē plethoram efficere: hæc verò, sanguinis paremptio fin ad arterias: atque hanc deniq; phlegmonem: nolit tamen concedere, repletionē phlegmonis causam existere. Nam & nos pari modo dicemus, quod qui plaga homini illata venas colli secuit, non extitit illi causa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille qui percussit, sed potius effusio sanguinis.

GAL. ENI PERGAMENI de plenitudine, liber unus.

Sicut nullū quod est nostra tempestate in ore ferè omniū medicorū crebrius vesetur, q̄ plenitudinis vocabulū: ita nec aliud facile invenias, q̄ magis ab eis ignoretur. Ut autē eos qui ignorantia tenebris occæcatur, quiq; absurda tuetur dogmata, in præsentiarū missos faciamus, cum ingenuis verò ac veritatis amore flagrantib. cōfabulemur: duas in universum notiones, relationesve plenitudinis proponamus: unam quidem, secundum robur virēsq; illius qui talē plenitudinē defert: alterā, secundū excipientis vasis capacitātē. Dein verò sedulo perscrutemur, quæ nā sint universæ animatis vires: & quomodo plenitudo, quæ secundū earū unāquamq; consistere potest, sit & agnoscenda, & curanda. Postmodū, quod sint eorū humorū species, qui vel vires aggravent, vel à vasis contineri non possint. Igitur in libris de Placitis Hippocratis & Platonis satis à nobis monstratum est, q̄ alia ea vis sit, quæ in venis cōsistit, alia quæ per arterias, sicuti & alia quæ per nervos diffunditur. Ubi etiam docuimus, cor * facultatis arteriarū fontem atq; originē esse: nervorū autē cerebrū, sicuti jecur venarū. At in libris de Elementis ostēdimus, substantiā eorū omniū quæ generationi & interitui obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus immutari: & ex earum certa quadam temperatura, omnium

Causæ primæ & maximè principales in universū sunt finis cuius gratia fiunt omnia quæ fiunt, & præterea id à quo fiunt: quas postea sequuntur reliqua, nempe instrumenta simul atque materia. Effectus nullus absolvi poterit in humanis artibus, nisi causa in unum omnes conspiciant: id quod in ijs quæ fortuito contingunt minimè necessarium videtur. Omnia egere materia ex qua & efficiente à quo fiunt.

Causa appellanda sunt, quæ ad rei generationem conducunt.

Causæ accidentariae sine quibus operari nō licet.

Vacuū nusquam dari.

Frigus illi tantū corpori febrē adferre potest, quod ad eam excipiendam est habile. Alexander torpore fuit correptus dum in Cydno, Ciliciæ flumine se lavaret.

Erasistratus censet patriam prodendam esse q̄ propriū dogma. Adeò enim stupidi simul & pertinaces sunt, ut etiam omnes febres à phlegmone exoriri contendunt: ob idq; nec potū frigidæ, ijs qui ardenti febre tenentur, cōcedant: cum tamen ea opportunè exhibita, nisi obster viscerum inflammatio, ægri cōfestim sudant, liberiq; à morbo reddantur. At si in discernenda hypostasi purulenta, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres conspicitur, essent exercitati, convincerentur. Quippe in sanis, & ubi febres solutæ fuerint, id quod residet, album est, nec foetorem habet, nec colorem, nec lentorem, qualis cernitur ubi phlegmone in suppurationem cōversa solvitur. Sed hæc etiā est summa impudentia Erasistrati, quod cum fateatur repletionē plethoram efficere: hæc verò, sanguinis paremptio fin ad arterias: atque hanc deniq; phlegmonem: nolit tamen concedere, repletionē phlegmonis causam existere. Nam & nos pari modo dicemus, quod qui plaga homini illata venas colli secuit, non extitit illi causa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille qui percussit, sed potius effusio sanguinis.

Plenitudo duplex, iuxta illius qui defert: & iuxta illius qui excipit. Plenitudo iuxta illius qui defert, est illa quæ in vasis capacitātē.

Cor est arteriarū originis. Cerebrum est venarū. Hepar est interitui obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus immutari: & ex earum certa quadam temperatura, omnium

omniū corporū substantiam, ac proinde viriū,
earum essentiam, quæ corpus nostrū dispensant,
constare: quippe quæ non sit, nisi ipsius tempera-
menti quædam proprietas. Porro vis ipsa sive fa-
cultas causa effectrix existit, non materialis sub-
stantia, patibilisve. Facultas itaq; erit alicuius ac-
tionis causa, quam mox necesse est esse motum
ab agente in id quod patitur. Sicuti & affectus
qui in patiente est, motus erit ab agente, in rem
patientem. Unde vires suam quidem ex alterius
comparatione notionem habent: essentiam ve-
rò, * ex habitudine ad alterum. Quod autē in se-
ipsum aut agat, aut aliquid efficiat, omnem men-
tis captum excedit: sicuti etiā, quod seipsum ali-
quid contineat. Quare non modò ex Herophi-
leis multi, sed & ex Stoicis juniores, dum conten-
dunt ostēdere, quod spiritus atq; ignis & sese, &
cætera elemēta cōtineant, terra verò & aqua ab
iis cōtineantur, nullā demonstrationē adferunt.
Nos quippe evidentissimē cernimus, ita nihil ab
igne contineri, ut potius ab eo universa solvan-
tur. Etenim quod durum est, renitēsq; ac-
densum, vel primo aspectu potius continere vi-
deri possit: contrā verò, quod molle, cedens, ra-
rūmq; est, altero indigere a quo cōtineatur. Dica-
mus igitur, quotiescūq; præ multitudine aliquid
nimis distenditur aut dirumpitur, affectum ta-
lem ad continentia vasa spectare, nō verò ad ali-
quas vires: cum verò gravatur, ad sensitricē po-
tentiam. Nam neque id ipsum omnino ad vires
pertinet omnes, * cum naturalis potentia hæc
gravitas affectus nō sit. At verò plenitudinis ge-
nus, quod ex loci continentis capacitate cōmen-
suratur, non modò in animantibus reperitur, ve-
rum etiam in rebus inanimis, quemadmodum in
vestibus, vinculis, pellibus, vasisq; fictilib. Rum-
puntur siquidem omnia hæc, ubi multa replen-
tur flatuosa substantia. Porro cum quatuor sint
naturales potentia, attractrix, retentrix, altera-
trix, expultrix: alia sunt inquirenda indicia ad co-
gnoscentiam plenitudinē, quæ secundū earū sin-
gulas accidit: nam nec gravitas in istis sufficere
poterit. Etenim imbecillus ventriculus, vi sensi-
trice maxima est præditus, qua sibi gravia senti-
re possit. Jam quibus signis arteriarū plenitudi-
nem, quæ ex collatione ad earū vires cōstat, pro-
bè deprehendere liceat, in cōmentarijs de pulsio-
bus exposuimus. Venarū verò nec ego signum
aliquod unquā, quod id ex scientia haberi possit,
præscripsi, neq; ab alio quopiam literis manda-
tum reperire potui. Ut autē de plenitudine aga-
mus, quæ sigillatim quascunq; particulas occu-
pat, sciendum est, ea membra quæ parū sentiunt,
vel sunt sensus omnino expertia, nequaquā parem
cum ventriculo aut vesica, excrementorum quæ
in ipsis congesta sunt, sensum habere: sed aut o-
mnino exiguū, aut penitus nullum: exiguū qui-
dem, ubi maxima plenitudo adfuerit: nullum, u-
bi illa non multa fuerit. Nam in pulmone, jeco-
re, renibus atq; in nōnullis ossibus, aliquis non-
nunquā oboritur alicuius ponderis sensus: quanquā
is certē potius ad membranas referri debet, quā ad
eorum viscerum carnes. At secundum cerebrum,
perquā manifestum sui sensum gravitas interdum
excitat. In partibus autem sensu vacuis, nullus

potest non modò gravitatis, sed nec alterius etiā
symptomatis sensus haberi. Atqui sensu carere
videntur nonnulla ossa, adeps, & glandulæ quæ-
dam: præterea medullæ omnes, sensus expertes
sunt. Cerebrum tamē atq; spinalem medullam,
nōnulli in sentientibus particulis collocant. Tu-
tius tamen poterit quispiam de carne, qua gib-
ba jecoris pars constat, asserere, quod absq; ullo
sit sensu, cum nervus illi nulla ex parte inferatur
De parte autem illius cava, facilē dubitatio exo-
rietur, cum nervi qui jecori juxta portas distri-
buuntur, adeo sint exiles, ut contexere solam
membranam videantur. Gravitas igitur eviden-
tissimū signū illius est plenitudinis, quæ ad vim
sensitricē spectat. Nam si in aliqua particula quæ
sensu prædita sit, ulla humorū multitudo aggre-
getur, in ea statim gravitas sensus quoq; excita-
tur. Nec tamen quotiescūq; pondus loco alicui
infederit, ibi etiam humorū multitudo aggrega-
bitur: quandoquidem si facultas sit imbecillior,
poterit vel ex ipsismet solidioribus membris gra-
vari, quemadmodum in corporibus resolutis
contingit. Siquidem præ resolutione imbecillio-
ritus redditus musculis, sentit ille qui resolutus
est, in motu gravitatem insignem: ita tamen, ut
infirmus musculus sibiipso minimē gravis videatur.
Gravitas quippe ab altero, & in altero, gigni-
tur. Potest itaq; musculus fieri se ipso invalidior,
imbecilliorque: ut verò sibiipso sit gravis, id fieri
nequit. Agē igitur, maioris perspicuitatis gra-
tia, ponamus nunc a spiritu per nervum delato,
moveri musculum: a musculo verò, tibiam pri-
mū, cui is inferitur. Qua mota, articulus in ge-
nu, ubi crus universum cōmittitur, subinde etiā
moveatur. Quibus sic constitutis, quisq; verē as-
serere poterit, & musculum, & totam tibiam, in-
valido spiritui esse oneri. Quocirca minimē po-
test exquisitē dignosci, quid sit id quod primū
gravet, quodq; primū gravetur: nisi prius sciatur
id, quod primū in nobis unāquāq; movet par-
ticulam. Ad quod quidem vir tum in discernen-
dis potentijs, quæ nos gubernant, peritus, tum in
anatomie exercitatus, desideratur. Jam verò, ut
nulla est necessitas illis, qui in obeundis functio-
nibus valentiores, quā prius forent, effecti sunt, hu-
mores aliqua ex parte accrevisse (quod Erasistra-
tus existimabat) ita per necessariū videt, ut si qui
validiores actiones habeant, eis viriū robur ac-
cesserit. Actionū siquidem fortitudo, ad viriū ro-
bur cōsequitur, sicuti & robur viriū, fortitudinē
comitat functionis. At a sanguinis multitudine,
cōsecution nulla necessariò est futura: cum neq; si
is majori sit copia quā antea, validior ex necessita-
te futurus sit homo: neq; si minori, imbecillior:
sicuti nec si æqualis sit, necessum est illū viribus
eodē se habere modo. Liqueritaq; actiones vali-
das propriā esse ac inseparabilem viriū vigentiū
notam, sanguinis verò aucti nequaquā. Porro ubi
adeest tensionis sensus, nec tamē exercitatio præ-
cesserit, ibi necesse est plethoram esse cōgestam,
Sanguis autē auctus, nō tamē eò, ut venæ adhuc
tensæ sint, nondum plethoram absolvit. Ut ve-
rò tensio, copiarū humorum propria vasa tenden-
tium affinis est: ita ulcerosus sensus acrem sequi-
tur qualitatem humorum, potestq; vel ex solis
quando-

Sensu vacuum
particulas,
nec proprius
symptomatis
nullius posse
sensum percipi-
pere.
Medulla om-
nes insensiles
jecoris gibba
insensilia
esse.

Gravitas est
certum indi-
cium illius
plenitudinis
quæ ad vim
sensitricem
spectat.
Plenitudinis
ad vires non
requiritur
necessariò
magna hu-
morum colla-
tio.

Gravitas ab
altero & in
altero gigni-
tur.

Actionum
fortitudo ad
viriū robur
consequitur.
Robur viriū,
fortitudinē
comitatur
functionum.
Actiones va-
lida, non au-
di sangui-
nis, sed vigen-
tium viriū
sunt insepa-
rabilis nota.
Ulcerosus sen-
sus acrem se-
quitur qualita-
tem humo-
rum.

quandoq; motionibus gigni. Si igitur particula quæ distenditur, particeps sensus fuerit, necessum est, ut quæcunq; fuerit ea res, quæ eò ipsam distendit, ut capi nequeat, tensionis sensum in animante excitet. Atq; is affectus qui tunc mēbra occupat, tensio appellatur. Quæ si plurimum augeatur, erit etiam necesse, ut quod tendit distendatur. Cæterū nō tantū ex ipso sanguine, sed ex quacunque substantia humida & flatulenta, possunt partes tensivo affectu occupari. In universum autem, id quod gravat, multum: quod verò pungit, aut mordet, molestum esse dicemus. At plures reperiri humores mordaces, qui partim in nobis gignantur, partim accedāt extrinsecus, omnibus est compertū. Quorum quatuor penes magis & minus differentia extant. Etenim qui modicè mordent, pruritū inferunt, uti scilla: qui verò magis, rodunt, ut cæpa. Sed si aliqua præterea adhuc his fuerint acriora, horrorem excitabunt: præcipuè quidem, si particulis admoveantur exulceratis: prorogato verò, atq; aucto horrore, symptoma illud rigor vocatur. In nobis quoq; mordaces gignuntur succi eadem ratione, per has quatuor ideas distincti. Quorū sanè pruriginosi illi sunt, qui modicè existunt acres: ulcerosum verò sensum pariunt, qui his sunt mordaciores: qui autē hos quoq; mordacitate superāt, horrorem, qui præterea jam mordacissimi sunt, hi rigorem inducūt. Affectio igitur ulcerosa, ex succis mordacibus gignitur. Gravitas autē à multitudine, pro viriū cōparatione. At tensionis affectio, & ipsa quidem humorū multitudinem sequitur, non tamen per collationē ad vires corporū continētium, sed tantū ad capacitatem qua continētur illi. Ad hanc ergo affectionē ultimam, tensio tantūmodo pertinet: ut ad secundā gravitas. Ulcerosus verò sensus, neutrius est propria nota, nec plenitudinis nuper dictæ, nec secundæ, quæ vires respicit. Ex symptomatis itaq; alia ad plenitudinē pertinent, quæ respicit vires: alia ad eam quæ in infusione consistit: nonnulla præterea nō sunt * simpliciter plenitudinis notæ, sed huiusce plenitudinis. Quædam verò nullius quidem plenitudinis, sed humorū potius pravitatis & corruptionis sunt signa, aut virium imbecillium, aut tumoris solidorū corporū. Ergo affectio tensiva, nisi exercitationis sit comes, plurimam omnino substantiā in corpore quod sensu præditū est, contineri insinuat: nō tamen qualis sit ipsa substantia, ostendit: nisi alia etiam indicia accedant. Actionū verò imbecillitas, vires invalidiores ostendit: * quod movens causa impeditur: quemadmodum accidit in languidiori manuum motione: id quod plures constitutiones consequi potest. Nam si in aliquo carneū ac adiposum particularū genus, viribus tamē eosdem fines servantibus, adaugeatur, necesse fuerit motiones imbecilliores fieri, moto nimirum aucto, movente verò æquali permanente. Sed si aut unus quispiam ex humoribus, aut omnes etiam simul excrescunt, nec vires alioquin simul unā augeantur, sic quoq; necesse erit actiones invalidas reddi: nec secus si humores simul & effusiones creverint, nullo autem in viribus incremento facto: quemadmodū & si pares illi, se habuerint, vi-

res verò imbecilliores evadant. Fieri etiā potest, ut & dematur de viriū robore, & humores unā cum parenchymate, seu transfusione (quæ impræsentiarū molē carnis, pinguitudinisq; significat) vel plures fiant, vel pauciores. Horum itaq; utrumvis eveniat, necessariò evadent * functiones imbecilliores. * Arbitrari autē quādiu solida corpora optimè nutricātur, posse nonnunquam edi imbecilliorē motum, hominū planè est minime perpendentiū, facultates p universa solidiora corpora permeare: sed perinde ac fistulas, aut canales quosdā, sic spiritui venas & arterias constituentiū. Hallucinantur etiam, qui inter plethorica indicia, corporis tumorem reponunt: quippe venarū tumor poterit forsan esse plethoricū signum, inseparabileq; ubi corpus ita se habuerit, ut neq; interna externis, neq; hæc illis caleant magis, nec præterea calor immodicus universum corpus detineat. Carnis autē & adipis moles, eorund multitudinē indicabit: non tamen plethoricæ plenitudinis quæ desiderat evacuationem, signum existet. Cum autē syncerus sanguis nunq̃ ita reperiatur in venis, quin illi aliquid aut bilis, aut pituitæ, aut serosi excrementi permistum sit: perinde sanè erit dicere, sanguinem ipsum augeri, ac si etiā humores dixeris. Venarū itaq; tumor, sanguinis plenitudinē indicat, si tamen is à nulla gignatur externa constitutione prorsus invalescente, aut ex fusione, aut ex ebullitione. Cavendum præterea erit, ne particula illa declivis fuerit, nè paulò antè cæteris vehementius mota. In summa verò, plenitudo à venarum tumore indicabitur, si omnes corporis partes eandem constitutionē servarint, idq; cum mediocri calore. Cæterum tum tumor ipse, tum tensio, cum à singulis humoribus, necnon à flatu excitari possint, plenitudinis quantitatem, potius quàm specificas differentias declarant. Sive igitur sanguis eò incrementi pervenerit, ut citra tunicarū tensionē, naturæ modum excedat, corporiq; gravis videatur: sive ita sit auctus, ut vasa continentia distendat: utrunq; certè & multū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundū vires, hæc penes vasa vocetur. Jam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calore, nec ex ira verecundiæve, neque ex alia deniq; occasione extrinseca oriatur, sed unde quaq; corpus æqualiter fuerit affectū, sanguineæ plenitudinis nobis indicium existit. Omnem autem plenitudinē quæ in venis congesta est, facile motus arteriarū ostendit, ob mutuam vasorum confluentiam: nisi ubi humores cōtenti in venis, q̃ maximè sunt crassi & tenaces. Plenitudinis autem species, ubi in universum illa corpus dispergitur, his notis sunt distinguendæ. Rubor plenitudini sanguineæ attestatur: color verò sup pallidus, flavæ bili. Cum autē pituita nimis excreverit, in album magisq̃ pro naturæ modo, color ipse mutatur: quemadmodū in atrū, si bilis atra. Opus tamen est, ut cum singulis horum humorum simul sanguis augeatur: alioq nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda veniet. Cæterū si gravitas vel tumor præter naturæ modum accesserit, affectio talis, plethora appellabitur: ipsiusq; humoris vincentis species, ex colore

Tendi possunt particulae quæ is substantia humida & flatulenta.

Mordicantium humorum quatuor, secundū magis & minus differentia habentur. Acres humores particulis exulceratis admoti, horrore atq; rigorem excitant.

Ulcerosus sensus neutrius plenitudinis est propria nota. Symptomatum differentia varia.

Tensivus affectus quid indicet.

Actionis languor, vires invalidiores ostendit.

Facile per u sa for corpo meau

Tum corp omne signa thori

Vena mor q sang plen indic

Pleni cund Pleni cund Rubor tus, sa nis ple nemi Arteri motus rum p dinem cat

Pleni species noris j sangu

Cacochy quid.

nituidini
petno a-
se tumore
pondus.
mita in
ncophle-
matia dun-
cat solet
univēsu
pus exube-
re.
uita spe-
s diversa,
nūq; usus
facultates
nor unde.
iliarum
sa.
elancholi-
unt diffici-
es prater
nem ratio-
nē tristes.
uita in
Sentris
lecta, appe-
tia facit.
is utrius-
e facultas
elancholi-
e succus.
alsum dif-
fentia pro-
rietate hu-
rum ex-
erantium.
anguinis
imperies a
versis va-
atur.

lore dijudicabitur. Sola tamen bilis nec tumo-
rem, nec pondus (quæ à plenitudine seungi ne-
queunt) inferre potest. Nam anteq̃ ita ea incre-
scat, alia illi superventura est affectio. At si sola
pituita augeatur (inter cuius species annumenta-
tur humor qui crudus dicitur, fabamq; imitatur
elixam, q̃ alia pituita, crassior, ac minus flatulen-
tus existens) duntaxat in levophlegmatia solet
per universum corpus exuberare. Sunt enim &
alia pituitæ species: dulcis nempe, acida & salsa.
Verū ex dulci fiunt somnolenti, ex acida cum re-
dundat, famelici: quemadmodū siticulosi, ex sal-
sa. A cruda autē, dejicitur appetentia, somnolen-
tiq; etiam fiunt. Siquidem si humescat, refrigere-
turq; cerebrum, quod est sentiendi principiu, sta-
tim soporosa affectio oboritur: quemadmodū si
siccescat, atq; incalescat, in vigilias illabitur. Pro-
inde omnes qui utraq; bile redundant, insom-
nes degunt. Id tamen peculiare habent, qui atra
bile cruciatur, quod difficiles sunt, atq; præter o-
mnem rationē tristes. Vigiliæ itaq; & somni cau-
sa, in cerebro ipso cōsistit: appetentiæ autē & il-
lius defectus, ad os ventriculi pertinet. In quo
quidem si colligat pituita, appetitiones excitat:
si flava bilis, tum sitim, tum cibi fastidiū pariet,
osq; fiet amarulentum. At si atra, morosi, tristes
atq; formidabiles fiunt, & sine siti: salivaq; plu-
rimū illis scatet: atq; nōnulli eorum satis videtur
famelici, in quibus nimirū atra bilis, acida quali-
tate fuerit affecta: id quod sanè cōtingit, ubi ipsa
malignior est reddita. Porro ubi ea veluti fæx
sanguinis permanet, neq; exacte est acida, satius
fuerit illam appellare melancholicū succum: nō
autem melancholiā, sive atra bilem. Quod ve-
rō ad pulsus pertinet, si in plenitudine flava bilis
redundet, tales necesse est reddi pulsus, qualis ubi
cor calfit simul & exiccat. Si atra bilis, quales
quum frigesceat & exiccatur. Si pituita, quales
edi solent in humida frigidaq; cōstitutione. Ubi
verō sanguinis se omnino secundum naturā ha-
buerit, nulla fiet in pulsu ab antiquo statu muta-
tio: alterantur autem, secundum ipsius sanguinis
mutationē. At verō ex ocio & humido victu san-
guis humidior seipso redditur: ex ira autem, ex-
ercitatione, æstu, frictione, medicamento alimen-
toq; calfacientibus, necnō meraciori antiquiorq;
vino, calidior efficitur: quemadmodū frigidior,
ex recenti frigore. Quod si quispiam alimentis
temperaturæ siccioris diutius utatur, quæ tamē
alia nulla intemperie teneantur, sanguis siccior
evadet. Sed secundum etiam varias complica-
tiones causarum, in diversas incidet sanguis cō-
positas intemperies: idq; citra miscellam aliam
in eo superantis humoris. Quod si ob aliorum
quoq; humorū misturam illabatur in intempe-
riem, certè absq; cacochymia cōstare talis dyscra-
sia nō poterit: alias tamen octo differentias for-
tietur, sed diverso modo, quā ubi ille solus &
per se fuerit talis. Verū an intemperies ad so-
lum pertineat sanguinem, an ad aliquem alium
illi humorē permistum, ex iis quæ diximus, & ex
aliis multis signis, facile deprehendi potest. Fin-
gamus igitur homini qui febre est vacuus, ve-
nas in tumore attolli, ac totum corpus rubicun-
dus evadere. Statim enim est expendendū, num

& causæ aliquæ occurrerint, ex illis quæ vim ca-
lesfaciendi habent: & si hoc fortè videatur, præsti-
terit huiusce rei dignotionem tantisper differre,
donec motio ab illis in corpore universo excita-
ta cōquieverit. Tunc autē, si qualem diximus, ta-
lis appareat, sanguinē sanè in eo abundare, indi-
cium erit. Mox verō gravitatē, tensionem, pigri-
tiam ad motum, pulsus, vigiliam, somnū, appe-
tentia, fastidiū, præcedentēq; vitæ rationē, ex-
pedit revocare ad examen, expēdereq; an aliqua
excretio solita, illi suppressa sit, aut exercitatio
neglecta: & an alimētis pluribus, aut plurimi nu-
trimenti sit usus: vel si post cibum se præter mō-
rem laverit: solutusq; sit plethoricis morbis cor-
ripi. Quibus addenda est temporis & regionis
cōsideratio. Nam hyeme & vere, locisq; tum fri-
gidis, tum temperatis, major colligitur plenitu-
do: minor verō locis & temporibus calidis atq;
siccis. Sic etiam qui densa sunt cuti, frequentius
plenitudinem colligunt: sicuti rarius, qui rara.

Plenitudo
maior colligi-
tur hyeme
& vere.

GALENI PERGAMENI

de atra bile, liber unus.



Anguis (qui humor omnibus ho-
minibus est notissimus) ubi vel ar-
teria, vel vena fuerit convulnera-
ta, ilico effundi videtur: rubens sa-
nè magis è venis, flavior autē ex ar-
teriis manans. Undecunq; autē exeat, subito con-
crescit in grumū: idq; nō solum extra corpus, sed
intra illud etiā, in quovis ipsius loco præter na-
turā cōtentus. Igitur magna ex parte in hoc hu-
more rubeus color exuperat: & talis exacte opti-
mus sanguis existit. Apparet autē nonnūq; hoc
ipso flavior & nigrior: sicuti etiam ex cōsistentia
crassior atq; tenuior. Quin & videtur quandoq;
in cōcreto sanguine tenuis quædam humiditas,
contracta à potu, innatare. Interdū & pituitosus
humor cum sanguine per venas defertur. Cæte-
rum hæ differentię humorū nō mutant sangui-
nis appellationē. Est & alius quidam humor san-
guini crasso & nigro persimilis, qui tum per vo-
mitum, tum per dejectionē excernitur: nō tamē,
etsi diutius aëri ambienti expositus fuerit, omni-
no densatur. Atq; hic ipse humor aliquādo à vo-
mentibus acidus simul & acerbus sentitur: quā-
doq; verō nullam qualitatem manifestam præ se fe-
fert. Cum autē sanguis majori ex parte dulcis es-
se videat: pituita autē insipida, veluti aqua: certè
si quando hi humores sentiatur salsi, morbofi e-
runt. Evadit autē interdum ipsa pituita dulcis.
Porro pituita omnis esse debet colore albo, mi-
nimēq; cōcrescere. Est & alius humor, qui dum
vomitur, semper amarus apparet: nō semper ta-
men flavus, sed quādoq; pallidus. At semper qui
flavus est, pallido crassior videtur. Jam verō, ut
flava bilis tenui serosaq; humiditati cōmixta, &
pallidior, & aquosior evadit: sic ubi resolvit plu-
rimū, vitellis crudorū ovorū apparet similis: ob
idq; vitellina appellat. Igitur hæc bilis, sive palli-
da sit, sive flava, sive vitellina, in vasis habet suā
generationē. At in ventriculo quædā alia gignit-
bilis, quæ porri colorē refert: alia quæ ab ærugi-
nis similitudine, æruginosa vocat: alia, quæ isati-
dis imitatur colorē. Quibus omnib. est cōmune,

Sanguis ex-
tra sua vasa,
subito in gra-
mum concre-
scit.

Serum san-
guinis.

Atra bilis.

Salso humi-
des esse morbi-
ficos.

Pituita om-
nis esse debet
colore albo,
minimēq; cō-
crescere.

Flava bilis
species.

Bilis porri co-
lorem refe-
rens, in ven-
triculo gigni-
tur.
Bilis ærugi-
nosa.

*Nigra excre-
menta quo-
modo ab a-
tra differant
bile.*

*Atra bilis
est acida, ter-
ramq; fer-
mentat.*

*Atra bilis
differt crass;
sic ab aceto.*

*Atra bilis
curexcedat,
corrodaturq;*

*Atram bile
gustare nul-
lum animal
sustinet.*

*Mare mor-
tuum nullū
in se piscem
alit.*

*Atra bilis
qua flava
praefata
oritur, est o-
mnium per-
niciosissima.*

*Atra bilis
semper ad
perniciem ex-
carnitur.*

*Sanguis ni-
ger quibus se-
cta vena va-
cuetur.*

*Melancholi-
cum succum
gignentia.*

*Tumores ab
atra bile.*

*Carbuncu-
lus.*

*Elephantia-
sis.*

*Cancer.
Cancer exul-
ceratus.*

Hæmorrhoidis.

Varices.

ut quales sunt, tales permaneant. Ut verò ad a-
tram bilem redeamus, ea, quia non concrevit, à
sanguine nigro distinguitur: nō tamē ab iis quæ
propriè excrementa nigra appellantur, eo nomine
differt. Hæc siquidem, cum talia sæpius vomantur
ac deiciantur, ab atra bile quæ plurimū & facul-
tate & qualitatibus differunt. Nam neq; acerbum
saporem, neq; acidum manifestè participat: cū
atra bilis tum gustui, tum olfactui talis esse vi-
deatur. Ad hæc, excrementa nigra minimè terrā
fermentant, ut atra bilis. Quæ quidem * hac in
re cū sit aceto quæ acerrimo similis, partiū tamē
crassitie ab eo quæ maximè dissidet. Quamobrem,
quibus corporis partibus pura & impermixta
adhæret, eas exedendo exulcerat. Acetū etenim
quod tenuium sit partiū, permeat: at bilis atræ
crassities, cū illi sedem firmam exhibeat, corro-
sionis fit causa. Taceo quòd nullū animal atram
bilem gustare sustinet: sicuti nec meram falsugi-
nem, in qua nullū animal degere potest. Cujus
rei mare mortuū firmum indicium præbet. Perni-
ciosa itaq; illius generatio censetur, cū ex hu-
more atro supra modum affato cōtingat. Cæte-
rū ea bilis atra, quæ ex flava bile immodicè af-
fata ortum habet, tantò hac perniciosior est æsti-
manda, quātò flava bilis efficacior est sanguinis
sedimento, quod amurcæ aut facis instar gene-
rari est prodictum. Igitur ut exactæ bilis atræ hu-
more semper excerni ad perniciem animadver-
ti, sic eorum quæ nigra appellatur evacuationē
nō rarò salubrem extitisse cōperi. Porro sanguis
qui vena secta mittitur, nigrior esse videtur in sic-
cis calidisq; temperamentis corporū: sicut & in
hujuscemodi anni temporibus, & regionibus,
constitutionibus, vitæ studiis, victus ratione, ac
deniq; cibis crassis & siccis: quales sunt, lens, co-
chleæ, & carnes taurinæ hircinæq; præsertim sa-
le asservatæ. Consimilis etiam naturæ est vinum
nigrum, crassūq; & austerū. Pari etiā ratione,
quæcūq; ægri tudines fiunt ex calida siccaq; in-
temperie, cujusmodi sunt febres ardentes, cras-
sum & nigrum sanguinē gignunt. Ubi igitur per
febres ardentes melancholicus humor in cutim
ipsam propellitur, carbunculus appellatus pro-
ducitur. Si verò ad eam, citra febrim, decumbat,
fueritq; permixtus sanguini, elephantem gigne-
re est aptus. Sin autē solus existat, ab initio qui-
dem nigrū tumorē gignit, qui procedente tem-
pore terminatur in cancerum. Rursus, ubi acrior
& cōtumacior hic humor fuerit, cancerum exul-
ceratum: ubi autem mitior, latentem & citra ul-
cus producit. Quippe omnes huiusmodi affe-
ctus, & præsertim cancer, ab humore melanco-
lico oriuntur: cæterū ut à calidiori carbunculus,
ita ab eo qui minus calidus est, oriri cancer con-
suevit. At ubi is humor niger, qualitates obtine-
rit mitiores, nimirum permixtus sanguini, subru-
beos elephantos progignit: qui tamen processu
temporis longè nigriores evadunt. Sæpius autē
natura, vasorum quæ ad sedem sunt, referans ve-
nam, huiusmodi humorem excernit commixtū
sanguini: ob idq; excretio ipsa hæmorrhoidis ap-
pellatur. Sæpenumero etiā eundem humorem ad
crurium venas transmittit, à quo dilatata & di-
stenta, varicosæ redduntur, & cutis quæ huius-

scemodi venas attingit, temporis processu ni-
grescit. Quòd si venas illas turgentes melanco-
lico humore quis molietur excidere, periculū
imminet, ne homo corripiatur melancholia: id
quod fieri sæpius est visum, nō in varicibus mo-
do, verumetiā in hæmorrhoidibus, quæ ex hu-
iusmodi humore consistunt. Quod igitur in ve-
nis & arteriis humores omnes unā cum sangui-
ne cōtinentur, ostendit ipsius varietas, tum in co-
lore, tum in consistentia: id quod etiā ex iis quæ
diximus, & quæ in libro de Natura humana, ab
Hippocrate prodita sunt, liquidò cōstat. Qui hu-
mores quandiu temperamenti obtinuerint me-
diocritatē, animal erit sanum: ægrotabit autē, u-
bi vel in omnibus vasis, vel in parte aliqua, eorū
aliquis à naturæ modo recesserit. Rationi autem
est consentaneum, similes affectus oriri in parti-
bus quæ profundo in corpore delitescunt, iis qui
in cute consistunt. Cū itaq; flava quidem bilis
in unam quampiam decumbens partem, gene-
ret erysipelas: atra verò, carbunculum atq; can-
crum: mirū sanè esse nō debet, si utraq; in intesti-
na descendens (quandoquidem internæ partes
non sortiuntur constitutionē adamantinā) alias
aliud ipsorum erodant, ac nonnunq; prorsus in-
sanabilem dysenteriam efficiant. Omnes siquidē
exulcerationes ab atra bile sunt insanabiles, nisi
quis curationē appellet, ubi affecta pars tota cir-
cunquaq; ad partem sanam usq; dissecta, abscin-
datur. Quemadmodū igitur intestina citra alicu-
jus auxilij spem ulcerantur ab atra bile: à flava au-
tem difficulter curationem admittunt: sic in pro-
fundo sitis accidit cæteris partibus, atq; iis præ-
cipuè, quæ intestinis sunt nobiliores. Adde quod
intestinorū curatio facilius est, eò quòd medica-
menta quæ injiciuntur per sedem, statim locis affe-
ctis occurrunt: quod sanè in cæteris partibus fieri
facile nequit. Porro lien malè affectus, vel ex in-
flammatione, vel scirrho, vel imbecillitate, ad ni-
grius cōversus, colorē vitiosum in toto corpore
efficit. Quin & ipse semper jecore nigrior existit:
& præsertim in animalibus calidiorib; & siccio-
ribus, qualia sunt ferratos dentes habentia. Hoc
viscus etiā vel elixū, gustui quippiam acerbū re-
fert, ut jecori nihil simile appareat. Unde liquet
jecur expurgari à liene: qui nimirū attrahit quic-
quid in ipso sanguine faculentum existit: quale
utique est fæx in vino, & in oleo amurca. Ex hoc
verò quòd medicamenta flavā bilem trahentia,
auxiliantur eis qui regio morbo laborant: quæ
autem aquam educunt, hydropes aseitas eva-
cuant: sicuti & quæ nigra expurgant, elephantos &
cancros augeri prohibent: in confesso est etiā, u-
numquodq; purgantium medicamentorū familia-
rem sibi humorem attrahere. Ut autē ad lienem re-
vertar: quandoquidē unāquāq; corporis partē
proprius alit humor: animalium verò ferratos ha-
bentium dentes lien acerbam acidamq; exhibet
qualitatē: manifestū est, humorem qui illū nutrit,
talem etiā existere: non igitur erit aliam particu-
lam excogitare, quæ melancholico humori exci-
piendo sit destinata. Jam verò, per quas venas à
ventriculo in hepar alimentū suggerit, per easdē
à toto corpore in illum etiā humor demittitur
tum in purgationibus quas moluntur medica-
menta,

*Varices
morror
que si qu
hibere
tur, per
est ne ho
corripia
melanch*

*Erysipe
Carbun
Cancer*

*Dysente
Exulcer
omnis a
tra bile
sanabili*

*Intestin
curatio
facilius
quā a
interna*

*particu
Lien m
affectum
rem totu
corporu
iat.*

*Lien eli
gustui q
pram ac
refere
Hepar
ne expu
tur.*

*Purgam
medicam
torum su
la sibi fa
liares sa
attrahem*

*Lienem
triri ab
do humo
quem ven
Ventricu
demitti
quando*

*mores per
dem Gen
per quas
suggeri a
mentum*

pati.

menta, tum in iis quas natura in morborum crisi-
bus efficit. Quinetiam in rectè valentibus, non-
nunq̃ optimus sanguis ad ventriculum cōmeat,
ipsū videlicet nutriturus: id quod in longis ine-
diis accidit. Porro cum natura quæ fœtū format
& auget, prægnationis tempore optimū sangui-
nem attrahat, in venis relinquitur vitiosissimus,
qui post partū tandem excernitur: quemadmo-
dum singulis mensibus, qui nō solum quantita-
te, sed qualitate etiam superfluous atq; inutilis est.
At pituitosus humor, ex pituitosis cibariis, in pri-
ma cōcoctione, quæ in ventriculo fit, generatio-
nem obtinet: veluti biliosus melancholicusq; in
jecore. In cuius quidem coctione pituitosus hu-
mor etiam in sanguinem vertitur. Quam ob cau-
sam nullum ipsi proprium instrumentum moli-
ta est natura, ad sanguinis expurgationē, quem-
admodum est utraq; vesica & lien. Siquidem hæ
sanguinē à bilioso humore & seroso expurgant:
lien verò à melancholico humore. Itaq; pituito-
sus humor, qui in ventriculo gignitur, cum de-
feratur in jecur simul cum humoribus genitis ex
comestis & bibitis, unā cum illis concoquitur,
in sanguinemq; mutatur. In universum igitur, om-
nes qui ab humore melancholico proveniunt
affectus, statim inter initia medicamētis eum hu-
morem vacuantibus validè purgans, quo minus
augeantur prohibebis, usque etiam ad caneros.
Nō est autē eadem bilis atra in iis qui integra sa-
nitate fruuntur, & in nōnullis eorū, qui olim na-
turalem habitū sunt egressi. Porro medicamen-
ta singula propriū quendam similemq; sibi suc-
cum eliciunt: nō autem in naturam suam corpo-
ris humores permutant. Nam si medicamenta
morbo regio laborantibus propinaveris: quæ
verò bilem educunt, his qui infestantur aqua in-
ter cutim: quam minimum propriū humoris vi-
debis utrobique vacuari: atq; inde non solum ni-
hil juveris ægrotantes, verum etiam quam maxi-
mè læseris: haud aliter, quā si ipsis venas inci-
deres. Adverte autem columbas, atque alia ani-
malia pleraque, destituta esse vesica fellis.

GALENI PERGAMENI

de tumoribus præter naturam,
liber unus.

Inter ea corpora quæ naturaliter, &
quæ præter naturā se habent, tertia
quædā est constitutio eorū corpo-
rum, quæ nō secundū naturā affe-
cta sunt. Siquidem qui crassior vel
gracilior est factus, non adhuc naturalis habitus
fines egreditur: sed tantū alter supra naturā mo-
dum, alter verò infra invenitur: uterq; autē secun-
dum naturā est minimè affectus: quanq̃ certē ho-
rum affectuū nō naturalū, excessus quidē, præ-
ter naturā exsistunt: terminus autem eorū exces-
suus, est actionis oblatio. At qui tumore ex a-
qua inter cutem contraxit, & qui ex tabe evasit
gracilior, præter naturā sanè uterq; est affectus.
Igitur in præsentī libro, de tumoribus præter na-
turam, qui tum corpus universum, tum qualibet
illius partē occupant, nobis differere est animus,
sumpto à phlegmōne initio. Phlegmone dicitur
tumor carnosarum particularū, ubi cum tensio-

ne, renitentiaq; , necnon dolore pulsati & cali-
do, ruboreq; , majorem sibi tumore contrahunt.
Ex quibus quidem signis sanguinem redundare
in inflammatione ipsa, existimandū est. Cuius sa-
nè defluxus, priusquā sit impactus, facillimè his
quis refrigerat atq; astringūt, repellit, præsertim
si tumor fuerit exiguus. Ubi autē fluxio impacta
jam tenaciter hæserit, nullum ab astringentibus
& refrigerantibus auxilium admittit: indiget au-
tem vacuari. Jam verò par phlegmone obsessa,
nō statim ab initio fit immodicè calida, sed pro-
cedente tempore, pristina nimirū perspiratione
impedita, ex obstructione omnium meatuum. Idcir-
co si inibi sanguis diu immoretur, necessum est
ut omnino putrescat. Siquidem omnia corpora
simul calida & humida, in calidum locū coacta,
putrescunt promptè, si nec evacuentur, neq; re-
frigerentur. Quare & quæ ex ipsius putredine ca-
lidas nascitur, ei supervenit, quam antè habe-
bat. In universum autē, nihil in inflammata par-
ticula permanere potest exactè secundum natu-
ram se habens, inflammatione perseverante diu-
tius: sed omnia simul cum carne, cutis videlicet,
nervi, tendones, membranæ, atq; vasorum tunica
fluxionē ipsam suscipiunt. Quare & ossa interdū
fluxio ipsa invadit: sicuti & ab ipsis primò affe-
ctis, nōnunq̃ oritur: quemadmodū etiam à ner-
vis, ubi scilicet vulnerant. Cutis igitur, ubi secun-
dum naturā se habet, laxa est, in iis qui crassi nō
admodum sunt: & locus medius, cui ipsa incum-
bit, existit vacuus: nec secus ea quæ in carne sunt
spacia, cōspiciuntur inania. Omnia autē hæc per
inflammationes replentur sanguine, ex vasis qui-
dem per eorum tunicas resudante: in quacunq;
aut carnis particula, ad modum rosis permisto.
Ubi verò procedente tempore vicerit quidē na-
tura: fluxio autē omnis concocta fuerit, ac geni-
tum: pus extra carnē id pellitur à facultate, quæ
in eo est, expultrice. Quod si vel meatus natura-
lis conspicuus sit, vel locus rarus existat, pus sa-
nè partim perspirat, partim sensibilibiter effluit. At
si incumbens cutis densa duraq; extiterit, ibi pus
detinetur, atq; eam à subjecta ipsi carne dirimit:
deinceps & sui acrimonia corrodit, & foras egre-
ditur, nisi quis eam prævertat scarificare. Cæte-
rum natura à fluxione victa nō amplius ad pus,
sed ad alienam quampiam mutationē, aliās di-
versam, perficitur sanguis. Porro dum pus cor-
pora excoriat, continentiaq; à subjectis diducit:
ac deinceps eo utcūq; vacuato, quæ dissident in-
ter se, pristina constitutionē nequeūt recupera-
re, is affectus vocat sinus. Qui nimirū nisi q̃ce-
lerrimè percuretur, callum contrahit, proceden-
teque tempore durus evadit, nec amplius subje-
ctis ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur
tamen medicamentis, & victus ratione exiccat,
ita ut particula integrè esse sana videatur. Nō so-
lū tamen ex inflammatione gignuntur absces-
sus, hoc est, diductiones particularum: sed & sta-
tim à principio interdū proveniunt, propter hu-
morem aliquē, qui temporis processu excoriet,
atq; à cōgentis cōtinentia dispescat. Proinde & in
cisi omnimodam speciē humidorū ac solidorū
corporum intus habere apparent: & non raro
etiam animantia in ipsis reperta sunt, omnibus

Phlegmones
curatio.

Putrescere
calida & hu-
mida ubi in
calidum lo-
cum impa-
cta, nec va-
cuantur, nec
refrigeran-
tur.

Ossa interdū
fluxionem i-
psa suscipere

Phlegmonis
generatio.

Abscessus
quomodo
fiant.

Sinus quid.

Animalcula
interdum re-
periuntur in ab-
cessibus.

Fistula quid. fistula, sinus est angustus & longus, aliis sinibus similis: quæ sanè astringit, & rursum diducitur etià ob excrementorū effluxum. Jam in atheromatis reperitur quiddam pulti consimile: in meliceridibus, mellis: ut sevo, in steatomatis. Plerumque autem quædam tunica membranosa singula hæc continet. At gangræna carbunculi; excitantur, cum sanguis tanquam fervens & inflammationi propinquus, exurit cutim. Proinde & cum crusta fiunt, & bullæ ulcus præcedunt, quemadmodum in ambustis. Quin & acutissima febrem inferunt, atque in discrimen vitam trahunt. Nigra autem prorsus, ac cinerulenta, apparet crusta carbunculorū ulceris: nec tamen inflammationis circumstantis color, sicuti in aliis, ruber cōspicitur: sed ad nigrius vergit, alio sanè modo, quam in suggillatis, vel à gelu perfrigeratis. Non enim vehementer livet, veluti in illis, tumor: verū habet quippiam splendidum, quemadmodū bitumen Judaicum. Hujusmodi siquidem exquisita atrabilis: unde & malignitas ulcerum quæ in carbunculis sunt, accidit. Siquidē sanguis, vel statim ab initio, vel in ipso fervore superassatus, melancholicus fieri videtur. Verū citra fervorem atrabilis caneros constituit: atque eos cum ulcere, ubi acriorem illam esse contigerit. Quamobrem & nigriores sunt colore omnibus quæ inflammatione infestantur, & minus calidi. Venæ autē in his replentur & tenduntur magis, quā in ipsis inflammationibus. Ad hæc gangræna maximis succedit inflammationibus: quæ sanè mortificatio quædam affectæ partis existit: & nisi curetur celerrimè, usque adeo pars affecta extrahescit, ut invadat alias cōtinuas, atque sic hominē perimat. Porro in naturali statu, insensibilis nobis est arteriarū motus: in inflammationibus autē, is cum dolore sentitur. Arteria siquidem dum dilatatur, corpora circumjacentis percutit: atque ex eorū plaga ob inflammationē dolemus. Quod si arteriæ tunica inflammatione urgeatur, tunc ratione percutientis simul & percussæ, geminatur dolor. Si fluxio biliosa in aliquam partē decumbat, idque ab exquisita bile profecta, cutē exulcerat: si verò sanies aquosas, vel etiam sanguinē habeat, minus erit acris, sed particula magis in tumore attollit, quā exulceret. Hoc igitur erysipelas nominatur, alterum verò herpes. Humor autem à quo unumquodque horum gignitur, tum ex colore, tum ex caliditate partis affectæ, facile dignoscetur. Rursum, cum fluxio acris, hæc quidem minus, hæc verò magis, talis existat: sciendum est, ab acriori fieri herpetē exedentem, ab altera verò miliarem. Atque hæc sanè fluxio pituitam habere mistam mihi planè videtur: ut illa proficisci à meracissima bile: quare & cum erosione oritur, affectu semper proximam invadentē cutem. Verū si ex æquo sanguis & bilis cōmixta fuerint, hujus affectus forma & natura, in medio erysipelatis & inflammationis consistet. Quod si alter ex humoribus longè exuperet, ab exuperante affectus nomē sortietur, cum adjectione tamen humoris admisti. Dicitur itaque erysipelas inflammationis particeps, flava bile superante: inflammatio verò erysipelatosa, vincente sanguine. Similis quoque erit aliarū mi-

stionum interpretatio. Quatuor enim sunt affectiones, quæ assidue ex humorū fluxione oriuntur: erysipelas, œdema, inflammatio, & scirrhus. Erysipelas igitur, ut dictum est, biliosa fluxione exuperante oritur: inflammatio, sanguinea: œdema verò, tenui pituita: quemadmodum & crassa & lenta, altera quædam scirrhorum species consistit: namque altera sæx sanguinis efficit: quæ ipsa rursus sanguinis sæx, est duplex: altera enim speciem Hippocrates nigram nominat: altera verò & ipsa quidem est nigra, propriè tamen atra bilis vocatur. Istius itaque, cancri soboles sunt: alterius verò nigra, una quædam scirrhorū species: quæ sanè ab altera quæ ex pituita consistit, colore distinguitur. Atque utrisque cōmunia sunt, major quam sit pro naturæ ratione tumor, tum dolore vacans, tum durus: & quod utraq; species quandoque ab initio gignatur, quandoque ex permutatione alicuius tumoris immoderatus refrigerati. Scirrhis propinqua sunt tum ecchymomata, hoc est transfusiones, tum melasmata, sive denigrationes. Qui affectus fiunt sanguine ex ipsis venis effusio, nunc tunicis earū contusis, nunc ipsarū finibus refferatis. Quod si arteria ad aperta fuerit, affectus hic aneurisma vocatur. Fit autē, ea vulnerata, cum ad cicatricē superposita cutis devenit, arteriæ verò ulcus permanserit, ipsa nequaquam cōglutinata, neque ad cicatricē perducta, neque carne obturata. Cæterū tumor ille compressus digito cedit. Cum igitur sanguis quem arteriæ continent, tenuis & flavus existat, ac præterea mistus subtili spiritui & multo, proindeque sit etiam calidior eo qui continetur in venis, adeo sanè is effluit, ubi vulnerat arteria, ut ægrè supprimi possit. Cedit etiam in œdimatibus materia prementibus digitis, & pars ipsa foveæ modo excavatur. At in hoc affectu pulsus non adest, ut percipitur in aneurismate: & color albicantior existit. Ad hæc œdema longè latius & majus est aneurismate: nisi quando grumus adnatus, coalitus ex aneurismate, sphacelum, hoc est, syderationē efficiat. Sic enim universam solidorū corporū corruptionem appello, ita ut ossibus quoque insit. Gangræna autem, solidorū corporum mortificatio est & ipsa, verū ossa nequaquam corripit, maximasque sequitur inflammationes. Repetendum autē rursus hoc est: atram bilem, si quidem mordax decubuerit in carnē, circumpositam cutē exulcerare: si verò mitior extiterit, caneros citra ulcus inducere. Jam verò, qui affectus ex ulcere & tumore circumambiente constat, phagedæna vocatur. Depascitur etià & herpes circumvicinas partes: solius tamen cutis exulceratio existit: phagedæna verò, una cum cutē, attingit etiam subjecta, quæ ulcera omnia, cacoëthe, hoc est, maligna vocantur. Porro scabies & lepra, melancholici affectus, ad solam cutē spectant: quemadmodū si in solis venis & carne fiant, nomē obtinent cancri. Præterea elephas affectus melancholicus est, à sanguine quidem melancholico primam habens generationē: tempore verò procedente, atra bilis copia sanguinē ipsum exuperat: quo tempore corpus jam & graviter olet, turpeque & deformatum videtur, atque interdū etiam exulceratur. Jam putendorum tensiones præter naturam, quæ non desistunt,

Oedema.

Scirrhorum.

Species duæ.

Facis sanguinea duplex.

Species.

Ecchymomata.

Melasmata.

Aneurisma.

Arteriæ sanguis.

Ipsa existit.

Oedema modo ab aneurismate differat.

Sphacelum.

Syderatum.

Gangræna.

Phagedæna.

Herpes depascens.

Cacoëthe.

Ulcerata.

Scabies.

Lepra.

Cancer.

Elephas.

refrigeratū esse, & videri, idem esse fatearis. Motus præterea in rigentibus, involuntarius omnino est: in tremantibus autem non absq; imperio voluntatis consistit. Porro ut motus aliquis dici rigor mereatur, opus est ut cum refrigeratione sensibili, inæqualis involuntariusq; totius corporis motus accedat. Quæ sanè quassatio, si in nonnullis accessibus solam superficiem concutiat, nec universum corpus commoveat, is affectus horror vocatur. Horror itaq; talis duntaxat cutis, qualis universi corporis rigor, affectus est. Cæterū impræsentiarū nō de rigore aut horrore qui sana corpora infestāt, sed de illo qui ægris solet supervenire, disputare consilium est. Igitur morbosus rigor secundum Hippocratis dogma, refrigeratio quædam est dolorifica, cum inæquali totius corporis concussione. At verò rigore affici, innati calidi affectū esse omnibus ferè in confesso est. Verumenimverò calidum hoc innatū, minimè gigni motu aut frictione arbitramur, sed corpus omni ex parte conspirabile, conflatileq; esse contendimus: calidum autem ipsum nō adventitiū, nec animalis generatione posterius, sed primariū, primordiale, insitumq; putamus. Natura itaq;, anima; nihil aliud quàm calidū est. Quocirca si hoc spontè semperq; mobile esse cognoveris, errare minimè poteris. Quia igitur ratione is calor semper existit mobilis, ea nimirum nec intus solū, nec foras movetur, sed alter ipsius motus succedit alteri: citò enim immobilem ipsum redderet intus statio: foris autè, quies eum dissiparet. Nam calidū moderatè extinctū, fursusq; moderatè accensum (ur ait Heraclitus) semper mobile remanet. Accenditur igitur, ubi appetens nutrimentū versus centrū inclinatur. Extinguitur autem, ubi foras & undequaq; dispergitur. Ac movetur quidem ipsum innatū calidū à suo principio foras, caliditatis ratione: intro verò, atq; ad propriū principium illabitur, quia etiam frigiditatis est particeps. Hoc si quidem calidum & mistum est, & ex calore frigoreq; ortū habet. At prima quidem calidi ratio spontaneā sui ipsius mobilitatem includit, hacq; ad operandum maximè eget. Nihilominus tamen magnū quoq; à frigore adjumentum accipit. Nam cum innatum calidum & elevare in altum, & secum alimentum rapere natum sit, certè si frigus lationem calidi non coerceret, penitus evanesceret, atq; dissiparetur. Porro animal tunc sanum existimatur, ubi temperamentū, naturæ ipsius limites non excedit: hoc est, cum calor frigufq; temperatura mediocri mutuò inter se miscentur. Si verò altera qualitas immodicè alteram superet, tunc animal laborare morbo, qui congruens sit naturæ causæ superantis, necesse est. Etenim in inflammationes, erysipelata, ulceraq; serpētia, nec nō carbones, omneq; tum impensè calidi, tum febriles affectus dum vis calidi dominatur, utique fiūt. At cōvulsiones & tetani, palpitationes, stupores, resolutiones, morbi comitiales, atq; ij affectus qui homines attonitos reddunt, facultate frigoris dominante oriuntur: inter quas affectiones rigorem enumeratur, qui refrigeratio simpliciter non est, sed tantū secundū sensum. Fuerit itaq; rigor innati calidi, vehemens, confertimq;

affligens, ac violenta secundum sensum refrigeratio. Jam verò quemadmodū quod in naturam haud latenter revertitur, est jucundum: ita quod à natura pari modo recedit, dolorificum fuerit. Quare unum idemq; frigus, aliàs quidem delectasse, aliàs verò tristitia affecisse credimus. Nam si frigus corpori extra modum calfacto, admotum fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suam naturā retinens, cōfertim abundeq; refrigeretur, dolebit utiq; & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimentū defectu innatū calidum obscuratur, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbecillitatem collabitur, rigorem fieri contingit: sed quoties ipsum validum existens, intenditur, ac dein coercetur, reprimiturq;: quod solet flamma ubi confertim aqua illi instillatur. Calor itaq; per rigores nec substantia nec robore læsus, ad universas corporis partes extendi feriq; properat: impeditus autè, versus principium propriè confurgit, inibi; permanere non valens (substantiæ enim semper mobili quies mors est) seipsumque congregans, ac veluti in spirā contrahens, æqualiter quidem, nō amplius tamen citra violentiā, extenditur. Ubi verò exiliens infestantibus reluctantibusq; rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq; impulsibus & conflictibus variis, tunc sanè corpus mira quassatione ob duplicem illum atq; inæqualem motū, haud citra dolorem cōcutitur, quādiu molestia adfuerint. Concussio igitur, quassatioq;, necnon omnium membrorū fremitus, omnisq; irregularis, inordinatus, involuntariusq; motus, ob caloris innati, factiq; jam vaporosi, inæquales, validos, violentosq; occurfus atq; resultationes, rigoris tempore perficiuntur. Quamobrè corpus in rigoribus rursus incalcescit exactiusq; cum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq; effunditur è corpore. Etenim ubi post multos conflictus molestia fuerint explosa, exacteq; jam perspiraverit corpus, tribus de causis id cal fieri est necesse: nempe quod calidum undiq; spiratione privatū, in profundo collectū fuerit: quodq; postea vehementer ad exteriora se extenderit: ac tertio denique, quod per occurfus illos, cōflictus, atq; violentos motus, natura calor reaccēditur. Itaq; sæpe in huiusmodi reditu de profundo calidū quasi ebulliens, cōfertim humidū quoddā effundit, quod sudorē vocamus. Ob idq; in rigore refrigerari, nec rursus cal fieri, pravū est, calidumq; succubuisse portendit. Est autè rigor indicium maximum exquisitæ tertianæ, quæ ab ingenti oritur ardore: catenusq; ab ardente continua deficit, quatenus in ea incendiū ipsum facit intermissio nem. Nam & sitis inexpugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis sincera vomitus, vomitufq; peracto quies (quæ omnia signa sunt caloris exuberantis) comitantur exquisitā tertianā. Febribus etiā ex ingenti ardore cōtinuis, solet rigor supervenire, easq; solvere. Præterea acre calidumq; medicamentū ulceri admotū, primò dolorem, mox horrorem, ac demum rigorem inducit. Inflammationi etiam in abcessum conversæ, rigorem horroremq; necessario accidere novimus. Ad hæc, res auditu visuq; formidabilis, interdum horrorem, rigoremq; inducit. Ex qui-

Jucundum quid. Dolorificum quid.

Rigor quando oboritur

Mobili substantiæ quies mors est.

Incalescit corpus à rigore vehementi, quàm antea, tribus de causis.

Rigentes non recal fieri, pravum indicium est. Tertiana quomodo ab ardente continua differt.

Rigor solet febres ardentes solvere.

Acria ulcera admotu, rigorem inferunt.

Rigor accidit inflammationi in abcessum conversæ.

Formidabilis inducunt horrorem, rigoremq;.

*Rigoris cau-
sa.*

bus uti liquet, non frigori duntaxat rigore tribuendum esse, cum ab aliis causis & præcipue ab acri & calido humore delato per sensibilia corpora, interdum proficiscatur. Cæterum neq; frigidum humore, neq; acrem, ad rigoris generationem simpliciter excellere, sed proprium modum ipsorum utriq; necessario inesse oportet. Modus autem fuerit aut copiam mensura, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in quo illum aggregari conveniat. In quiete quoq; motuq; at-

*Rigor fit ubi
flava bilis
fertur per
membra sen-
sibilia.*

*Ardentes fe-
bres quomo-
do à tertia-
nis differant
Frigere ex-
trema per ac-
cessiones un-
de accidat.*

que ipsius motionis modo, haud parva differentia oboritur. Ubi igitur flava bilis non per vasa, sed per carnes movetur, manifestè gignitur rigor. Hoc namq; solo febres ex ingenti ardore à tertia-
nis differunt, quod illæ quidem in vasis bilem continerent, hæ autem, extra vasa diffusam per sensibilia corpora. Per quæ quidem dum bilis fertur, acredine sua tristitia inferens, dolorem excitat. In hoc autem duo quædam eveniunt, nempe ut sanguis contrahatur in profunditatem corporis, ob idq; exteriores partes refrigerentur: & ut ille eadem corporis partes quæ à bile punguntur, impellant ipsam facultate expultrice, donec ab omnibus profligata partibus, per sudorem aut vomitum. aut dejectionem exterminetur. Hoc etiam iis qui non* concoxerunt, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æstivo, vel balneo diu sunt immorati, aut seipsum exercuerunt, contingit. Horum namq; aliqui horrore confestim, ac dein rigore correpti sunt. Verum non solum mordax causa, sed vehementer mota, si rigor fieri debeat, desideratur. Atq; hoc sanè tam frigida quam calida causa est commune, quod utraq; corpus cum dolore commoveant. * Idcirco per quartanas atq; tertianas febres, quævis à contrariis oriantur humoribus, rigor tamen invadit. Etenim ut atra bilis est frigida, sic flava calida existit. Cæterum non solum ex atra aut flava bile, sed ex pituita ultra modum frigida (quam vitream appellavit Praxagoras) rigor fieri consuevit: idq; in mulieribus magis, & quæ in ocio vitam traducunt: qui rigor tamen vehemens non est, & quiescentibus, nulloque modo motis corporibus, ipse etiam conquiescit. Iis autem qui simili affectu correpti sunt, in principio quidem medicamentum diatrion pepperon propino: subinde verò nostrum ex calamintha: deindeq; ex succo Cyrenaico, castoreoq; compositum, quod quartanæ exacerbationibus maxime confert, præsertim quando ingentis rigoris impetu ægri afficiuntur. Porro qui quartanis correpti sunt febribus, usq; ad ossa sibi penetrare rigorem affirmant: & talem, qualis per immensa frigora, dum iter facerent, eis accidebat. In rigore autem qui tertianas, pariq; modo ab ingenti ardore ortas comitatur, quasi ab acutis tenuibusq; acubus se perpungi fatentur. Nunc verò de convulsione non nihil dicamus. Voluntarij omnes motus, per musculos absolvuntur. Ubi igitur musculi in propria retrahuntur capita, ad eas singulæ partes, quibus natura infixi sunt, retrahuntur, convellunturq;. Verum si passio aliqua suboriatur, quæ in tensionem ipsos adducat, hanc sequitur motus similis quidem naturali, involuntarius tamè: atq; hæc passio convulsio appellatur. Nam tendi contrahiq; musculum in proprium prin-

*Rigor fit à
causa non
quiescente,
sed mota.*

*Pituita vi-
treæ inducit
interdum ri-
gorem.*

*Rigentium
ex frigido hu-
more, cura-
tio.*

*Quartanis
exacerbatio-
nibus medi-
camentum ex suc-
co Cyrenaico
& castoreo
auxiliatur.
Tertianus ri-
gor qualis.*

*Motus volun-
tarij à mu-
sculis fiunt.*

*Convulsio
quid.*

cipium, secumq; illam corporis partem, cui est insertus revellere, bene valentibus convulsisq; commune profectò est. At si invito id agatur, præter naturæ ordinem dispositis, minimeq; sanis contingit. Tenduntur autem nervi: perinde ac cithararum chordæ, interdum quidem plurimo humore imbuti, interdum à causis exsiccantibus arefacti. Evenire etiam potest, aliquam corporis partem aut ob inflammationem, aut aliqua alia de causa, vehementer affectam, nervos sibi vicinos unà secum revellere. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, convulsiones accidunt, ob solam siccitatem insignem universi nervosi generis: in phrenitide autem, ob principii nervorum inflammationem. Cæterum cum corporis partes antè tenduntur, symptoma dicitur emprosthotonos: cum verò postèrius, opisthotonos: * at cum in utrunq; latus ex æquo inclinant, tetanus. Igitur convulsiones à siccitate ortas, minime curandas susceperis. Nam qui iis sunt affecti, citissimè intereunt. Quæ verò vel ab humorum copia, vel ab inflammatione trahunt ortum, iis, si plenitudinem vacues, aut inflammationi commodis remediis succurras, mederi poteris.

*Tensio-
rum in
ab hum-
ribus,
dum à
ribus c-
oritur*

*Emprostho-
tonos.
Opistho-
tonos.
Tetanus.
Convul-
sio
siccitatem
recipit
tensionem*

GALENI PERGAMENI de morborum temporibus, lib.



Uod in animalibus ætas, idem tempus in morbis significat. Etenim quemadmodum ipsi nos geniti ad vigorem usq; augetur: inde jam contabescere incipientes, ad extremam usq; corruptionem declinamus, si omnes ætates pertransituri simus: ita singuli morbi à prima ipsorum constitutione ad statum usq; increscunt, donec pro augmenti prioris portione decrescant, in totum dissolvantur. Hoc tamen discrimen interest, quod animalibus quidem, cum sint corpora, proprium generationis tempus præscriptum est, quo omnes ad vitam necessariae partes figurantur, formanturq;: morborum autem, cum sint accidentia corporum, nullum huiusmodi tempus est præfinitum, sed à prima statim generatione augetur. Figurationem itaq; generationemq;, proprietates corporum postulat: accidentia autem ipso tempore ubi genita sunt, ad incrementum festinant. Siquidem phlegmone (exempli gratia,) cum primum inceperit esse, huiusmodi speciem habere videtur, qualem habebit ubi erit maxima: sola autem magnitudine differt. * Porro pars phlegmone obfessa, calidior seipsa evadit, cum tremore majori, item dolore & tensione. Sed hæc parva primo aditu sunt: inde autem ad magnitudinem quandam non omnibus æqualem increscunt. * Postea verò aut discutitur remediis tumor ipse præter naturam, simulq; illius dolor atq; calor resolvitur aut certè in pus convertitur. Tempus itaq; nullum inflammationis generationi singulariter proprium tribuitur, ab eo, quod augmenti est, diversum. Febris etiam (qui calor præter naturam est) proprium distinctumq; generationis tempus non habet. Sed ubi corpus primum calidius quam antea febrili calore fieri coeperit, inde aliud atq; aliud tempus affectionis incrementum excipit, usq; ad per-

*Tempus
borum
paratur
ti animi*

*Tempus
borum
ab
te animi
quomodo
ferant.
Morborum
generatio
non efficitur
tum quod
tempus
scriptum*

*Phlegmone
accidentia*

Febris quæ

ad perfectum vigorem quem in singulis rebus summā esse magnitudinē intelligimus. At verò principium specie quadam ab incremento post ipsum, diversum esse demonstrare conabimur. Etenim initiū uniuscujusq; morbi esse cēserūt veteres non primū illum simplicemq; insultum duntaxat, sed temporis longitudinem latitudinemq; notatu dignam ipsi tribuerunt. Post principium ipsum, collocarunt, ascēsum: dein, statū: ab hoc, declinationem. Ex quibus sanē temporibus circuitus morborū cōstant. Ipsorum autem circuituum nonnulli describuntur horis vigintiquatuor, quotidianiq; vocantur: alij quadraginta octo, hoc est, duabus diebus & noctibus, vocanturq; tertiani. Alios (quos appellant quartanos) septuaginta duarum horarū tempus describit. At hi circuitus omnes, aliquando ad integritatem perveniunt, ut in quotidiana, tertiana, & quartana febris interdum ad declinationē solum vel propius ad integritatem, vel longius ab illa, accedunt. Igitur in auspiciis tertianæ febris (quam exempli gratia propono) horror mediocris oritur. Dein cum majori horrore extrema omnia refrigeratur. Postea verò & rigore & frigore cōcutiuntur plurimæ corporis partes. Quo tempore pulsus durior, minorq; q̄ prius, redditur, necnon in contractione velocior. Præterea quies post contractionē ferè major contingit: post dilatationem, eodem cum illa modo: sæpe prior æqualis, etsi aliquando inæqualis. Atque hæc sanē in quibusdam tertianis, curriculo duarum horarum æquinoctialiū solēt sæpe cōtingere: in aliis autē longiori vel breviori intervallo. Inde pulsus major simul & celerior, dēfiorq; fieri incipiens, sensim singulis cōmemoratis incrementis, statimq; ægri calidiores quā antea redduntur. In summa, inæqualitas quæpiam non mediocris in corpore per hoc tempus exuperat. Atque hoc sanē est secundum tempus à primo illo, in quo ex priori statu fuit universum corpus refrigeratum, pulsusque in contrariam constitutionem mutatus. Ubi verò febris ad integritatē desinit, tūc pulsus ad naturalem statum revertitur, si qua fides habēda est sensibus. Primū itaq; tempus totius periodi est, quo corpus cum prædictis mutationib⁹ pulsus in alserit. Aliud ab hoc secundum est, quod pulsus & calorem in contraria mutat, donec tota corporis moles æqualiter concalescat. Post hoc tertium, quo calor etiamnum augetur, pulsus magnitudine, celeritate & frequentia ei respondentibus. Quarta constitutio post tres cōmemoratas conspicitur, omnibus jam dictis æqualem sibi magnitudinem pro sensus nostri iudicio servantib⁹. Ad hæc quinta alia, cum jā calor manifestò decrevit: halitus autem per cutem excernitur, pulsusq; ad naturalem habitum redit, rejiciens omnia, quæ præter naturam in magnitudine, celeritate, frequentia, duritiēque conquirit. Hoc tempore plurimis ipsorum sudor oritur. Post hoc autem, intermissionis siue intervalli tempus succedit. Igitur primū tempus integritati cohærens, quod frigoris sensum præbet, principiū vocetur. Secundū verò, quod frigus paulatim deponit, tempus inæqualitatis dicatur. Ab hoc tertium, æqualis in-

crementi. At quartū post hoc consistentiæ. Quintum imminutionis. Sextum deniq; integritatis. Quòd igitur sex hæ temporū differentiæ in tertianarum aliarumq; intermittentiū febrium circuitibus reperiantur, id sensu vel multitudo imperita judicat. Nihil tamen obstat & alium quodammodo febris circuitum in duas, sed majores partes dividere: unam, primæ accessionis à primo insultu ad extremam usq; remissionē, alterā, quæ in declinationis & insultus secundæ accessionis medio consistit. Quòd igitur ab Hippocrate dictum est, in accessionibus abstinendū esse, pro accessione intelligendū existimo tempus à primo insultu, usq; ad ipsam declinationem. Porro clarioris doctrinæ gratia, omne id quod accessionem sequitur, remissionē vocabimus, quāvis in intermittentibus febribus, remissio ipsa ablatio etiam dici meretur. Divisimus itaq; febres desinentes ad integritatē, quotidianam, tertianam, quartanā: quarū singulæ sex distincta sortiuntur tempora. At verò quæ non intermittunt integrè, in quinque tantū solvuntur, ab eis nimirū sola integritate remota. Quarum sanæ nonnullæ quotidie accessionem habent: quædam tertio quoque die. Quæ verò quarto habent, non frequenter, sed rarò evenire videntur, utpote quæ magna ex parte ad integritatem desinant. Ad hæc, febrium quotidianarū, tertianarū, & quartanarū, quæ ad integritatē nō desinunt, duplex species est. Quædam nanq; magnitudinem, celeritatem, frequentiam, atq; duritiem pulsus deponunt: quædam autem reliqua tria ad naturalem statum deducunt: at cōservant celeritatem, hæc magis, illæ minus. Verum in quibus febribus citra sensibilem systolen, accessionis insultus accidit, tria tempora in unum recidere est necessarium, totumq; id usq; ad statum fieri incrementū. Nam ubi nō adfuit conspicua systole, ibi nec inæqualitas adesse potuit. Statum verò nunq; defuisse meminī: sed semper sensibili æqualitate in omnibus febribus aliquandiu permansisse. Insultū etiam millies sine dictis conspexi symptomatis. Quibus febribus nullus circuitus adest, ut iis quas synochas vocant: nec accessio quædam omnino est, neq; prædictæ partes. Attamen hæc quoque, secundū diversā tempora totius morbi particulas obtinet, aliis modis innotescentes, q̄ per accessionū tempora. Sed nunc tantum de febrium circuitibus, iisq; nō complicatis, sed simplicibus, nobis habetur sermo. Adverte autē, aliud esse misceri, aliud inter se complicari. Semitertiana quippe ex miscella & temperamento quotidianæ & tertianæ febris oritur. Potest tamen ipsi semitertianæ copulari alia simplex febris, vel tertiana, vel quotidiana. At hujusmodi varietas minimè ad hunc librum pertinet. Cæterū cognitis singularum febrium temporibus, facillè complicatarū tempora cognoscemus. Igitur de simplicibus dictū abundè cum sit, de commissis deinceps disseram: in quibus interdū horrificus insultus quidā cōtingit, omnes principij peculiare notas habens, præter rigorem: q̄vis interdum & hujus quandam imaginē repræsentans. Siquidem vehemens horror, vel aliquod rigoris initiū, vel parvus rigor videri potest. At exactū rigore, qualis in tertianis

Febrium non intermittentiū reperi-ri tempora

quinque. Continuarū febrium se remittentium species.

Quartana non intermit- tens, rarò invenitur.

Synochis febribus nullum circuitū adesse, ac proinde neq; accessionem.

Missionem febrium differre à complicatione earundem.

Semitertiana ex quibus conflet.

Rigor Sehe-
mens non
adest misce-
lancis febril-
bus.

Semitertia-
na febris ac-
cessio nun-
quam inte-
grè desinit.

Semitertia-
nam febrem
invalere
maximè Ro-
ma.

tianis quartanisq; est, febris miscellanea, cujus-
modi semitertiana existit, nō recipit. Ubi igitur
signa quædam secūdi temporis, febris hæc præ-
monstravit, initiū rursus alterius invasionis hor-
rificum efficit, quod nonnulli repetitionē appel-
lant. Aliquando hoc secundo molitur: quibus-
dam tertio facit. Deinde vix æquabiliter simplex
redditur, ad usq; statum increfcent. Hæc febris ad
integritatē nunq; desinit. Nā permultum tempo-
ris usq; ad vigorem habet, declinationemq; sine
perspiratu sensibili: tantū abest, ut integrè cum
sudore solvatur. Quemadmodū igitur a primo
insultu accessio ad vigorem usq; multo tempo-
re pervenit, sic a vigore paulatim minuitur: ideo
que postridie altera accessio advenit, horrida
quidē illa, sed quæ non item cum priori repeti-
tiones habeat. Porro hæc accessio ad vigore etiā
longo tempore ascendit, nec exiguo inclinatur: at
que ob hoc ipsum tertio die, eadem quæ primo
accessio invadit: postea rursus quarto similis ei
quæ secundo habita est, idque perpetuo ordine.
Hanc igitur febrem, quæ maximè invalescit Ro-
mæ, voco semitertianā. Sunt & aliæ differentiæ
particulares febrium, multiq; alij circuitū mo-
di differentiis particularibus variantes, quos ex
industria omitto, ceu nihil conferentes ad præ-
sentem commentationem. Atq; hæcenus de par-
ticularibus morborum temporibus.

G A L E N I P E R G A M E N I
de totius morbi temporibus
liber unus.

Totius mor-
bi tempora
quatuor.



Otius etiam morbi tempora, simili-
ter ac animantium ætates, confide-
ramus. Quorum unum quidem &
* primum, generationi ipsorum tri-
buitur, incremento secundum, tertium vigori,
quartum deniq; declinationi, si ægri salvi futuri
sint. Nam si vel in ascensu, vel statu decesserint,
liquet talem morbum non omnia tempora per-
transiisse. Ridiculum autem fuerit, pri-
mum tempus primæ accessionis, totius morbi
principium existimare: cum nimirum principium
morbi ad præsidia ferenda, utiles præbeat indi-
cationes. Ad id principium respiciens Hippo-
crates, ait: Incipientibus morbis, si quid mo-
vendum videtur move: cōsistentibus verò, præ-
stat conquiescere. Præterea nō minus absurdum
fuerit, morbis qui intra diem solvuntur septimū,
& iis qui prorogantur in annum, æquale princi-
pium tribuere. Ostendimus autem primo libro
de Crisibus: totius morbi principium, ipsius cru-
ditatem existere. Porro inflammationis princi-
pium totum illud tempus existit, quo sanguinea
substantia pars affecta repletur. Cum autem in-
fluxus cessaverit, & quod in particula contine-
tur, putrefieri inceperit, calor quidam ob putre-
dinem nascitur, & fusio magis propter calorem:
unde etiam spiritus generatur, atq; ob hæc am-
bo, particula magis quàm antea distenditur, e-
tiam si nihil influat. Hoc igitur secundum tem-
pus, est inflammationis augmentū. At cum hu-
mor in pus jam vertitur, maximi tunc dolores
partem ipsum corripunt. Nam in puris genera-

Principium
morbi ad præ-
sidia feren-
da utiles præ-
bet indicatio-
nes,

Principium
morbi totius,
est eius cru-
ditas.

Inflammati-
onis quatuor
tempora de-
scribuntur.

tionem dolores, febrisq; magis quàm prius, infe-
stant. Vocatur autem hoc tempus ægritudinis
vigor. Quod si humor in pus mutetur, vel dige-
ratur, minorem tumorem atque tensionem effi-
ciat: huiusmodiq; est declinationis principium.
Sic itaq; in inflammatione tempora dividuntur:
nec secus in febris, quæ ab illa trahit ortū. At quæ
ab humore citra inflammationem oritur, mole-
stantiū humorum cruditatem, pro initio habet.
Hi ubi concoqui incipiunt, initium finitur, atq;
ascensus sive incrementum adventat. Ubi verò
maximè cōcoctio perficitur, vigor adest. Quam
declinatio est vestigio sequitur, dum symptoma-
tum magnitudo, & humorum copia est repres-
sa: restat autem humorū modicum, adhuc con-
coctionem desiderans. Ulcerum quoq; eadem
habentur tempora. Primum nanq; sanies aquo-
sa, incoctæ & tenues ab ipsis desluunt. Dein pau-
ciores atq; crassiores. Postea jam pus tenue. Po-
stremo minus quidem copia, sed crassius, & al-
bidum magis redditur: quemadmodum appa-
ret etiam in pleuritide & lippitudine. Quare nul-
lus morborum solutorum existit, qui non hæc
quatuor percurrat tempora. Non tamen ex quo-
dam alio quàm cruditatis & concoctionis indi-
ciis, quæ excrementis deprehenduntur, cogni-
tio ipsorum constat. Etenim fluxionum quæ ex
cerebro per palatum & nares fiunt, non secus
quàm lippitudinis, initium quidem est, cum a-
quei, tenuesq;, necnō copiosi & acres, qui fluunt
humores apparent: nam extremam hæc crudita-
tem significant. At concoctionem portendit,
crassior & minus acris, modicusq; humor descē-
dens. Jam verò quemadmodum in ætatibus, nō
ipsum vigorem modo, sed omnia quatuor tem-
pora latitudinem habere comperimus: sic etiam
particularium accessionum, ac totius morbi uni-
versa tempora latitudinem momentaneam for-
tuntur. Vigor itaq; tum accessionis, tum totius
morbi sensibili tempore absolvitur. Igitur uni-
uscujusq; morbi proprium quoddam tempus ge-
nerationis existit, interim sensui manifestum, in-
terim minimè. Post quod rursus augmenti tem-
pus advenit, * nec id æquè manifestum in omni-
bus. * Post hæc vigoris sequitur tempus, omni-
no sensibile. Quod si salus futura sit, declinatio-
nis etiam tempus sequetur, & hoc sensui subje-
ctum, cum nimirum amplam latitudinem ha-
beat. At verò morborum qui non solvuntur, du-
plex natura est. Nonnulli enim ipsorum præpa-
rationem habent, ubi exactè illam absolutam
sint consequuti: alij ex eorum natura sunt, qui
solvuntur: id quod eis in ægri perniciem accidit.
* Hoc autem contingit tripliciter. Nam aut pro-
pter ægrotantium imbecillitatem, vel propter
propriam vehementiam, vel propter utranque
prius perimunt, quàm solvantur. In universum
autem nemo servari potest, nisi natura supera-
verit morbum: nec perire, nisi illam morbus pro-
straverit. Igitur morbi singuli ex sua quidē natu-
ra magnitudinē quandam possident, quæ vel su-
pra vires est, ut eas opprimat: vel viribus ægri im-
becillior, ut ab eis superetur, omnib. probe eve-
nientibus. Proinde cum supra vires fuerit, homo
prorsus morietur. At morbi tempora tunc partim
simili

Febrilium
morborum
tredimo-
rum te-
ra desin-
tur.

Ulcerum
tempora.

Tempora
morborum
non alia
cognoscuntur
ex crudi-
tis & conco-
ctionis indi-
ciis.

Tempora
universi
morborum
latitudinem
momentaneam
fortuntur.

Morbi
que ge-
nerationis
proprium
quoddam
tempus
Tempora
tius mor-
bi quatuor

Morborum
qui non
solvuntur
natura da-

Servari
non pote-
st nisi natu-
ra superet
morbum
perire, si
lam mor-
bus postea

simili modo cum prædictis sumuntur, partim dissimili. Siquidem initium similiter in morbi generatione constituitur. Ascensus autem, haud in concoctionis, sicuti in iis qui superstites sunt futuri, sed in cruditatis signis, letalibusque, consistit. Ergo bene colorata urina, & mediocriter crassa, omnium optima existit, quantum ad colorem & consistentiam pertinet. Conveniet autem præterea, vel eneorema, vel nebulam, vel hypostasim salubrem adesse, utcumque morbi natura postulaverit. *cruda* At cruda urina est illa, quæ nec suspensum quicquam, nec subsidens, nec nebulam habet: imò quæ nec crassitiem aliquam, nec pallorem assumpsit, sed alba est, & consistentia tenuis, aquæ speciem referens. Quod si aut nubecula, aut eneorema, aut hypostasis nigricare videatur, talis urina est letalis: quæadmodum si quædam similia fursuri, vel lamis, in ea videantur. Jam verò si aut foetida sit, aut pinguitudinem oleaceam in se contineat, mortem minatur. Hæc igitur sunt urinæ, magni morbi notæ. Magnū etiam esse morbum cognosces, si sputum pleuritide & peripneumonia laborantibus, vel nigrum, vel *fulvum vehementer, vel spumans, vel impense foeditum fuerit: vel nihil omnino expuatur: idque ingenti dolore, vel spirandi difficultate hominem affligente. Respondent his & alij morbi, qui jecur, ventriculumque exercent, eodem letalium signorum genere comprehensī. Unde in huiusmodi morbis vigorem similiter cum eo qui salubrium est, determinare non licet. Nam illic maximæ accessiones statum definiunt: hic verò non licet maximas accessiones similiter determinare, cum morbus quidem ipse à principio incoctus persistat: verum intellectu maximum capere oportet. Porro inflammatione quæ terminatur, puris generatio, vigoris terminus est: in ea verò quæ non finiet, homo etiam in ejus ascensu mori potest. Cæterum vires validissimæ usque ad extremam phlegmones magnitudinem sufficere possunt: quæ magnitudo extrema, vel in gangrænam, vel in putredinem terminatur. Jam verò uno eodemque tempore duobus tribusve morbis homo infestari potest: quorum alius jam inclinatur, alius principij tempus adhuc, vel augmenti primordia occupat: tertius plurimum auctus est. Deinde hominem mori contingit, non propter inclinantem, vel nunc incipientem, sed ob vehementer auctum. Qua de causa, tria facultatum nostrum corpus regentium principia, summè considerabis, quoniam statu sint prædita. Dico autem hæc, cerebrum, cor & hepar. Deinde alias quoque universas particulas, ex singulis principiis ortas, nempe nervos, venas arterias: ad hæc illas, quæ naturam quidem propriam habent, sed ab omnibus principiis reguntur. Nam ex hac speculatione, primum, sive unus, sive plures, in homine morbi sint, invenies. Proximū est, cuiusque propria tempora ad præsidiorum inventionem necessaria inspicere. Etenim circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt: in vigore fortiora, quæ hæc intercedunt, medio consistunt ordine. Igitur in vigore, quod mitigandi vim possidet, in curatione præpollere debet: in principio & fine, quod vehementiam habet. At media tempora, pro summorum proportionem capiantur. Neque enim quam

quis victus rationem instituet, invenire poterit, neque unquam nutrire, sine certa temporum distinctione. Etenim si vigoris tempori, etiam sine alimentum exhibitione sufficere possit æger optimū sanè fuerit, donec morbus inclinet, à cibo abstinere. Si verò sufficere citra cibum non possit, protinus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atque hoc remissionis est tempus. Voco remissionem modò, secundam partem totius circuitus in duo universa divisi, nempe accessionem & remissionem.

GALENI PERGAMENI

de locis affectis, lib. I.

Pro differentia partium humani corporis variari affectuum curationem contingit. Partes igitur quæ in superficie corporis sitæ sunt: una cum affectibus quibus vexantur, facile sensibus deprehenduntur. At verò in imo corpore delitescunt, exercitata cogitationis virum desiderant, cum in partium actione & usu, tum vel maximè in arte secandi corpora, quæ nimirum nos docet accuratissimè proprietatem essentiae uniuscuiusque partis. * Si igitur inter tussendum, bronchium aliquod expuatur (est enim id natura cartilagineum) maximo sanè ulcere affligi pulmonem existimemus. Nam tametsi aspera arteria similibus sit ex bronchiis compacta, tam grandis tamen exulceratio, sine præmatura morte in illa gigni non poterit. Nec verò tantum ex proprietate essentiae, sed ex magnitudine etiam excrementi reiecti, affectus locus discernitur: ut, si una cum tussi excreetur aliqua portio vasis grandiuscula (quod aliquando contingit) tunc certè credendum est illam educi à pulmone. Quandoquidem venæ quæ in asperam arteriam disseminantur, minutissimæ sunt, & capillorum instar. Similiter si per dysenteriam tunicam aliquam corpulentiores alvus aliquando reddiderit, non ab re conjicies ulcere crassiora intestina torqueri. Necnon ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis creberrimè sedes affecta cognoscitur. ut, si urina per vulnus reddatur, vesicam: si verò stercurus, intestinorum aliquod: at si cibus, ventriculum liquet esse convulneratum. Similiter etiam si vulnerato thorace, spiritus per vulnus effletur, indicat membranam cingentem costas, solutam esse. Præterea sanguis ejectus saliendo, arteriam esse vulneratam denunciat. Qui quidem arteriarum sanguis, eo qui à venis effluit, calidior, tenuior atque flavior apparet. Ex adhærentibus etiam rebus, affectæ sedis notæ petuntur, cum nimirum & ipsæ etiam essentiae proprietatem obtineant. Hujus generis est ramentum: quod quidem ostendit illius partis ulcus, à qua rejicitur. Nam si id cum lotio excernatur, urinæ meatum: si tussiendo, spiritalium instrumentorum: si per vomitum, gulæ aut ventriculi: si cum alvi excrementis, intestinorum ulcerationem significat. Est præterea & alius dijudicandi motus sumptus à rebus alcubi contentis præter naturam: ut, si in vesica aut renibus continetur lapis, in thorace pus: aut denique aliquis humor molestus in animalis corpore, illic genitus, vel adveniens extrinsecus. Fingamus igitur

*Vitus & ratio
medij rationem
insitit
iuxta ipsius
morbi tem-
pora.*

*Curatio affe-
ctum varia-
tur pro diffe-
rentia affe-
ctuum par-
ticularum.*

*Artificandi
corpora, do-
cet nos pro-
prietatem es-
sentiae unius-
cuiusque par-
tis.*

*Magnitudo
excreta sub-
stantia.*

*Res natura-
liter in parti-
culis quibus-
dam conten-
ta.*

*Sanguis ar-
teriarum
qualis.
Res adhæren-
tes.*

*Res contenta
præter natu-
ram.*

(gratia

*Urina sup-
pressa qua
sint confide-
randa.*

*Musculus ve-
sicae collū con-
stringens,
agit volunta-
rie,
Vesica non
paret volun-
tatis impe-
rio.*

*Urinam sup-
pressam ob re-
solutam & im-
mū excernendi
quomodo ex-
pellere oportet.*

*Obstruitur
collum vesicae
trifariā.*

*Lapidis in-
cumbentis
collo vesicae
indicia.*

*Aenea fistu-
la ad quid
utilis.*

*Caruncula
collo vesicae
innata ar-
gumenta.*

(gratia exempli) aliquē tribus diebus non reddi-
disse urinā. Ad hæc, evidēs quidā tumor circa pu-
bem emineat, evidentē repletionem vesicæ indi-
cans. In primis enim cōsiderādū est, nū resolutæ
excretrici potētiae nomine id accadat, an ob ob-
structū urinariū meatum: nā utrumq; potest acci-
dere. Prius tamen revocare in memoriā oportet,
musculū qui claudit collū vesicæ, ab actione ge-
scere, dum fungitur vesica suo munere. Cuiusq;
dem musculi actio, paret voluntatis imperio. At
vesica ipsa, utpote naturaliter agens, minimē vo-
luntati obsecūdat. Inest etenim illi, quēadmodū
cæteris ferē omnib. partibus, facultas quædā ex-
pultrix, qua utitur, dum cōtristatur ab excremē-
tis. Quæ sanē excernendi vis, si aliquando fuerit
affecta, fieri potest ut supprimatur urina. Proin-
de si hominem sic figuraveris, ut declivis sit colli-
vesicæ positus, ac manibus pubis tumore presse-
ris, tandem reddetur lotium. Quod si sic facien-
do nihil omnino promoveris, non resolutā eam
vix, sed urinæ fistulā constipatā esse, suspicari o-
portet. Quippe musculus ei circumdatus, si resol-
vatur, nō cohibiti, sed præter voluntatem emissi
lotij, est causa. Trifariā autē cōtingit obstrui col-
lum vesicæ. Aut enim corpus ipsius in tantum tu-
morem attollitur, ut meatus inde occupetur: aut
aliquid ei præter naturā, ut caruncula vel callus,
innascitur: aut deniq; à re quapiā adveniente, me-
atus ipse obstruitur. Porro corpus ejus ad mag-
nitudinem insignem attollitur, si vel inflāmatio-
ne vel scirrho, vel abscessu, vel alio quo vis tu-
more fuerit affectum. In meatu caro quidem o-
ritur, si præcesserit ulcus. Obstruitur meatus, vel
à lapide, vel grumo, vel pure, vel crasso lentoq;
humore: quæ omnia distinguere oportet, ex præ-
sentibus præteritisq; accidentibus. Sit igitur ali-
quis puer, qui perpetuò pudendum scalpat. Ejus
autē urina sit aquæ similis, in qua sabulosa quæ-
dam subsideant: dein verò repentē supprimatur
urina: nunquid optima ratione conjeceris, huic
lapidem incidisse in collum vesicæ? Itaq; supino
collocato puero, ut crura reliquo corpore sint
sublimiora, multifariā ipsum cōcuties: sic enim
feceris, ut lapis à meatu recedat. Quibus pera-
ctis, jube ut puer urinā conetur reddere. Quod
si profluxerit, notitiā causæ, ac simul curationis
modum te invenisse, ne dubitaveris. Sin autem
nihilominus supprimatur urina, tunc demissa æ-
nea fistula, simul lapidem à vesicæ collo repelles,
& evocabis urinam. At nulla lapidis nota præce-
dente retentum lotium, si sanguis simul cum uri-
na profluxerit, argumentū est grumū aliquē exti-
tisse ipsius obstructionis causam. Quāq; fieri
potest, ut ob ulcus vesicæ, citra sanguinis profu-
sionem, paulatim grumus concreascet. Potest etiā
cōtingere, ut sanguis ex renibus per ureterās in
vesicam defluens, grumū efficiat. Ad hæc igitur
omnia, sicuti etiā ubi pus, vel aliquis lentus hu-
mor meatū urinæ obstruxit, haud inutilis est æ-
nea fistula immissa. Sic etiam ubi ob carunculam
ab ulcere innatam, vesicæ cervicem obstructam
esse putamus, & ex præcedentibus ulceris notis
& ex eo quod immissa ænea fistula urina vacua-
tur, id intelligere possumus. Quippe demissa fi-
stula, dolorem movet in ea meatus parte, ubi ul-

cus esse conjicimus: fractaq; sub fistula carne, se-
quuntur cum urinæ excretionē, & cruor & car-
nis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa
conjectura nobis perq; utilis est, ut quæ inter ex-
actam noticiā, & omnimodam ignorantiam,
media quodāmodo existimetur. Cæterū cujusli-
bet partis usus, magnificē ad affectorū locorum
cognitionē conducit. Etenim actio, motus par-
tium factivus est: at usus, omnibus inest, vel ni-
hil etiam agentibus. Fit itaq; excretionis urinæ
actio, à compressionē vesicæ, opitulantibus etiā
abdominis musculis, ubi urinam admodum exi-
guam continet, aut vesica ipsa est infirma. Reli-
quæ autē partes omnes, ad actionē sunt utiles.
Porro si vesica minimē in tumore extensa, urina
reddi nō possit, necessum est vel ureterās, vel re-
nes obstructos esse. Quapropter hic rursus in-
tueri oportet, num anteq; supprimeretur urina,
aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius cu-
juspiam mali accidentia præcesserint. Neq; inte-
rim negligenda est universi corporis dispositio:
ut possimus planē discernere, num in ipsis reni-
bus, à lapide, vel crassis humoribus, fuerit ob-
structio oborta, an in vocatis ureteris. Cum igi-
tur singulæ actiones corporis, peculiaria sorti-
tur organa, quibus obeuntur, sanē actionē lædi
est necesse, instrumento efficiente ipsam, quomo-
dolibet læso. Verū interdum facilē affectus pro-
ductus solvitur, ita ut simulatq; opifex causa se-
mota fuerit, prorsus ipse conquiescat. Interdum
verò usque adeo pertinaciter hæret, ut perma-
neat diutissimē, etiam ablata causa. Accidit autē
nonnunq; ut efficiens causa pertransiens, nō fir-
mum faciat affectum: veluti cum suffusioni simi-
lia oculi imaginantur, collecto in ore ventriculi
aliquo tenui excremento, unde vapores sublatis
ad oculos, similes imagines movent, quales per
suffusiones cernūtur. Oportet siquidem oculos
participes fieri ejus dispositionis quæ infestat vē-
triculum, si videndo debeant hallucinari. Itaque
necessum est ordiri semper ab instrumēto actio-
nis oblæsæ. Dein autē investigare, quīnam sit i-
psius noxæ modus: num videlicet dispositio ipsa
sit permāens, an adhuc in generatione cōsistens,
nec nata perseverare. Quod si nunc quoq; fiat,
utrum causa quæ effectum producit, contineat-
ur in ipsa parte, an per ipsam transeat, investigā-
dum. Etenim arefacto immodicē humore, quem
crystalloidem vocant, perseverans erit oblæsiō,
& essentia ipsius proprius affectus. Si verò cras-
sus humor in pupilla cōstituerit, essentia quidem
nondum * est læsa, verū accidētis causa in ocu-
lo ipso consistit. Tunc autem per ipsum transire
dicitur, cum evaporans humor in ventriculo
continetur. Non autem necesse est ad hoc, ut
pars aliqua esse affecta dicatur, in essentia ipsius
permanentem esse dispositionem. Nam ubi ve-
hemens dolor aliquod intestinum infestat, fir-
mato in una quapiam parte dolore, ut quasi per-
forari videatur, quo pacto quis vel nequaq; inte-
stinum affici dixerit, vel in eo affectum non con-
sistere? q̄vis hujuscemodi dolores interdum ex-
creto quodam humore vitreō, vel temporis mo-
mento solvantur. Is igitur humor vitreus, causa
illius doloris extitit. Id siquidem quo tangente
attigimus,

*Coni-
artifi*

*Urinæ
actio a
fiat.*

*Acti-
di est
instru-
effici-
quom-
bet la*

*Oculi
gati-
sint
rana*

*Hum-
trunc*

iusa est id, ut tangente videm affici-ur: ablato utem, affe- sus sedatur.

afficiuntur, & quo separato quiescit affectus, cau- sam esse, omnibus in cōfesso est. At verò ipse af- fectus, nonnunq̃ à causa aliqua oritur: sed ita o- ritur, ut sublata causa effectrice, haudquāq̃ per- manentē habeat dispositionē. Interdum autem partim jam factus est, partim etiam nū sit. Sæpe numero etiam si fieri desinat, utpote ablata cau- sa, perseverans tamen permanet dispositio. Vel- uti in dysēteria, cuius affectus, mordax humor existit causa: utpote qui ab initio extergat, abra- datq̃, ac dein temporis tractu ulceret intestinū. Quod si anteaq̃ produxerit ulcus, * perfluere is humor desinat, affectus ipse nōdum dysēteria vocabitur. Sin verò ulcus jā intestinū exerceat, etiāsi humor finiatur, non ob id finitur affectus. Hoc autem summoperē venit considerandū, om- nem morbū protinus ab initio, ubi primū cor- pus ipsum limites temperaturæ, quæ sanitati de- betur, excesserit, eandem sibi ipsi naturam atque essentiam sortiri, nec differre, nisi magnitudinē à jam absoluto & maximo. Siquidem res simila- res, cum nullam figuram naturalem desiderent, protinus ab initio eadem essentia constant. Dis- similiares verò, & quibus varia est forma, ut do- mus, essentiam generatione posteriorem habe- re poterunt. Quum itaque causæ agunt in cor- pus, ipsa species affectus ab initio est eadem, ta- men ob exiguitatē nō planē cernitur: sicuti neq̃ in saxo cōcavitas, quā unica stilla produxit. Cæ- terum id genus affectus exigui, separatis efficiē- tibus causis, ilicō à natura vincuntur. Ille quippe dumtaxat externo egent auxilio, quos ob magni- tudinem vincere natura non potest. Igitur ubi primū mordax humor aliquod intestinū erose- rit, q̃vis id quod jam factum est, nondum apertē videatur, nihilominus dispositio ipsa sub dysē- teriæ specie cōprehenditur. Sit aut̃ hoc initiū viæ ad inveniendas affectas sedes, nullam actionem lædi, nisi pars, quæ illam efficit, afficiatur. Verum ut affectio & actio diversæ sunt voces, ita diver- sus quoq̃ earum est usus. Id siquidem agere di- citur, quod ex seipso motū obtinet. Affici verò, quod motum habet ab alio. Cum itaq̃ duo sint motus genera, alterationis & lationis: ubi ad permanentem dispositionem alteratio pervene- rit, fueritq̃ dispositio præter naturam, morbus vocatur: q̃vis per abusionem nōnulli eam dispo- sitionem affectum nominent. Distinguenda ta- men est interim propria & primaria affectio, ab ea quæ per cōsensum accidit. Ut autē recta pro- priaq̃ nominū appellatione utar, afficitur quidē caput, quando condolescit ventriculo: agrotat verò, cum proprio morbo laborat. Similiter vē- triculū affici quidem dicemus, ubi à vitiosis mo- lestatur humoribus: agrotare verò, aut per intē- periem propriā, aut cum inflammationē, vel ul- cus, vel abscessum habet præter naturam. Porro corruptionis ciborū tres primæ ac veluti gene- ralissimæ sunt differentiæ. Una quidem per pro- prios ventriculi morbos, altera à vitiosis humo- ribus in ipso collectis, tertia ab alimentorū qua- litate inducitur. Licet itaq̃ vitiosam ædi coctio- nem, ventriculo nō primaria, sed secundaria ra- tione affecto, minimeq̃ circa actionē propriam hallucinante: quemadmodum ubi vitiosi cibi &

corruptioni obnoxij ingerūtur. Si igitur quispi- fumosum ructum emittat, igneo quodam calo- re ventriculū ejus esse dicemus præditū. At dein- de rursus distinguendo investigabimus, utrū ab intemperie corporis ipsius ventriculi, is calor o- riat̃ur: aut à flava bile, eaq̃; vel in ipsius spacio cō- tenta, aut in tunicas ita, ut vix abstergi possit, de- missa. At ne hīc quidē cessabimus. Nam rursus quærere oportet, an jecinore malē suo officio fungente, hujusmodi humor accumuletur: an is ex universo defluat corpore: an etiam in ipsomet gignatur ventriculo. Ergo si in vētriculo cibi in fumosam qualitatem mutantur, idq̃; non ex sua ipso- rum natura, causam calidā: si verò aceſcāt, eam frigidam esse necesse est. Ut discernas autem, nū intemperies aliqua, an vitiosus quispiam humor ventriculi corpus infestet, offerre oportet cibos qui suapte naturā q̃maximē corruptionis modo advenſentur: ut panē aut chondrum illis, qui in fumū transmutare cibum consueverūt: mel aut̃ his, qui à cibo acidum saporem percipiūt. Dein considerare excrementa, tum ea quæ vomūtur, tum quæ djiciuntur per alvum: num humor ali- quis cum illis quidē biliosus & calidus, cum his verò pituitosus ac frigidus excernatur: an nul- lo vacuato humore, ipsa exigua quandam mu- tationem obtineāt. Quippe ubi * citra humoris affluxum igneo calore ventriculus infestatur, pa- nem aut chondrū absq̃; humore videbis dejici, perq̃ exigua in ipsis facta trāsmutatioe. * Quod si humor quoq̃; pravus in ipso ventre consistens corrumpat cibos, vidētur ij, ubi dejecti fuerint, in hujusmodi humore submersi, & ab ipsius a- ctione manifestius alterati. Id quod à vomitio- ne etiam clarius discernitur, si laborans sit pro- clivis ad vomitū. Nam cogere eum qui nequeat vomere, absurdū est. Atq̃; hæc ita deprehendun- tur, si in spacio vētriculi noxijs cōtineatur hu- mor. Si verò in tunicis sit imbibitus, ut ad cali- dum nausea quædam inanis (hoc est, citra vom- itum) sitisq̃; vehemens cōsequitur, ita à frigido ci- borum cupiditas excitatur. Porro calida disposi- tio, ubicunq̃ fuerit, semper refrigeranda est. At quousq̃, aut quo modo, aut qua materia refrige- rare conveniat, locus affectus cōmonſtrat. Jam verò iis qui acidū ructū adunt, auxiliatur medi- camē diatrion pepereō, aut aliud simile ex aqua vel vino epotū. Aliis autē qui nidorosum, tum absynthiū, tum hiera picra est ex usu. Quo qui- dem medicamine (hiera videlicet, quæ ex aloē cōstat) in potu exhibito, quosdam olim colicos perſanavi, quibus mordaciū humorū defluxus in intestinū, conciliaverat affectionē. Cæterū in- testinorū proximæ ventriculo partes, exhibitis tum cibis, tum potibus: quæ verò nō ita multū à sede distant, clysmis promptius curantur. Fin- gamus rursus per ventrē dejici excrementa quæ- dam, aliquādo quidē ramenta, aliquando cruen- tum aliquid, simulq̃; aliquando hæc ambo: tunc sanē intestinum ulcere affectū esse, dubitaverit nemo. At verò utrum in exilibus intestinis, an crassiss, ipsum ulcus consistat, id ex rasura, & exi- tus tempore, & ex mitione cum stercore, distin- guere oportet. Siquidē infirmarū partiū ulcera, nullas omnino ulcerum habēt notas alvi excre-

Ructus fumo- sus significat igneum calo- rem ventri- culi.

Aceſcere in ventriculo ci- bos, ob causā frigidam. Ructu adito fumoſo & el- acido quid agendū, con- siderandūm- ē, ad utrius- que causam perſeſtigandam.

Vomere ne- mo cogendus est, nisi sit ad vomendum proclivis. Nausea in- anis indicat calidum suc- cum imbibitum ventri- culi tunicis. Cupiditas ci- bi unde exci- retur.

Locus affe- ctus quid in- dicet. Diatrion pe- pereō ructū acido cōfert. Hier- picra quibus con- ducat affe- ctibus. Intestina su- tum prema cibo- & potu, infir- ma prompti- clysmis cu- rari.

Ulcus obſide- atne tenuia intestina an crassa, quo- modo digno- scendum.

*Excrementa
unde sum-
mantur.*

*Actio laesa
partem affe-
ctam indicat
Excremento-
rum species
partem affe-
ctam indicat
Positus indi-
cat partem
laesam.*

*Dolores sin-
guli aff. etia
possunt par-
tem ostendere*

*Accidentia
propria indi-
cant locum
affectum.*

*Peripneumo-
nicis viden-
tur maxilla
rubea.*

*Affectuum
nota unde de-
prehendan-
tur.*

*Lapis in qui-
bus gignatur
paribus.*

*Abscessu cor
sustinere non
potest.*

*Dolorem nec
pulmo nec li-
gamentum
patitur.*

*Horror inte-
pestivus cum
febre suppu-
rationem in-
flammationis
inducit.*

*Affectuum
propria si-
gna qua sunt.*

*Affici per co-
sensum quan-
do dicatur
cerebrum.*

mentis admistas: earum verò partium, quæ paulo alius sunt sitæ, ulcera, mistas quidē cum stercore notas habent, sed id leviter duntaxat. Quē admodum si multò sint sublimiores, vehementior erit mistura. Præcipuè verò in supremis intestinis ulceris notæ stercorei accuratè miscētur. Potest ex uno quandoq; indicio simul & locus & dispositio deprehendi, aut locus unà cū causa. Cæterum locorū notæ, & ab actione laesa, & excrementis, & positu, & doloris proprietate, & propriis accidentibus desumuntur. Affectuū verò, & ab excrementorū specie, & loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Actio itaque laesa, affectam partē indicare potest, hoc modo. Si enim accidens aliquod circa cernendi officium evenierit, oculū affici cōstat. Excrementorū species partē affectā indicat, vel quod sint ex essentia illius, vel quod ab ea cōtineantur. Positus etia affectā partē commōstrat. Durus quippe in dextra præcordiorū parte tumor, nō lienis, sed jejorū affectū est nota: in sinistra autē, nō hepatis, sed splenis affectū indicat. Ad hæc, si membrano sæ tunica frustulū vomendo fuerit rejectum, aut gulæ, aut ventriculi: si tussiendo, gutturis, aut asperæ arteriæ: si excreando, faucium: si cum urina, ejus fistulæ: si a sede, alicujus intestinorum: si per mulieris pudenda, uteri affectum portendit. Singuli etiā dolores, pro positis varietate, possunt affectam sedem ostendere. Nam si apparentibus per vomitū ulceris notis, in anterioribus partibus circa præcordia sentiatur dolor, ventriculū: si verò in posterioribus circa dorsum, gulam exulceratam esse est indicium. Ex propriis accidentibus etiam innotescit affectus locus. Nam ore ventriculi affecto, fastidium infestat. Per hepatis verò imbecillitatē, excrementa alvi, aqua in qua carnes nuper mactatæ ablutæ fuerūt, assimulantur. At in peripneumoniciis, maxillæ videntur rubeæ. Quinetiam propriæ ipsorū affectuum notæ, in excrementis deprehenduntur: si quidem ramentū, ulceris: si in urina sabulosum residet, lapidis: cucurbitæ verò seminibus excrementa similia, latorū vermiū indicia sunt. A locis etiam ipsis, morborum indicia sumuntur, eò quod quibusdam solis morbus ille accadat, quibusdam verò solis nunq̃ eveniat. Quippe soli oculi suffusio ne laborant. Lapis in vesica & renibus duntaxat nascitur: atq; ut nonnullis placet, etiam in colo. Lumbrici in intestinis gignuntur. Rursus impossibile est, ut cor abscessum sustineat: aut pulmo, aut ligamenta, dolorē. Ab accidentiū quoq; proprietate affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per tabificos morbos, ungues adunci evadunt. Intempestivus horror cum febre, inflammationis ad suppurationē transeuntis indicium est. Lingua nigricans ardentē febrem portendit. Pauca tamen affectuū sunt notæ, quæ non simul affectam sedem ostendant. Cæterū ut actionum noxæ affectā duntaxat particulā, sic differētiæ earum, ipsius affectū declarant. Ea igitur sola sunt affectuū propria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur. Porro cum ob vapores vel etiā humores ipsos ascendentes ad cerebrū, mens læditur, nemo sanè dixerit cerebrum tunc laborare primogenio affectu: quanq̃ omni affectu carere,

ipsum haudquaquā defendi potest. Quare dicendum est, illud per cōsensum, sive cōsortij lege affici: hoc est, ab altera parte talem affectionē recipere. Sunt præterea nonnullæ actiones, quæ idonea indigentes materia, ipsam ab aliis partibus præparatā accipiūt. Qua de re interdū optima ratione cōtingit, nulla existente in actionis cujuspiam propriis instrumentis noxa, actionē ipsam perire, defectu scilicet ejus materiæ ex qua fieri cōsuevit: veluti in voce accidit, cujus quidē materia efflatio existit. * Hæc autē fit cōtractio thorace ab intercostalibus musculis. His igitur nihil agentibus, animal vocē amittit, & quidē nullo interdū in propriis vocis particulis apparente affectu. Sunt verò hæ partes, tres cartilagine a tribus cōmotæ musculis, in quos inseruntur nervi demissi à cerebro. Est præterea in gutture lingua, sive epiglottis, maximè propriū vocis ipsius instrumentū. Etenim cecidit quidam ab alto, ita ut dorsū initiū affligeretur. Is tertio die exiguum admodum vocem emisit. Quarto deinde die omnino obmutuit: resolutaq; simul fuerūt & crura, manibus prorsus illæsis. Sed nec spirationem amisit, nec difficulter spirabat. Nam cum tota sub cervice spina esset ei resoluta, accidit thoraci, ut et septum transversum, & musculi superni, numero quidem sex, moverentur. Quippe nervi ex spinali medulla, quæ in cervice est, in ipsos descendunt. At nervi musculorū intercostaliū, qui efflatum efficiunt, omnes affecti erāt. Ubi igitur sedata fuit spinæ inflammatio, à septimo die vox restituta est juveni, & crura motionis facultatē, antea interceptā, recuperarūt. Hujusmodi ergo noxæ speciem, magis propriè per cōsensum evenire dixeris, q̃ ubi ab humoribus in ventriculo contentis, exhalantibusq; caput dolore tentatur. Jam verò, ut ad crura facultas quædam, sed citra essentiā substantiāve descendere ob phlegmonem prohibita est: sic ad oculos, cum essentia, ubi obstructi fuerint visorij meatus. Ad guttur autem, q̃vis materia perveniat per illam spinæ dorsū resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquā accedit. Qui verò ab intercostaliū musculorū perforationē obmutuit, is totā vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura resolvuntur ob inflammationē spinæ, ita etiam guttur, vocalibus sive recurrentibus nervis (quos ipse inveni) aut incis, aut laqueo interceptis. Atq; idem est modus quo læduntur gutturis musculi, sive recurrentes nervi, sive ij qui juxta arterias sunt, vitientur. Utrinq; enim animalis facultas desideratur, sine qua moveri nemo potest pro voluntatis imperio. Incis præterea musculis qui epiglottida movet, animal etiā evadit mutū. At laqueus collo circumdatus nō solū reddit animal mutum, sed etiam suffocat, ipsum respiratione privando. Aspera autem arteria, si dissecetur, voci quidem nocet, sed animal non privat respiratione. Angina verò, cum sit internarum gutturis partiū inflammatio, stranguatio ni proportionē respondens, respirationē tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocalis instrumenti maximè proprius affectus est. Qui autē ex affecti loci notitia ipse curationē invenierim, ex hoc exēplo perdisces. Occurrit mihi olim

*Vocis man-
ria est efflu-
tio, quæ fit
tracto tho-
ce ab inter-
stibus mu-
sculis.*

*Vocis pro-
pria instru-
menta sunt
tres carti-
lagine quæ
sunt in lu-
ryngem, &
præterea e-
piglottis.*

*Affectione
per cōsensu
species dicitur*

*Recurrentes
nervos in-
nit Galenus*

*Moveri pro
voluntatis
imperio ne-
mo potest, si
ne facultate
animali.*

*Angina est
inflammatio
internarum
gutturis pa-
rtium*

*Loci affecti
notitia qua
ratione Gal-
enū ipsam cu-
rationem
ostendit.*

olim quidam, cui sensus trium digitorū manus, jam triginta diebus perierat, prorsus illæsa motione: ne juvabatur quicq̃ à medicamentis ipsi manui admotis. Cum igitur intellexissem ex illo, cum proficisceretur Romā, se decidisse à vehiculo, ac initium dorsi tunc sibi cōtūsum fuisse, nec multò post accidisse digitorū affectū: cōjeci inde, * in primo statim exortu nervi post septimam vertebam, partē aliquam obiectum fuisse inflammata, eamq; jam induruisse in scirrhum. Quippe nervorū qui à cervice prodeunt, ultimi pars * humilior, quæ descendit per cubitū, in cutem minorū digitorū disseminatur, ac præterea per mediū digiti mediā partē dispergitur. Quam obrem illi spinæ parti, * quæ affectæ particulæ principium in se continebat, congruenti medicamento cum succurrissem, digitis suū sensum restitui, cum maxima spectantiū omnium admiratione. Quo autem modo sensus digitorū perierit, motu prorsus illæso, jam audies. Sentire enim, veluti quiddam pati est: moveri autem, ceu quoddam est agere. Quamobrem ut quis moveatur, opus est robore: at ut sentiat, vel minima facultas est satis. Ob idq; necessum est, ut sensu ipso deperdito, simul exolvatur & motus, ubi per unum eundemque nervum ambæ perficiuntur actiones. Porro omnis voluntarius motus, ad musculorum officum pertinet. Quippe nullus nervorū per se, sine musculo, ullam huiusmodi in animatis particulis actionem efficere possit. Cæterū ad partes movēdas muscoli ipsi aliquādo quidem * immēdiatē perveniunt: aliquando verò per medios tendones: quales sunt illi qui movent digitos. Si igitur affici musculorum nervos contingit, digitorum motus peribit: si verò eos qui ad cutim pertingūt, tangendi sensus corrumpitur. At ubi tota resolvuntur membra, cum videlicet cōmune principium est læsū, simul & motus & sensus pereunt. Ac tunc locum primario affectum, ex læsorum nervorum multitudine duntaxat invenire poteris. Accidit autē interdum, ut dextra tantum pars ipsius spinæ afficiatur, altera omnino illæsa: aut ē contrario, ut illa manente integra, sinistra affectum sustineat: atq; hac ratione nonnunq̃ tota pars sinistra resolvit, dextera illæsa manente: nonnunq̃ cōtrā, dextra pars duntaxat & afficitur & resolvitur. Ubi verò non affecta spina, tantū unus nervi processus est læsus, eas duntaxat partes resolutio occupat, in quas ille nervus est distributus. Itaque si spina fuerit affecta, aut aliquod nervorū principium, cōvertenda illuc tota medendi ratio est: alioqui frustra circa resoluta membra occupaberis. Jam verò ob frigus immoderatū, interdū sedis musculus resolvi solet q̃ maximē, sive sederit quis super lapidē frigidū, sive in aqua frigida supra modū fuerit versatus. Quā sanē resolutionē sequitur in voluntaria excrementorū dejectio. Qui igitur in anatome exercitatus fuerit, accuratēq; præcedentia & præsentia accidentia norit, ac sic ad curandorum morborū experientiā methodo & ratione pervenerit, is inveniet & locum affectū, & ipsam dispositionē. Ut autem affecti muscoli, voluntarias: sic vesica, necnon intestina oblæsa, naturales actiones lædere possunt: eò quod ipsis

cōtractis excernantur ea quæ cōtinent. Ac differunt certē plurimū naturalia ab animalibus instrumentis: quòd naturalibus quidem, cognata actionis vis insit: animalibus verò instrumentis à principio, veluti lumē à sole, ipsa defluat. Quā obrem solis partibus quæ & sentiendi & movendi vim habēt, accidit, ut ipsis interdū haudquāq̃ affectis, nihilominus eorum actio exolvatur: id quod naturalibus instrumentis minimē solet accidere. Quoties enim horū actio læditur, semper ipsa primò afficiūtur. Cæterū animalibus instrumentis omnibus, * naturalis quoq; dispensatio adest, cum nimirum & arteriarū & venarū admiculo indigeāt, ad essentiā propriam servandā. Proinde alterari à vicinis, ipsis ut naturalibus: alterationem verò sentire, ut animatis evenit.

GALENI PERGAMENI

de locis affectis, lib. II.

CAPUT I.

TRes sunt exercitationis modi circa affectorum locorum notitiam. Quorū unus circa singulas corporis partes, alter circa causas & dispositiones, tertius circa differentiam accidentium versatur. Igitur à locis sumitur modus, ubi dicimus: Affecto cerebro huiusmodi accidentia sequuntur. A dispositionibus & causis sumptus, existit talis: ut si dixerimus: Inflammationis seorsum, aut refrigerationis, huiusmodi sunt accidentia. Ab accidentibus, ut cum dicimus: Hoc doloris genus hæc dispositiones aut hosce locos portendit.

CAPUT II.

Hallucinatur autē Archigenes, ubi dolorem stupidum nervis tantū evenire ait. Quippe stupor à frigida dispositione oritur, non nervorum duntaxat, sed etiam venarū, arteriarum, carnis, membranarū, tunicarum, & cutis. Quòd si ob id quòd hæc omnia per nervos sensum habent, ad nervos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias esse nervorū ait? Etenim dolor, tristis est sensus: quē admodum ipsa voluptas, blandus. Quòd si rem accuratius inspexeris, haudquāq̃ doloris species dicendus est * stupidus dolor: sicuti neq; species ulceris inflammatū ulcus: sed utrobique duarū dispositionū concursus adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: idcirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultatē inducit: quē admodum cōpleta refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Quòd autē stupor dispositio nis, nō doloris aut sensus sit nomen, Hippocrates docet, ubi ait: Stupor enim mediocris dolorem solvere potest. Porro cōstrictas vehementer particulas, atque eos qui torpedinē animal dum adhuc vivit, tetigerint, infestare solet etiā stupor. At quibus membrū aliquod stupidum fuerit, ij quicquid tetigerint, obscuro & hebeti sensu percipiunt, neq; moveri possunt. Si verò moveri cōgantur, dolent. Cæterū citra hoc quòd moveri tentēt, affectū ipsum stuporis haud obscure persentiūt, sed tunc minimē dolent. Stupor itaq; nō participulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere quidem omnibus potest partibus, ab ijs tamen duntaxat manifestē senti-

Instrumentis naturalibus cognata actio nis inest. Instrumentis animalibus, veluti lumē à sole, à principio facultas defluit.

Exercitationis circa affectorum locorum notitiam, tres modi.

Archigenis opinio refellitur. Stupor à frigida oritur dispositione.

Dolor tristis est sensus. Voluptas est blandus sensus.

Refrigeratio completa sensum & motum tollit. Stupor mediocris, dolorem solvere potest.

Stupor quos infestare solet.

Stupor accidere omnibus partibus potest.

*Caro per se
reperitur
nunquam.
Musculi com-
pulsio.*

*Pulsus dolo-
rificus quan-
do sentitur.*

*Dolor inflam-
maris muscu-
lis unde acci-
dat.*

*Stupor est dis-
positio me-
dia inter re-
solutionem
et integram
valetudinē.
Pulsatilis do-
lor nec in pe-
ripnevmo-
nia, neq; in
pleuritide
oritur.*

*Pulmo caret
sensu
Pleuritis
quid.*

*Pulsatilis do-
lor quas in-
flammatio-
nes sequi-
tur, et quib;
non accidat
partibus.*

*Extensivus do-
lor quā affi-
ciantur par-
tes.*

*Doloris spe-
cies prima
sunt dua.*

*Intemperies
dolores in-
fert.*

ri, quæ & suos affectus percipere, & moveri pro voluntatis imperio sunt nata. Jam verò ex carne (quæ nusquā sola ac per se reperitur) ligamentisq; & tendonibus per ipsam disseminatis, musculorum essentia constat: quæ ut permanere posset, venis indigebat, arteriisq;. Verum citra dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiamnū rectē valente. Ubi verò ingens inflammatio est ob orta, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarū pulsus cum dolore sentitur: cum per bonam valetudinē, nec cum dolore, nec sine dolore ipsum discernemus. Etenim duabus præcipuè occasionibus vehemens dolor particulis inflāmatis infertur: nempe cum moventur, & cum à re quāpiam premuntur. Proinde inflāmato musculo, duplici nomine, ob dilatatas arterias, dolorem percipimus: & quod moveatur illæ, & cōprimantur ab adjacentē carne, atq; ipsam similiter cōprimant. Quinetiā sine musculo, arteria inflāmatoriū affectum sustinens, ipsa per se cum dolore pulsatur. Quod si aliquādo per id genus affectus, stupidus esse pulsus ipsi ægro videatur, tunc scire licet, dispositionē in musculi nervis ita cōsistere, ut ad resolutionē tendat. Nam dispositio stuporis, media est inter resolutionē & integrā valetudinē. Ceterū neq; in peripnevmonia, neq; in laterali morbo pulsatilis potest dolor contingere: idq; ob partium naturā. Pulmo siquidem, lenissimus non habet: morbus verò lateralis, membranæ cingentis costas affectus est. * Cujus quidē pars illa quæ costas adhæret, necessariò comprimitur: * quæ verò inter costas est collocata, comprimi nequaquā potest, sed inflammationis duntaxat ratione dolet. Siquidem in eo spacio arteriæ consistunt, per musculos intercostales dispersæ: idq; altius, q̄ ut membranā cingentē costas attingant. At inflāmatis interdum intercostalibus musculis, dilatio arteriarū dolorem necessariò infert. Proinde æger pro magnitudine inflāmationis, sentiet in parte inflāmata ipsum dolorē pulsatilem. Igitur pulsatilis dolor (qui vehementes partium sensibiliū inflāmationes sequitur) arterias ipsas primario affectu molestat: per consensum autē cæteras partes sensibiles, eò quod à vicinorum contactu premantur. At neq; in hepate, neq; in renibus unquam hujuscemodi pulsatio percipitur: quoniā nullus per totū corpus ipsorū, sicuti nec per pulmonē, nervus disseminatur. Quia verò membrana quæ eorū viscerū quodlibet ambit, & per quam dispergitur nervus, sensu prædita est: ob id nimirum in ipsis gravitatis sensus percipitur, ubi tumor aliquis præter naturam illa infestaverit. Etenim membranæ, cutis, adenēsq;, cum his partibus nullæ infint arteriæ, ubi inflāmata sunt, nō pulsatili, sed extensivo dolore cruciantur. In universum autē, primæ doloris species sunt duæ: una quidem, dum subito temperies mutatur: altera, dum cōtinuitas solvitur. Siquidem pars intenta, aut cōpressa, aut cōtusa, aut vulnerata, dolet ob continui divortiū. Ceterū nō eandem doloris speciem excitant mordax humor & plurimus: ille quippe rodendo, hic verò tendendo dolorē infert. Quantam autē vim habeat intemperantia ad inducendum dolorem, ex his licet planē perpendere, qui vehementer refrigerati, ad ignem manus affatim calfacere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt dolorem, præcipueq; juxta unguium radices. Similiter etiā per dolores vocatos colicos, ubi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quē vitreum Praxagoras nominat) in quopiam intestino crassiori est impactus, adeò torquetur ægri, ut videantur sibi circa ureterarū regionem terebro perforari: id quod olim mihi etiam cōcigit: cæterū injecto oleo rutaceo, cum id paulò post conarer excernere, excrevi humorem vitro fuso per similem. Sunt & alij dolores, per quos palus infixus videtur, q̄ & ipsi corpus affectū crassum esse significat. Differūt autē inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei dolorē faciētis potentia sive ea humor fuerit, sive spiritus flantulētus. Siquidem paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanens moto, ac denique minus refrigerans, eo qui vehementissimam refrigerandi vim obtinet, minorem solet excitare dolorem. Igitur sive clavo transfixus esse, sive terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum intestinū est referendus. Atqui hujuscemodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni non possunt, nisi quis accidētia quæ postea cōsequuntur, expectaverit. Utriusq; tamen doloris sunt cōmunia præsidia, & quidē calorifica in primis, sive ea extrinsecus adhibeantur, sive ea injiciantur. Deinde, nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorū quæ dolorem obrundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi existit, quod à Philone instituitur. Verū si lapis dolorē excitaverit, ipse interdum solus, interdū unā cū cruore excernitur, in urinisq; subsident sabulosa quædā. At si in collo affectus cōsisterit, nihil horū videtur: sed protinus inflatio quædam & extensio, & flatus complures, & tormina, & excrementa flatibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere, si & sup aquā natent, & bubulo stercore similentur. Quinetiā cibi tum cupiditas, tum concoctio, deterior evadit, & præsens, & præcedens, & quæ sequetur. Vētriculū nanq; male affici accidit, ut qui parti primario affectæ cōtinenter adhæreat. Insuper colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flantulētus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inanis permanet, & in præcordiis mordacitas, & fastidiū, & indigentia plurima. Igitur id genus dolores vehementissimi, consistere in crassis intestinis putantur. Qui verò mitiores sunt, ex duobus alterū necessariū est: aut quod in his ipsis sunt, sed à leviori causa orti: aut quod in tenuibus intestinis consistant. Porro qui mordaces dolores sunt, ij à mordaci humore intestinū erodēte fiūt. Unde dysenteriam semper hujusmodi dolores præcedūt, utpote per quā intestina ulcerētur. Cæterū dysenteria illa, quæ veluti faculentū sanguinē excernit abundantissimè, jecinoris affecti cōcietur esse symptoma. Ea verò per quā syncerus, multusq; sanguis excernitur, plerūq; universum corpus evacuat, haud secus q̄ hæmorrhoides, aut muliebre profluvium. Ut verò ad dolorū differentias revertar, punctorius dolor potissimū circa membranas cōsistit. Quāobrem lateralis dolor, punctorius esse censetur. Jā verò hæmodia, sive dentium stupor,

menter refrigerati, ad ignem manus affatim calfacere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt dolorem, præcipueq; juxta unguium radices. Similiter etiā per dolores vocatos colicos, ubi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quē vitreum Praxagoras nominat) in quopiam intestino crassiori est impactus, adeò torquetur ægri, ut videantur sibi circa ureterarū regionem terebro perforari: id quod olim mihi etiam cōcigit: cæterū injecto oleo rutaceo, cum id paulò post conarer excernere, excrevi humorem vitro fuso per similem. Sunt & alij dolores, per quos palus infixus videtur, q̄ & ipsi corpus affectū crassum esse significat. Differūt autē inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei dolorē faciētis potentia sive ea humor fuerit, sive spiritus flantulētus. Siquidem paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanens moto, ac denique minus refrigerans, eo qui vehementissimam refrigerandi vim obtinet, minorem solet excitare dolorem. Igitur sive clavo transfixus esse, sive terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum intestinū est referendus. Atqui hujuscemodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni non possunt, nisi quis accidētia quæ postea cōsequuntur, expectaverit. Utriusq; tamen doloris sunt cōmunia præsidia, & quidē calorifica in primis, sive ea extrinsecus adhibeantur, sive ea injiciantur. Deinde, nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorū quæ dolorem obrundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi existit, quod à Philone instituitur. Verū si lapis dolorē excitaverit, ipse interdum solus, interdū unā cū cruore excernitur, in urinisq; subsident sabulosa quædā. At si in collo affectus cōsisterit, nihil horū videtur: sed protinus inflatio quædam & extensio, & flatus complures, & tormina, & excrementa flatibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere, si & sup aquā natent, & bubulo stercore similentur. Quinetiā cibi tum cupiditas, tum concoctio, deterior evadit, & præsens, & præcedens, & quæ sequetur. Vētriculū nanq; male affici accidit, ut qui parti primario affectæ cōtinenter adhæreat. Insuper colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flantulētus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inanis permanet, & in præcordiis mordacitas, & fastidiū, & indigentia plurima. Igitur id genus dolores vehementissimi, consistere in crassis intestinis putantur. Qui verò mitiores sunt, ex duobus alterū necessariū est: aut quod in his ipsis sunt, sed à leviori causa orti: aut quod in tenuibus intestinis consistant. Porro qui mordaces dolores sunt, ij à mordaci humore intestinū erodēte fiūt. Unde dysenteriam semper hujusmodi dolores præcedūt, utpote per quā intestina ulcerētur. Cæterū dysenteria illa, quæ veluti faculentū sanguinē excernit abundantissimè, jecinoris affecti cōcietur esse symptoma. Ea verò per quā syncerus, multusq; sanguis excernitur, plerūq; universum corpus evacuat, haud secus q̄ hæmorrhoides, aut muliebre profluvium. Ut verò ad dolorū differentias revertar, punctorius dolor potissimū circa membranas cōsistit. Quāobrem lateralis dolor, punctorius esse censetur. Jā verò hæmodia, sive dentium stupor,

Colicos dolores oriri a humore vitreo, impactato in aliquo intestino crassiori.

Oleum rutaceum colicis doloris est medium.

Dolorum humores, et minores ferant.

Crassius in dolore dignoscitur.

Doloris causa, et eius ab impactu lapidis oritur, sunt munia prædicia.

Philonis Colicis doloris, et lapidis, diversitas.

Colicos dolores quæcedant, et promat.

Dysenteria dolores præcedunt.

Dysenteria hepatica.

Dolor punctorius.

Hæmodia.

stupor, solis dentibus & gingivis accidere solet, ubi quispiam & austeros & acidos cibos ingesserit. Cæterum complura alia dolorum genera sunt ab Archigene prodita, sed quæ prorsus intelligi nequeant: qui sanè vir, ita omnium affectuum proprietates descripsit, ac si omnes ipse fuisset perpeffus: quod non verisimile est. Præterea ubi ait, hemicraneas sphacelodes circumscribi, hoc est, submoveri à dissectione vasorum, minimè declaravit quidnam sphacelos esset: de cuius vocis significato varij variè opinantur. Dein dolorè pulsatorium & turgidum inferri ab arteriis cõtendit, ubi ipsæ per hemicraneas sphacelodes primogenia affectione laborant. Est autè turgidus dolor, qui à parte primario affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adjacentes trãsfertur. Id quod non solùm in hemicrania, sed in cephalæa etia solet accidere. Sed neq; illud etiã est verum, affectos nervos protinus intorqueri, indurarique: cum reperiatur nonnulli affectus, per quos laxiores evadunt nervi, quemadmodum per atrophiam conspicuum est. In inflammationibus autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenduntur nervi. Cæterum inflammatis partibus, præter tensionem accidit ut rubescant, renitentur, intumescant, & doleant. Adverte tamen interim, propriæ actionis læsionem, esse singularium partium proprium symptoma. Porro convulsiones nervorum, Hippocratis testimonio, & à plenitudine, & ab inanitione oriuntur, cum nimirum nervi per eas dispositiones immodicè tedi possint: quemadmodum chordæ in cithara, quæ à contrariis aeris statibus, sive humidus fuerit ille, ut rigare ipsas implereq; possit, sive vehementer aridus, ad ultimam tensionem perveniunt. Quamobrem citharistæ, ubi instrumenta post usum reponunt, solent chordas ipsas laxare. At quod Archigenes dixit, profundos esse dolores nervorum: id ab accidentibus quæ plurimis nervorum eveniunt, est sumptum. Etenim cum venæ quidem semper priores in superficie consistent: deinde post eas arteriæ, quibus tandè nervi subduntur: id circo laborantes tensionem in imo sentiunt. Quamq; multi tendones (quæ corpora sunt nervosa) non profundos, sed in superficie dolores habent, si quando ipsos sic quoq; tendi contigerit: ut sunt illi qui extendunt digitos. Minimè autem nervis accidere potest affixus dolor, ut falsò profitetur Archigenes, cum magna ex parte doloris ipsorum ad infernas supernasq; extendantur partes. Jam verò membranarum dolores in latitudinem protenduntur: videnturq; esse æquales, quod univsum illarum corpus æquale existat. Semper tamen ubi intenta particula sensu acutiori est prædita, ibi vehementior infestat dolor. Ad hæc pleuriticorum nonnulli jugulū dolent, porrecta in hunc locum succingente costas membrana. Aliquando ad præcordia descendit dolor, percepto ipsius sensu in septo transverso, utpote q; necessario movetur, cum pleuritici respirant, idq; magis q; cæteræ ipsius thoracis partes. Ubi enim veluti radix doloris consistit in latere, tum labores, musculis qui illic sunt, respirare pigritant: ac proinde soli septo transverso respirationis munus cõmittit natura: quemadmodum in bene valentibus, qui

leni, ac minimè violenta utuntur respiratione. Igitur cum in internis partibus lateris inflammatio aliqua oritur, septum transversum intentum impenitus dolet. Cum verò in supernis, tunc jugulū potius dolor infestat. Ubi ingens in hepate inflammatio oritur, aut ubi ipsum est induratum, dolor qui tunc jugulum in dextra parte infestat, cavæ venæ magis q; membranarum tensionem sequitur. Quod autem membranarum quæ ossibus adjacent, dolores profundi sint, & veluti dolentium ossium quandam imaginem referant, haud quidem mirandum est. Proprius autè arteriæ venæq; dolor, extensa secundum longitudinem corporis, veluti chordæ cujusdam speciem refert, nullam gravitatem inducens. Porro ulcerosus dolor non solum ad cutem, sed ad imas quoq; partes, ut ossa extenditur. Pruriginosus autè ad solam pertinet superficiem: non tamen primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidens, * quod nimirum cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine superet. Horum ergo dolorum uterq; propriæ dispositionis est accidens. Fiunt autè ob quosdam humores acres: tantumq; ipsi inter se, quantum dispositiones à quibus oriuntur, dissident. Verum quia crebro dispositio pruriginosa, ulcerosam antecedit, necnon soluta quiescenteq; ulcerosa in pruriginosam fieri trãsmutatio assolet, inde est quod de ipsis scripserit indistinctè atq; confusè Archigenes. Qui quidem ubi etiã ait, * pungentem dolorem in profundo esse, perperam hallucinatur: quando quidem ad membranas is, non ad imas partes propriè pertinere videtur. Similiter ubi infixum dolorum vocat, cum sinus accesserit, sermo illius absurditate non caret. Quippe sinus cavitas quædam est, cum partium antea cõjunctarum, altera distat ab altera. Ubi igitur fluxione impletur, ita ut adjacentes partes tendantur, tunc tensivum dolorem sentiunt laborantes, non quidem longo spacio porrectum, sed propriis limitibus circumscriptum. Præterea dum ait, hepatis dolorè in hærentem, hoc est, eodem in loco permanentem, existere, an non etiam veris contraria profert? Siquidem hepatis dolor, si quispiam alius, vicina corpora ad consensum perducit. Nam & ad jugulum usq; porrigitur, & spirandi difficultatem creberrimè infert: atq; interdum tussim quoque, & dysenteriam excitat: nec raro nothas colicas infestat. Porro inter vehementer respirandum nonnunq; gravitatem in dextra præcordiorum parte sentimus. Cæterum si id citra febrim eveniat, aut obstructione, aut dura dispositione, hepar laborare conjicito. Nam ubi inflammatione infestatur, tunc febrim adesse est necesse.

CAPUT III.

Igitur ad inveniendas affectas sedes, in primis querere oportet, an singulorum locorum, quomodocunq; afficiantur, propria signa inveniri possint: an pro affectuum ratione alterentur. Deinde, utrum singulorum affectuum propria sint signa: an circa quamlibet partem varietur. Postea verò expedit, loci simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ita acciderit, ut pulmo inflammatione laboret, tanta spirandi difficultas orietur, tataq; angustia, ut suffocari laborantes videatur, ac recti sedere conentur: quæ affectus

Dolor ab inflammatione hepatis.

Dolor membranarum ambientium ossa.

Dolor arteriæ & venæ.

Dolor ulcerosus & pruriginosus.

Cutis superat omnes subditas sibi partes spissitudine.

Dolor pungens

Sinus quid.

Dolor tensivus quando accidat.

Dolor hepatis vicina corpora in consensum adducit.

Hepatis inflammationi necessario adest febris.

Pulmonis inflammationi symptomatica.

Orthopnea.

Etum vocat orthopnoeam. Quinetiam calidam sentiunt * expirationē, idq; maximē si erysipelatis particeps ipsa inflammatio fuerit: quamobrem ubi plurimū efflant, juvantur, inspirareq; abundanter frigidum aërem desiderant. Sputū verò ipsum modò hoc, modò alio expuunt colore tinctum. Insuper gravitatis cujusdā thoraci incumbētis sensum sæpenumero ægri percipiunt, ac dolorem eximo ad ipsum pervenire, & ad pectus, & ad spinam. Præterea febris acuta ipsis ad est. Pulsum verò habent, qualem in libro de Pul-

Pleuritidi que ad sint Symptomata.

fibus diximus. Similiter ubi membrana costas succingens est inflammata, acuta febris infestat, simulq; dolor punctorius, unā cum spirandi difficultate. Magna etiam ex parte sputū colore infectū apparet, haud secus q̄ in peripnevmonia. Igitur utrunq; affectū, respirandi difficultas necessariò cōsequitur, eò quod affecta particula spiritus instrumentū existat. Oritur autē febris, & propter affectū ipsum (calidus enim effectus est inflammatio) & propter positū. Nam & pulmo, & succingens costas membrana, prope cor cōstant. Sic etiam tussis ipsis ut spiritalibus convenit. Sed quod aliquid expuatur, id ab affectu pcedit. Quippe jam ostendimus, omnē inflammationem ex affluente sanguine fieri. Quapropter si biliosus sanguis fuerit, flavum aut pallidū erit sputum: si pituitosus, spumans & candidū. Si melancholicus, aut nigrum aut lividum. Si nihil horum infecerit sanguinē, rubrū. Quinetiā in laterali morbo sæpenumero magis biliosum: in peripnevmonia verò magis pituitosum sequi sputum consuevit. Quod autem inflammatarū thoracis partiū excrementa, per asperam expurgentur arteriam, in causa certē est, tum positus earū, tum formatio, ut quæ per solam hanc viam effluxum sortiantur. At verò ventriculus duos habet meatus: ac quod in eo vitiosum est, supernatare solet, vomitioneq; ejicitur: quod autē in intestinis subidet, dejectione vacuatur: veluti renū velicæq; excrementa, mejēdo excernūtur. Nam quæ redundant in cerebro, per nares præcipuē, nonnunq̄ per palatum & aures exterminātur. Sedes itaq; affectæ dignoscūtur & ab accidetibus, & ab actione læsa, & ab excrementorū qualitate, & à tumoribus præter naturam, & à doloribus, & à coloris vitio, quod sequitur, vel in universo corpore, vel in una quapiam parte, vel duabus, idque maximē in oculis & lingua: quibus addere potes etiam eam affectionē, quæ per consensum affligit. Præ autē in hisce omnibus exercitatio, ubi particularia sub eandē viam & rationē ducūtur. In primis igitur intueri oportet, num sit actio aliqua læsa: quippe cum ipsa propriū aliquod instrumentū affici necesse est. Deinde, ubi actionē esse læsam perspexeris, ad modum læsionis accedendo, considera ad quem affectū propriè pertineat. Postea partē affectam expende, num tumore quodam, aut dolore infestetur, & quidem accurate cujuslibet horum speciem investigando. Fingamus ergo, ut quispiam inter respirandum, in notharū costarum regione doleat: non protinus hunc esse pleuriticum suspicari debes, sed in primis quidē, an tussiendo aliquid expuat, cōsiderare. Idenim si coloratū videris, tunc ægrum

dices esse pleuriticū. Quod si tussiendo nihil omnino expuat, fieri potest ut nihilominus pleuricus sit ille quidem, sed inflammationē habeat in coctam adeò & impactā, ut nihil ab ea foras ejici possit. Fieri quoq; potest, ut ob hepatis inflammationē dolor in jam dicta sede excitetur. Ceterum ex differentia pulsus, ex dejectionibus, ex tumore præter naturā, ex gravitate & pondere, ac deniq; ex aliis notis, quæ hepatis inflammationi sæpe solent accidere, jecorariū affectū à pleurítico licebit nobis discernere. Verū in hujusmodi dispositionibus, solidum firmumq; discernendi indicium, per omne tempus morbi, à pulsu sumendū est: deinde tractu temporis, reliqua etiā consideranda. Nam & linguæ, & universi corporis color alteratur, ubi hepar vitiatum est. Sicuti rursus thorace affectio, increscit tussis, atq; sputa cernuntur. Distinguendi tamen sunt interim affectus qui primarij dicuntur, ab ijs qui per cōsensum affligūt. Nā si in pleuritide vel peripnevmonia delirium aliquod incidat, existimandum est principem animæ sedem, in qua & scientia, & opinio, & cogitatio consistit, consentire thoraci, atq; ob eam necessitudinem affici: in aliis autem affectibus, ut in lethargo & phrenitide, minimē consentire, sed laborare affectu primario: undiq; verò affici, ubi propriarū ipsius functionū aliqua oblæsa fuerit. Proprias enim functiones dico, quæ à nulla alia parte ut instrumento, fiunt. Nam revera & videre animam, & audire, haudquaquā negandum est: sed videre oculis, & audire auribus. Atq; ut cogitet, reminiscatur, existimet, eligat, neq; oculis, nec lingua, nec alia quapiam parte utitur. Verū quod * dux sensus & voluntarij motus sedem habeat in cerebro: quodq; cerebrum cōtegatur menyngibus, alibi à nobis est declaratū. Si igitur per solum consensum cerebro affecto, illa pars quæ primitivo affectu laborat, curata fuerit, priusquā cerebro propria aliqua dispositio eveniat, nullū in ipso accidens relinquetur. Quod si ex cōsensu permanēs aliqua in ipso dispositio remaneat, nō solum parti primariò affectæ, sed capiti quoq; remedia adhibenda sunt. Quapropter exactē definire, utrū cerebrū, an membrana ipsius primitivè afficiantur, haud magnam utilitatem asferre potest, cum in utraq; dispositione capiti succurratur eadem medendi ratione. Præcipuē verò danda opera est, ut morbi essentiā deprehendamus: qua cognita, facile nobis licebit per contraria curationem moliri. Itaq; non tantū affectum locum, sed causam etiam inferentē noxam, cōsiderare oportet. ut, exempli gratia, delirium est ejus actionis symptoma, quæ à loco mentis compote prodit: similiter sopor stupidus: sed à contrariis causis oriuntur. Siquidem & vigiliam, & delirium, causa potestate calida efficit. At quotquot somnolenti soporisque affectus existunt, omnes à frigida causa proveniūt: id quod ex medicamentorū natura planē discere licet. Quippe frigida stuporem soporemq; calida verò vigiliam & varias motiones inducunt. Tenuis etiam victus ratio, & vinum meracius, vigiliam parit, præcipuē si vinum ipsum fuerit suapte natura calidū, aut etiā antiquius valdē. Etenim calida causa motum ex-

Jecorariū affectus à pleuritico quomodo discernatur.

Hepate affectus à pleuritico totius corporis color. Affectus maris qui per cōsensum affligūt, distinguendos. Anima, capis sedem, quando per cōsensum affligatur. Propria actiones capis quæ cantur.

Originē sensus & voluntarij motus cōsiderare in cerebro. Affectum per cōsensum curatio.

Cerebri eius membra narium & alibi eas succurrere dendi ratione.

Essentia in primis est cognoscenda.

Curationem per contraria moliri esse.

Deliria & sigilia à frigida causa calida videntur.

Soporosi & stupidi oritur à causa frigida.

Vinum meracius eius indicat.

citat

Cerebri excrementa per quas regiones vacuantur. Sedes affectæ unde dignoscatur possit.

Thoracis partes inflammatae expurgantur per asperam arteriam.

Inflammatio omnis ex affluente fit sanguine. Sputa pleuriticorum speciem diversa.

lida cur-
gias effi-
nat.
igida cur-
mant so-
rem.

citatur, ob idque; vigilias affert: frigus autem ociosum, & ad motiones pigrum reddit animal: qua ratio ne somnum soporemque conciliat. Igitur qui hac intelligit, cum per ardentium febrium vigorem, hominem viderit & vigilare & delirare, deinde inclinante jam febre, & dormire & recte sapere, in capite nullam propriam esse dispositionem, sed à febris abundantia calore delirium fieri, perpendet. Quippe tunc affectus proprius putandus est, cum permanere in parte quapiam conspicitur. At ubi pars aliqua simul cum alia sic afficitur, ut irritata quidem una, altera infestetur vehementius: remissa verò irritatione, quiescat, eam per consensum affici putandum est. Sic etiam contingit, ut cum febrium accessiones invadere incipiunt, sopore laborantes graventur: quod eo tempore cerebrum sit vehementer refrigeratum, alio qui paratissimum, ut noxam eiusmodi subeat, cum nimirum frigidiori intemperie sit præditum. Gignitur autem sopor, vel ab intemperie frigida, vel à pituita in cerebro exuperante.

GALENI PERGAMENI

de locis affectis, lib. III.

mediorum
tio qua
era de-
stratio-
aratur,
is que ra-
onungit,
e experi-
a prastat

Igitur ad cognoscendas affectas sedes, curandosque; illarum affectus, accurata inquisitione est opus. Cæterum per artis exercitationem comperi, eam remediorum inventionem, quæ ex vera demonstratione oritur, in iis quæ raro contingunt, experientia longè præstare. Nam experimenta duntaxat sectantes medici, non ea quæ raro, sed quæ crebrius accidunt, memoria & imitatione assequuntur. Quocirca dispositionum raro evenientium, non solum curationem, sed prævenientes etiam notiones ipsarum, negligunt. Ego verò semper investigare studui, quanam sedes vel afficeretur ipsa, vel alteri consentiret. Cumque; eam inventam esse arbitrarer, tunc ad dispositionem eius investigandam, atque; ex utrisque; totius curativi generis indicationem sumendam, ac denique remediorum qualitatem, quantitatem, idoneamque; materiam comparandam, me accinxit: haud neglecta interim, ætatis, naturæ, temporis, regionis, aliorumque; id genus omnium contemplatione. Deprehendi autem possunt affectæ sedes ab excrementis, atque; ab iis quæ affectis partibus adnascuntur, necnon à functionum noxa: quibus connumeratur & color præter naturam, figuraque; Verum ubi nulla mihi pateret aliàs via, sola functionis læsio fuit satis, ad inventionem affectarum particularum.

CAPUT II.

memoriam
sam re-
uro,
int con-
anda.

Cum autem exoletam cujusdam memoriam restituere conarer, primum quidem apud meipsum investigavi, quanam pars esset affecta, cui localia adhiberem præsidia, prius videlicet universi corporis vacuatione præmissa, quod præceptum est in morbis omnibus observandum. Deinde, qua via & ratione invenirem singula remediorum. Cæterum affectam sedem eam ipsam existimavi, qua princeps, animi vis continetur. Medicamenta autem ea adhibenda esse, quæ hujus sedis dispositioni reluctarentur. Cum igitur hujus inquisitionis gratia consuluissem epistolam quandam ad Marium, ab Archigene scriptam, in qua

jubet, depravata memoria, raso capiti affigi cucurbitulas, non injuria sanè inconstantia hominis sum demiratus: quod nimirum neglecto corde (cui memoriam ipse, seu opus cognatum tribuit) ad caput remedia transferret. Nam quid per immortales deos ex affectorum locorum notitia (quæ ipse ad medendi rationem ait maximè necessariam existere) consequemur utilitatis, nisi ab ipsis ad remediorum inventionem ducamur? Ad hæc, si affectio quæ oblædit memoriam, existat frigida & sicca, nullum usum adferunt cucurbitulæ ad motum, sive ex incisa prius cute, sive integra, administrentur. Si quidem detractio sanguinis, quæ sit, ubi scarificata prius cutis fuerit, ad extremum ducit periculum. At citra ulla scarificationem cucurbitulæ adhibita, solius excitandi caloris gratia utiles esse censentur: quippe attrahunt ad sese humorem eximo, id quod magnoperè aridæ dispositioni adversatur. Porro rationalem animæ vim in cerebro: virilem, irascibilemve, in corde: appetitoriam denique; in jecore sitam esse, nemini non persuasum existimo: idque; vel ex vulgari sermone indies discere licet. Fatuum siquidem ajunt carere cerebro: timido & pusillanimo, cor deesse. Tityo verò jecur ab aquila erosum, non solum poetæ, verum etiam pictores, sculptoresque; fingunt. At verò, quæ admodum si ratio lædatur, sæpenumero contingit lædi memoriā: sic si memoria vicietur, ratio ipsa quodammodo etiā labefactatur, utpote actionis utriusque; noxa procedente ab eadem dispositione: quæ ubi vehementius intèditur, simul cum memoria ratio quoque; omnino deperditur. Ac talis quidem affectio stultitia vocatur, Sic in lethargo etiā, in omnibusque; soporosis affectibus, utraque; simul pereunt actiones. Quod autem affectus hi à frigida intemperie oriatur, quæ animales, actiones omnino torpidas reddit, sanè id vel ex animalibus ipsis, quæ per frigora latere coguntur, satis liquido constat: necnon ex frigidis tum medicamentis, tum cibis. Lactuca quippe graves inducit somnos, si multam quis ipsius quantitatem ingererit. Verum & capitis gravitates, quæ sine moriadi infestant dolore, somnum soporemque; conciliant: quibus apophlegmatismi magnificè opitulari videtur. Igitur ut capitis ardor vigilias, sic refrigeratio inducit soporem. Item biliosi calidi que; morbi, vigilias, deliria, phrenitides: contra pituitosi frigidi que; ignavia soporemque; efficiunt. Nam quod ad vigilias soporesque; per morbos pertinet, calida frigidaque; intemperies primam sibi facultatem vèdicat: altera verò ab hac, ad humilitatem ariditatemque; refertur. Balneæ siquidem, eo quod ma-

Archigeni
in constan-
tiam demira-
tur Galenus.

Memoria ob-
læsa à causa
frigida & sic-
ca, cucurbitu-
las ad motum
admotas non
esse ex usu.
Cucurbitula
sine scarifica-
tione adhibi-
ta, solius exci-
tandi caloris
gratia sunt
utiles.

Anima fa-
cultatum sin-
gulis quæ se-
des tribuan-
tur.

Tityo erosum
jecur ab a-
quila fingunt
poetæ.

Ratione læ-
sa, sæpe me-
moriam lædi
contingit: ut
è converso.
Stultitia
quid.

Frigida in-
temperies,
animales ac-
tiones omne
no reddi tor-
pidas.

Lactuca sopo-
rem gignit.
Apophlegma-
tismi quibus
affectibus
conferant.

Vigilias qui
morbi infe-
rant.

Balneæ cur-
soporifera.
Vinum modè
sumptum
inducit som-
num.

Pueri cur-
somnia.
Senes cur-
vigiles.

Stultitia un-
de oritur.

Actiones principales. Actiones in rationales.

Vigilans sopor.

Caput quadrupliciter afficit.

Stultitia est intellectus amissio.

*Memoria exoleta, vel gra-
viter laesa,
causam esse
intemperiem
frigida cere-
bri, quae ca-
lescienda
est.*

*Affectus pri-
mogenij siue
primarij, qui
sunt*

*Affectus per
consensum,
qui dicuntur.*

*Anima prin-
cipalium fa-
cultatum af-
fectus, consi-
stunt in cere-
bro.*

frigiditate humiditateq; verumetiam in ariditate & calore, non parvum secundum magis & minus, discrimen sit: nihil mirum, si multifariae inveniantur causae quae animales actiones laedere possint. Impraesentiarum autem, clarioris doctrinae gratia, rationalis animae actiones, principales: irrationales vero, morales vocentur. Cum autem bifariam fieri contingat intemperies praedictas, duplex quoque erit utriusque dispositionis modus: unus quidem, in humidis siccisque humoribus: al-
ter in corporibus solidis, si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidae partes inciderint. Praeterea quavis ipsae intemperies inter se sint contrariae, * fit tamen ex ipis interdum mixtum quoddam temperamentum: ut in vigilanti sopore, in quo pituitosus biliosusque humor exuperat. Ita in calidi frigidiq; contrarietate, eosdem quoque modos invenire licebit, tum per simplices intemperantias, tum per compositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixta ex contrariis dispositione fieri fateamur, tres sic prodibunt in utraque contrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes capiti adveniri solent, sed inter se differunt, non solum mixtionis varietate, aut eo quod magis minusve inteduntur, verumetiam quia interdum afficiuntur ventriculi cerebri id genus intemperantias, interdum universa eius vasa, aut humiditas dispersa per corpus cerebri. Accedit ad haec quartus quoque modus, cum videlicet ipsummet corpus cerebri intemperatum redditur.

CAPUT. III.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus perit (intellectus enim amissio, stultitia est) somnos observare oportet. Praeterea, utrum excernant quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod a capite defluat: an aridae huiusmodi partes sint. Quippe ex ijs dispositione ipsam consequi conjectura poterimus. Ubi igitur vel perit, vel graviter laesa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri: quocirca calfacere ipsum oportet. At vero exiccare, vel humectare, non necessarium est: sed si humiditati copuletur, arefacere: si ariditati, madefacere. Ceterum si inter has medium obtinet, ipsum est conservandum. Interdum vero ubi principales actiones sunt laesae, febris quoque accedit: ut in phrenitide & lethargo. Interdum sine febre adest vitium: ut in mania, & melancholia: id quod modo per consensum, modo primaria affectione cerebro laborante, accidit. Etenim ubi propriis accidentibus exprimitur huiusmodi vitia: permanentiaque sunt, nec aliis praecedentibus, superveniunt, primogenia dicuntur esse. Ubi vero propriis accidentibus minime limitantur, neque perpetuo permanent, atque ad alias affectiones sequuntur, per consensum ipsa evenire dicimus. Nec interim latere nos debet, ubi quis lege consortii afficitur, fiatque adhuc affectio, quod deletis efficientibus eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autem consentientes partes permanentem jam habeant dispositionem, quavis causa efficiens coquiescat, ipsa tamen permanebit affectio. Quod autem in cerebro consistant omnes principalium animae virium affectus, pro confesso habent omnes medici, qui studio veritatis tenentur: sicuti & quod omnes nervi qui voluntatis imperio au-

diunt, a cerebro ducant originem. Convulso siquidem universo corpore, omnes profecto autumant, talem quamprimum affici partem, quae ut in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit communis omnium nervorum origo. Si igitur partes omnes quae infra faciem sunt sitae, convulsae sint, primas spinalis medullae partes affectas esse putandum est, ac proinde illis opitulandum. Si vero simul cum universo corpore facies quoque convulsa videatur, * non modo spinalis medullae exortum, sed etiam cerebrum ipsum, a quo nervi faciei oriuntur, curamus. At vero si crux tantum, aut altera manus convulsione tentetur, totius membri convulsio nervorum, qui ad ipsum feruntur, principium affectum esse declarat. Ceterum cum omnis motus a voluntate profectus, attractis musculis in eas quibus innascuntur partes fieri videatur: ne fieri possit attractio, nisi ad suam originem retrahatur musculus, constat convulsione in convulsis partibus factam, hac sola ratione a motu naturali differre, quod praeter voluntatem fit. Porro ipsam convulsione nervorum, ob plenitudinem vel inanitionem fieri, quaverissime professus est nobis Hippocrates: id quod vel ex fidelibus instrumentorum (quae ob utranque intemperiem ambientis aeris, humidam nempe & aridam adeo tenduntur ut disrumpantur) liquido constat. Si igitur convulsio fiat vel a labore, vel vigiliis, vel fame, vel solitudine, vel arida aestuantique febre, quale est videre in phreniticis, causam eius ariditatem, inanitionemque, recte putaveris. Sin vero temulento cuipiam, ac omnino pleno homini convulsio accidat, non ab re ipsam a contraria causa judicabis ortum habuisse. Atqui inanitioni contraria est repletio. Jam comitialis morbus convulsio est omnium corporis partium, minime quidem perpetua (ut in emprosthotono, opisthotono & tetano) sed quae ex temporum accidit intervallis. Nec solum hac re, sed mentis quoque & memoriae, ac sensuum oblatione, a jam dictis convulsionum generibus differt. Unde constat in cerebro hunc affectum consistere. Ceterum velox eius discussio, crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem, hunc maxime affectum peperisse declarat: nervorum principio seipsum quatiente, quod excutiat id quod infestat. Itaque non ab ariditate, inanitione, sed a crasso & viscido humore, impediente animalem spiritum, quo minus deferatur in corpus, hanc affectionem gigni argumento est, quod subito & fiat, & solvatur. Siquidem brevi tempore fieri non potest, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana, ad tantam ariditatem perveniat, ut corio simile quippiam patiatur. In corpore itaque cerebri, anima suam sedem sortitur: in quo etiam fit tum ipsa ratiocinatio, tum recordatio sensibilium imaginum. Primum autem instrumentum ipsius animae, tum in sensibilibus actionibus universis, tum in ijs quae a consilio & voluntate proficiuntur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventriculis continetur, sed praecipue in postremo: quavis non contentendus sit medius ventriculus, quem amplecti multis rationibus cogimus, ut duos anteriores deferere. Satis tamen fuerit ad curationem, nosse sedem affectam esse ipsum cerebrum: atque in eius ventriculis humorem crassum & viscidum con-

Nervus animalis a cerebro ducit originem.

Convulsio quo differt a naturali motu.

Convulsio ob plenitudinem vel inanitionem.

Epilepsia convulsio versus corpus, quae ex temporum accidit intervallis.

Epilepsia consistit in cerebro.

Epilepsia de gigni.

Animae catur in cerebro.

re in quae ratiocinatio fit, & memoria.

Animae spiritum animalis.

spiritus animalis in cerebro continetur.

tur, sed praecipue in postremo.

prehendi,

prehendi, nunc pituitosum, nunc melancholicum. Pituitosum in presentia humorum appello, in quo humiditas frigiditasque: ut melancholicum, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Ac pituita quidem unum genus est, quod quotidie vel screando, vel vomendo, vel emungendo educitur, vaporoso spiritu plenum, ut ne sensu quidem lateat ipsum esse dissimulare. Alia vero pituita, similis quidem videtur, licet fortassis non similis existat: qualis est tum crudus humor, qui in urinis subsidet: tum is qui a Praxagora vitreus vocatur. Ex quo genere videtur esse & saliva, quae neque fluida admodum sit, neque aquosa. Verum saliva non unica duntaxat qualitate gustum solet afficere, nedum universa pituita. Sic atra bilis quoque ob substantiae varietatem non obscuras differentias sortitur. Nam alia est veluti fax sanguinis, quae admodum spissa existit, facibus vini haud ab similis. Alia vero, quae superior essentiae est multo tenuioris: atque vomentibus ipsam & olfacientibus videtur acida. Haec etiam attollit in bullas terram, eamque radit, atque fermentat. At illa quam facis vini similem esse dixi, in terram effusa non inducit fervorem, nisi forte in ardenti febre ipsam praestari contingat: neque ulla etiam acida qualitate participat: quare iudicio meo potius melancholicus aut succus aut sanguis, quam atra bilis, dicenda est. Igitur ut crassus pituitae succus, ita hic quoque comitialis morbum solet efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Ubi vero in ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem, quam Graeci vocant melancholiam, inducit. Quemadmodum alter atrae bilis succus, qui praestata flava bile nascitur, ferina gignit deliramenta, modo cum febre, modo absque illa, in cerebri corpore abundans. Atque hanc ob causam phrenitis nonnunquam est mitior, ubi a pallida bile ortum traxit: interdum vehementior, ubi flava bilis eam peperit. Deliria autem quae per febrium vigores accidunt, non propria cerebri affectione, sed per consensum fiunt. Quamobrem sic delirantes, minimè appellamus phreneticos, quia phreniticorum insania non quiescit mitigato febrium vigore. * Quemadmodum igitur phreniticorum febris, unum quoddam ex symptomatibus dispositionum cerebri iudicatur, sic ardentium febrium symptoma delirium est: quod nimirum sit elatis ad cerebrum multis vaporibus calidis. Haud secus gignitur ea affectio, quae suffusioni est per similis, a ventriculi dispositionibus ortum trahens. Namque ventriculo cerebrum, cerebroque ventriculus, suas affectiones transmittit, idque propter nervorum a cerebro ad os ventriculi descendentium magnitudinem: per quos etiam sensus huic particulae, quae ulli reliquarum corporis partium, acutior est. Quocirca fracturas quidem capitis, ubi ad membranas usque perveniunt, biliosus vomitus: capitis autem dolores quomodocumque fiant, nausea stomachique morsus consequitur. Hypochondriacas vero & flatulentas vocatas affectiones, melancholica comitatur tristitia: haud secus quam acutas febres delirium, & nonnullas oris ventriculi dispositiones, affectio suffusioni per similis. Sic nervosis partibus inflammatis, promptius quam reliquis, delirium supervenire solet: idque ascendente

ad caput interdum per continuas partes solo calore, interdum spiritu vaporoso, vel fumoso, vel fuliginoso.

CAP. IIII

Igitur crassi humores qui in cerebri substantia abundant, interdum ei veluti instrumentali, interdum ut simili nocet. Cum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: cum vero alteratur temperamentum, ut simili. Proinde rectè ab Hippocrate dictum est: Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes, melancholici evadunt. Atque horum utrumlibet magis accidit, prout vel in hanc, vel in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus epileptici: si vero in mentem, melancholici evadunt. Cum autem non solum ab atra bile, sed etiam a pituita morbus comitialis oriatur: sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholiam transire posse. Etenim cum anima ipsa, aut temperamentum activarum sit qualitatum, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam ubi cerebro, veluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus converti ait: id quod in obstructionibus fieri constat. Cum vero temperamentum mutando, ei veluti simili nocet, ad mentem eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnunquam universo in venis sanguine melancholico effecto, ob commune vitium, ipsum quoque laedatur. Nonnunquam vero totius corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idque bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum derivatur: aut in ipsomet melancholico humore genitus est, cum videlicet internus calor aut flavam bilem, aut crassum atrumque sanguinem superassavit. Si igitur universum corpus redundet melancholico sanguine, curationem a venae sectione auspicari oportet: si vero cerebrum tantum, aeger tunc (quod ad hanc dispositionem pertinet) sanguinis detractione non indiget: quamvis ob aliam causam sanguis detrahi possit. Utrum vero melancholicus sanguis universum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis universi corporis habitum, qualis nam sit, accuratè consideres velim: meminerisque, quod molles & candidi, & obesi, nequaquam humorem melancholicum possident. Macri vero, & nigri, & hirsuti, & quibus latae sunt venae, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumulatur. Fitque interdum, ut admodum rubicundi, affatim melancholicum temperamentum contrahant: atque post hos etiam flavi, si praecipue vigiliis, & multis laboribus, & solitudine, & tenui victu educati fuerint. Cujus generis etiam haec notae existunt: si haemorrhoidis aliqua sit restricta, aut consueta aliqua sanguinis evacuatio: aut usus fuerit aeger cibis melancholici succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ferè sunt: caprina bubulaque caro, magisque hircina & taurina: sed maximè asinorum & camelorum carnes: itemque vulpinae & caninae. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationem momentum adfert etiam leporis esus, sed multo magis aprorum. Limaces quoque sanguinem melancholicum pariunt, si frequens sit eorum usus. Praeterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditae: necnon aquatiliū

Cerebrum quando afficitur ut instrumentum, et quando pars similis.

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt, et converso.

Atra bilis quando in cerebri corpore, et quando in animam repat.

Melancholicus sanguis in quibus minime habeatur, et in quibus omnium maxime accumulatur.

Cibi melancholicum suum gignentes.

aquatilium carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atq; cetaceorū omniū. Ex oleribus aut, brassica ferè sola, gignere sanguinem id genus cōsuevit: quemadmodum & arborum germina, ubi vel muria, vel oxyhalme conduntur, præcipuè lentisci, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminū verò omniū maximè lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox furfuraceus panis, & qui ex typha & vitiatis seminibus factus est. Præterea vina crassa, nigraque, aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Vetus etiam caseus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit, faciliè huiusmodi humorē procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicū succū. Ad efficaciorē autem notitiā, non parū confert anni tempus, ac præterita præsensq; ipsius constitutio: nec non regio, & laborantis ætas. His itaq; omnibus præmeditatis, si existimas in universi corporis venis contineri sanguinem melancholicū, quò certiorē habeas notitiā, cubiti venam secā, præcipueq; mediam quæ cōmunis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum fertur. Quòd si tum fluens sanguis non videatur melancholicus esse, supprimatur cōfestim. Si verò talis appareat, vacua quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conjeceris. Est præterea tertium melancholiæ genus, morbi comitialis exemplo, ubi ortum à ventriculo suscipit: solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriacū, flatulentumq; morbum vocare. Quem sanè (ut Diocles testatur) sumpto cibo concoctu difficili, statim ructus acidus comitatur: cum eoq; flatus & æstus. Ad hæc fluctuatio in præcordiis, non ilicò, sed ubi cibos venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum usq; extenduntur. Cæterū ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; aliis ingestis, eadē revertuntur symptomata, quæ interdum jejunos, interdū etiam à cœna affligunt, ita ut ægri vomant cibos crudos, & pituitam subamaram, calidamq; & adeò nonnunq; acidam, ut dentes torpere videantur. Atq; horū plurima statim ab ineunte ætate eveniunt. Utcunq; tamen acciderint, omnibus protelantur. Cujus morbi causam, calorē immoderatum venarum meseraicarū, obstructionemq; earundem, à crasso sanguine ortam, idem Diocles assignat. Videtur autē in ipso ventriculo per huiuscemodi affectus, inflammatio quædā consistere: sanguis autē in parte inflammata contentus, & crassior esse, & atra bili similior. Quo quidem exhalante ad cerebrum, melancholica eveniunt circa mentē symptomata. Frequentissimè etiam videmus, flava in ventriculo bile contenta, caput dolore affici: illa verò ejecta per vomitum, ilicò dolorē compesci. Atq; inter optimos medicos convenit, nō solum hæc accidentia, verum etiā epilepsiam, aliquando capiti à ventriculo oriri. Cæterū melancholicos ut nunq; deferit timor: ita eorū phantasmata præter naturā, non semper eodē genere cōtinentur. Siquidem alius se testam factum putavit: atq; idcirco obviantibus cedebat, ne collideretur. Alius, ne Atlas, qui mundū sustinere dicitur, gravatus sub tanto one-

re, illum à sese excuteret, atq; ipse cōminueretur cum eo pertimescebat. Differunt porrò inter se melancholici: nam omnes timent, morerent, vitā damnant, odio habent homines, sed non omnes mori cupiunt. Quippe hoc ipsum nonnullis melancholiæ caput exiit, quòd pertimescunt mortem. Sunt qui simul & mortem metuant, & mortem sibi consciscant. Quemadmodum igitur externæ tenebræ pavorē inducunt, sic atra bilis color, mentis sedem tenebris similem reddens, timorē efficit. Siquidem tum humores, tum ipsa temperies corporis, possunt animæ actiones mutare, id quod à nobis est demonstratū in eo libello cui titulus est, Quòd mores animæ corporis temperiem sequatur. Ergo si circa ventriculū prima inceperint ipsius morbi symptomata: quibus auctis melancholica sequatur affectio: deinde alvi dejectione, vomitu, pba coctione, ructibusq; levetur is qui laborat, hypochondriacū flatuosumq; ipsum morbum vocabimus. Accidentia verò ipsius dicemus & mœstitiā, & metū. Ubi verò propria melancholiæ accidentia esse auctiora videntur: circa ventriculum aut aut nulla, aut perexigua cernuntur: haud ab re existimaveris, primitivam in cerebro affectionē consistere, ob atram in ipso bilem cōgestam. Quem morbum minimè inveteratū, frequentibus balneis. victuq; humido & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse aliàs curavi. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat.

CAPUT V.

Morbus comitialis, similiter ut melancholia, tribus clauditur differentiis. Verum omnibus commune est, quòd afficitur cerebrum, sive primaria affectione, sive consortii lege. Prima igitur differentia existit, ubi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, ubi ab ore ventriculi per cōsensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodū per suffusiones contingit. Tertia deniq; fit rarò, cum à parte alia quavis ipse affectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum usq; perreptat. Quale genus morbi ipse adhuc adolescens primum vidi in puero tertiumdecimum ætatis annum agente: qui sanè narrabat, dispositionem ipsam à crure initium capere: mox illinc rectā ascendere per fæmur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad cervicem, donec perveniret ad caput: quòd cum primum tangeret, ipsum haudquamquam sibi constare. Interrogantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam aurem existere. Unde ex duobus alterū Pelopi præceptor placuit: aut quòd qualitas quædam, alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis substantia transmitteretur. Nec mirandū esse dicebat, tam validam vim esse humori, in affecta particula præter naturā genito, ut cum perniciosarum ferarum venenis componi posset. Etenim ubi phalangium momordit aliquem, quavis parvū existat animal, existimare tamen debemus, venenū ex ipsius ore, primò quidem in superficie, dein verò in totū corpus deferri. Præterea marine turturis, sicuti & terreni scorpionis aculeus,

Venā mediā in cubito percutiendam esse, qui sanguine melancholico abundat per universum corporis habitum.

Hypochondriaca ac flatulenta melancholia, quæ à ventriculo oritur, signa.

Hypochondriaca melancholia causa.

Epilepsiam aliquando oriri à ventriculo.

Melancholici nunquam deferunt vitam: Melancholici spiritus speciosa.

Atrabiles curantur timore conciliantur.

Hypochondriaci morbi qui dicuntur.

Melancholia remota qua rationabilis est causa.

Epileptici tres differentie.

Curantur epileptici habes vers. 2.

Pelopi præceptor.

Phalangium morsum.

Turturina aculeus.

aculeus, quāvis in extremā illam acutissimamq; partem finiatur, ubi nullū foramen est, per quod venenum dejici possit: necessum tamē est, ut excogitemus substantiam quandam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quæ ut mole minima, ita facultate est q̄ maxima. Siquidē cum nuper fuisset quidam ictus à scorpione, videor mihi esse (inquit) percussus grandine: eratq; omnino frigidus, frigidusq; sudore perfusus. Quippe ubi ex icta parte per totam ipsam celeriter distributa fuerit veneni vis, contingit eam, eodem rursus contactu, in singulas subjectarū ei partium recipi: mox ex illis in alias cōtinuas, donec in aliquā pervenerit principem: quo tempore, mortis periculum instat. Ad hanc rem in primis conferunt vincula partibus supernis injecta, abscissioq; partium venenatarū. Novi equidem rusticum, qui epote è viperis medicamēto, rescisso prius digito, evasit: sicuti & aliū quendā, qui sola sectione, citra medicamen est liberatus. Sed epilepticū illum puerū medici quoq; sanarūt, primò quidem universum ejus corpus purgantes, dein medicamen ex thapsia & sinapi, parti primò affectæ adhibentes, ac supra illam medium membrū ligantes. Quod verò ad causam pertinet, ob quam in hujusmodi per consensum affectibus, epilepticæ cōvulsione, fiant: probabile sanē mihi videtur, quemadmodū frequentissimē singultū fieri videmus affecto stomacho, ita hanc oriri dispositionem. Etenim cum ventriculus ciborum mole gravatur, aut ubi à corruptis cibis mordicus infestatur, singultu haud dubiè corripitur. Imò verò acris humor ipsum ventriculum mordicans nō singultum modò, sed convulsione etiam, per universum excitat corpus. Quo ejecto per vomitum, ilicò cōvulsio sedatur. Quo minus mirandum est, si nervorū principiū motu hujusmodi concutiat, ut à se expellat, quicquid fuerit id, q̄ à parte primò affecta, ad ipsum transmittitur. Ubi verò deperdito sensu quis cōciderit, non accidente motu, quo vel cōvelli, vel salire videatur, affectum ipsum oriri à frigore censeo. Quo in genere cōtinetur lethargus. Apoplexiæ autē, quod subito eveniat, aut frigidum, aut crassum, aut viscidū quippiam, quod affatim principes cerebri ventriculos impleat, non totius substantiæ intemperie, causam esse, est perspicuū: veluti lethargi, phrenitidis, mania, melancholia, stultitiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetationis, & resoluti motus. Porro in omnibus his affectibus in quorū numero apoplexia continetur, periculi magnitudinē ex nocumento respirationis conjicere oportet. Siquidem in cunctis soporosis affectibus, etsi corpus nec moveatur, nec sentiat, sola tamen spiratio, quæ musculorū thoracē moventiū est munus, servatur. Porro musculis universis, principium motus ab innatis ipsis nervis accedit, qui à cerebro initium primariū sortiuntur. Quamvis enim ex medulla spinali permulti oriri nervi videantur, vim tamē quam habet illa, cerebrum ipsi omnem suppeditat. Cum itaq; spirationem vehementer impeditam cōspexeris, nō parvam in cerebro morbidam dispositionē esse conjicies, præcipuè in soporosis affectibus, qui omnes consistunt in cerebro,

CAPUT VI.

Affectus vertiginosus sive primariò, sive lege consortii accadat (quod solet ob consensum ventriculi) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo detenti, vel à minima occasione hebetatur, adeò ut interdum cadant, si vel ipsi unico duntaxat circuitu in gyrum agantur, aut quippiam aliud circumrotari viderint. Est autem rationi consonum, hujusmodi affectionem fieri, elato per magnas illas arterias, quæ plexum retiformē constituunt, vapido calidoq; spiritu, atq; cerebrum ipsum replente. Fieri etiam potest, ut inæqualis intemperies cerebri, hujusmodi spiritum gignat.

CAPUT VII.

Cephalæa (qui affectus ad cerebrū etiam pertinet) est capitis dolor diuturnus, difficulterq; solubilis, qui à parva occasione vehementes possidet accessiones, ita ut qui eo torquetur, neq; strepitum, neq; vocē, neq; luminis splendorem, neq; motū perferre possit: sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum quærat, idq; ob doloris vehementiam. Ad hæc, accessiones hujusmodi, veluti in comitiali morbo, intermissiones habet, interceditq; tempus, quo perfectè liberari videtur ægri. Differt autē à cephalalgia, quod in hac non usque adeo imbecillæ reddatur partes affectæ, ut in cephalæa, licet in utroque affectu caput minimo negotio afficiatur. Sunt tamē nonnulli, quibus caput aptissimum est ut impleatur: atq; universi quoq; corporis habitus ad ipsum implendū idoneus. Alii, omnes capitis partes aptas habent, ut afficiatur. Quibus, ubi vitioso victu utuntur, accidit ut cephalæa arripiantur. Quo minus mirandum est, si horum aliis membranæ cerebrum continentes, dolore afficiantur, aliis pericranii duntaxat. At quæ intra calvariam est dispositio, iis ad oculorum usq; radices, ipse dolor extenditur: quod nimirū à cerebro, & ab utraq; membrana necnō à vasis quæ in ipsis sunt, veluti germina quædam illuc deducantur. Sed & eorū quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (vocantur autē ij hemicranici) alij extra calvariam, alij in capitis intimis partibus dolorē percipiūt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguit futura per longitudinem ipsius exporrecta. Sub qua, intra capitis ossa, linea medium cerebrū dividens manifestè portenditur: ad quam etiam pervenit anteriorum duorum ventriculorū septum. Ea porro corpora suapte natura idonea sunt ut ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus calidusq; spiritus gignitur: aut quibus biliosa excrementa cumulatur in ore ventriculi. Atqui spiritus, dolores tensivos pariunt: biliosa excrementa dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine inducti, gravitatis sensum præ se ferunt. Quod si rubor adsit & calor, calidos in causa esse humores est signū. Sunt quibus caput affidue dolet, ubi vel liberalius vinū ingesserint, vel meracius: idq; magis, suapte natura calidū fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in universum odorata omnia capiti dolorem conciliant. Nonnullos autē ob sensus exuperantiam dolor infestat: quemadmodū in ore ventriculi accidit.

CAPUT VIII.

At verò si aliquādo per totū corpus, nervorū actio

Vertigo ad cerebrum pertinet.

Vertiginis causa.

Cephalæa quid.

Cephalalgia & cephalæa discrimen.

Caput intra calvariam dolentibus, dolor usq; ad radices oculorum extenditur.

Hemicranici qui dicantur.

Caput quibus impleatur fasile.

Odorata omnia conciliant re dolorem capitis.

CAPUT I.

*Apoplexia
quid.**Resolutio
quid.**Nervi moventes
thoracem,
à collis spina
exoriuntur.
Spinalis
nervis quoque
subdita-
rum illi par-
tium lesiones
respondeant.**Apoplexia
omnibus actio-
nibus anima-
libus noxam
infert.**Spiratio pes-
sima qua-
nam sit.**Apoplecticos
mori, quod
prevenitur re-
spiratione.**Resolutio
præcipue di-
citur, ubi mo-
tus perit.**Odoratorum
sensus in an-
terioribus
perficitur ce-
rebrum sinibus*

actio vitiosa redditur, ipsorum esse affectum princi-
pium constat: id quod ex sola dignosci potest a-
natome. Cum igitur omnes pariter nervi, tum
sentiendi, tum movendi vim amiserint, affectus
is apoplexia appellatur. Ubi verò alteri lateri, aut
dextro aut sinistro id accidit, resolutio nomina-
tur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus.
Quod si in aliquo membrorum idem evenierit, e-
iusdem resolutio dicitur. Cæterum omnes animæ
partes sub cervice positæ, quæ à consilio & vo-
luntatis imperio moveri possunt, nervos habent
qui eas moveant, procedentes ab spinali medul-
la. Porro nervi qui movent thoracem, ab ea spi-
na parte quæ in cervice est, exoriuntur. Si itaque
tota spina transversim dissecta fuerit, omnes quæ
sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuque pri-
vantur: quod per eam nimirum facultas sentiendi
& movendi pro arbitrio, deferatur à cerebro.
Quod si transversim ad medium usque, secundum lon-
gitudinem ipsa spina incidatur, non omnes supposi-
tæ corporis partes, sed eæ duntaxat quæ è regio-
ne sectionis sunt, resolvuntur: dextra quidem, de-
xtræ spinæ parte dissecta: sinistra verò, sinistra.
Videntur autem huiusmodi resolutionum aliquæ,
faciem quoque infestare: sed tum resolutum latus
ad alteram faciei partem retrahitur. Cum igitur
nervi qui in faciei partes dispersi sunt, à cerebro
orientur, sanè si earum aliqua simul cum toto cor-
pore resoluta sit, scire oportet resolutionis dispo-
sitionem in cerebro ipso consistere. Ubi verò il-
læ permauerint, haud dubiè spinæ initium affici-
tur. Accidit verò nonnullis, ut faciei partes solæ
afficiantur, ut lingua, oculus, mandibula, & la-
brum. Quippe non omnibus ab uno loco princi-
pium influit, cum ex diversis cerebri partibus
suos nervos recipiant. Igitur apoplexia omnibus
actionibus animalibus noxam inferens, cerebrum
affectum esse manifestè declarat. Discernitur au-
tem magnitudo affectionis, ex noxæ quam spi-
rationi infert, vehementia. Cum enim naturalem
ordinem plurimum egreditur, magnam: cum verò
paulum impedimenti est, parvam in cerebro no-
xam esse, cōjicere oportet. Sanè omnium pessima
spiratio putanda est, quæ & intermittitur, & ma-
gna cum violentia trahitur. Siquidem ob id con-
tingit mori apoplecticos, quod spirare non pos-
sint. At verò ubi pars aliqua convulsa est, nervus
ei motioni deputatus, aut musculus, necessariò
est affectus. Potissimum autem dicitur resolutio ner-
vorum, ubi motus deperditus est. Ubi verò par-
tium aliquarum sensus perit, eam partem sensus ex-
pertem esse: resolutam autem, non usque adeo dici-
mus. Quamperinde est, ut quisque eam nomina-
re voluerit, modò sedem affectam, simulque illius
dispositionem inveniat.

CAPUT IX.

Ubi olfaciendi vis læditur, non eorum meatuum
qui in naribus sunt, sed vel anteriorum cerebri
ventriculorum, cum aliqua intemperie laborant,
est noxa: vel eorum meatuum, qui in ossibus co-
latoriis consistunt, si aliquando obturentur. Si-
quidem odoratorum sensus, in anterioribus per-
ficitur cerebri sinibus, elatis ad ipsos,
per foramina colatorii os-
sis, vaporibus.

AT verò oculorum interdum quidem sen-
sus, interdum motus, ac nonnunquam utraq;
functio resolvitur: idque nunc in altero, nunc
in utroque contingit oculo. Est cum solius palpe-
bræ vel sensus, vel motus læditur. Ubi igitur nul-
lo malo apparente in oculo, perierit facultas cer-
nendi, nervo in ipsum descendenti à cerebro, cau-
sa tribuenda est, nimirum vel inflammato, vel in-
durato, vel quomodocumque aliter ob humorum
affluxum læso, obstructo ve secundum proprium fo-
ramen.* Quæ omnia accidere illi tanquam organicæ
parti, necessum est. Nam tanquam pars similis, oc-
cto intemperieb. vexatur. Præter has causas exo-
luti oculorum sensus, est alia, ubi nihil omnino,
vel exiguum admodum visifici spiritus à principio
(quod in cerebro consistere putandum est) ad eos
descenderit. Si verò utervis oculorum, motum dun-
taxat amiserit, secundæ copulæ nervum, qui à ce-
rebro oritur, molestari est necesse, ab aliquo vi-
delicet eorum affectuum, quos alteri nervo, qui à
prima conjugatione oritur, & cui soli meatus con-
spicius inest, nuper accidere diximus. Quia ve-
rò musculus oculum ipsum moventes senario nu-
mero constant, ac præter eos alii quoque adsunt,
qui descendentes in ipsum amplectuntur optici po-
ri radicem, ut videlicet oculum retrahant & fir-
ment: nec mollis ille nervus, in processu perversi-
tatur aliqua ex parte: accidit sanè interim, hoc ip-
so nervo nequaquam læso, musculorum aliquem, aut
in propria essentia, aut in nervo ad ipsum descen-
dente, contristari ab aliquo dictorum affectuum.
Siquidem singulis eorum musculorum, pars quedam
nervi à secunda conjugatione orti, transmittitur.
Cum itaque sex inveniantur moventes oculum mu-
sculi, si is quidem qui ipsum ad superiora trahit
afficiatur, totus oculus delapsus videbitur. Si ve-
rò is qui ipsum detrahare solet, affectus sit, ocu-
lus sursum tractus cernetur. Sic si virietur mino-
ris anguli musculus, ad maiorem: si verò hic læ-
sus sit, ad illum inclinatur oculus. At si volventium
musculorum quispiam sit resolutus, obliqua to-
tius oculi conversio ædetur. Cæterum resolutis
musculis circumdantibus mollem nervum, proci-
det totus oculus atque à sua sede movebitur. Por-
rò cum oculi è sede sua deturbantur, si ad alteru-
trum angulum perversio fiat, innocua permane-
bit cernendi vis. Si verò aut sursum, aut deorsum,
aut in obliquum quoque vertatur, quicquid ipsis
objeceris, id omne dupliciter esse videbitur. Ex mu-
sculis supernam moventibus palpebram (nam in-
ferior immobilis est) si is qui sursum eam retra-
hit resolutus sit, laxam efficiet illam, adeo ut o-
culus aperiri non possit. Si verò qui eam detra-
hant (gemini enim hi sunt) exolvantur, oculus
claudi non poterit. Quorum si alter afficiatur dun-
taxat, ad oppositum musculum palpebra refle-
ctetur. Hi sunt partium oculi peculiare affectus,
qui latentibus locis insident. Ac sunt præterea al-
ii, qui ex aliis partibus ei per consensum adve-
niunt, nempe aut oris ventriculi, aut cerebri co-
gnatione. Cujus generis sunt symptomata suffu-
forum

*Visum
modis ex
conting**Oculorum
tum un-
rire acc**Optici
vis soli
se consi-
meatus
Oculo
do mus-
sunt se-
buti.**Oculi
pliciter
sunt per-**Oculi
aut de-
perfer-
sedu-
duplici-
Palpe-
quosup-
ter per-
tantur.**Oculorum
etiam per
sensum*

forum visis similia. Cæterum visa ob humorum in ventriculo contentorum vitia oborta, utriusque oculo similiter accidunt. Quæ verò per suffusiones apparent, nec incipiunt simul in utroque, nec similiter. Præterea, si tribus quatuorve mensibus suffusionis accidentia apparuerint, pupilla autem pura splendidaque cernatur, ab ore ventriculi nasci affectum ne dubites. Si verò non ita multum temporis intercesserit, quærendum est in primis, num ex quo incœpit affectus, singulis diebus perpetuò hæc apparitio perseverarit. Nam assiduitas suffusionem portendit: intermissio autem, quod malum à ventriculo prodierit, suspicionem excitat: idque magis, si perfectè quis concouens, nullum sibi visum apparere fatetur: ac multo magis, si cum apparuerint tales imagines, mordicus in ore ventriculi doluit: maximè verò, si posthæc, vomendo ejecta re mordente, mitigata accidentia fuerint. Quin etiam si à ventriculo symptoma id exoritur, medicamine ex aloë potui dato, minimo negotio curatur, accedente simul proba coctione. Ubi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exactè pura conspicitur, suffusionis esse initium censendum est. Similia quoque suffusioni accidentia in quibusdam phrenitidis speciebus (affecto scilicet cerebro) sæpè numero evenire solent. Sunt etenim phrenitici quidam, qui de iis quæ oculis offeruntur, rectè (quantum ad sensitivam notitiam pertinet) judicant: cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alii rursus, cogitatione quidem falluntur minimè, sensibus tamen hallucinantur: id quod mihi olim contigisse videtur, cum ardenti febre laborans, & floccos vellerem, & in vestibibus festucas colligerem, idque animo constans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis vitio laborant. Porro ubi in cujuspiam cerebro biliosus succus abundat, acceditque febris ardens, ab illo oritur tunc fumus, veluti in lucernis ab oleo: qui, per vasa quæ ad oculum tendunt, delapsus, earum imaginum in ipsis esse causa censetur.

CAPUT II.

In lingua etiam, interdum motum ipsius, interdum sensum, interdum vitari quoque tactum contingit. Non tamè alio gustus, atque alio tactus nervo utitur. Siquidem nervi à tertia conjugatione orti, qui in lingua pelliculam disseminantur, non solum tangendi, sed gustandi etià vim obtinent. Crebrius tamen læditur gustandi quam tangendi facultas, cum ad gustum exacto iudicio sit opus. Etenim tangendi sensorium, crassissimum: ut cernendi, tenuissimum est. Auditus verò sensorium, ut in tenuitate à visu, ita sensorium gustus in crassitudine, à tactu secundum locum obtinet. Olfacienti verò sensorium, in illorum quatuor medio consistit. Igitur cum posterior cerebri pars tam dextra quam sinistra afficitur, ne apoplexia hominem rapiat, timendum est. Ubi autem altera tantum, in paralyfim finiri solet: quæ interdum alteram solum linguæ partem motu destituit, illa solum ipsius tum gustu, tum tactu: interdum partes sub capite constitutas, modò has, modò illas. Cum autem à parte anteriore cerebri facies suos nervos recipiat: à posteriore verò omnes partes quæ sub capite sunt: à qua etiam oritur septima conjuga-

tio nervorum, qui inserti in musculos linguæ, voluntarium illius motum perficiunt: non ab re quidem anteriore cerebri parte altera affecta, sola linguæ motio vitio carebit: reliquæ verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut sinistra, sensu & voluntario motu destituuntur. Quemadmodum si afficiat posterior pars cerebri, reliquarum partium faciei incolumi simul & motu & sensu, solum linguæ motus vitietur. Quod si aliquando tota anterior cerebri pars afficiat, supremum ipsius ventri ei consentire necesse est: atque cogitandi quoque actiones vitari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, neque movetur: spirandi tamen facultas haudquaquam in illo læditur: vocaturque hic affectus caros, sive sopor. Qui si vehementer spirationem opprimat, apoplexia nominatur. At solutæ apoplexiæ creberrimè solet paralyfis succedere. Sopor verò finito, magna ex parte bona valetudo subsequitur. Fit autem sopor, Hippocrate autore, affectis musculis temporum, atque in acutis morbis. Inter soporem & apoplexiam, morbus comitialis est mediis, convulsionem universo corpori inducens: sed in paralyfim non desinit. Quorum trium morborum, frigidus, crassusque, aut omnino viscidus humor est causa. Verum & in sopore, & in morbo comitiali, ventres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia verò, corpus magis affici solet. Atque in sopore anterior pars magis, in apoplexia & morbo comitiali utraque afficitur. In catalepsi & vigilantia sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quum autem osse aliquot terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat, sed neque convulsione, nec difficili spiratione oborta: hæc enim apoplexiæ, illa morbo comitiali est affinis: haud secus quam catalepsi, sopori, servata secundum naturam spiratio. Verum ut in sopore clauduntur palpebræ, ita in catalepsi manent apertæ. Jam verò vehementes dolores sopor sequi consuevit, concidentem videlicet robore animalis spiritus, quod primum animæ instrumentum existit in ventriculis cerebri: indeque fluens per nervos deferat motum & sensum in universas corporis partes. Igitur affectum linguæ, alii quidem illi communes sunt, * ob commercium quod habet cum cerebro & nervis: alii ipsius duntaxat proprii censentur. Quemadmodum ergo consortii lege, per septimam nervorum conjugationem motus ipsius vitietur: sic sensus impediri potest per tertiã, quæ & mollis est, & in pelliculam illius, sicuti septima in musculos, disseminatur. Quod verò ad proprios illius affectus pertinet, sicuti musculorum eius, ut similium, intemperantiæ motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membranæ intemperies, & tangendi & gustandi simul sensum vitiat. At instrumentalem affectionum speciem referunt in inflammationes, scirrhi, œdemata, erysipelata, supurationes, & alia id genus: de quibus, quia visu & tactu discerni possunt, nihil in hisce cōmentariis dicemus. Ut autem de ipso auditu non nihil inferamus sermoni, si illa solum apparente aurium foramine, sola audiendi facultas læditur, nervum proprium esse affectum, licet existimare. Ubi verò reliquæ faciei partes simul cum functione audiendi lædunt, in cerebro esse dispositionem præter na-

Caros.

Sopor.

Apoplexia, soluta solet paralyfis succedere.

Sopor fit affectis musculis temporum. Epilepsia.

Cerebri corpus magis afficitur in apoplexia, quam in morbo comitiali, & sopore: in his autem ventriculus magis.

Catalepsi desenti dormiunt apertis palpebris. Sopor consuevit sequi vehementes dolores. Animalis spiritus est primum instrumentum animæ.

Lingua propter morbum qui sunt.

Audiendi facultas unde possit læsionem accipere.

*Nervorum
tertia con-
jugatio in quas
partes distri-
buatur.*

turam, est verisimile: ipso vel ut similari, vel ut in-
strumentali parte affecto. Memineris aut velim,
temporū maxillarumq; musculis, item labris &
nariū pinnis, sensum & motū: linguæ verò, om-
nibusq; oris partibus, sensum duntaxat, à tertia
cerebri cōjugatione oriri: à secūda, oculorū mu-
sculis motū, ut à prima, oculis ipsis cernendi sen-
sum suppeditari. Ubi igitur universæ particulæ,
quibus à tertia cōjugatione inferuntur nervi, oblæ-
sæ in altera tantū parte videtur, cōmunem nervū
primariò affectū esse putandū est. Si verò utrāq;
simul partē lædi cōtigerit, nō nervi proprius, sed
loci cuiuspiā in cerebro, à quo nervi procedunt,
est ipse affectus censendus: ac tunc sanè omnes
vicinæ partes simul affici cōsueverūt: proinde &
quartæ & *secundæ cōjugationis nervi: unde se-
quitur, ut oculorū quoq; partes lædantur. Quod si
unus duntaxat vel musculus, vel nervus, quoquo
modo sive primaria affectione, sive per consen-
sum, affectus fuerit, pars ipsa in adversum trahetur
musculū. Nam resolutio musculi qui dextrā
partem labri movet, ipsa ad sinistrū flectitur. At
si is qui sinistram movet resolvitur, ita trahitur
ad dextram. Haud secus & totam mandibulā, &
nariū pinna, & genas quæ à loco movetur mu-
sculo, in adversam partem flecti cōtingit. *At la-
tus musculus nō recipit nervos à tertia conjuga-
tione: sed nervi à cervicis vertebrae prodeuntes,
in illū ferè totū disseminantur, exigua ipsius parte,
sublimiori; , excepta, in quā deferuntur nervi à
30 quinta conjugatione. CAP. III.

*Anginā ali-
quando ob
vertebras lu-
xatas acci-
dere.*

Porro ubi afficiuntur priores vertebrae spinæ, li-
cet rarò, evenire tamen interdum angina potest,
idq; in pueris magis q̃ in adultis, nimirū, ob ipsas
vertebras ad interiora luxatas: quemadmodum

*Spinæ partes
altiores, pra-
stantiores
existere.*

Hippoc. ait, secundo de popularib. morbis. Cæ-
terum per huiusmodi anginas guttur nullo pro-
prio affectu laborat. Cum autē spinæ partes, quò
fuerint altiores, eò sint præstantiores: sanè quò
affectio fuerit inferior primis duabus vertebrae,
eò inferet multò minorem noxam. At nervi septi
transversi, sub quarta & quinta vertebra oriuntur.

*Septimū trans-
versum solū
perficere le-
nem respira-
tionem.*

Ab eo autē solo fit spiratio * lenis, accedente in-
tercostaliū musculorū actione, ubi vehementio-
ri est opus respiratione: quæ si vehementissima
requiratur, supremos etiam musculos cōcurrere
oportet. Porro ubi unica duntaxat vertebra, aut
etiam duæ, aut tres, sese consequentes invicem,
distrahuntur, ea parte spinā cavari cōtingit. Ubi ve-
rò inter distractas vertebrae, vel una, vel plures, 50

*Gibbus unde
accidat.*

illæ sæ manserint, sic affectis gibbus accidere so-
let. At si in alterutrā partē, vel dextram, vel fini-
stram, distrahatur vertebra, ibidē in obliquū spi-
na torquebitur. Cæterū alia sequuntur symptoma-
ta, ubi proprio affectu laborat spinalis medulla:
& alia, ubi una vel plures vertebrae afflictæ luxan-
tur. Nam cum proprio affectu spina ipsa affligi-
tur, citra vertebrae aliquā luxationē, si quidem
in altera duntaxat parte afficiat, omniū inferiorū
corporis partiū, quæ è regione nocuementi consi-
stunt, tam sensus q̃ motus læditur. Si verò utrāq;
pars sit affecta, omnes particulæ tam id dextra,
quàm in sinistra regione, ei quæ affecta est subje-
ctæ, similiter resolvuntur. At luxata vel ad gibbū,
vel ad concavū vertebra, fieri potest ut nulla o-

mnino partiū inferiorū, vel in sentiendi, vel mo-
vendi functione aliquod vitium percipiat. Per an-
gulosas tamen luxationes spinæ, subjectas om-
nes particulas lædi est necesse. Paulatim verò fa-
cta luxatione, atq; in orbem magis, nihil notatu
dignum patiuntur partes, quæ cōmotæ vertebrae
subjiciunt. Sed in obliquū luxatio, lædit omnino
eas partes, ad quas nervi ex luxatis vertebrae, pro-
cedentes, perveniunt: idque magis in cervice, in
10 thorace minus, sed multò minus in lumbis acci-
dere solet. Siquidem in cervice, vertebrae inter se
cōnexæ, æqualiter utrāq; foramini conferunt, un-
de nervus procedit: in thorace autē, superior ma-
gis, inferior minus: sed in lumbis, totus nervus
ex suprema excidit vertebra. * Quare in eis trans-
versa vertebrae luxatio, unā secū trahens & me-
dullam, & nervū, illæsum servat naturalem ortū
ipsius. In cervice autē, ex loco medio inter duas
vertebras procedentes nervi, per obliquas luxa-
tiones, in ea quidem parte, ad quam spina defle-
ctitur, opprimuntur: in altera verò tenduntur. Rur-
sus tensiones quidem, ubi ingens quoq; inflama-
tio accesserit, cōvulsio comitat. Ad cōpressiones
verò earū partiū, ad quas oppressus nervus de-
scendit, sequitur resolutio. Igitur per eas quas nu-
per diximus vertebrae luxationes, reliquæ fa-
ciei partes omnes, neq; in sensu, neq; in motu no-
xam subeunt. Solæ autē genæ læduntur, ut quæ mo-
ventur à lato musculo. * At vertebrae solent luxa-
20 ri, aut ob casum, aut ictum, aut tumore præter na-
turam, nervosa corpora vertebrae atq; medullæ
cognata extendentē. Ut autē impræsentiarū ali-
quid de angina dicamus, Hippocrates affectus
omnes, qui cū spiratione difficili, guttur aut fau-
ces infestant, synanchas, hoc est, anginas appel-
lat. Ac sunt quidē anginae genera quinque. Primū
est, ubi inflamantur fauces: hoc est, internus oris
locus, ubi & gulæ & gutturis partes extremæ
cōeunt. Secundū est, ubi nec fauces, nec reliquæ
30 oris partes, nec etiā externarū partiū ulla inflam-
mata videtur: laborans tamen suffocationis peri-
culum in gutture sentit. Tertiū, ubi extrinsecus
circa fauces inflammatio apparet. Quartū, ubi gut-
turis partes tam externæ q̃ internæ, similiter in-
flammatæ videtur. Quintū deniq; cum ad ante-
riores partes, colli luxantur vertebrae: id quod sa-
nè cōtingit, vel solis musculis qui cum ipsis com-
municant, tumore præter naturā affectis: vel nato
ibi tuberculo, vel gula pariter vitiata, nonnunq̃
musculis quoq; qui gulam gutturi jungunt, pro-
priisq; aliquando gutturis musculis, qui ipsum
aperiunt, oblæsis. Hi igitur affectus omnes diffi-
cilem respirationē efficiunt, minimè tamen in di-
scrimen suffocationis addunt. At ægri & diffi-
culter deglutiunt, & dolent, tum præcipuè, cum eis
potus per nares resilit. Nullo aut spiritalium in-
strumentorū nec primariò nec per cōsensum af-
fecto, fieri minimè potest ut spiratio lædat. Quo
circa ex sola spirandi specie, illic nō nihil & de affe-
cta sede, & de ipsa dispositione, conicere licet.
Quippe si videatur laborans, inter spirandū, to-
tum movere thoracē, ut in parte quidē antero-
re, ad jugulum: in utroq; latere, ad cervicē: in par-
te posteriore ad scapulas usq; motus ipsius ascen-
dat: tres ex huiusmodi spiratione dispositio-
nes

*Angulosas
luxationes
na sunt
centiores
qua in or
atq; paul
tim sum
Luxatio
spinae obli-
qua.*

*Luxatio
tebrarum
unde poss
accidere.*

*Angina ge-
nera quin-*

nes significat. Una est flamma in corde & pulmone caliditas. Secunda, in altero spiritalium instrumentorum angustia. Tertia, facultatis musculos movētis debilitas. Cum igitur huiusmodi spirationē cōspexeris, in primis arteriæ pulsationē perpendere oportet: hæc enim quātus sit calor, indicat. Deinde spirationē ipsam expende, an multa, an frequens, an exsufflando fiat. Postremò thoracem in pectore tange, quem si præter cætera ardentē inveneris, jam omnes copiosi caloris notas te habere ne dubita. Quibus ex abundantia accedit faciei, oculorumq; rubor, capitis ardor, sitis vehemens, lingua arida, salebrosaq; Ubi verò incendii signis modū servantibus, thorax dilatur vehementer, angustiam in spiritalibus instrumentis esse portendit. Solet aut imbecillitas accidere spinæ, interdum cerebri vitio, utpote à quo & sentiendi, & movendi facultatem recipit: interdū ipsa duntaxat spina primario affectu laborante, idq; ob peculiare intemperiem, vel toti spinæ, vel diversis ipsius partibus advenientem. Igitur ob ipsius imbecillitatē spinæ, omnib. thoracis partibus solet aer inspirari, vel nullo ardente calore ægrū ad id cogente. Siquidem ubi animans quiescit, viresq; validæ sunt, liberam spirationē solum septū transversum efficere solet. Ubi verò id ob imbecillitatē, spirandi munus perficere nequit, intercostaliū musculorū tunc concurrat auxiliū. Quod si præterea majori animal egeat spiratione, tunc superni muscoli omnes, quorū maximi scapulas secū manifestè movent, ad spirandi actionē desiderantur. Cæterū tametsi per spiritaliū organorū imbecillitatē totus thorax moveatur, dilatenturq; narium pinnae, dilatatio tamen thoracis est minor, q̃ in ardentibus febribus: in quibus, si vires valeant, * totus thorax plurimū dilatari cōsuevit: minorq; etiā q̃ in angina, & dyspnœa, & peripnevmonia. Quippe hoc morbo affecti, & maxima, & frequentissima spiratione utūtur. At quemadmodū ob infirmitatem omniū organorum respirationis, sic ob unius quoq; particulæ imbecillitatē, omnes thoracis partes dilatari coguntur. In universum autem, unica pereunte actione, solum musculū qui ipsam efficere solet, aut nervū ipsius, esse affectū, putandū est. At ubi plures actiones vitiatae sunt in diversis locis, accidit interdum omnes musculos, quibus perficiuntur, ab aliqua communi causa esse oblaesos. Fieri etiam potest, ut nervus aliquis, qui musculis illis cōmunis est, afficiat. Verum si ex anatome, ad quā particulam porrigantur singuli nervi ab spina prodeuntes, didiceris, affectas sedes q̃ facillimè invenies. Sic enim cum ex refrigeratione primarū vertebrarum spinæ, à quibus quatuor nervi ad caput ascendūt, ut pericranio sensum largiantur, cuiusdam olim caput afficeretur: affecta sede explorata, illiq; remediis adhibitis, eum subito per sanavimus.

CAPUT III.

At verò sanguinē è ventriculo gulaque, vomitione: ex spiritalibus partibus, tussis: ex faucibus & gurgulione, sreatu: ex ore, simplici expuitione expelli, apud omnes medicos in confesso est. Nos verò sanguinē qui à cerebro affatim descendebat ad fauces, tussiendo educi, sæpenumero vi-

dimus: quippe subito gutturi irruēs, tussim movere potest. Quare diligēter oportet huiuscemodi affectus distinguere. Cæterū cōtingit plerunq; ut vel erosa, vel exesa, vel rupta vena, sanguis tussiendo, affatim cōfertimq; ejiciatur. At si spumofum aliquid simul eductum fuerit, efficacissimum est indicium, ipsum educi à pulmone. Haud secus, si bronchi pars quæpiā, aut arteriæ, aut venæ tunica, aut etiam pulmonis ipsius caruncula rejiciat. Quippe nihil horū accidit iis, qui ex thorace sanguinē tussiendo producūt. Jam verò nullus dolor infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit: utpote qui duos nervos perq̃ tenues à sexta nervorū à cerebro ortorū conjugatione recipit, extrinsecus per membranam ipsam continentē dispersos: qui intrinsecus haudquaquā per visceris profunditatē extēduntur. Verum thoraci multi ab internis, multi etiam ab externis partibus adveniūt nervi, quibus facillē dolores percipi possunt. Præterea thorax quidem est musculosus & ossulentus: pulmo verò & latus, & tutus à cōtusione. Proinde thoracis dolores intensiores sunt, pulmonis remissiores. Cum igitur dolente parte quapiā thoracis, sanguinē quis spuen- do rejecerit, nec multū, nec rubrū, sed nigricantem grumofumq; huic thorax primaria affectione infestatur. At sanguis affecto thorace per pulmonē educitur: ut in suppuratis affectibus pus, quod inter thoracē & pulmonē deprehēditur: ad eundemq; modum, quod in pleuritide coloratū sputum emitti solet, per pulmonē excernit. Porro ulcera quæ sanguinis rejectioni solent super- venire, in pulmone quidem ægrè curationē admittūt. At in thorace disrupta vasa, à quibus sanguis expuitur, magna ex parte conglutinantur. Investigandum verò est, num ob adhærescentē sanguisugam, vel in ipso nariū meatu, vel in illa oris parte, qua ad nares foramen tendit, sanguis aut emungatur, aut screetur. Ex ventriculo etiā cruor, epota hirudine, evomitur. Qui cruor tamen est tenuis, sanieiq; speciem referens, sive is ex ventriculo, sive ex naribus, sive ex ore feratur.

CAPUT V.

Quod nō sit eadem res, vox atq; sermo, neminem ignorare existimo. Vox siquidem vocalium instrumentorū est munus: loquela verò, eorum quæ sermoni sunt deputata: inter quæ lingua principatū obtinet: cui nō parum conferūt & nasus, & labra, & dentes. Sic etiā vocis instrumenta sunt guttur, & ipsum moventes muscoli, ac nervi qui à cerebro ipsis movendi vim deferunt. Igitur si vel claudentes, vel aperiētes guttur musculi, immobiles reddantur, qui sic afficitur obmutescet. Ubi verò vel difficulter movētur, vel palpitant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affectionis ipsius modo vox ipsa lædatur. Quod si alius quispiam ex moventibus guttur musculis, quoquo modo lædatur, vitiabitur quidem vox, sed exiguum. Quippe sic affectus, neq; obmutescet omnino, neq; ita parvam habebit vocem. Ut autem ex musculis guttur moventibus, præcipuū habentur ii, qui ipsum & aperiunt & claudunt: ita ex vocalibus nervis, ii quos recurrentes vocant: qui & ipsi, sextæ cōjugationis pars sunt nervorum, qui à cerebro oriuntur: quemadmodū &

Sanguinis à pulmone reiecti, indicia.

Dolor non infestat eos quibus à pulmone sanguis erumpit.

Pulmonis dolores cur remissiores sint, quam thoracis.

Sanguis, affecto thorace, per pulmonē educitur.

Pulmonis ulcera ægrè curationem recipere.

Sermonis organa. Vocis instrumenta.

Vox qua ex causa perire aut vitari possit.

*Recurrentes
nervi refrige-
rati. Vocem
impediunt.
Vox in acu-
men & ma-
gnitudinem
quando exte-
ritur.*

*Vox unde effi-
ciatur rau-
ca.*

*Angina of-
fendit vocem
simul & re-
spirationem.*

*Voci qui affe-
ctus incom-
modant.*

*Voci mate-
ria est effla-
tio.*

*Efflatio quo-
modo fiat.*

*Actiones in-
ter se conse-
quentes, sunt
quinq; circa
respirationē.*

*Expiratio.
Efflatio.
Efflatio stre-
pens.*

*Vox.
Loquela.*

*Difficilis re-
spiratio, in
qua omnes
thoracis mu-
sculi, a qui-
bus causis
oriri possit,
investigatio.*

alii, qui quidem per ipsum dispersi, differunt ab il-
lis, eo quod a nervis sextæ conjugationis, non in
cervice, sed cum ad thoracis regionem pervene-
rint, separantur. Per vulnera igitur recurrentes ner-
vi refrigerati, tantisper vocem impediunt, donec
calfacti, naturalem temperiē recuperarint. Præ-
terea vitari vocem * in acumen & magnitudinē
haud obscurē cōtingit, ubi fauces etiā a suis mu-
sculis contendit & cōtineri nō possunt. Item gra-
vissimē læditur vox, cum membrana faucibus
gutturique continua, multa humiditate rigatur.
Quod etiā destillationes eadem ratione vocem
raucam efficiant, nemo nō intelligit. Vehemens
quoq; exclamatio similiter vocem offendit. Cæ-
terum cum gutturis muscoli interni inflamman-
tur, angina is affectus dicitur, quæ simul & vo-
cem, & spirationē lædit. Idem quoq; in univer-
sum facere solent omnes præter naturam tumo-
res, sive in spiritalibus viis exoriatur, sive extrin-
secus ipsas cōprimant. Sic enim gula quoq;, ubi
inflammatione est affecta, ut comprimat asperæ
arteriæ tunicam, qua cartilaginū ipsius extremi-
tates, sigmoides dictæ, junguntur, & spirationi &
voci noxā afferre cōsuevit: quemadmodū & ver-
tebrarū cervicis in anteriorem partem luxatio.
Igitur omnes hujusmodi affectus voci accidunt,
propriis ipsius instrumentis vitio aliquo labo-
rantibus. Sunt autem affectus alii, cum peculiari
sua materia privat: quæ sanè est generaliter qui-
dem loquendo, expiratio: secundum speciē ve-
rò, efflatio. Quæ quidem fit, cum spiritus affatim
foras effertur, cōcurrentibus ad hanc actionem
intercostalibus musculis. Proinde accidit, ut per
vehementia thoracis vulnera, atq; omnino ipsius
in altera parte resolutiones, in primis quidē se-
mispirans, ac mox animal semivocale evadat: id-
que per accidens. In apoplexia verò, sopore, mor-
bo comitiali, vigilantia sopore, communi ratione
earum actionū, quæ ab imperio voluntatis pro-
ficiscuntur, vocē lædi cōtingit. His itaq; quinq;
actionibus consequētia quadam inter se conve-
nientibus, expiratione, efflatione citra strepitū,
strepenti efflatione, voce, & loquela: si earum pri-
ma lædatur, reliquas omnes lædi necesse est. Ul-
tima verò læsa, reliquæ haudquāq; læduntur. At
cum secunda, tres oblāduntur reliquæ. Cum ter-
tia, duæ ultimæ. Cum quarta, sola postrema. At-
qui expirationē efficiunt universi thoracem con-
trahentes muscoli: efflationem (quæ vehemens
expiratio est) intercostales maxime: strepentem
efflationem, ii qui in faucibus sunt: vocem verò
ipsam, gutturis muscoli absolvunt. At lingua ar-
ticulatim vocē distinguens, loquendi usum lar-
gitur: ad quam rem nonnihil conferre videntur
dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgu-
lio, mediocresq; ipsius linguæ vinculum. Quorū
aliquando si fuerit vitiatum, vitari quoq; sermo-
nem ipsum cōtingit.

CAPUT VI.

Ut autē ad causas dyspnœæ explorandas rur-
sus hic sermo redeat, si videris aliquem respiran-
tem ægre, ita ut inter respirandum thoracis om-
nes moveatur muscoli, pectusq; etiam unā cum
scapulis artollatur: certē ex tribus unum conjice-
re oportet, aut virium imbecillitatē, aut viarum

spiritus angustiam, aut vehementem in corde, ac
pulmone caliditatē. Quamvis interdum duæ, ac
nōnunq; (licet rarò) tres quoq; ex jam dictis cau-
sis concurrere possunt. Atqui tribus quidem si-
mul coeuntibus, proximam mortē timere oportet.
Ubi verò duæ fuerint, difficile est ægrum ser-
vare. Sed una duntaxat infestāte, peculiari opus
est finitione, ut sciatur, servabiturne æger, an ipsi
malo succumbet. Igitur ubi vires duntaxat fue-
rint infirmæ, ad tria moventiū musculorū gene-
ra venire, eosq; omnes ad motionem excitare so-
lent, uno genere * vehementer movere nequeun-
te. Quippe si septum transversum solum, veluti
cum secundum naturā se habet, sufficienter mo-
vere posset, utique nec intercostalibus, nec supe-
rioribus musculis indigeret. Quoniā verò imbe-
cillum est, omnes sensim commovet: sed nec fre-
quentē, nec admodum raram actionem efficit.
At plurimū aucto in spiritalibus instrumentis ca-
lore, omnibus quidem thoracis musculis agit a-
nimal: sed velox, frequens, & vehemens, est eo-
rum actio, si citra virium imbecillitatē ipse calor
infestet. Virium autem imbecillitatē, ubi nō ac-
cesserit flāmea caliditas, nec velox, nec frequens
omnino comitatur motus: proinde non ita mul-
tū omnes thoracis partes potest distendere.
Præterea ubi ob plurimū calorem spiratio est diffi-
cilis, spiritus quidam calidus, fervidusq; efflatur.
Ubi verò ob solā imbecillitatē, * nulla facta per
os efflatione, spiritus per nares tantū emittitur.
Quod si per inspirationē cujuspiam nariū pinnae
manifestē * dilatata videantur, id sanè efficax ro-
boris prostrati est indicium. Ob spiritaliū verò in-
strumentorum angustiam, totus quidem thorax
* plurimū, celeriter atq; frequenter distenditur.
Cæterū qui sic laborat, * absq; ulla efflatione ex-
pirant. Si verò simul convenerint in spiritalibus
instrumentis, & calor, & angustia (quod solet in
peripnevmonia) tunc sanè nec maxima, nec fre-
quentissima, nec etiā celerrima spiratio sufficere
potest: sed surgere tentant ægri, quod sic melius
eis thorax dilatari videatur. Similiter solēt respi-
rare & ii, quibus asperæ pulmonis arteriæ, pluri-
ma defluxione opplentur: at neq; efflant, nec ca-
lidum emittunt spiritum. Purulentis etiam totus
thorax attollitur: sed neq; ab eis fit efflatio, neq;
spiritus emittitur calidus, nisi fortē adurēs febris
accesserit. Verum ii q; celerrimē suffocantur, tum
ob plenitudinē ipsam, tum quod vires omnibus
purulentis necessariò imbecilliores reddantur.
Contra autē per anhelantes affectus, humorib.
crassis & viscidis in ipso pulmone impactis, per-
manere possunt vires robustæ & constantes. Ad
hæc, si tuberculū coctū difficile aliquando fuerit
in ipso ortū, thorax maximē dilatabitur, sed non
trahet ita multum spiritū, ob idq; crebrò spirare
cogetur, * verum absq; efflatione, quæ sanè aucti
caloris est propria. Magna porro interdum fit re-
spiratio, ob magnitudinē dilatationis, quam tho-
rax molitur: interdū verò ob inspirati aeris mul-
tam essentiam. Igitur quicumq; sine aliqua spiri-
taliū instrumentorū angustia, per febres arden-
tes difficulter spirant, iis inspirati aeris quanti-
tas, magnitudini dilatationis thoracis propor-
tione respondet. Quibus verò vel tumor vel an-
gustia

*Narium
na man-
dilata
ter respi-
dum, ro-
prostrat
indicant*

*Recti qu-
rare sole*

*Purulent
qualis fia
spiratio.
Purulent
cur quan
ocysime
focentur.*

*Tubercul
in pulmo
ortum, q
lem respi-
tionem ef-
ciat.*

*Aeris ins-
rati quan-
tas in qui-
nam respo-
deat mag-
tudine di-
rionis tho-
cis, & in q
bus naqua-
quam.*

gustia sine flammeo calore in spiritalibus est, in his, thoracis quidem dilatatio fit maxima: id vero quod inspiratur, non solum dilatatione proportionem non assequitur, verum etiam minus, quam secundum naturam inspirari solet, attrahitur. Ceterum inspiratio ea quae ob virium imbecillitatem fit omnibus agentibus musculis, dicenda est sublimis, non magna. Jam vero multus spiritus, & ex longis intervallis attractus (quemadmodum inquit Hippocrates) delirium declarat. Spiratio exigua simul & rara, spiritalium instrumentorum frigiditatem: frequens vero, non solum spiritalium, sed eorum etiam quae cum ipsis moventur, ut hepatis, lienis, ventriculi, & gulae, laborem indicat. Est etiam alia dyspnoeae species, cum veluti brevi quadam quiete intercipitur opus thoracis: idque modo in inspiratione, modo in expiratione, sive hoc accidat ob convulsionem musculorum thoracis, sive ob caloris copiam, cogentis aërum continenter vel inspirare vel expirare. Est & alius spirationis affectus, apnoea, hoc est, privatio spirationis, vocatus: qui tamen constare nequit. Nam videtur esse impossibile, ut animal omni spiratione exacte privatum, in vita servari possit. Quavis animalia ea quae in cavernis delitescere consueverunt, movere thoracem videantur minimè. Proinde conijcere oportet, aut adeo exiguam adesse illis respirationem, ut effugiat sensum: aut animalia ejusmodi, tunc non indigere respiratione, sed transpirationem illis sufficere, quae fit arteriarum motu per universum corpus. Fieri autem contingit apnoeam, minimè quidem affectis respirationis organis, sed principio à quo illa reguntur.

CAPUT VII.

Verum enim vero pulmo nunquam vehementi dolore cruciatur: at gravitatis sensum, atque aliquando extensionem, vel ad pectus, vel ad spinam (quando quidem inde suspenduntur membranae ipsum ambientes) percipere potest. Saepenumero etiam pulmone affecto, aëri molestatur angustia, atque ob id crebro celeriterque respirant, & thoracem vehementer attollunt, sed non ita multum aërem attrahunt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tuberculum, aut plenitudinem crassorum humorum in eo consistere ostendunt. Ceterum si inter respirandum aëri minimè videatur stertere, indiesque augeatur symptoma, crudi tuberculi ortum suspicari oportet. Si vero stertendo strepitum fecerint, lentorum crassorumque humorum pertinaciter impactorum multitudinem, pulmonis bronchia molestare est indicium. Quod si illico ab angustia sensu quis difficulter respiret, fluxionem vel à cerebro, vel à vicinis sedibus, irruere in pulmonis bronchia significatur. Porro si ubi vehemens putrescit pleuritis, remissa jam febris excandescencia, in imo thoracis aëger derelictam gravitatem percipiat, ac per varios decubitus, maximè dum repente ab uno in alterum latus convertitur, aliquid transfluere sentiat, puris multitudinem ibi contineri, conjectura est certissima: præcipue si nihil penè expuerit laborans. Si vero citra febrem ferofus aut pituitosus humor subito in thoracis spaciū defluens, excitaverit spirandi difficultatem, aëger tunc tenue sputum, idque ab initio quidem exiguum, sed cum vehementi tussi: ubi ve-

ro concoctum est, plus atque crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Quippe bifariam accidere potest, ut vehementer tussiendo paucum quis expuat: nempe aut ob lentum crassumve humorum, aut ob impensè tenuè. Siquidem tenuis humor cum sublevatus est, inter tussendum à spiritu divisus refluit: lentus vero, aut omnino crassus, difficulter effertur, utpote qui non tam facile à corporibus, quibus impactus est, abstergi, neque à quovis spiritu, nisi à vehementi & multo, potest impelli. Igitur sputum quod neque liquidum, neque aquosum admodum fuerit, neque crassum etiam, aut lentum, id facile efferi solet, maximè ubi vires validæ fuerint. Porro ubi cum spirandi difficultate, cui & angustia & gravitas conjuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus est inflammatio pulmonis. At si intolerabile incendiū fuerit, angustia vero, gravitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Vexatur etiam pulmo interdum inæquali, sicuti & æquali intemperie, citra humorum affluxum. Igitur inæqualis tussim excitat: æqualis vero, si moderata sit, spirationis concinnitatem variat. Si autem vehemens, idque vincente calore, frigidi aëris & positionis cupiditatem inducit, ac tractu temporis in febrem definit. Per frigidam autem intemperiem, contraria evenire solent. Quippe si modum servaverit, calidi aëris, & calidæ desiderium potioris excitat: si vero modum excedit, replet viscus ipsum fluxionibus. Ob ruptionem etiam vasorum, contingit sanguinem in pulmones transfluere, atque excitare tussim. At ruptiones in eo deprehendendum ex multi sanguinis effusione, tum ex magna, notabilique aliqua causa, quæ subito advenerit. Sunt autem causæ prægressæ, casus ab alto, collisio, iracundia, exclamatio, atque alia id genus. Contingit quippe interdum vasa dirumpi, ubi non præmissa lenitione pulmonis per præcedentes exclamationes, vehementer aliquis exclamare cōtendit. Ad hæc, nulla extrinsecus manifesta adveniente causa, sanguinis abundantia potest in pulmone vas rumpere, si minimè extendi possit aut ob frigus à vicinis contractum, aut ob innatam temperiem. At vero ubi oscula referantur venarum, calidæ præcedunt semper dispositiones. Quæ vero eroso vase aliquo effatim accidunt sanguinis evacuationes, eas præcedere solent exigua sputa, acresque in pulmone fluxiones à capite. Nonnunquam vero & pulmonis aliqua pars, aut crustula simul efferi videtur. Distinguitur autem ulcus pulmonis ab ulcere asperæ arteriæ & gutturis, tum ob ea quæ cum sputo excernuntur, tum ob sputi ipsius quantitatem. Siquidem per ulcus pulmonis, plurimum sputi rejicitur: à partibus autem illis exulceratis, admodum parum excernitur. Præterea pulmonum ulcera non comitatur dolor: ea vero quæ guttur & asperam arteriam infestant, dolorem quidem inducunt, non tamen nimis vehementem.

GAL. ENI PERGAMENI
de locis affectis, Lib. V.

CAPUT I.

Dinceps autem symptomata quæ cordi primario affectu, & per consensum accidunt, consideranda. Cor igitur innati caloris ex-

Pauca cum magna tussi expuuntur dupliciter.

Pulmonis inflammatio.

Pulmonis erysipelas.

Pulmonis intemperiei æqualis & inæqualis indicia.

Rupta esse vasa in pulmone unde deprehendimus.

Pulmonis vasa à quibus rumpi occasionibus possint.

Pulmonis ulcus ab ulcere asperæ arteriæ & fauce cum quomodo distinguatur.

Cor innati caloris origo.

Principia
nos guber-
nante.

Animal mo-
ri non posse,
nisi prius cor
afficiatur.
Cordis tem-
periem esse
necessariam
cerebro et he-
pati: non au-
tem horum,
illi.

Latentia nec
moveri, nec
sentire, nec
ali.

Respirationi
qua conse-
rant.

Mortem con-
tingere posse
ob timorem
gravem &
voluptatem
immensam,
atq; etiā mœ-
stitiā.

Magnani-
mus vir ob
nullam ani-
mi perturba-
tionem succu-
buit unquā.

Syncope du-
plex.

Repente mo-
ri quibus co-
tingat.

Palpitatio
cordis.

Cordis pul-
sus nisi ad
ventrem usq;
pertingat nō
statim peri-
mit animal.

fit foris & origo: quemadmodum sensus & mo-
tus, cerebrū: ac hepar deniq; facultatis nutritio-
riā: à quib. sanè tribus principiis animal guber-
natur. Cæterū animal omnino mori non potest,
nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intempe-
rantias immodicas mors necessario sequitur. Si-
quidem cum singulæ partes peculiari temperie
cordis suas actiones perficiant, hac profecto pe-
reunte, actiones quoq; ipsarū perire est necesse:
ac proinde cerebri etiā & jecoris. Horū verò tem-
perie deperdita, nō oportet cordis simul actionē
perire. Nam etsi sensu & motu voluntario sit de-
stitutū animal, nec nutriatur, veluti in latentib.
evenit, nihilominus vivere ipsum posse, quandiu
cor illæsum permanferit, haud inficiandū est. At
verò si cor respiratione priveretur, hominem ilicō
perire est necesse. Porro ad ipsam respirationem
conducūt thoracis muscoli, in quos nervi à cer-
vicis medulla orti, motionis principiū deferunt.
Qua quidē facultate motrice, quæ à cerebro in-
fluit, musculi si priverentur (ut videre est per vehe-
mentes apoplexias) perit opus respirationis. At
verò qua ratione homines per somnū spirant, re-
liquis musculis omnibus, præter eos qui ad tho-
racem pertinent, tunc feriantibus, eadem per mi-
norem apoplexiam, atq; alios ei vicinos affectus,
spirare possunt. Verū per vehementis superni
principii læsiones, tota spiratio resolvitur: unde
cordis quoq; temperies corrumpitur, peritq; ne-
cessario animal. Ex jecinoris etiam affectu mori
aliquādo cōtingit, alia tamē ratione, * atrophia
videlicet. Quare in huiusmodi affectib. vita po-
test longius produci. Mori etiam contingit non-
nullos ob syncopam vitio stomachi orta, ac ve-
hementem dolorē, & timorē gravem, ac deniq;
voluptatē immensam. Etenim quibus vitale ro-
bur infirmū est, animi verò affectiones, ob impe-
ritiam fortes, iis facile animæ substantia resolvit-
tur. Atq; horū aliqui etiam ob mœstitiā perie-
runt: sed non ilicō. At vir magnanimus, ob nul-
lam animi perturbationem unquā succubuit. Pro-
prio autem affectu laborare cōtingit cor, vel ob
simplicē intemperiem, sive inæqualis, sive æqua-
lis ea fuerit: vel ob inflammationem, vel erysipe-
las, idq; dum fieri incipit. Nam ilicō, antequā au-
geantur huiusmodi affectus, animal ipsum cor-
rumpitur. Quos sanè affectus cardiaca sequitur
syncope: quemadmodum stomachica eos, qui os
ventriculi afficiunt. Hæ tamen etiā consentiente
corde accidunt. Igitur exiguæ quidem cordis in-
temperantiæ, pulsus arteriarum, pro sua quæque
natura, variant: majores verò, per proprias qui-
dem similariū partium intemperies, subitā mor-
tem non inducunt: per eas autem quæ ad partes
instrumentales pertinent, subito enecare possunt,
sed præcedentibus signis quibusdam, quorum
unum ab Hippocrate est dictū: Qui sæpe & mul-
tum exolvuntur sine causā manifesta, ij repente
moriuntur. Est præterea & alius affectus, palpi-
tatio videlicet cordis, aut per se eveniens, aut cū
suspicionē quadam, quod in humore cor ipsum
moveatur. Inflammato autem manifestē corde gla-
diatores vidimus, haud aliter q̃ qui syncope car-
diaca pereunt, obiisse. Si ad ventrem cordis, præ-
cipueq; sinistrum, aliquando penetraverit vul-

nus, protenus cum multo sanguine vitam exha-
labit animal. Si verò nō ad ventrem usq; pertin-
gat, sed in cordis substantia consistat vulnus, ex
ita affectis aliqui, nō solum ea die quā vulnerati
fuerūt, sed sequenti quoq; nocte potuerūt vive-
re: qui oborta deinde inflammatione fuerunt ex-
tincti. Cæterū quandiu vixerūt, mentis compo-
tes inventi sunt. Unde evidens testimoniū sume-
re potest ea secta, quæ negat rationalem animæ
vim, in corde consistere. Palpitatio autē visceris
huius, plurimis per integram valetudinē accide-
re est visa: quos omnes detractio sanguinis ju-
vit, unā cū extenuante victus & medicinæ ra-
tione. Eorum tamen qui affecti sic fuerunt, nul-
lus ad senectutem pervenit. Panniculus ambi-
ens cor quomodocunq; affectus, nullum affert
periculum, nisi ipso inflammatione affecto, cor
confortii lege afficiatur. Porro supercalfactum
cor, spirationem efficit magnam, densam & ce-
lerem: calidumq; semper spiritum reflat. Contra
refrigeratū, exiguā reddit spirationem, & raram.

CAPUT II.

Similiter etiam thorax (propriū ipsius respi-
rationis organū) aut primario, aut per consen-
sum afficitur: à cuius quidem affectibus necessa-
rio respiratio vitatur. Igitur ubi dolorificis affe-
ctibus infestatur, exiguam densamq; reddit spi-
rationē: id quod etiā vicinis partibus, & iis quæ
simul moventur affectis solet accidere. Quippe
interdum læditur respiratio, thorace non labo-
rante proprio aliquo affectu, sed vel nervo ali-
quo orto à spina, vel spina ipsa affecta. Eorum
verò affectuum qui propriè ad thoracem perti-
nent, quidam in ipsius musculis, quidā in mem-
brana costas succingente consistunt. Igitur inter-
costales musculi, qui in ima parte consistunt, gra-
viori q̃ externi dolore ob inflammationes cru-
ciantur: facileque membranæ subditæ suam affe-
ctionē cōmunicant: quemadmodū ubi ipsa pri-
mario aliquando affectu infestetur, intercosta-
lium musculorū partes internæ, similiter ei con-
dolescunt. Verū exquisita pleuritis fit, ubi suc-
cingēs costas membrana primario affectu labo-
rat. Proinde dolor, vel ad jugulum, vel ad præ-
cordia potest extendi: ad jugulum quidem, supe-
rioribus ejus partibus: ad præcordia verò, infe-
rioribus inflamatis. Vehemens quoq; febris, hu-
iusmodi inflammationē sequitur: quia sedes affe-
cta & parum distat à corde, & cum panniculo in-
volvente ipsum, ac septo transverso, cognationē
habet. Jam verò inflammati intercostales musculi,
minus: cingens verò membrana, magis & ten-
dit, & indurat arteriā. At in peripneymonia, nul-
la apparet talis durities. Porro effusa in vacuita-
tem thoracis sanies, in asperas pulmonis arte-
rias recipit: ac dein p̃tussim excreta, naturā hu-
moris qui peperit inflammationē, declarat. Ete-
nim si bilis abundat, pallidū aut flavū: si atra bi-
lis, nigrū: si pituita, spumofum, & candidū: si san-
guis, rubrū sputū rejicitur. Quod verò ex thora-
cis capacitate aliquid expuat, hinc liquet mani-
festissime: quod si p̃ vulnus thoracis penetrans,
aqua mullā infundat, moxq; tussiendo expuat,
æger vel ex sapore mullam esse deprehender.
Præterea in eo ipso spacio, quod inter pulmonē
atq;

Rationalis

animæ

con/stru-

corde

Palpitatio

cordis con-

cit sectio-

ne, tenuis

dictus, &

dicina ra-

Cor in cal-

scens respi-

raturūq;

lem edat

ritum.

Thorax p-

prium re-

rationis o-

num.

Thorax d-

lens exiga-

densamq;

edit respi-

tionem.

Pleuritis e-

quisita qu-

do fiat.

Pleuritidis

que ad sym-

ptomata

Sputorum

differentie

pro varieta-

te humoru-

gignentium

pleuritidem

atq; thoracem est, purulenti & pus continere, & ipsum tussiendo expuere, haud obscure cernitur. Nec verò defendi potest, sanguinem in ea vena quæ circa spinâ est, contentû, regurgitare ad cor, ut inde ad pulmones feratur: quod ex Erasistrati sermone colligitur. Nâ e cōtrario, vena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinē secū defert, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa octo costas * inferiores cōsistunt, alimentû præbeat. Etenim superiores quatuor nō ab * ea, sed à vena perreptante ad jugulû, nutrimentû suscipiunt. Pus itaq; in thoracis capacitate contentû expirationis tempore in pulmonis asperas arterias transmittitur. Siquidē respirationis actio ad ipsum thoracem pertinet, pulmone illam propriam habente motionē, quippe qui per consequentiā dilatato thorace, pariter ipse attollitur: eo verò cōstricto, spongiarû manibus cōpressarum exemplo, rursus in sese residet. Proinde thorax vehementer cōstrictus, humorē qui in vacuitate subdita cōtinetur, in asperas ejus arterias cōprimit. Nisi verò thorax admodum vehementer pulmone omni ex parte compresserit, humor in asperarû arteriarû ora recipi haudquā poterit. Quamobrem quò robustior fieret compressio, animali adjunxit tussim natura, quæ naturale est symptoma, sternutationi, singultui & nausæ, cōsimile. Verum quia viribus opus est, quibus excitetur hujusmodi naturale symptoma, contingit frequenter per suppuratos affectus interire ægros, viribus antea prostratis, quod à validissima celerrimaq; cōstrictione thoracis fiat tussis, quam vires adeo imbecillæ præstare nequeunt. Porro inseparabilia lateralis morbi symptomata sunt, febris acuta, dolor, perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur: spiratio frequēs & exigua, pulsus parvus, arteriam & duram, & quodammodo tensam indicās, tussis magna ex parte cum coloratis sputis, nonnunq; verò sine his. Atq; has sanè incoctas vocant pleuritides, quæ vel celerrimè hominē rapiunt, vel longo temporis spacio finiuntur. Sunt præterea alij laterû cū febre dolores, per quos spirationē exigua reddi est necesse, sed nullum sputû redditur: ut in ea re nihil à pleuritide sine sputo cōstante differre videatur. Verum hi facili ab illis discerni possunt, quod in his quidem nulla omnino tussis molestat (quemadmodû in illis, qui absq; sputo infestantur pleuritide, in quib. sicca adest tussis) neq; tensionē, neq; ullâ duritiē pulsus referat, nec perinde acuta febre laborent, nec deniq; adeo difficulter spirent. Sunt etiā nonnulli, qui extrinsecus presso inflammato loco, dolere sese fatētur. Atq; ij per sputû purgantur minimè: quia ab initio nihil ejus succi, qui excitavit inflammationē, pervenire ad spaciû thoracis consuevit. At inflammatione concocta, nisi pus prius discussum fuerit, ad cutim usq; attollitur, inciditurq;.

CAPUT III.

Terminû quo thoracis pars inferior finitur, antiqui phrenas vocarūt, fortè quia eo inflammato mens læditur. At Plato ipsum septû appellat, quod irascibilem animi facultatē, quæ in corde est, ab appetitoria, cujus sedes est in jecinore, distinguat, separetq;. Cæterû recentiores septum

transversum id nominant, ut Aristoteles succinctoria. Qui sanè musculus spirationis instrumentum cum sit, nō immeritò, si afficiatur ipsam lædit spirationē, Antea tamē q; quis ob affectum septum deliret, frequentē atq; exiguum: infestante verò delirio, multa varietate inæqualem spiritû reddit. Delirare tamen solent nonnulli, ob vitium cōsistens in ore vetriculi: sicuti per febres arduas pleuritidē, & peripnevmonia. At quæ ob septum transversum deliria oriuntur, non multû à phrenitide distant. Etenim per cæterarû partium affectus, ad per arduas febres, mitigari solet delirium, quoties morbus declinare videtur. Phrenitis autem propria præcipuaq; nota est, ne in declinatione quidem febriû, delirium quiescere, cum nimirû non per consensum sub hujusmodi morbo cerebrû, sed primaria affectione laboret. Proinde paulatim affectus hic gignitur, nec repente subitove alienatur ægri, ut in aliarû partiu affectib. quin etiā prius q; invalescat is morbus, præcedunt ipsum nō pauca accidentia phrenitica, ut puta immensa vigiliæ, aut somnus imaginibus variis turbatus, aut deniq; rerum omnium quæ faciūt, agrestis quædam oblivio. Interdum etiam, qui phrenitici evadūt, majori cum tumultu aut temeritate respondent, cum antea tamen fuerint mansueti. Atq; ij omnes, potu exiguo utuntur. Nōnunq; occiput dolore infestatur. Cum verò ad phrenitidem jam proximè accedunt, oculi evadunt eis vehementer squalidi, aut ex altero ipsorum acris lachryma effunditur, ac dein lippitudo innatat, & venæ intumescunt sanguine, sanguisq; stillat è naribus: quo tempore nihil quod exactè ad prudentiā pertineat, respondent & floccos vellunt, & festucas carpunt, atq; aridiori febre, cui non ita magnæ in alterutram partem mutationes accedunt, torquētur. Ad hæc lingua quoq; illis aspera est, nonnulliq; auditu falluntur, atq; interdum jacēt cogitabundi. Quinetiam dispositione dolorifica affecti, vel acius premente aliquo, eam haudquā sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis gignitur. Ab aliarû verò partium nulla, per perpetuum delirium oriri potest, dempto solo septo transverso, cujus vitio excitatû delirium, parum à continuo distat: à phrenitide tamen distinguitur, & ex symptomatis, & ex sanguinis destillatione à naribus, ex ipsaq; spirationis specie. Siquidē spiratio phreniticorû est magna & ex longis facta intervallis, inæqualis verò, ubi à septo delirium oritur. Cæterû præcordia* revelli, septi transversi ilico ab initio affecti, propriû indicium est: id quod affecto cerebro, posterius accidit, videlicet non incipiente affectu, sed ubi formatus jam fuerit. Calor quoq; circa caput & faciem, vehementior est iis, qui ob cerebri vitium delirant.

CAPUT IIII.

Illius partis quæ inter fauces & os ventriculi media est, & quæ œsophagus, stomachus, & gula dicitur, duplex est usus. Unus, q; veluti via sit eorû quæ devoratur: alter, q; circa utrunq; progressum, tam devoratorû, q; eorû quæ à ventriculo in os rejiciuntur, aliquid moliri videatur. Nâ cū geminæ insint ei tunicae, altera ad cibi potusq; deglutionē utitur: altera ad eam, quæ vomendo

Deliria quibus ex causis oriuntur.

Deliria ex septo transverso orta, non multum à phrenitide differunt.

Phrenitidis nota præcipua.

Phrenitidem præcedentia symptomata.

Phrenitidis iam inflammatis symptomata.

Delirium nullum perpetuum, excepto phrenitico, quod oritur a septo transverso.

Delirium, à septo transverso ortum, quomodo a phrenitide distinguatur.

Œsophagus. Stomachus. Gula usus duplex.

Gula cur tunicae duplexes sint datae.

Gula affectuum generata duo.

Gula inflammata indicia.

Inflammata omnes partes dolent, ubi suo funguntur munere: mitigatur dolor, ubi ab agendo destiterint.

Gula sensu, seu indicio, esse utendum, ad dignoscendos affectus illius.

Reseratio & asis quare à rptione atque erosione differat.

Ulcus unde fiat.

fit,expulsionem. Proinde rationi est consonum, duo esse affectuum ipsius genera: unum quidem quod veluti viarum ingestorum, tum vomitione rejectorum, ei accidit: alterum verò, quod ei, veluti utriusque actionis instrumento, evenire potest. Constat itaque, eorum duorum usum, alterum quidem semper esse necessariū, alterū propter occasiones quasdam. Igitur eorum symptomatum quæ gulam tanquam viam infestant, genus unum est, cum ob tumorem aliquem præter naturam, angustior ipsius meatus redditur: alterum, cum perficere proprias actiones nequit. Accedit etiam gulæ angustia ascititia ubi à vertebra intro luxatis comprimitur. Ubi verò gula inflammata, non à vicinis partibus cõciliata, sed propria familiarique angustia torquetur, gravissimus tunc inter deglutientium infestat dolor, accedente quoque perquam difficili transitu, præsertim si supinus, qui laborat, jacens, deglutire quippiam conetur. Nam erecta si gura transglutitio multò facilius perficitur. Nec verò puto latere vos, partium inflammatarum nullam non dolere, ubi suo munere fungitur: contra, mitigari dolorē, ubi ab agendo destiterit. Cum autem gula sentiendi facultate sit prædita, ipsam quoque, veluti auctarium indicium, in usum evocare oportet, quò plenius affectus illius dignoscantur. Quare juvat ægros interrogare quidnam deglutiendo sentiant. Quippe imbecillitate nonnunquam percipere se fatentur, ut longo vix temporis spacio per gulam transeant ingesta. Interdum ea in media via hæere & coerceri ajunt. Horum primum actionis infirmitatē: alterum, particulam cuiuspiam angustiam indicat. Verum utriusque differentias ex reliquis accidentibus intelligere licet. Nam in imbecillitate quæ ex sola intemperie citra tumorem fit præter naturam, ingestorum in transitu tarditas, & æqualis, & sine dolore, & in supino quidem decubitu, major: cervice verò erecta, minor, sine ullo angustiae sensu, accidere solet. Ubi verò cum tumore cõjuncta imbecillitas est, unam quampiam particulam angustiorē ceteris efficiet, atque per eam ipsam tardior erit transitus. Quod si tumor fuerit inflammationis aut erysipelatis particeps, accedet ei dolor & sitis, & multus caloris sensus, febrisque non admodum ardens, quæ sibi proportionem haudquam respondeat. Si verò tumor aliquis ex non ita calidis fuerit, tum citra febrim, & calorem, & sitim, deglutionis inæqualitas aderit, retentis cibis in parte aliqua. Porro affectus dolorificus gulæ, juxta dorsum quoque sentitur, cum gula incumbat spinæ. Jam verò si ob ruptum aliquod vas ipsius gulæ, sanguis aliquando vomatur, dolor statim sentitur juxta locum ubi talis ruptio cõtigerit. At reserato ore vasis, nullus percipitur dolor: quare à rptione atque erosione vasis distinguitur: ac præterea, quod neque ictus, neque casus hanc profusionem præcessit, id quod rupto vase videre est. Quam ob solam sanguinis plenitudinem, vasa interdum dirumpi possunt. Quæ verò per erosionem fit ejectio sanguinis, ulcere præcedente contingit. Fit autem ulcus, vel rupto vase, vel vitiosorum humorum influenza: id quod in cute quoque sæpenumero accidit.

CAP. V.

Os ventriculi (quod veteres ob accidentia quæ

inducit, cor nominabant) non solum syncopam, sed convulsiones, sopores, morbum comitalem, atque melancholiam inferre solet: necnon symptomata, qualia per suffusiones infestant. Quos quidem affectus omnes consentientibus ei ceteris partibus, in ipso fieri contingit. Quippe ad propriam ejus rationem pertinet, tum fastidire, tum natantes cibos corrumpere. Nam si cibi in ventriculi fundo firmetur, præcipue si suapte natura non facile corrumpantur, neutrum ex illis accidit. Porro cum grammaticus quidam juvenis, quoties vel nimis vehementer docebat, vel cogitabat, vel esuriebat, vel irascebatur, morbo comitali, ob nimis acutum sensum oris ventriculi, corripere, tertia vel quarta hora panem optimè præparatum ei exhibere jussi, solum quidem si non sitiret: si verò siti cruciaretur, ex vino madidum, & quidem albo, modiceque adstringente. Nam hujusmodi vinum, ut vires addit ventriculo, sic minimè tentat caput, quod solent vina vehementia. Dein verò singulis annis bis, aut ter, picram ex aloë ei exhibens (quod quidem medicamentum ventrem ab excrementis liberat, ipsumque ad actiones proprias corroborat) ita restitui hominem, ut reliquum vitæ integra sanitate frueretur. Cõplures etiam non solum insomnia & somni tumultuosi molestant, sed amentia quoque, propter vitiosum humorem collectum in ore ventriculi. Jam verò flatulentum illud hypochondriorum morbum, omnes professi sunt tristitia, desperationem atque mortis stitiam inducere, nihilque ad melancholiam accedentia reliqui facere. Laborantes autem eo morbo, post cruditates, dictis accidentibus multò vehementius cruciatur: ac quidam ipsorum quoque splenetici fiunt. Quocirca conjiciendum est, ex hoc etiam viscere vitiosam saniem in ventriculum relegari. Ergo ea accidentia quæ cerebrum afficiunt, vel oculos, vitiosorum humorum vaporationem sequuntur. At syncopa quæ vitio stomachi, hoc est, oris ventriculi, accidit, ob dolorum ipsius proprietatem exolutionem inducit, fortasse verò ejus quoque intemperie ad cor perveniente. Quemadmodum ubi cor vehementer intemperatum est, vires agminatim cadant: oportet similiter etiam citræ, hoc est, picræ, mulieribus accidit, ore ventriculi affecto. Nausea præterea, cardialgia & singultus, inter hujus partis affectus debent annumerari. Afficitur autem ventriculi universa capacitas similibus dispositionibus quibus & os illius, ceterum non perinde vehementibus. At quia coctionis opus perficitur in partibus ori subditis, necessum est eas ipsas partes, cum malè dispositæ fuerint, cruditate casuam existere. Quod verò sanguis à jecino re atque liene effluens, vacuari per ventriculum possit, sanè de hac re latius alibi sumus dicturi.

CAPUT VI.

At jecori duplex etiam genus morborum accidit: unum à sola intemperie, citra tumorem præter naturam: alterum, ubi una cum intemperie, tumor quoque adest, inflammatio, erysipelas, scirrhus, inflatio, & obstructio à crassis & viscosis humoribus, in extremis vasorum partibus, quæ à vena portæ exoriuntur, facta. Verum in iis laborans gravitatem percipit in dextra præcordiorum regione. Quod si halituosus quoque spiritus, cui

Os ventriculi quare infestatur

Oris ventriculi affectus primarius

Vinum modice adstringens res addit ventriculo nimè tentat caput. Picra eius usus.

Hypochondria morbi, omnes professi sunt tristitia, desperationem atque mortis stitiam inducere, nihilque ad melancholiam accedentia reliqui facere.

Syncopa oris ventriculi, accidit, ob dolorum ipsius proprietatem exolutionem inducit, fortasse verò ejus quoque intemperie ad cor perveniente. Quemadmodum ubi cor vehementer intemperatum est, vires agminatim cadant: oportet similiter etiam citræ, hoc est, picræ, mulieribus accidit, ore ventriculi affecto. Nausea præterea, cardialgia & singultus, inter hujus partis affectus debent annumerari. Afficitur autem ventriculi universa capacitas similibus dispositionibus quibus & os illius, ceterum non perinde vehementibus.

Sanguis à jecino & liene effluens, vacuari per ventriculum possit, sanè de hac re latius alibi sumus dicturi.

cui nō pateat exitus, illic cōcludatur, nō solum gravitas, sed tēlionis quoq; sensus sequetur. Meminisse autem oportet, octo numero musculos per abdominis regionem extendi, quatuor comprehensos conjugationib. Quarū prima ex musculis constat rectis per totō carneis, à pectore ad pubis ossa protensis. At reliquarū trium cōjugationum muscoli, usq; ad rectorū contactum, carnea substantia constant: ubi verò primū illos attigerint, in membranas nerveas degenerant. Horum itaq; musculorū cōjugatio una, quæ quidem reliquis est exterior, à thorace obliqua deducitur, in anteriores partes descendens. Altera huic opposita, ab infernis exorta partibus, obliqua ad anteriores ascendit. Huic tertia musculo rum cōjugatio subjicitur, qui transversum habēt positū, atq; peritonæo innectuntur. Rectorū igitur musculorū tumores præter naturam, oblongi, ac per totū extensi vidētur: quapropter haud obscura est ipsorum dignotio, sicuti & eorū qui obliqui à thorace descendunt. At multò difficilior est notitia musculorum, qui iis sunt subiecti: difficillima verò transversorū. Cum igitur jecur sub peritonæo à tribus ex illis musculis contegatur, fieri nō potest ut tactus aliquam ipsius notitiam præstet, nisi vel magna in ipso inflammatio oriatur, vel incumbentes ei muscoli admodum extenuentur. Jecur tamen declarant affici, in dextera præcordiorum parte gravitas, dolor tota præcordia retrahens, atq; ipsius ad jugulum usq; extensio: exigua tussis, linguæ color, in primis quidem ruber, deinde verò niger: ingens cibi fastidium, inexplibilis sitis, vomitus tum synceræ bilis, tum ejus quæ ovarū luteis assimilatur: quæ aliquando æruginis quoq; colorē refert. Alvus quoq; astringitur, nisi una cum visceris hujus imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Erysipelatis accidentia his ferè similia sunt. Sed insuper febris quoq; cum vehementissima siti, laborantes cruciat. Etenim jecoris ac ventriculi flammeis dispositionibus, ardentes febres solent supervenire: quas etiam excitari continget in pulmonis inflammatione particeps erysipelatis: * quæadmodum etiā per universum corpus, ob putredinem biliosorū humorū immodicè effervescentiū. Verum quæ aut jecoris aut ventriculi occasione eveniunt, ex febres omnium sunt vehementissimæ, ac magna ex parte in marasmiū degenerat. Quæ in simis jecoris partibus eveniūt inflammationes, ut magis, q̃ illæ quæ in ejus gibbo fiūt, fastidiū, nau seam, vomitū biliosum, ac sitim ingentem inducunt: sic à cōtrario hæ, majori q̃ illæ inter spirandum dolore laborantē infestant, magisq; tussim excitant, atq; dolorem usq; ad dextrū jugulum, adeo ut detrahi videatur, extendunt. Utriq; autē parti cum dolor adest, nōnunq̃ nothæ costæ consentiunt: Soli verò jecinori est proprium, ut tumoris cumulum cōprehensim habeat circūscriptum. Quare durus in ipso circa principium tumor (quem scirrhum vocant) multò evidentius ob duritiem dignosci potest, quàm inflammatio. At verò tractu temporis, q̃vis magis incre-scat scirrhus, nō tamen æquè faciliè deprehenditur, intercidente scilicet indicium aqua inter cutem, quæ & ilicò scirrhum sequi cōsuevit, & nisi

afficiatur hepar, gigni minimè potest. Non tamē semper ob primariam excitatur affectionem illius, etsi hoc frequētissimè accidat. Etenim quia hepar facultatis sanguificatricis est instrumentum: consequens est, ut ipso vitiato, actio quoq; ejus vitietur. Accidit tamē interdū, ut ob intemperiem alicujus particulæ, earū quæ aut per meseraicas, aut cavam venam, cum illo cōmercium habent, ipsum quoq; refrigeretur. Porro simarū partiū venæ, ab ea quæ in porta est, exortæ, in tenuissimas extremitates finiuntur: ad quem similiter locū, aliæ quoq; venarū extremitates, à concava vena in gibbas visceris partes distributarū, perveniunt. Cibus igitur universo corpori distributus, ex omnibus simarum partiū venis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates transmittitur. In qua quidem venularum conspiratione, nōnulli fieri obstructions existimant. Ergo ob refrigerationē jecinoris, in sanguinem mutari cibus non potest, refrigeranturq; cum illo totius corporis venæ. Sæpenumero etiam, nullo tumore apparente in jecinore, æger aqua inter cutem corripitur, vel ob vitium lienis, vel jejuni, vel alicujus intestini tenuioris, aut mesenterii, aut pulmonis, aut renū, aut ob immodicū hæmorrhoidum, aut mensium profluvium, aut ob suppressionem menstruorū, aut ob alium uteri momentaneum affectum. Ex intempestiva præterea frigida potatiōe jecur affatim refrigeratum, statim aqua inter cutim inducit. Ac sic affecti, vehementi ciborum desiderio tenentur, quod solent omnes quibus os ventriculi fuerit perfrigeratum.

CAPUT VII.

Porro utrū semper in morbo regio locus affectus sit hepar, an alia præterea dispositio hūc affectum efficere possit, deinceps considerandum. Siquidem videmus nonnunq̃ jecinore haud malè affecto, per morbi judicationem effundi pallidam bilem per universam cutim. Quinetiā circa morbi judicationē interdū aliena quadam corruptione, qualis ob ferarum morsum contingit, quandoq; sanguis in bilem mutatur. Fieri autē potest, ut jecinoris naturali tēperie mutata, humores hujusmodi vitio afficiantur, & quidem citra obstructionē, aut inflammationē, aut scirrhum. Ob splenis quoq; vitia, corporis color vitiatur, sed multò nigrior fit, q̃ ob affectum hepar. Cum igitur sanguinis generatio hepatis munus existet, nullā sanè aliā causam hujusce generationis dicemus esse, à facultate ipsius visceris propria. Cæterum omnium facultatū essentia, in peculiaribus partium temperaturis consistit. Proinde si hepar ad aliquā octo intemperantiarum aliquādo labatur, accidit facultati ipsius noxa, quæ peculiariter illi intemperantiæ debetur. Igitur calidæ jecinoris intemperantiæ, cum cōtentos in ipso humores, tum eos qui suggeruntur per mesenterii venas, adurūt & assant: frigida autē, succos jam in ipso cōtentos, crassos, ad fluxumq; contumaces efficiunt. Quod verò ad ipsum suggeritur, pituitosum, crudū & semicoctū reddunt. Rursus arida intemperantiæ sicciore crassioresq;: humida verò tenuiores, aquosioresq; humores efficiūt. Igitur cum alvi sedimina, aquæ, in qua nuper macinata carnes fuerint ablutæ, similia videris,

jecur

Hydrops gigni non potest, nisi afficiatur hepar. Hepar sanguificationis principium.

Venarum hepatis exploratio.

Hydrops causa diversæ.

Cibi desiderium. Vehemens inessetis, quibus os ventriculi fuerit perfrigeratum.

Sanguis quædam in bilem mutatur.

Color corporis quot modis vitari possit.

Lienis, quæ hepatis, vitia, nigriorem colorem reddunt.

Essentia facultatum in propriis partium temperaturamentis consistit.

Hepatis intemperantiarū singulis quæ effectus tribuuntur.

Jecore affecto qualia excrementa excreantur.

Hepatica excrementa qua dicatur.

jecur esse affectū existimabis. Nominatur autem præcipue hepatica, quæ ob imbecillitatem ipsius deijciuntur. Ut autem tenue excrementum & saniem referens, infirmi jecinoris gignere sanguinem non valentis: ita id quod similatur fæci, superassantis sanguinem hepatis est indicium. At verò nonnulli primò quidem saniem, & cruenta quædam: dein tractu temporis, crassum ac melancholicū sanguinē: postremò atram quoq; bilem atq; synceram, deijciunt. Qui affectus interdum ob frigidam intemperiem, citra febrem, incipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur: dein verò progressu temporis, corrupto in viscere sanguine, febris solet supervenire. Porro nonnulli eorū qui ob frigidam intemperiem laborare incēperūt, nō solum nō admittūt cibi cupiditatem, verum etiam multò magis q̄ antea appetunt. At calidas intemperies nunq̄ comitatur cibi cupiditas, sed fastidiū grave, sitis vehemens, febris insignis, atq; pravorū humorū vomitus. Sciendum autē est, singulis nostri corporis partibus quatuor naturales facultates inesse: quarū prima appellatur attractrix, quæ peculiares partium succos, alendi ipsam gratia, & appetere, & attrahere potest. Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, quæ succus attractus, similis evadit ei quæ nutritur particulæ. Huic aliæ duæ ministrant: retentrix nempe: quæ suo munere fungitur, quando pars succū attractum concoquit, donec eum in suam ipsius naturam convertit: & expultrix,

Facultatum singularum lasiones in hepate, quæ signa indicent. Signum ali cuius dicitur, quod ab eo proficiscitur, tanquā à causa.

Partes aliquas purgari interdum per hepar.

Particula omnis agit secundum proprietatem temperamenti.

quæ post absolutam coctionē, excernit id quod inutile est, atq; excrementum vocatur. Si igitur in jecinore attractrix facultas quomodocunq; afficiatur, cibum quem cōfecit ventriculus, atq; in chylum convertit, relinquet, ut liquidus excernatur per alvum. Atq; hoc sanē ipsius facultatis affectus erit signū. Siquidem quicquid ab aliquo proficiscitur, tanq̄ à causa, id etiā esse illius signum constat. Ubi autem hepar integrè valet, mesarei venis veluti quibusdam manibus, quæ ex ventriculo ei cibum afferant, utitur. Cæterum ubi vel inflammatio vel erysipelas afficit mesenterium, nō solum qualia per jecinoris imbecillitatem excremēta deijci consueverūt, planè excernuntur, sed apparet etiā veluti ab inflammatione, sanies quædam illis admista. Ut autē nō potente ob imbecillitatem hepate succū à ventriculo attrahere, attractrix facultas afficitur: sic ubi retinere nō valet, retentrix vis infirma putanda est: ob idq; primò quidem cruenta sanies excernitur, dein crassior & fæculentior. Similiter aliæ quædam excretiones contingunt, non quidem ob imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, idq; interdum per integram valetudinem. Sic plerunq; pars aliqua cum affecta est, per hepar purgatur, viribus ipsius jam robustioribus factis. Quemadmodū autē retentrix facultas dum imbecillior est, ac rem quæ ipsam gravat, retinere nō potest, vix expultrix id quod infestat evacuat: sic infirma expultrice, retineri quædam res solēt, facultate retentrice nō usque adeo gravata. Nam in quolibet instrumento aliā alia facultas vel fit fortior, vel imbecillior, facta relatione ad actionem. Etenim omnis particula, secundum temperamētū quod ei *perpetuò inest,

agit proprietatē. Jam verò interdum etiam contingit, ut ob folliculi fellis imbecillitatem, ad se bilem minimè attrahere valentis, impurus vagetur sanguis per universum corpus, aliq; oriatur morbi arcuati species præter illas, quas superius exposui. Qui folliculus sic etiam nonnunq̄ impletur, quemadmodū urinæ vesica, aut evacuari nō possit, aut quia obstructus est, ut quia secretoria ipsius facultas est imbecillior. Veluti etiam cum obstructis aut infirmis vasis, quæ ab ipso extenduntur in hepar, biliosum humorē interdum attrahere nō potest. Proinde excrementorū proprietatem in morbo regio considerare, perq̄ necessariū est. Porro quibus citra febrem morbus regius accidit, urgente in dextra præcordiorum parte gravitatis cujusdam sensu: iis omnibus aperiens obstructions cibis & potibus, & medicamentis extendantibus, deinde medicamentū quod bilem ducere possit, exhibens, eorū plurimos una die sanitati restitui. Qui verò purgatione liberari nō potuerūt, iis rursus valentiorē ad aperiendum data portione, medicamentū quod vehementius purgaret, exhibui: sic, ut sub purgationis fine, cærulea magis q̄ flava bilis cum acrimordacitate secerneretur. Atq; in iis conjeci fellis folliculum similiter affici, ut solet urinæ vesica, ubi magna humoris copia distenditur, quam excernere nequit, interdum ob excretoriæ facultatis imbecillitatem, interdum quod ob gravē somnum, vel negotia quæpiam, ultra q̄ par est, urinam suppresses, dein ab ea prosternatur, mirum in modū intenta. At folliculus fellis, *cum juvetur nihil ad excretionem à facultate animali, unicū habet imbecillitatis principium, veluti cætera quoq; naturalia instrumenta, à partis intemperie ortum.

GALENI PERGAMENI

de locis affectis, lib. VI.

CAPUT I.

Lien autē, cum ex hepate sanguinem melancholicū trahat, quo ipse postea nutritur, sanē si in eo facultas attractrix facta sit imbecillior, sanguis ex jecore impurus in universum corpus trāsmittitur, ac proinde color nigrior evadit. Quinetiam exemplo hepatis, sæpenumero ex se rejicit excremēta quædam: ita ut per vomitū, cui nausea accedit, nonnunq̄ excernatur melancholicus sanguis: qui interdū etiam solet per inferna descendere. At hujusmodi vacuatione suppressa, nonnulli melancholica tristitia afficiuntur, ciboq; avidissimè cōcupiscunt: idq; præcipue, si valde fuerint acida, quæ excrementa ad ventriculum trāseruntur. Si autē alia melancholici humoris corruptio accadat, subverti, deijciq; appetentiā videbis. Quod verò indurato ipso, aqua inter cutē effundi possit, consentiente jecinore jam antea est dictū. Quinetiā laborante aliquando utroq; viscere, regium morbum evenire cōspeximus, nigriore q̄ pro consuetudine subsequente colore, ita ut videretur flava bilis esse fuligini admista. Quemadmodū autem vitiosa aqua & frigida, *si confertim & intempestivè bibatur, solet aquā inter cutem inducere (nocet enim sic ingesta interioribus partibus, maximè verò iis,

Morbi causa.

Excrementorum proprietatem in morbo considerandam. Regium morbum ab his febribus in dextra præcordiorum parte gravitatis cujusdam sensu.

Lien ne aliter melancholicus.

Lien ratio, si sentient cinore, inter oritur. Regium morbus per se. Frigiditas temporis exhibet aquam inter effigere, pueri si fuerint.

quæ

quæ tum temporis fuerint imbecilliores) sic ob refrigeratum unâ cum tumore lienem, ut puta si adsit scirrhus: vel circa tumorem, ut per jam nuper dictam aquæ potionem, aqua inter cutem etiam evenire consuevit. Cæterum nisi ad hepar usq; ipsa refrigeratio pervenerit, aqua inter cutem subsequi potest minimè.

CAPUT II.

Dysenteria exquisita, intestinorû ulcus existit. Qui sanè affectus, non gignitur affatim, aut subito, ut ille quem vitio hepatis accidere diximus: sed protinus quidem ab ipsius initio, bilis mordax excernitur, quâ deinde interaneorum abrasiones sequuntur: postea verò paulum cruoris deijci simul videtur, quando videlicet ipse affectus jam esse dysenteria censetur. Cum itaq; hujusmodi abrasiones solæ excernuntur, cõsiderandum est, num pingue quippiam, simul cum eis dejiciatur: ita enim ulcus in crassis intestinis consistere, existimandum est. Ubi verò cruorem quoq; excerni videris, intueri oportet, utrum is reliquis excrementis adeò permixtus sit, ut universus universis misceatur, an pars ejus aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus sit in superioribus: si verò supernatet, in humilioribus intestinis ulcus esse portendit. Idem etiam & in abrasis excrementis videre est, verum non ita manifestè, ut in cruore. Similiter crustula, quodnâ intestinum sit ulceratum declarât, tum ex essentia proprietate, tum ex modo, quo vel misceri reliquis excrementis, vel uni eorû parti supernatare videntur. Nec verò mediocriter cõducit ad curationem, nosse in qua intestinorû parte consistat ulcus. Nam si in superioribus intestinis sit, ab epotis medicamentis præsidium petendum est: sin verò humilioribus hæreat, clysterem subicere magis convenit. At hujusmodi dysenteria, ab iis quæ ab hepate profluunt, sic discernitur. Nam ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate excernitur: deinde aucto malo, crassus humor sæcibus vini haud absimilis. Præterea, in hepaticis excretionibus nihil abrasum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium dierû intervallo, supprimitur evacuatio: dein rursus malum revertitur, atq; excernuntur excrementa prioribus multò pejora. Id verò per intestinorû ulcera haudquaquâ apparet: quippe in iis neq; affatim, neque ex longis temporis intervallis, laborantes dejicere consueverunt. Porro ulcera quæ in recto intestino oriuntur (tineasmû vocant) vehementi quidem tensione, & prompta dejiciendi cupiditate infestant, paucis admodum sequentibus excrementis: quæ quidem ab initio pituitosa, & pingua, progressu verò temporis, etiâ ramenti specie dejiciuntur: sed per totum morbi spacium, iis quæ à supernis descendunt, minimè misceri videntur. Jam verò ut doloris colici, nephriticiq; distinctio, in initio difficilis est, sic circa id tempus, non ita magna præsidiorû differentia desideratur. Cæterû & nausea, & vomitus, per id genus affectus urget: sed multò graviores, & magis assidui, dolente colo. Evomuntq; ita laborantes pituitosa quædam, atque corrupta: hac in re longè superâtes nephriticos: ac retinent etiam magis excrementa, ut ne flatû quidem, neq; etiam ructum excernere possint.

Sæpenumero veluti circuire videtur dolor, modo hanc, modo illam partem infestans. Nephritici verò dolores eodem in loco stabiles infestant jugiter. Cum itaq; dolor in loco fuerit altiore renibus, manifestum colicæ indicium portendit: si verò circa sedem renum infestet, urinæ cõsiderandæ sunt. Nam nephritici ab initio dilutas purasq; reddunt urinas: dein sequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere videtur: demum arenosæ minguntur. At in colica, si quid ab alvo dejicitur, id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatare consuevit, similem habens bubulo stercore consistentiam. Quin etiâ cruciatus colici, quam nephritici, multò magis lenientibus mitigantur clysteribus. Atq; interdum evenit, ut frigidus aliquo humore simul ejecto, ilico quiescant. Quare ipsum præsidium mitigans erit etiam curativum atq; prognosticum. Nephritici etiam dolores, cum urina exeunte lapide, simul & solvuntur, & loci affectum indicant. Ut autè perseverante dolore utraq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore subsequente ad præservationem oportet diversa præsidia adhibere. Cum autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso discendant, atq; omnium supremum, jejunum sit: deinde, quod tenue vocatur: postea cæcum, quod usq; ad infernas partes extenditur: deinde colon, quod ad superiores revertitur partes, ita ut sæpenumero hepar & lienem attingat, satis mirari non possum, quo pacto vehementissimos quosq; dolores, quacumq; in parte cõsistant, ab omnibus cõtribuantur. Igitur ob frigidum crassumq; aut etiam humorè viscidum, aut ob flatulentû spiritû, in corpore crasso densoq; alicujus intestini inferioris genitum, sed egredi nequeunt, excitari dolor consuevit: vehementis quidem, ob intemperiem atq; tensionem corporû in quibus hæret impactus: longus verò, quia difficulter vacuatur. At dolor ille acerbissimus, quem ileon, volvulum & chordapson vocant, sublimiores intestinorû partes infestat, adeoq; impellit ad vomitum, ut nonnulli sterces per os reddentes, miserrima tandem morte moriantur. A quo affectu vix aliquis unquam evadere potuit. Itaq; nõ ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflammatione, vel ab obstructione aridi stercoreis, oriri hujusmodi tenuiû intestinorû affectû. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & ventriculo simul affectis evenire creduntur: ut quas lienterias celiacas nominant, ubi materia ipsæ minimè mordaces existunt. Etenim ut mordaces ob mordendi vim omnia intestina ad excretionem excitant, sic nõ mordaces, in intestinorû imbecillitate sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

CAPUT III.

Igitur si nephritis repente incidat, lapide notatu digno, vel in renû aliquo vel in ureteris etiam impacto, dolorem exictabit haud absimilem colico: verum distinguetur ab eo, per illa quæ in capite præcedenti accidere colo affecto jam diximus. Ubi verò ex iis quæ in urinis resident, aut ex lapide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæstioni nullus locus relinquitur. Porro ubi dolor alterius renis, cum horrore inordinato & vario,

nec-

Nephritico-
rum urina
quales.Colica excre-
menta qua-
lita.Intestino-
rum ordo.

Dolor colicæ

Ileos.
Volvulus.
Chordapson.Volvulo labo-
rantem vix
aliquem eva-
sisse.
Volvuli can-
sa.Lienteria
celiaca.

Nephriticus dolor cū horrore inordinato, ac febre etiam inordinata affligens, quando abscessum significet.

Renis exulcerati indicia.

Caruncula cum urina excreta efficacissima ulceratorum renum sunt nota.

Pilis similia excrementa, qua in urinis cernuntur, in Venis gigni.

Diabetes. Dip sacos.

Vesica non trahit à renibus.

Intestina non trahunt à Ventriculo.

Diabetis causa est imbecillitas renum.

Appetentia canina.

Appetentia cibi esse animale opus.

necnon inordinata febre affligit, si per primum decubitus atque in alterum latus permutationem, in ipso rene dolente suspensi cujusdam poderis sensum æger percipiat, abscessum jam coactum esse conjicere oportet. Quo concocto, si mictum ut laborantem à dolore liberat, sic ulceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, ægre curationem recipiet. At perseverantis ulceris notæ ex urina haud obscure deprehenduntur. Adde quod laborans creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atque interdum cum urina exiguum pus veluti ab ulcere excernitur. Similiter ramentum nonnunquam cum urina excerni videtur: atque interim sanguis quoque, qui erosi jam ulceris est indicium. Quamvis rupto aut resecato aliquo vase, sanguis potest etiam profluere, Verum efficacissima exulceratorum renum est conjectura, si exiguae quædam carunculæ cum urina excernantur: utpote quas renum essentia partes, easque ob vehementem ulceris erosionem avulsas eo constat. At quæ unà cum lotio excernuntur pilis similia, probabilius mihi visum est, ea in venis, quæ in renum capacitate, gigni: idque ex crassa lentaque materia, quam color calfecit exiccavitque: cujus sanæ affectionis per diuretica speravi curationem futuram, nec unquam spes me fefellit. Jam vesica, ubi longo tempore acres per ipsam urinæ transeunt, ulceribus affligi solet. Est & alius renum affectus, quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cujus quidem existet causa, aut ipsorum imbecillitas renum aut maxima relaxatio eorum meatuum, per quos ex vena cava in renes percolatur urina. Atque ad renes quoque pertinere affectus videtur, quem alij matellæ hydropem, alij profluviū urinæ, alij diabetem, alij dipsacon vocant: qui certe gravissimè accidit. Quo morbo affecti inexplibili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberunt, minimè à sua qualitate mutatum. Hic igitur renum vesicæque affectus, similis & levitati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex ventriculo jecur per mesenterij venas, veluti arbores à terra per radices, alimentum ad sese trahit: sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, alliciunt. Cæterum vesica non trahit à renibus: quemadmodum neque intestina à ventriculo: sed renes quidem per ureteras excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in jejunum, per intestinum ab Herophilo dictum dodecadaetylum. Proinde diabetis causa, renum imbecillitas, non potentium diutius continere, urinam, censenda est. Verum enim vero objiciet aliquis si imbecilli sint renes, qui fieri potest, ut urinam ad sese tam celeriter attrahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculi ore consistens, non potente ipso sustinere pondus devoratorum, multa impetuosèingere, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam feroci humoris cupiditatem, unà cum virium imbecillitate accidere. Unde & humiditatem affatim trahere, & eam mox in vesicam pel-
lere, ipsi renes coguntur. Quod autem urinæ fluor repente evenire possit, levitas intestinorum non possit, veluti nec canina appetentia: ob id fit, quia cupiditas qua cibum appetit venter animale officium existit, quo citra sensum nostrum fungi ne-

quæ potest. Renum verò desiderium est naturale, neque ab ipso sensu nostri afficiuntur. Proinde cum ad statum pervenit, ne sensum quidem movet, quemadmodum appetentia canina. Porro laborantes vehementi siti, quatuor accidentium discrimina à potione subire solent. Unum, & quidem primum, vomitio est: alterum, velox per alvum excretio, aut fluore, aut levitate intestinorum: tertium, quod potus diutius quam par est, in ventriculo manet: quartum denique est diabetes, sive urinæ profluviū. Occurrit interdum affectus alius diabeti similis, & quidem ob ciborum multitudinem, qui nec crudi permanent, nec dejiciuntur per alvum, nec plenitudinem gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discutiuntur, dissipanturque. Cujus ut crebrior est, quam displaci, eventus, ita faciliorem curationem admittit. Quippe si prius quam ad summum pervenerit, ipsum cognoveris, haud ita difficulter curabitur. Atque is affectus, à celeri dissipatione ortum ducit, omnibus partibus attracticem, appetitricemque facultatem servantibus. At verò ingentis sitis, quæ citra diabetem accidit, causa est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut utraque intemperie laborans: maxime verò os ipsius: proxime ventriculo hepar, sed maxime pars ejus sima, simul inflammatis meseraicis venis, & jejunum, & ventriculo, atque cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcor ut plurimum comitatur. Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui caninæ in ore ventriculi appetentiæ proportionem respondet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate.

CAPUT III.

Vesicæ superveniunt symptomata, partim communia cæteris, veluti omnes ipsius præter naturam tumores, dolores, & quæ hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, ut ischuria, hoc est, urinæ, retentio: stranguria, hoc est, stillicidium urinæ præterea immoderata urinæ profusio. Quæ quidem evacuationes vesicæ seu meatu utuntur, ipsa haudquaquam affecta. At verò stillicidium urinæ, si ob urinæ acrimoniam fiat, symptoma vesicæ est, affectus verò minimè. Si verò aut ab ulcere, aut ab imbecillitate procedat, in vesicæ affectu consistit. Cæterum cum ab intemperie vesicæ fit imbecillior, propria ipsius actio læditur, quæ est urinæ excretio: ad quam animal excitari solet, cum vel à multitudine contentæ in ipsa materia vesicæ gravatur, vel à mordacitate convellitur. Quinetiam instrumentales affectus interdum imbecillitatem inducere possunt: præterea omnes intemperantiæ, præcipueque illæ, quæ sæpe nonnullis eveniunt, cum frigore corripiuntur. Ad hæc, ischuriæ symptoma supervenire solet vesicæ, tanquam meiendi instrumento: interdum quidem, cum circa id quod in ea continetur, contrahi non potest, ut ipsum exprimat: interdum etiam obstructo inferiori meatu aut à crassis humoribus, aut à lapide impacto. Atque accidit nonnunquam vel ab inflammatione, vel ab alio id genus tumore, ut angustior reddatur meatus, vel etiam omni non obstruatur. Sciendum autem est, non vesicæ, sed meiendi munus, veluti etiam dejiciendi, non intestinorum officium, pendere à voluntatis imperio. Quippe vesicæ officium unicum est, contractio. At musculus qui

urinæ

Sitientia hementia quatuor cidentia scismen tione possent

Sitis in tis causa

Diabetes prius affectus

Ischuria Stranguria

Stillicidium urinæ do Symptoma Vesicæ do affectus eius existit

Meiendi munus ca, potest Solus imperio Dejiciendi munus intestinum est voluntas

urinae meatum in circuitu ambit, in origine cervicis vesicae positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur. Simile quoque & actio nem & usum habet musculus, qui recti intestini partem extremam ambit: proinde ipsis resolutis neque urinam vesica, neque alvus stercorea, retinere potest: sed praeter voluntatem, * utraque paulatim effluunt. Quare suppressio urinae fieri nequit ob affectum spinæ, aut nervorum ab illa in dictos musculos exortorum (quod nonnulli putarunt, credentes vesicae officium a voluntate pendere) sed ipsius involuntaria excretio. Atqui ut nonnulli tum urinarum, tum excrementorum alvi dejectionem totam ab electione procedere existimantes, hallucinati sunt: sic rursus alij, his è diverso totum hoc opus naturale putantes, ab scopo aberrarunt. Etenim cibi à ventriculo in jejunum transmissio, tota naturæ opus est: voluntatis autem, extensio digiti. At alvi dejectio, & urinae redditio, utroque instrumento propriis suis facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque vesica, naturali facultate utuntur: muscoli vero, ea quæ animalis & voluntaria vocatur. Quippe muscoli qui solent cohibere fluores, ab opere quiescunt, abdominis musculis munere suo fungentibus: maximè verò mediis. Quum igitur vesicae corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur exprimere nequeat, urina supprimitur, vocaturque symptoma id ischuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius sensum obtusum, ut non reddatur urina, citra tamen expultricis facultatis læsionem: nimirum si proprii vesicae nervi afficiantur, nervis musculi cervicem ejus constringentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si resolvantur, urina praeter voluntatem excernitur. Ob spinæ etiam luxationem ad interiora, supprimitur aliquando urina consuevit: orta videlicet phlegmone in affecta particula. Quemadmodum vertebrae ad externas partes luxatis, invito urinam profluere vidimus, ob resolutum nervum musculi vesicam ipsam claudentis. Retenta etiam longo tempore urina, vel ob somnum diuturnum, vel ob negotia urgentia, ipsa vesica extenditur, atque urina supprimitur, contractrice facultate propter tensionem immodicam læsa. Præterea ob sanguinis grumen & pus crassiusculum, interdum retinetur urina. In pueris etiam, quos lapis in vesica cruciabat, vidimus saepenumero ipsam urinam supprimitur. Eos itaque, resupino figurato corpore, adeo concussimus, ut à meatu lapis dimoveretur. Ceterum grumos vocatos, non solum eos qui in vesica, sed multo magis illos quoque, qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectio, & color pallidus se qui solet: pulsus vero parvus, obscurus, & frequens apparet: laboransque ipse, cum anxietate resolvitur. Sunt autem ad intentionem affectæ sedis, non solum præsentia symptomata, sed præterita etiam investiganda. Nonnihil etiam confert quantitatem puris (si quando excernatur) & mixturam ejus cum urina, considerare. Nam si pus cum lotio exactè permixtum sit, à supernis aliunde partibus effluit. Si vero sine urina excernatur, in vesica consistere suppurationem indi-

cat. Sed quod mediam inter hæc conditionem servaverit, id à renibus descendisse, certum indicium est. Similiter expendendum est, si rupta vomica, cum notis affecti loci, ulceris aliquod quodque signum appareat. Nam & hoc, aut exactè, aut mediocriter, aut omnino nihil cum urina miscetur. Atque vocatum quidem ramentum, ulceris: essentia vero proprietas, affectæ partis proprium indicium est. Quippe partes à vesica avulsæ, lamis: à renibus vero sunt carunculis similes. Similiter ubi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cum urinis ejecta intueri, & ea suspectarum partium essentia comparare oportet. Igitur cum urina expurgatur gibbe hepatis partes, atque omnes quotquot his superiores existunt: per alvum vero pars jecinoris sima, intestina, ventriculus, lien. Præter has alia quædam sunt purgationes, sed raro: ut quæ thorax & pulmo per alvum purgatur: quæ sub septo transverso sunt positæ partes, per urinam. Vidimus etiam nos pulmonis vomica expurgari similiter per urinam: rejecto videlicet pure, à pulmone quidem per lævæ arteriæ, in sinistrum cordis ventriculum: à corde autem, per arteriam magnam, ad renes: atque illinc tandem per ureteras ad vesicam. Etenim ut à concava venâ, ita ex magna arteria, rami ad renes descendunt.

CAPUT V.

Uteri affectuum plurimæ differentia existunt. Siquidem mulierum quæ hystericis dispositionibus corripuntur, alia quidem sine sensu immobiles jacent, cum obscuro parvoque pulsu, vel omnino sine ullo pulsu. Alia autem sentiunt, atque moveri possunt, integraque ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, difficiliusque spiratione laborant. Alia denique crura simul & brachia contrahunt. Porro nonnulli ad explorandum, num penitus respiratio perierit, flocculos lanæ carptæ, suspendi coram naribus jubent. Alij poculum aquæ plenum ori ventriculi imponunt. Quippe immotum omnino servari humorem aiunt, si spiratio tota sit intercepta. Etenim in confesso est, & spirationem à vita, & vitæ à spiratione separari non posse: adeo ut viventem non spirare, & spirantem non vivere, sit impossibile. Quod si in animalibus, quæ in latere delitescunt, nulla appareat respiracionis nota, neque ob id mirari debemus, quum videlicet ea animalia sint frigida. Quippe maximus usus respiracionis est, ut intimus calor & refrigeratione & ventilatione servetur. Quare haud ita difficile fuerit perpendere, exiguum illum calorem in eis derelictum, arteriarum cordisque motu servari: quæ actio à quibusdam medicis transpiratio vocatur. Similiter etiam, pereunte ob uteri affectum spiratione, quoniam universum corpus refrigeratur, (id quod perspicuum est) fieri potest, * ut nullo attracto per os spiritu, aut reddito, transpiratio, quæ per arterias fit, perseveret, licet adeo interdum exigua, ut sensum omnino effugiat. Accidit autem uteri suffocatio magna ex parte viduis mulieribus: us præsertim, quæ quum antea probe repurgarentur, parerent, atque virorum congressu fruerentur, his omnibus postea privantur. Quare verisimile est, ob retenta menstrua, vel semen cohibitum, ejusmodi mulieres uteri dispositionibus infestari: idque fortasse magis ob se-

Ramentum est signum ulcera. Essentia proprietas affectæ partis indicium est. Partes à vesica avulsæ, lamis, à renibus, sunt carunculis similes. Partium singule per quæ regione purgantur. Pulmonis vomica ali-quando per urinam purgari. Arteria magna ramulos mittit ad renes.

Uteri affectuum plurimæ differentia.

Respiratione perisse omnino, aut non prorsus, quibus modis deprehendatur.

Spiratio à vita separari non potest, nec à respiracione ipsa vitæ.

Respiracionis usus. Latentium animalium calor, motus cordis & arteriarum servantur.

Transpiratio per arterias.

Uteri suffocatio quibus præcipue accidat.

Uteri suffocatio ob retenta menstrua, & semen cohibitum, semen solet accideri.

Semen muliebre quale.

Semen retentum nonnullis viris qua Symptomata inducat.

Semen retentum quam mēstrua quibus inferat graviora Symptomata.

*Libidini indulgere mul-
tos modestos
Viros Galetu-
dinu gratia.
Diogenes Cy-
nicus.*

Animalia omnia quo pacto excitentur ad Venerem.

Phalangii iētus.

Scorpionis iētus.

*Torpedo marina, piscato-
ris manum reddit torpi-
dam, per me-
dium triden-
tem.*

Heraclius lapis.

*Veneno ex-
tinctos, quo-
modo distin-
guemus ab
aliis qui ob
praesos corpo-
ris succos in-
tereunt.*

men retentum. Nam quum muliebre semen hu-
midius atq; frigidius sit, ipsum excerni oportet,
praesertim si copia redundet. Nec secus etiam in
viris. Sunt quippe nonnulli eorum, quos protin-
us à juventute, concubitus imbecilliores red-
dit. Alij, nisi assidue coeant, capitis gravitate infe-
statur, cibos fastidiunt, febrib. sunt obnoxii, dete-
rius coquunt & appetunt, ac deniq; torpore, pi-
gritia, ac melancholicis accidentib. molestantur.
Proinde ex retento semine, quam ex suppressis
menstruis, videtur mihi longè major noxa eve-
nire posse corporibus, eorū praesertim, qui suapte
natura vitiosis abundat humoribus, pleniq; sunt,
& in ocio educati: quiq; quū antea nihil fecissent
ad libidinē reliqui, affatim cōtinere cōperunt. In
quibus sanè conjicio, naturalē excernendi ipsum
cupiditatē, laesionis causam existere. Etenim quū
tale & tantum ipsum semē evaserit, neminē non
ad sui excretionē vi quadā stimulat. Ob idq; pla-
nè constat, modestos viros, non ob voluptatem,
sed ut ab impedimento praeserventur, indulgere
libidini, perinde ac si nulla sit ei conjugata volu-
ptas. Ita Diogenem Cynicum narrant, virū alio-
qui mortaliū omnium (quod ad cōtinentiam
pertinet) cōstantissimū, libidini tamē navasse o-
perā, nō à cōjuncta illi voluptate veluti bono a-
liquo, illectum, sed ut noxā, quā à retento semi-
ne provenire solet, arceret. Eum nanq; meretrix
adire pollicita. quum diutius cessaret, ipse manu
pudendis admota, semen excussit, ac venientem
dein mulierculā remisit, inquit: Manus hyme-
næum celebrando praevenit te. Sic etiam arbitror
animalia omnia excitari ad coitum, non quod e-
xistiment voluptatē boni cuiuspiā speciē prae se
ferre, sed ut semē, quod retentum ipsa molestat,
excernāt: haud secus quam deijciendi stercoreis,
excernendāq; urinā desiderio suapte natura mo-
ventur. Fieri autē potest, ut profluentibus men-
struis, retineatur in viduis semen, gravissimaque
inducat symptomata. Nec sanè cuipiā mirum vi-
deri debet, si exiguus humor in una parte cōten-
tus, tantorū accidentiū sit causa: quū à phalangii
ictu affici totū corpus videatur, exiguo veneno
per minimū forām injecto. Praeterea scorpio-
nis iētus brevi admodum tempore gravissima
symptomata inducit, quāvis in illius aculeo fora-
mē nullū videatur. Rationi tamen est cōsonum,
ut vel à spiritu quodā, vel tenui humiditate injē-
cta, accidentia illa proficiantur. Sunt qui putāt,
res quasdā solo tactu per qualitatis vim, ea quae
ipsis vicina sūt, alterare posse: idq; planè videri in
marina torpedine ajūt, utpote cui tā vehemēs sit
potentia, ut per piscatoris tridentem transmissa
ad manū alteratione, totā reddat repentē torpi-
dā. Similis etiā facultas inest Heraclio lapidi, fer-
rum siquidē, q; tetigerit, ei adhæret. Deinde si a-
liud, id quod primō tactum fuerit, tetigerit, simi-
liter ut primū illi inhærebit: ac si deinceps. Por-
rò ijdem affectus oriri possunt & ab humoribus
in corpore putrescentibus, & ab epoto veneno.
Ii tamē qui venenum hauserunt, ab iis qui alter
sunt affecti, discerni possunt. Quū enim homo
suapte natura probis succis abundans, ac *salu-
bri secundū omnia usus victus ratione, repentē
moritur (ut letali assumpto veneno fieri contin-

git) deinde corpus aut livens, aut nigricans, aut
varium apparet, aut diffuēs,* aut gravem red-
dit odorem putredinis, hūc venenum sumpsisse
ajunt. Igitur si ejusmodi affectibus nos infestari
fateamur, qui ex nobismetipsis accepto suā ori-
ginis impetu, similes sint iis qui epoto veneno
eveniūt: nihil mirum fuerit, si etiā vitiatū semen,
aut menstrū, hujusmodi, quū retinetur, aut pu-
trefcit in corpore, gravia symptomata inducat,
iis praesertim, qui ut afficiantur, sunt apti. Siqui-
dem quantā vim habeat afficiendē rei aptitudo,
in canibus licet videre. Quum enim reliquorum
animalium nullum rabie arripiatur, solus canis
eo affectu corripitur, tantāq; fit in ipso humorū
corruptio, ut vel solum ejus sputum, si humanū
corpus cōtigerit, rabie excitare sit potens. Quod
verò ad gignendos uteri affectus majorem vim
habeat semen quam menstrū retentum, vel ex
hoc liquet, q; dum supprimuntur menses mulie-
ribus cōjugatis, etsi pluribus accidentibus infe-
stentur, nunquā tamen aut spiratione privātur,
aut animā deliquio laborant: quod solent non
nullae viduae, licet æquē ut antea, aut paulò mi-
nus, quod pertinet ad menstrua, purgētur. Quae
sanè symptomata Plato exponere cupiens, sic in
Timaeo edisserit: Ea pars quae in mulieribus & u-
terus & vulva nominatur, quum sit animal avi-
dum generadi, si intempestivē diuq; infecundū
manserit, admodum indignatur, errantq; per to-
tum corpus, ac meatus spirituum obstruens, re-
spirareq; non sinens, in extremā anxietatē addu-
cit, & alios morbos complures excitat. Hæc Pla-
to. Cæterum illius agitationis uteri, quam mulie-
res percipiunt, nō est causa ascensus ejus usq; ad
regionem diaphragmatis, ut nonnulli putarunt.
Nam si aliquid ex utero videatur ascendere, id p-
exiguum est. Sed uteri ipsius tensiones esse po-
tius in causa dixerim, cur tangentibus obstetrici-
bus, modò sursum, modò retrahi in latus vide-
tur. Nam simul cum utero, cervicē quoq; ipsius
retrahi necesse est. Quum igitur ad uterum mul-
ta admodum venarum ora perveniant, per quas
ex cōcava vena sanguinem attrahere potest,* san-
nè ob plenitudinem tum earum, tum vinculorū
quae ex illis dependent, cōtingit uterum sursum,
aut etiam ad latus retrahi. Siquidem omnis con-
vulsio fit aut à plenitudine, aut ab inanitiōe. Ple-
nitude quippe, repleta corpora & in latum, & in
profundum extendit, sed longitudinē reddit bre-
viorem. Quò autem breviora fiunt, eò magis ad
suam originem retrahuntur. Dum itaq; descen-
dens sanguis ad uterum, ingredi ad ipsius inter-
nam capacitātē nō potest, aut quia crassior est,
quā ut vasorum ora permeare possit: aut quia
clausa sunt orificia, multiplicatus in venis, eas ex-
tēdit, atq; vicina ipsis vincula madefacit: ad quo-
rum omnium tensionem, continuo uterum re-
trahi est necesse.* Qui si undiq; trahatur æquali-
ter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmu-
tatio: sin verò inæqualiter, ad partem vehemen-
tius trahentem intenditur. Non ergo veluti ani-
mal errabundum, aliās ad alium locum discurrit
in mulierib. uterus, sed ab extensione retrahitur.
Quòd si quispiam dixerit, uteri corpus tunc mi-
nimè affectū esse, sed perversione laborare, haud
absur-

*Afficiendū
res aptissimae
maximam
obtinere &
ad excipien-
dum affectum
Canis solus
rabie cor-
tur: ex
sputum
biem exci-
ve est pat-*

Plato.

*Uterum
ascendens
regionem
diaphrag-
matis
per uterum
foculatione
sed tum
tum ipsius
vasa tenent
qua rari
videtur
gari.*

*Convulsio
invisibilis
à plenitu-
dine, aut
inanitione*

absurda is dixisse videbitur. Igitur perversiones uteri, eo quæ diximus modo, ad suppressa sequuntur menstrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent, causas esse, nequaquam putandum est. Quæ verò citra perversiōnem, aut menstruorum retentionem, viduas molestant noxæ, hæ ob retentum semen evenire putantur. Cæterum pro multitudinis, qualitatisve ratione, tum menstruorum, tum seminis, alias alia accidentium species oriri solent. Etenim noxia causa universum corpus refrigerare potente, adeo vehementer omnes partes refrigerantur, ut & respiratio, & arteriarum pulsus, sensu deprehendi non possint. Quæ si vel crassa fuerit, vel acris, convulsiones: si verò atræ bilis naturā referat, mœstitiā inducet: quemadmodū animi quoque deliquia, & ad fortes extensiones, & refrigerationes, & oris ventriculi affectus, subsequi consueverunt. Porro si mulier nec prægnans, nec puerpera, lac possideat, menstrua ei defecerunt. At nullo in mammis lacte apparente, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Gravitas totum corpus infestat, necnon fastidium, atque inæqualis horror. Quod si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, appetatq; mulier quædam aliena, ut (exempli gratia) extinctos carbones, jube ut obstetrix uteri cervicem tangat. Nam si citra duritiem clausa inveniatur, eam prægnantē esse conjicies. Si verò etiam durities adsit, affectum aliquem in utero esse portendit. Oportet itaq; speculari obstetricem, ad quā partē vel declinet, vel retrahatur uterus: nā in ea parte affectū uteri sedē esse conjicies. Atq; in quibusdā fœminis, ejus partis dolor cum gravitate, nō nihil potest significare: quinetiā in coxā dolor interdum transit, & crus ipsum, quod est regione est, per incessum claudicat. Quod si longiori tēpore supprimatur menstrua, nullaq; medicus mulieri vacationē pmoveat, tumor aliquis præter naturā, in ilibus interdum oritur, ostendens nimirum ex internis partib. quāpiā esse inflāmatā. Nonnullis panus in extrema ilium parte excitatur, veluti viris quoq; eodem in loco nōnunquā oriri solet.* Qui panus in quadam muliere fuit suppuratus, adeo ut opus fuerit sectione.* Juxta hanc ipsam partē vidimus colon intestinum & suppuratum, & sectum: interdum ignoratib. medicis imperitis quidnā inciderent, interdum intelligentibus quoq;.* Cæterum quoties suppurari cōtigit colum, semper facile curationem recepit: uteri verò sectiones, ægrius cōglutinantur. Itaq; symptomata hujusmodi consueverunt sequi suppressa menstrua: ac præterea lumborū, & colli, & sincipitis dolor, qui ad oculorū usq; radices extenditur: item febres ardentes, & nigricantes urines, cum rubra quadā sanie, perinde ac si aque, in qua nuper mactatæ carnes ablutæ fuerūt, fuliginem quis miscuisset. Quibusdam urinā aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Quod si per alium quēpiā corporis locum sanguis effluerit, aut inflāmatio, aut erysipelas excitetur, an menstrua purgentur interrogare debes. Siquidem nihil horum accidere solet, integre repurgatis. Quum verò immodicē vacuatur menses, color sequitur fœdus, pedes molli tumo-

re attolluntur, corporis robur prosterntur, vitiantur ciborū tum cōcoctio, tum cupiditas. Sed accidit interdum fœminis muliebri vocatū profluvium, vel utero haudquaquā affecto, quū videlicet universum corpus per ipsum interdum purgatur: quemadmodum per renes quoq; aliquando solet vacuari. Id verò potissimū fit, si mulier laxis sit carnibus, & pituitosa. Atq; id quod excernitur, nōnunquam rubra sanies est, interdum aquosa, & sup pallida. Quod si purus fuerit sanguis, qualis ex dissecta vena profluit, diligenter animadvertere oportet, num erosio sit aliqua in utero. Ea verò magna ex parte in cervice potius quā alibi cōtingere solet: discerniturq; per excretam sanie, si fuerit profunda: si verò circa os cervicis cōstitit, nō solum per hanc, sed per tactū etiā cognosci potest. Atq; prægnantes quoq;, quū ora venarū in cervice aperiuntur, excernunt sanguinem. Ergo si mulieri utero gravi, subito extenuentur mammae, abortus sequitur. Atq; geminos ferens, si altera mamma extenuetur, alterū amittit: & omnino si dextra mamma extenuata est, marē: si sinistra, fœminam ædet. Mares si quidem dextris, fœminæ magis cōtinentur sinistris uteri partib; atq; raro aliter accidit. Si mulier pmp̄tē quidem conceperit, dein secundo, aut tertio, aut quarto imprægnationis mense fœtum ejecerit, circa uteri acetabula humorē pituitosum abundare, atq; idcirco venarum arteriarumq; ejus loci ad ora vasorum in uterum descendantium, nexum debiliorem esse, cōjiciendum est, ut fœtum ob gravitatē ferre nequeat, sed abrūpatur facile.

CAPUT VI.

At colis ulcus deprehenditur ex dolore instantē ipsum: necnon ex iis, quæ familiaria ulceri unā cum urina purgantur. Cæterum hæc ab iis quæ a vesica excernuntur, miscellē modus distinguit. Nam quod ex cole defluit, in primo statim exitu excussum, urinā prævenire cōsuevit. Quod verò a vesica emittitur, urinā admixtum videtur. Quinetiam assidue inter mejendū mordicus dolent pudendorū ulcera, præcipuē quum vel crustula, vel sordibus solutis, pura remanserint. Porro gonorrhœa est seminis assidua excretio, & in vita, quæ fit cole haudquaquam extenso. Priapismus verò est permanēs colis tumor extensiove in longitudinem atq; circulum, nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdam consuevit accidere, qui supini decumbunt. Igitur quemadmodum omnia corporis nostri excrementa, duobus modis vacuantur (interdum enim a cōtinentibus ipsa corporibus excernuntur, interdū spontē profluunt, eò quod ob imbecillitatem ab ipsis retineri nequeant corporibus) ita de semine quoq; dicendum est. Nam in hujusmodi omnibus, ut excernere tēpestivē ita continere, naturæ est officium. Verū secretio fit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conceptaculi spatio & contracto, & ad apertum jam meatum, quicquid intus cōtinetur, pellente. Retentio fit, quum clausus manet meatus, & cōtinentur a continente haudquaquam impellitur, sed potius per contractionem comprehenditur, & retinetur. Hoc modo cōtenti in cavis instrumentis humores, per integram valetudinem natura-

Profluvij muliebri causa

Prægnantē si extenuentur mammae, abortus sequitur.

Mares continentur dextris, fœmina sinistris.

Colis ulcus unde deprehendatur.

Excreta à cole & Vesica, quomodo discernenda.

Gonorrhœa est seminis assidua profusio, et in vita, quæ fit cole haudquaquam extenso.

Priapismus quid.

Excrementa corporis duobus modis vacuant.

Excretio quomodo fiat.

Retentio ut fiat.

Semen excernitur in vitro per epota & effluvia

Gonorrhœa instrumentorum seminis est affectio. Priapismus, solis est accidens.

Colem à spiritu intus.

Glandempe- nus semper magnitudinem eandem servare. Partes omnes extra doctrinam ag- grediuntur proprias functiones.

Populares ea tantum quæ raro videntur, prosequuntur admiratione

liter & excernuntur, & retinentur. In illis autem qui præter naturam se habent, retentio quidem, ob excreticis facultatis imbecillitatē: excretio verò, ob retentricis infirmitatem evenit: vel ob dispositionem aliquam, quæ haud secus quam naturalis ipsa excretoria vis partes movere possit. Id quod in seminariis vasis videre licet, ubi quis vel comitiali morbo, vel convulsione violenter fuerit correptus. Cæterum videmus alias quoque partes, ut manus, pedes, aut digitos convelli, modò simul cū totius corporis convulsione, modò ipsis solis affectis. Quare minimè præter rationem fuerit etiam in seminariis vasis, & quidem interdum solis, ejusmodi excitari dispositionem: quemadmodum & gonorrhœam, quæ urinæ, quam quis invitatus emittit, proportionem respondet, quum retentricem videlicet facultatem resolvi contigerit. Gonorrhœa igitur instrumentorum seminis est affectio, non pudendorū, quibus ceu via per quam excernatur, utitur semine. Priapismus verò planè colis est accidens, quam ad arterias ejus potest referri: utpote quæ solæ interdum hujusmodi habeant præter naturam dispositionē, quali affici consueverunt, quum naturaliter totus coles intenditur. Arqui à spiritu ipsum in tumorem attolli, manifestè patet iis, qui celeritatem ejus, & quum iterum residet, perpendunt. Quippe nullus humor tam subitam in alterutram partem mutationem efficere posset. Quum igitur pudendi corpus sit undique fistulosum, facile à vaporoso spiritu per arterias affluente, ubi quis libidinis impetu stimuletur, aut dum ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi, extenditur: glande ipsius semper magnitudinem æqualem servante, quod fistulosus in ipsam nervus non ingrediatur. Natura etenim corporis partes fingens, perficiensque, fecit ut ipsæ citra doctrinam, proprias actiones aggredierentur. Quippe omnium quæ à consilio & voluntate pendunt actionum instrumenta, esse per se docta videntur: animaliaque omnia simulatque genita sunt, & spirant, & vocem ædunt. Quare mirum esse non debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura sunt institutæ, protinus ab initio cognoscere. Uterus siquidem, quum semine genitale conceperit, donec fuerit perfectus fœtus, exactè clausus permanet: perfecto verò fœtu, plurimum aperitur, ac deinde sic apertus excludit. Populares autem hæc, propter crebrum eventum, contemnunt: utpote qui nihil quod re vera sit admirabile, sed ea duntaxat, quæ rara videntur, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura potest admirabilius contingere, quam quod novem perpetuis mensibus clauditur os uteri adeo exactè, ut ne specilli quidem acumen admittat: perfecto autem fœtu, usque adeo distenditur, ut totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorū vim per se doctā esse: ut fistulosum hoc, nervosumque corpus, ubi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate, quæ ipsum potest attollere, protinus distendatur. Cujus rei simile, & in corde, & arteria planè videre est: nisi quod horum motus perpetuus existit, quia necessaria nobis est eorū actio: fistulosus verò nervus non semper movetur, sed quum u-

sus requirit. Quum ergo sic fuerit extensus, sequitur atque illū replet ex arteriis spiritus: quæadmodum pulmo thoracē, ob eā quam habet ad ipsius motum consequutionē. Atque eam actionē satius est ut ad nervū, quam ad arterias referas: quum præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, non ex earum situ, provenire, rationi cōsonum sit. Arteriæ itaque nullā aliā in pudendo habent actionis vim, quā in universo corpore: licet calfactis lumbis par sit, ut arteriæ calidiores reddantur, & magis etiā pateant ipsarum ora. Quamobrem non exigua tunc spiritus essentiam, in fistulosum nervū effundit: qui paulatim impletus, collem extendit, ita ut tota ipsius essentia consistere in fistuloso nervo videatur. Ex dictis igitur constat, vel ob arteriarū ora immodicè patefacta, vel vaporosum spiritū in fistuloso nervo ortū, priapismum oriri. Cæterum ab utrisque ipsum fieri posse existimo, crebrius tamen ob arteriarū ora patentia. Porro medicamenta excitandæ tēiginis vim obtinentia, tum epota, tum pubi lumbisque admota, calida omnino, ac flatulenta sunt: quemadmodum contraria omnia, minimè flatus excitat, ac potius refrigerant, quam calfaciant. Sunt præterea alimenta quædam, quæ, quod plurimum gignat seminis, excitare ad libidinē possunt. Jam verò qui quum plurimo semine abundant, à concubitu abstinent, interdum priapismo vexari solent, præsertim si venereis imaginibus molestantur, nec studeant ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipent. At cantores & athletæ, qui jam inde ab initio nullam vitæ partem venereis illecebris contaminarunt: nullā admittentes ejusmodi vel cogitationem, vel imaginationem, iis pudenda & exilia, & rugosa fieri, veluti senibus, consueverunt. Siquidem præter cætera quæ accidere solent iis, qui protinus juventute prima immodicè sese permiserunt libidini, id etiā evenit, ut horum locorum vasa, amplius patentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & coeundi cupiditas magis increseat. Ignavia siquidem (ut inquit Plato) exolvit: proprii autem officij exercitatio, robur augere solet. Sic mammæ quoque, in iis quæ nondum imprægnatæ fuerunt, contractæ permanent: in aliis verò à partu infantulos suos lactantibus, vastissimæ evadunt, atque ita magnè permanent, lac fundentes quandiu fœtū lactaverint: quo ablato, haud ita multo post à lactis generatione desistunt.

GALENI PERGAMENI de differentiis febrium, lib. I.

C A P. I.

Propriæ ac maximè principales febrium differentia sunt, quæ sumuntur ab ipsa febris substantia, quæ in calore præter naturam consistit: ut si dixerimus, febrium aliarum quidem mordaces, aliarum verò sunt mites. At reliquæ differentia, ab accidente aliquo deducuntur: ut quum dicimus, febrium aliarum pallidarum, aliarum rubearum, aliarum lividarum. Porro differentia caloris præter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in quā calor acceditur, & ex modo motus ejusdem caloris, sumuntur. Sunt autem omnino evidentes, quæ

Priapi te- nem ad- sumptio- referenda- esse, quam- arterias.

Lumbis- lescen- arteria p- calidiores- reddunt- Penis effo- tra tota- ner- so fissi-

Priapism- unde oria- Medicam- ra excita- tēiginis- lia existan-

Aliment- venerea- Priapism- qui sol- a- venari- p- num.

Catores- quam non- facio er- longè com- nentiores- pudenda- stis redd- lia et rug-

Ignavia- bur exolv- Exercita- Sires aug- solet. Mamma-

Febrium- ferentia- xime prin- pales sum- tur ab ip- febris sub- stantia.

Febrium- ferentia- accidenti- sumpta.

quæ in eo quod magis aut minus calor est accensus, consistunt. Quo in genere differentiæ, cōsueverunt medici magnam ac parvam febrem vocare, improprie quidem rei quali, nomē quanti tribuentes. Quæ verò à caloris materia ducuntur, maximè propriæ differentiæ caloris præter naturam sunt. Atq; hæc sanè ternario numero ambiuntur. Nam aut incalescit ipsius cordis corpus: aut qui continentur in ventriculis ejus humores: aut sola quidem aërea spiritalisq; substantia sufficēter incaluit: humores autem & solida corpora incalescunt quidem adhuc, nōdum autem sunt calefacta. Māta siquidem est in arteriis omnibus spirantibus per infinita foramina, aërea substantia sanguini, ac nihilo minus in corde ipso, ceu *confluxili & conspirabili cum universis arteriis. Incipit itaque hic præter naturam calor, quem nominamus febrem, alias ex alio eorum, quæ nuper diximus: spargitur autem, atqui unā cum patiente afficit duo reliqua genera. Facillima igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis transumptio: nō æquē autem promptē unā cum spiritu, accenduntur humores. Corpus etiam solidum, humoribus atque aëreæ substantiæ facilius impartitur calorem, quā ipsum ab eisdem suscipiat. Omnis siquidē substantia tenuis, promptius alteratur quā crassa. Est autem tenuissima quidem aëris: crassissima verò corporum solidorum: media humorum substantia existit. Cæterum solidas partes, continentia: humores, contenta: spiritus, impellentia appellavit Hippocrates.

CAPUT II.

Quod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate, & crapula, nonnulli febricitare cernantur, omnib. est in confesso: quemadmodum etiam, quod pestilens aëris constitutio febres conciliet: quodq; periculosa sit conversatio cum laborantibus pestilenti morbo, quum nimirum is non secus sit contagiosus, quā scabies aut lippitudo. Sed neque tutum est cum iis qui tabe correpti sunt, cōversari: neq; (ut summatim dicā) cum illisq; spiritum putrem reddunt. Jam verò qui consueta exercitia omiserint, & aliis morborum generibus, & febribus maximè corripuntur. Plethora etiam, vitiosi cibi, medicamenta, æstusq; circa canis syderis ortum, atq; alia id genus complura, similiter febres accendunt.

CAPUT III.

Igitur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, corporum elemēta existunt: ex ipsorumq; temperaturis primi constituuntur morbi: quorū unus est febris, ubi in corde quædam præter naturam caliditas generatur. At differentiæ caloris, à triplici differentia materiæ desumebantur. Siquidē vel in ipso corpore cordis, vel in humoribus, vel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Præincipiunt autem causæ quædam notissimæ, in omni febrium constitutione, quatenus dictum est. Sed neque sat est, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, ad hoc ut dici febris mereatur: oportet siquidem prius ut cor illo incalescat: alioqui calor à sole aut ab igni inductus, febris esset dicendus. Porro iracundia est veluti

fervor quidā, ac motus vehemens potentia irascibilis, in corde *delitescens. Simul autē cum eo fervore calfit aliquando spiritus, aliquando substantia sanguinis. Quod si ita contigerit, ut ea corpora quæ in se admiserunt caliditatem, longo eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedetur, in hisce tamen permanet calor præter naturam, atque inde hominem febricitare est necesse. Hujuscemodi autem febris habet originem à motu atque fervore nativæ caliditatis. Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex fervore gignitur. At illius quæ labores sequitur, principium est musculorum, nervorum, copularum, & articularum motus immoderatus. Ea siquidem primò, calorem quendam concipiunt. Dein verò continuatim calor ascendit ad cor, ac tunc homo necessariò febricitat.

Quæ autem ex densitate cutis accenditur febris, qualis maximè constipatis atque astrictis corporibus accidere solet, mordaci effluxu in corpore coacervato contingit. Semper enim corpora animalium diffilantur, idq; duplici modo: nempe effusis ad exteriora vaporosis fuliginosisq; superfluitatibus, ac rursus intus attracta refrigerante ac ventilante nativum calorem aërea substantia.

Quum igitur vehemens aliqua causa cutim ipsam condensans, meatus angustiores reddiderit, sæpius in plethoricam dispositionem incidit corpus, si & vapidum & optimum, quod effluit, extiterit. At si fuerit mordax & acre, nonnunquā febre corripitur: quo tēpore etia calor maximè augetur, refrigerio extrinsecus adveniente privatus. Acris autem ac mordax superfluitas *effluit iis, qui aut natura vitiosos habent humores, aut pravis cibis utuntur, aut sæpius cruditate vexantur, maximè si post ejusmodi cibum aquam vitiosam biberint. Idem his quoque accidit, qui supra modum laborant, aut vigilant, aut cogitant, aut medicamina acuta jugiter sumunt. Eorum igitur

qui cruditatem patiuntur, ij quidem qui pravis succis redundant, ac malè diffilantur, aut intempestivè laborant, aut balneis superfluis utuntur facile corripuntur febribus. Qui verò boni habitus sunt, integreq; diffilantur, & quiescunt, regionemq; ventriculi & hepatis calfaciūt, impossibile est ut febricitent. Nam in eisdem residet ventriculi & hepatis partibus, quicquid corruptum est, ac paulatim coquitur, redditurq; optimum: sicuti & iis qui se motibus vehementioribus torquent, aut æstivo sole, aut balneis calidis dulcium aquarum utuntur, quicquid vitiatum est, recipitur in corporis habitum. Quibus verò corrupti cibi descenderunt in ventrem, *eos febris non corripit, nisi ob alias causas: veluti si defatigati sint ob crebriorem dejectiendi necessitatem, aut ventrem inflammatio tentaverit. *Porro per obstructions meatuum, & humorum constipationes, ob putredinem solet febris oriri. Promptissimè nanq; putrescunt omnia calida & humida, in calidis locis contenta, nisi diffilari ipsa & refrigerari contigerit. *Quinetiam in altera plenitudine quæ ad vires dicitur, succi citò ad corruptionem deveniunt, *quum nec vincantur, nec concoquantur à facultate, utpote imbecilla existente. Propterea autem quicumque cibi

Febris ab iracundia quanta gignatur. Febris orta à tristitia. Febris ab exercitio immodico.

Febris à cute densata.

Diffilari animalium corpora duplici modo.

Astrictione cutis, quomodo febris sequatur.

Cruditatem patientium, qui nam facile in febres incidunt, & qui egred.

Febres oriri solent ob obstructions meatuum.

Putrescunt facile calida & humida, & si conclusa in calidis locis.

nec diffilantur nec refrigerantur. Plenitudo ad vires.

*Inflammata
particula
cur febres
succedant.*

*Caliditas
erysipelato-
sa & phle-
gmonosa,
quando in se
stans.*

*Carbunculi
oriuntur à
fergente &
melancholi-
co sanguine.*

*Aër impen-
dio calidior,
quid in corpo-
ra nostra mo-
liatur.*

*Pestilentis fe-
bris causa est
inspiratio
aëris vitiat
& putridi:
necnon vitio-
sus succus in
corpore, ad
putrescendū
habitus.*

*Causam nul-
lam posse age-
re, absq; pa-
tientis corpo-
ris aptitu-
dine.*

*Pestilentis fe-
bre, qua cor-
pora facile,
& quæ diffi-
cillimè corri-
piantur.*

*Aëris consti-
tutio calida
& humida,
pestiferis est
morbis obno-
xia.*

*Corpora con-
sistentia
causis morbi-
ficis facile
corripiuntur.
Corporū di-
spositiones
dissimiles.*

glutinosi atq; crassi sunt, * ij ratione putredinis magis morbifici existunt: quandoquidem succi ex ipsis geniti, longè promptiores sunt, ut & in meatibus hæreant, & impingantur. At acres & attenuantes cibi, quòd mali succi sint, febres etiā accendunt. Partes etiā quæ experiuntur inflammationem, ratione putredinis similiter febres inducunt. Impactus siquidem in eis qui influxit humor, si natura calidus sit, nec diffletur, actutum putrescit. Si igitur fluxionem ipsam exquisitè a- 10 mara bilis pepererit, caliditas erysipelatoſa partem occupat: si verò sanguis, phlegmonosa: at si ex utrisq; miscellaneus humor, vel sit erysipelas inflammationis particeps, vel inflammatio erysipelatis: nomen quidem ab humore excellēte suscipiens, cognomen autem ab altero. In hisce autem omnibus consortii lege febris accenditur. Nam proxima pars calefactæ particulæ, simul cum ea calfit, donec ad cor * dispositio ipsa pervenerit. Etenim in carbunculis id quod conti- 20 nuum existit, similiter cōcaleſcit. Fiunt autem ex sanguine quidem satis calido, & ad atræ bilis naturam, propter adustionem, converso.

CAPUT IV.

Calidiores aëris ambientis status, per inspirationem quidem manifestè cor calfaciunt: corpori autem extrinsecus circumfusi, totum ipsum calidius reddunt: sed præsertim arterias, ut quæ ipsius substantiæ aëris ambientis aliquid ad se alliciāt: * cum quibus omnibus affici etiam cor est, 30 necesse: & quum calidius impediō fuerit, ipsum primum atque præcipuè, calorem febrilem suscipere, ac dein universo corpori communicare. Pestilentis autem febris, inspiratio aëris vitiat & putridi, maximè esse in causa videtur. Fit aliquādo etiam ob opus qui sunt in corpore humores ad putrescendum paratos, quum exiguam aliquam occasionem ad febris originem ab aëre ambiente acceperit animal. Aëris autem putredo accidit, vel ob cadaverum multitudinē minimè cre- 40 matorum: vel ob lacuum, vel paludum æstivo tempore evaporationem. Cæterum nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest: alioqui ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. Quæ igitur vitiosis succis redundant corpora, obstructaq; sunt, atq; inertis victus & exercitij ratione educata fuerūt, ea sanè per pestilentes cōstitutiones ambientis, statim à prima inspiratione initium putredinis sument, ac plurimum in malo provehantur. Quæ verò contrario modo 50 disposita, nonnulla quidem nihil, nonnulla verò adeò exiguū læsionis percipiēt, ut minimo negotio reverti ad naturalem habitū possint. Jam verò quum aëris temperatura, ad caliditatem atq; humiditatem immodicam fuerit conversa, pestilentes morbi exoriētur: qui ea tantum corripient corpora, quæ ut afficiantur, prompta & idonea erunt. Etenim ea corpora quorum dispositiones consentiunt causis morbificis, facillimè cōtaminantur: quorum verò renituntur, ac reluctantur, 60 quantum viribus ac magnitudine contrarietas valet, tantum invicta cōtingit permanere ea corpora. Quum enim corporum dispositiones dissimiles ac multiformes existant, quædam facile alterantur, ac patiuntur à causa in ipsa operante: quæ

dam insuperabiles atq; impassibiles permanent: quædam agrè patiuntur. Est autem ipsius medicus opus, correctivū errorum omnium, qui circa humanum corpus contingunt. Quare in iis omnibus prima esse debet, atq; communis intentio, ut corpus quammaximè purum sit, ac perspirabile: secunda autem, ut præpotenti causæ adversetur, quammaximè fieri poterit. Nam quibus horum contraria insunt, corripuntur celeriter, acerrimèq; laborant.

CAPUT V.

Igitur omnes pestiferæ febres à putredine originē ducunt. At ephemeræ, minimè putredinem humorum sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febricitat, ab agentis causæ caliditate affici natura est aptus. Qui ex ira, huic fervorem quidem fieri caloris qui in corde consistit, est necessarium: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehementior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cutis adstricta est, quum prius acriores superfluitates expirarent per eam, posteaquàm sunt retentæ coærvatæq;, in febrem incidit, nulla interveniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superveniunt febres, omnes (authore Hippocrate) perniciosæ sunt, exceptis ephemeris. Sunt siquidem quædam febres è genere ephemerarum, superveniētes tumoribus inguinum: 30 quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eveniunt, quæq; vel in aliquo viscerū, vel in cavis & maximis vasis radicem habēt suæ generationis. Quandoquidem quæ inguinū tumoribus ephemeræ superveniunt, concalfaciunt semper partes vicinas, donec usque ad cor febrilis calor perveniat: quò tamen putrida fuligo non pervenit, sed ibidem, in loco inguinis circumscripta remanet, sola alteratione per continuum facta, atque usque ad cor ipsum extensa 40 sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis sit vasis, quidā veluti fumus, ex putrescentibus succis ad ventriculos cordis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collectiq; humores putrescunt, sive per unum, sive per duos continuos dies, utpote in uno eodemq; loco compacti: at qui in visceribus sunt, vasisque magnis, quum perpetuò fluant, suosque contactu vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt. 50

CAPUT VI.

Humorum autem putredo, quæ in vasis sit, similis est ei quæ in inflammationibus, abscessibus, atque tuberibus accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit vincente natura, aut omnimodo superata, aut adeo imbecilli reddita, ut nullam amplius in putrescente excremento ad optimum moliri possit transmutationem: quod quidem tertium genus putredinis ex duobus primis conflatur. Per abscessus igitur, integrè superante natura, optimum conficitur pus, aspectui album & crassum, & quaqueversum sibi simile: læve autem tangenti, ac minimè foetidum. Nam si semiputridum fuerit, tertium in tali transmutatione genus, quod paulò antè diximus 60

*Corpus o-
tra pestili-
tem auran-
debet red-
purissimū
ac maximū
tum perſpi-
bile, tum
sa præpot-
contrariū*

*Pestiferæ
bres omni-
putredine*

*Ephemeræ
superſen-
tes tumor-
ibus inguin-
um, quomodo
putredine
ferant.*

*Putredo
morum
in vasis
contingi
pliciter.*

*Pus la-
le quale
debeat.*

mus, fit: quodq; secundū magis & minus, varias differentias sortitur. Quotcunque autem in abscissibus putredinis sunt differentiae, totidem & in febribus quae ex putredine succeduntur, sunt eorum quae in urinis apparent, formae varietates. Optima verò urina quae ex putrescente humore perficitur, qui adhuc concoctionem à continenti vase suscipiat, est quae albam, laevem, aqualem, & minimè foetidā habet hypostasim. Pessima autē est, quae in omnibus maximè cōtrario modo se habet. Quae verò intermedia existit, quantò ad alterā propius accesserit, tantò aut melior est, aut deterior.

CAPUT VII.

Porro febrium ephemerarum hoc unum est praeipuum atq; inseparabile indicium, quod ab aliqua manifesta causa praecipienteque (quam procatacticam vocant) oriatur. Non est tamen id signum earum proprium. Nam & aliarum quaedam, à causa manifesta gignuntur, quae nimirum praecessit. Inseparabile verò ac proprium ephemerarum est, urinae statim prima die cōcoctio: pulsusq; ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedens, ita ut frequentia à proportionē deficiat secundum externam quietem. Est autem & magis inseparabile & proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quae dicitur systole, tendit: & si aliquando contingat hoc, minimum ac vix perceptibile existit, parumq; à naturali tenore mutatum. Sed & caliditatis suavitas, proprium atque inseparabile est huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, aequalis atq; incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & aliis quibusdam adsit: sicuti etiam consistente febre mediocritas. Neq; enim hoc etiam est ephemerarum proprium, quanquam eis maximè inest. Proprium praeterea inseparabileq; ephemerarum indicium est, cū sudore, aut rore, aut aliquo optimo vapore inclinatio, quam sequatur integritas. Atq; haec quidem est communis ephemerarum febrium dignotio. Earum verò quae ex adverso ab ephemeris distinguuntur. quaedam in putredine humorū consistunt, quaedam solidas animalis particulas occupant. Atque has sanè medici febres hecticas appellarūt, vel quia firmæ atq; fixæ, perinde ac habitus, sunt: vel quia corporis habitum comprehenderunt: sic enim partes solidas vocitant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatactica causa eas antecedit: id quod neutri aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatacticis. Hecticae autem, quando sine his gignuntur, minimè ab initio invadunt. Ubi quis igitur citra manifestam, praecipientemque causam cœpit febrile, scire oportet eius febris causam in humoribus esse. Interdū tamen aliqua ex procatacticis causis sui ratione febrem accendit ephemeram: succedit autē altera ex putredine humorū, qui quod afficitur corpus, & impurum & superflui humoris colluvie redundās fuerit. Successionis autem ipsius, una quidem propria inseparabilisq; dignotio habetur, quod febris ephemeræ ad integritatem non

desinat. Contingit verò aliquando, ut per vigorem ephemeræ, ac multò magis p declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: videlicet si ea tranquillitas absit, quam adesse oportebat. Initium autē sumere à rigore febrem, ubi nec insolatus, nec praecessit aliqua refrigeratio vehemens, putridarum febrium est proprium signum, non tamē inseparabile. Siquidem nō inest putridis omnibus rigor: sicuti neq; horror. Praeterea inaequalitas pulsuum atq; caloris, sive in principiis, sive in augmento contingat, huiusmodi febrium est signum proprium, sed ne ipsum quidē inseparabile. Multò aut minus inseparabile existit, quod accessiones ipsae habeant plures veluti insultus: id quod superexacerbari vocamus: quemadmodum & pulsuum compressio, quae putridarum febrium est propria (nisi aliquis symptomatis ratione citra febrem ea accidat) non tamē inseparabilis. Maximum etiam earum febrium quae à putredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimonia caloris, quae perinde ac fumus nares & oculos, sic ipsa erodere tactum videtur. Sed in principiis quidem accessionum, utpote in quibus calor adhuc suffocatur, superfluitatesque succeduntur intus, non statim ea qualitas, admota manu, discernitur. At per moram, praedicta caliditas species effertur ex penitioribus partibus. Proprium praeterea inseparabileq; putridarum febrium est signum, velocitas systoles, quae manifestius quidem in crescentibus febribus, non obscurè autem in incipientibus & consistentibus fit. Comitatur autem has febres, in initiis quidem, pulsus parvus ac velox: quum verò consistunt, velox simul & magnus. Sic & quae circa externam quietem versatur frequentia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifestè. Cujus similis neque in ephemeris, neque in hecticis cernitur. Maximum verò & harum febrium indicium existit urinae cruditas: earundemq; est proprium, imbecilla concoctio. Neque enim unquam magnum aut effatu dignum concoctionis indicium per huiusmodi febres in primis urinis apparet, si quidem excipiamus eam, quae fit ex ephemeris febribus, permutationem. At verò pulsus durus nullius generis febrium, quatenus febres sunt, est aut proprius, aut inseparabilis. Comitatur tamen magna ex parte hecticas febres: nonnunquam verò etiam duo genera alia, symptomate aliquo interveniente. Quippe durities accidit arteriarum tunicis, aut ob congelationem, aut tensionem, aut siccitatem. Congelationes igitur, vehemens algores efficiunt: tensionem verò, inflammationes, & duri tumores, & nervorum dispositio inflammationibus correspondens. At siccitatem, evacuationes diuturnae, & longi temporis fames, & diutinae febres ardentes. In universum autem, quaecunque solidas animalis particulas vehementer exiccant, sicuti & hecticae febres, arteriarum duritiem efficiunt.

CAPUT VIII.

At verò hecticae febres magna quidem ex parte ardentibus febribus solent supervenire, usque adeo productis, ut humorem in corpore cor-

Ephemerarum
permutari
in putrida,
quibus digno
scatur indi-
cium.

Putridarum
febrium ca-
lor est mor-
dax & acris.

Putridis fe-
bribus adeffo
velocem sy-
stolem.

Putridarum
febrium pul-
sus.

Putridarum
urinae qualitas

Febrium nul-
li, quatenus
febris, adeffo
pulsus durus.

Durities ten-
de accidat ar-
teriarum tuni-
cis.

Hectica ar-
dentibus fe-
bribus super-
venire.

*Tabida fe-
bres.*

*Hecticas fe-
bres interdū
ab initio in-
vadere, simi-
lem cū ephē-
meris habē-
tes generatio-
nem.*

*Hecticarum
nonnullas
quidem faci-
le, alias agre
curationem*

*Marasmus.
Tabida fe-
bris à tabe
quomodo dif-
ferat.*

*Tabida fe-
bris indicia.*

*Marasmus
quomodo in-
cipiat.*

*Tabes exqui-
sitā quando
dicatur.*

dis contentum absumpserint: quanquam fieri etiam potest, ut magna adhuc eius portio servetur. Cæterum illæ non tantum hecticae sunt, sed etiam rabidæ. Quæ verò manent adhuc humiditate gignuntur, ubi cordis occupaverint corpus, hinc maxime succenduntur, quemadmodum lucernæ flamma ex ellychnio. Alio autem modo febres hecticae oriuntur, ubi statim ab initio invadentes, similem ortum cum ephemeris habent: videlicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non admodum agere curantur. Quæ autem pervenerunt ad tabem, ijs, ubi jam exquisitè consistunt, & jamdudum inceperunt, ut medeamur est impossibile. Siquidem earum natura calida est & sicca, quum per eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychnium, dum plurimum est exustum. Differt autem tabida febris à tabe, sive marasmo. Marasmus siquidem etiam absque febre in decrepitate ætate solet accidere, extincto nativo calore: id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ ferè sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex siccitate contingit: sicuti & ijs qui præter naturam tabescunt, altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex morbo senectus vocatur. Tabida verò febris non tantum sicca, sed etiam calida est passio.

CAPUT IX.

Hectica igitur quæ in tabem incidit, febris, cognitū promptissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsum atque calorem perpendas tactu, videbis oculos immodicè concavos, ac veluti in foveas quasdam reconditos, exhausto jam universo ipsorum humore, ita ut ossium, quibus palpebræ coherent, eminentiæ cernantur. Sordes præterea in ipsis sicca ostenduntur, & quædam veluti squallida dispositio, qualis maxime inest ijs, qui toto die sub solis ardore per pulverem iter longum fecerunt. Quinetiam in eis est coloris flos vitalis extinctus: frontisque & faciei cutis rigida ex siccitate, & squallida. Ad hæc, sic affecti frequenter palpebras contrahunt, dormitantium instar: non tamen affectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotentia. Præ macie etiam sunt illis collapsa & concava tempora: nihilque in eorum corporibus cernitur præter cutim atque ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet. Caliditas verò, quum primum admovetur manus, lan- quida est: paulatim autem acredinem, atque erosionem ostendit: ac magis, quum plus tangendo immoraberis. Porro marasmus tunc incipit, dum cognatus humor, qui in mediis partium similium spaciis inspersus est, & ex quo primum universæ partes nutriuntur, periclitatur circa corpus cordis non amplius adesse. Quandiu enim pars aliqua humoris illius conservetur, solum febris hectica existet, nondum etiam tabida. Ubi verò res eò discriminis jam pervenerit, ut nihil ex tali humore supersit, tunc exquisita tabes existet. Est autem hecticarum omnium dispositio difficilis, ubi præterierit principii tempus: quod non dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est.

Cæterum quum naturalis temperies cordis primum inverti inceperit, neque nativa humiditas protinus dissipatur, neque virtus laborat plurimum: sed primò fit veluti quædam effervescentia ipsius humiditatis: quo tempore facile est ejusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc virtute perpeffa. Tantum autem virtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde invaluerit. Jam verò, quæ febris æqualiter ab utraque distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, mediam quodammodo sese habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinans. Quæ autem tabidæ proximior existit: est vicinior periculo, quum quæ alteri primæ magis adhæret, non parvam salutis spem possit nobis promittere. Fingamus igitur aliquem esse correptum febre, quam præcesserant conspicua & procataretica causa. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neque integrè desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen majorem in corpore repræsentet, talem hecticam fore tibi suspicandum fuerit. Quod si & in tertio die sine cibo permanere voluerit æger, donecque tertianæ accessionis præterierit horas suspectas, nihilque effatu dignum priori accesserit febre, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quædam exigua reliquæ primæ febris procedant, permaneantque cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidem tactu miris sentiatur, processu verò acris, mordax & sicca: hujuscemodi febrem hecticam esse existimandum est. Maximum verò & indubitatum erit eius naturæ indicium, si cibum homini post suspectas horas obtuleris. Statim siquidem una vel altera hora post cibum exhibitum, quicumque ægotantem tetigerint, alteram febris accessionem opinabuntur adesse. Omnibus namque hecticis febribus hoc proprium inseparabileque adest indicium, scilicet quod allato cibo accendatur calor, pulsuque ad magnitudinem & velocitatem augeatur, sic ut videatur oborta esse incompressa quædam accessio, hoc est, libera ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tamen in aliis nonnullis febribus hujuscemodi insultus incompressi cernantur, ij tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hecticis nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuò cernitur una febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admoventi manū possidet occurrentem: pulsusque ædit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hecticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusque tantò minores, rariores, atque tardiores sunt ijs, qui per synochos, fiunt, quòtò etiam caliditas ipsa est minor. Commune itaque omnibus hecticis febribus est, quod pusillæ, & semper à principio usque ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum siccitas. Nam sine siccitate sæpius hecticae febres consistunt, quum minimè in tabem degenerant. Jam cæteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingestus fuerit in accessionis principio. Hecticis autem, post

post cibū assumptū, quendā velut inconcussū
insultum fieri contingit, qui tamen nō est acces-
sio, sed incrementum caloris, atq; promotio pul-
sus in magnitudinē atq; velocitatem, qualis cui-
cunq; alteri post cibū solet accidere. Quamobrē
alteratio ipsa tandiu perdurabit, donec distribu-
tus cibus appositusq; humectaverit cordis aridi-
tatem. Postea verō corpus ad pristinum reverte-
tur statū, in quo antea quā cibus exhiberetur,
cōspiciebatur. Quod si rursus nutrire velis, vel in
diversis temporibus, sentiens semper calorē post
cibos adauctū: pulsus aut (ut dictū est) alteratos:
utpote quibus idem videtur accidere, quod calci-
dus lapidibus cal factis, quorū nimirum caliditas
sicca, per aquæ affusionē, ab humida substantia
nutritur. Humida enim caliditas, quā sicca, vi-
res habet non parum evidentiores. At verō sicca
in heceticis febribus esse caliditatem, quas conse-
quitur tabes, hinc constat, quod nullus eorū qui
habitu corporis sunt humidior, statim ab initio
hujuscemodi febre corrept⁹ fuerit. Quicūq; aut
sunt natura sicciores, ac præsertim si temperiem
etiam calidiore sortiantur, vitamq; elegerint in
laboribus, vigiliis, curis, tenuiq; victus ratione,
hos statim ab initio solet hecetica febris invade-
re, ex ira, vel tristitia: ac magis æstate, statuq; tem-
poris calido & sicco, ac loco præterea consimili.
Ac terminus talium heceticarum principii est, si
eo tempore, quo solent ephemeræ ad integritatē
desinere, non solum istis nihil tale accidat, sed sic-
citas etiā manifestē intendatur. Alter verō cujus-
dam veluti ipsius augmenti, atq; integræ perfe-
ctionis terminus, est tertiæ diei accessio. Nam si
tunc nec altera accessio supervenerit, neq; ægro-
tus absq; febre fuerit, adaucta insuper siccitate,
proculdubio hic hecetica febre laborat: quæ pro-
gressu temporis citō ad tabidam cōvertetur, nisi
rectē curetur. Terminus autem permutationis ip-
sius ad tabem est, dum pulsus debilis simul atq;
durus sentietur: q̄ quidē necessario etiā erit par-
vus & frequens: non tamen propterea febris di-
citur tabida, sed ob id potius, quod debilis atq;
durus existit. Debilitas siquidē, vehementē sequi-
tur febris intemperantiam: durities aut, aridita-
tem. Si igitur hujuscemodi affectus cor occupa-
verit, hinc febre tabida necessum est animal labo-
rare. In eandem verō incidunt febrē ex ardenti-
bus atq; acutis febribus plures, qui rectē curati
nō sunt: quicūq; quī egerent potionē frigidā, non
solum eam nō biberūt, sed nullū etiam aliud re-
frigerans medicamē applicuerūt thoraci & præ-
cordiis. Quinetiā hepatis ac ventriculi inflama-
tionibus, nisi rectē curētur, tabes supervenire cō-
suevit, affectione ipsa cordi cōmunicata. Siqui-
dem tabe corripitur cor, interdum quidem ex se
ipso, sicuti per excandescētiās, vehementesq; at-
que diuturnas tristitias: nonnunquam verō ex
ardentibus febribus: aliquando autem ex pul-
monis ac thoracis affectibus, ac præsertim ex em-
pyemate & phthisi, atq; adeo ex diuturnis nobi-
lium partium inflammationibus. Similiter in lien-
teria & diarrhœa, si vel ab initio statim, vel pro-
gressu temporis, febris invaserit, tabidæ postea fe-
bres succedunt. In universum autem, quando-
cunq; præexiccatum cordis corpus febrilem ca-

liditytem suscepit, & quæ cum difficultate ex-
tinguatū, tabida occupatur febre. Quare & quī
arteriæ circumstantibus partibus calidioribus sen-
tiuntur, maximum sunt heceticarum febrium in-
diciū. Ubi igitur soli per seipsam consistit he-
cetica febris, perspicua est, an sit absolutē heceti-
ca, an simul & marasmodies. Ubi verō hecetica fe-
bris unā cū putrida coit, longē difficilior cognos-
citur: quamvis ex arteriarum perseverante calo-
re, motusq; celeritate & frequentia, eam discer-
nere possumus.

CAPUT X.

Porro qui ex fervore solis inciderūt in febrim, his cutis magis ad calorem & siccitatem, quā
pulsus ad febrilem vergit dispositionem: nam &
minus sitibundi sunt ijs, qui æqualem habent ca-
liditatem: & quamprimum manus admoveatur,
ingens calor percipitur. Contrā res se habet in
ijs, qui ex cute densata & astricta laborant: nam
in eis reaccenditur calor. At qui ex fervore solis
ægrotāt, his maximē deuri caput videtur: plusq;
ex balneis frigidis utilitatis & delectationis per-
cipiunt. Oculi quoq; in eis rubicundiores & ca-
lidiores cum quadam ariditate videntur, si qui-
dem sine gravedine ac destillatione affligantur.
Est autem minus calida cutis ijs qui ex frigidita-
te febricitāt, corpusq; eis in maiorem tumorem
attollitur: ac nullus in frōte squalor, qualis illis
qui ex insolatu febricitant, sine plenitudine capi-
tis. Siquidem magna ex parte his solet caput re-
pleri, nisi quis purum, materiæq; inutilis expers
corpus possideat. Solis quippe his caput cal fieri
contingit, sine aliqua plenitudinis noxa.

GALENI PERGAMENI
de differentiis febrium, lib. II.

CAPUT I.

Superest autē nunc, ut de differentiis febriū
quæ ex humorum putredine oriuntur, si-
militer differamus: idq; ubi admonuerimus
prius, non sat esse (quemadmodū multi opinan-
tur) ad omnium febrium generationem, si in cor-
pore amara bilis redundet. Alioqui laborantes
arquato morbo, ad unum omnes maximis cor-
riperentur febribus: id quod nequaquam con-
tingit, priusquam bilis quæ in illis copiosissima
est, cōputrescat. Absurdum etiam est credere, in
quartanis & quotidianis febribus exquisitis, a-
cervari bilem amaram, quemadmodum in ter-
tianis, atq; in caufonide, quum in illis nullum ta-
lis succi vestigium adsit. Etenim febres tertianæ
magna ex parte in corporibus natura magis bi-
liosius fiunt: in atate vigenti (quæ omnium bilio-
sissima est:) tempore æstivo (in quo dominatur
is humor:) in locis præterea quæ calidam & sic-
cam temperiē possident, in similiq; aeris ambien-
tis constitutione: ac breviter in homine qui la-
boribus, curis, vigiliis, æstu, tenuis victus ratio-
ne, eademq; calida & sicca, ac deniq; medicami-
num calfacientiū & exiccantium immodico u-
su, fuerit commaceratus. Quotidianæ verō, natu-
ris in quibus pituita superfluit: sunt familiares:
in hyemeq; præcipuē, atque in omni locorum &
temporum statu frigidiori atque humidiori gi-
gnuntur. Ex ætatibus porro lenilem atque pueri-
lem

Hectica non
sciri interdū
cum putrida

Febris ex
solare.

Febris ex
astricta.

Febris ex
frigiditate.

Tertiana fe-
bres quibus
naturis ma-
gis sint fami-
liares.

Quotidianæ
febres quib.
naturis ma-
gis sint fami-
liares.

lem infestant magis: præsertim si accedat otiosa vita; quam crapulæ comitantur: atq; etiã si post pituitosos cibos quispiam balneis utatur. Neq; etiam ij qui quotidiana febre tenentur, amaram evomunt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis: hæ siquidem flava bile putrescente gignuntur. At quotidianæ ex pituita, quemadmodum quartanæ ex atra bile, ducunt originem. Proinde corporum naturæ magis ad atram bilem proclives, ex ætatibus, præcipue declinans: ex anni verò temporibus, maximè autūnus: ac breviter victus universus frigidus atq; succus, quartanis febribus originē præstāt. Quare & rigor quæ utrumq; genus febris antecedit, haudquã similis est: * sed q in tertianis quidē accidit, repræsentat sensum causæ efficiētis, veluti rei cuiusdā pūgentis, feriētisq; qui verò in quartanis, tanq̃ refrigerantis. Porro febres intermittētes, quæ nimirū ad integritatē desinūt, ortū habent ab humore qui per oēs corporis partes suo motu defertur. At in cōtinuis, humor delitescit atq; cōtinet in venis.

CAPUT II.

Intermittentiū igitur tres sunt omnes numero differētiæ, quotidiana, tertiana, et quartana: quotidiana quidē, ex pituitæ: tertiana aut, ex flavæ bilis: quartana deniq; ex atræ putredine, ppagata. Continuarū aut quæ ex flava bile proveniūt, duplex species habetur: una quidē, earū quæ appellantur synochi: quarū universum tēpus unica accessio existit, à principio usq; ad finē extensa: altera verò earū quæ idem cum genere nomē habēt, cōtinuæq; dicūtur, atq; in pluribus* particularib. circuitibus cōtinētur. Earū igitur quæ appellantur synochi, tres differētiæ connumerātur. Nam earū quædā à principio ad finē usq; perseverāt æquales: quædā paulatim augētur: aliæ decrescūt, atq; minuuntur. Unde nonnulli primas quidem homotonas acmaasticasq; , secundas epacmaasticas, tertias peracmaasticas, hoc est, uniformes, invalescentes, & decrescentes, nominant. At continuarum duæ sunt differētiæ primæ. Siquidem earum nonnullæ quidem, tertio quoq; die invalescunt exasperanturq; , referentes naturam tertianæ febris: aliæ verò etiam die intermedio exacerbationem faciunt: neutra tamē harum ad integritatem desinunt. Earum igitur cōtinuarum quæ die intermedia accessione faciūt, nonnullæ quidem formam quotidianarum servāt, duas invicem accessiones simillimas conficientes: aliæ verò, quum duas dissimiles faciant, simillimam primæ tertiam efficiūt, atque secundæ quartam, instar duarum tertianarū progredientes. Hæ igitur ex bilioso magis, altere verò quæ singulis diebus similem accessione faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febriū continuarum, quæ perrarò tamen eveniunt, quarum accessiones quartanarum figurā progredientes ostendunt, nec desinunt tamen integrè. Quemadmodum autem febris tertiana aliquando fit duplex, & aliquando triplex: sic hæc etiam non duplex modo, sed triplex potest evadere.

CAPUT III.

Quæ igitur à flava bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, ea cum rigore inva-

dit, atq; ardentis febris similitudinem gerit, & biliosis vomitibus, aut dejectionibus, aut sudoribus, vel horū quibusdam, vel omnibus simul, solvit. Hujus febris accessio duodecim ad summum horarum æquinoctialium intervallo finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianā, quæ in temperatura laborantis biliosa, & anni tempore & regione, & victus ratione, calidis & siccis cōsistit. At verò copiosior bilis, ea quæ pauca est, longiorē facit accessionem: tenuis autem, crassa breviorē. Sic & vigor, major quidem, breviorē; imbecillior autem longiorē. Præterea corporis dispositio, rara quidē breviorē, densa verò longiorē. Tempus autem intermissionis in hac febre, nullū habet humoris putrescentis ex pulsu perceptibile indicium, in die aut nocte, quæ consequitur accessionem. Quum verò parumper succenditur, vix agnosci potest in primis diei aut noctis subinde sequentis partibus: manifestius autem circa fines ipsius diei vel noctis: atq; adhuc manifestius die proxima, quæ videlicet antecedit accessionis diem vel noctē. In illa verò jam signum evidentius apparet, ac multo etiã magis accessione jam incipiente: atq; adhuc plus, invalescente febre. Quū verò jam consistit, minus quàm quum agebatur: multoq; minus ubi jam declinaverit.

CAPUT IIII.

Est & alia exquisitæ simpliciter febris, quæ ex putrilaginosa pituita ortum habet, per sensibiles à natura partes impulsā. Incipit autem à refrigeratione extremorum, & horrore magis quàm rigore. Cum difficultate per eam accenditur calor, ac longum cōsumit tempus dum invalescendo pervenit ad summum. Quoniā verò is ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, ac præterea lentus & tenax, idcirco ægrè accenditur, ac tardè movetur, sapiusque in foraminibus hæret. Opprimat autem atq; aggravat aliquando virtutem: unde inæquales ac debiles magis, parvosq; efficit pulsus, quū primū accessiones invadunt, atq; in primis incrementi partibus. Fiunt & in biliosa febre circa accessionum principia, singuli quos diximus pulsuū affectus: in ea tamē statim desinunt: cætera verò, necnon inæqualitas, plerunq; tali febre invadente non adsunt. At postquam cessaverit rigor, non multum post calor accenditur, veluti ignis effulgens, purusq; , omnis fumose fuliginis expers. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accensis lignis viridibus refert. Idcirco & * exiguæ evacuationes ab ipso, & accessionis spacium longius producit: neq; intermissionis tempus est adeo ut in tertiana syncerum, sed humoris putrefacti servat indicium. Attamen quum exquisitè suam naturam servaverit, plerisq; & mihi nō raro videtur habere purā intermissionem. Hæc febris, naturas cōsequitur corporum & tempora, & loca, & status, artesque & victus rationem, aliaq; omnia prorsus alumna pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, quàm biliosa tertiana. Hæc enim, quū humorem habeat minimo negotio, inflammabilē, facileq; quicquid ex eo efferbuerit, totū propter subtilitatē in accessione expurgetur, ad puriorem quādam integri-

Tertiana sunt à flava bile computrescente.

Quotidiana sunt à pituita.

Quartanis febribus quæ originem præstent.

Rigor qualis tertianis, quartanisq;.

Intermittentiū febriū & continuarum discrimin.

Intermittentiū febriū tres differētia.

Continuarū species duplex.

Synochi uniusversum tempus est unica accessio.

Synochorum tres differētia.

Homotona febres.

Acmaastica febres.

Epacmaastica febres.

Paracmaastica febres.

Continuarū duæ differētia.

Continuam quartanam reperiri per raro.

Tertiana exquisita quæ

Accessio febriū faciunt.

Gior

res

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

Tertiana

bris sym

ma. a.

integritatē terminari videtur: atq; exiguū quoddam vestigiū post paroxysmū, putridæ caliditatis relinquere. Quæ autē ex pituita febris accēditur, in accessionū declinationib. nō expurgatur integre neq; parū reliquit eius quod veluti succendi videtur: ac, p inde intermissio eius longē deterior est, ac secundæ accessionis multo magis festinat insultus.

CAPUT V.

Tertiū febriū intermittentiū genus est exquisita quartana, quū ex solo atræ bilis humore gignitur, qui frigida & sicca cōstat tēperatura. Succenditur aut paulatim, veluti lapis aliq; aut corpus similiter frigidū atq; ficcū. Ubi verō aliqua ex eo flāma fuerit accēsa, nihil humidū, aut semicōbustum in accessione relinquit: atq; idcirco ex hoc humore, quā ex pituita, plures evacuationes oriuntur, intermissioq; exquisitē pura videtur: quādoquidē quicquid atræ bilis accēsum fuerit, exhauritur atq; discutitur. Quamobrō in sic affectis talis est rigor, qualis ijs, q; vehemēti gelu frigescent. Hanc aut febrē necessariō antecedit, quæcunq; atrā bilem accumulāt. Cæterum accessio ipsius, quod quidem ad longitudinem pertinet, similis est tertianæ: nonnunquā etiam & longior, quum videlicet exquisita persistit, nēpe à frigidiori humore producta. Pro multitudine autem & qualitate humoris, vigore & imbecillitate potentia, necnon ipsius ægotantis dispositione, per omnes febres solet longitudo accessionum variari. Si igitur neq; putrescat, neq; vehementer per partes sensiles deferatur, melancholicus humor, nūquā efficiet exquisitum quartanum circuitum. Jam verō, regii quidem morbi passionibus, diuturni melācholicūq; splenis affectū, & colores in toto corpore fœdi: herpetib⁹ verō atq; erysipelabus, quæ ex flava bile gignuntur, cancri & phagedænæ, proportionē quadā respondent. Verū neq; in his, neq; in aliis atræ bilis affectibus necessariō febricitat, nisi pri⁹ atræ bilis putrescat. Semper quippe natura suis viribus freta, quicquid optimū reddi potest ex succis, id nutriendis partibus conatur assimilare: excernere aut, quod talem correctionem nō recipit. Quod si quando ob occasionem aliquam id ipsum nequeat expellere, necessum est, ut diutius delitescēs in animalis corpore, corrumpatur. Sic igitur ijs qui morbo regio, atq; atræ bilis passionibus infestantur, quando biliosi humores superabundantes, diutius corpus obsederint, febris supervenire cōsuevit. Sed neq; ob redundantem pituitā febris unquam accenditur, nisi prius cōputruerit. Ob pituitam aut visum est sæpius (quod impossibile arbitrabantur veteres) oriri absq; febre rigorem.

CAPUT VI.

Ex genere quotidianarum est febris quam Hepialam vocāt, ubi simul & febriunt, & rigent ægri, atq; eodem tempore in toto corpore utrunq; sentiunt affectum. Oritur autē hæc febris ab humore illo, quē vitreum Praxagoras vocat, quiq; est species quædam pituitæ, satis frigidus atq; tenax existens. Siquidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cujus tamē plures sunt differentiæ. Est namque una species pituitæ, usque adeo frigida, ut quū detinetur alicubi, dolores acerbissimos ex-

citet. Atq; hæc sanē vitro fuso est persimilis. Est et alia pituitæ species haudquaquā exactē frigida, quam pleriq; cū sreatu expuunt, sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertia species pituitæ, quæ sentitur expuentibus acida: estq; minus frigida, quā quæ dicit^r vitrea: magis verō quā dulcis. Præter has species, est salsa aut ob putredinē, aut ob serosæ humiditatis mistionē: ex qua quidem febricitantes non rigent, sed tantummodo horrēt. Acida verō ac vitrea pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrem Hepialam conciliant. At si vehementius putrescant, rigor quidē antecedit, febris verō sequitur, à multitudine caloris frigida materia devicta. At putrescente dulci pituita, rigor minimē antecedit febrem.

CAPUT VII.

Porro si pituita putrescēs misceatur amaræ bili, duplex ut causa, sic etiam dispositio jungetur. Alter siquidem humor afferet quotidie accessionem, alter verō tertio quoq; die. Itaq; alter quidē dies duas accessiones habebit, alter verō unam duntaxat: nisi accessionū tēpora sibi mutuō cohæreant: cohærentibus siquidem fiet una febris confusa, quæ neq; puræ tertianæ, nec quotidianæ formā præ sese feret. Quoniā verō utriusq; febris duplex species est, quatuor ex ipsis fient conjugationes. Una qdē in qua tertiana quotidianæ intermittētī miscet^r. Altera, in qua tertiana quotidianæ continuæ jungitur. Tertia, in qua quotidiana intermittens, tertianæ cōtinuæ miscetur. Quarta deniq; in qua permiscet^r quotidiana cōtinua tertianæ cōtinuæ. Harū verō nuper dictarū conjugationum omnium, duæ sunt differentiæ: quum aliquando quidem in eandem horam accessiones occurrant: nonnunquam verō diversis temporibus superveniant. Cæterum ex accessionis forma, non ex periodorum simili proportionē, cognoscenda ipsa febris venit. At quæ singulis diebus accenditur atq; intermittitur febris, ea amphimerina, hoc est, simpliciter quotidiana vocetur. Quæ verō intermissionem non habet, continua quotidiana dicatur. Idem etiam & in aliis febribus est faciendum iudicium. Jam verō ex quotidiana continua, & tertiana intermittente, hemitritæi natura constat. Quum igitur tertianæ insultus cum rigore invadat: quotidianæ autem continuæ, sine rigore: sanē si ambæ in unam horam (quod interdum per hemitritæum contingit) conspirent ex æquo, febris conflata ex utraq; horrorem præ se feret, rem quidem rigore minorem, sed majorem refrigeratione. Quocirca dimidiam hemitritæi portionem utraq; illarum febrium (dico quotidianæ cōtinuæ, & intermittētis tertianæ) occupabit. Est autem hemitritæi duplex generationis modus. Nam aut illarum febriū accessiones in unam eandemq; horam coeunt, quod altera quidē anticipet, atq; altera prorogetur: vel statim ab ipso initio ambæ febres miscentur & confunduntur. Quæ igitur fit, in unum tempus conspirante utraq; accessione, unum duntaxat hemitritæi naturæ paroxysmum sortitur: altera autem omnes, à principio ægritudinis usq; ad finem: quæ febris maximē ab omni-

Hepialam fieri etiam à pituita acida.

Tertiana febris & quotidiana mixta. rum, quatuor conjugationes.

Amphimerina febris.

Hemitritæi constat ex quotidiana continua, & intermittente tertiana. Hemitritæi invadere cum horrore.

Hemitritæi duplex generationis modus.

omnib. hemitritæos vocatur. Qui aut intermit-
tētis tertianæ & quotidianæ cōtinuæ formā per
se cognōrit, facile cōplicas per symptomata p-
pria distinguet. Porro quānā ex eis cōplicatis ci-
tius sit habitura finem, ex ipsarū specie, accessio-
nis prolixitate, magnitudineq; præterea ex mo-
re, motu, reditū periodorum, necnon ex conco-
ctionis & cruditis indicis, conjecturandum.

CAPUT VIII.

Febris igitur quæ ex intermittente tertiana, & 10
quotidiana cōtinuā, cōposita est (quam hemitri-
tæum vocamus) aut flavam bilē habet exuperan-
tem: atq; ob id, in ea fiunt tertianæ febris acciden-
tia majora: aut hæc quidem parcior, pituita verò
abundantior existit: ob idq; quotidianæ cōtinuæ
affectus firmiores: aut neuter horū humorū alte-
rum vincit, sed ambo æquipollere videntur, idq;
in exquisitis hemitritæis, hoc est, semitertianis,
cōtingit. Ergo si in mixtione ipsa prævaluerit fe-
bris tertiana, horridior sit tota febris, & nōnihil
sibi invasione rigoris associat. Cōfestim verò &
fervidior est hujuscemodi febris, & incēdii plus
habet, magisq; ad summū festinat: & aliqd bilis
per vomitū, aut per alvū, aut per sudores excerni-
tur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior,
tūc frigus vehementius extremas occupat partes,
& pauci adsunt horrores, ac pulsus magis, & diu-
tius cōprimitur: tardiusq; accessio invalescit, ac
longū post tempus cōsistit: non tamen aut fitim,
aut magnum adfert incēdium: nec in ea, ut in
alia, bilis excernitur. Itaq; in hemitritæo exqui-
sita, quæ ex æquali duarum febrium (quando-
quidem humorū duorum) temperatura est com-
posita, veluti pugna quædam inter varios affe-
ctus oritur, quum ager nonnunquā invalescen-
te febre tertiana, atq; ad cutem humores pellēte,
incalescat vehementius, remorante interim re-
vellenteq; intrō ipsius motū febre quæ ex pitui-
ta ortum habet: * quum nimirum is humor sit
tardi ac difficilis motus, frigida & lenta existens

*Hemitritæis
exquisita
quomodo cōn-
stituatur.*

*Hemitritæis
non exquisi-
ta quando di-
citur.*

*Hemitritæus
est continuus.*

*Continua fe-
bres nec hor-
rorem, nec ri-
gorem faciūt*

materia. Dicitur aut hemitritæus febris non ex-
quisita, ubi aut bilem, aut pituitam habet vincen-
tem. Est & alia secunda copula commistioq; dua-
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, am-
barum intermittentium, quæ similem quidē nu-
per dictæ accessionem facit: hoc tamen interje-
cto discrimine, quod hæc quidem intermittatur,
atq; necessario ad integritatem desinat: quodq;
diē secunda cum rigore aut horrore, sola quoti-
diana febris invadat. Quamobrem hujuscemo-
di febris non est dicenda hemitritæus, si quidem
ea numero continuarum hemitritæus existit. At
si in utroque genere hemitritæus consistat, non
hæc tantum, sed multæ præterea aliæ febres, he-
mitritæi dicentur. Cæterum minimè ex duabus
continuis, quarum altera ex bile, altera ex pitui-
ta oriatur, potest hemitritæus produci: quando-
quidem hæc cōmixtio, febrem horridam, & quæ
multas habeat reduplicaciones, non facit. Nam
quum omnis febris continua, sui quidem ratio-
ne, si exquisita fuerit, neq; horrorem habeat, ne-
que rigore: certè quæ ex ipsis componitur, haud-
quaquam horrida fiet. Necessum igitur est, si hor-
ridus simul atq; continuus sit hemitritæus futu-
rus, ex duabus ipsum febribus generari, quarum

altera sit intermittens, altera verò cōtinua. Pro-
inde tertiana mixta quotidianæ continuæ, hemi-
tritæum producit: quam febrem neque utraque
continua, neque utraq; intermittens efficere po-
test. At verò si quotidiana intermittens, miscea-
tur tertianæ continuæ, oriri poterit continua si-
mul atque horrida febris. Hæc tamen contrario
modo se habebit quàm prior: quoniam conti-
nuitatem quidem ex bile obtinebit: horrore ve-
rò, ex pituita: reduplicaciones autem, ex pugna
mutua, ac tunc præsertim, quum humores æquas
vires habuerint. Porro quæ de biliosa & pitui-
tosa febre simul mixtis conscripsimus, ea transfe-
rentes ad * melancholicā, poterimus ipsius cum
utraq; illarum cōmixtionem & confusionem si-
militer cōjecturari. Voco enim complexionem
dum invadunt differētibus horis: confusionem
verò, si eodem tempore inceperint. Tres itaq; si-
mul febres complecti quispiam & cōfundere po-
terit, ipse per se, ex ijs quæ diximus, contempla-
tionem exorsus. Nam horum omnium princi-
pium, fons, atque elementum est, singulare fe-
brium formam atq; figuram exquisitè cognosce-
re: id quod perfacile existit, quum tres tantum
existāt numero: nempe quæ ex amara bile, & quæ
ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare sin-
gulæ duas habent differentias, continuæ scilicet
intermittentisq;: ita ut omnium quæ ex humo-
rum putredine ortum habent, fiant sex numero
differentiæ. Quod si quæ alia accesserit particu-
latim præter has differentia, ea vel ex multitudine
humoris, vel ex quātitate vel ex qualitate pu-
trefactionis, ac præterea ex modo motus, & par-
ticula in qua putredo consistit, habebit originē.
Jam verò quæ intermissionem habuerint mino-
rem febres, nempe accessione ipsa in longius tē-
pus producta, eæ sanè extensæ vocantur: quæ ta-
men in eo quod magis aut minus, varias differē-
tias recipiunt. Ex accessionis autem & intermis-
sionis spacio, opportunum ad exhibendum ci-
bum tempus cognoscitur.

CAPUT IX.

Quum autem oriri soleant ephemeræ, sangui-
ne nō putrefacto, sed tantummodo calefacto: in-
vestigandum nobis jam est, si putrescere illum a-
liquando contingat, quenam species febrium gi-
gnatur. Porro ab aliena caliditate exoriri putre-
dinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat au-
tem alienam, externam: nō familiarem, neq; na-
tivam. Hæc siquidem coquere nata est, illa verò
corrumpere, * quod est putrefacere. * Incalescit
autē externo calore sanguis, & in solari deustio-
ne, & pestilēti aëris statu, atq; in febribus univer-
sis, quacumq; ex causa nascantur. Ubi verò in ali-
qua corporis parte sanguis plurimus accumula-
tus, ejusdem partis vim superat, corrumpi cōsue-
vit: præsertim si in parvis vasis propter crassitu-
dinem constipetur, aut ob multitudinem impin-
gatur: quemadmodum videre est in universis in-
flammationibus: in quibus sanè duabus de cau-
sis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet nō
diffilatur, & quia à natura non vincitur. Nōnun-
quam itaq; sanguis in inflammatis particulis su-
bire potest putredinem: ex qua simpliciores qui-
dem, quàm ex aliis humoribus febres oriuntur:
similem

*Hemitri-
ortus.*

*Febrili
plexio
fusio qu*

*Putrida
februm
Versa di-
rentia
ces, sena
numeros
biuntur*

*Ephem
interdū*

*à sangui-
calfacto
Putredo
aliena
citur cau-
tate.*

*Calor na-
tus coqui
alienus
rumpere
natus.*

*Sanguis
do exteri
calore in-
lescat.*

*Sanguis
inflamm
particuli
duplici
causa cor-
rumpitur*

*Febres
redine
guis or
simplici
esse quā
aliis humo-
ribus.*

similem tamen accessionū proportionē servantes, qualem tertianæ febres ostendunt. Sic enim in iis qui laterū inflammationes patiuntur, est observatum: quo tempore maximè rubidum expuunt. Quod si sanguis supra modum assetur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in flavam bilem convertitur: crassior autem, in atram: quod in iis tumoribus, qui carbunculi appellatur, videre licet. Igitur pro varietate humorum in quos cōvertitur sanguis, febres fient, solum la bonitate vel malitia differentes. Illæ siquidem quæ sanguinis consequuntur transmutationem, sunt simpliciores, tum in reliquis, tum in caliditatis qualitate mitiori. Nam etsi se plurima manui tangenti offert, tamen omnino mitis: sicuti quæ in balneo cōtrahitur. Semper enim multitudo febrilis caliditatis, in multitudine effluxus consistit. Quod verò tangenti manui calor molestus sentiatur, id provenit ex humoris acridine. Si igitur calor & vapidus, & minus insuavis videatur, à sanguine proficiscitur. Qui verò molesti, rodentes atq; mordaces existunt, consequuntur utrāq; bilem. At ubi in primo occurso, aliquid magis vaporosum quàm acre, se repræsentat manui, sed per moram paulatim crescit mordacitas, eaq; admodū inæqualis, perinde ac si per cribrum excolari videatur, ex pituitæ putredine oriri talem febrem ne dubites. Indaganti autē mihi, cur in febribus aliis calor æqualis occurrat: quæ verò ex pituita ortum habent, talem caloris inæqualitatem ostendunt: tenacitas & pituitæ crassitudo, quæ dissolvitur ægrè, visa esse in causa. Siquidem ex eo humore, sicuti ex aliis omnibus, ea pars prima omnium expirat, quæ jam attenuata fuerit: vix autem attenuatur, quod valde crassum existit. Quod si etiam natura frigidum fuerit, tunc difficultas augetur: ac proinde non totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantum, in qua putredo invaluerit, efflatur, atque attenuatum effertur.

CAPUT X.

Solent autē per circuitus affligere, quæ admodum febres, alii etiam morbi particulares: ut lipituidines quædam, nonnullique aurium, capitis, nec non articularū dolores. Ut igitur per hosce affectus videre licet, venas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumore attolli, atq; inflammationē augeri, doloresq; intendi, ac deniq; affluxum materiæ inutilis ad exteriora fieri: sic etiā in interioribus oportet imaginari ea omnia, quæ cum minimè cadant sub sensum nostrum, eandem tamē cum illis perpetuò analogiam sortiuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionū quidem principia, tumores crescunt: in declinationibus autem, evaporant, & submittuntur. Porro alibi à nobis est proditū, esse quatuor naturales potentias, à quibus dispensantur tū plantæ, tum animalia. Quarum prima quidem est, similiū attractrix: secunda, eorundem retentrix: tertia post has, altera: quarta denique, alienorū expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alienum: alterum quidem qualitate, alterū verò quantitate. Acervatur autem hoc, ob earum potentiarum quæ in membris sunt, vel imbecillitatē, vel robur. Etenim

si æquè valentes ipsæ partes extiterint, & meatus qui in utilem materiam deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanitate fruētur. Ubi verò plus assumptū fuerit, quàm alterari possit, omne id quod superfluum est, à virtute expultrice trusum, excernitur. Quod si hæc imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, gravat, distenditque: si acre, exedit, ac mordet: sicuti & quod calidū est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Solet autem sæpe excrementum ab aliis in alias partes transfluere, fortioribus nempe id semper à se pellentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Qui motus non cessat, donec in eas quæ omnium imbecillimæ sint, oberrans humor inciderit. Hinc verò ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per plethoras atq; cacochymias, imbecilliores particulæ infestari solent variis fluxionū affectibus. Nihil igitur mirum, vel cerebri, vel universum caput, excrementū in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, veluti ad aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatū, gingivas, gurgulionem, paristhymia, aut denique ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem patiatur, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, ipsa fluxio delabatur. Sicuti igitur causa talium omnium morborum sæpenumero est caput, ita & eas quæ in jecinore ac lie-ne fiunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ vel etiam ex remotioribus aliqua una, vel plures, generant, augent, immittunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nescius non fuerit, primam inflammationis originē, ex fluxione in hepar incidente, suum ortum traxisse: ac quod deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consistere: utiq; is non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Confluit autem materia inutilis interdum quidem (quatenus dictum est) impulsā ad infirmiores particulas, interdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redundant, magna portio ad eas defluit partes, quæ in caluerint vehementius. In iis autem quæ superfluitatibus vacant, admodum pauca. Non parum verò & ad partes dolentes humoris solet confluere. Videntur itaq; manifestè, fluxionū causæ quæ ex ipsis partibus laborantibus originem trahunt, esse duplices: quarum altera est, in ipsis accensa caliditas: altera, excitatus dolor. At verò quod melius sit, aut deterius, quod influit, ex partibus mittentibus pendet: quod plus vel minus, tum ex iis quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentiæ fluxionū, quæ sine partiū, quæ fluxiones admittunt imbecillitate consistunt. Aliæ verò, & propter harum imbecillitatem, & propter earum robur, quæ excrementa transmittunt. Cæterum omnes quæ citra vulnus & contusionē, partibus adveniūt inflammationes, ex recrementis quæ à fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Ubi autem cōstipata excrementa in particula inflammata putruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab inflamato membro in alia illi febris.

vicina, atq; ab his in alia, successione quadā extenditur, donec ad cor aliquando ipse calor perveniat. Porro ubi superfluitas quæ ab una in alteram partem transfertur, adeo copiosa & vitiosa est, ut facultatem recipientis particulæ opprimat dissolvatq; sic ut jam nequeat vincere, quæ

Sanguis quādo necessario putrescat.

antea vincebat: tunc certè necessum est, ut ipse etiam putrescat sanguis: idq; ratione duplici, * & quia humori, qui a proprio calore non vincitur, nihil amplius superest, nisi ut in putredinē transeat: & quia cum superfluitatibus putrescentibus simul ipse putrescit. Quod si nec tanta, nec tam vitiosa ipsa superfluitas existat, ut facultatē omnino dissolvat, atq; feriari compellat, semiputris ac semivitiatus in tali statu reddetur sanguis, ob commercium quidem putrescentium excrementorum, ad putredinē raptus: tantū verò in natura sua perseverans, quantum ab ea, quæ exornat ipsum potētia, vincitur. Utcunq; verò res habeat, qui in prima putredine accenditur calor, acrior atq; mordacior est eo, qui naturalis existit. Tantū autem augetur, quantum natura superfluitati suppeditat. Hæc siquidem ad eum qui ab ipsis

Excrementa fovēt calorem præter naturam, quemadmodum ligna ignem.

calor augetur, ferè similem quandam rationem habent, quàm ligna ad ignem. Etenim hæc minimè in infinitū usq; tempus ad alterationem suffiunt: sed est quidam transmutationis terminus, cum tandiu possint exuri, quandiu aliquid nativi caloris habuerint. Qui ubi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere jam desinūt: & quæ super-

Febres per circuitus mori, unde accidat.

sunt reliquæ, cineres appellantur. Eodem igitur modo putrescentium humorū caliditas permanet, donec prorsus fuerint assati. Parum autē reliquiarū terrestriū restare ex humoribus est verisimile, quoniam in eorū substantia humidum & nō siccum prævalet elementū. Cum itaq; ferventes in putredine humores a calore extenuentur, substantia ipsorū, ubi febres cōsistunt atq; declinant, in ambientem aërem discutitur: superfluitas autē, vel exigua remanet, vel nulla penitus: ex crassioribus quidem humoribus, pauca: ex serosioribus verò nulla. Quod si nullam imbecillitatem pars inflammata contraxerit, neq; iterum superfluitates accedant, ægritudo finietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ mittantur denū, aut ne mittantur quidem, sed adsit sola potentia imbecillitas, hominē secundo febrire est necesse. Fingamus enim, primū quidem validā esse particulæ facultatē: interim verò easdem in partibus, quæ prius transmiserunt, acervatas esse rursus superfluitates, & quantitate & qualitate pares, iis quas antea immiserant: certè nemini dubiū est, quin eodem quoq; circuitu ad eas expellendas, versus imbecilliora membra, move-

Excretrix facultas quando moveatur

buntur ipsæ immittentes partes. Siquidē vis excretoria tunc primum excitatur ad proprium opus, quando aut multitudine superfluitatū gravatur, aut qualitate pungitur. At verò cum in

Lippitudine accedentem per circuitus quomodo curavit Galenus.

lippitudine quæ per circuitus accedit, medici qui se ocularios vocant, semper oculis negociū facessant, nos aliquando purgatione, aliquando balneo, interdum meri potione, interdum missione sanguinis, atq; interdum clystere usi sumus. Quæ industria nonnunq; statim est subsequuta sanitas, nonnunquā post curationem capiti ad-

hibitum. Nam quandiu humor qui ad caput confluit similis fuerit, eademque dispositio capitis, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales acervabuntur, similesque oculorum exasperationes orientur. Quod igitur contingit in oculis, idem in pulmonis, cerebri, laterum, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illis quæ superfluitates transmittunt, sint eodem tempore imbecilliores. Mirandum autem non est, si non iisdem statis temporibus eadem excrementa acerventur. Nam cum is qui pro alimento sanguis defertur, non semper usquequaq; sit similis, nec item nutriendarū particularum eadem dispositio: alii aliud sufficit tempus ad colligendam tantam superfluitatem, a qua quidem ubi primum membri natura læditur, cogitur eam tanquam alienum onus protrudere. Sed neq; ob accessionū imparitatem mirari oportet. * Nam si non eadem est nec species,

nec multitudo superfluitatū, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut discuti. Nam quæ plura & frigidiora, tenacioraq; & crassiora

excrementa sunt, faciunt accessiones longiores: quæ autē pauciora, calidiora, & subtiliora, breviores. Præterea rarior quidem corporis habitus, breviores sui ratione accessiones reddit: densior autem, longiores. Quinetiam potentia robur, minus diuturnas efficit accessiones: imbecillitas autem, in longius tempus producit.

Longissima itaq; accessio fiet ob materia inutiles multitudinem, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam.

Brevissima autem, propter materia inutilis subtilitatem, paucitatem, potentia vigorem, ac laxitatem meatuum. Cum igitur primæ accessio-

nis tempus adeo breve fuerit, ut antequam superveniat secunda, jam prima quieverit, omne id temporis spacium, quod secundæ principium & primæ finem interjacet, sine febre est. Si verò

secunda invadere anticipaverit priusquam omnino prima solvatur, nihil intervenit medium.

Hoc autem fit, cum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contentū, quemadmodum antea, cōvincit. Quod si quando imbecillior reddatur, non solum materia inutilis, sed sanguis etiam cum ea corrumpetur & putrefiet, ex eoq; accendetur febris: atque hinc orietur aliud principium earum, quæ per circuitum fiunt, accessionum.

Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnum perseveret, duplex febriū se invicem complectentium species gignetur. At si illa cessaverit, membri verò fluxionem recipientis dispositio remanserit, quæcunq; de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoq; intelligantur. Nam & ipsa aliquas in se superfluitates gignet: idq; duplici ratione, quemadmodum illa, & quia vitiosum sanguinem continet, & quia facultas ejus est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quavis causa membri vis adeo debilitetur, ut is qui adjacet sanguis, illi sit potius oneri, quàm nutrimento: cōtinget ut corrumpatur, aut si calidior sit, putrescat. Nam si frigidus fuerit, & pituita naturam gerat, non subito, sed tempore ad eandem veniet dispositionē. Porro si eas quæ in ipsa genita fuerint superfluitates,

Accessiones impariter unde accidat.

Accessiones longiores breviores, unde accidat.

Accessiones longissimas quibus.

Accessiones brevissimas quibus.

Accessiones quibus.

tates, nequiverit particula aut coquere, aut ad aliam partem detrudere, tale sibi ipsi febriendi principium constituet, quale ea quæ transmittit alteri, affert. Nequit autem aliò superfluitates transmittere, aut ob propriam imbecillitatem, aut propter recipientis robur, aut denique ob constipationes meatuum, quæ fieri à lentis & crassis & multis humoribus consueverunt. Quæcunque autem naturales meatus obstruxerint, hæc necessario putrescunt tempore, atque etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coacervetur excrementorum, cujus solitam evacuationem & diffusionem prohibent. Unà igitur cum illis putrescunt & alia quæ postremo acervantur, statimque simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At verò, ubicunque accenditur atque augetur caliditas, illuc ab aliis partibus sanguis solet confluere. Quo igitur tempore confluit, illas quidem privari sanguine est necessarium: quod verò patitur membrum, gravari & distendi: ipsumque confluentem sanguinem alterari, & quod aliis quæ jam putruerunt superfluitatibus permisceatur, & quod diffilari, utpote impactum, non possit. Proinde fit, ut instar lignorum humidiorum, quæ super exiguam flammulam projiciuntur affatim succendantur. Quod totum est accessionis principium. Ubi autem caliditas jam materiam convicerit, id tempus augmentum vocatur. Ubi verò calore per universum corpus disperso, inflammati humores ad summum fervorem pervenerint, id accessionis tempus, dicitur consistentia. Hinc igitur, si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rarum, maxima humorum putrescentium pars in sudorem resoluta evacuat. Sin verò hi crassi fuerint, & vis expultrix infirma, necnon meatus angusti, nihil quidem defluit sensibile: sed id solum, quod ita est extenuatum, * ut in subtilioris vaporis naturam transierit. Atque id sanè tempus declinatio appellatur, humorum effervescentium diffusus quidam existens. Cæterum cum in parte adhuc remaneat affectus, necessum est in ipsa aliam gigni superfluitatem, cum nimirum id quod denuò ad ipsam trahitur alimentum, non conficiatur exquisitè universum. Quæ quidem superfluitas rursus à putridis excrementis in parte relictis, necnon proprio ex vitio, initium putredinis suscipit: cumque satis caluerit, rursus ad ipsam influit, quemadmodum antea, ex reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus modo, principium, ascensus, status, & declinatio, alterius fit accessionis. Nec hoc per circuitus desinit fieri, quandiu in particula gignente superfluitates perseverarit affectio: quæ quidem existit duplex: altera quidem, imbecillitas partis, à qua superfluitates gignuntur: altera, quæ ex iisdem quotidie genitis ducit originem. Impossibile autem est solvi remanentem illam dispositionem, si universum corpus multis ac variis excrementis refertum fuerit: ac multò etiam magis, si his accedat omnium, per quos excrementa membri excernuntur, obstructio meatuum. Sanitas autem succedet, si & meatus aperti sint, & facultas vegetior, & corrigatur affectus partis, universumque corpus nec multis nec vitiosis humoribus opprimatur. Nam

quandiu hæc perduraverint, tandiu accessionum circuitum perseverare est necesse. Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus quandiu æquales ac similes menstruum causa persisteant, idem circuitus servabitur. Earum igitur februm, quæ per circuitum accessiones faciunt, nescio an aliqua fuerit nobis ommissa causa: aliarum autem quæ carent ordine, nonnullæ ex transmutatione humoris, nonnullæ ob victus errorem, ad talem dispositionem deveniunt. Maxime autem transmutatur, atque in alteram transit naturam sanguis, dum putrescit. Nam pars quidam ipsius una fit flava bilis: alia, nigra. Quantum verò in ægotantium corpore humores mutantur, tantum etiam accessionum circuitus. Quæcunque autem circa victus rationem errata ab ægotantibus fiunt, ordinem circuituum pervertunt. Sæpe verò ob complicationem circuituum, quæ à medicis ignoratur, videntur absque ordine accessiones ægotantibus fieri. Reliquum est id febrium genus, quæ synochi nominantur, quarum universum tempus unica accessione finitur: quæ vel semper in eodem vigore persistit, vel minuitur, vel augetur, donec finiatur. Hæc verò omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras existimabat, humorum videlicet in cava venâ putrefactionem. Quamquam absolutior & verior hic erit sermo: Quæcunque per circuitus aliquos ægritudinum accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ vel mittunt, vel recipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. At quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit offensa. Qui autem in venis & arteriis omnibus continentur humores, præcipue qui in maximis & plurimo calore abundantibus delitescunt, aut ob aliam quamvis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem ferventes, febrem accendunt synocham, quæ à principio usque ad finem nullam habet intermissionem: ac tandiu perseverat, hominemque deurit, donec humores ipsam gignentes, aut consumantur penitus, aut coquantur, aut utrumque patiantur.

GALENI PERGAMENI

de marasmo sive tabe, Liber.



Marasmus est viventis corporis interitus præ siccitate. Cum autem interitus bifariam dicatur, tum de eo qui fit, tum de eo qui jam factus est, sanè secundum prius significatum oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est, tabes dupliciter dici poterit, nempe cum jam aliquid tabuit, vel cum adhuc tabescit: de qua quidem significatione secunda impræsentiarum nobis est sermo. Porro cum generata viventium sint tria, videlicet animalia, stirpes, & semina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, propriè loquentes dicimus: quamvis per translationem & cæteros etiam interitus, cum ex siccitate proveniunt, communiter tabem appellent. Cum igitur primi & simplices modi quibus omnia viventia intereunt, sint quatuor, siquidem & elementa substantiæ eorum quaternò etiam numero

Sanguis putrescens, in aliam naturam transit.

Circuituum ordinem quæ pervertant.

Synocha, una universum tempus unica accessio est.

Circuitus facientes morbi, ex membrorum dispositionibus universi oriuntur. Synocha generatio.

Marasmus est viventis corporis interitus præ siccitate.

Marasmus est duplex.

Viventium genera tria.

Tabes quotiè esse affectus dicatur.

Interitus modi sunt quatuor.

Elementa viventium sunt quatuor.

ro ambiuntur: tabescere sanè ea dicimus, quæ ex siccitate intereunt. Quod si hæc tantum habeant, quod siccentur, altera verò contrarietas quæ inter calidum & frigidum intercidit, intra suos terminos maneat, simplex ea tabes erit. At si vel caloris vel frigoris accedat immoderatio, jam modus is interitus, duplex & compositus erit. Simplex itaq; tabes inediis solet supervenire, tam eorū qui in ediam spontè tolerant, quam eorum qui præ alimentorum penuria, fame conficiuntur. Illa verò cui frigus accessit, solet senibus evenire: vel etiā illis, qui malo quodam affectu senectuti simili detinentur. Ea autem quæ cum calore est, in febribus locum habet, quæ hecticæ nominantur. Nec verò impræsentiarū de partibus loquimur, quæ ex aliquo symptomate arescunt: sed potius cum totum corpus hoc se habuerit modo. Quocirca si tabes affectio est universi corporis, ea fieri nequit, nisi animantis * principium etiam affectum sit. Quinetiam fieri non potest, ut alius affectus totum ipsum animal occupet, ab alio verò principium ipsius detineatur. Ac proinde necessum est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus arescat. Quocirca si invenimus causas omnes, quibus cor arescere possit, facile tunc noverimus, an omnes tabidi insanabiles sint, an ex iis aliqui potius sanari queant. Optimū autem huius instituti principium erit, si perscrutati fuerimus omnes causas senectæ: quandoquidem ea inter omnes tabes usque adeo evitari minimè potest, ut esse secundum naturam videatur. Siquidem inevitabilia sunt omnia naturæ opera, utpote habentia necessarium suæ generationis ordinem. At non eo modo dicimus senescere esse secundū naturam, quo ali, & augeri (sunt enim hæc naturæ opera: senectus autem non opus, sed affectus quidam necessariò consequens illa) verum hoc nomine, quod nullum unquam sit visum animal, quod ortū fuerit, quin idem sit senio obnoxium. Quamquam non defuit nostris his temporibus philosophus quidam, qui librū ædedit, quo docebat, qua quis posset ratione servari penitus senii expers: qui tamē, posteaquam ad octogesimū usq; annum produxit vitam, adeò gracilis & exiccatus effectus erat, ut verè faciem illam exprimeret, quam descripsit in libro prænotionum Hippocrates. Num igitur propter id siccescunt tum animalia, tum plantæ (quod nonnulli affirmant) quia insitus animantibus calor, veluti ignis quidam, ex ea materia in qua accensus est, suum incrementum sortitur? Etenim illi semper affixus est, nec unquam inde sejungi potest, unde etiam sua omnia habet. Plantæ igitur, animantiaq; omnia, quandiu recens genita sunt, admodum humida existunt. * Quamobrem calor (ut illi aiunt) in ipsis tunc veluti suffocatus obrutusq; præ humoris copia, vix se potest exerere: nimirum caliginosus, tardus, ad motumq; piger cum sit. Postea verò ipsam humiditatem progressu temporis superat, & cuicunq; materiæ præest: quo tempore jam purus æthereusque redditus, suas omnes expeditè functiones ædit. Itaq; usq; ad ætatem vigoris relucet, augeturq;: cujus magnitudo quam plurimū tunc attollitur. Mox verò in-

opia alimenti contingit, ut contabescat paulatim: atq; id ipsum existit senectus. Sed & paulò post extinguitur penitus, id quod mors est. Hic itaq; sermo omnibus ferè tam philosophis, quam medicis recentioribus placet, licet verus omni ex parte non sit. Hallucinantur nanq; dum flammā ignis omnino cum calore animalium conferunt: idq; minimè animadvertentes, quod ortus flammæ est ex materiæ interitu, de qua ea est accensa. Animalia verò, non sic suum, ab eo qui illa effinxit, insitum habuere calorem: sed potius ut ab eo augerentur regerenturq;. Nec ullum est tempus, quo innatus is calor per universam eam materiam non diffundatur, vires non modò eas continens, quibus animal format, verum & alias præterea plures: quippe & alimentū attrahit, & materiam dispensat, apponit, unit, assimilât, omniaq; ut in summa dicam, circa sibi congenitam materiam perficit, contrā quā flamma faciat. Nam quæ unquam flamma, materiā cui annexa est, adauget? vel quæ etiam materiæ potius alimenta assimilât, quā eam sibi? Et quæ tot excogitavit modos, ut eam tueretur materiā? Itaq; cum illi iidem nativum calorem esse naturam fateantur, non rectè faciunt flammis eum comparantes. Nam quod ait Hippocrates, eum calorem nos interficere, qui genuit corpora: certè si liber ille referri ad Hippocratem debeat, locus is requirit expositionē. Verum siquidem est, corpora ob innatum calorem senescere interireq;: modus tamen, quem isti ajunt, verus non est. Neque enim ut flamma ligna, ita innatus animantibus calor, eorum corpora absomit. Quod fortassis exemplum illis congrueret, qui ob febrilem caliditatem intereunt. Porro natura, quæ tum animalia, tum plantas procreat, omnino corporeū aliquod principium, ad illorum generationē assumit: cum nihil sit, quod unquam possit sui ortus initium habere, ab eo, quod penitus est non ens. Inde verò exorsa, semper in eum scopū ordinatè tendit, quem in ea procreatione statim ab initio sibi proposuerat. Id autē est, perfectum illud reddere, quod ab ea gignitur. Sanè perfectū est, quando nulla suarum functionum deest illi. Ipsarum autem functionū complures durioribus instrumentis egent. Unde postea fit, ut multæ in animantibus particulæ duræ evadant. * At principium generationis ipsarum, contrā quā in animali perfecto, necessum est ut sit molle, ut & aptè cōpingi, efformariq; possit, & ad omnia tractabile se suo conditori exhibeat. Ac proinde, quantūcunq; semen sit durum, mollis tamen planta æditur, moderato nimirū quodam humore prius macerata, ut pro semine fiat natura. Itaque si opus est, ut generatio animalis à substantia molli sua habeat exordia, quæ ut absolvitur, ita durescit: necesse utiq; fuerit, ut in prima elementorū, unde illa constituuntur, temperie, tum humidum, tum siccum præpolleat. Cæterum humidum quidem ipsum est aqueum: siccū autē, naturaliter aut est terreum, aut igneum. Fieri verò minimè poterat, ut statim à primis exordiis, plus terreni cōmiseretur, cum opus esset principium animalis fore humidum: reliquū igitur solum est igneum, quod in prima animalis generatione

Tabes simplex quæ dicitur.

Tabes composita quæ dicitur.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Tabes simplex inediis solet supervenire.

Tabes composita quibus solet supervenire.

Senectus quid.

Flamma quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

Calor quid.

ratione & formatione, obtinet principatum. Si igitur fieri posset, & natura cum animal, vel plantam, ad consistendi vigorem perduxerit, aliam rursus elementorū dispositionem, proportionem viribusq; æqualem, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset expers tam senii, quā interitus perdurare, si tamen custodia sapientis alicuius viri mox demandata fuisset: alioqui si malam adhibuisset victus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc verò posteaquā prima elementa generationis tam animalium, quā plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: idcirco necessum est, post consistendi vigorem corpus semper siccescere, quamvis non amplius egeat, ut id ipsum patiat, cum jam illi usui non sit, ut siccescat. Verum ætas inclinationis, quæ siccitatem quidem, quamvis exiguam, habet, multos latet, ac si nondum aliqua tabes sit. Senectus aut, quæ ab ea non genere, sed tantum magnitudine differt, facile deprehendi potest. Hæc igitur causa est, quæ universam animantibus tractu temporis siccitatem præstet: perspicueq; ostendit, senium nec evitari, nec etiam sanari posse. Etenim universa ætas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines, inter eorum ætatem qui jam declinant, & eorum qui senescunt, humidorū est excrementorum exuperantia. Unde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Caterum & omnes actiones statim in his fieri imbecilliores, manifestè videri possunt: atq; etiam via ad mortem, quæ latebat in inclinantibus, jam omnibus fit cōspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit ulla ratione dissolvi, licet ipsam plurimum remorari possimus: quod munus ad gerocomicen, hoc est, ad artem senū curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, ut quoad eius fieri potest, obstitat, prohibeatque, quò minus ipsum cordis corpus eo usque arescat, ut ab omni opere vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cordis est ab actione: cum impossibile sit mori animal, quandiu cor sua actione moveatur. Quare si possit substantia corporis ipsius cordis humidior fieri, vel per Jovē etiā jecinoris, poterit senectuti obstiti. Si verò nemo est, qui queat jecur vel cor humidiora reddere, quā ipsa sint ex se, sed potius semper tempore procedente ea necesse est indies sicciora fieri, cum eisq; arterias & venas, senium quidem prohiberi nō potest: potest tamen detineri, ne citò ingruat, idque humesciente adhibita victus ratione, qua nimirum augere possumus illam humiditatem, quæ in corde jecinoreque est dispersa. Cum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pulsuum & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar: contingit utique, ut hæc viscera nunquam moderatis alimentis destituantur, nisi cum valida sanguinis penuria universum occupaverit corpus. Unde ubi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quoque etiam jecur, esse pro aliorum proportionem extenuata. Caterum vera tabes, similiter partes omnes occupat, propterea quod etiam principia ipsa. Atq; hæc tabes in ætatibus quidem, est senium: in iis verò qui præter

naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia præterea affectio, quam senectam ex morbo cōmōdè appellaverimus, idq; longè melius quā Phlippus, qui eam etiam tabidam febrem nominat. Nam neque febris unquam huiusmodi erit affectus, ubi cor frigidius redditum est, quā ratio naturæ postulet. Quod autem per eum affectum sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus & parvus, similiterq; spiratio rara simul & parva, necnon qui expiratur aer, minimè calidus. Quæ sanè tabis species fit, febribus ob intempestivam immoderatamq; refrigerationē in eam transeuntibus. Est & alia tabis species, quæ dicitur torrida, sicuti & tertia, quam synco-palem appellant: quarum illa quidem ortum habet à calore, febribusque ardentissimis, maximè verò ubi habitus fuerit siccior: hæc autem gignitur, quando iis qui correpti fuerint deliquio animi, ubi vehementiā periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet, ita ut adhuc defectum illum animi sapiant. Est autem duplex ipsa extenuatorum affectio: una quidem, ubi is humor solidorum corporū periit, qui eorum proprium est alimentum, & præterea molliores carnes liquatæ sunt: altera verò, dum solidiora etiā corpora sunt exiccata, quæ utiq; & prima, & similia appellantur. Hæc igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera verò periculo quidem non caret, non tamen eo usq;, ut nullo modo curari possit. Igitur humectare oportet tres illas species tabis jam dictas: & hoc est illis commune, quippe quæ communē siccitatē sortiantur. Sed earum una eget ut calfiat: ea nimirū, quam comparavimus senectuti. Altera verò, quam esse torridam diximus, refrigerari postulat. At tertia, quæ habet animi deliquium conjunctum, si nōdum facta sit, sed etiamnum fiat, ita ut humiditas solidis membris innata absumatur, miscellaneam curationem desiderat. Conspiciuē autem humectare reficereq; exiccatos videtur balneū, ut facile possumus in iis observare, qui æstate sub sole vel iter faciunt, vel alio quopiam modo exercentur, aut exuruntur. Hos enim omnes, atque etiam eos qui siticulosi sunt, humidos reddit, & siti liberat. Sed & alios omnes quocunque modo exiccatos, sive ex vigilia, sive ex curis, sive ex venere, sive ex eduliis, vel medicamentis exiccantibus, sive ex ira: hos inquam omnes madefacere sovereq; balneum videtur. Cum autem sint tres differentię febrium generalissimæ, in præsentia quidem omittamus diarias: convertamus verò sermonem ad eas, quæ ab humoribus proficiuntur: & ad illas etiam, quæ, quod in habitu sint, hecticæ nominantur. Illis igitur quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur, si concocti ii fuerint, balneum remedio est. Hecticis verò quæ solæ consistunt, nec aliud quodpiam genus febris secum habent, balnea quovis tempore conferunt. Sin autem illæ secum febrem aliam habuerint, ex iis quæ ab humoribus pendet, cum ii concocti jam fuerint. Eadem etiam tempora putandum est esse commoda, ad propinandam frigidam: præterquā quod si in hoc aberraveris, id minimè fiet sine magno incommodo. At balnearum usus in jam dictis febribus

Tabes, quam ex morbo senium appellant, non est tabida febris.

Senium ex morbo quomodo introducatur.

Tabes torrida unde gignatur.

Tabes synco-palis quando accidat.

Extenuatorum affecti est duplex.

Tabes incurabilis quanam sit.

Tabes universa quomodo sint curanda.

Exiccatos manifestè videtur reficere balneū.

Balnei usus.

Febrium tres differentie generalissimæ.

Putridis febribus, post concoctionē humorum, balneum optulatur.

Hecticis febribus, quibus alia non copulantur, balnea quovis tempore conferunt.

*Ephemera
quadamcum
hecticis ha-
bent neces-
situdinem: qui
bus aqua est
intrepide pro-
pianda.*

*Frigida po-
tus est
eis quae inco-
moda infe-
ras.*

*Hectica fe-
bre cognata,
refrigeran-
tia esse ex-
trinsecus ad-
movenda cor-
di.*

*Hepar ven-
triculusque
quaratione
febrem hec-
ticam inferat.*

*Pulmo cur
hecticam fe-
brem non gi-
gnat.*

*Hectica fe-
bris quae ra-
tione secun-
dum reliqua
viscera oria-
tur.*

*Balnea tam
calida, quā
frigida sicc-
tatibus confe-
runt, eosque si-
ciculosos red-
dunt qui siti-
sunt vacui,
atque sitim a
siccibundis
abigunt.*

*Hectica cui
erysipelato-
sus affectus
sit coniun-
ctus, curatio*

procul est ab omni periculo, nisi forsitan virium imbecillitas sit suspecta. Ceterum quaedam ex diariis febribus, cum hecticis cōmunionē quan- dam fortiuntur, quae sanē statim in prima die ex- cte discerni nequeūt, sed circa secundam, vel om- nino tertiam. Quo tempore, ubi quis primū eas novit, intrepidē offerre aquam frigidam pote- rit, cum nimirum tunc & vires validae sint, nec desit adhuc corpori sanguinis copia. Ubi verō immoratae diutius fuerint, tunc sanē vires imbe- cilliores redduntur, & sanguis exiguus fit: un- de duplex ex potu frigidae sequi solet incommo- dum. Primū, quod interim dum aquam bibunt, percutitur & refrigerat aliquod membrum. De- inde, quod qui aquam exhibent, nisi debitā men- suram sint assequuti, praeter alias particulas il- lam etiam refrigerabunt, in qua est situm princi- pium generationis febris. Ubi verō supra quā par sit cor refrigerat, si nativam suam adhuc hu- miditatem servet, vires concidunt. Si efficiatur 20 ficius, ab eo affectu arripitur, qui similis senio existit. Sed eodem ipso tempore, quo primum si- gna febrium hecticarum fuerint conspicua, ex- pedit ut refrigerantia medicamenta adhibean- tur extrinsecus, & super ipso febris * foco, & ori- gine. Porro cor primum, si plus aequo incalescat, hecticam febrem affert. Dein verō jecur: hoc ta- men non habet ex se, perinde ut cor, sed ob id, quod illud secum in consortium trahit. Mox ve- rō ventriculus, & post hunc quaecunq; alia, con- 30 sortii lege, possunt secum cor calfacere. At pul- mo hecticam febrē non gignit, propterea quod hoc viscus humidum est, & per inspirationem assiduē refrigeratum, non facile in similem occa- sionem incidit. * Ut plurimum autem secundū reliqua viscera febris hectica gignitur, infuso bi- lioso humore in ventrem ipsius loci patientis. Cum itaq; sola febris constiterit, absq; ulla alte- rius morbi mistura, balneum exposcit, non se- cus ac ceterae siccitates, quaecunq; vel calidae fue- rint, vel frigidae. Nam id sanē mirum balneis inest, quod tam calidis prosint, quā frigidis siccitatibus: quemadmodum & illud, quod eos siticulosos efficiat, qui sitis sunt vacui: a siticulo- sis verō sitim abigat. Quandoq; tamen cum he- ctica tabificaq; febre adest etiam erysipelatosus affectus: qui exigit, ut prius cibo & potu, & iis etiam quae apponuntur exterius, refrigeretur. Quo tempore omnino est super sedendum a bal- neo, frigida autem confertim in ipso morbi vi- gore viriliter exhibenda: a cuius tamen usu ab- stinendum est in principio, nisi nos forsitan ipse cogat agrotus, quippe qui sit assuetus potui fri- gidae, nec sitim perferre velit. Exterius autē sunt applicanda ea quae refrigerent: quae si nihil pro- fecerint, cogendi ut illa etiam intra corpus assu- mant. Praecipuē verō illis prosunt molles lactu- cae, recentesq; , solummodo in frigidam aquam demersae, ac ita assumptae: vel si placet, prius a- ceto diluto intinctae. Extrinsecus etiam eiusdem 60 lactucae succus utiliter adhibetur, sicuti & sem- pervivae & intybi. Praestantissimum verō ad id etiam est medicamen confectum ex succo uvae acerbae, necnon portulacae, cui parum albae fari- nae misceatur. Quod quidem exceptum duplici

linteo, praecordiis est praetendendum, donec te- pescere incipiat. Dein verō, ipso ablato, alterum admovendum est. Nonnunquā iis & oleum imma- turum miscemus, vel rosaceum, praesertim verō si aliquid inflammationis detinuerit praecordia. Sciendum tamen est, fieri non posse, ut ubi erysi- pelatosa visceris dispositio constiterit, ea sit fe- bris exquisitē hectica. Siquidem exquisitē febris hectica est, quae nullum habet particularis acces- sionis principium, nullum incrementum, nul- lum vigorem, nullam inclinationem. Solummo- do autem hecticae febres post assumptū cibum, perinde ut calx, inspersa aqua, effervescūt. Quod incrementum si abstuleris, semper aequales per- manent. Tabi igitur torridae, quae ab ardentibus febribus suam ducit originem, obstititur reme- diis refrigerantibus, quae tum exterius secundū locum affectum administrantur, tum interius accipiuntur. Cum verō senectus quae ex morbo est, invaserit, ea quidem quae absoluta est, nequit curari: quae autem non est perfecta, eō tamen ac- cessit, ut ferē jam facta sit, hunc solum habet cu- rationis scopum, quem refectionem & nutritio- nem vocamus. Nam corpora solida, dum are- scunt, cibis sanat. Cum autem alimentum om- ne, non ipsum per se deferatur ad alendas parti- culas, sed potius ab eis trahatur: ob ariditatem verō atq; frigiditatem, in tabidis sint illae ad tra- hendum invalidae semimortuaeque: utiq; alimen- ta desiderant, quae facile possint attrahi, ut imbe- cillitatem attrahentium virium, suppleat prom- ptitudo materiae. At ea sunt tractu facilia, quae tenuioribus partibus constant, suntq; natura ca- lida: quae sanē cum difficultate nutriunt, cum ali- mentum omne debeat esse crassum & lentum, ut & permaneat diu, nec facile possit diffilari. Quare aliquod investigandum est, quod in me- diocritate consistens, mediocriter utraq; possit praestare. Ac mihi sanē nihil ad haec omnia lacte videtur praestantius, praecipuē si quis ore appre- hensa mamma muliebri, lactet. Quod si id fieri nequeat, bibat saltem lac asininum, dum adhuc calet, temporeq; brevissimo aēri expositum fue- rit. Quae quidem alimentorum ratio tribus illis speciebus marcoris convenit. Quinetiam ptisa- na & alica illis ex usu sunt: aceto tamen condi- debent, ut facilius distribuantur. Porro mel, ut frigidioribus affectibus prodest plurimum, sic ca- lidioribus obest summopere. Quare torridae qui- dem febri inimicissimum est: iis autem qui senili affectui expositi sunt, utilissimum. At illis qui ta- bescunt ex defectu animi, nisi obstat ventriculi ratio, poterit coctum vel solum, vel aliis inter- mistum cibis offerri. Opportunus balnei usus, optimum erit auxilium etiam ad alimentorum distributionē. Erit tamen administrandum, ubi cibis concoctus fuerit, nec longior inedia praec- cesserit. Jam & vini potus, ut summopere frigi- dae tabi prodest, sic torridae fugiendus est. At ea quae in animi defectu consistit, sicuti affe- ctus medius & miscellaneus est, sic in hoc mediam rationem obtinet.

GALENI PERGAMENI

contra eos qui de typis sive circuitibus
scripserunt, liber.



Bi quid specie idē, rursus equali sit tempore totum ipsum curriculū, Græci periodū, sive circuitū, atq; inter eos nonnulli, typū etiam atq; ordinem vocāt. Cæterum cum nihil utilius sit, præsertim in febribus, quam futurarum accessio-
num principia prænosce: is plurimum ægro proderit per totum ipsius morbi spaciū, qui nominum disputatione neglecta, statim a morbi initio artificiali quadam conjectura poterit id ipsum assequi. Quod si quis prima statim die pervenire ad talem cognitionem non possit, poterit certē secunda, vel tertia, vel quarta, Si quis verō sit, qui neq; in hac morbi speciem noverit, is non exiguam artis partem ignorat. Etenim tum alia, tum febrium accessiones, vel quotidie, vel tertio vel quarto quoq; die invadunt. In quam plurimis siquidem morbis, ubi sanē maximē utilis sit futuræ accessionis prænotio, ea vel alternis diebus sit, vel quotidie, in paucis verō quibusdam per quartum. Qui verō præter has tres periodos, & quintanam, & sextanam, & septimanam, aliasq; innumeratas esse arbitrantur, præter quam quod inania producunt, infinitosq; coguntur dare periodorum complexus, nunq̄ poterūt futurā accessionem prænosce. Porro quis fuerit hujusce attonitæ sectæ autor primus, ignoro: dicam tamen, quādo primum illam explicari audiverim. Deceßerat paulō antē de vita Antoninus, qui Adriano in Imperio successerat. Regnabat autem Severus: qui seipsum nomine mutato, Antoninum appellavit: Lucium verō, quem imperij participem fecerat, Severum appellavit, Cæterum præstat illorum a surditatis ne meminisse quidē, Pythici præcepti memores, Esse parandum tempori. Nos verō in præsentia diem, tempus id universum dicimus, quod diem atq; noctem complectitur. Qua ratione dicunt annū constare diebus trecentis & sexaginta quinq; , & quarta unius parte. Horæ itaq; quatuor & viginti, diem absolvunt: duos autem, octo & quadraginta; tres duo & septuaginta. Typis autem nomina indita sunt non ex diebus ipsos complentibus, sed ex accessionū reditu. Tertianā quippe appellamus, ubi accessio tertio quoq; die invadit, duobus interim absolutis: quartanā, in qua videlicet quarto, in hac quoq; tribus jam perfectis: & in aliis quoq; secundum eandem rationē. Si igitur periodum inveneris typi alicujus, quatuor continentem completos dies, illum quintantā dices. Neq; enim est idem, accessione quinto oboriri die, & esse quinq; dierum circuitum. Siquidem numerus horarū periodicarū, qui inter duo initia accessionum est medius, considerandus est, atq; ex illo typus febrium metiendus. Sic enim dicimus, quotidianū typum sortiri horas vigintiquatuor, tertianū quadraginta octo, quartanū septuaginta duas, quintanū nonaginta sex. Quo similiter pacto cæteri perficiuntur ex horarum vigintiquatuor multiplicatione.



Typus est ordo intensionis et remissionis: periodus verō est tempus intensionis & remissionis, quod in morbis existit. * Pauci autem ex affectibus carent typo uti atrophia, neutrorum resolutione, elephantiasis, & quicunq; his proportionē respondent. Plurimi verō affectus typum quidē præ se ferunt, verum rarius. Porro omnium maximē febres typos admittunt, iis continuis exceptis, quæ vel remittunt nunq̄, vel inordinatæ existunt. Typorum itaq; alij quidem sunt primi, alij verō secundi, alij permanentes, alij mobiles, alij simplices, alij cōpositi. Primi igitur sunt, qui brevem habent invasionem, longam autem remissionem: quales tertiani & quartani existunt. Secundi verō, qui longam habent invasionem, brevem autem remissionem: ut quotidianus & valde extensus semitertianus. At permanentes sunt, qui iisdem horis perpetuō invadunt remittuntque. Mobiles verō, qui diversis semper horis accedunt. Ex quibus qui præveniunt, & celerius horas præoccupant, proleptici: qui verō tardius morantur, hysterici nominantur. Simples sunt, qui unum tantummodo insultum faciunt. Cōpositi, qui ex pluribus invasionibus & remissionibus constant. Cæterum compositorum quidā ex homogeneis, id est, genere similibus: quidam verō ex heterogeneis, hoc est, dissimilibus constant. Ex genere quidem similibus, cum quotidianus typus (exempli gratia) simplex, duplici quotidiano implicatur: aut duplices tertiani, aut tres tertiani existunt: vel rursus duo & tres quartani. Ex diversis autem genere, cum quotidianus (exempli causa) tertiano connectitur, aut tertianus quartano. Etenim quotidianus est, qui quotidie unam invasionem longitudine cōmensuratam, unamq; similiter remissionem efficit. Tertianus autem, qui tertio quoque die, unā invasionem & remissionem similiter cōmensuratam adducit. Quartanus denique, qui quarto quoq; die suam invasionem & remissionem molitur. Atq; eadem intelligantur de quintano & septimano, & si quis alius typorum ordo invenitur. Porro quotidianum consequitur typum, humiditas habitus, vomitus pituitosi, sitis non admodum intensa, totius corporis gravitas, somnus gravis atque profundus, pulsus magnus, rarus & lusus, facies sublivida, laxa & præmollis, & quæ multā præ se ferat materiæ tum pravitate tum mutationem. In hoc etiam typo splendor evadit. Quod si protrahatur diutius, tremuli & veterinosi sopores sequuntur, & thoracis fluxiones, & aquæ inter cutem affusiones. Potissimum autem hi stomacho malè affecto constituuntur. Tertianum verō comitatur sitis intensa, æstus, acres atq; biliosi vomitus, inedia inquit tudinesq;. Ut plurimum autem rigores hunc præcedunt, nonnunq̄ verō etiam refrigeratio. At pulsus in his qui tertiano typo vexantur, parvus & frequens subsequitur. Noctes, quæ accessionis dies præcedunt, molestæ admodum sunt. Ubi autem morbus producit, non amplius molestæ

Typus accessio-
num quidē.
Periodus ac-
cessionum
quidē.

Typus carentes febres.
Typorum differentia.

Typi primi.

Typi secundi.

Typi permanentes.

Typi mobiles
Typi proleptici.

Typi hysterici.

Typi simplices.

Typi cōpositi.

Typus quotidianus.

Typus tertianus.

Typus quartanus.

Typum quotidianū quæ consequantur.

Quotidianæ laborantibus febre induratur leni.

Quotidianus typus ventriculo malè affecto constitui solet.

Tertianum typum quæ consequantur.

existant, sed febrem ipsam compescunt. Qui vero ita febricitant, quandoq; à tertiano in semitertianum transeunt. Hic autem tertianus typus omnium minimè vexat, præsertim si æstate fuerit contractus. Quod sanè indicavit Hippocrates, dicens: Tertianæ exquisita septem circuitibus, q; longissimū est, judicatur. Rarò autem diuturna fit, nisi desinente autumno, adventanteq; hyeme gignatur. Urinæ sunt flavæ, necnon vigiliæ infestant. Omnia autem quæ comitantur tertianā, eadem & semitertianæ contingunt, cum ejusdem generis ambæ participes sint, tertio quoque die molientes remissionū & accessionū repetitiones. Propriū autem semitertianorū typorum existit invasionū extensio, & quod plerunq; cum refrigeratione, & statu nodum completo, rursus accessiones infestent. Atqui semitertiana periculū semper minatur, eò quod nō solum os ventriculi & nervosas partes attingat, & in universum eas adhuc, quæ media cōpositione cōsistunt, verum etiā veterinosos inducat sopores & cum deliriis vigilias annexas: nōnunq; & resolutiones, quas syncope comitantur: linguā etiā validè siccet, atq; animi defectum efficiat, ea quæ sunt in profundo vehementius cōmovens. Ut autē summatim dicā, typus hic ferus est, periculumq; undecunq; portendens. Quandoq; autē primo die cōstituitur, quemadmodū cæteri typi: interdum verò & à secundo & tertio incipit. Oritur autem nonnunq; à tertiana producta: nonnunq; etiam solutus, in tertianam degenerat: interdum verò & in duas tertianas & quotidianas, ob longitudinem invasionis, dirimitur. Plerunq; autem, q; attinet ad naturas, virilem corripit: quod ad ætates, florentem maximè: quod verò ad anni tempora, in autumno præsertim, quādo & valdè, periculosus existit. At nō perpetuò continuus est, sed & intermittens quandoq; invenitur. Habet autem & tres, quò ad ejus magnitudinē, differentias: alia siquidem semitertiana est exigua, alia media, & alia magna. Exigua igitur est, quæ circa vigintiquatuor horas torquet. Media, quæ circa triginta sex. Magna, quæ circa quadraginta octo: quæ & cōtinuæ febri est propinqua. Porro Agathinus à relatione ad tertianā, semitertianā fieri censet. Etenim tertio quoq; die utrisq; fiunt invasiones. Quartanū verò typum rigoris quidem validi consequitur, & vomitus piruitosi, & lienis inflammatio, & rumor: nonnunq; & abolita appetentia, & salivæ copia. Interdum etiā ex contrariis appetitus intensus. Quandoq; & ruficula simul adest, si corporis habitus corrumpatur. Idcirco typi quartani difficile solubiles sunt, cæterisq; omnibus diuturniores, ita ut usque ad bienniū perdurent. Cum autem invalescit quartanus typus, ipse sibi met complicatur, ut duas & tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā deveniat continuitatē. Rursus verò cum moderatior fit, in unam convertitur. Interdum autem & ob symptomata quæ complicantur ipsis, adeò periculosæ hujuscemodi febres evadūt, ut ad phthisim tandem, aut ad aquæ inter cutem affusiones perducant. Frequentiores autē sunt quàm aliis temporibus in autumno potissimū, quo etiam tempore solvuntur ægrè. Quæ verò æstate fiunt,

omniū minimè infestant, & magna ex parte aliis præcedentibus morbis superveniunt inordinatè. Quandoq; etiam, sed rarò, ab initio consistunt. Cæterū pulsus eis qui tertiana laborant, nō tantum magnitudine exiguus fit, quantū iis qui vexantur quartana: neque usque adeo in tumore attollitur, quantū illis qui quotidiana occupantur. Nanq; in hoc typo: pulsū quædam mediocritas invenitur. Est autem quandoq; & in accessionū initis rarior eo, qui secundum naturam est. Verum præter has tres, inveniuntur etiā febres quæ typicos dierū motus servant: sicuti & aliæ typorum prorsus expertes, præter unam. Quæ igitur servant typicos dierū motus, vel ante horas consuetas corripunt, vel retardant. Fiunt autē inordinatæ, sed præter motus formam. Quare interdum præoccupant, interdum tardius morantur, at citra ordinē utraq; præter id tamen quod modò inordinatè moveant, modò sistant, nusquam autē ordinem habeant, ubi etiam à nullo impediuntur: verum manente semper dierum figura, quam solè particulares inordinationes comitentur. Quæ verò omnino typorū expertes sunt, & præter omnes modos enumeratos, & adhuc citra dierum ordinē fiunt. Quædam enim invasiones adducunt, quædam existunt prorsus inordinatæ. At speciei hujus differentias plures esse cōtingit. Licet itaq; modo prædicto cuiq; speculari, necnon utcunq; voluerit, prædictorū typorū proprietates complicare. Porro ex typis duplicantur ij qui primi appellantur: ut quotidianus, tertianus atq; quartanus. Quotidianus itaq; duplex est, qui diebus singulis similiter bis invadit, & bis remittit. * Duo autē tertiani sunt, qui per singulos dies diversis accessionibus sibi invicē succedentibus, tertio quoq; die apprehendunt. Quartani verò, cum die uno salubri succedente, duobus deinceps sequentibus diebus contingat febricitare, in singulis invasionum horis servatis figuris, quæ nimirū ex quaternario circuitu sunt æstimandæ. Quotidianus verò tertiano adjungitur, cum primo quidem die bis invadit, & bis remittit: die autē sequenti, semel: tertio verò, rursum similiter primo. Quartano autem quotidianus miscetur, cum primo quidē die bis invadit, duobus sequētib; semel: quarto verò die, bis, primo similiter. Porro quotidianus, tertianus atque quartanus, invicem cōmiscentur, cum dies quidem prima tres habet invasiones, & totidem remissiones: secunda unam: tertia duas: quarta tres: quinta unā: sex duas: septima rursum tres: atque in reliquis diebus idem cum primis ordo servatur. Tertianus autē quartano jungitur, ubi prima dies duas invasiones adducit, totidemq; remissiones: secunda verò nullas omnino: tertia unā, & quarta unam similiter: quinta unam: sexta nullā prorsus: septima duas: atq; in sequentibus pari modo. Cōmiscentur adhuc tertianus typus, quartanus & quintanus: cum scilicet primo die accessiones contigerint, secundo quieverint: & tertio tertianus, quarto quartanus, quinto verò tertianus simul & quintanus invadant. Sed aliter etiā quodammodo hujus typi invasio cōtingit, in eundem nihil minus typi ordinem incidente, tertiani cum semitertiano cōjugatione.

*Hemitritæo
adesse quæ-
cunq; comi-
tantur ter-
tianam.*

*Hemitritæo-
rum typorū
propria.*

*Hemitritæus
typus est fe-
rus, pericu-
lumq; unde-
cunq; porten-
dens.*

*Hemitritæus
quibus ma-
gis sit fami-
liaris.*

*Hemitritæus
aliquando
intermittit.*

*Typum quar-
tanum quæ
consequan-
tur*

*Quartani ty-
pi accurata
descriptio.*

*Quarta-
narò ab
tio incip*

*Typi ad-
rentes du-
catsonem
qui sint
Quotidia-
duplex.
Tertianus
duplex.
Quartanus
duplex.*

*Quotidia-
nus tertianus
no inunctus
Quotidia-
nus quartanus
Quotidia-
nus tertianus
no inunctus*

*Tertianus
typus qui
no inunctus*

*Tertianus
typus qui
no inunctus
tano inunctus*

GALENI PERGAMENI

Ars medicinalis.

CAPUT. I.



Res sunt omnes doctrine quæ ordi-
ni inhaerent. Prima quidē ex notio-
ne finis, quæ per resolutionē fit. Se-
cunda ex cōpositione constat eorū
quæ per resolutionem inventa fuerunt. Tertia ex
definitionis dissolutione, cui nunc incumbimus.
Ex quibus sanē primam, quæ oritur à finis notio-
ne, & ex qua omnes artes via quadam atq; ordi-
ne constituuntur, neminē ante nos scripsisse cō-
perimus. Hic itaq; definitivam faciemus doctri-
nā, quæ quantum ab ea quæ ex resolutione con-
sistit, & dignitate, & ipso docendi ordine inqui-
tur tantum & ad totius compendium, & ad sin-
gulorum memoriam præstare invenietur. Suffi-
cienter siquidem, ac facillimē cōmendantur me-
moriarum universa, ex definitionis dissolutione: quo
nam totius artis capita in se optima definitio cō-
plectitur, quam quidem substantialem appellat:
ex adverso distinguentes eam ab aliis, quæ no-
tionales vocantur. Illæ siquidem ab iis quæ ac-
cidunt rebus definitis, hæ verò ab ipsa essentia
constituuntur.

¶ Quid sit medicina. Cap. II.

Medicina est scientia salubrium, & insalubrium,
& neutrorum. Nomen autem scientiæ cōmuni-
ter, non propriè, accipere oportet. Porro salubre
ipsum, insalubre & neutrum, unumquodq; tripli-
citer dicitur: hoc quidem, ut corpus: hoc autem,
ut causa: hoc verò, ut signum. Etenim corpus
quod natura suscipere sanitatē est aptum, & cau-
sam quæ eandem efficere aut cōservare, & signū
quod potest indicare, hæc omnia salubria Græ-
ci appellare cōsueverunt. Eadem ratione & su-
sceptiva morborum corpora, & eosdem efficien-
tes conservantesq; causas, & signa judicantia, in-
salubria vocant. Nec aliter corpora neutra, cau-
sas signave dixerunt. Cæterum secundum qui-
dem primam rationem, atq; præcipuam, causa-
rum salubrium est medicina scientia. Propter eas
autem, & aliarum: secundo autem loco insalu-
brium & tertio, neutrarum. Et post has eodem
modo corporū, primò quidē & hic, salubrium:
secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum.
Itidem & de signis dicendum. In actionibus au-
tem prima quidem est corporum cognitio, quæ
habetur ex signis: post hæc earum quæ in ipsis
cognitio causarum.

¶ Quot modis dicatur affectivum, indicativum,
& susceptivum. Cap. III.

Sed quoniam & effectivum, & indicativū, &
susceptivū, dupliciter unumquodq; dicitur, hoc
quidem simpliciter, hoc verò ut nunc: nosse opor-
tet, amborū esse medicinæ scientiam. Ipsum ve-
rò simpliciter, duobus dicitur modis: & quod
semper, & quod ut plurimū: de quorum utroq;
medicina pertractat. Neutra verò, et causa & cor-
pus & signum, & quod simpliciter dicitur, & q-
ut nunc, tripliciter unumquodq; appellatur: hoc
quidem, quia neutrius contrariorum est parti-
ceps: hoc verò, quia utriusq; atq; hoc deniq;, q-
aliquando huius, aliquando illius. Horum autē

ipsorum secundum, rursus duobus dicitur mo-
dis: aut quia utrunq; contrariorum ex æquo par-
ticipat: aut quia aliquando plus alterū. Primum
igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia nam
sint, salubria, & insalubria, & neutra: post hæc
de signis & causis differemus.

¶ De corpore salubri. Cap. IIII.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso
naturæ ortu bonam temperaturā sortitur in sim-
plicibus ac primis particulis: estq; in his quæ ex
illis constant instrumentis cōmensuratum. Salu-
bre verò nunc, est corpus, quod in præsentī est sa-
num. Est verò & hoc, eo tempore quo sanū exi-
stit, bonam habens temperaturam & cōmensu-
rationem: non tamen optimam, at sibi propriā.
Ipsius verò salubris simpliciter corporis, semper
quidem est tale, quod optimē temperatū ac ma-
ximē cōmensuratum existit: ut plurimum au-
tem, quod à cōstitutione optima, non valdē ad-
modum deficit.

¶ De corpore insalubri. Cap. V.

Insalubre verò simpliciter corpus est, quod ab
ipso ortu naturæ, vel in consimilib. partibus ma-
lam temperiem possidet: vel in instrumentis
incōmensurationem, vel utrunq; vitium. Insalu-
bre verò ut nunc, est illud, q- eo tempore, quo ta-
le dicitur, ægrotat: vel in consimilibus pravam
temperaturā, vel in instrumentalibus incōmen-
surationem, vel utrunq; vitium tunc habens. Est
verò & semper insalubre, quod ex ipso naturæ
ortu vel pessimam temperiem possidet in sim-
plicibus & primis particulis omnib. vel in aliqui-
bus, vel in iis quæ obtinent principatum: vel in
instrumentariis incōmensuratum existit, idq; vel
in omnibus, vel in nonnullis, vel in illis quæ prin-
cipatum obtinent. Ut multum verò insalubre est
corpus, quod ab huius quidē vitio recedit, non-
dum tamen mediocritatem attingit.

¶ De corpore neutro. Cap. VI.

Quoniam verò & neutrum corpus dicebatur
tripliciter: unum quidem, quod neutrius erat ex-
tremæ dispositionis particeps: aliud, q- utrius-
que: aliud, quod aliquando huius, aliquando il-
lius: juxta primū significatū, neutrum erit corpus,
quod exquisitè mediū est & saluberrimi & insa-
luberrimi corporis: & huius, hoc quidē simplici-
ter tale, quod ab ipso naturæ ortu, ita est cōstitu-
tum: hoc autem ut nunc, quod in præsentī tem-
pore, exquisitè medium existit, & saluberrimi, &
insaluberrimi corporis. Ipsius verò simplici-
ter, semper quidem tale est id, quod in omnibus
ætatibus perdurat tale: ut multum autem, quod
nonnullas recipit mutationes: At juxta secun-
dum significatum, neutrum erit corpus, quod ab
ipso ortu naturæ, contrariarum simul est parti-
ceps dispositionum, aut scilicet in una parte, aut
in duabus differentibus. In una quidem, si se-
cundum alteram oppositionem effectivarum
qualitatum bonam habuerit temperiem, ve le-
tiam secundum utranque, sed in formatione, vel
magnitudine, vel numero partium, vel situ, de-
linquat: aut contrā, in his quidem rectè se ha-
beat, vel omnibus, vel quibusdam, peccet autem
in ipsa temperie. In differentibus verò partibus,
& juxta omnes oppositiones potest quicq; simul
esse.

esse particeps contrariorum. Et semper quidem est tale, quod per omnes aetates in eodem perseverat statu. Ut multū verò, quod aliqua ex parte evariat. Ita etiam & nunc neutrum erit corpus iuxta secundum significatū: quia vel parte in una, hæc quidem sibi salubria sunt, illa verò insalubria: vel in differentibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium significatū, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando verò insalubre existit. In uno autē tempore, quod ita est neutrum, * exactē quidem consistere nequit: latius verò si accipiat, potest.

§ *Designis salubribus.* Cap. VII.

*Salubria signa que sint
Insalubria signa que sint.
Neutra signa que sint.*

Sunt autem ex signis, salubria quidem, quæ cunctis præsentem indicant sanitatem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subjiçunt. Insalubria verò, quæ & præsentē indicant ægritudinem, & futuram prænunciāt, & præteritam memoriæ subjiçunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ subjiçunt: quæq; partim quidem salubrem, partim insalubrem dispositionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando verò insalubrem: & hæc quoq; secundum tria tempora, veluti salubria & insalubria, appellantur. Dicuntur autem nonnunquam a vetustioribus medicis hæc omnia, signa prænunciativa, quamvis sint præsentium & præteritorum indicativa. Porro usus non parvus ex prænunciativis atq; indicativis accedit: minor autē ex his quæ memoriæ subjiçunt.

§ *Designis optima constitutionis.*

Caput VIII.

*Signa prænunciativa
indicantia
que esse utiliora iis, quæ memoriæ subjiçunt.
Salubrium corporum dignotiones unde petenda sint.*

Salubrium autem corporum dignotiones sumenda sunt ab iis quæ secundum essentiæ rationem eis insunt, & ab his quæ necessario sequuntur ipsa functionibus, atq; symptomatis, quæ propriè accidentia appellantur. Ab essentia quidem ipsa eorum quæ optimam habent constitutionem, cōmensuratione: consimilium quidem, in caliditate frigiditate, humiditate & siccitate: instrumentorum verò, in quantitate ac numero eorum ex quibus cōstant: ac præterea formatione, situ partium singularum, & totius instrumenti. Ex his verò quæ necessario consequuntur consimilia, quantum quidem ad tactum attinet, à mediocritate quæ in mollitie & duritie consistit: quantum verò ad aspectum, à colore optimo, & lævitate atq; hispiditatis mediocritate. In functionibus à perfectione, quam ipsarum esse virtutem dicimus. Ab iis verò quæ instrumentarias sequuntur partes, à cōmensuratione & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorum: ac præterea, ab earū quæ ipsis insunt, virtute operationū. Optimæ igitur constitutionis corporum signa indicativa sunt hæc. Eorum autem quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in consilium temperatura vitium aliquod parvum habent: nonnulla verò in instrumentariorum vel omnium, vel aliquorum cōmensuratione, & hoc quoq; perexiguū. Sunt quæ in utrisq; vitium aliquod habeant. Vitiis verò genera, eadem sunt his quæ virtutem perficiunt: temperatura quidem in consimilibus: numerus aut, & formatio, & magnitudo, & situs, in instru-

mentariis: utrisq; verò cōmunis unitas, quæ ipso rum continuitatem vocamus. In his autem ipsis generibus sunt corporum insalubrium vitia, secundum utrumq; salubritatis significatū. Terminus autem qui utrumq; distinguit, est operationū læsio sensibilis. Etenim quæ simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod facile à causis morbificis superantur: & quoniā in vigore operationū deficiunt plurimū. In medio autē salubrium & insalubrium collocantur ea, quæ neutra exquisitè appellantur, & cum latitudine quadam. Quo fit, ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non parvam, dividatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium. Post hæc deinceps sequuntur quæ jam ægrotant corpora: quæ sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur. Hæc autem omnia sensu dijudicantur, non ipsa natura rerum. Signa itaq; sanorum corporum, sive ea salubria, sive insalubria, sive neutra existant, quantitate distantia differunt, duobus invicem contrariis terminis à nobis cōstitutis, optima videlicet cōstitutione corporis, & nuper genito morbo: ac deinceps considerantibus, utri eorum sint vicina, quæ ad examen corpora veniunt. Quæ enim proximiora sunt optimæ constitutioni, salubria: quæ verò ab hac longius distant, atq; ad ea quæ jam ægrotāt, magis accedūt, insalubria: quæ autem intermedia, atq; æqualiter ab utrisq; distare videntur, neutra existunt. Optimæ igitur constitutionis corporis indicia explicavimus. Eorum verò quæ ab ipsa deficiunt, totidem sunt numero genera, quæ in magis & minus secari possunt.

§ *Quot sint differentie partium.* Cap. IX.

Partium universæ differentia sunt quatuor. Siquidem earum nonnullæ principia quadam existunt: aliqua ab ipsis originem habent: aliqua neq; aliarum gubernationi præfunt, neque aliunde gubernatur, cum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur. Quædam verò sunt, quæ insitas simul & aliunde emanantes sortiuntur. Principia igitur sunt cerebrum, cor, hepar, atque testiculi. His verò & originem debent, & famulantur: nervi quidem & spinalis medulla, cerebro: cordi autem, arteriæ, hepatis, venæ: ut testiculis seminaria vasa. Quæ autem à se ipsis gubernantur, sunt cartilago, os, copula seu ligamentum, membrana, adenes, adeps, & caro simplex. Reliquæ verò partes, cum unā cum iis habeant ex se ipsis regimen, arteriis, nervis, & venis insuper indiguerunt. Capillorum autem atque unguium neq; regimen ullum est, sed generatio tantummodo.

Designis cerebri. Cap. X.

Cerebri autem naturam, quinque indiciorum genera ostendunt. Primum quidem, totius, capitis dispositio. Secundum, sensibilibus operationum virtus & vitium. Tertium, activarum. Quartum, earum quæ principatū obtinent. Quintum deniq; naturalium. Est & aliud sextum genus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus advenit. Porro totius capitis dispositio, ex magnitudine ipsius atq; figura sumitur, necnon ex capillis.

De par-

De parvitate & magnitudine capitis.

Capit. XI.

Parvū igitur caput, vitiosæ constitutionis cerebri propriū indicium est: magnū verò non necessariò indicat bonā cerebri compositionem: sed si quidem ob insitæ virtutis robur, quæ multam ac optimam materiam afformarit, eveniat, optimū signum est. At si ob materiæ tantū multitudinem, haudquāq̃ bonum. Distinguenda verò sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his quæ ab eo habent ortum. Ex figura quidem, si sit cōcinna: semper nanq̃ hoc, bonum signum existit. Ex iis autem quæ ab eo ortum habent, si cervici validæ infideat, aliisq̃ ossibus optimè constet: atq̃; omnis præterea substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, veluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundam ex cera constructam, paulatimq̃; utrinq̃; depressam. In hac enim necesse est, ut posteriores * prioresq̃; partes plus gibbæ fiant, q̃ sphaeræ cōveniat: quæ verò utrinq̃; consistunt, magis rectæ. Quod si ea quæ secundum occiput eminentia aliquatenus minuatur, simul intueri oportet nervos, atque cervicem, unā cum ossibus aliis. Nam si secundum naturam constiterint, materiæ defectus nō virtutis imbecillitate, contingit. Illis verò nō rectè se habentibus, principium est debile. Ut plurimū verò existit optimū signum figura concinna parencephalidis, quam nōnulli medici posterius cerebrum vocant, ut est revera posterius, distinctum labdoide sutura. Est verò hæc pars principii spinalis medullæ, ac proinde nervorum omniū, per totū corpus animalis, actionibus subservientiū. Ipsa siquidem cerebri pars posterior, per seipsam, paucos admodum sensitivos possidet nervos, plurimos autem activos. Anterior verò contrā, sensitivos quidem plurimos, activos autem per paucos. Quare ubi utraq̃; fuerit optimè affecta, robustas habebūt eas, quæ ab ipsis pendent, derivationes. Eadem quoq̃; distinctiones faciendæ sunt ad partes capitis anteriores, quæ etiā ad posteriores: eorundemq̃; parvitatem, magnitudinem, & figuram, necnon sensus ibi collocatos, visum, gustum, & odoratum, expendere oportet: siquidem sese invicem indicant attestanturq̃; & quæ à principiis oriuntur, principii virtutem & vitium: & principium, ea quæ ab ipso nascuntur.

De operationibus obtinentibus principatum. Capit. XII.

Earum autem operationū quæ obtinent principatum, virtus ac vitium, sunt ipsius principii seorsum tantummodo indicia. Voco autē operationes principatum obtinentes, quæ à solo principio proveniūt. Sagacitas igitur, subtilem cerebri substantiā indicat. Tarditas verò intellectus, crassam. At discendi facilitas, formarū facile susceptivam, Memoria, stabilem atq̃; firmam. Difficultas discendi, formarum non facile susceptivam. Oblivio, fluidam. Mobilitas in opinionibus calidam: ut stabilitas, frigidam.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Capit. XIII.

Si quidem cerebrū sortiatur bonam primarū quatuor qualitarum temperiem, omnia quæ di-

ximus, habebit quāmodō moderatā. Excrementa quoq̃; quæ ab eo expurgantur, moderatè se habebunt, atq̃; ab iis quæ extrinsecus alterando occurrant, nequaquam lædetur. Talibus igitur capilli capitis, cum adhuc sunt infantes, subrufi: cū verò pueri, subflavi: cum jam adoleverint, flavi fiunt: mediq̃; inter omnino crispas * & lenes. Nec verò calvescunt facile.

Signa calidi cerebri. Capit. XIII.

Signa calidi cerebri sunt, in iis quæ circa caput consistunt, rubor & calor major, & quæ in oculis visuntur venæ, conspicuè magis. Capilli quoque in his statim in lucem æditis * celeriter generantur: & cum plurimum in calore à mediocri temperatura recesserint, nigri & robusti & crispi fiunt: cum verò non multū, subflavi quidem ab initio fiunt, deinde nigricant: ac progredientibus ætatibus, calvitii patiuntur: eoq̃; magis, quò temperies plus æquo calidior fuerit. Excrementa verò quæ per palatum, & nares, & oculos, & aures purgantur, pauca & concocta ipsis existūt, si integra sanitate fruuntur. Si verò eis caput repleatur, plura quidem in ipsis excrementa, sed nō concocta gignuntur. Implentur autem aggravanturq̃; eorum capita à calfacientibus tum cibis, tum potibus: necnon ab odoribus, iis omnibus, quæ extrinsecus nobis occurrant: in quorum numero est aer circumfluit: ac tunc præcipuè, si nō solum natura calida, sed etiā humida, ipsa corpora extiterint. Brevib. aut somnis huiusmodi temperaturæ cōtentæ sunt, nec profundis admodum.

Signa frigidi cerebri. Capit. XV.

Frigidioris verò quāmodō oporteat cerebri indicia sunt plura in propriis meatibus excrementa: capilli recti, rufi, stabiles, & qui longo post natiuitatem tempore nascuntur tenues, atq̃; ab initio malè nutriti. Porro quibus tale cerebrum obtingit, facile à frigidis causis læduntur: quo sanè læsionis tempore destillationibus & gravedinibus corripuntur. Sed nec partium quæ iuxta caput sunt calor magnus aut rubor, nec oculorum venæ illis conspicuæ insunt. Sunt autē quodammodo somnolentiores.

Signa siccæ cerebri. Capit. XVI.

Siccioris autem cerebri indicia sunt pauca superfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt autem ad vigilias prompti, & capillos habent robustos, crispas potius quāmodō rectos, & qui celerrimè eis genitis innascuntur. Citò autem calvescunt.

Humidi cerebri indicia. Capit. XVII.

Humidioris verò cerebri indicia, capilli plani quodq̃; minimè calvi fiāt: sensus turbulenti, multitudo excrementorū, somni multi & profundi. Atq̃; hæc quidem simplices sunt intemperies.

Signa calidi siccæ cerebri. Capit. XVIII.

Qui calido & sicco sunt cerebro, superfluitatibus carent, sensibus vigent, plurimū vigilat, atq̃; citò fiunt calvi. Prima autē capillorū generatio in illis celerrima est, ac plurimò alimento abundans. Capillos verò habent nigros & crispas: tangentibusque caput sentiuntur calidi, rubicūdiq̃; sunt, usq̃; ad consistentiæ ætatem.

Signa calidi & humidi cerebri. Capit. XIX.

Si verò humiditas caliditati iugatur, sed parū

Cerebri calidi indicia.

Cerebrum calidum à quibus facile implentur.

Calida & humida corpora somnis brevibus contenta sunt.

Cerebri frigidi indicia.

Cerebro frigido prædicti faciliè à frigidis causis læduntur.

Cerebro frigido prædicti somnolentiores sunt.

Cerebri siccæ indicia.

Cerebri humidæ indicia.

Cerebri calidi & siccæ indicia.

Cerebri calidi et humidi indicia.

utraq; qualitas mediocritatem superet, adest color bonus calorq; & quæ in oculis sunt venæ, magnæ. Præterea excrementa plura, & mediocriter cocta, & capilli recti & subflavi: nec facile calvi fiunt. Impletur verò atq; aggravantur eorum capita à calidis. At si humectentur: tunc multò magis: & præcipuè ubi multitudine excrementorū redundant. Quòd si plurimū caliditas atq; humiditas creverint, iis caput est morbis obnoxium, excrementisq; abundans: ac facile à calfacientibus & humectantibus læditur. Proinde Auster semper talibus adversatur: atq; optimè in Aquilone se habet. Hi non diu vigilare possunt, & cum se ad somnum converterint, simul gravi somno tentantur & vigilant, & somnia habent imaginationibus plena. Visus est eis turbulentus, nec satis sensibus vigent. Pro ratione autè ipsius qualitatis in mixture excellentis mediocritatem, solent etiam signa ipsa excellere.

Cerebro calido et humido pradiis, ut adversatur Auster, sic confert Aquilo.

§ Signa frigidi & sicci cerebri. Cap. XX.

Cerebri frigidi & sicci indicia.

Frigidæ verò & siccæ cerebri intemperantiæ, frigidum & minimè coloratū, sui ratione, caput efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis nullas habent venas conspicuas, facileque à frigidis causis læduntur. Quare & inæquali sanitate fruuntur.

§ De sensibus. Cap. XXI.

Sensus autem eorū, in juventute quidem omnes vigent, atq; omni vitio carent: sed progrediēte ætate citò marcescunt. Ut autem summam dicam, omnia quæ ad caput pertinent, celerrimè illis marcescunt: quamobrem citò cani fiunt. Capilli verò ipsis quidem genitis, vix exeunt, & male nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, q̃ siccitate humiditatem, non calvescunt. Contra verò, si contigerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditati, frigiditatem verò parum colori, calvi fiunt hi.

§ Signa cerebri frigidi & humidi.

Caput XXII.

Cerebri frigidi & humidi indicia.

Humidæ verò & frigidæ cerebri temperaturæ, graves somnos conciliant, sensuum hebetudinem pariunt, vim excrementorum accumulāt, caputq; reddunt frigori & plenitudini obnoxium. Sic affecti, destillationibus & gravedinibus facile corripuntur: at minimè calvi fiunt.

§ De oculis. XXIII.

Oculorū temperamenta quomodo dignoscantur.

Qui oculi tangentibus manifestè calidi apparent, & facile ac crebro motu movetur, & venas latas habent, ij calidi omnes sunt. Frigidi verò, his cōtrarij. Et humidi quidem, molles, multa; humiditate referti: sicci verò, duri simul & aridi. A similibus autem suæ temperaturæ causis facile offenduntur: juvantur verò à modico contrarium usu. Sed hoc quidem commune in omni cuiusque partis temperiei dignotione meminisse oportet.

Oculi à similibus temperaturæ causis leduntur facile: in contrariis vero à modico contrariariorum usu.

Oculorū magnitudo quid indicet.

§ De magnitudine oculorum. XXIII.

Magnitudo oculorum quidem, ubi concinnitas adsit, & operationum virtus, multitudine bene temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt conformati. Quæ si desint, multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam indicat.

§ De parvitate oculorum. Cap. XXV.

Parvitas verò oculorū, adjuncta quidem concinnitate, atq; *odorationū virtute, paucam quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt conformati. Si verò inconcinnitas adsit, atq; functionum vitium, paucam simul atq; vitiosam materiam demonstrat.

Oculorū parvitas quid significet.

§ De colore oculorum. Cap. XXVI.

Glauci oculi, qui pura humiditate ac nō multa præfulgēt, tales fiunt ob splendidi luminis abundantiam. Cōtrā verò nigri, & q̃ intermediā naturā servāt, causas quoq; intermediās sortiuntur.

Oculi glauci & nigri desinant.

§ De glaucedine & nigredine oculorum.

Caput XXVII.

Glaucus igitur oculus fit, vel propter magnitudinem, vel propter splendorem crystallini humoris, vel propter situm prominentem, vel propter tenuis & aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem & puritatem. Omnibus autè his in unum coeuntibus, fit glaucissimus oculus. Si verò aliqua adsint, aliqua desint, tunc major minorve glaucedo contrahitur. Niger verò oculus fit aut ob parvitem crystalloidis, aut propter profundū situm, vel quia splendidus ac fulgidus exquisitè non est, vel quia tenuis humor vel superabundat, vel impurus existit, vel ppter unam ex hisce causis, vel propter omnes fieri cōsuevit. Tenuis igitur humor quò magis ad aquæ naturam accedit, & superabundat, humidiores ostendit oculum: quemadmodum si crassior ac minor fiat, sicciores. Crystalloides autem humor, si quidem durior existat, sicciores efficit oculū: si verò mollior, humidiores. Sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, siccior: si relinquatur ab illo, contrarium.

Glaucæ oculorum causa.

Nigredinis oculorum causa.

§ De cordis temperaturis. Cap. XXVIII.

Unamquaq; partem calidiores aut frigidiores dicimus, nō alicui rei alteri, sed ad seipsam, eam comparātes. Sic enim utcunq; extiterit cor natura frigidissimū, multò sanè calidiores temperiem sortiatur calidissimo cerebro.

Cor frigidum erit calidius cerebro.

§ Signa cordis calidi. Cap. XXIX.

Calidioris igitur cordis, quam pro naturalisymmetria, indicia quædam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, pulsus velocitas & frequentia, audacia, & ad actiones natura prompta. Quòd si multum in caliditate excesserit, tunc furibunda quædam iracundia, & temeritas adsunt. Est autem his thorax hispidus, & præsertim pectus, & quæcūq; hypochondriis partes proximiores. Magna verò ex parte calidi cordis temperies universum corpus calidū reddit, nisi hepar vehementius obstiterit. Est præterea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, nisi & hic quoq; cerebrum plurimū reluctetur: cui spinalis medullæ magnitudo proportionē respondet. Tantæ verò erunt magnitudine vertebræ, quāta spinalis medulla: quare & spina universa. Cōpingitur autè thorax ad eam spinæ partem, quæ juxta metaphrenum, hoc est, dorsum, consistit, tanq̃ ad navis carinam. Quare necessariò ejus longitudo æquabitur dorso. Latitudo verò erit pro vertebrarū ratione, quando ad proportionem crassitudinis earum fuerit compactus. Cū verò cordis caliditas superans perflaverit ac dilataverit

Cordis caliditatis indicia.

Thoracis latitudo quomodo sit caliditatis indicium.

dilataverit in primo sui ortu thoracem, erit ejusdem caliditati proportionem respondens. Quare quum caput parvum, thorax autem latus extiterit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Quum verò magno existente capite, parvus fuerit, propriissimum hoc tibi sit cordis frigidioris signum & argumentum. Si verò capiti fuerit proportionem respondens, tunc aliis signis de corde distingues, ex ipsius thoracis amplitudine nihil judicans.

Signa cordis frigidi. Cap. XXX.

In frigidioris verò corde pulsus minores existunt, quam modo naturæ conveniat: non tamē necessario tardiores, vel rariores. Respiratio autem, si quidem tantò thorax minor extiterit, quāto cor frigidius, pulsibus erit proportionalis. Si verò major fuerit, quam pro frigiditatis portione, non solum minor, sed etiam tardior & rarior ipsa respiratio erit. Sic affecti, sunt naturaliter timidi, pusillanimēque, atque tardi: pectusque glabrum sortiuntur.

Signa cordis sicci. Cap. XXXI.

Cor autem siccus, pulsus duriores efficit: iramque non promptam excitat, sed ferinam, quæque facile compesci non possit. Magna autem ex parte sic affectis universum corpus siccus existit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis humidi. Cap. XXXII.

Cordis verò humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidem proclives, sed talem, quæ sedari possit: at universum corpus humidius existit, nisi hepar obstat.

Signa cordis calidi & sicci. Cap. XXXIII.

Calidi et sicci cordis pulsus duri sunt, magni, veloces, atque frequentes: similiterque respirationes magnæ, veloces atque frequentes. Multo autem magis ad velocitatem ac frequentiam vergunt, thoracem cordi non aucto proportionaliter. Sic affecti, præ cunctis, pectus habet maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & celeres, moresque præ se ferunt tyrannicos. Sunt etenim ad furorem faciles, inexcitabilesque.

Signa cordis calidi & humidi.

Cap. XXXIII.

Si verò caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem ejus quos antea diximus, hi sunt hirsuti, ad actiones verò nihilominus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum proclivis. Pulsus verò magni ac molles, velocesque, & frequentes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem servabit. Si verò minor extiterit, tantò illis velocior atque frequentior erit, quāto et thorax minor extiterit. Quod si multa facta fuerit everfio in ipsa temperatura, atque in humiditate præcipue, præter ea quæ diximus, continget etiam ex putredine morbi, his, qui in ipsis fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autem majores fient, ac velociores inspirationibus: necnon arteriæ contractio velox.

Signa cordis humidi & frigidi. Cap. XXXV.

Qui humidioris & frigidioris sunt corde, pulsus molles sortiuntur, minimeque audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales etiam possident glabrum pectus: minimeque iracundiam conservant,

ad quam etiam non sunt admodum prompti.

Signa cordis frigidi & sicci. Cap. XXXVI.

Frigidius verò atque siccus cor pulsus quidem duriores reddit & parvos: respirationem autem, si quidem thorax parvitatem cordis frigiditati proportionalem habuerit, moderatam: si verò major extiterit, raram & tardam. Hi verò præ omnibus minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint irasci quibusdam, retinent iracundiam. Habent autem maximè omnium pectus glabrum. * Cæterum quæcunque de moribus, sive nunc, sive quovis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem: sciendum est, ea non de optimis moribus, aut vitiosis, qui ex philosophia hominibus adveniunt, sed de infirmis unicuique, naturalibusque, à nobis exposita fuisse.

Signa calidi hepatis. Cap. XXXVII.

Hepatis calidioris indicia, venarum latitudo, flavas bilis abundantior: in consistente verò ætate, etiam atra: calidior ipsis sanguis, atque eadem ratione universum corpus, nisi cor obstitit. His venter & hypochondria hirsuta.

Signa hepatis frigidi. Cap. XXXVIII.

Frigidioris verò, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoque totius corporis habitus, nisi calefiat à corde. Veter illis glaber est, atque hypochondria.

Signa hepatis sicci. Cap. XXXIX.

Siccioris autem, sanguis quidem crassior, & minime abundans: venæ duriores, & totius corporis habitus siccior.

Signa humidis hepatis. Cap. XL.

Humidioris autem, sanguis quidem copiosior, humidiorque, atque venæ molliores: ita verò & universum corpus, nisi cor reluctetur.

Signa calidi & sicci hepatis. Cap. XLI.

Calidioris verò simul ac siccioris hepatis sunt indicia, hypochondria plurimè hispida, sanguis crassior & siccior, flava bilis plurima: consistente autem ætate, etiam atra: venarum autem latitudo & durities. Sic verò & universum corpus se habet. Nam quæ ex corde caliditas originem duxit, potest obtundere eam, quæ ab hepate nascitur, frigiditatem: sicuti & frigiditas caliditatem. Sic citatem verò non potest humidius cor ad habitum contrarium perducere. At media inter has quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur. Magis enim à cordis siccitate superatur, quàm siccitas ab humiditate: minus autem à caliditate: adhuc verò multo min⁹ à frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates quæ eveniunt ab hepate facillimè superatur. Ubi igitur in unum conveniunt utriusque principij temperaturæ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

Signa hepatis calidi & humidi.

Cap. XLII.

Humidius autem, ac simul calidius hepar, minus quidem quàm calidius & siccus hispida hypochondria reddit. Plurimum verò sanguinis, & venas amplas, habitumque calidiorē, & humidiorē facit, nisi obstitit cor. Si verò amplius in ambabus qualitatibus à naturæ modo recedat, à morbis qui ex putredine ac vitiosis humoribus fiunt, sic affectus minimo negotio corripitur, præsertim si plurimè augeatur humiditas: caliditas verò non ita. Sin autem contrà, minimè humorum vitio laborat.

*Hepatis hu-
midi et frigi-
di indicia.*

¶ *Signa hepatis humidi & frigidi.* Cap. XLIII.
Humidius autē atq; frigidius hepar habet hy-
pochondria glabra: sanguinem verò accedentē
ad pituitā naturam gignit, cum venarum angus-
tia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad
contrariam transferatur naturam.

*Hepatis frigi-
di & sicci in-
dicia.*

¶ *Signa hepatis frigidi & sicci.* Cap. XLIV.
Frigidius & siccus hepar, parum sanguinis, &
exiguas venas exhibet corpori: ipsumq; frigidi-
us reddit, & hypochondria glabra, nisi & hic cor
dominetur.

*Testiculorū
temperatu-
ras signifi-
cantia.*

¶ *Signa calida, frigida, humida, & sicca tem-
peratura testiculorū.* Cap. XLV.

Temperatura verò testiculorum, calida qui-
dem, proclivis ad venerem, masculorumq; pro-
ductrix, atq; fecunda. Eadem celerrimē genitales
partes obsepit pilis. Frigidior verò cōtraria effi-
cit. At humida, multo & humido semine abun-
dat. Sicca, paucū & modicē crassū generat semē.

¶ *Signa calida & sicca temperatura testicu-
lorum.* Cap. XLVI.

*Testiculorū
calidorum et
siccorum in-
dicia.*

Calidior verò & siccior, crassissimū semē ha-
bet, & fecundissima est, ac celeriter ab initio
protinus ad coitū excitat animal. Sed & his geni-
tales partes citissimē hispidae fiunt: atque omnes
quæ circumstant, suprā quidem, usq; ad umbilicū:
infra verò, usq; ad media femora. Petulca igitur
est, & ad libidinem prona ejuscemodi tēperatu-
ra: statim verò satiatur, & si cogatur, offenditur.

¶ *Signa calida & humida temperatura testi-
culorum.* Cap. XLVII.

*Testium cali-
dorum & hu-
midorum in-
dicia.*

Sin autem caliditas humiditati iūgatur, hirsu-
ti quidē tales minus, plus verò semine abundāt:
non tamen plus ceteris appetunt, sed minori de-
trimento prēter modū venereis indulgēt. Quod
si caliditas & humiditas abundanter exuperave-
rint, non sine detrimento à venereis abstinēt.

¶ *Signa humida & frigida temperatura testi-
culorum.* Cap. XLVIII.

*Testium fri-
gidorum &
humidorum
indicia.*

Si verò frigidiorē & humidiorē tempera-
turā testiculi habuerint, partes circumpositæ gla-
bræ sunt, & tardē rem exercere veneream incipi-
unt, nec proni ad actū hujuscemodi sunt. Aquo-
sum verò & tenue ipsis est semē, infœcundūq; &
fœminarū generativū, vel omnino nō generas.

¶ *Signa frigida & sicca temperatura testicu-
lorum.* Cap. XLIX.

*Testium fri-
gidorum &
siccorum in-
dicia.*

At frigidior & siccior tēperatura, similis quidē
in reliquis est antedictæ: crassius tamē in ipsa se-
men existit, atq; paucum omnino.

¶ *De totius corporis habitu.* Cap. L.

*Musculorum
substantia
ex quibus
constat.*

Totius corporis habitus in illis maximē cōsi-
stere dicitur partib. q primæ oculis subjiciuntur.
Sunt verò hæ, muscoli, qui omnia ambiunt ossa,
existentes quædā carnes compositæ, ex prima &
simplici carne, & præterea fibris, quibus innascū-
tur. Propria siquidē musculorū substantia constat
ex his duob. Quæ verò ad ipsos vasa pertingunt,
veluti rivi quidam sunt, qui non substantiā com-
plent, sed eis subministrāt, ut in vita permaneāt.

¶ *Signa moderata temperatura.* Cap. LI.

*Temperamē-
ti moderati
indicia.*

Moderatæ temperaturæ indicia secundum to-
tum animalis habitum, sunt: color quidem ex ru-
beo & albo cōmistus: capilli flavi, & ut plurimū
mediocriter crispī: carnositatisq; mediocritas in
qualitate & quantitate. Medium nanq; est ex qui-

sitē, ac veluti Polycleti regula, hujuscemodi cor-
pus, inter omnes excessus, ceu ad quod ipsi & di-
cantur, & cognoscantur.

¶ *De corpore calidiore.* Cap. LII.

Quæcunque autem in caliditate à medio rece-
dunt, non tamen in humiditate, vel siccitate, hec
quātum ad carnosum genus attinet, vidētur qui-
dem tangentibus calidiora tantum, quantum &
eorū tēperatura calidior. Tantò verò magis hir-
suta sunt, quātò & calidiora, & minus pinguedi-
nis habent. Colorem autem rubrum capillos
nigros sortiuntur.

¶ *Signa frigida temperatura.* Cap. LIII.

Frigidioris autem tēperaturæ indicia sunt, pi-
lorum privatio, pinguitudo, & occursans frigidi-
tas. Color autem, unā cum capillis, rufus, & ubi
frigiditas excesserit, lividus quodāmodo existit.

¶ *Signa sicca temperatura.* Cap. LIV.

Siccior temperatura tātò gracilior & durior
est bona temperatura, quanto major est siccitas.

¶ *Signa humida temperatura.* Cap. LV.

Humidior autē tēperies, carnosior atq; mol-
lior existit.

¶ *Signa calida & sicca tēperatura.* Cap. LVI.

Calidior simul & siccior, magis hirsuta, necnō
calida & dura existit: itaque pinguedine caret, te-
nuisq; est, & capillos nigros sortitur. Si verò mul-
tū in caliditate excellat, color quoque niger
illi adest.

¶ *Signa calida & humida tēperatura.* C. LVII.

Calidior aut & humidior temperatura, mol-
lior & calidior & carnosior tantò existit bona tē-
perie, quātum & utrisq; qualitātibus aucta fue-
rit. Quod si plurimum augeatur, citò similiter à
putredinis corripitur morbis. * Si verò parum
quidem humidior sit, multò autē calidior, mol-
liores quidem parum hujuscemodi sunt, iis qui
bonam habent temperiem, & magis carnosī: nō
parum verò hirsutiores, & tangentibus etiā non
parum calidiores. Nigri verò eis sunt capilli, &
caro pinguedine caret. Sin autem paulò quidem
calidior, multò verò humidior, mollis his caro
est, & multa: colorq; miscellaneus, ex albo simul
& rubeo tangentibusq; paulò calidiores appa-
rent. In summa aut, omnibus temperaturæ con-
jugationibus, semper excellentis qualitatis indi-
cia eminebunt.

¶ *Signa frigida & humida temperatura.*

Cap. LVIII.

Frigidior autem atq; humidior temperatura,
si parum quidem utraq; augeatur, capillis nuda
est & alba, mollisq; & crassa, & pinguis. Si verò
magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum
proportionem qualitatum auctarum: color au-
tem, unā cum capillis, rufus. Quemadmodum si
plurimum utraq; augeatur, lividus. Si verò quali-
tatum augmentum inæquale fuerit, ejus quæ su-
peraverit, indicia eminebunt.

¶ *Signa frigida & sicca tēperatura.* C. LIX.

Si autem frigiditas unā cum siccitate augea-
tur æqualiter, natura durum ac tenue & gla-
brum corpus sic affecti sortiuntur, ac tangenti-
bus frigidum: pinguedo tamē ipsis, etli graci-
les sint, per carnes dispersa inest. Capilli autē &
color, frigiditatis modū, ac proportionē sequū-
tur. Ubi verò calida & sicca temperatura, per de-
cremen-

crementi tempus, in frigidū & siccū labitur habitum, graciles hi tunc fiunt, & duri, atq; atra bilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, hirsutiq; evadunt. In universum autem, si membrum facile frigeat, vel frigiditatis, vel raritatis est signū: si verò non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si a desiccantib. offendatur, atq; aridum & siccū, nec facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus graviter se habeat, humiditatis. Porro pauca simul & dura caro, membrū siccius efficit: multa aut & mollis, humidius. Sic & intermedia spacia corporū similariū, ut plus vel minus humidæ substantiæ in se continent, vel crassius vel tenuius, vel humidius vel siccius, membrū ostendunt, humidius quidē, ubi subtilior & plurima est humiditas: siccius verò, ubi crassior simul & minor. Ipsæ enim solidæ partes, quæ verè solidæ sunt ac primæ, nullo modo effici humidiores possunt: intercepta aut in ipsis spacia, hac vel illa humiditate complere possibile est. Hoc verò est proprium partiū similariū alimentū quod ex appositione fit, & non per vasa attrahitur.

§ Signa siccitatis ventriculi. Cap. LX.

Ventriculi indicia sunt, ejus quidem qui natura siccior existit, si celeriter sitibundi fiant, & paucus eis potus sufficiat: à plurimo autē aggraventur, fluctuationibusq; infestetur, aut superfluit id quod abundat, cibisq; delectetur siccioribus.

§ Signa humidioris ventriculi. Cap. LXI.

Humidioris aut, si neq; sitibundi fiat, & super abundans humidū facile tolerant, & cibis humidioribus gaudeant.

§ Signa calidi ventriculi. Cap. LXII.

Calidior verò natura ventriculus, melius quidē cōcoquit quàm appetat: & multo magis quæcunq; sunt dura, & non facile alterationem suscipiunt. Nam quæ facile alterantur, in eo corrumpuntur: gaudetq; calidis potibus ac cibis, nec à frigidis ullā percipit noxam, si modicè ipsis utatur.

§ Signa ventriculi frigidi. Cap. LXIII.

Frigidus natura ventriculus, ad appetendū quidem plurimum viget, ad cōcoquendum autem, minime: tales præsertim cibos, qui & frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Citò itaq; in ipso acescunt: ac proinde acidis ructibus talis ventriculus abundat plurimum: gaudetq; frigidis, sed ab eorum usu immodico offenditur. Sic & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit longiori tempore tolerare: quemadmodum neq; calidus calida. Malè verò temperaturæ quæ morbi ratione ventriculū occupant, hoc differunt ab iis quæ naturales existunt, quoniā contraria, non autem similia, appetūt, quemadmodū naturales.

§ De situ a corde & pulmone profecta.

Cap. LXIV.

Nec verò tantum ventriculus sitibundos, minimeq; sitientes reddit, & frigidi calidiq; potus appetentiores, sed ea quoq; viscera quæ in thorace sunt, ut cor atq; pulmo. Caterum qui ob horum sitiunt caliditatē, plus inspirant, & longius expirant, atq; æstum in thorace percipiunt: non sicuti qui ventriculi ratione in hypochondriis caliditatem patiuntur. Præterea bibentes, non statim quiescunt, & frigidus potus magis eorum sitim restinguit. Refrigerat autem eosdem & frigida aeris inspiratio: quæ nihil illos juvat, qui ven-

triculi ratione sunt sitibundi. Sic qui contrario modo se habet, sensibilibus à frigida inspiratione læduntur.

§ Signa pulmonis frigidi. Cap. LXV.

Et hoc maximū sit frigidi pulmonis indicium. Ut etenim frigidum inspirantes, manifestè dolorē sentiunt atq; frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica. Sed & pituitosa excrementa tum loquentes, tum tussientes rejiciunt.

§ Signa pulmonis siccitatis. Cap. LXVI.

Pulmonis autē siccitates excrementis vacantes, & pituita: vocemq; claram efficiunt: quemadmodum humiditates obscuram eam reddunt, ac raucam. Et quum vehementius aut acutius loqui studuerint, tunc intercidunt excrementa.

§ De voce. Cap. LXVII.

Non tamen ipsa vocis magnitudo à caliditate, sicuti neq; parvitas à frigiditate oritur: sed altera quidem asperæ arteriæ latitudinem sequitur, & vehementiorem efflatum: parvitas verò, à contrariis procedit causis. Quare nec semp, nec primò, sed ex accideri, & solas naturales temperaturas, nō autem adventitias, vocis magnitudo aut parvitas sequitur. Quia enim talia instrumenta temperaturæ ratione sunt facta, ad hæc autē consequitur hujuscemodi vox: ob id nimirum contingit, ex voce de naturali temperie ratiocinari.

§ De leni & aspera voce. Cap. LXVIII.

Nam lenis vox, arteriæ lenitatem cōsequitur, sicuti & aspera asperitatē. Lenitas igitur arteriæ, moderatā temperiem sequitur, ut asperitas siccitatem. Asperitas quippe fit à duri corporis inæqualitate. Arteriam verò duram, similariū partium, ex quibus constat, siccitas efficit: at inæqualem dispersæ in eisdem humiditatis defectus.

§ De voce acuta. Cap. LXIX.

Eodem modo neq; acuta naturaliter vox, sine angustia faucium, nec gravis, sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab insita atq; innata frigiditate nascitur: latitudo autem à caliditate. Porro cuiusq; facultatis virtus & vitium, à temperie ipsa, seu à causa præcedente, exoritur.

§ De homine pituitoso bilem vomente.

Cap. LXX.

Vidi equidem hominem, cujus totus habitus pituitam præ se ferebat, quotidie tamē biliosum evomebat humorem. Censui itaq; inspicienda alvi excrementa esse, in quibus minime apparebat bilis. Quare conjectura quadam comprehendimus, cum meatū, qui biliosum humorem egurgitat, non minimā ipsius partem ad *imum orificium ventriculi, quod Græci pyloron vocant, effundere, ut in quibusdam animalibus cernitur. Plurimum itaq; ad eorum quæ latent sensuū cognitio nē cōducit, ea quæ ex sectionis inspectione habetur peritia, operationumq; atq; utilitatū inventio.

§ Quomodo cognoscantur egrotantia corpora. Cap. LXXI.

Ubi igitur jam corpora ægrotant, ipsorum partes, quæ quidem subjiuntur sensui, sunt dignoscendæ ex eorum quæ insunt eis secundum naturam permutatione, in magnitudine, colore, figura, numero, situ: & ea quæ est secundū duritiem, mollitiem, frigiditatem, & humiditatem, differentia. Quæ autem visum effugiūt, ex operationum læsionibus, aut iis quæ excernuntur, aut dolori-

bus, aut tumoribus præter naturam, aut horum quibusdam, vel omnibus.

¶ *De signis patientis cerebri.* Cap. LXXII.

*Cerebri mor-
bi quomodo
dignoscendi.*

Igitur cerebri ægras dispositiones, aut ex desipientiæ speciebus, aut sensuum, aut imaginationum læsionibus, aut actuum qui secundum electionem fiunt, aut ex iis quæ excernuntur per palatum, vel nares, vel aures, aut ex dolorû, qui ei eveniunt, differentiis, cognoscere oportet.

¶ *Signa cordis patientis.* Cap. LXXIII.

*Cordis mor-
bi unde no-
scentur.*

Quæ verò in corde fiunt, ex difficilis anhelitus speciebus, & tremulis motibus, qui ipsi contingunt, & pulsibus quoq; ejus & arteriarum, & ex iræ excandescētis celeritate vel tarditate, & ex febribus, & refrigerationibus, & in colore differentiis, eisq; quibus conflictatur, doloribus.

¶ *Signa patientis hepatis.* Cap. LXXIV.

*Hepatis affe-
ctus unde
sint cognoscē-
di.*

Quæ in hepate fiunt, ex defectu humorû atq; abundantia, & ad id, quod præter naturam est, eversione, & colore malo. Sed & ex gravitatibus, & tumoribus, & doloribus, nō modò his qui in eo ortum habent, verum & ex illis, qui consortij lege proveniunt: ut per aliquam difficilis respirationis, aut etiam tussis speciem.

¶ *Signa patientis ventriculi.* Cap. LXXV.

*Ventriculi
affectus quo
pacto depre-
hendendi.*

Sic & ventriculi affectus agnoscitur, ubi in cōcoctione, et appetitu humidi vel sicci alimēti, vel superfluitatû excretionē, delinquitur. Nec secus ex singulibus, eructationibus, nauseis, vomitibus, & ipsis eorum quæ vomuntur, speciebus.

¶ *Signa patientis thoracis.* Cap. LXXVI.

*Thoracis af-
fectus unde
sint digno-
scendi.*

Thoracis dignoscuntur affectus ex spiradi difficultatibus, tussibus, & dolorib. qui in ipso fiunt, & ex eorum quæ cum tussi expuuntur, differentia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes difficiles, & tusses, & dolor in loco, & quæ expuuntur, & vocis offensiones ostendunt. In universum autem ex tumore, dolore, operationû læsione, & excrementorum differentia, omniû partium affectus noscuntur. Tumores igitur præter naturam, in inflammationibus, scirrhis, atque iis quæ vocantur œdemata, explorandi sunt. Dolor autem, quemcunque obsederit locum, aut solutam continuitatem, aut subitam alterationem, indicat. Solvitur autem continuitas incisione, exesione, fractione, & tensione. Alteratur verò substantia à caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate. Tripliciter autē læditur operatio; aut quia debiliter, aut quia vitiosè, aut quia nullo fit modo. At verò quæcunque excernuntur, nonnulla qui-
dem sunt velut partes locorum patientium, nonnulla verò ceu excrementa. Etenim quæ in ipsis naturaliter continentur, singula propriam facient indicationem.

¶ *Signa futura ægritudinis.* Cap. LXXVII.

*Morbum fu-
turum signa
indican-
tia ex neutrorû
genere exi-
stunt.*

Eorum autem indicia, quibus ægritudinis periculum imminet, mediam formam habent inter ea quæ sani & ægrotantibus accidunt. Siquidem sanis omnia secundum naturam insunt: præter naturam verò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In confinio autem horum, indicia neutrorum consistunt. Quocirca dispositiones corporum, quæ casura in morbum videtur, sunt ex neutrorum genere, simulq; etiam quæ ipsa indicant signa. Primò siquidem hæc sanitatem ostendunt, secundò autem ægritudinem. Ac proinde eadem signa se-

cundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neutra & insalubria dicuntur: quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ verò futuram præmonstrant, insalubria. Eadem verò ratione, & quæcunque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicentur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt: egra autem, quatenus præsentem indicant ægritudinem. Nec in ambiguo est, quòd quæ sunt utrorumque indicativa, neutra dicuntur, secundum unum quoddam neutrius vocabuli significatum. Quum igitur eorum signorum quæ futuram ægritudinem indicant, duplex sit differentia, prius ea pertractemus, quæ quantitatibus, vel qualitatibus, vel temporibus, non autem propriis speciebus, ab eo quòd secundum naturam, evariant: veluti ciborum appetentia intenta, vel dissoluta, vel quæ non servat consuetum tempus, aut quæ ad edulia nō usitata fertur. Ad hoc etiam genus pertinet excretiones cibi superfluitatum, quæ aut pauciores, aut plures, aut humidiores, aut duriore existunt. Sic humidiorum excrementorum vel defectus, vel præter consuetudinē abundantia, aut in colore, aut in cōsistentia varietas, aut in excretionis tempore. Præterea vigiliæ plures, somniq;: aut nō cōsueti tempore obiti. Eodem modo potus plurius aut paucioris, calidi aut frigidi insolens appetitus, vene reorumq; immodica aut intempestiva concupiscentia. Ad hæc plures aut pauciores sudores his qui sunt opportuni, & ad motus torpor: vel si moveri tētaverint, tarditas, exolutiove insignis. Huc pertinet menstruorû suppressio, vel immodica, aut diminuta evacuatio. Similiter de fluxu hæmorrhoidû est distinguendû. Quòd si nō eadē quæ prius ex cibo potuq; voluptas capiatur, est futura ægritudinis signum: quemadmodum hebetudo mentis sensuq; minimè naturalis aut oblivio insolita, somnive turbati imaginibus. In summa verò, quæcunq; secundum naturam inerant: hæc quidē supra modum aucta, hæc verò imminuta, hæc temporibus quibusdā, aut qualitatibus, aut quantitatibus immutata, futuros morbos prænu-
ciant. Porro morsus ventris, vel in ore ventriculi, vel in aliquo intestinorû, aut quum alvus subducitur, aut quum vomitus excitatur, aut quum mingitur, sive alius aliquis dolor mediocris, ex genere quidem existit eorû quæ præter naturam: non tamē qui sic se habent, ægrotare dicuntur: sic uti nec qui capite gravantur, aut dolent, aut vigilant: quum nondum solitæ ipsorum impediuntur operationes. Hic siquidē in hujuscemodi operationibus terminus est. Atque in eo idcirco quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram dicemus. Nam pro vigore potentia, quæ vel facile sustinet, vel vincitur, unaquæque ex his quas antea diximus, vel morbus est, vel dispositio neutra. Sic & quæcunque in sensibus, non in eo quod magis aut minus invicem differunt, sed toto genere sunt præter naturam, signa morborum existunt, quandiu modica fuerint, ac nondum sufficiunt hominem à consuetis operibus amovere. Ea autem contingunt, ubi sensus ipsi circa sensibilia propria palam hallucinantur.

¶ *Signa corporû ægrotantiû.* Cap. LXXVIII.

At quæ jã in ægrotantib. signa videntur, nonnulla

*Ægri-
nem su-
indican-
signorum
tura di-*

*Morbo-
ros præ-
ciant
naturam
nē rece-*

igna salu-
na.
igna perni-
osa.
crementa
vid indicet.
cretoria
cidentia.

nulla quidem salutem, nonnulla mortem portē-
dunt. Ac prima sanè salubria: secunda verò gene-
re quidem ægra, secundum speciem autē, perni-
ciosa dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus uni-
versaliter, ex operationum virtute ac vitiis: secū-
dum partem verò, ex particularium operationi-
bus: quarum genera prius diximus. Porro excre-
menta, quandoquidē coctionis & cruditatis si-
gna continent, fieri nō potest quin omnino signi-
ficent, aut naturam materie, aut materiam natu-
ræ, aut neutrum alteri dominari. Salubria igitur
signa dicuntur, superante natura: insalubria ve-
rò, devicta. Neutra autem, quæ pugnas habēt æ-
quales. Cæterum quæ manifestam coctionē in-
dicant, ex salubribus sunt: sicuti quæ cruditatem
ægra. Quæ verò neq; coctionem nec cruditatem,
ex neutrorum natura existunt. Sunt verò & neu-
tra, quæcunq; nunc quidem hoc, nunc verò con-
trarium significāt: veluti denigrati digiti. Acta-
lia sanè sunt decretoria accidentia.

¶ De causis salubribus, insalubribus, atq;
neutris. Cap. LXXIX.

alubrium
usarum
fferentia
plex.

Quoniam verò causarū hæ quidem salubres,
hæ autem insalubres, hæ deniq; neutra: primum
de salubribus differemus. Cæterum quandoqui-
dem nonnullæ earum conservatrices, nonnullæ
effectrices existunt: suntq; & tempore & dignita-
te priores conservatrices, ab illis nobis est auspi-
candum. Quum igitur non vnum tantum sit sa-
num corpus, sed plura, in eorū singulis propria
erit causa conservatrix. Siquidem omnis causa
in eo quod ad aliquid, est. Hic igitur denuò sumē-
dum initium ab optima corporis constitutione:
& quæ illi salubria sint, considerandum. Eorum
autem inventionem ipsius rei natura indicat.

¶ Quot modis alteretur corpus.
Cap. LXXX.

nservatri
causa
ot sint.
rpus neces
io alteran
qua sint,
quot nu-
tro.

Secundum quot igitur corpus nostrum altera-
tur modos, tot causarum conservatricium gene-
ra habebit: quas liquet etiam correctrices existe-
re. Alteratur autem corpus, à nonnullis quidem
necessariò, à quibusdam verò non necessariò. Ne-
cessariò enim alterant, quæ nulla ratione evitari
possunt: non necessariò autem reliqua. Nam æ-
rem quidem ambiētem semper attingere, come-
dere, bibere, vigilare, & dormire, est necesse: en-
sibus autē, & exitiis feris occurrere, non i-
tem. Quare juxta primum causarum genus ver-
satur pars corporis conservatrix, circa secundam
autem minimè. Quot igitur sint ea quæ ex neces-
sitate corpus alterant, distinguentes, proprium
in singulis eorum causarum salubrium genus in-
veniemus. Inest igitur unum ex ambientis aeris
adhæsu. Alterū, ex motu & quiete totius corpo-
ris, & singularum particularum. Tertiū, ex som-
no & vigilia. Quartum, ex his quæ assumuntur.
Quintum, ex iis quæ excernuntur & retinentur.
Sextum, ex animi affectibus. Ex his itaq; necesse
est aliquo modo affici corpus. Ab aere quidem
ambiēte, quia vel calfit, vel frigeat, vel exiccat,
vel humectatur, vel secundum horū patitur con-
jugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex
motu verò & quiete, quum utraq; modū excessē-
rint, aut calfactum, aut frigefactum, aut hume-
ctum, aut exiccatum, vel aliquid secundum ho-
rum patiens conjugationem. Sic & ex somno &

vigilia ipsum pati est necesse, juxta eandem ratio-
nem. Præterea & ex animi affectibus, & ex iis
quæ assumuntur, aut excernuntur, aut retinentur.
Hæc siquidem omnia, partim quidem evidenter,
partim verò per alias causas medias, alterāt cor-
pus, & sanitatē corrumpunt. Omnia igitur nunc
dicta genera, materiæ quædam sunt salubriū cau-
sarum. At usu opportuno adhibito, causæ fiunt
cōservatrices, atq; salubres: si verò à modo aber-
raverint, redduntur insalubres. Quocirca singu-
læ earum rerum, quandoq; salubres, quandoque
insalubres sunt, quū ad aliquid referantur. Quip-
pe ubi motum corpus desiderat, exercitatio qui-
dem salubris, ociū verò insalubre existit. Quum
verò eget quiete, ociū salubre est, insalubris au-
tem exercitatio. Eodem modo de cibis & poti-
bus, ac de aliis omnibus statuendū. Horum nan-
que singula, quando ut necessitas corporis exi-
git, cum mensura, & opportuna qualitate adhi-
bentur, salubria fiunt. At quum citra omnem ne-
cessitatem, ac præter modum afferuntur, insalu-
bria. Atque hæ duæ sunt circa salubre & insalu-
bre intēctiones: rei scilicet, quæ adhibetur, quali-
tas, & quantitas. Non est autem rationi conso-
num, etiam temporis occasionem, quæ in iis quæ
dicta sunt, continetur, veluti tertium aliquod ab
eisdem diversum, introducere. Nam si tanta & ta-
li re allata egeat corpus, nemini dubium est, quin
etiam in tempore opportuno afferatur. Siquidē
inde temporis occasio est nata, quod fluxile &
transmutabile mortale corpus quum sit pro mo-
do transmutationis, alia alio tempore auxilia po-
stulet. Optimæ igitur corporis cōstitutioni, quū
circunfusus aer optimè temperatus fuerit, om-
nium earum rerum, de quibus nuper sermonem
fecimus, quantitas moderata conveniet. Quum
verò aer à temperie recesserit, tantum illas à me-
diocritate evariare oportet, quantus fuerit aeris
ab optima temperatura recessus. Hi verò medio-
critatis termini existunt: in aere quidem ambiē-
te, ut neq; horreat propter frigus, nec sudet pro-
pter æstum. In exercitiis autem, quum primum
lassari cœperit corpus, confestim quiescere. At in
cibis, coctionis perfectio, & excrementorū mo-
dus in quāto & quali cōveniens. Aequalis verò
in his quodāmodo est coctione appetitus. Opti-
ma quippe natura, quantum appetit, tantum etiā cō-
coquit. Sic & somno modū ipsa natura præfinit
his, qui optimam corporis constitutionem sor-
tiuntur: nam ij tunc à somno excitantur, quum
corpus ampliori quiete nō eget. Quumq; talem
victus rationem adhibuerint, nullum est in eorū
excrementis delictum, quæ vel per ventrem, vel
urinæ meatum, vel per totum corpus vacuatur.
Liquet igitur ipsos cavere debere ab immodicis
animi affectibus, ab iracundia videlicet, tristitia,
furore, timore, & invidia. Hæc siquidem alterāt,
atq; à naturali statu corpus immutant.

¶ De venereis. Cap. LXXXI.

Venereorum verò juxta Epicuri sententiam, *Venus quate-
nullus est usus salubris. Re vera autem confert, nus sit salu-
si tantum intervalli in eorum usu adhibeatur, ut bris.*
nec resolutio aliqua percipiatur, et ipse seipso ho-
mo quodammodo levior factus, ac melius spira-
re videatur. Tempus autem ad utendum oppor-
tunum, quum in omnium rerum circumstantiū

*Optimè con-
stitutam natu-
re omnia re-
quiri medio-
cris.*

exquisita mediocritate corpus fuerit constitutum, ubi scilicet nec supra modum plenum, nec vacuum extiterit: aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Quod si aberrare contigerit, parvus fit error. Melius autem illi calefacto magis quam frigefacto, & pleno quam vacuo, & humecto potius corpore, quam exiccato, uti venereis. Horum autem singulorum quæ dicta sunt qualitas, in * optima corporis constitutione est eligenda: exercitij quidem, in quo totius corporis partes æqua proportionem moventur, ita ut non aliæ quidem ultra modum fatigentur, aliæ verò citra. Cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Eadem in reliquis etiā extractio habenda. At si ab optima constitutione aliquod defecerit corpus, non autem vehementer, & hæ quæ ipsius sanitatem conservant causæ, ad proportionem mutabuntur. Sed quum multa sint huiusmodi corpora, per singula genera est seorsum dicendum. Quod igitur in partium similium temperie evariat, instrumentarium autem partium servat cōmensurationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidem earum quæ ipsius conservant temperiem, alteram verò earum quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam conservant, tantum à causis optimè temperatæ naturæ distabunt, quantum & totius corporis temperatura ab illa evabit. Calidiora siquidem corpora, calidiorum victus rationem postulant, frigidiora autem frigidiorum, sicciora sicciorum, & humidiora humidiorum. At secundum conjugationem, calidiora & sicciora, calidiorum simul atque sicciorum: eadem in reliquis quoque conjugationibus proportionem servata. Rectè siquidem causarum uteretur materia, qui naturales earum potentias agnovit: videlicet quod motus, alimenti penuria, vigilia, excretio, & omnes animi affectus, corpus exiccant: at quæ hisce contraria existunt, humectant. Ita verò & calfacientia, & refrigerantia vitæ instituta, & ciborum, ac potuum, utq; simpliciter dicam, omnium quæ corpori afferuntur, materias quis noscens atque potentias, salubribus utetur causis, similia similibus adhibendo, si quidem eandem in qua acceperit, servare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atq; ad melius eam traducere studeat, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium: æqualiter verò declinans ad alteram partem à bene temperatis & mediis, quæ optimis naturis cōveniunt. Calidior siquidem & siccior temperatura, à calidioris ac siccioris victus ratione, ad exactissimum bonæ temperaturæ habitum non transfertur. At talium erit usus necessarius, quæ tantum eis quæ probè temperata existunt, frigidiora atq; humidiora sint, quantum & natura naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nā tale causarum genus insitas corrigit intemperantias: alterum verò de quo supra diximus, temperaturam conservat. Est autem utriusque vicissim apud medicos usus necessarius. Nam quum plurimum suppetit ocij, corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura patitur repentinas alterationes. Hominem autem occupationibus necessariis districtum, in eodem præstat habitu conservare. Por-

ro quæ similem habent in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuratione: dissimili, quæ dissimilem.

De causis salubribus partium instrumentalium. Cap. LXXXII.

Instrumentarium autem partium causæ salubres, quatenus & hic ab optima cōstitutione delinquitur, ita & invicem distabunt. Alię nanq; sunt salubres erroribus qui in formatione cōsistunt: aliæ iis qui in magnitudine, vel numero, vel positione. In formatione igitur plures contingunt errores: nā & figura partis, & si qua in ea cavitas est secundum naturam, vel meatus, vel orificiū, vel asperitas, vel lenitas, si quidem parum à naturali symmetria recesserint, salubrium corporum retinent appellationem: si verò amplius, insalubriū. Quod si tantus fuerit recessus, ut operationi afferat detrimentum, jam ægrotare dicentur. Secundum quantitatem autem, excessus atq; defectus ad easdem ducit differentias. In numero verò, si ve una, si ve plures, quæcunq; ex similaribus partibus fuerint, aut deficiant, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt, quæcunque in nobis substantię præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cujuslibet simplicis attinet partis, in quo et ipso quatuor sunt omnes differentię. Prima quidem, quæ optima existit. Secunda, quæ parum evariat, ob idq; salubre adhuc efficit corpus. Tertia, quæ insalubre, quādo amplius à modo recesserit. Quarta, quæ jam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcunq; igitur partes in figura delinquant, veluti quæ blæsæ, varæ, & obliquæ appellantur, hæ, quum fœtus nuper natus atq; tenellus est, formatione & ligatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si jam aucto infante, ad duritiem pervenerint, emendari non possunt. Si errores quidem qui ad cavitatem attinent, quum adhuc augeri perseverant, correctionem admittant. Quum autem jam ad ultimum pervenerint, nullus est remedio locus. Cavitates igitur quiete atq; alligatione parvæ reddantur: magnæ verò, partium operatione, & retentione spiritus. Sic & quæcunq; foramina, oraq; Et quidē quæ naturalem magnitudinem partes exuperant, quiete, ac cōmoda ligatione, minores reddunt: augētur autem et naturali motu, & frictione moderata, & quibuscunq; aliis plus sanguinis cōciliare valentib⁹. Deficientes autem partes, quæcunq; ex sanguine duxerūt originem, corrigi quidem nō est impossibile. Quæ verò ex semine, pæmodum impossibile existit. Licet tamē aliquādo loco earum alias facere, quæ usum haud dissimilem præstent. Earum verò omnium natura opifex est, medicus aut minister. Porro quæ numero excedūt, iis ablatio, causa salubris existit. Inspicere verò oportet, in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tentandum est. Eadem est & eorum, quæ in situ vitia sunt, emendatio. Nec verò in ambiguo est, quod duo sæpius aut tria vitia, eandē possunt partē cōprehendere. Reliquum est id morbi genus, q̄ similaribus & instrumentalibus partibus existit cōmune, unitatis divortium.

De causis salubribus cœn ad eos, qui morba tenentur. Cap. LXXXIII.

Salubrium causarum, aliæ quidem occurrunt

*Errores in
formationem
quotupliciter
consistere
possunt.*

*Partes ex
sanguine
tas posse
rigi si defici-
ant: ex se-
ne autem
tas, ut insti-
rentur, esse
ferè impos-
sibile.*
*Naturam
se opificem
generationis
particulari
Medicinis
tura minis-
ter.*

*Exiccantia
corpus qua
sint.*

*Similia simi-
libus esse ad-
hibenda, dū
servare cor-
porum tempe-
ramenta est
animus.*

*Intemperan-
tia quando
ad melius
sint tradu-
cenda, et quā-
do sic conser-
vanda.*

*intēperiei jam genitæ: aliæ illi quæ in generatio-
ne cōsistit: aliæ illi, quæ futura est. Igitur harū quæ
sunt postremæ, hæ quidē in præservativa artis par-
te cōtinentur, hæ verò in salubri. Primæ aut illæ
inter oēs, in curativa tantūmodo: at illæ quas in-
ter utraq; collocavimus, in præservativa simul
& curativa. Siquidē factā jam ægritudinē curare
oportet: eam verò quæ nondū adest, sed futura
est, phibere ne fiat, ab ea quæ est in corpore dispo-
sitione. Ejus aut quæ adhuc fit, q; quidē factū est,
curare expedit: q; verò futurū, prohibere ne fiat.
Prohibebit aut, sublata ea dispositione * quā seq-
morbus natura est aptus. Talis etenim dispositio,
causa antecedēs dicitur. At facta jam ægritudo cu-
rabitur, soluta ea dispositione, à qua primū lā-
ditur naturalis functio. Quā sanē ipsam disposi-
tionem, morbi causam vocamus.

¶ De communissima intentione curativa.

Cap. LXXXIII.

Curatio verò unū præcipuū cōmunissimumq; 20
habet scopū, nēpe tollēde dispositioni contrariū.
Ex hoc siquidē genere sunt causæ illæ oēs, quæ sa-
nitatē efficiūt: particulatim verò, ex unicuiq; di-
spositioni cōtrariis. Calido igitur affectui, causa
frigida cōtraria existit, frigidō aut calida: eadēq;
in cæteris, pportione. Etenim si omne immodera-
tū præter naturā est, moderatū verò secundū na-
turam: necesse est omnino, ut immoderatū ab im-
moderato cōtrario, ad mediocritatem trahatur.
Cæterum secundum potentiam, non secundum 30
imaginationem, calfaciens refrigeransq; & alia
id genus, sunt accipienda. Fingamus itaq; in hu-
moribus putrescentibus febrem accendi. Indica-
tio in hujuscemodi affectu, est evacuatio simul et
alteratio: hæc quidē, quæ putredinem finiat, ma-
nente adhuc substantia: evacuatio verò, quæ to-
tam ex corpore substantiam putrem educat. Sed
dicta quidem alterationis species, concoctio exi-
stet. Evacuationes autem fiunt, & per sangui-
nis emissionem, & clysteris usum, & per urinę 40
vias, atq; eam quæ per cutim fit transpirationem:
ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas
attractionē, atq; ad alias propinquas derivatio-
nem. Nam & ad hoc ipsum genus pertinet citare
menstrua, hæmorrhoidesq; aperire, ac deniq; ex-
purgare per palatum & nares. In universum au-
tem, si unamquamq; prius effectricem causam re-
sciderimus, dein verò ad illam quæ ab eadē cau-
sa facta est, ægritudinem accesserimus, causarum
salubrium inventionē habebimus. At secundum 50
compositas intemperies, ex simplicibus compo-
sitio commōstrabit salubria præcepta. Etenim si
decem quidem gradibus ad caliditatem majorē
ea quæ naturæ cōveniat, labatur corpus, septem
verò ad siccitatem majorem, tunc salubrem cau-
sam in hujuscemodi affectibus esse oportebit, de-
cem quidem gradibus frigidiorē, septem verò
humidiorē. Quod si particula affecta in peni-
tioribus locis sit sita, machinari oportet insuper
tale remedium salubre, cujus vis nequaquā in iti-
nere antea exolvatur. Si itaq; calidius esse opor-
tuerit eo quod est moderatū, non solum tantam
habeat caliditatem, quantam exigit morbus, sed
ultra eandē mensurā tantum adjiciatur, quātum
ex situ, ut pertingere possit ad locum patientem,

fit necessariū. Si verò frigidius, nō simpliciter tā-
tum frigiditatem oportet augere, sed & materia
quoq; prius animadvertēda est. Si enim crassa sit,
non admodū poterit penetrare ad profunda: sed
potius contrariū præstabit effectū, spissando su-
perficiem, atq; densando. At si tenuioribus parti-
bus constet, poterit sanē plurimū subire profun-
dum. Idem in humectantibus atq; exiccantibus
accidit, in quibus crassitudo & subtilitas partiū
substantiæ inspicienda venit. A situ itaq; loci, inve-
nit indicatio salubre remediū. A formatione aut
& situ simul, quādo effluxus sensibiles, atq; ad a-
lium locū foraminib. patentes habuerint, aut his
omnino caruerint. Quos enim effluxus ad prin-
cipales efferri partes cognoverimus, avertemus,
atq; ad illas impellemus, quæ minimē principatū
obtinēt, Porro causarum quæ intemperaturam
efficiūt, curatio fit per evacuationem. Nam ipsæ
intemperaturæ, sola alteratione sanantur.

¶ Curatio solutionis continui in parte car-
nosa. Cap. LXXXV.

Cōtinuitatis aut solutionis curatio, intentio-
nem quidē habet unionē, quæ in partibus quidē
instrumentariis impossibilis est, in similaribus ve-
rò non semper possibilis. Quandoq; verò, sicuti
in carnosiss, sanitas cōglutinatione perficitur. Ip-
sam verò antecedit, si vulnus majus extiterit, par-
tiū applicatio distantū, quæ ex formationis ge-
nere existit. Ut aut hæc ipsa firma & stabilis fiat, al-
ligatio cogens in unum, & fibulæ & suturæ uti-
les sunt. Coalescere autem facit ea quæ distāt in-
vicem, ac pristinam restituit unionem, ipsa natu-
ra. Nostrum verò opus est, primò quidem appli-
care extrema distantū partium: secundo autem,
quæ in unū coacta sunt, sic conservare. At tertio,
cavere ne quid labris intercidat ulceris. Quarto
deniq; ipsam partis substantiam conservare salu-
brem, id q; per mediocriter exiccantia fiet. Hæc
igitur est solutæ cōtinuitatis curatio, quum ipsa
sola seorsum in carnosa parte consistit.

¶ De solutione cōtinuitatis in osse.

Cap. LXXXVI.

At fractio est in osse cōtinuitatis divortionū: q;
quidem tantum ad intentionē primā, insanabi-
le est: quò verò ad secundā, quodāmodo recipit
curationē. Prima igitur intentio est coalitio partū,
qui ob ossis duritiē fieri nō potest. Secunda, alli-
gatio, quæ fit callo supernato partes fractas cir-
cumligate. Calli aut generatio, quā quidē ex ma-
teria & à natura fit, est & ad alia cōmunis. Qua-
tenus verò formā ossi vicinā habet, ex ejusdē fit
alimēto. Molle vero & puerile os coalescere po-
test, sed perrarò fit talis affectus, quā associetur al-
teri. Magna enim ex parte adjacentes muscoli, unā
cum corporibus aliis, per fracturā ossiū patiun-
tur. Quocirca & curatiōis intentio oritur duplex:
quarum altera quidē circa ossa, altera verò circa
corpora adjacentia versatur. Quum igitur fractu-
ræ sanitas, callo adveniente fiat, ad hujus antē ge-
nerationem, proprii ossis alimentū superfluitatē
naturæ suggerere oporteat, quæ quidē superflui-
tas in qualitate & quantitate debet modū serva-
re, talis certē victus ratio adhibēda est, quæ influ-
xurū ossibus sanguinē tantū ac talem præparet,
qualis & quātus generādo callo fit opportunus.

Avertendos
effluxus esse
a partibus
principali-
bus, ad igno-
biles.

Unio in parte
bus instru-
mentariis so-
luta est im-
possibilis.
Unio car-
nis soluta,
quæ præce-
dant.

Unionem præ-
stat natura.

Soluta par-
tis substan-
tiam conser-
vare medio-
criter exic-
cantia.

Fractura
quod perti-
net ad inten-
tionem pri-
mam, est in-
curabilis.

Calli genera-
tio.

Ossa puerilia
coalescere
posse.

Fractio ossis
simul affici
musculos.
Fractura sa-
nitas fit callo
adveniente.

Fractura
qualis sit
ratio cōven-
iens.

De punctura nervi & tendonis.

Cap. LXXXVII.

Punctura nervi, cur ad excitandam convulsionem sit prompta.

Punctura curatio.

Cicatricis curatio.

Cicatricis inducende, sic causa desiderari.

Ulceri si adsit tumor, hic prius curandus est, quam succurramus illi.

Per versum membri curatio.

Obstructionis curatio.

Lapidis in vesica curatio.

Pectoris excreta educta cum tussis a medicamentis tenuantibus.

Non verò & tendonis punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars principio continuatur, propterea est ad excitandam convulsionem nervorum: ac tum præsertim, quum nil extrorsum expirat, obcæcato cutis vulnere. Aperiendum est igitur, atque exiccandum substantia tenui, quæ usque ad imum nervi oblecti possit descendere. In simplicibus igitur hujusmodi affectibus, salubrium causarum formatalis existit. In compositis verò complicatur ulceribus, prima quidem cavitas: quæ non differentia ulceris, sed est alterius ægritudinis genus, in quo facta est substantiæ jactura. Curatio autem in morbo duplici, duplicem exigit intentionem. Nam continuitatis solutio, unitate: substantiæ autem jactura, generatione indiget. Quod autem primo quidem hunc affectum oporteat sanare, ac deinde unitatem, restituere tentare ipsa natura rerum nos docet. Ubi verò repletum ulcus jam fuerit, ad æqualitatemque perductum, cute inducendum est: id quod si fieri non possit, saltem carne quæ cuti vicina sit, comuniendum. Est autem hujusmodi, quæ & sicca, & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricem igitur inducendam, necessaria exiccantia erunt, ac sine mordacitate astringentia medicamenta. Sic etsi sordities aliqua fuerit adnata, intentio abstergendi erit. Præterea si inflammatio aliqua vel attritio, vel scirrhus, vel tumor mollis & lusus, vel intemperies una cum ulcere adsint, prius quidem eorum curationi insistendum est, ac deinde ipsum ulcus curandum.

De speciebus morborum qui juxta formationem contingunt. Cap. LXXXVIII.

Quod verò ad figuræ permutationem pertinet, in ijs sanè qui adhuc crescunt, possibile est plurimarum partium perversione corrigere: in eis autem qui jam sunt aucti, minimè. Scopus igitur in ijs quæ curationem recipiunt, est, in contrarium perversionis adducere. Si verò fractione aliqua non rectè conformata, alicujus membri figura vitata fuerit, cui substantia callosa innasci prævenierit, si quidem hæc adhuc recens extiterit, perfringere os compactum oportet, ac rursus rectè affirmare, deinde callum superinducere.

De obstructione. Cap. LXXXIX.

Est verò & obstructio ex eodem morborum genere, sitque ex crassis & lentis humoribus, unum & ipsa scopum habens morbum contrarium, videlicet apertionem. Causæ autem salubres sunt, abstergentia & incidentia medicamenta. Quæ verò fit ab stercore duro, intersepiente intestinum, obstructio, primum quidem habebit duritiei remedium, ex humidis pinguibusque clysteribus: postea demum ab acerbis evacuationem exposcet. Quæ autem à lapide fit in vesica, subito quidem illius transpositionem requirit: integræ verò sanitatis gratia, incisionem & extractionem. At humiditatis quæ præter naturam continetur sanatio, in exacta totius evacuatione consistit: quæ ad modum etiam in suppuratis. Immodica autem repletio, immodica evacuatione curatur. Quæcunque igitur in pulmone vel pectore continentur educuntur quidem per tussim, sed à medicamentis extenuantibus. Quæcunque verò in hepate, vel venis, vel arteriis, vel renibus: aut per urinam

aut per inferiorem ventrem. Sed per urinam quidem, ab ijs quæ vehementer extenuant: per ventrem verò, ab eis quæ attrahendi aut aperiendi opera vim habent. Quæcunque in superiori ventre comprehenduntur, per vomitum: sicuti quæ in inferiori, per subductionem. At quæcunque sub cute, per sectionem, vel ignem, vel adurentia medicamenta. Sic aliquando etiam, quæcunque in aliqua naturali cavitate, ut in thorace. Ut autem summam dicam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus continetur, eius sanationis intentio, est ablatio: vel si fieri hæc non possit, transpositio. Quæ verò non sunt ex genere præter naturam, aut quantitate damnantur, in his scopus detractio existit. At inventio eorum, quæ ad ipsorum sanationem perducit, partim quidem ex affectu, plurimum verò ex ipsis affectis particulis sumitur.

De asperitate & levitate. Cap. XC.

Quæcunque verò partes, quod exasperatæ sint, naturalem amiserint habitum, iis levitatis naturalis restituenda est: ossa quidem levigando, asperam verò arteriam vel linguam leniendo, humidis quæ nihil mordeant, atque lentorem habeant. At quibuscunque levitas inest non naturalis, cognata asperitas revocanda est medicamentis, quæ sufficienter abstergant, astringantque parum. Quæcunque verò vel obstructions, vel angustia meatuum, alios morbos sequuntur, eorum curatio prius est perficienda. Quod si nonnulla ex proximè dictis invicem complicantur, varias habebunt indicationes. Si igitur in particulam aliquam tanta sanguinis copia confluerit, ut universæ ipsius venæ intumescant, & distendantur, non nihilque in spacia vacua & intermedia transfundat, hujus quidem affectus sanatio scopum habebit evacuationem: aut, ut apertiori utamur vocabulo, detractationem: quandoquidem morbus est immodica partis repletio. Itaque necessarium est ut superfluitas vacuetur, aut retrocedens, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedet autem, vel impulsæ, vel attractæ, vel transmissæ, vel uno aliquo horum modorum, vel omnibus. Per locum verò patientem vacuabitur, partim quidem manifestè, sensibiliterque, partim verò resoluta in vapores. Si igitur universum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minimè vacuare expedit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus sensibiliter aliquid evacuemus, plus ratione excitati doloris attrahemus in partem. Si verò calfacientibus conemur discutere, major copia caloris vi ad partem trahetur, quam dispergatur. Quod si hac in re laboremus, ut retrocedat id quod influxit, corpus quum plenum sit non admittet. Ut igitur fieri hæc ambo possint, in primis evacuare universum corpus oportet, deinde autem id quod in partem influit, ad contraria loca retrahere. Quod quidem ubi fecerimus, prius repellemus à parte, quam aggrediamur discutere. At quod mitiora præsidia fuerint, eò erit longè apertior vacuatio. A patiente verò loco repellemus, astringendo, atque refrigerando. Quinetiam loca inanita attrahunt ad seipsa quæcunque reperiuntur. Vasa præterea, vi medicamentum astringentium corroborata, à se ad alia remittunt. Si igitur superfluum omne hac via retrocesserit, bene se res

Diuretica qualia debeant.

Causæ quibusdam mentis.

Asperitas si levitas exasperata.

Vacuare per partem laesam se morbo.

Inflammatiis, ut per se.

Reperire neminem astringentem.

res habet. Si verò aliquid fuerit retentū in parte, id lentum & crassum esse, ob idq; egrè solubile, conijcere oportet. Potest etiam, vel si influens humor non sit ejusmodi, effusus tamē esse ad intermedia spatia: quo tempore evacuandus est per ipsum locum affectum: imponētib; nobis particulis superjacentibus ea, quæ repellendi humor vim habeāt. Maximè verò evacuabis quod in spatiis ijs delitescit & scarificationum auxilio, & medicaminum quæ discutiendi vim habeant. At quia discutientia omnia vires calidas habent, effectus autem hujus temperaturæ est mordere, ubi caliditatis modum exceſſerint: cavenda ex eis sunt vehemētissimè calida, ac tum præsertim quum patiens locus in superficie cōsiterit. Neq; enim parvus excitabitur dolor, si præter propriū affectum, insuper mordeatur. Taceo etiam dolorem omnem irritare fluxiones. Quod igitur mediocrē caliditatem obtinet, in hūc dolorem sedat, ac multò magis si humidū fuerit. Et quidem quicquid per summa hæret, potens est id medicamen digerere, * etiamsi validas non sortiatur ad discutiendum vires. Quod si summæ quidē partes omni noxa caruerint, id verò quod evacuari oportet in penitioribus partibus hæreat, intendendus atq; augendus discutientis medicamenti est calor: quum dubitandum sit, ne prius quàm profundas partes attigerit, interim vires amittat. Nec tamē ex eo superiores partes aliquem dolorem sentient, quum omnes vacent affectu. Quare duo hæc simul invitant ad calidorū pariter atque acrium medicaminum usum. & summæ partes quæ tolerāt, & profundæ quæ egent. Hanc igitur indicationē à situ partis desumebamus. Porro affectarum partium, in quibus retinetur superfluitas fluxionis, nonnullæ quidem raræ, laxæ, & molles natura existunt: nonnullæ autem densæ, pressæ, ac duræ. Priores igitur evacuantur facile: reliquæ autem medicamenti acrius vacuantibus, ac præterea tenuiores partibus habētib; egent: atq; eò magis, quò profundiorē situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit indicatio, una quidē à particulæ patientis substantia, altera verò à formatione & situ. Fingamus enim in hepate esse proximè dictum affectum, in angustis vasorum finibus, impactis humoribus, qui vel lēti & tenaces, vel crassi existant, vel superabundant: nonne in promptu est, primū quidem crassitiem unā cum lentore & tenacitate, cibis ac potibus extenuantibus, ad subtiliorū partiū substantiam transferri oportere? Secundo autē, non per angustos tantum invisibilesq; meatus, sed per latiores etiam, quicquid inibi infestū est, evacuandum esse? Sunt enim in hepate venæ, non minus amplitudine quàm numero, insignes. Terminantur autem, hæc quidem in gibbis, ad venam cavā: hæc verò in cavis, ad portam. Unde haud difficile tibi futurum est, ubicunq; pressi constipatiq; humores fuerint, eosdem expeditè evacuare: trahēdo quidem ad ventrem, cum his quæ attrahendi vim habēt medicaminibus, quicunq; ex ipsis, in venis ad cava hepatis pertinentib; acervati sunt: ad urinæ verò meatus promovendo, per cavam venā, quicunq; in venis ad eam pertinetibus hæret. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, veluti

à venarū principio. Nam quum non tantum seipsum regere natura sit aptū, sed largiatur etiam virtutē venis: verendū est, ne si eius vigor fomentis & cataplasmatibus relaxantibus exolutus fuerit, & ipsum primum ad proprium opus, & omnes subinde venæ, ratione illius imbecilles reddantur. Quare in curationibus, eius aliqua ex astringētib; medicamētis semp miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodū loco situm est, dubitandum erit, ne adstringentis medicaminis vis debilitetur, nisi ab aliqua altera subtiliū partium substantia, qualis aromaturū est, traducatur. Melius verò fuerit, si & ipsum medicamē astringens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duas habuerit natura insitas qualitates ac potestates, valentius operabitur, ita ut evacuet quidem quod præter naturam in ipsum membrū confluit, servet autē humorū modum cōvenientem naturæ. Explorandū itaq; est, num quid ab humoris confluentis qualitate, temperies ejusdē membri sit alterata: ut hanc ipsam curātes intemperiem, sanitatē parti restituamus. Curabimus autē, cōtrariā ex adverso afferētes qualitatē, quantum unūquodq; calidius aut frigidius redditū est, tantum refrigerātes, aut calfacientes. Quare & hīc rursus agnoscēda est ipsius secundum naturā temperies.

¶ De morbo secundum numerum Cap. XCI.

Quibus autem aliqua particula deficit, in ijs quidem scopus est efficere alterā, subministrando naturā, eo quo diximus modo. Quibus autem redundat, hanc refecare oportet aut scalpel lo, aut igne, aut caustico medicamine. Hæc igitur omnia sanare * fermè possibile est: aut generari nō omnia possunt. Quædam verò sunt, quæ et si generari nequeant, pro ipsis tamen licet alterum substituere: quemadmodū osse ex toto sublato, carnosum quēdam callum inducimus, qui processu temporis duriorē naturam contrahit, quū ab initio carnis imitaretur substantiam. Ubi verò parte quacunq; sublata, neq; eandem secundum speciem substantiam, neq; similem efficere possumus, tertius nobis scopus est, invenire decorem quendam, quemadmodum in mutilationibus.

¶ De morbo secundum magnitudinem.

Cap. XCII.

Communicat autem hoc genus totū cum eo quod ad magnitudinē pertinet. Nam quodcunque ex eo est secundum naturam, illi propinquū existit. Id verò tantum se junctū est, quod inter minimè naturalia cōnumeratur. In quo quidem prima intentio est ablatio. Secūda verò, si illa sit impossibilis, transpositio: quemadmodū in suffusionibus. Quæcunq; aut nō integris partibus, sed earū tantum particulis, aut deficiunt, aut excedunt naturæ modum, refectio quidem, vel generatio, in iis quæ deficiunt: ablatio verò & abolitio, in his quæ superabundant, scopus est. Quare neq; in ipsis altera intentio, neq; medicaminū forma est diversa.

¶ De morbo secundum situm. Cap. XCIII.

Sed jam veniendum est ad reliquum salubrium causarum genus, quod ea corpora emendat, quæ in situ sunt vitiata: veluti luxationes, & in scroto intestinum. Quæ sanè vitia contingūt, partim ex violēta tensione atq; impulsu, partim

Hepaticis medicamentis aliqua ex astringentibus admiscenda esse, & quæ aromaticam vim obtineat.

Intemperies esse per contrariam naturam.

Redundantes partes refecari tripliciter posse.

Mutilis membris arte cōsiliandum esse decorem.

Luxationis causa & ratio.

ex di-

ex dilatato continente, vel rupto. Quare modus etiā curationis est duplex: alter quidē ad oppositam partem ei * ad quā facta est permutatio, intendendo, & pellendo: alter verò, id quod continet, firmitus solidiusq; reddendo.

De causis præservativis. Cap. XCIII.

Præservativarum causarum differentia triplex.

Porro eorū quæ præservativa dicuntur, triplex secundū genus differentia existit. Prima quidē, hominis qui integra fruitur sanitate. Secunda verò, eius qui non integrē valet. Tertia deniq; eius qui jam ægrotat. Primū igitur genus ad salubē artem spectat, in duasq; partes dividitur. Secundū verò ad præservatricē pertinet. Tertiū ad curativam. Hoc autē universum genus præcipuē circa humores versatur, quos neq; lentos oportet esse, neq; crassos, neq; aquosos, neq; plurimos, neq; vehementer calidos aut frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neq; veneni naturæ affines. Nam ubi aucti fuerint, generant morbos. Augentur verò nonnunq; eadem ex causa, quæ ab initio eos generavit. Illud autē plerunq; accidit, ut sua alteratione inficiat illos, q; sunt in corpore humores. Scopus verò & horū curationis duplex existit: alteratio scilicet, & evacuatio. Alteratur igitur, vel cōcocti à corpore, vel ab aliquib; facultatibus aliis, quæ vim medicamentosam sortiuntur. Equorū numero existūt ea, q; adversantur exitialiū ferarū venenis: quæq; etiā pharmaca virulenta transmutant. Evacuatur autem satis calidis medicamentis, purgationibus, clysmis, sudoribus, & vomitibus. Hæc igitur sunt ipsorum cōmunes evacuationes. Propriæ autem, ex locis in quibus coacervantur, sumuntur. At verò promptius evacuatur per ventrem, quæcunq; continentur in primis venis superfluitates. Quæ autē in iis quæ in hepate sunt, per urinæ meatus. At quæ in toto corpore, per sudores: sicuti quæ in capite, per palatum, vel nares, vel per utrūq;. Cæterum quæ in spatiis pectoris laxioribus continentur, per guttur simul cum tussi: quæ in renibus sunt, vel vesica, per urinam. Cōmunis autem in his indicatio est, * revulsio quidem ab omnibus partibus, ad quā maximē distantia loca: derivatio verò, ad vicina. Quæcunq; itaq; huiusmodi curat dispositiones, causas salubres vocamus: sicuti insalubres eas, quæ adaugent: & neutras, quæ neq; obsunt, neq; juvēt. Pars igitur artis præservativa talis est.

De illa artis parte, quæ convalescentes reficit, & senibus congruit. Cap. XCV.

Quæ autem reficit atq; restaurat, in convalescentibus atq; senibus locū habet. Cæterum quæ nam horum sit dispositio, & à quibus præcipuē causis ad naturalem habitū reducat, in methodo medendi explicavimus. Dispositio igitur talis est. Optimus quidē, sed exiguus est sanguis: atq; una cum ipso spiritus animalis, vitalisq;. Ipsæ verò solidæ partes ficciores, atq; ob id, earum vires imbecilliores: proindeq; universum corpus, frigidius. Causæ verò salubres quæ hanc emendant dispositionem, ut uno eas cōprehendam capite sunt quæcunq; præsentaneum tutumq; exhibent alimentum. Particulatim autem, in motibus moderatis, & cibis, potibusq;, ac somnis consistunt. Sunt porro materiæ motus, vehicula, ambulationes, frictiones, & balneæ. Ubi igitur non parum

se ex his profecisse senserint, paulatim se ad cōsuetā opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem, humidos, concoctūq; faciles, neq; frigidos: in processu verò, eos qui plurimū alimēti suppeditāt. At potus eis opportunus est, vinū, ætate quidē moderate, pvectū, substantia aut purū, pellucidumq;: quod scilicet vel subflavum, vel album existat, atq; suaviter olens: gustui verò neq; aqueum omnino, neq; aliquam qualitatem insignem aut dulcedinē, aut acritudinem, aut amarorem, aut deniq; astrictionem referens.

GAL ENI PERGAMENI

de medendi methodo, Lib. I.



Inter alias causas quæ à cōdenda medendi methodo me hacten° dehortatæ sunt, charissime Hiero, hæc fuit una & præcipua, q; frustra me scripturum timerē, quum nemo propēdixim hac nostra ætate, veritatis inquisitioni sit deditus: sed pecuniam, & civilem potentiam, & inexplēbiles voluptatum delicias, omnes eousq; suspiciant, ut si quis sapientiæ quodvis studium sectetur, pro insano hunc habeant: quippe qui primam ipsam, & verē sapientiam, quæ divinarum humanarumq; rerum est sciētia, ne esse quidem omnino existimēt: ac proinde inter eos censetur optimus, non qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone uti philosophico norit, sed qui multos, eosq; maximos calices exiccarit. Eoq; fit, ut quum ægrotare ij cœperint, medicos advocent locupletentq;ue, non quidem optimos, sed eos qui adulētur ipsis: quiq; & frigidam dabunt, si hanc poposcerint: & lavabunt, quum jusserint: & nivem, vinumq; porrigent: ac breviter, quicquid jubebitur, mancipiorū ritu facient: cōtrā quam veteres illi medici ab Æsculapio oriundi, qui veluti duces militibus, & reges subditis, imperare semper ægris voluerunt: nequaquā verò empritorum Getarum more, parēre & obsecundare: id quod facere Romæ erat solitus impudentissimus Thessalus, eō etiā temeritatis progressus, ut sex tantum mensium curriculo, traditurum se totam artem medicā profiteretur, citra ullam aliarū disciplinarum institutionē. Quamobrem ipsius facilitate allecti sutores, textores, fabriq; servilibus opificiis relictis, catervatim hodie sese sub eo præceptore ad professionem sacratissimam conferunt, in perniciem humani generis. At verò minimē licere alicui curare cōmodē morbos, nisi prius naturā corporis universi perspexerit, apud omnes sapientiæ professores est inconfesso. Totius autem naturæ constitutionem, accuratissimē exposuit nobis Hippocrates. Quē quidem Peripatetici atq; Stoici sequuti, utriq; sanē hoc illius dogma recipiūt, nempe, universum corpus conspirabile & confluxile existere, omnesq; animalis particulas à se invicem affici: dissident tamen in eo, quod Aristoteles quidem, qualitates tantum in se mutuō transire, atq; omnino misceri: Stoici verò, non has modō, sed etiā substantias ipsas existiment. Ceterum medicinæ fuerit abundē, si concedantur ea quæ ab utrisq; sunt demonstrata: necnon quod qualitates virtutesq; in mistis, totæ sint totis permixtæ. Hac autem hu-

mani

Alteratio humorū à quibus fiat.

Evacuatio- nis modus multiplex.

Revulsio fit ad quam maximē distantia loca. Derivatio fit ad vicina.

Convalescentium senūq; dispositio qualis.

Convalescentes atq; senes reficiendi ratio.

Tempores mores nus de

Sapientia est di- humani que re- scientia

Medici res imp- bant ag- scilicet militib;

Thessali palliceb- doctura- artem- cam cum- lo mens- sex.

Curatur morbos- saria es- poris na- cognitio

Corpus- versum- conspira- & fluxu-

Misturæ- qualitat- facultat- sunt tota- totas mi-

salus
tinebat
tantum
bos in
versum.

rentia
sca.
malis
rentia
ia.

ani-
rationa
morta-
finit
ia.

iam
rei
incipi-
quo or-
um est
actam
inqui-
um.

menta
tionis
ratio et
entia.

do in-
e, quid

entia
odos,

fortu-
taxat
m da-

mani corporis cōtemplatione posthabita, nullā-
que usus demonstratōne, ille sapiētissimus Thes-
salus, duos tantum esse morbos simplices tradit
in universum, nēpe fluxū et clausum: ex quibus si
mul coeuntibus, gignit tertiū unū cōpositum: nō
intelligēs se differentiā quandā morborū, nō nu-
merū, in mediū adferre. Atqui minimē cōvenit,
quū de animalū numero quæritur, unā differen-
tiarū oppositiōne producere: alio qui duo sic uni-
versa animalia erūt, ut, gratia exēpli, rationale &
irrationalē. Proinde ac species quæ in substantia,
nō quæ in differentiā versantur, respicere oportet
eum, qui numerū morborū sit traditurus. Porro
nō omnis differentiā generi addita, ad speciei con-
stitutiōne cōducit aliquid: sed quæ ex generis pro-
pria divisiōne nascitur. Hæ siquidem differentiæ
sunt, quæ species cōstituunt: reliquæ oēs, alienæ.
Etenim propriæ animalis differentiæ existūt mor-
tale & immortale, rationale & irrationalē, man-
fuerū & ferū: aliāq; id genus. Molle verò ac durū,
grave & leve, rarū & densum, magnū & parvū,
animalis differentiæ nō sunt, sed substantiæ. Itaq; e-
tiā si cū animali vel molle vel durū, cōponas, ad
speciē constituendā nihil sanē cōtulerint. Sin vel
rationale et immortale, vel rationale et mortale,
animali adjeceris, efficitur jam illic Deus, hic ho-
mo. Ita verò & si rationali animali duas illas dif-
ferentias peculiāres addideris, quæ sunt, gressile
& bipes, sic quoq; hominis speciē effeceris. Unde
fieri nō potest, ut ullius rei specificas differentias
inveniat quis, nisi prius substantiam illius aut de-
finiverit, aut oratione circumscripserit accuratē.
Si quis igitur tradere de morborum numero in-
stituāt, is nō debet statim in prima differentiā sub-
sistere, sed divisa illa procedere: donec ad aliquā
infimarum specierū, & quæ in aliam distrahi am-
plius nō possit, perveniat: id quod facere illi tan-
tum est promptum, qui in dividēdi arte magno-
perē fuerit exercitatus. Peccavit etiam vel gravis-
simē Thessalus, quod ne principium quidem in-
demonstrabile, ac per se notum attigerit, illius rei
quam pertractandam suscepit. Principium autē
intelligo, quæ sita uniuscujusq; rei propriā essen-
tiam: a qua necessariō est ordiendum, quū ad in-
ventionem specierum & differentiarū, tum vel
maximē (ut ait Plato) ad divisiōnem, atq; ad om-
nem cuiusvis rei absolutam inquisitionem. Sed
nec ratione, nec experientia, ad fulcienda sua do-
gmata usus unquam est Thessalus: quæ quidem
duo instrumēta, iis quæ optimē inventa fuerint,
apud homines solent semper patrocinari. Cæte-
rum in his commētariis animus nobis est agere,
nō de experiētia quæ ratione nō utitur, sed de iis
præliis, quæ methodo & ratione inveniuntur.
Etenim methodo quippiā inquirere, invenireq;
ex adverso opponitur ei, q̄ est fortuito & teme-
rē. Est siquidem illud, cum via quadam & ordi-
ne, quippiā investigare. Experientia autē ame-
thodos, non artem, aut ordinem certum, sed tan-
tum fortunæ unius favorem, ad rei inventionem
desiderat. Qua quidem prorsus nēglecta, nos de-
monstrationi insistamus, quæ a principiis inde-
monstrabilibus, & per se notis, intellectuiq; obje-
ctis, nunquam non proficiscitur. Nam quod in-
tellectui se uno occurſu nō exhibet, id protinus

controverſum existit, demonstratiōemq; deside-
rat: nec artē ullam a tali principio incepisse con-
venit. Quadoquidem igitur morbi curationem
invenire est propositum, haud dubiē necesse est,
prius morborum numerū sciri. At quoniam fie-
ri nequit, ut aut differentias generis ullius mor-
bi, aut species invenias, ipso quod dividitur non
planē explorato: oportet profectō nunc, etiam
quid morbus sit, enarremus, quō sic divisiōnem
eius ritē adeamus. Id verò fiet cōmodē, nobis a
cōmuni notione auspiciatis, sine qua invenire p-
positæ rei substantiam non licet. Ut igitur ubi ci-
tra offensam omnīū partiū actiones obeunt, ho-
mines valere se dicunt: sic dum naturalem cor-
poris actionū senserint quampiam vel malē ge-
ri, vel prorsus non geri, & ægrotare se illa corpo-
ris parte existimant, cuius actionem oblāsam vi-
dent, & medicum de remedio consulunt. Ac ta-
les sunt universis hominibus notiones & sanita-
tis, & morbi. Ergo accepto, illo, quod omnes cō-
fidentur, principio, nempe id in medendi metho-
do propositū esse, ut ægra corpora in sanitatē re-
stituamus, hoc est, naturales partium actiones, si
quæ oblāse sint, emendemus: claritatis gratia o-
culum proponamus, hujus nimirum particulæ
opus esse ut videat, inter omnes homines conve-
nit. Nec verò refert, partē mne, an particulā, quis-
piam oculum dicat. Siquidē q̄quid totum com-
plet, atq; integrat, id corporis totius, quod com-
plet, particula sive pars nominat. Est nanq; pars
ex iis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars to-
tius integriq; pars dicitur: æquē profectō ut to-
tum integrumq; per relationem ad partes & par-
ticulas suas nominatur. Ceterum a rerum, nō no-
minum differentia, in omni cōmentatione prin-
cipium sumendum est. Est itaq; visio, oculorum
actio: quemadmodū locutio, linguæ: incessus au-
tem, crurū. Ipsa rursus actio, motus est activus.
At mot⁹ est prioris habitus immutatio. Qui qui-
dem activus dicitur, quum a se æditur: passivus
verò, quum ab alio posito extrinsecus, excitatur.
At verò immutatio prioris habit⁹ dupliciter fit:
nēpe aut in qualitate, aut in loco. Cæterum quæ
circa locum versatur, latio dicitur: alteratio au-
tem, quæ in qualitate consistit. Porro instrumen-
tum appello eam animalis partē, quæ perfectē
adfere actionem potest. Qua significatione ocu-
lus pars animalis, & particula, & instrumentum
vocabitur. Cornea verò tunica, particula qui-
dem & pars: at instrumētum nō item. Simili mo-
do & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ
amphiblestroides dicuntur: quarum nimirum
singulæ, primum quidem ac maximē, oculi parti-
culæ sunt. & quia is etiam faciei pars est, itidem
& illæ faciei sunt partes, sed secundaria ratione.
At verò similem partem appellant, quæ undi-
que in particulas similes dividi potest: veluti vi-
treus humor, & crystallinus, & tunicarum pro-
pria cuiusq; substantia. Est itaque instrumentum
oculus, actio verò visio: una ex eius particulis si-
milaribus, ac primum instrumentum visionis,
crystallinus humor. Id nāq; est, quod alterari de-
bet ab aliquo extrinsecus occurrentiū colorum,
ut animal videat. Alterari verò nō potuit, nisi pu-
rum omnino, perspicuumq; esset. At purum ita,
pelluci-

Notio com-
munis. Valere &
ægrotare
quando se di-
cant homi-
nes.

Pars quid
dicatur.

Visio est ocu-
lorum actio
Actio quid.

Motus du-
plex.

Immutatio
duplex.
Latit.
Alteratio.
Instrumen-
tum quid.

Oculi tunica

Similaris
particula
qua discatur.

Crystallinus
humor pri-
mum instru-
mentum vi-
sionis.

*Nihil sine
causa contin-
git.*

*Sanitatem
et morbum
sub eodem ge-
nere contineri
Contraria
qua dicantur.*

*Affectus cor-
poris existit
functionis
causa.*

pellucidumq; esse non posset, sine eo quod nunc obtinet temperamento. Quippe ostensum est, unamquaque rem talem esse, qualis est propter calidi, frigidi, humidi & sicci temperaturam. Ideoque si quid horum magnopere immutatum sit, aut plane non videbit, aut male videbit animal. Ubi igitur neutrum videre oculum cernimus, qui tamen probe antea cernebat, subito nos accingimus ad ipsius lationis causam investigandam, quum sine causa nihil in natura rerum contingat. Causa inventa, necessario fatendum est, aut morbum ipsum eam esse: aut, si morbus latio actionis existat, affectum qui huic officit, morbi causam existere. Dubitaverit tamen aliquis, ipsumne oculi affectum, a quo cernendi actio vitatur, dicere morbum debeamus: an ipsum actionis vitium. Quodcumque tamen elegeris, necessum est ut de sanitate enuncies, & quidem multo antea, contraria: nempe eam esse vel incolumem oculi actionem: vel affectum, qui visionem absolvat. Sanitas quippe & morbus, maxime contraria quum sint, sub eodem genere continentur. Contraria siquidem sunt, quae in eodem genere posita, plurimum inter se dissident: veluti album & nigrum, quorum unum est genus, color. Ergo si sanitas actio est, quae secundum naturam se habet: omnino morbus, actio praeter naturam erit. Sin autem affectio quaequam, aut constitutio naturaliter se habet, extiterit sanitas: & morbus affectio, constitutione praeter naturam, necessario fuerit. Verum quum duo rerum genera sint, nusquam inter se similia, sed tota differentium natura: quorum alterum quidem, corpus, certo modo affectum, vocatur: alterum vero, functio: fatendum proculdubio est, affectum ipsum corporis causam esse: functionem vero, id quod ab affectu ipso proficiscitur. Comitat quippe necessario affectum naturaliter se habentem, naturalis actio. Contra, si a natura recesserit, actio statim praeter naturam se habebit. Atque hoc ipsum est veluti elementum primum totius medendi methodi, quum nihil aliud sit quam curatur a medicis, quam ipsius affectus corporis. Contingit tamen non ex nominum, sed rerum recta opinione, recta morborum curatio. Ut autem omnia methodo compendiosa explicemus, quatuor in universum res sunt, quae in praesenti contemplatione proximè inter se coherent. Ac videtur sane ex his esse unum genus ipsorum corporum: alterum vero, actionum ac corporum quidem genus praecedere actiones, easque gignere: has vero sequi: idque, si corpora se naturaliter habeant, inculpabiles, naturalesque: sin praeter naturam sint affecta, aut nullas, praeus, aut omnino certe impeditas. Tertium praeter haec genus est causarum, quae hos affectus creant. Nam quam rationem habet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habeat oportet: illud duntaxat evariis, quod affectus una cum actione consistit: nec potest usquam aut propter actionem esse, sine corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi quum corpus sit vitio affectum. Ipsius autem affectus, qui actionem impedit, causas possunt & adesse, & abesse. Ab hoc quartum aliud genus est eorum, quum corporibus & naturaliter & praeter naturam se habentibus insint, actioni nec commodant, neque incommodant: ut, exempli gratia, color niger, ob diuturnam in sole moram contractus. Affectum igitur corpo-

ris praeter naturam se habentis, qui actionem aliquam vitiat, morbum (si placet) vocemus. Ipsum vero functionis vitium, insigne quoddam morbi symptoma. Quae alia ratione accidunt, seu colores, ea symptomata etiam, sed familiaria, propriaque possit quispiam vocare. At quarum ab his genus sit insalubrium sive morbificarum causarum. Quarum eas quidem, quae in ipso corpore animalis consistunt, internas sive antecedentes: quae vero extrinsecus accidunt, externas aut procatacticas appellabimus. Ut autem haec exemplo clarescant, phlegmonem esse pedis morbum constituamus: laticum autem ingressum, esse insigne ipsius morbi symptoma. At rubor, tensio, renixus, & tumor praeter naturam, diversa quaedam symptomata nominentur. Porro sanguinis redundantia, phlegmones causa interna dicatur. Sicuti externa, quae praecessit abundantia ciborum. Ceterum nullus affectus dici morbus meretur, nisi alicujus partis actionem vitiet. Quod autem postulat curationem, aliud plane non est, quam affectus qui vitiat actionem. Etenim quod primum, maximeque omnium desideramus, id naturalis est actio. Ut igitur totam particulam actionis tantum gratia requiramus, eodem (arbitror) modo & ipsius partis naturalem constitutionem, etiam actionis gratia desideramus. Porro quae constitutionem ipsam unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis, accidentia: agrotantibus, symptomata nuncupantur. Atque haec quatuor genera sunt omnium, quae in nostro corpore habentur, sive secundum naturam nos, sive praeter naturam habeamus: actiones, constitutiones, quae has praecedunt, quaeque etiam sequuntur.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. II.

Ergo affectus qui actionem vitiat, morbus vocetur. Hunc si quis sequitur, symptoma. Quod illud excitat, causa. His ita distinctis, inspicenda diligenter est nominum diversitas, quae aegritudinibus imposuerunt ipsorum primi auctores. Partim namque a laesa particula fuerunt indita, ut pleuritis, id est, punctio lateris. Peripneumonia, id est, pulmonum phlegmone. Ischias, id est, coxendicum morbus. Podagra, id est, pedum vitium. Nephritis, id est, renum affectus. Arthritis, id est, articularum vitium. Ophthalmia, id est, oculorum phlegmone. Cephalalgia, id est, capitis dolor. Dysenteria, id est, intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate, ut Ileus, hoc est, volvulus. Tinesmus, id est, desidendi assidua cupiditas. Spasmi, id est, convulsio. Palpos, id est, palpitatio. Tromos, id est, tremor. Paralysis, id est, resolutio nervorum. Apepsia id est, cruditas. Dyspnoea, id est, difficilis respiratio, vel inordinata spiratio. Apnoea, id est, spirandi defectus. Agrypnia, id est, vigilia. Paraphrosyne, id est, delirium. Coma, id est, sopor. Saepè ab ambobus simul: ut, Cephalalgia, hoc est, capitis dolor. Oralgia, hoc est, dolor aurium. Cardialgia, id est, oris ventriculi (quod veteres appellabant cor) dolor. Odontalgia, id est, dentium dolor. Hysteralgia, id est, uteri dolor. Sepenumero a causa putata, ut Melancholia. Nonnunquam a similitudine ad aliquid extra positum, ut Elephas, Cacer, Polypus, Staphyle, id est, uva. Leuce, id est, vitiligo alba.

*Morbus
affectus
ternarius
functionis
vitiosus
Symptoma
duplex*

*Causa
fica
Causa
differens*

*Accidens
et Symptoma
materia
do diff
Rerum
in nos
pore ha
tur qu*

*Morbus
nominatus
a laesa
tiscula*

*Morbus
nominatus
propter
symptoma*

*Morbus
nominatus
propter
putata
ab aliq
mili.*

go alba. Myrmecia, id est, formica. Atheroma, id est, tuber, cui pulticulæ quid simile inest. Steatoma, quod aliquid sevo simile continet. Staphylo-
ma, id est, oculi morbus, cum in summa tunica quiddam acino simile eminet. Meliceris, hoc est, capitis ulcera, saniæ instar mellis fundentia. Anthrax, id est, carbo. Alopecia, id est, areæ in capite. Ophiasis, id est, vitium serpentis formam representans. Sycofis, id est, ficus. Satyriasmī & priapismi, pudendi erectiones præter naturam. Ipsorum verò morborum, qui neq; locum affectum nomine representant, nec causam quæ eos effecit, perpauca sunt nomina, phlegmone, gangrana, scirrhus, erysipelas, apostema, œdema, empyema, ulcus, exarthrema, catagma, spasma, rhegma. Coloboma, id est, mutilatio. Dothien, id est, furunculus. Jonthos, id est, varus. Phyma, laxarum partium phlegmone. Quamquam horum quoq; nonnulla, partim locum corporis, si-
ve particulam afflictam, subindicare videntur, 20 partim à prægravante symptomate nominari. Porro ulceris (quod unitatis solutio est in carno-
sa parte) differentia particulares partim ab iis qui primum eas sanaverunt, dicuntur: partim ab ipsis qui iisdem affecti sunt, ut telephium. Cancer autem, à similitudine ad animantem. Phagedæna herpesq; à symptomate. Verum phagedæna quidem, ulcus depascens est. Herpes autem non semper existit ulcus. At quoriescunq; cum exulceratione invadit, ritu serpentis bestia, ad vici-
nas partes progreditur, easq; depascit & popula-
tur. Cavum verò ulcus, & sordidum, & cruentum, & purum, & æquale, & carne excrecens, hæc magis proprias appellationes sortiuntur, non tamen similiter omnes. Nam æquabile, cavum, & supercrecens, à propria differentia: at cruentum & purum, & sordidum, non à propriis differentiis, sed ab externis symptomatis appellantur. Tres igitur esse in corpore affectus præter naturam, ostensum jam est: causas videlicet, morbos 40 atq; symptomata. Causas, veluti redundantiam & corruptelam. Morbos, ut phlegmonē, ulcus. Symptomata, ut pravum calorem atq; gracilitatem. Diversa ab his sunt quæ immodicè excernuntur à corpore, aut retinentur præter naturā, & functionū vitia: omnia scilicet cōmuni nomine appellata symptomata, cæterū non uni generi subdita. Quippe affectus quidam corporis est vitiosus color. Quod excernitur autem, aut retinetur, affectus non est, sed affectum sequitur. Si-
militer actio vel læsa, vel integra, affectus sanè non est: particulæ autem unde editur, necessario comitatur affectum. Ac œdema quidem & phlegmone, ex iis sunt, quæ absolute dicuntur esse. Eodem modo & redundantia, si ea sit sanguinis: & corporis pallor. Actio verò ex eorum numero non est, quæ esse absolute dicuntur, aut certè non similiter sicut jam comprehensa. Siquidē nullo temporis spacio ejus partes manent, sicut nec sermonis, nec ullius motus: sed horū quilibet in generatione consistit. Cum verò duplex sit ipsius motionis genus, unum in loco, aliud in qualitate: prius latio, secundum alteratio dicitur. Ac omnis quidem actio, motus est activus: omnis alteratio, ejus quod alteratur, motus est pas-

sivus: patitur nāq; quod alteratur. Ergo affectus dum alterantur, movetur: ubi verò à motu cessaverint, jam alterati sunt, non autem amplius alterantur. Quicquid enim quocūq; modo se habet, aliquo omnino affectu est præditū. Quod autē in constanti, ægreq; solubili affectu est, id habitu jam quodam affectum est. Sanè alteratur is qui nigrescit: alteratus est, qui obnigruit. Itaq; alteratio, generatio est qualitatis. Nam quæ absolute dicitur generatio, ad substantiā via quædam est & progressus. Aliqua igitur in generatione, alteratione, & ut semel dicā, motu, suam essentiā obtinent: aliqua * permanentē habent substantiam. At sanitas quidem & morbus, & quæcunq; symptomatum causarumq; affectus vel habitus sunt, ex permanentium numero existunt. Actiones autē omnes alterationesq; circa rem quamlibet, in generatione propriam essentiā sortiuntur. Porro corpus ipsum, secundum quodcunq; movetur, secundum idem patitur: motusq; ejus pathos, sive passio, est. Etenim prisca, motus omnes, etiā si naturales existant, nisi activi sint, pathe, hoc est, passionēs nominant: sicuti activos motus, actiones. Nos autē contrarium sanitati affectum, à quo lædi functionem diximus, tantū morbum vocamus, sive diutinus hic sit, sive brevis, sive momento duret. Ex reliquis affectibus præter naturā, eos qui hunc præcedunt, causaq; rationē obtinent, causas tantū dicimus, non pathe. Qui illum sequuntur, si actionū offensæ sint, & symptomata, & pathe. Eodem modo, & immodicas vel inanitiones vel retēiones. Qui verò affectus sunt, veluti vitiosus color, supra affectionis & symptomatis appellationem, etiam affectus, vel affectiones vocamus: ita nimirū ut sunt. Omnium igitur horum cōmune id est, quod præter naturā sunt. Propriū autē morbi quidem est, quod actioni incommodet: symptomatis, q; morbum sequatur: causa deniq; quod præcedat. At verò medicorū proprium est munus, ut morbos adimant: quibus sanè sublati, non modò actionis vitium evanescit statim, sed reliqua etiā omnia symptomata. * Quisquis igitur ex iis quæ particulis naturaliter insunt, tum eas quæ aliter accidunt, tum proprias functionis causas distinguere nescit, qui obsecro fieri potest, ut is dispositionem inveniat, à qua primū læditur functio? Etenim quæ fortuito corporibus accidunt, etiā si millies sint alterata, nocere actioni non possunt, quandiu à quibus fiebat, omnia naturā suā servaverint. Horū verò si vel unum quodvis alteratū fuerit, actionē quoq; ipsam statim in tantum lædi est necesse, in quantum ab eo est, cum secundum naturam se haberet, adjuta. Fieri autem non potest, ut omnium morborum numerū methode is comprehendat, qui numerum omnium actionis causarum, corpore secundum naturam se habente, non norit. Qui autem omnem morborum numerum methode non invenerit, hic maximè labatur oportet in ipsis medendi auspiciis: cum cōstet tot esse medendi rationes, quot morborum idæ existunt. Verumenim vero primus omnium ille affectus investigandus est, qui dicitur functionis effectrix causa. Hunc sanè eucrasiā nos diximus esse calidi, frigidi, humidi &

Habitu quid affectum dicitur.

Alteratio quid. Generatio est ad substantiam progressus.

Pathe.

Causa symptomata.

Medicamentum.

Medendi rationes, quot morborum idæ existunt.

Functionis causa.

*Functiones
editæ à corpo-
ribus simila-
ribus.*

*CrySTALLINUS
humor est in-
strumentum
visus.*

*Hypochyma,
oculi totius
cui instru-
menti, est morbus*

*Similares
particulæ so-
lent octo inte-
peraturis
cruciari, ab
que humoru
affluxu: toti
demq; etiã,
dum illi af-
fluunt.
Morborum
genus du-
plex.
Morbus in-
strumentalis
quadruplex.
Solutio con-
nui est com-
munis mor-
bus simili-
bus & instru-
mentariis
particulis*

*Experientia
soli qui debe-
ant incum-
bero.*

ficci, ex intemperie quorum, primus morbus in particulis similaribus nascitur. Cum autem à similaribus ipsis, corporis functiones edantur, merito instrumentis singulis unica tantum est attributa similis particula, à qua perfici ipsa actio possit. Reliquæ verò quæ cum hac quodvis instrumentum absolvūt, in aliquem usum illius quæ prima existit actionis causa, sunt constitutæ: quæ & ipsæ retinēt suas peculiare actiones. Etenim instrumentum visus, est crystallinus humor. Reliquæ verò partes, eius gratia sunt factæ. Singulæ tamen earum aliquā seorsum actionē obtinent: ac vena quidē & arteria, & nervus, toti animanti communē: membranulæ autem oculi omnes, cum sint nutritivi participes, præditæ omnino sunt naturalibus facultatibus, ac proinde etiam functionibus quæ ab ipsis proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor intemperie laborat, omnino læditur oculorū functio. Non est tamen affectus is, eorum, ut organa sunt, morbus. At hypochyma, hoc est, suffusio, nullius similium morbus existit, sed oculi totius, seu instrumenti. Ad eundē modū si in finibus venarū, quæ sunt in cavo jecinoris, obstructio aliqua oriatur, digestio quidē in corpus per has morabitur: ægritudo tamen totius hepatis, seu instrumenti censetur, nulla similium eius partium adhuc ægrotante. At si intemperies venas illius infestaverit, ipsarum quidem illarū morbus primū erit, ex accidenti verò etiā jecinoris. Solent autē similes particulæ, octo intemperaturis secundum nudas qualitates cruciari: nempe quatuor quidem simplicibus, quatuor autē cōpositis. Quod si ad intemperiem accedat & humorū affluxus, totidē rursus intemperies orientur. Duplex itaq; erit morborū genus: alterum in partibus similaribus, alterum in organicis. Quod igitur ad particulas similes pertinet, circa intemperantias versatur. Quod verò ad organa, unū quidē in figura, aliud in particularū numero, tertium in magnitudine, quartū deniq; in positura spectatur. Utrarūq; verò partiū, id est, similium & instrumentalium, cōmunis affectus est, unitatis divorcium. Quare sex in universum morborū genera existunt. Unum, quod similium est proprium, nempe intemperies. Quatuor, instrumentorū cuiusq; Et cum his sextū, quod utrisq; partibus est cōmune, ipsius unitatis solutio. Porro omnis medendi methodus, sejuncta ab experientia procedit. At medicorū pleriq; nō tantum experientiæ applicantes animū (per quā tamen liceret eis evadere in probos medicos) sed perfectioris etiā rationis cupidi, cum aut iis quæ citra demonstrationem sunt enunciata, credant, aut vitiosis fallantur demonstrationibus, nō solum nihil exco- gitant boni, sed etiam quæ per experientiam cognita sunt, corrumpunt. Proinde talibus experientiæ ut incumbant consulo: cum nō leve instet periculum iis, qui supra vires aliquid moliantur, ne & id non consequantur, & quæ intelligere alias possent, omnino omittant. Itaq; cōmittendum nō est, ut utraq; simul misceantur, & quæ per experientiam inventa sunt, & quæ sola ratione investigata: sed cum utrunq; seorsum sit tractatū, post ambo jungantur. Etenim tota Empiri-

corum ars, observatio quædam est & memoria eorum, quæ visa sunt inter se habere consecutionem aliquam. At ex ipsa rei natura ordiri, atque ab ea, quod sequens sit, invenire citra experientiam, id est indicatione invenire. Voco autem indicationem, ipsam veluti consecutionis imaginem. Omnis itaq; medendi methodus donec ad optatum finem perveniat, per indicationes progreditur. Quandoquidē quicquid ab experientia est sejunctum, id totum indicatio vocatur. At finis propositæ tractationis est, invenire cuiusq; morbi remedia. Hujus autem inventionis principium, est ipsius morbi cognitio. Ergo primum quænam generalis, cōmunisq; morborum omnium indicatio sit, investigandū est. Ab hac deinde ad alias speciatim est descendendum, donec finem eum consequamur. Porro quemadmodū hominibus universis inest quippiā cōmune, cuius nimirū ratione omnes dicunt esse homines, ita & usu venit in morbis. Ut enim Socrates atq; Plato, specie quidem sunt unus homo, numero autē varii: sic, mea quidē sententia, morbus qui utrunq; eorū infestat (sit febris, exempli gratia) genere & specie erit unus, etsi duo numero existunt. Id quod Plato significare videtur, dicens: Multa unum esse, & unū multa. Recte igitur ab antiquis philosophis dictum est, aliud numero, aliud specie, aliud genere esse, quod tum idem, tum unū est. Cum igitur omnis affectus præter naturā, functionē lædens, sit morbus: necessum haud dubiè est, omnes id genus disputationes, quatenus tales sunt, vel genere vel specie unum morbum existere. Quamobrem, unū genere, specie ac numero dici & esse qui nō intelligunt, asino (quo nullum est animal stupidius) mihi stolidiores videntur: nam hic, aliud esse unū quidē specie, numero autē aliud, cognoscit. Quæcūq; verò de morbo dicimus, eadem & de optima valetudine, & de aliis etiam dispositionibus, intelligenda veniunt. Nam quemadmodum hominis nomen est unum in universis hominibus, morbiq; in omnibus morbis: sic sanitatis denominatio, una eademq; est, in omnibus illorum constitutionibus, qui prospera sanitate fruuntur.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, Lib. III.

SI igitur indicatio quæ ab ipsa rei natura primum oritur, quid agendum sit invenit, necesse est remediorum inveniendorum initium, ex morborum ipsorū natura sumi. Ceterum indicatio ipsa, quæ à morbis sumitur, principium tantum est, unde medendi ratio promoveat, nō autem ipsius artis medicatricis pars: aut certè nec magna, nec propria, sed quæ etiam plebi est communis. Quamobrè eum solū esse medicū existimamus, non qui novit, quidnam morbi prima indicatio dicat, sed qui illa perficere potest, quæ tali præscribuntur indicatione. Is igitur, si per experientiam ea invenit, observator & Empiricus est vocandus. Sin ratione quadam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmaticus. Empirici quippe per experientiam inveniri omnia cōtendunt. Nos partim experientia, partim ratione: cum neq; illa invenire omnia queat, neq;

nec sola ratio. Verū cōfusam mistamq; tradendā esse doctrinā nō censemus: sed seorsum empiricam, & seorsum logicā: quō facile appareat, quā utraq; earum vim habeat. Igitur unitatis solutio (quæ in osse quidē fractura, in carnosa autē parte ulcus dicitur) unitiōne postulat: quemadmodum & vulnus, & ruptio, & convulsio. E quibus vulnus quidē, solutio quæ ex vulnerando in carnosa parte relicta est: ruptio autē atq; convulsio, citra vulnerationē accidit: ac prior quidem, carnosa partis divisio existit: secunda autem, nervosa. Hic itaq; omnibus unitio molienda indicatur: quæ an præstari ubiq; possit, an in multis non possit, hoc utiq; internoscere, primū jam artificis est. Siquidem hoc ipsum primū artis est opus, ut intelligas, sperarene id quō tendis debeas, an secus. Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi tertia. Altera per experientiam, cui longo usu est opus: altera per ipsius rei naturam. Hæc siquidē, tum cujusque substantiam particulæ, tum actionem, tum usum, situmq; æstimabit. A quibus procedens, non solum quod sanari non potest, prævidebit, sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inveniendis ei remediis deliberabit. Constat aut quod à simplicissimis auspicabitur. Porro nihil est simplicius ulcere, quod in summa carnosa parte consistit. Hujus ergo, si quidem ulcus tantum sit, unus curationis scopus, unitio est. Sin autem cum cavitate adsit, erit duplex affectus: nempe ulcus, quod est unitatis solutio: & cavitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia cōtracta est. Ac pinde duplex etiā proponitur ejus curationis scopus: nempe ut inducatur cicatrix, & impleatur cavitas. Horum tamen alterum sæpe fieri non potest: ut puta, cum non modo carnem, sed etiam illi subiectum os, perire cōtigerit. Quippe impleri ad unguem huiusmodi minimè potest: cicatrice induci, facile potest. Inventionis autem, ut aliarum rerum, sic remedium omnium duo nobis sunt instrumenta: videlicet experientia & ratio. Cæterum qui sola experientia utuntur, cum videant, cui aristotelia ulcus carne nō implevit, huic thus conferre: cui autem thus nō contulit, ei irim admotam esse utilem: judicant nō omnes ab omnibus medicamentis similiter affici, ac proinde quamplurima eiusdem speciei medicamenta sarcotica in unū confundunt, quō nulli corporis naturæ defuit, quod sit ex usu. Atq; hi quidē quā turpissimè hallucinantur. Primò quidem, nam solius compositionis quæ ex similibus specie medicamentis conflatur, non eius quæ ex contrariis initur, instituunt methodum. Dein autem, quia in eius miscellæ multitudine, unū fortasse medicamentum laboranti prodesse poterit: fortasse neque unum quidem: contra verò septem aut octo obesse: ita ut pluribus numeris eiusmodi medicamen obfit, quā proficit. Ac proinde, quod quidē ad hanc rem pertinet, ii plura mihi ignorare, quā novisse videntur. Etenim oleum cavo ulceri infusum, adversissimum omnium medicamentū est, ipsumq; & sordidum, & foetidū reddit. Quod si tempus quoq; anni calidius sit, ac vitio mali succi homo labore, aut sit natura obnoxius fluxionibus, aut in victus ratione delin-

quat, timendum est ne pars illi ea computrescat ex usu olei, quæ fuerit exulcerata. Periculosus est etiam, & ceræ sive solius, sive in oleo solutæ, usus. Hæc itaq; putrescere ulcus faciunt. At si æruginem, ad lavorem tusam, inspergas, ea quidem nullo modo putrefaciet, dolorem tamen & mortuum nō parvum inferet: præterea exedet, ac phlegmonem excitabit. Quod si largius utare, etiam convulsionem accerset. Quoniam igitur neq; oleum, neq; ærugo, neq; cera, cavum ulcus per se implere carne potest: constat quod ex iis qui experientia profitentur, nemo usquā miscebit illa: id quod faciet rationalis intrepidè, videlicet haud ignarus, ex duobus temperamentis immodicis, cōtrariisq; confici unum modicū posse. Non est ergo difficile, eo oleo, cera, & æruginē, medicamentū sarcoticū, & moderatè siccum conficere: quale ulceri cavo est aptissimū, ceu quod medicocriter exiccari postulet. Omnis igitur quæ præter naturā est cavitas, repleti postulat: quare & quæ in carnosa accidit parte. Ipsa verò repletio, inveniendorū remedium finis, quō tenditur, est. Cæterum ut illa quæ implent invenias, & multa ratione est opus, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Qua quidem destitutum vulgus medicorū cum sit, etiam oculorum doloribus illa medicamēta adhibet, quæ ex opio, mandragora, & hyoscyamo parantur, maximam planè oculorū perniciem: utpote quæ nulla re alia sublata ad præsens speciem doloris præstant, quā quod ipsum sensum extinguant. Nos verò, dolores oculorū gravissimos, aut balneo, aut vini potione, aut fomentis, aut missione sanguinis, aut deniq; purgatione sanavimus. Ut igitur ad cavi ulceris curationē revertar, in eo sanè proponitur nobis, ut quæ periit caro restitatur. Scire autem oportet, generandæ carnis materiam, sanguinem bonum existere: opificem verò atq; autorem, naturam illius, videlicet corporis, cui caro superinduci debet. Porro natura cujusque corporis, calidi, frigidi, humidi & sicci temperatura constat. Quare perspicuū est, justum horum temperamentum in subiectis particulis, quibus deficientē carnem sumus restitaturi, opificis habere rationem. Ac primū quidem in omni cavo ulcere hæc duo consideranda veniunt: justane sit temperie id quod subiectum est: nempe an secundum naturam se habeat (similarium quippe corporum sanitas, justa est quatuor qualitatū temperies) & an sanguis qui influit, bonus ac mediocris existat. Nam si horum alterutrum sit vitiosum, multi affectus præter naturā constiterint. Verum si & sana sit pars, & sanguinis cōfluxus citra omne vitium: nihil obest quominus prima carnis generatio contingat prospere, idq; nullius externi medicamenti ope. Cæterum quia in ipsa primæ carnis generatione duplex excrementū oritur, alterū quidem tenuius (quod in ulcere sanies dicitur) alterū verò crassius, quod nuncupatur sordes: atq; ex tenui quidem, ulcus humidum redditur, ex crasso autem sordidum: duplicibus sanè medicamētis est opus: utique ut humidum ulcus est, siccantibus: ut sordidum, quæ ipsum expurgent. Ergo cum nullo unquam tempore natura esset, certè nec

*Sarcoticum medicamen-
primo gradu
debet deterge-
re, & siccare.
Sarcotica me-
dicamenta
qua sint.*

*Thuris facul-
tates.*

*Naturaliter
se habentia
corpora, sibi
similia postu-
lant: prater
naturam an-
tem, contra-
ria.*

*Ulcus pro-
pria curatio
unde profici-
scatur.*

*Genitura cor-
ruptelaque
quatuor qua-
litates sunt
causa.*

*Ulcus sim-
plex solum
agglutinatio-
nem desiderat.*

tempus ullum erit, in quo nō ambo hæc in cavo
ulcere colligantur. Quare nec tempus ullū erit
in quo nō utrunq; medicamento genus, & siccas
& expurgans, desideretur. Sed nō sat est invenisse
genus medicamento, nisi etiam speciem ejus dis-
quiras. Cujus quidem inventio petenda est ex
cōmentariis medicamentorū simplicium, ubi ni-
mirum omniū medicaminū temperaturas, gra-
dus, & differentias tradidimus. Debet autem me-
dicamen producendæ carni cōveniens, ex iis es-
se, quæ primo ordine tum detergunt, tum sicca:
qualia sunt, thus, hordeacea, fabacea, & erui fari-
na, iris, aristolochia, cadmia, panax, atq; pōpho-
lyx. E quibus aristolochia quidē & panax, tum
cæteris plus siccant, tum natura magis calent.
At hordeacea fabaceaq; farina, multo his minus
siccant, ac minimè calida existūt. Thus verò mo-
deratè calet, minus tamen illis siccat. Erui fari-
na & iris, horum, atque aristolochiæ & panacis,
medium locum sortiuntur. Cæterū thus in hu-
mida corporis natura carnem producere potest,
in sicca autem non potest: vim tamen movendi
pus habet, nimirum cum mediis ac temperatis
naturis consentiens. Sunt nanq; duæ differentiæ
primarum indicationum: quod secundum natu-
ram se habet, custodiam sui indicante, & propte-
rea quæ sibi similia sunt, postulante: quod præ-
ter naturam est, sublationē sui, eoque requirente
contraria. Perit enim quidq; in contrarium, & à
contrario. Ulcus ergo, quò humidius fuerit, eo
sanè medicamento quod magis siccet, indiget.
Corporis verò natura, quātò est humidior tan-
tò quod minus siccet, medicamentum postulat.
Quamobrem ex ulceribus æquè humidis, quod
quidē in sicciore temperamēto cōsistit, utiq; ma-
gis siccati postulat: quod in humidiori autē, mi-
nus, quatenus natura naturæ interest. Siquidem
productam carnē, ei quæ antea erat, similem es-
se oportet. Jam verò si medicamen ulceri, admo-
tum profuerit minimè, continget utique id, aut
quod exiccarit impensius (hoc enim cognoscit
ex insigni ulceris puritate) aut quod parcius id
sit molitū: quod sanè ex ipsius ulceris sordib. fa-
cilè cōjiciemus. Quare haud magno negotio ex
notis ipsis corrigemus siccitatis medicamento &
defectus, & exuperantias. Atq; hæcenus de cavi-
tatis quæ ulceri inest, curatione sit dictum. Pro-
pria aut curatio ulceris (est enim hoc cōmune si-
milarium atq; instrumentalium particularū vitiū)
tum à laborantis particulæ temperamento, tum
à medicamentorū proficiscitur facultate. Cæte-
rum ambo hæc à tractatione de elementis pen-
dent, cum nimirum genituræ corruptelæq; qua-
tuor qualitates sint causæ. Quocirca nec simila-
rium, nec instrumentalium partium licet cura-
tionem attingere, absque naturali scientia. Sed
jam ad ulceris, quod solum consistit, curationē
transire, tempestivum videtur. Fuerit autem so-
lum, si neque affectus ullus simul adsit, nec sym-
ptoma. Igitur dum solutio cutis contingit, citra
fluxionem, aut intemperiem, aut cacochymia,
aut cavitatem, aut aliquam ipsius cutis deperdi-
tionem (quemadmodum ubi à telo aliquo acu-
to ipsa cutis convulneratur) ulcus ipsum est, &
dicitur simplex, tantumq; agglutinationem de-

siderat. Quippe si commissæ simul sint cutis oræ,
nulla intercedet cutis diversi generis: quemad-
modū in eo repleto, planoq; reddito, in quo scili-
cet oræ ulceris se non contingunt, sed totius ul-
ceratæ partis cuticula amissa est: quā utiq; prius
restituere, q̄ ora jungantur, oportet. Quoniam igit
in simplici ulcere sola divisio pponitur, diducta
labra conjungi, conjunctaq; manere oportet. At
verò ex diductis corporibus, alia quidem per se,
alia aliorum ope conjuncta manent. Per se qui-
dem, quæcunq; secum cōcrescunt, coalescunq;
ut caro, & quæ ex carne constant. Aliorū autem
ope, tum quæ colligantur, tum quæ vinculo ali-
quo cōtinentur: ut ossa, & quæcūq; sunt dura. Est
aut, sicuti in cavis ulceribus, ut producaturo caro,
ita in simplici ulcere, ut oræ ipsæ mutuò coale-
scant, natura opifex causa: ita, ut si quæ dissident,
in idem adamussim componas, citra omnē reli-
quam extrinsecus molitionē coalescant. Quæ di-
ducta sunt, in idem adduces, aut vinculo ex duo-
bus initiis circumdato, aut sutura, aut fibulis im-
positis: aut horum quibusdam, aut omnibus. Ex-
pedit autē, quod circumjicitur, nec molle nimiū
sit, quò videlicet tutò cōtineat: nec rursus ita du-
rum, ut premendo offendat. Circūductio etiam
ipsa, nec ita laxa sit, ut nihil efficiat: nec ita vehe-
mens, ut dolorē premendo excitet. Hæc itaq; me-
dendi ratione, quale diximus ulcus simplex coi-
bit. At si ob magnitudinē ejus, vel ob interciden-
tem saniem, vel ob dolorem, aut insignem imbe-
cillitatē particulæ, vel denique ob inclusum aë-
rem, disjunctæ partes exactè ad imū usq; conjun-
gi nequeat, ejusmodi sanè ulcus ex sola partium
commissione agglutinari omnino non potest.
Quare medendū prius est illis impedimentis, ali-
quo medicamento siccante: quod quidem si qua
sanies jam subsit, absumat eam: & si qua in va-
cua loca influxura est, hanc prohibeat. Etenim
medicamen glutinatoriū, aut omnino carnis ge-
neratione nō eget, aut planè exigua: ac proinde
plus siccet oportet, q̄ quod carnē producit. Præ-
terea, cum carnis productivū medicamentū fa-
cultate extergendi opus habeat, qua non modo
redundantiam humoris siccet, sed etiam expur-
get sordes: glutinatorium certè nec deterget, nec
expurgat, sed contrā prorsus substantiam om-
nem in idem cogit: cujusmodi facultatē habent
medicamenta ea, quæ austera, & astringentia vo-
cantur. Quocirca, ubi carni gignendæ studemus,
maximè cavendum est à medicamento astring-
gente: utpote quod sordes ulceribus arctius affi-
gat, quàm ut facile possint elui. Vinū igitur om-
nis ulceris, quatenus ulcus est, optimū medica-
mentū existit. Porro ipsa medēdi methodus pro-
cedet nobis bellissimè, si de singulis simplicibus
seorsum aliquid præceperimus: post verò, de cō-
positis omnibus alteram aliquam methodū ex-
plicarimus. Quam quidem si ingrediamur viā,
omne ulcus tum siccati, tum debere astringi in-
veniemus, non tamen detergeri. Contrā, cavi-
tatem in carne, siccati quidem postulare & ab-
stergeri, minimè autē astringi. Cæterū quātò cor-
poris natura est humidior, tantò medicamentis
minus siccantibus eget. Quātò aut sicciore, tan-
tò rursus quæ vehementius siccet, magisq; astring-
gant,

*Diducta sunt, in idem adduces, aut vinculo ex duo-
bus initiis circumdato, aut sutura, aut fibulis im-
positis: aut horum quibusdam, aut omnibus. Ex-
pedit autē, quod circumjicitur, nec molle nimiū
ducit.*

Glutinatorium medicamentum, quod carnem producit, plus siccet oportet, quod carnem producit.

Astringentia medicamenta, quæ austera, & astringentia vocantur. Quocirca, ubi carni gignendæ studemus, maximè cavendum est à medicamento astringente: utpote quod sordes ulceribus arctius affigat, quàm ut facile possint elui.

*Vlcus simplex solum agglutinatio-
nem desiderat.*

gant, desiderat. Jam verò ulceri mediocriter ca-
vo, statim quicquid volumus applicamus, sive
siccum id, sive humidum medicamen existat. At
in vulneribus quorum major profunditas est, id
nō licet. Etenim & cerussa & lithargyros siccat,
astringuntq; modicē: ad ulceris tamen fundum
vis eorum nō pervenit, nisi humori cuiuspiam mi-
sceantur. Porro quemadmodū cavum ulcus ut
repleatur, carnis generationē (cujus materia san-
guis est) postulat: sic plenū, ut perducatur ad ci-
catricem, generationem cutis, quæ ex carne est,
nō unionem tantum, desiderat. Verū caro ea-
dem specie cum ea quæ perit, gigni in cavo ulce-
re potest. Cutis talis omnino, qualis erat quæ pe-
riit, prorsus restitui non potest: sed simile quid-
dam cuti, & quod eius officium suppleat, potest.
Etenim cum cutis carne ipsa tum siccior, tum
densior sit, certē si resiccarimus & astringerimus
carnem, persimilem illam cuti reddemus. Cæte-
rum multo siccior quod cicatricē inducat, quā
quod agglutinet, esse oportet medicamentum.
Quandoquidem glutinatio, solum id propo-
situm est, ut eius quod secundū naturam est, red-
undantiam consumat: qui autē cicatricem indu-
cet, nō hoc modō, verū etiam ut ei quod secun-
dum naturā se habeat, aliquid deradat. Galla igitur
immatura hoc loco, & malicorium, & Ægy-
ptiæ spinæ fructus, modicē siccantia pharmaca
sunt. Chalcitis, & æs ustū, & æris squama, & mi-
sy, multo his valentiora existunt: misy quidē &
chalcitis, præcipuē: mitior autē æris squama: atq;
etiā hoc mitius æs ustum, præsertim si ablutū fue-
rit. Sed hoc quidē ad speculationē de cōponen-
dis medicamentis pertinet, quæ medendi sequit̃
methodum: quemadmodū ipsam præcedit, sim-
pliciū pharmacorū notitia. Deinceps autē aga-
mus de excrementis carnis in ulcere, quæ mor-
bus in magnitudine exiens, primò omnium sui
ablationē indicat. At hæc, sola vehemēter siccan-
tium medicamentorū ope perficitur, haud item
naturæ opera: contra q̃ in carne restituenda, aut
glutinatione res habuit: hæc enim ipsius natu-
ræ sunt opera, nec aliud medicamēta moliuntur
quā submovere illa, quæ actioni eius obstant.
Porro medicamenta carnē minuentia, proxima
tum his sunt quæ valenter detergūt, tum iis quæ
cicatricem inducunt. Cæterū misy & chalcitis, si
humidæ naturæ applicētur, potius carnē exedēt,
quā cicatricē inducant: nisi fortē in pollinem
admodū tenuem redactis, parcissimē illis quis-
piam utatur. Nam sic imposita, partibus cicatri-
cem cōciliant. Quod si minuere quæ supercreve-
re studemus, liberalius sunt imponenda. Ærugo
aut, magis adhuc quā hæc, minuere carnē potest,
ita ut genus eorū quæ cicatricē inducunt, prorsus
egressa videat̃. Jā verò si exuras hæc omnia,
ut minus acria, sic etiā ad cicatricē inducendam
ipsa reddes aptiora. Si verò etiā laves, adhuc eva-
dent mitiora. Hoc autē semper curantis animo
hæreat, nō omnē naturam eadē remedia requi-
rere: sed infirmiores, mollioresq; mitiora: vali-
diores siccioresq; valētiora. Quare natura ægri
in primis venit consideranda. Cum autē cujusq;
naturæ proprietas ineffabilis sit, nec exactissima
scientia cōprehensibilis, ac præterea cuiusq; ho-

minis propria curatio habeat̃, is erit optimus cu-
jusq; particularis ægritudinis medicus, qui jam
eam methodum cōparavit, ex qua & dignoscere
naturas possit, & cōjectura cōsequi, quæ sint cu-
jusq; propria remedia. Verū legitimi ulceratarū
partiū temperamentis, quoties eas vel carne im-
plere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes,
major tibi sollicitudo erit. Nam si ipsa exulcerata
caro calidior sit, aut frigidior æquo, utiq; mede-
lam exigit, quæ nō modō moderatē siccet, sed e-
tiam in tantū calfaciat, refrigeretve, in quantum
subjecta caro à naturali suo recessit habitu: cum
fieri nō possit, ut in ulcere vel carnis productio,
vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatri-
cis inductio, rectē unquā cedat, nisi subjecta ca-
ro pro naturali modo se habeat. Ut igitur si phle-
gmone unā cum ulcere urgeret, priusquā hæc ef-
ficeret discussa, nemo id vel carne implere, vel gluti-
nare, vel inducere cicatrice tentaret: ad eundem
(arbitror) modū, etiā si sine phlegmone sola in-
temperies subsit, nullū horū fore prius sperabi-
mus, q̃ illa fuerit sanata. Cavenda tamen sunt in-
temperies immo dicē cum calfacientia, tum etiā refri-
gerantia. Ergo hyoscyamū, mandragorā & cicu-
tam, ceu supra modū refrigerantes herbas vita-
bis: tamen si siccat ex quoq; quantum sit ulcere ex
usu. Resina verò & pix, & asphaltus, quāq; mo-
dicē siccant, immo dicē tamen sunt calida: ideoq;
eis solis utetur nemo, nec aliter, nisi admistis cu-
leviter refrigerantibus, unū ex omnibus medica-
men fecerit, q̃ sit temperatū. Inspiciunda quoq;
est & æris nos circūdantis temperies. Siquidem
veluti medicamentū quoddam is etiā corporib.
nostris forinsecus incidens, ubi immodicus ca-
lore, vel frigore est, sanationē morat̃. Danda igitur
opera est, ut medicamēta ejus excessui occur-
rant. Ideoq; Hippocrates in calidiorib. anni tem-
poribus, iis quibus frigidior facultas sit, medica-
mētis utitur, calidioribus per frigidiora. Jam ve-
rò quemadmodū humidior natura, humidiora,
sicciora sicciora medicamenta exigebat: ita tunc,
calidior calidiora, frigidior frigidiora requirit:
contrariā scilicet semper iis, quæ præter naturā,
& quæ secundū naturā sunt, indicationē præstan-
tibus. Quippe quæ secundū naturā sunt, similiū
sibi indicativa sunt: quæ præter naturā, cōtrario-
rum: si modō illa servari, hæc submoveri est ne-
cesse. Quod verò ad cōtrarias indicationes per-
tinet, si quantō ægri temperamentū iusto est hu-
midius, tantō particula iusto sit siccior, tale adhi-
bendū est pharmacū, quale si ulcus in medii tem-
peramenti particula, corporis mediocriter tem-
perati cōsisteret, adhiberemus. Sin autē particu-
la fuerit * siccior iusto, q̃ corporis temperamentū
sit æquo humidius: utiq; in tantū intendi siccita-
tem medicamēti cōveniet, quantū particulæ tem-
peramentū, totius temperamentū excedit. Velu-
ti si exulcerata pars, quatuor numeris sit siccior
medio temperamēto: ægri autē natura gradibus
tribus humidior: manifestū est, particulam quæ
nunc exulcerata est, siccior uno gradu desidera-
turam medicamentū, q̃ quæ sit temperata parti-
cula. Simili modo & de aliis excessibus licet tibi
ratiocinari. Porro sicciores particule sunt, quæ
minus carnosæ existunt: cujus generis sunt, quæ
Medicus cu-
i usq; morbi
optimus, quis
se dicendus.
Ulcus rectē
curari non
posse, nisi sub
iecta caro
pro naturali
modo se ha-
beat.
Ulcera cura-
turus cavere
debet ab ex-
tremē calfa-
cientibus at-
que refrige-
rantibus.
Æris tempe-
raturam ad
ulcerum cu-
rationem esse
expedendam
Naturaliter
se habentia
corpora, simi-
lia sibi: præ-
ter naturā
autem con-
traria po-
stulant.
Siccæ partes
quæ sunt.

*Ulceri sordidi & cavi curandi metho-
dus.*

*Carnis generationem ex
subiecta carne, si sana sit,
fieri.*

*Puncto capite musculi, si
convulsio oriatur immedicabilis,
scindendum esse totum
transversum musculum.
Sanguinem fluentem im-
modicè, superprimi si per
transversum totum scis
præcidatur: ulcus tamen
eius postea sanari non
posse.*

*Nervus quando transver-
sim secandus*

*Luxatio cum
ulcere quando debeat in
sanata relinqui.*

*Differentia nullius po-
test, quod per se consistere
potest.*

*Ulcus simplicis differ-
entia propria unde su-
mantur.*

circa digitos articulosq; habentur: præterea, quæ circa aures, nasum, oculos, & dentes consistunt: atq; ut semel dicam, ubi crebræ cartilagines, & membrulæ, & ligamēta, & ossa, & nervi adsunt: adeps verò & caro, vel omnino nulla est, vel per-
exigua. Ordo autē curandi ulceris sordidi & cavi, à sordē expurgāda orietur, cum nec glutinari quicq; nec carne impleri possit, priusquā purum fuerit. Secundū locū exiger cavitatis sanatio. Tertium, cicatricis obductio. Quod si unā cum illis vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna, vel intemperies aliqua simplex cōpositave, partem infestet, nisi quis prius eam sanarit, ulcus implere carne nō poterit. Carnis siquidē generatio, ex subjecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea verò quā premit phlegmone, quæq; intemperata est & ægrota, gigni caro nova non potest. Etenim iusta subjectæ carnis temperies, causæ rationē habet: ut quæ cōcrescere secū, quod ulceratū est, faciat, & cavitatē impleat. Puritas ulceris, rationē eius sine quo nō, atq; hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet autē & ulcus ad cavitatē, rationē ejus sine quo nō: quandoquidem si ulcus cicatrice fuerit obductū, nō amplius cavitas impleri carne poterit. Ergo si phlegmone, & cavitatas, & ulcus, & sordes, in eadē particula simul adsint, primò phlegmonē, secundo loco sordē, tertio cavitatē, & quarto ulcus sanare oportet. Cæterum affectus unde primū maximeq; imminet periculum homini, hic debet primus curari, atq; etiā solus interdū: veluti si puncto capite musculi, cōvulsio, quæ cōgruentiū omniū medicamentorum vim respuit, accidat, præciso per transversum toto musculo, convulsionē quidem sanaveris, aliquē tamen ex particulæ motibus vitiaveris. Ad eundē modū, cum ex vena, arteriave sanguis immodicè profluit, si totū vas per transversum præcideris, ulcus quidem ejus postea sanare nō poteris: periculū tamē quod ex profluvio sanguinis impendebat, sustuleris. Jam nervum punctum sæpe cogimur transversim præcidere, quoties vel convulsiones, vel deliria, vel ambo magna ægreq; sanabilia, supervenire vulnerationi cernimus. Similiter ubi luxatio cum ulcere in aliquo majorū articulorū incidit, ulcus sanamus, luxationē autē insanatam relinquimus. Nam si hanc quoq; sanare conemur, cōvulsiones haud dubiè sequētur. Primus igitur medendi in hisce est scopus, ille qui veluti à causis sumitur, ejus est futurū: alter, qui ceu rationē obtinet, ejus sine quo nō. Tertius denique is de quo nuper diximus, qui ad id quod urget dirigitur. Porro quod cōsistere seorsum & per se potest, id nullius unq; alterius differētia fuerit: sed quod alteri accidit, nec seorsum per se consistit. Quamobrem ulcus, phlegmone, gangræna, & putredo, cum seorsum & per se consistere possint, affectus quidam præter naturam potius dicenda sunt, q̃ ulceris differentia. At magnitudo, parvitas, æquabilitas, inæquabilitas, tempus & figura, ex eorū numero sunt quæ aliis accidunt: ac proinde ab iis sumuntur propriæ simplicis ulceris differentia. Indicatio aut curationis à differentiis fit, sed non omnib. Nam nec recens, nec vet⁹ ulcus per se indicat aliquid. Siquidem quod ulc⁹ tantū est, omniq; alio

affectu liberū, sive recens, sive antiquum sit, eandem semper curationē desiderat: nihil planè proprium indicante discrimine eo, quod à tempore sumitur. At si cavitatē altè reconditā sub cute habeat, considerare oportet, utrum ea in superiore parte sit sita, ut sanies ex ea p̃na effluat: an in inferiore, sic ut illic sistatur. Eius igitur cui effluxus patet, eadem quæ aliorū curatio est. Cui non est, huic ipsi moliamur effluxum quendam oportet. Eius duplex ratio est: aliās tota cavitata defecta, aliās in fundo tantū aperta. Quando verò harū alterutra sit ineunda, docebit tum locorū ipsa natura, tum verò ulceris magnitudo. Si nanq; & loca ipsa periculosam sectionē faciunt, & ulcus magnū fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contrā se habeant, perscindere præstat. Deligatio verò ejus incipiat quidē supernè, sed finiat in frā, ubi scilicet patet effluxus. Jam verò transversa ulcera, quod eorū labra magis diffideāt, à seseq; absint, diligentius cōjungi postulant: ideoq; tum futuris, tum fibulis, in eis est utendum. Quæ verò per longitudinē musculorū sunt facta, hæc si duplici initio deliges, nec futuris egebis, nec fibulis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel futuris utere. Sufficiens aut paucissima omnino futuræ. Et magna quidem ulcera, iis quæ valentius siccent medicamentis curabis. Parva verò vel quæ moderatè siccēt, abundè sanaverint. Cæterum profunda ulcera, eadem etiā sunt magna, voluntq; tum à duobus initiis deligari, tum verò nec labra sua præproperè glutinari. At quæ profunda multū, longaq; sunt, ut duplici ratione sunt magna, sic duplicem quoq; præstant indicationem. Itaq; & quæ valenter siccent postulat, & ne immaturè labra conjungas: & ut à duobus initiis deliges, & ut altis futuris consuas.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, Lib. IV.

40 **E**st itaq; unum morborū genus, divortium continui vocatū: quod quidem in carnosā parte, ulcus: in ossē, fractura: in nervo, convulsio appellatur. Eiusdem generis sunt avulsio, ruptio & contusio: illa quidem in ligamēto, hæc in vasis musculisq; ex violento ictu, vel gravicasu, vel alio quopiam valente motu excitatæ. Ecchymosis verò ut plurimū unā cum contusione & ruptione incidit. Fit autem aliquando & ex oris vasorum apertione, quæ anastomosis dicitur, & ex ea quam diapedesin vocant, & ipsam existentem solutæ continuitatis aliam speciem. Jam verò & ex erosione etiam solvitur interdum in animalis partibus cōtinuitas. Verū is jam mistus affectus est. Porro erosio, si intrinsecus ab ipso animali proveniat, vitiosi succi est soboles: sin extrinsecus, aut à valentibus medicamentis fit, aut ab igni. In vniuersum autem, simplices affectus à compositis distinguere oportet, cum simplici morbo simplex curatio adhibenda sit, composito verò nō simplex. Igitur omne ulcus, aut solum atq; per se, nullo nec cū eo simul invadente, nec ipsum præcedente, aut sequente alio affectu, partem infestat: aut cum alio quopiam uno, pluribusve conjunctum: quorum alii, non modo statim ab initio excitant ulcus, sed nunc etiam

*Effluxus
liendi
in iis
bus
qua
expurgari
non possunt*

*Deligandi
ulceris
Transvers
ulcera
diligentius
quæ
recta
da esse.*

*Vnitatis
lutio.
Ulcus.
Fractura
Convulsio
Avulsio.
Ruptio.
Contusio
Ecchymosis*

*Anastomosis
Diapedesis*

*Erosionis
causa.*

etiam majus efficiunt alij, eius sine quo non, ut ad curandi opus, rationem obtinent. Cæterum qui ulcus majus efficiunt, submovendi è corpore sunt, aut pervincendū id, quod inducūt, incommodum. Hoc autē, si affectus exiguus sit, fieri libebit facile: si verò magnus, duci ad cicatricē ulcus nō poterit, priusquā illi affectui subventum fuerit. Ergo omne ulcus subjectū sibi carnē præditam naturali dispositione, optat: & ne quid ahenum inter oras cōglutinandas intersit, quod curationem morari possit. Subjectæ verò carnis affectus, causæ rationē obtinet, ad id quod efficitur. Quippe ex hac, & per hanc tum quæ dissident, glutinantur: tum quæ cava sunt, carne implentur: quare pro natura sua se habeat oportet, quò hæc utraq, cōmodè perficiatur. Rectè autē illa se habuerit, si propriū temperamentū tueatur. Itaq; necessum est ad ulcera tum glutināda, tum carne implenda, temperatam esse subjectam carnem. Nec sat hoc ipsum videtur esse, nisi etiā qui affluit sanguis & probus sit, & quantitate medio cris. Quippe ægrè sanabilium, rebelliumq; ulcerum, alia ob intemperie carnis exulceratæ, alia ob affluentē humorē sunt talia. Caro autē ipsa interdum solis qualitatibus naturæ modū egreditur, interdum accedente tumore præter naturam. Jam humor confluens, aut qualitate aut quantitate, à naturæ modo discedit. Interdum verò miscentur dictorum affectuum, aut aliqui aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intemperiem, si squalens siccaq; videatur, aqua temperata fovens humectansq; donec rubescat, attollaturq; in tumorem, corriges. Si verò ultraperfuderis, id quod attraxisti evocabis: ac proinde nihil profeceris. Quinetiā medicamenta humidiora, q̄ sanæ carni, adhibeantur. Si verò humidior q̄ pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferēda: aqua verò nullatenus admovenda: sed si lavādum ulcus videtur, vinum, aut posca aut decoctū austeræ cuiuspiam herbæ, præparandum. Eodem modo & calidiorē q̄ par est, carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē calfacies. Agnosces verò horū utrunq; partim colore, partim tactu, partim laborātis sensu. Quippe alias unctionem se sentire fatentur, alias manifestum in particula frigus: gaudentq; vel frigidis medicamentis, vel calidis. Et aliis quidem rubor levis infidet, aliis color magis albicat. Partiū porò quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus est tumor. Ubi labra tantum ulceris decolorata durave plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanem usq; carnem. Cum verò altius id malum serpit, deliberatione est opus, excidendūne omne sit, q̄ præter naturam cernitur, an temporis spacio curandum: qua in re certè consulendus etiam est æger. Jam verò si pravus humor iu particulas cōfluens exulceratas, nec uberius sit iusto, nec multum excellat malignitate, averti hunc, atq; repelli conveniet: astrictis scilicet refrigeratisq; iis particulis, quæ ante exulceratā consistunt. Inchoanda etiam deligatio est à laborante particula, deducendaq; versus sanā. Quæ autē ulceribus ipsis admoventur pharmaca, siccant valētius oportet,

quàm quæ simplici applicantur ulceri. Quòd si fisti, cōpesciq; medicamentis influxus nequeat, causa eius investiganda est, atque hæc prius adimenda. Ac siquidem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatē aliquam id contingat, huic mirum medendum est. Imbecillitas autē partis, omnino ab intemperie nascitur: nō tamen ab omni, sed ab excellentiori, quæ sanè per contrariā est abigenda. Ubi igitur intemperie ipsam sanaveris, te ad curandū ulcus cōvertes. non aliter planè nunc curata intemperie, q̄ si incidisset citra ulcus. Si verò ab alia quavis particula, vel etiam à toto corpore, vitiosus aliquis humor influxerit exulceratis particulis, medendum in primis est ipsius fluxionis radici. Ita igitur & varices, quæ sæpe suprā exulceratū locum sunt, prius sanabimus, ut deinde mox ulcus sanemus. Advertendum autē est interim, nullam primitivarū causarum, quas procatarcticas vocant, nisi etiamnum affectum producant, esse curationis indicatricē: sed huius indicationem, ab ipso affectu initium habere. Siquidem à nullo eorū, quæ adhuc non permanent, indicatio sumi eius quòd ex usu futurum sit, potest. Est tamen utilis causarū procatarcticarū cognitio, ad noscendos affectus eos, qui tum rationē, tum sensum latent. Est itaq; rei quidem præsentis curatio: futuræ autem, providentia. Quod verò nec nunc lædit, nec læsurū timetur, id ab utroq; artis munere, tum eo quod curat tum eo q̄ providet, excessit. Quare nec indicatio ab hoc curationem ulla, nec providentiæ ratio sumitur. Si igitur à procatarctica causa indicatio curationis non sumitur, utiq; manifestum evadit, quod ab ea quæ præsens est, sumetur. Cæterum prospectrix pars artis, est duplex: altera, quæ morbosum affectum jam præsentem submovet: altera, quæ illum qui nondum urget, prohibet. Porro cōtingit ulcera nō sanescere, interdum quidem ob labra ipsa pessimè affecta, interdum ob intemperiem particulæ, absq; ullo tumore præter naturā: nonnunq̄ ob intemperantiam quidem, sed quæ cum tumore aliquo sit cōiuncta, nō tamē qui omnino sibi labra excidi possit. Fieri etiam potest ut superjacens varix, vel auctior lien vel aliquod vitiū jecinoris, vel imbecillitas exulceratæ particulæ (quæ ipsa quoq; intensā quædam est intemperies) vel totius corporis cacochimia, vel plethora, ut ulcera minus sanescant, prohibeat. Quare causa ipsa quæcūq; illa sit, circuncidenda venit. Jam verò ulcus omne cacoëthe, hoc est, malignandis naturæ, continuò & cavum sit est necesse, cum ex erosione nascatur. Nunq̄ autem id genus ulcera, sicuti neq; alia ulla, calido acriq; medicamēto exasperes, priusquam universum corpus à recrementis liberes: quemadmodū faciebat imperitissimus Thesallus. Quippe ejusmodi medicamenta omnia, curbitæ ritu ad se trahere à toto corpore sunt habilia. Itaq; nisi id prius vacuaris, materiā fluxionis acri medicamento relinques. Etenim q̄ nec rectè sanare oculū ante totum caput, neq; hoc ante totum corpus, ulla ratione liceat, tum philosophis tum medicis universis, qui methodo mederi sunt soliti, est in cōfesso. Voco autē methodū, certam quandam universalemq; viam, quæ sit omnium

Imbecillitas partis ab intemperie nascitur.

Varices prius sanandas esse, quàm ulcus ab eis fluxum recipiens.

Indicatio utilis nulla sumitur à causa non permanente. Procatarcticarum causarum usus.

Indicatio curationis à causa præsentē sumitur. Prospectrix artis pars duplex. Ulcera sanescere quæ prohibeant.

Ulceræ exasperanda nō esse prius quàm corpus universum sit purum.

*Methodus est
certa quada
m & universa
lis via, omni
um particu
larium com
munis.*

*Ulceris cacoethe
qua di
cantur.*

*Ulceris diu
turnitas est
succis & vitio
sindicium.*

*Ulcus omne,
quod ulcus
est, ut sane
tur, mediocri
ter exiccare
postulat.*

*Putredinem
oriri a calido
& humido.*

*Pus moven
tia qua sint.*

*Inflammatio
ni cur adhi
beantur ca
taplasmata
calida & hu
mida.*

*Hordei fari
na dolo em
mitigat.*

particulariū cōmunis. Cæterum notitiam quan
dam habeat oportet, tum similis, tum dissimilis,
qui methodo quidvis molitur. At verò, etiam si
in singulis morbis privata quædam esse metho
dus medendi videatur, cōmunē tamen genus in
omnibus unum existit. Quippe in omnibus cu
rationibus, unum est methodi ipsius principiū,
quod ab affectus indicatione sumitur: viaq; etiā
quæ ab eo principio ad finē usq; perducit, est in
omnibus particularibus similis. Quæ igitur ulce
ra, omnibus ritē decenterq; factis, nō sanantur,
ea medici cacoethe, hoc est, maligna, contuma
cia, rebelliaq; nuncupant. Protrahuntur autem,
ubi quis illis, perinde ac si tantū ulcera sint, me
detur. Cæterū ex diuturnitate ipsius ulceris, indi
catio curationis nō sumitur, sed ex ipsius parti
culæ affectu. Si ergo tantū exulceratæ partes af
fectæ sint, si eas curaveris, continuo sanaveris ul
cus. Sin verò universum corpus pravo succo re
dundet, si hūc evacuaveris, idem haud dubiē mo
lieris. Ac signū quidem vitiosi sucti, est ipsa diu
turnitas ulceris: inventio autem ejus quod expe
dit, nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio sugge
ritur. Quare tria hæc sibi mutuō cohærēt, signū,
affectio, & curatio: signum quidem, ipsa diutur
nitas: affectus, succi vitium: curatio, ejus vacua
tio. Veteres autem, utpote brevitatis studiosissi
mi, prætermisso medio, interdū tertiū statim pri
mo subjiciunt. Veluti Hippocrates fecit, cum di
xit: Tum ab inveteratis ulceribus confert ut as
siduē sanguinē effluere facias, utcunq; id oppor
tunum videtur: non utiq; curationem indicante
diuturnitate, sed sanguinis vitio. Porro omne ul
cus, quā ulcus est, ut sanetur, mediocriter exi
cari postulat. Si verò etiam habeat secum affectum
aliū conjunctum, primò quidem illius curatio
nem: secundo autem, suam propriam requirit.
Sed de curatione ulcerum, sic verba fecit Hippo
crates: Quodcunq; ulcus cæsim, perversimve a
cuto telo est divisum, medicamentū enæmon, &
siccans, & quod suppurari vetet, admittit. Sin ca
ro aliqua telo tum contusa, tum cæsa sit, huic ita
medendum est, ut q̄ celerrimē suppuret. Nam &
minus phlegmone urgebitur, & necessum est car
nes, quæ contusæ cæsæq; sint, putrefactas & in
pus versas, liquare, postea novam carnē produ
ci. Quo quidē sermone nos docet, oportere om
nia siccari, præter ea quæ sunt cōtusa. Porro om
nia quæ putrefiunt, ex calido & humido sic affi
ciuntur. Ideoq; etiā ea cataplasmata quæ ex hor
dei farina constant, ceu quæ calfaciant hume
ctentq; omnibus iis affectibus, quibus moveri
pus expedit, admoveamus. Hordei nanq; farina,
ex aqua & oleo: itēq; panis, ex aqua & oleo: præ
terea fomentū multæ calidæ aquæ: & tetraphar
maci vis, omnia deinq; calfacientia simul & hu
meccantia, pus q̄ celerrimē movēt. Sciendum ta
men est, ad moveri cataplasma calidū atq; humi
dum inflammationi, haud quidem tanq̄ remediū
ipsius (phlegmone nanq; remedia facultatē sic
ciorē possident, ut verbasco coctū, & folia trifo
lij cruda & epipatri folia cocta, & polium) sed ut
lenimen quō idā symptomatis. Ac proinde hor
dei farina, lenit quidē dolorem, minimē autē me
detur inflammationi. Igitur vel pravus succus non

amplius confluit ad partē exulceratā, aut etiam
num fluit. Si nō amplius fluat, ipsi tantū quod la
borat, est succurendum: si quidem vel lividum,
vel nigrum, vel rubrum conspicitur, scarificādo,
ac sanguinē emittendo, mox spongiam ficiore
potius q̄ humidiorē superimponendo: post hæc
verò etiam siccantia remedia applicādo. Ab his,
si res postulat, rursus sanguinem auferendo, ac
mox iterū eadem peragendo, donec parta sani
tas sit. Quod si labra ulceris dura, callosaq; appa
reant, etiam ea excindendo. At si aliunde hu
mor ad partē fluat, fluxionis est occurrendū ori
gini. Si verò valens aliquis morbus, unā cum vi
rium robore affligat, vel si redundantis sangui
nis concursus nō adsit, nemo est qui nō sangui
nem detrahat, qui utiq; in artis operibus fuerit
exercitatus. Quippe sanguinis redundātia haud
quāq; sanguinē esse mittendum indicat, sed ma
gnitudo morbi unā cū virtute vegeta: exceptis
tamen a sermone pueris. Etenim si quis etiam nū
sanus, nec adhuc quicq; læsus, sanguinis redun
dantia gravetur, non statim huic mitti sanguinē
est necesse: imò alii satisfacit inedia, alii cibi par
citas, alii soluta alvūs, vel purgatio, vel frequen
tius balneum: alii sola exercitatio, vel multa fri
ctio, abundē fuit. Sed nec purgatio in sola vitio
si succi abundātia cōvenienter administratur, ni
si etiā magnitudo ipsius morbi sit ipsi cacochy
miæ, cōjuncta. Sic enim ulceribus atq; vulnerib.
omnibus quoties valida sunt, purgationem esse
utilem est professus Hippocrates, quod nimirum
& insigniter vacuet, & ad diversum trahat. Uni
versa autem vitia, trifariā gravia validaq; reddun
tur: nempe vel propter afflictæ partis præstanti
am, vel propter affectus magnitudinē, vel pro
pterea quod sint cacoethe. Vulnus igitur quod
intra thoracē, peritonēumve penetrat, nō parvū
periculum adfert, præcipuē si interiorū quicquā
sit simul convulneratū. Quinetiam cacoethe sta
tim fieri, quæcunq; in articulis accepta vulnera
sunt, id quoq; omnes ferē sciunt. Ubi enim ten
dones, & nervi, & carne vacua, osculentaq; sunt
loca, hīc doloris, vigiliarum, cōvulsionis, & deli
rii periculū instat. Tum hæc igitur vulnera, tum
quæ adeo sunt magna, ut futuris aut ligaturis in
digeant, purgationem desiderant. Ad hæc, qui
bus periculum corrumpendi ossis impendit, ea
utiq; non sunt absq; magnitudine phlegmone.
Quæcunq; verò exeduntur, ea tū cacoethe sunt
tum malorum succorū soboles. Herpetes quoq;
a bilioso excremento ortū habent: cæteraq; diu
turna omnia, ex hujusmodi quapiam causa pro
veniunt. Quare in omnibus his meritò purgare
per alvum jubet Hippocrates. Si igitur valenter
etiamnum fluxio irruat, revellere ad cōtraria stu
debimus: utique si in superioribus ulcus confi
stat, per inferna purgantes: sin autē in inferiori
bus sit, superiorem ventrem vacuantes. At si jam
fluxio restitit, atq; in membro inhæsit, derivare
per vicina magis expedit: cū & in propinquiora
translatio, & purganti medicamento tum acces
sus, tum attractus, è vicino, sit promptior. Ma
gnitudo autem morbi, ceu scopus quidam san
guinis detrahendi, aut purgationis adhibendæ,
a nobis cōstituenda est. Quæ sanē scopū invenit
primus

*Sanguis
mittenda
esse ubi
magnitudo
morbis
cōjuncta
re con
ferit, &
sanguinis
concur
non ad
Sanguis
dundant
non poss
re sectio
Sena.
Purgatio
in sola
chymia
admini
ri comm
nisi etia
gnitudo
morbis
postulere
Vitia om
trifaria
Sua real
tur.*

*Vulnera
ticulorū
dere ca
the.*

*Herpetes
bilioso ex
cremento or
tur.
Reversio
esse ad co
traria li
molenda*

*Derivatio
cienda ex
per vicina
Morbis
gnitudo
esse scop
Sanguis
mittenda
gationis
hibenda*

primus omnium Hippocrates: secundum cuius quidem sententiam, omni recens facto vulnere, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguinem plus minusve effluere. Quippe phlegmone sic minus tentabitur tum ulcus ipsum, tum quæ circumposita ei loca sunt. Idem etiam confirmat, debere scilicet imitatore esse medicum, non tantum naturæ, sed eorum etiam quæ cum sua sponte eveniant, conferunt: necnon conducere, si ab inveteratis ulceribus eorumque circumjacentibus partibus, crebro sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eam quam maxime servare citra dolorem tentandum. Quæ verò parum acuti sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, valentiora præsidia admittit. Rursus principis quidem membri robur servari oportet. Quod tale non est, licet huic adhibere relaxantem medendi rationem. Quod verò ad positum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transitus comestorum bibitorumque est) non semel, nec tota simul sumenda, sed paulatim, assidueque lingenda: & sanè tum crassiora, tum magis lenta esse debent. Nam ex transitu contactuque, vulneribus quæ illic habentur, emolumentum accedit: non ex continendo, & diutius adhiærendo: sicut iis quæ in ventriculo sunt. Quæ verò ulcera in crassis sunt intestinis, iis quæ per sedem injiciuntur remediis magis egent: quippe cui magis sunt propinqua. Quæ in tenuibus habentur (quoniam & longinquiora sunt, & medio litu posita) ambo requirunt, & quæ supernè sumuntur & quæ infunduntur per sedem. Communis autem omnium internarum partium est indicatio, ut ea eligantur, quæ animalis naturæ maximè sint familiaria, sive cibi sint, sive medicamenta: fugiantur respuanturque his contraria. Quamquam in iis quæ foris sunt ulceribus, innoxius etiam talium medicamentorum sit usus, æruginis, æris usti, æris squamæ, cadmiæ, pompholygis, lithargyri, atque cerussæ. Hæc igitur & similia, inter quibus exhiberi non pebent. Eligenda verò alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut ulcus glutinare studemus, tum austera, tum glutinosa, & quæ minimè rodant. Sin emundare, quæ modicè abstergeant: quod munus mel non coctum, præter cætera præstat. Ac voco sanè austera, id quod astringens dicitur: ut acerbum, quod impensè est austerrimum. Ergo internis ulceribus opitulantur, hypocistis, balauftium, punicorum cytini, galla, malicorium, terra Samia, Leminum sigillum, rhois, rosarum succus, acacia, aliaque id genus, quæ citra incommodum viscerum, præsidium internis visceribus afferunt. Danda verò hæc sunt, ex aliquo astringentium decocto, vel mali cotonei, vel lentis, vel claviculorum rubi, vitisve, vel myrtorum, vel denique ex vino aliquo austero. Cavendum tamè a vino est, ubi phlegmone suspicio adest. Sunt autè & præparanda id genus medicamenta, cum eisque miscenda etiam, tum tragacantha, tum gummi: præsertim si ob gulæ ulcera exhibeantur. Sed & gargarizare quoque jubendus est, qui ad fauces & paristhmia his utitur. Ad ulcus autem quod in aspera sit arteria, ut supinus quod durissimè in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos laxet, remittatque, præcipiendum: influit nam

que sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam. Nam & cum naturaliter sese habet, scire licet positionis non nihil illuc percolari. Sempèr autè cavendum est, ne largius quicquam, & per mediam spiritus viam, influat: alioqui excitabit tussim. Jam verò medicamentis omnibus, quæ thoracis & pulmonis ulceribus sunt destinata, mel admiscendum est: quod quidè digestionis eorum in corpus, ac celeris transitus, veluti vehiculū erit, cum eo, quod neque nocebit ulcere. Ad eundem modum, quoties in vesica & renibus consistit vitium, non solum mel ipsum, sed etiam diureticorum aliquod ulceris medicamentis miscere oportet. Ceterum partes exulceratæ, tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura, faciliè discernuntur. Itaque non modò illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, posituraque, indicantur. Etenim cathetere omnino probe uti nequeas, nisi & positum, et figuram totius vesicæ planè perspectam habeas. Ergo in hisce omnibus non parum ad totam curationem locus affectus indicat. Porro valentiora medicamenta requirunt, affectus in alto delitescens corpore, quam qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis omnis, vacuationem pro curationis remedio indicat. Quare calfacientibus huic, & modicè siccantibus medicamentis est opus. Quod si ecchymosis altius descendat, non fuerit usus cucurbitulæ inutilis: quod quidem instrumentum fuit à medicis, ad violentiam attractionem excogitatum. Ergo si evocatum celeriter ecchymoma sit, faciliè coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spacio, sordes multa subnascens, medium inter ulceris labra spacium occupat, ita ut jam coire ruptio non possit, sed tantum ipsa labra propè admoveatur.

GALENI PERGAMENI de methodo medendi, Lib. V.

Monstratum igitur est, omne ulcus siccatia medicamenta requirere. Ceterum quod finem habet, ut minus sanè quam reliqua, sic ea quæ præterquam quod modicè siccant, etiam abstergendi facultatem possideant, desiderare. Quod verò conjungi sibi labra postulat (cujusmodi sunt cruenta) huic tum quæ magis etiam siccant, tum quæ citra absterfionem leviter astringant, esse opus. Jam quæ ulcera perducunt ad cicatricem postulant, hæc non solum magis adhuc siccantibus, sed etiam strenuè astringentibus remediis egere. Quod si caro eorum præter naturæ modum intumuit, acria, & demolientia desiderare. Si quod verò aliud symptoma ulceri adjunctum erat, ab eius natura curationis indicatio sumebatur: atque ex hac rursus petebatur remediorum facultas. Si namque sordes innasceretur, quæ hanc tollerent opus esse: eaque omnia abstergendi vim habere, multò sanè majorem, quam ea quæ carne impleverentur. Ac si agglutinatorum medicamentum esset, siccans, astringensque id esse debere. Si carne impleturum, siccans & abstergens atque in singulis reliquorum, uti dictum est. Si verò intemperata subjecta caro esset, primum per contraria succurrendum esse illius intemperan-

perantiæ. Nihil siquidem redire ad propriam naturam potest, sine iis quæ ipsi facultatē habent contrariam. Considerandas præterea esse & ipsius intemperantiæ causas: ac primū quidem medendum esse causæ quæ adhuc intemperiem foveret: post hanc verò, & ipsi quæ jam facta esset intemperatiæ. Ostendimus autē, tum ab ulcerum differentiis diversas indicationes præberi, tum eas quæ à laborantis corporis temperamento sumuntur, diversam ab his habere rationē. Siquidem illæ, cum ex iis, quæ sunt præter naturā, sumantur, omnes contraria esse adhibenda dicant: hæc, cū ab ipsa natura capiuntur, similia. Nec illud omisimus, ex præcellentia membri, aut contrario statu, iremque sensu acri, hebetere, diversum medicandi consiliū peti. Cum autē non modò in similaribus, sed etiam in organicis partibus solutio cōtinui oriatur, remediōrum indicationes aliæ quidem à similaribus, aliæ ab instrumentalibus desumuntur. Cæterū quandoquidē satis superque de iis ulceribus, quæ in carnosissimis accidunt partibus, differuimus, tempestivū videtur nunc de illis agere, quæ in arteria, vena, & nervo contingunt. Ergo si cui arteria venæve magna sit vulnerata, copiosum sanguinis profluvium subito supervenit, & glutinari id vulnus difficile quidem in vena potest: in arteria autem (sicuti nonnullis medicorū est visum) fortasse omnino nō potest.

Sanguis quatuor modis à vasis effluere potest.

Anastomosis vasorum unde accidat.

Diapedesis causa.

Sanè profluit ex vena aut arteria sanguis, aut re-ferato earum ore, aut tunica earum divisa, aut transcolatus, sive sudoris instar transfusus. Porro dividitur ipsa tunica, aut vulnerata, aut cōtusa, aut rupta, aut erosa. Anastomosis hoc est, re-feratio) accidit, propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad os ejus impetu ruat, copiam: ad hæc acrem quampiā, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatem. Diapedesis verò ex tunica rarefacta, & attenuato sanguine oritur. Accidere tamen potest & ob graciliū vasorū os adaper-tum. Quæ igitur vulnerant, ea sunt acuta, atque ad secandum habilia. Quæ cōtundendo solvūt, dura graviaque existunt. Quæ rumpūt, omnia tensio-nis interventu id faciūt. Idem & intensior actio-nis vehementia facit: tum plenitudo illa quæ re-spectu vasorū dicitur, tum casus ab alto, necnon grave quippiā durumque incidens. Ac si ex vul-ne-re, vel clamore, vel casu, vel cōtusione, perruptū vas sit, utique in iis causa ipsa desit. Si verò ex abū-dantia, fieri potest ut vas etiam amplius rumpatur, effectrice saltem etiānum causa manente. Quare in tali affectu, quā primū est ipsa plenitudo vacuanda, dein suppressendus sanguis: ac demū ulcus curandū. Ubi verò effectrix causa jam de-sit, primò quidem sanguis sistendus est, ac mox ulcus sanandū: idque obturato perrupto vase, translatoque alio sum quod per id ferebatur. Porro ulcus ipsum claudetur, vel labris ejus, quæ dis-sident, in idē adductis: vel osculo ipsius obstru-cto. Adducentur in idē labra, tum nostrarum ma-nuum opera, ubi sic ad manus ulcus se exhibet: tum per deligaturā, tum per refrigerantia astrin-gentiaque remedia. Neque enim suere fas est, arteriæ venæve vulnus. Obstruetur vasis osculum & san-guine ipso cōcreto, & iis quæ foris illi admoventur emplastris linimentisque: necnon igne, & me-

Suendum ar-teria aut ve-na vulnus non esse.

Vas apertum obstrui quo-tuplīter potest.

dicamentis inducentibus crustam. Potest etiam superimponi ulceri circūjacens caro, atque ipsa in nonnullis vulneribus cutis. Avertitur autē san-guis tum ad proxima derivatus, tum ad contra-ria revulsus. Derivatio ad vicina loca fit, cum id quod per palatum vacuatur, derivatur per na-res: revulsio autem ad contraria, cum ad inferna revellitur. Rursus, quod per sedem profluit, id derivamus per vulvā, sursum verò revellimus. Ita namque & natura ipsa facere solet. Mulieri enim (inquit Hippocrates) sanguinem vomenti, men-ses supervenientes remedio sunt. Hac de causa, si vel menses cōfertim eruperint, vel sanguis ab utero quoquo modo profluxerit, sursum revel-les, cucurbitā maximā suffigens mammis. Ean-dem ob causam, si ex dextra quidem nare pro-fluat sanguis, eum retinet maxima cucurbitula hepatis admota. Si ex sinistra autem, lieni. Quem admodū si per utranque fluat, utrique visceri cucur-bitulæ applicandæ sunt. Quod si resolutus adhuc æger non sit, etiam vena ex eodem cubito inci-denda est, qui profusioni ē directo respōdet. Cæ-terum ubi paulum detraxeris, mox unam horā intermittens, rursus detrahes: post iterū atque ite-rum, pro laborantis viribus. Ad eundem modum, quæ per alvum fluunt, ea vel per urinas, vel per uterū derivabis: quæ per urinas, ea vel per ute-rum, vel per sedem transferes. Pari modo: quæ per uterum erumpunt, vel per urinas, vel per al-vum. Quæ verò in oculis, aure, vel palato, fluxio nes accidunt, earū ad vicina derivatio per nares est. At revulsio in iis quæ supra sunt omnibus, deorsum semper agitur: sursum in iis quæ sunt in frā. Præterea à dextris ad sinistra: sicuti ab his rur-sus ad illa. Similiter ex iis quæ intus habentur, ad ea quæ foris sunt: cōtraque ab his, ad illa. Ergo & frictio contraposita partis, potissimū per ea me-dicamenta quæ calfaciant, præterea vincula ar-ctiora, iis quæ ad contrariū revocant remediis annumeranda sunt. Non secus profectò, & natu-ralium meatuū qui positi ex adverso sunt, reclu-sio. Porro vinculū ipsis profluentibus vasis inje-ctum, fluentē sanguinē sistit: nequeque similiter di-giti apppositi: atque adeo dissidentū vulneris la-brorū ligatio, quam epidesim vocant. Situs autē particula vulnerata sit talis, ut & spectet sur-sum & ipsam indolentem conservet. Si vas un-de sanguis profluit, altius demissum sit, unco at-tollendū est, modicaque intorquendū. Quod si ne-tunc quidē sistatur ipsumque vas vena fuerit, sup-primendus est cataplasmatibus quæ ex frixa resina, & farina triticea tenuissimo polline, & gypso, aliisque id genus confecta sunt. Sin sit arteria, aut vinculo amplexens, aut totū vas præcides, pro-fluvium sistes. Sed vinculum etiam injicere ma-gnis venis compellimur: interdumque transver-sim totas præcidere, ubi recte ex profundissimo loco assurgunt, ac præsertim per angustias quas-dam, vel per principes partes. Tutius tamen est utrumque moliri, et vinculū vasis radicis injicere, & quod deinceps habetur, præcidere. Vasis radicē voco priorē ejus partē, quæ vel jecinori est pro-pior, vel cordi. His peractis implendū carne vul-nus est, priusquam vinculū à vase decidat. Itaque sistendo sanguini longē sunt cōmodiora empla-stica,

Sanguis derivatur vicina, & velli ad straria.

Menses velli sum admodum cucurbitula mammis.

Sanguis ex dextre refluens suppressum admota cucurbitula habet.

Si ex sinistra autem lieni.

Sanguis nares fluente, quæ qualis sit & derivandi modi differunt.

Revellentia ratio.

Frictio.

Vincula.

Epidesim.

Vulnera particulae.

Sanguis profluens ex vasis demissus, quæ modo suppressus.

anguini
primendo
emplasti
sint aptio-
crustificis.

anguini
primendo
mum ca-
lisma.

or omniū
imē tum
m proflu-
m exci-
tum phle-
nas au-

ma thu-

liche.
veris.
dicisq; in
us coga-
nti.

rentia
lō a-
gentia,
sint.

as a
icis a-
gentib;
atas, ha-
ditius

stica, q̄ inducentia crustas: quādoquidem in his est verendū, ne ubi crusta deciderit, rursū sanguinis profusio ab ipso vase exciteretur, cum vas magis nudatū carne, q̄ pro ipsius naturali habitu, derelinquat. Siquidē generatio crustæ, ex subiectis fit, circumpositisq; corporibus semiuultus. Optimū igitur omniū quæ novi medicamento- rum quo etiam ad cerebri membranarū, necnon sphagitidum venenarū hæmorrhagias tutissimè utemur, est quod subijciam. **R̄**, thuris partem j. Aloës partem s. misceatur ita cum ovi candido, ut perveniant ad crassitudinē mellis. Postea verò leporis mollissimis pilis excepta, tum vasi, tum universo ulcere liberaliter admoveatur. Alligādum autē id forinsecus fascia est ex tenui lin- teo: cujus fasciæ primi quatuor quinquēve am- plexus ipsi profluenti vasi injicientur, duceturq; mox versus ejus radicē: nisi in quibus partibus id nō licet, ut in cerebri involucris. His factis, ubi tertio die solveris, id tutò adhuc medicamen- tū ulceri adhæret, aliud rursū superimpones, deli- gabisq; ut antea, similiter. Quod si prius lina- mentū deciderit, impones alterum: ac sic, quoad carne munietur, curandū ipsum vas est: necnon à principio ad finē usq; vulnerata particula, me- diocriter supina servanda. Vitandū autem est ne dolor incidat, ac rursū profluvium excitet, cum nihil sit quod profluvium magis q̄ dolor prori- tet, & phlegmonas augeat. Jam māna thuris ma- gis q̄ thus astringit: est autem minus emplastica. Constat verò in d. corporibus plus aloës im- miscendum esse prædicto medicamento: in mol- libus autē, plus thuris. Cæterū ubi medicamen- tum id facere magis emplasticū optas, deligere thus resinosis oportet, quod quidē & mollius est, & candidius, mansumq; non cōminuitur, sed partes suas sibi cohærentes tuetur, ut mastiche. Maximā autem necessitatem vel crustificis me- dicamētis, vel ignitis ferramētis utendi animad- verti, ubi ex erosione putrescentis alicujus, pro- fluvium sanguinis excitatur: ut in pudēdis & sede: quæ partes & propter naturalem humiditatē, & quod excrementorū canales sint, ex levi occasio- ne putrescūt. Ubi igitur totū quod jam compu- truit sublatū fuerit, tunc in hisce opus est radicē ipsam exurere, idq; aut ferro candenti, aut medi- camētis excitantibus crustam, sed quæ etiā facul- tatem astringendi possideant, qualis in chalciti- de & mysi, et atramēto futorio visitur. Porro quæ ex calce nō extincta cōficiuntur, ea utiq; valētio- ra his sunt: cæterū calx vim astringendi non ha- bet. Excidunt igitur citius quæ ab his fiunt cru- stæ: hærent autē diutius, quæ ab astringentibus: quod utiq; longē est utilius. Quare nec festinare quidē debemus ad amoliendas crustas, ubi hæ- morrhagias periculū adest, nisi in illis tantū affe- ctibus depascentibus, in quibus propter putre- dinē candēs ferrū admoveere corpori fuimus co- acti. Porro qui è vasis profluit sanguis, aut pro- pterea quod amplius non cōfluet, sistetur: aut q̄ occlusa divisio erit, aut etiā ob utranq; causam, id quod tutissimum fuerit. At confluere prohi- betur, & propter deliquiū animi, & cum ad con- traria revellitur, & cum derivatur ad proxima: & per refrigerationē, tum corporis totius, tum præ-

cipue partis affectæ. Hac etiam ratione, frigida tum pota, tum parti foris affusa, sæpe hæmorrha- gias suppressit. Idem etiam molitur, & posca, & vinū acerbum, aliaq; omnia quæ vel astringendi, vel simpliciter refrigerandi vim habent. Claudi- tur ipsa divisio, si vel contrahatur cōniveatq; id quod divisum est, vel obstruatur. Sanè contrahi- tur tum astrictione, tum refrigeratione, tum de- ligatura, tum vinculo exceptū. Obstruitur vel in- trinsecus, vel extrinsecus. Et intrinsecus quidem à cōcreto sanguine: extrinsecus verò, tum ab hoc ipso, tum à linamento, & spongiis, & crustis, & medicamētis iis, quæ lētitia crassitiq; sua, mea- tus obferant: ad hæc, corporibus iis quæ circum- jacēt, propius admotis. Atq; hætenus de proflu- viis sanguinis, quæ à partibus expositis sensui o- riuntur. Nam quæ de profundo sanguinis, pflu- via erumpūt, ea nec vinculo nec deligatura sana- veris: veluti neq; candenti ferro: sed per revulsio- nem, ac ad vicina loca derivationem: necnō per cibum atq; potionem, quæ & emplasticam vim sortiantur refrigerentq;: necnō per medicamen- ta astringentia. Pro differentia autem & proprie- tate partium quæ profluvium patiuntur, variis utimur instrumentis. Siquidem per clysterem, in intestina: per metrenchytas in uterum: in vesi- cam deniq; per catheteras, idoneorum aliquod medicamentorū immittimus. Equidem quater- nis diebus vidi sanguinē è vulva profluere, nec potuisse ullo remedio sisti, quoad quarto die plantaginis succo utentibus nobis, prorsus con- stiterit. Est quippe hoc medicamen- & ad ea quæ ex erosione excitantur profluvia sanguinis uti- lissimum. Cui etiam valentius aliquod hoc casu medicamentū, aliās aliud miscere soleo, utiq; ad totum respiciens affectum, id quod perpetuo est faciendum. Etenim in his ipsis quæ ex vulva, ve- fica, & intestinis profluvia oriuntur, æstimari de- bebent ipsius profusionis quantitas: ut videlicet hanc ipsam, vel ut primā, vel ut secundā indica- tionem curationis habeamus, nec tamen negli- gentes affectum. Nam si perruptum vas aliquod magnū est, & vehementer reclusum hiat, utiq; astringentibus medicamentis est opus, veluti ba- laustio, hypocistide, rhoe, omphacio, acacia, gal- lis immaturis & malicorio. Sin vel exiguum vas est, quod perruptum est, vel modicè reaseratum, sic ut nō multus sit ex eo sanguis profluens, etiā aloë & manna, et pini cortex, et lemnium sigillū, & spinæ Aegyptiæ fructus, & crocū, & lapis hæ- matites, aliaque id genus, ex vino nigro austero, utilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id vini adsit, nec plantago, nec solanū (quippe hæc quoq; sunt idonea) rubi, & cynosbati, & myrti, & lentisci, & hederæ, & coronarū, & mespilo- rum, breviterq;, astringentium omnium deco- ctum ex usu est. At si ex erosione profluvium ali- quod incidit, erit utiq; id exiguum, atque paula- tim effluens. Quare Pasionis, vel Andronis, vel Polyidæ pastillis utendum est: aut etiam nostro qui ex charta constat. Sin profusior hæmorrha- gia sit, iis quæ vehementissimè astringant uten- dum medicamentis, quoad vehemēs ejus frāga- tur impetus. Mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt: postea ad ipsos solos veniendū, cū aliquo ex ante

Refrigeratio
totius corpo-
ris & parti-
cule affectæ,
fluentem san-
guinem sup-
primat.

Sanguinis
profluvium ex
profundo erū-
pentibus qua-
ratione oc-
currendū sit.

Plantaginis
succus reme-
dium opti-
mum est san-
guinis effu-
sionibus.

Astringen-
tia medica-
menta.

Pastilli diSer-
si contra pro-
fluvia san-
guinis, ex ero-
sione aborta.

*Astringenti
um simul &
refrigeratiu
usum, quæ
ad suppressi-
dum sangui-
nem applica-
tur extrinse-
cus, non ubi-
que probat
Galenus.*

*Refrigerantib.
quando cir-
ca partes un-
destit sang-
guis utendū.*

*Cucurbitam
summa cer-
vici affixā,
revellere a
naribus san-
guinem.*

*Sanguinis
fluentis per
nares, & vul-
sis duplex.
Diapedesis
quomodo sit
curanda.*

*Dura omnia
ægrè consoli-
descere.*

*Ferno tempo-
re sanguinē
mittere Gra-
ecis etiā erat
consuetum.*

*Vesica pro-
clystere Gale-
nis utitur.*

*Lēnia terra,
Romam esse
maximè ob-
noxiam flux-
ionibus.
Pulmonis ul-
cera cur dif-
ficiliora sa-
tu sint.*

antè dictis succis aut decoctis. At verò quæ ex-
trinsecus profluenti particulæ admoventur, tum
astringentia, tum citra astrictionem frigida, hæc
ipse non ubiq; probat: sed mihi contrā omnino q̃
fieri tres postulat, ipsum sanguinē intrò compel-
lere, ac venas quæ in alto sunt implere videntur.
Vidimus enim quosdam eorum, qui sanguinē à
pulmone rejicerent, ex thorace refrigerato ma-
nifestè læsos: æquè ut qui sanguinē vomuerunt
nonnullos, quòd venter esset foris refrigeratus.
Eodem modo & eorum quibus ex naribus san-
guis p̃fluxit, aliqui ex capitis refrigeratione de-
terius habuerūt. Quare nec omnino, nec sine di-
scrimine, nec omni tempore loca quæ circa par-
ticulam unde sanguis profluit, sunt sita, refrige-
randa suaserim, sed posteaq̃ in alia diverteris: ut
exempli gratia, in naso, ubi sanguinis missione
usus fueris, vel artuum frictione, devinctiōneq̃;
vel ad præcordia cucurbitis defixis. Quin ne sic
quidem ad frontem caputq̃; refrigerantibus utē-
dum est illicò, sed revellendū prius ad contraria:
utiq; affixa in summa cervice cucurbita. Quippe
duplex est in sanguinis è naribus profusione a-
versio: & quæ est ad totius corporis inferna: &
quæ ad capitis posteriora: propterea videlicet
q̃ ipsæ nares & in superiore & in anteriore parte
sunt sitæ. Jam verò sanguinis effusio diapedesis
dicta refrigerantibus & astringentibus est curā-
da: necnon victu crassiori, ob tenuitatem san-
guinis accidat. Porro quod venæ insedit ulcus, si
ad manum est, eandem curationem cum iis desi-
derat, quæ in carne consistunt. Enim verò quem-
admodum dura omnia ægrè consolidescunt (car-
tilago enim cum cartilagine per coitionem haud
coalescit, sicuti nec os cū osse, sed per callum tā-
tum conjungitur) sic etiam solutæ arteriæ cum
difficultate ob substantiæ duritiem coalescunt,
etsi eas aliquando conglutinari viderimus: idq̃;
in mulierib. atq; pueris, tum circa frontem, tum
circa malleolum carpumq̃; ac medium extremæ
manus. Simile quiddam aliquando & agresti cō-
tigit juveni, dum sanguinem sibi mittendum ver-
no curaret tempore, quod nostratibus est maxi-
mè in usu. Illi siquidem pro vena fuit secta arte-
ria in cubito, quam postea nos ipsi conglutinavi-
mus. Est autem sanatu difficilior arteria incisa q̃
vena, tantoque siccioribus medicamentis eget,
quantò ipsa est suapte natura q̃ illa, siccioris tem-
peramenti. Cætera verò, ejusdē speciei ambæ me-
dicamenta desiderant. Porro ad ea quæ in recto
intestino sunt ulcera, per xesicā, cui sit fistula re-
cta ad finē annexa, injicere liquatū medicamen-
atq; tepidū licet. Cæterū sicca medicamenta ma-
gis sunt idonea, q̃ quæ liquabilia vocantur: quo-
niam facile vel plantaginis, vel alterius ejus ge-
neris succo miscentur. Ejusmodi medicamenta
sunt, & crocum, & pompholyx, & aloë, & quæ di-
cuntur cephalica. In ipso autē primo producen-
dæ carnis tempore, quod suppressionem sangui-
nis continenter excipit, etiam Lemnia terra salu-
tare est præsidium. At quæ pulmōni adhæserunt
ulcera (cujusmodi sæpe in urbe Roma visuntur,
loco profectò maximè obnoxio fluxionibus)
difficiliora curatu existunt, ob assiduam ipsius
visceris agitationē. Quod quidem laxū & spon-

giosum cū sit, minimè etiam mirari convenit,
si sanguis aut pus in thorace contentū, aliquan-
do per membranam illius transmittatur ad arte-
riam asperam: quandoquidem per aliam longè
duriorē in ossiū fracturis effunditur sanguis cras-
sus ad calli generationem. Ubi igitur vel ex casu,
vel prævalida acutaq; voce vas aliquod in pul-
mone rumpitur, citraq; dolorē cōfertim sanguis
fervens, floridus, multusq; cum tussi expuitur, sci-
re licet in viscere vulnus consistere. Itaq; laboran-
ti injungendum est, ut nec respiret vehementer,
ac semper silentiū agat. Præterea vena cubiti in-
terna protinus incidenda, à qua bis terq; postea
sanguis est detrahendus, utiq; avertendi gratia,
tum artus omnes fricandi vinciendiq̃. His per-
actis, primū posca tum diluta, tum tepida, potui
offerenda est, quò si quis in viscere cruor concre-
tus latitet, solutus expuatur. Atq; hoc nihil vetat
bis tēve, ternis horis facere. Ab iis verò etiā ali-
quod eorū quæ tum emplasticā vim habēt, tum
astringunt, medicamentū est exhibendum: idq̃;
aut ex posca diluta primū, aut ex malorū myrto-
rūve decocto. Rursusque vesperi medicamen-
hoc similiter dandum, circunciso (si valentior sit
eger) omni nutrimento. Sin aliter, sorbitionis quod
satis est exhibendū. Maximè verò ad rem perti-
nebit, si etiam postero die (modò æger robustus
sit) parū sanguinis rursus ab incisa jam vena de-
trahas. Victu autē, medicamentisq; eodem mo-
do in quartū usq; diem utatur: pectore interim,
si æstas sit, undiq; melino & rosaceo, madefacto:
sin hyems, nardino unguento. Juerit etiam vel
maximè nō modò ad vulnus pulmōnis, sed ad
alia omnia, illud medicamen emplasticū, q̃ ex
bitumine acetoq; & aliis quæ illi misceri solent,
conflatur. Quòd si mulieri puerove, aut corpori
quod mollis sit carnis, medearis, quod ex chalcitide
sit, satis habile medicamentū fuerit. Cæterū
si rupturæ vasis successerit inflammatio, exigua
spes est cōglutinendi ipsius: quādoquidē inflam-
mationis solutæ pus, expurgari sine tussi nō po-
test, quæ maximè rupturæ adversatur: in longius
tamē tempus produci ipse affectus potest. At se-
pti transversa vulnera quæ foras nō perveniunt,
in carnosus quidē partibus subinde visa sunt coa-
lescere, ejus motu minimè obstante. Quæ in ner-
vosus ejus hærent, insanabilia sunt. Sanè diffi-
lis gravisq; curatio est etiam eorū quæ in carno-
sis sunt partibus, si has jam phlegmone obsede-
rit, idq̃; non in diaphragmate solū, verum etiā in
omnibus quæ intra peritonæū ambiūtur: quòd
in ea scilicet sanies defluat. Danda tamen opera
est, ut illa quacunque ratione siccemus, tum per
ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur, tum
per ea quæ ex aqua, vinove tenui bibuntur. Ho-
rum maximè idonea sunt quæ diaspermaton vo-
cant, & quod ex casia componitur. Immutatur
autem plurimū ipsa curatio ulcerum, per singu-
las animalis partes. Indicat siquidem veluti vi-
tium ipsum, ut curetur, sibi applicandum esse cō-
trarium: sic particula quæq; quod sibi sit q̃ simili-
mum. Quamobrem auriū ulcera, cū eæ par-
tes longè siccissimæ sint, glaucio ex aceto curan-
tur: necnon (si valentior sit opus) medicamine
Andronio, scoriaq; ferri in pollinem tenuissimū
lavigata

*Pulmonis
ulcerati-
onis.
Hæmopti-
s morbi e-
stio.*

*Posca di-
visio grua-*

*Sanguis
expuens
repeten-
dus esse mi-
sanguis*

*Pulmonis
se distru-
si inflam-
matio succo-
rit, cur-
tus nec
consolida-*

*Ulcerum
rationem
mutari
rimum
singulas
malis pa-
Aurium
cera qui
medicam-
tis curem-*

levigata, & cum acerrimo aceto, quousque ad lubrici mellis consistentiam deveniat, coacta. Porro quod tetrapharmacum dicitur, siccare ulcera id genus prorsus non potest: at maturare phlegmonem potest, augereque affectu partis putredinem. Itaque audiendi locus, quoniam siccissimus est, idcirco medicamentis egetque vehementissime siccant. At oculo exulcerato, collyrium fortasse quod ex thure conficitur, expedit: naribus vero, quod multo sanè magis siccet, quam ut conveniat oculis, minus autem quam ut auri quadret. Ulcerum vero quæ in ore accidunt, quæcunque admodum humida existunt, præsertim si proximè adherent ossibus, ea medicamentis egent quæ vehementer siccant: veluti diphryge, tum ipso per se, tum ex melle, & vino, & mulso: præterea & ea quæ iris dicitur, & quæ anthera: hisque vel siccis, vel ex melle, vel mulso, vel vino. Utile vero ad talia est & Musæ medicamentum, præterea rhois succus, & omphacium, aliaque strenuè siccantia. At quæ simpliciora oris ulcera sunt, hæc sanare commodè possunt etiam medicamenta quæ modicè siccant: veluti quod ex moris conficitur, & quod ex rubi fructu, & quod ex succo corticis juglandium viridis, atque etiam his magis, quod ex mulso & cupressi sphaerulis constat. In universum autem, genus quidè medicamenti, ab ipsa curandarum partium substantia & affectu est sumendum: utendi vero modus, à figura & situ. Siquidè quæ in ventriculo, pectore, & pulmone ulcera constiterint, per ea quæ eduntur, bibunturque curanda sunt. Quæ verò in intestinis, bifaria. Nam quæ vicina ventriculo sunt, his per comesta bibitaque succurritur. Quæ verò inferius sunt sita, per ea quæ injiciuntur: quippe neque ad ea quæ vicina ventriculo sunt, subire, potest quod per sedem infunditur: nec integris viribus ad interiora pertingere, quod per os sit ingestum. Quamobrem thoracis atque pulmonis ulcera, tum difficilius iis quæ in ventriculo sunt, sanantur, ut quorum situs longius absit, atque idcirco medicamentorum vis remittatur: tum propter hoc ipsum multo valentiora ea quæ devorentur præsidia requirunt, quam si ipsis statim ulceribus admoventur. Quod igitur pulmonis atque thoracis ulcera expurgentur per tussim, ventriculi autem per vomitum & dejectionem, id ob ipsarum partium contingit formam. Cæterum qui è ventriculo eluere pus volunt, non sine periculo vomitum provocant: sicuti si aliter infixi illi pituita per oxymeli & radicula detergerentur. Tutius itaque est dejectione uti, quam vomiti periculum sit, ne & quod exulceratum est dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Porro si in pulmone ruptum vas sit, scire licet, nisi protinus, antequam excitetur phlegmone, glutinetur, id postea insanabile fore. At ulcera interioris tunicae asperæ arteriæ, & præcipue laryngis, curationem sanè recipiunt per medicamenta humida quidè, sed facultate exiccantia: quæ retinentur ore, paulatimque per fauces defluunt, idque agro jacente supino. Lac etiam, ad talia ulcera unice commendatur, sed præcipue quod Tabiis habetur, quum nimirum illic locus sit satis æditus, & aer circumdatus siccus, & pascuum pecoribus salubre. Licebit autem tibi simile locum etiam arte parare, inferereque in eo agrostim, lotum, polygonum, melissophyl

lum, lentiscum, arbutum, rubum, hederam, cytisum, & alia id genus. Jam verò lac bubulum, crassum natura est: asininum, tenue: caprillum denique, mediâ consistentiâ fortitur. Verum muliebri lac rabidis auxiliatur eximie, quum naturæ humanæ sit admodum familiare. Hoc tamen de lactis usu, sit maximum & commune præceptum, ut iis quibus eo est opus, omnino id astante animali statim mulctum ebibant: etiam melle injecto, si cui cogi in ventriculo solet, necnon sale, si ipsum citius ad alvum descendere cupis. Quod verò ad sanguinis rejectionem ex catharrho ortam pertinet, quum olim accersitus fuisset ad splendidam quandam matronam Romanam, tali affectu prehensam, incidere illi venam non placuit: quandoquidem jam quatri-duum sine cibo egerat propter catarrhum: sed iussit ut acriter uteretur clystere, tum crura manusque calfacienti pharmaco plurimum perfricaret, vinciretque: mox caput raderet: cui deinde medicamentum, quod ex palumbium stercore constat, imposui: interpositisque horis tribus, in balneum duxi, ac laevi, nullo caput contingens pingui. Dein caput idoneo pilo contexi, & pro eo qui tum erat temporis statu, nutrivi sola sorbitione: postquam, statim fructum aliquem autumnalium austerum dedi. Quum autem dormitura esset, theriacem propinavi, circiter quatuor menses antè confecta. Habet enim id ætatis adhuc prævalentem papaveris succum, qui in antiquitatis ignavus redditur: ideoque & somniferum est, & fluxiones tum siccant, tum leviter crassat. Secundo autem die iussi omnes ejus partes fricari, uno capite excepto: ad vespertinam vero porrexi rursus theriacem ceu fabæ nostræ magnitudinè. Erat enim quod pridie acceperat, hoc longe amplius. Postea verò quæ hac quoque nocte perhibere dormiisset, tertio die mane mel coctum copiose exhibui, & in quiete servavi. Proecedente die totum corpus similiter fricui, ac ptisanæ cremorem cum pane exiguo, pro cibo sumere iussi. Mox quarto die mane dedi theriacem consistentem in ætatis vigore, idque cum melle copioso. Capiti verò mulieris eodem pharmaco, quod vehementer tum siccant, tum calfacit, imposito, ac dein ipsa lota, nutritaque modicè, valentius jam pulmonem expurgare sum in quinto conatus. Ac de hinc rursus, rursusque ex intervallo, ad caput quidè consueto cerato, quod thapsia recipit, sum usus. Totam verò corporis curam, in gestatione, frictione, ambulatione, lavandique abstinence, ac victu tum moderato, tum boni succi, ad reficiendum direxi. Qua industria rectè se habet mulier, minimè lactis opem requirens. Alteri verò adolescenti, cui ex refrigerationis spiritus instrumentis orta tussis fuerat, quum sanguinem ipse rejecisset ad dimidiam heminam, statim venam incidi, ac bis eodè die ex ea detraxi sanguinem: deinde rursus postridie bis: sed artuum frictione & vinctura priore die usus, ad vespertinam dedi pharmacum nostrum, quod diaspermation dicitur. Secundo die post alteram detractionem imposui totum pectori ceratum quod ex thapsia conficitur: mox vespertini, ne supra modum calfaceret, id auferes. Tertio die rursus ad treis horas imposito, hominem lavi. Cibavi autem similiter tribus his diebus: prioribus quidem duobus, sorbitiunculis: tertio vero, ptisanæ primum cremore: dein, pisce statim

Lac bubulū.
Asininum.
Caprillum.
Lac muliebre, rabidis esse maximè congruum.
Lac astante animali, statimq; mulctum, bibendum esse.
Lacti quando sal & mel injiciendum.
Sanguinis rejectionis à catharro prodeuntis curatio.

Theriacem quadrimestris facultas

Sanguinem bis eadem & ex eadem & de na detraxit Galenus, reijcens sanguinem ob refrigerata spiritus instrumenta.
Diaspermation medicamentum.
Ceratum ex thapsia.

*Diasperma-
ton medica-
minis usus.*

*Pulmonis ul-
cera contra-
cta ex vitio
succis erosio-
ne esse pror-
sus insana-
bilis.*

*Pulmonis ex
ulcerati cura-
tio.*

*Catapota
descripta à
Galeno.*

*Pulmonis ul-
cera in iis
qui deplorati
non sunt, cu-
rari per de-
tractionem
sanguinis,
purgationē,
& ea quæ ca-
put roborant
Extremis
morbis extre-
ma remedia
adhibenda
esse.
Pudendorū
ulcera qua-
lia medica-
menta postu-
lent.*

*Aloem in-
spersam, esse
salutare me-
dicamentum
sedis & pu-
dendorum
ulceribus.
Medicami-
na ulceribus
sedis & puden-
dorum apta.*

aliquo, qui facilis concoctu esset, adjecto. Dedi-
quoq; medicamentū diaspermatō & secundo &
tertio die similiter circa vespērā: quippe & somnū
cōciliat, & sensum doloris levat, & siccandi vim
habet. Ubi autē & spiritui delegatæ partes in na-
turali essent temperie, & totū corpus vacuatū ac
nulla phlegmones suspicio juxta ruptum vas su-
peresset, tunc expurgare incepimus. Mox propi-
nata theriace vigentis ætatis, illum ad Tabias di-
misi. Ex iis verò qui ulcus in pulmone habent, ij
demū insanabiles mihi esse videntur, qui ex suc-
ci vitiosi erosionē id possident. Oportet autē in
principio nullius rei æquē esse sollicitū, quā ut
neq; tussiant, neq; ex capite aliquid in pulmone
defluat. Cavetur id triplici præsidio: purgatione
primum: secundo, medicamine q̄ diaspermatō
dicitur: tertio, ipsi capiti providendo. Quod pur-
get, diversas facultates habeat oportet: cuius ge-
neris nostræ sunt pilulæ, quæ ex Aloë, Scammo-
nio, Colocynthide, Agarico, Bdellio, & Gummi
Arabico cōficiuntur, ad plures videlicet purgan-
das species excrementorum. Capiti providebitur
cerati usu quod ex thapsia cōstat. Atq; hæc quidē
sunt peragenda in principio. Post verò reficien-
dus est eger salubriter, cibis boni succi, frictione,
inambulatione, & balneo, ac præterea lacte fo-
vendus. Quicumq; parū habere sanguinis vide-
buntur, iis ad quendā succū p̄biorem reductis,
detrudere sanguinē poteris: tum rursus reficere:
eosdē etiā rursus purgare, ac rursus reficere: de-
nuoq; si res suadeat, sanguinē mittere, potissimū
quibus veluti limus quidā vitiosus & crassus, to-
tus est sanguis. Ac qui sanguine abundāt, statim
iis à principio minuendus est. Itaq; per hæc tria, q̄
planē deplorati non sunt, oēs servātur: nepe per
detractationē sanguinis, & purgationē, & ea quæ
caput roborāt. Quare minimē à parvis incipien-
dum auxiliis est, in quib. morbis maximū impen-
det periculū. At in levioribus, licet quidē leviora
experiri remedia. Sciendū autē est interim, fieri nō
posse ut glutinetur ulcus, si phlegmone pulmo-
nem invaserit: omninoq; si invaserit, febricitatu-
rum hominē esse, ac purulenta deinde, quū solve-
tur phlegmone, exputurū tussi. Porro ulcera quæ
citra phlegmonē in pene, sedēve cōsistunt, nullū
cataplasma desiderāt, sed medicamē q̄ cicatricē
inducat: nō tamen eius naturæ, quæ ulcera, quæ
in carne sunt, inducere cicatrice possit: imò quæ
tantò magis valeat ficare, quanto hæ partes car-
ne ficiiores existunt. At talia sanē medicamenta
sunt, q̄ ex charta cōbusta cōstat: anethumq; ustū
atq; dispersū, ac deniq; colocynthis cōbusta. Ve-
rū in ipsorum, quæ in pene sunt, ulcerum, magis
ficari postulat quæ in toto cole hæserunt & quæ
solam glandulam occupāt: minus verò quæ in
præputio sunt: atq; etiam his minus, quæcunq;
in reliqua sunt cute, quæ totum colem vestit. Re-
centibus & sine madore tum sedis, tum puden-
dorū ulceribus, sola aloë redacta in tenuissimū
pollinē, inspersaq; , salutare medicamē existit. Si-
milimā huic vim habet cadmia vino elota, & sic-
ca. Ab hac nō longē abest lithargyros. Deinceps
verò molybdæna sequitur. Ceterum omnib. tum
minus inferēs doloris, tum nullo minus efficax
pōpholyx est. Sin humidiora sint ulcera, ipse per

se pini cortex, itēq; lapis hæmatites, idoneus est.
Quod profunditas quæpiam adsit, ubi exiccata
fuerint, dictorū alicui tantum mannæ admiscen-
dum est, quantū sit ad carnem gignendam satis.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. VI.

Solutio continui, in carne quidem, ulcus: in
osse, fractura: in nervosis fibris, spasma: in
musculis deniq; , ulcus atq; ruptio vocatur. *Solutio u-
tatis spe-*
Singuli verò horū affectuū, quatenus quidā affe-
ctus sunt, sui per contraria sublationem indicāt:
quatenus autem solutiones continui, unionē.
Igitur si cutis tantum acu (exempli gratia) alicui
sit puncta, facileq; in eo sanescant ulcera, etiam si
citra medicamentum, nudoque membro, ipsum
ad consueta dimittas opera, nihil sentiet mali:
sin verò ægrē in illo sanentur, primum quidem
dolebit, post etiam tum pulsu particula infestabi-
tur, tū phlegmone. Quare minimē imponemus
medicamen q̄ glutinet, sed molle, & blandū, &
quod dolorē mitiget. Siquidē ubi magna divisio
est, ibi studium impendi debet, ut magis siccāti-
bus remediis labra ulceris & uniantur, & coale-
scāt: ubi autē acu stylove facta divisio fuerit, id dū
taxat curādum est, ne phlegmone tentetur parti-
cula. Porro ubi aliq̄s nervus est punctus, cutim i-
psam apertā servare oportet: aut (q̄ tutius est) la-
ti⁹ incidere, ut p̄ eā ex nervo vulnerato effluat sa-
nies: dein verò admovenda quæ simul dolorem
mitigent, & exitum saniei patefaciat. Si virtus
vegeta sit, sanguinis missio est expediens, purga-
tioq; universi corporis, si vitiosis succis redudet.
Aqua verò calida, quanquā reliquas phlegmonas
valde mitigat, vulneratis tamē nervis inimicissi-
ma est, quum præsertim eorū substantia ex refri-
gerata cōcretaq; humidior materia sit condita.
Omnis quippe ejusmodi constitutio, per ea quæ
simul calfaciunt humectantq; , resolvit, atq; pu-
trefcit. Quare præstat oleo tenuium partium, &
veteri, & calido, nervos punctos fovere. Hoc si-
quidē, si frigidum applicetur, tenues meatus ob-
struit: sin calidum, digerit. Etenim medicamenta
quæ nervi puncturæ auxiliantur, debent esse fa-
cultate tenuia, modiceq; calfaciētia, & quæ sicca
re citra dolorē possint: quādoq; dem sola hæc tra-
here ex p̄fundo saniem, nec demorsa, nec contra-
cta particula, valent. Ego itaq; sum usus primum
resina terebinthina, tū per se, in iis qui molli erāt
carne: tum cum euphorbio, in iis qui dura. Non
secus etiā & propuli, nō per se modò, verum etiā
cū euphorbio ipsam emolliens: quod si durior es-
set, cum aliquo tenui oleo. Quin & sagapeno, &
popanaceq; , sum in duris corporibus usus, utiq;
cū oleo & terebinthina id miscēs. Sed emplastrū
ex lachryma Cyrenaica nō inutile ad id fore mi-
hi vider. Nec secus sulphur vivum, ac minimē la-
pidosum, tenui oleo p̄mistū, donec sordū crassi-
tudinē cōtrahat. Calx etiā lota, oleoq; cōmixta, si
militer auxiliat, præcipueq; si in æstu caniculæ bis
terve aqua marina abluat. Ego verò ad nervos
punctos hoc uti consuevi emplastro: Ceræ partē
unā: resinæ terebinthinæ, aut (loco ejus) humidæ
pinæ, aut colophonix, aut abietinæ, unius par-
tis dimidiū: picis tātundē. Si itaq; humidā resinā
miscebis

tatis spe-

*Puncturæ
curatio.*

*Puncton-
so vulna
dilatand
Puncti
curatio.*

*Aquam
dam esse
neratis
vis inimi-
simam.*

*Nervos p
tos oleo
do fovea
esse.*

*Puncti
qualia m
camenta
sulent.*

*Terebinth
nam auxi
ri punctio*

*Punctis
in empla
strum op
mum.*

misceris, tumsum cribratūq; euphorbium reliqs
immittens liquatis. Esto verò pōdus ej⁹, pars cerę
duodecima. Sin sicca, sicuti q̄ colophonia dicit^r,
utiq; oleū pusillum desiderabit euphorbiū. Itaq;
vulnerati nervi curatio medicamenta postulat,
q̄ & tepidum calorem excitent, & valēter siccēt:
tū quæ ex substantiæ suæ natura & attrahēdi vim
habeāt, & tenuiū sint partiū. At si nerv⁹ nō pun-
ctus, sed p̄ directum sit cēsus, nudūsq; divisa cute
ostendar^r, vim euphorbij nō feret, ita ut quū in-
terposita cutis est, ferre potest. Quare tūc optimē
calce elota, & in plurimo oleo soluta utēre. Salu-
tare etiā est medicamē, q̄ ex pōpholyge medica-
mentū fit, si in largo sit rosaceo liquatū. Quod utiq;
melius fuerit, si tū rosaceū ipsū, tum oleū,
salis sit expers. Porro quæ ex metallis cōstant me-
dicamēta, ea elota omnia esse debēt, si citra mor-
sum sint siccatura. Salubre verò medicamētū est,
q̄ ex melle soluto in oleo insulso cōstat. Cera prę-
terea, terebinthinaq; si his misceantur, elui prius
debēt. Quippe medicamētis omnib. quæ laveris,
acris mordenq; sanies eluitur, abstergiturq;. Si
verò robustus sit q̄ vulnus accepit, & cui corpus
sit a supervacuis humorib. mundū, in hoc fas est
valentioribus remediis nōnullis uti: cujusmodi
sunt linamēta imbuta pastillis Polyidæ, sapa solu-
tis, & super aqua calida tepēfactis. Nā eorū quæ
vulneratū nervū contingūt, nihil esse frigidū de-
bet: quādoquidem ea pars maximē sensilis est, &
principū partiū primati cōtinua, et tēperamento
suo frigida. Quorū omniū occasione facilē a fri-
gido offenditur, & suam offensam impertit cere-
bro. Quod si ex iis fuerit qui perveniūt ad muscu-
los (sunt. n. hi instrumēta voluntariæ motionis)
etiā convulsionē facilē accersit. Idē fore & in ten-
donibus expectabis, iisdē de causis. Sanē oleo p-
fundere tale ulcus non cōvenit: nam oleum viri-
bus illius pastilli est adversum, ulcusq; sordidum
reddit. Nec enim parū interest, nudōne nervo, an
per interpositā cutem admoveas. Abluenda igi-
tur a vulnere est sanies per lanam mollē specillo
circūvolutā, ac in principio quidē sapa mada-
factam, expressamq;: postea verò etiā vino dulci,
sed omni mordēte qualitate carente. Nam quæ-
cunq; dulcia pariter & fulva sunt, ut Falernum,
ad id inutilia existunt. Quippe acris sunt omnia
talialia, & supra modum calida. Ulcere verò jam ad
cicatricem veniente, quæ alba planē sunt, & te-
nuia, nec multam aquā tolerant, nec odora sunt,
ea dulcibus præstant. Aquæ verò usum ad ner-
vū vulneratū perpetuò fugies, sicuti & catapla-
sma relaxās. Ad jam dicti pastilli usum proximē
illud medicamentū accedit, quod diachalciteos
vocant. Liquari autem id debet, æstate rosaceo,
hyeme Sabino oleo. Quod si Polyidæ pastillus
nō suppetat, Andronis vel Pasionis, loco ejus su-
mendus est: vel noster, qui etiam omnibus eis est
valentior. Ubi verò nervus alicui transversim est
vulneratus, detrahēre largius sanguinem expe-
dit: ac tenui magis, quā in illis, uti victus ratio-
ne: tum in quiete omnino ac lectulo molli ho-
minem continere: tum oleo calēti ubertim in ax-
illis, collo, tendonibus, ligamētis, & capite uti.
Quod si vulneratus nervus ex iis sit qui in crure
habētur, sicuti quū in manu est, alæ, ita in his bu-

bones largo oleo imbuendi: tū per totā spinā ad
collum & caput ascendendū. At confusi nervi, u-
bi cum eis est simul & ipsa cutis cōtusa, cataplas-
mate ex oxymelite et fabacea farina curatur. Qui
verò absq; cutis simili affectu, confusi sunt, iis o-
leum calens, atq; tenuiū partium, auxilio est. At si
dolor unā cum cōtusione cutis & nervi infestet,
etiā picē liquidā immiscere illi cataplasmati, ac
benē coquere, tum calens medicamentū impone-
re oportet. Ubi verò magis siccans efficere vo-
les, erui farinā injicies. Quod si ut amplius quo-
que siccet desideras, irim immittes Illyricā. At si
totus præcisus nervus sit, metus præterea nullus
instat, debilis tamē remanebit particula. Curatio
verò ejus cōmunis est cum ea, quæ aliorū est ulce-
rum. Ligamenta aut, quū similimā habeāt speciē
tendonibus, valentissimorū remediōrū vim to-
lerant: q̄ neq; ad cerebrum pertingant, & sensus
sint expertia. Nā nervi omnes, alii ex ipso statim
cerebro habent ortū, alii spinali interveniēte me-
dulla. Tendones quoq;, quoniā ex nervo & liga-
mēto cōstant, quatenus nervi participes sunt, ea
tenus ex cerebro oriuntur, minus tamē q̄ ipsi ner-
vi cōvulsionē accersunt. Ligamenta verò, quū ex
osse ortū habeāt, quæcunq; rotunda sunt, ea ner-
vis sunt cōsimilia: duritie tamen plurimum diffi-
dent. Verū in eo quod alba sunt, & exanguia et
cavitate carentia, & in fibras dividūtur, similitu-
do illis cum nervis & tendonib. cōstat. Ligamen-
tū igitur vulneratū, si id est quod ab osse ad os p-
meat, & maximē sine periculo est, & si id sicces
libet medicamētis, nihil hominē offenderis. Sin id q̄ se in musculum intērit, quātō est nervo
& tendone minus opportunū periculo, tantō u-
tiq;, nisi rectē curetur, reliquis ligamentis magis
terrere debet. Sed jā operæ precium est, ut de ab-
dominis vulnere aliquid etiā dicamus. In abdo-
mine extrinsecus cutis omnibus antestat: quæ in
membranam finitur. Post cutem, medio circiter
loco, nervea tenuitas musculorum gemina tendi-
tur, membranarum ritu. Post has deinceps habē-
tur duo muscoli recti, et carnosī, qui a pectore ad
ipsā pubis ossa perveniunt. Atq; hæc quidem om-
nia sibi mutuò cohærent, abdomenq; cōstituūt.
Quod verò deinceps hoc excipit, peritonæū vo-
catur, estq; ex corporibus duobus exanguibus
& nervosis conflātū. Verū alterū eorum ner-
vosa tenuitas eorum musculorū est, qui per trās-
versum se agunt: alterum, membrana prætenuis,
veluti aranea, quæ utiq; verē est peritonæum. Ac
tale quidem in medio sui est abdomen. Partes ve-
rò ejus, quæ utrinq; ad latus ad quatuor quasi di-
gitos recedunt, hæc statim a cute obliquos muscu-
los habent: priores quidem, qui a pectore demit-
tuntur: secundos, qui ab ilibus ascendunt: dein
post hos, transversum utrinq; musculū, sub quo
est peritonæū. Ergo & minus periculi in hoc lo-
co convulnerato est, quā in medio: quum te-
nuem aponevrosim nullam habeat, & futura in
medio difficulter administretur: quum nimirum
& hac parte maximē procidant intestina, & ægrē
inibi cōtineri queant. Si igitur majus sit abdomi-
nis vulnus, tum plura necesse est intestina excide-
re, tum difficilior denuò immitti: quanquam &
parva vulnera tractatu etiam sunt difficilia. Nā

Contusi ner-
vi curatio.

Ligamenta
sunt sensus
expertia, ne-
que consen-
tiunt cerebro
Nervi oriun-
tur a cerebro
Tendones cō-
stant ex liga-
mento & ner-
vo.

Ligamenta
oriuntur ab
ossibus.

Ligamenta
a noxia peri-
culo cum sul-
nerantur
qua sint.

Abdominis
descriptio.

Peritonæum.

Abdominis
partem ante-
riorem cum
vulneratur,
agius cura-
ritur quæ con-
sistunt ad la-
tera.

*Abdomine
vulnerato,
cur mediocre
foramen sit
salutarius
angusto.
Intestinis ex
cidentibus
per abdomi-
nis vulnus
quid agen-
dum.*

nisi q̄ procidit, illicò in suum reponatur locū in-
flatur, surgitq; in tumorē: quo fit, ut per angustū
foramē immitti nequeat. Quare minus grave p̄
huiusmodi vulnera, mediocre foramē est. Prin-
cipiò itaq; id agendū est, ut intestina quæ excide-
runt, in suum recōdantur locū. Secūdo, ut ulcus
suatur. Tertiò, ut medicamē imponas. Quartò,
ut ne qua prætatiō pars simul afficiatur, prospi-
cias. Si ergo adeò parvū sit vulnus, ut inflatū in-
testinum ex frigore ambientis aëris remitti ne-
queat, discutiemus flatum spongia molli, & ex
calente aqua madenti, mōxq; expressa, intestinū
ipsum calfacientes. Præparetur verò interea vi-
num austerū calidum: quippe id magis calfacit q̄
aqua, roburq; intestino addit. Quod si huic quo
que præsidio, intestini inflatio nō cesserit, incidē-
dum pæritonēi tantulum syringotomis est, quā-
tūm ei q̄ excidit, reponēdo sit satis. Scalpelli ve-
rò quib. acies utrinq; habetur, aut quibus cuspis
acuta est, sunt omnino fugiendi. Situs aut laborā-
ti sit talis, ut quæ vulnerata pars est, sublimiorē
semper locum obtineat. Cavendumq; magnope-
rē est, ne id quod exciderit, degravetur quicquā
ab intestinis aliis. Qui igitur intestina per mag-
num vulnus prolapsa, reponere in propriā vult
sedem, is ubi totum vulnus manibus suis extrin-
secus apprehenderit, debet intrò reprimere, tum
cōstringere, ac exiguum semper suenti prænuda-
re: quin etiā id ipsum quod assutum est, modicē
cōprimere, quoad totum persuatur. Quoniā igit-
tur coire coalescereq; oportet cū peritonæo ab-
domen, incipiendum quidē à cute est, atq; ab ex-
terno introrsus acus injicienda. Ubi verò tum cu-
tim, tum rectum musculum totum trāsierit, præ-
terito quod ei subest peritonæo, per reliquum pe-
ritonæum eā ab interno extrorsus injiciens, atq;
inde per reliquū abdomen ab interno extrā trās-
mittens. Ubi hoc penitus penetraverit, rursus ab
externo introrsus idē abdomen est perforādum.
Mox ubi peritonæum quod illi quoq; subhæret
præterieris, atq; ad contrarium veneris, hoc quo
que ab interno extrorsus est perpungendum, u-
naq; cum eo totum ipsi conjunctum abdomen.
Deinde ab hoc incipiendum rursus, atq; id cum
contrario peritonæo consuendum: ac rursus vi-
cina quoq; cute transmissa, iterum ab ea parte a-
cus introrsus est trajicienda, cōsuendumq; abdo-
men id cum peritonæo contrario, etiam inibi vi-
cina cute transmissa. Atq; hæc iterū iterūq; faciē-
da, quoad totum vulnus similiter consuerimus.
Quod verò ad intervallū punctionū, earundēq;
altitudinem pertinet, mediocritas eligēda est. Fi-
lum etiam, inter durum & molle medium quod
dam obtineat. At verò medicamenta, quibus in
his utemur, ejusdē materię sint, cū vulnera gluti-
nantibus. Sunt qui aliter vulneratū abdomen cō-
suant, ad hunc modum: Oportet à vicino nobis
abdomine incipere, atq; ab externo introrsus p̄
id tantūm acum transmittere. Post, præteritis u-
triusq; peritonæi labris, ex adversa parte ab exter-
no introrsus per utrūq; ejus labrum acum revo-
care: dein rursus hæc revocare, atq; ab interno ex-
trorsum per adversum abdomē trajicere. Atq; i-
ta totū peritonæū sibi mutuò coalescēs, prorsus
intra abdomē absconditur. Deligatio verò ext- in-

*Abdomen
vulneratum
consuendi
ratio.*

*Abdomen
vulneratum
consuendi se-
cundus mo-
dus.*

secus, vel præcipuè in his necessaria est. At hæc q̄
inter bubones & axillas est, id totū molli lana ex
oleo medioeriter calido imbuta circūdare opor-
tet. Satius itē fuerit, & si per clysterē intestinis a-
liud simile infundas. Quod si qd ipso intestino
rū sit vulneratū, q̄ extrinsecus fieri debēt, omnia
similiter ut diximus, sunt peragēda. Ceterū q̄
injicitur, vinū nigrū austerū, & tepēs erit. Ac cras-
sa qdē intestina, sanatu facilia sunt: ē cōtrario dif-
ficilia, q̄ tenuia existūt. Jejunū aut est omnino in-
curabile, tum ppter magnitudinē multitudinēq;
vasorū, tū q̄ tunica ejus nervosa, prætenusq; sit.
Adde q̄ tum bilē synceram hoc intestinū recipit
universam, tum q̄ omnium maximē est vicinū jeci-
nori. Vētriculi aut q̄ carnosę partes infernæ sunt,
curare cū fiducia tētabis: q̄ verò in ore ejus sunt,
eē sensus acumē quo minus sanentur, obest: atq;
hoc etiam q̄ medicamenta illic diu hæere non
possint. At verò omentū si per vulnus exciderit
(præstat enim hæc pars animali usum nō usque-
adeo magnum: cōstatq; ex membrana tenui, ar-
teriis atq; venis cōtexta) si qd ex eo nigricās sit,
excipiemus id vinculo, ac sic, q̄ post vinculum
est, amputabimus: atq; ut in imo sine jā prædictę
futuræ abdominis, pendeāt ipsius vinculi extre-
ma, curabimus, quò nimirum ea, quum ex vulne-
re suppurate evomentur, faciliē recipiamus. Sed
jā ad fracturę curationē veniendum est: cujus q̄-
dem scop⁹ unio existit. Ceterū coalescere ne-
queunt ossa juvenum, adolescentum, cōsistentiū
ætate, necnō senum, ob eorum maximā siccitatē
duritiemq;: tametsi interveniente alia quapiam
substantia crassiuscula (quæ ex proprio eodemq;
crasso ipso ossium alimento redundat) con-
crescenteq; in labris fracturæ, possint ceu quodā
glutino separata ossis partes connecti invicem,
atq; conglutinari. At verò quæ abundē sunt mol-
lia, qualia in puerulis conspiciuntur, ea sola uni-
tionem recipiunt. Ergo si os aliquod per trāsver-
sum frangatur, sic dissident à se ejus partes, ut ē
directo nō jaceant: quare primò curandum est,
ut in directum & contrarium agantur, juxta inte-
græ exemplum: à qua nimirum certissima trās-
positionis fractorum ossium indicatio sumenda
est. Quæcunq; igitur retrorsum (exempli gratia)
magis sunt acta, ea prorsum magis impelli cōve-
niet: nec minus alteram quoque fracti ossis par-
tem modicē ad contraria retrudi. Contrā, quæ
prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidem re-
trorsum, reliquā verò partem sensim duci prorsum:
nec secus de cæteris differentiis. Cavendū
tamen est interim, ne in adducendis cōtrario mo-
tu partibus, extantia fractorum ossium frangan-
tur. Quibus sanē confractis, non poterunt ad a-
mussim inter se coaptari fracti ossis fines. Ob id
quæ dissidentia ossa, ē directo admota esse opor-
tet: q̄ cōmodē fieri nequit, nisi retracta sint, idq;
aut manibus, aut vinculis, aut instrumentis. Po-
stea verò quā abundē revulsa fuerint, nec ullus
superfit metus, ne se in adducendo tangant, tum
in directū opponere, vinculaq; remittere, ac mu-
sculis ipsis diductorum in idem commissionem
permittere expedit: interim verò te ipsum quoq;
manib. subservire: & sic ubi aliquid paululū sub-
sulet, corrigere atq; formare. Ab iis secundum,
quò

*Intestino ali-
quo & nō
so quid age-
dum.*

*Intestina
crassa esse
natu facili-
difficilia a-
tem quæ te-
nua existi-
Jejuni inte-
ni & vulnus
cur incur-
bile.*

*Omento e-
dente per
nus, quid
dum.*

*Fractura
pus unio
Ossa ut co-
sunt ineq-
qua sint.
Callum gl-
nandis oss-
bus nasce-
alimento-
rundem.*

*Ossa puelle
sola posse
unum co-
scere.
Fractura
ratio.*

quò diriges, fuerit, ut immotum prorsus membrum consistat, ne quid eorum quæ efflexeris, moveatur. Ne verò per motiones ipsas disiungatur ossa commissæ, tuta deligatura cõplecti fracturam oportet. Quam sanè deligaturam nec adeò debemus arctare, ut eam cõprimat: nec remittere ita, ut sit laxa. Ac pectori quidem latissima fascia cõgruit: artubus autè & jugulo, angusta; sed quæ tantum ex versuum numero securitatis adjiciat, quantum ex angustia deficit. Ad hæc deligaturæ principium debet super ipsam fracturam injici, ac circumduci bis terve: hinc verò ad membrum reliquum dispensari. Siquidè quæ sic deligat, & ab integris ad laborantem partem sanguinis confluxum arcet, & quod jam collectum in ea est, exprimit: prohibetque circa fracturam excitari tum phlegmonem, tum sphacelum, quæ ossium caries & corruptela existit. Cæterum quum duæ partes sint, quæ & recipere aliquid à laborante particula, & transmittere ad ea possint: utique quæ superjacent, tum propter multitudinem, tum magnitudinè, ad ambo magis sunt habiles. Extremæ verò, propter causas cõtrarias, exiguum quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt: at multum nec ægris subministrare, nec ab ipsis recipere. Sed nec sola deligatura fasciarum est satis ad commissorum ossium tutelam, nisi etià & splenia una cum fasciis exteriorib. adhibeantur, quæ hæc quoque ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, cerato est humido utendum. Jam verò repositionis figura eligenda est, quæ à dolore maximè sit immunis, quò nec phlegmonè particula cõtrahat, & æger persistere in una ea diutissimè immotus possit. At talis sanè est quæ maximè naturalis membro, ut brachio quidem, angulosa: cruri verò, quæ paulò minus porrecta est. Verum ad dolorem vitandum, non modò naturalis habitus cuiusvis instrumento est utilis, sed etiam consuetudo quoque cõducere non nihil videtur. In universum autem tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere, una ea figura, quæ doloris minimum habeat, est studendum. Solvere autè deligaturam tertio die debes, ne in membro præter solitum cooperto, dolor aut pruritus creetur: nec ejus, quod jam fracturæ est infixum, pspiratione phibeatur. Cujus occasione non modò noxius pruritus quibusdam accidit, sed etià cutim ob acrimoniam saniei erosam exulcerari. Infundendum igitur tantum temperatæ aquæ est, quantum ad evocandum ejusmodi saniem sit satis. Quod si rursus quoque simili modo facies, utique septimo id à primo die facere debebis. Apparuerint verò jam omnia phlegmone libera, & quæ pro naturali habitu magis aliquando gracilia. Tunc igitur licebit & ferulas circumponere, & solvere ex majore intervallo. Nā antea quum phlegmones periculum esset, non erat tutum ferulis premere. Quod si ex longiori intervallo eas solvas, callus multò feliciter cõrescet. At ubi adeò exicata sunt ossa, ut callus produci nequeat, tertio vel quarto die modicè aquam calidam infundemus, donec carnes in rubrum tumorem attollantur: desistemusque priusquam subsidere incipiant. Ubi verò aliquid digerere volumus, non prius est desistendum, quàm quod ex perfusione intumuit, subdat. In quibus autè, quo minus callus in fractura

pveniat, humiditas abundantior obstat, ibi hanc siccare cõvenienti deligatura, & perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit, vel plurima, conabimur. Minima quippe, humores qui in superficie sunt per spiritum digerit: & qui in alto hæret, modicè liquat. Plurima verò, digerit plusquam attrahit. Cõstat autè, in ea quidem deligatura quæ exprimet, minus esse arctandos fasciarum fines: in ea verò quæ ad renutriendum est comparata, nec minus hos esse arctandos, & universos circumductus laxiores faciendos. Quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibus optimi succi, & qui multum nutriat: ex quibus pvenire succus consuevit, non solum bonus, sed etià tenax, qualis desideratur ad calli generationem. Magnitudo autè calli ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo existat, nec musculos tamè cõprimat. Quare danda opera est, ut si minor justo pveniat, augeatur: vel inhibeat, si immodicè crescat. Sunt verò quibus hæc efficies, ipsius perfusionis quantitas, qualitasque, præterea, ciborum quantitas, & medicaminum quæ illi imponuntur extrinsecus, facultates. Etenim quæcunque emplastica substantia habent, ac modicè calfaciunt, ea callos tum promovent, tum vero augent. Quæ verò digerendi vim obtinent, ea magnos jam callos diminuunt. Cõservant in proprio statu, medicamenta quæ cruentis adhibentur vulneribus. Atque hæc de transversis fracturis. Longæ autè, similiter sunt curandæ, cæterum cõprimendæ magis in ipso fracturæ loco: tum quod recessit, retrudendum introrsum est. Quæ verò multifariâ cõfracta sunt, iis splenia circumdantur fasciæ ritu incurva, ut monet Hippocrates. Medicamenta etià omnia exsiccantiū sint numero, atque ex iis quæ enæma vocant. Capitis autè fracturæ simplices, quæ ad secundam usque laminam calvariæ pveniunt, scalpellis angustis indigent. Expedit autè hos, ut numero multos, sic esse magnitudine impares. Atque ubi os vitiatum nudatum fuerit, primo quidem utendum latiore est: secundo loco, eo qui sit illo angustior: mox ita deinceps reliquis, usque ad angustissimum omnium: quo sanè est in ipsa secunda lamina, quæ diploën appellat, utendum. Post hæc tum protinus, tum ad finem usque siccis est medicamentis medendum, quæ ob id cephalica vocitantur. Ea cõponuntur ex iri illyrica, & erui farina, & mæna, & aristolochia, & panacis radicis cortice, & in summa, omnibus quæ ex tergere citra morsum possunt. Ipsa namque generatio carnis, naturæ opus est. Itaque ægro ad eam rem nihil est opus arte medica. Ut autem quæ pvenit caro coalescat, circumhære atque omni ossis parti, id inde maximè eveniet, si nec sordes super eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur est, quod ægris medici ad carnis productionem præstant, ut totus locus siccus sit, tum quælibet ossis vitiatæ pars planè pura. Ex fracturis verò quæ ad cerebri usque membranas pervenerunt, si simplex tantum fractura sit, angustis scalpellis utendum. Sin cum confusione aliqua, quod confusum est, excidi debet: idque vel terebellis prius in circuitu foratum, ac mox scalpulis admotis, vel protinus ab initio cycliscis. At quæ per terebellam quidem ratio fungitur, parum tuta est: propterea quòd dum audacius eam tractant, duram

Callo gignetur
do qualis
ctus ratio
conveniat.

Callos promovere
emplastica
medicamenta,
quæ modicè cal-
faciunt.
Callos minui-
entia.

Callos in statu
proprio
servantia.
Longas fra-
cturas curari
di ratio.

Capitis fra-
cturarum cu-
ratio.

Cephalica
medicamen-
ta.

Carnis pro-
ductio, natu-
ra opus est.

Fracti simul
& confusi ca-
pitis ossis cu-
ratio.

Terebella uti-
sa in fractu-
ris capitis,
cum parum
tutum, Gale-
nii damnat.

GALENI PERGAMENI
de medendi methodo, Lib. VII.

Cyclifcorum
usum in ma-
gnis fractu-
ris capitis
quando pro-
bet Galenus.

Lenticula-
ria scalpra.

Calvaria fo-
randa ratio.

Ostagra usus

Dimidium
facti qui be-
ne cepit ha-
bet.

Fracturas
cranij admo-
dum expor-
rectas & lon-
gas non esse
persequendas
ad finem usq.

Craniio fora-
to, valentissi-
mis & siccis-
simis medica-
mentis gau-
det dura me-
brana cere-
bri.

membranam, quæ ossi substernitur, non raro vio-
lant. Quod verò per cyclifcos opus administra-
tur, ne id quidem omnino vitio caret, quum qua-
tiat immodicè caput, quod poti⁹ quietem postu-
lat. Cæterum si magnæ sint fracturæ, & ossa quæ
fracta sunt vehementer mota, mihi cyclifcorū
usus perplacet. Quippe paucis excisionibus fa-
cies lenticularis excisionis locum. Sin firma pluri-
mum ossa sint, foranda sunt terebella. Terebellis
autem ipsis, ut emergi non possint, parum supra
cuspidem, nonnulli supercilium extans efficiunt.
Expedi itaq; id genus complures præparatas ha-
bere ad omnem calvariæ crassitiem. Commodissi-
mè tamen cyclifcis uteris: & primo quidè aggres-
su latioribus, postea magis angustis, donec ad
crassam membranā perveneris. Verum quod ex-
cidi oportet, id totum cyclifcis nudadum nō est,
sed ex ea maximè parte, qua fractura est gravissi-
ma. Nam præter alia, etiā membrana ipsa ab os-
sibus quæ sunt vehementer afflicta, recedit celer-
rimè. Si verò unam semel partem nudaveris, atq;
scalprum in cuspidē, habēs præfixam obtusamq;
& lævem lenticulæ speciem, acie verò per longi-
tudinem erectam, submiseris, ubi latam partem
lenticulæ statueris sup membranam, feries mal-
leolo, ac sic calvariā quam tutissimè divides. Ne-
que enim qui minus cum periculo, nec qui cele-
rius perficiatur, forandi modum alium invenias.
Jam verò instrumento, quod ostagram vocant.
nonnulla ossium vehemèter cōminutorum vel
exaltantes, vel cōvertentes, per eam potissimum
partem lenticulato scalpro præparabimus aditū.
Quod quidè ubi demissum fuerit, dicere possis
illud proverbium celebre: Dimidium facti qui
bene cœpit habet. Igitur quod vehementer cō-
fractum est, id totum est auferendum. Si verò ab
eo fragmenta quædā longius excurrant, hæc per-
sequi ad finem non expedit: ut illud persuasum
habentes, minimè futurum ex eo noxa sequat-
ulla, modò reliqua ritè sint nobis peracta. Atque
indicatio agendorum hic quoq; ex natura ipsa-
rum partium affectarum subministratur. Necessu-
m itaq; in capite nobis (quatenus dictum est)
primò fracturæ aliquid denudare, quò videlicet
detergere & abluere à membrana saniem possi-
mus. Post verò, quum phlegmonis tempus præ-
terit, omniaq; ad unguem sunt sicca, carnē pro-
ducere, ac cicatrice locum includere. Porro quū
un⁹ atq; alter homo occurrisset mihi, habens sin-
cipitis atq; temporis os confractum, equidem su-
perius, hoc est sincipitis, os exemi: à tēporali au-
tem abstinui, cui callum inducendū curavi. Nec
infeliciter cessit nobis negocium. Quod verò ad
medicamenta post foratum os infundenda perti-
net, quandoquidem auditorius meatus (qui nō
solum usq; ad cerebri duram membranam pene-
trat, sed etiam nervum cōtingit, qui in ipsum de-
scendit à cerebro) vehementissima medicamē-
ta tolerat: nihil miri sit, si crassa membrana cere-
bri, antequam notabiliter occupetur phlegmo-
ne, valentissimis post forationes etiam medica-
mentis gaudeat, ceu naturaliter siccam sub-
stantiam possidens.

Medendi Methodum, Eugeniane charis-
sime, quā olim in Hieronis gratiā scri-
bendam susceperam, posteaquā illū
functum vita intellexi, ipsi quoq; persequi destiti-
mus. Tu nāq; mihi cōsci⁹ es, neq; hoc me opus,
neq; aliud ullum, popularis auræ studio fuisse ag-
gressum: sed quò vel amicis gratificarer, vel mei-
psum simul utilissima ratione ad rem propositā
exercitarē, simul ad oblivionē senii (ut Plato in-
quit) cōmentarios mihi reponerē. Quippe mul-
titudinis laus, cōmodū ad usus nōnullos instru-
mentum viventibus aliquādo est: mortuis certè
nihil prodest, sicuti neq; viventium quibusdā. Nā
qui vivere in tranquillo optarunt, & fructum ex
philosophia ceperunt, suntq; iis quæ corpori cu-
rando sufficiunt contenti, eis utiq; impedimento
non parvo est apud vulgum fama, ut quæ ipsos à
rebus pulcherrimis plus iusto transverfos aufe-
rat. Ego verò (haud scio qua ratione) ab ipsa usq;
adolescētia mirificè sive inspiratus, sive furore
percit⁹, & vulgi famā cōtempsi, & veritatis sciē-
tiæq; studio flagravi, nullā esse hominib; neq; ho-
nestiorem, nec diviniorem possessionem ratus:
ob idq; nulli meorum librorum meū nomen præ-
scripsi. Quandoquidem igitur in præcedentibus
cōmentariis, quemadmodū similariū instrumen-
taliumq; partium cōmunem morbū, nempe so-
lutionē cōtinui, curari cōveniat, scripsi: deinceps
quod reliquū est, in tui & aliorum amicorum id
flagitantiū gratiā adjiciā, revertarq; ad eum mor-
bum, qui omnium est primus, nempe qui in simi-
laribus nascitur, quibus scilicet primū animan-
tis functiones referuntur acceptæ. Est enim hoc
morbi genus cognitu maximè necessarium: nec
ratione curari potest, primis elementis corporis
ignoratis. Ergo quoniā unaquæq; animalis par-
ticula propriam actionem ædit, quæ tantum ab
aliarum actionibus differt, quātum ipsa particu-
la ab aliis, quæ illas ædunt, diversa est, tempera-
menti ratione: sanè qui tueri partium actionem
vult, hic temperiem earū custodiat oportet. Cu-
stodiet autem, si id quod ad calidius conversum
est refrigerabit: quod ad frigidius inclinatū, exal-
faciet: ac de cæteris intēperantiis, tam simplicib⁹
quàm compositis, eadē ratione. Quū enim octo
earum sint differentiæ, octo nimirū erunt & me-
dendi rationes, quibus particula, per contraria
eorum quæ exuperant, ad naturalem symmetriā
reducitur. Erit itaque curationis una meta com-
munis, quò diriguntur consilia medentis, ipsius
similaris corporis alteratio: quandoquidem etiā
morbus, ex naturalis temperamenti alteratione
est ortus. Medicatio autem particularis, ex mate-
riæ copia, & hujus congruente usu cōficitur. Sed
horum jam proponamus exemplum, auspiciati à
ventriculo. Ac facillimæ quidem curatu ejus al-
terationes sunt, quæ ex calido & frigido oriūtur,
propterea quod maximè affectivis qualitatibus
corriguntur. Egrius verò curantur, quæ in hu-
mido siccoq; habentur, quod qualitatibus imbe-
cillis, curatio earū perficiatur. Ac tempus quidè
caloris, frigorisq; reparandi, par quodammodo
est: se-

Laudem p-
pularem m-
tuis nihil p-
desse, sicut
nec & sen-
quibusdā

Galenus in
stantia.

Galenus
li librorum
suorum p-
primum non
prescriptis

Similariū
partibus
mum an-
tis functi-
nes refer-
tur acceptæ

Intemper-
tarum &
differenti-
otto, totia
medendi
tiones.

Medicati-
particula
ex mater-
copia &
ius conve-
ente usu cō-
ficitur.

Ventriculi
alteration-
quæ ex cal-
& frigido
untur, q-
caratu fa-
cillima.

est: securitas tamē impar. Nisi. n. cuncte q̄ ei q̄ curat circūdatae sunt particulae, validae planē sint, verendū est, ne ab iis q̄ refrigerēt, noxā contrahāt nō levē. In reliquis duab⁹ qualitātib. est securitas similis. Tēpus tamē curationis in sicca intēperie multo amplius est. Quippe q̄ senium in sanis, id in agris sicca intēperies existit. Itaq; etiā insanabilis est, si prius sit cōsummata: nēpe ubi solida partiu similariū substantia reddita fuerit sicciior. Nam est & altera siccitas, utiq; quā ea, quorū substantia ex humore cōcreto constat, sicuti caro & adeps, sunt liquata. Etia tertia, quum ppria humiditas, unde partes nutriūtur, & quae in illis habet, veluti ros quidā sparsus, omnino est absumpta. Diverfa ab iis siccitas est, quae in ppriis cujusq; particulae exilib. arteriis atq; venis cōsistit. Provenit autē & haec ex penuria sanguinis, Omnib. igit his siccitatibus maximē cōtrarius est austerorū usus: pppe quae si qd in iis superest naturalis humoris, id absumūt; partim ebibētia, partim in sinū vētris per exiguos meatus exprimētia, partim ad cōtinētes partes trudentia. Curabis ergo ipsas, si meatus q̄ cōtracti sint, dilataveris, ac q̄ in vicinas particulās est impulsū, revellas: prāterea singulas similariū partium propria humiditate, humectantis nutrimenti ope, repleas. Cui negotio lac asininum ex ipso animali suctum, vel maximē ex usu est. Quod si asinam sugere aeger ipse gravetur, expedit ut quamminimo tempore lac in ambiente aēre moretur, pppterea quod celerrimē mutari est aptum, genitalis feminis ritu, quod nec ipsum ali-quandiu extra propria vasa morari patitur. Optimum aut, utpote cognatum, existit muliebre lac: quod quidē sugendū iis suadet Prodicus, qui tabe absumuntur. Sed quoniā id exhiberi sibi cēu pueris pleriq; recusant, utiq; cēu asinis, asininum ipsis dari conveniet. Id siquidem reliquis omnibus ad propositum affectum utilius est, quum & tenuissimū sit, coaguleturq; minimē, & quoquo-versus ocysimē digeratur in corpus. Est itaq; lac ipsum iis tum per se dandū, tum pauxillū ei tepidi mellis miscendū. Caterum quod mel flavo est colore, odore suavi, tum purū adeo, ut totū pel-luceat, ac gustanti parum acre jucundissimūq;: prāterea tam sibi hārens, ut si attollatur digito, cōtinuum sibi, nec intercisum, ad humū defluat, id omnium optimū iudicatur. Si verò abrum-pitur, nec demissum ad terram usq; continuitatem tuet, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut diffi-milium partium. Debet autē nullam penitus al-terius cuiuspiam rei eminentem in se continere qualitātē optimum mel. Quare quod thymum planē redolet, minimē probo. Ad eundem mo-dum & lac nullam externā qualitatem odore gu-stūve prae se ferat: sed esto quamdulcissimū, & si-bi ipsi continuū, & put lacti cōvenit, splendens, super omnia, quoad ejus fieri poterit, similes par-tes habeto. Quod verò tale lac fiat, & idoneis nu-trimētis alendū animal est, & exercitationib. me-diocribus exercendum, & pullus, si quem lactat, auferendus. Quod autem aetatis quoq; florentis esse vel maximē debeat, id neminē latet. Curan-dum quoq; ut quamoptimē concoquat: cōtem-ptis videlicet iis, qui si asinis quoq; prāscribemus victus rationē, ridebūt. Fingamus igitur aegrum

aliquem tū lotum esse, tum lac hausisse: hunc ad secundam usq; lavationē quiescere pmitteremus, tum modicē fricabimus, & pinguit, utiq; si lac quod sumpsit, jam ad unguem confecit: id quod tum ex ructu, tum ventriculi mole, nobis licebit cōjicere. Modicum verò temporis inter primam & secundā lavationē intervallū erit, si quatuor aut quinque; æquinoxialiū horarum intervallum inter sit, scilicet si tertio adhuc lavare paras: sin aliter, pluriū. Sanē tertio lavabis, si multis lavatio-nibus fuit assuetus. Quinetiā post quāq; lavatio-nem hominē ungemus oleo priusq; se vestiāt: ne videlicet plus digeratur æquo, sed obstruātur exi-gua cutis spiramenta. Quippe conducit ad renu-tricationē id quoq; sicuti & frictio. Jam verò si-ve cuilibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, sive frices, sive laves, sive aliter quomodocūq; calfacias, primum quidem attol-litur, mox efficitur gracilis: ideoq; ubi carne im-plere quodlibet corpus studemus, id eatenus cal-faciendum nobis est, dum intumescat: ubi verò primū intumuerit, tūc super sedendum est. At si digerere & evacuare contendimus, eatenus con-tinuandū est, dum quod prius intumuit subsidat. Si aeger igitur delectetur lacte, post secundā quo-que lavationē id exhibebis. Sin aliter ptisanā dili-genter coctā, aut alicam ptisanā ritū prāparatā. Hinc ubi rursus quieverit, ad tertiā reducendus est levationem, aut illico ad cōenam. Sit aut prae-paratus illi panis purus, probē coctus in furno, quiq; tum fermenti, tum salis, quod satis est, ha-buerit. Opsonium quoq; sit ex saxatilibus pisci-bus, aut ex albo jure asellus: necnon alae testesq; gallinacei, qui lacte sit altus. Quorū si copia non est, aliis utendum. Ad eundem modum & perdi-cibus, & mōtanis aviculis, quae mollem carnem sortiuntur, vescendum. Vitanda autē & quae palu-stria sunt, & quae carne sunt dura. In summa verò, alimētum sit coctu facile & nutriens, minimeq; glutinosum aut excrementitiū. Porro omniū ci-borū, quos novimus, maximē nutriēs suilla caro est, verum nō æquē ac prādicta, cōcoctu facilis: prāterea glutinosum succum crassūq; generat. Quare hac uti ad propositū affectum nō conve-nit. At vino ut utantur omnes, quibus refici cor-pus est opus, cōsulo, modò nō febricitēt. Esto ta-mē id & aquosum & astringēs leviter. Aquosum natura appello vinum, quod tenue est, & purū, minimaq; aquae mitionē ferens. Cavendum aut à vinoso est, q̄ feriat vires imbecilliores. Rursus novellū vinū tum aquosius, tū imbecillius quo-dāmodo est q̄ ut vino cōveniat. Adde etiā q̄ a gri-us cōcoquitur, ac magis excrementosum est. An-tiquius verò, ut vinosius est, ita vehementius exi-stit, q̄ ut ppositis sit ex usu. Porro aquae vitia pen-dens ex eius frigiditate omnia: cujus culpa & mo-ratur in p̄cordiis diutissimē, & fluctuationes ex-citat, & in flatū vertitur, & corrūpitur, adeoq; vē-triculi robur resolvit, ut deterius proinde conco-quat. Sed nec digerendo per corpus alimēto ma-gnoperē videt aqua cōducere. Quib. sanē aquae vitii, quale nuper diximus vinū cōtrarias virtu-tes obtinet. Portionis itaq; is erit modus, ut neque in vētriculo innatet, nec fluctuationis ulli⁹ sensū invehat: ciborū verò, ut vel nō gravet, vel grava-

Vntione en
oleo obflare;
quò minus
digerantur
ac resolvantur
succo.
Carni augen-
da minuen-
daq; qualis
frictio persua-
sio de deside-
retur.

Testes galli-
naces.

Suilla caro
est maximē
nutrimenti;
agrē tamen
concoquitur.
Vino utan-
tur omnes
quibus refici
corpus expe-
dit, dummo-
do non febrici-
tent.

Vinum aquo-
sum.

Vinum vino-
sum.

Vinum no-
vellum.

Vinum anti-
quius.

Aqua vitia
proveniunt
ex eius frigi-
ditate.

Aqua distri-
buendū ali-
mento per
corpus non
videtur usq;
adeo condu-
cere.

re q̄citissimè desinant. Ab hoc tensio inflatioque præcordiorū vitandæ iis sunt. Ergo si ob affectū ventriculi totū corpus macrescat, exquisitior victus ratio desideratur, ppter cōcoctionis imbecillitatē. Ubi verò æger sanior est redditus, ad refectoriā est trāsferendus. Id fiet, si pluribus & frictationibus, & gestationibus, q̄ antea, utemur: ac ciborū tū qualitātē, tum quantitātē mutabimus, ita ut plures & valentiores q̄ prius exhibeantur. Quū verò ad sanitatis statū, p̄p̄modū ventū jam sit, cibandus volatilibus est: illiq; jam offerre carnes suillas licet: primum quidē, porcelli pedes in ptisana elixos, dein pernam: ab hac etiā reliquas partes. Quē porcellū: si hyems sit, pridie fuisse jugulatū oportet: nam hesternus, q̄ recēs necatus, facilius cōcoquitur. At æstate sat fuerit, si porcellus manē immolatus fuerit, ac juxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentū valentius ad vesp̄rā exhibendū est. Quū igitur qui macilētissimi sunt, plurimo nutrimentō indigeāt, nequeant autē vel q̄ mediocre est concoquere: paulatim eos, sed sēpius cibare erit melius. Atq; hac sanē de causa ipse eos ter cibare sum solitus. Verū quādo jam manifestē meliores sunt facti, etiā bis nutritivisse sit satis. Quare tantā exhiberi primā cibationē est rationabile, quanta prius quā secunda sumatur, tota p̄sus erit cōcocta: idq; valētiori cōtingere alimēto nō potest. Idcirco primo loco

Cibi cur cras leve sumendū eis est, secundū aut crassius: quandoquidē & quies, & somnus, & lōgius tēpus, huius naturalē administrationē excipit. Jā verò bibendū illicō post cōnā nō est, anteq̄ cibus fuerit cōcoctus. Siquidē innatāt cibi si bibāt, ita ut eos vētriculi corpus, ppter humorē interpositū, nō cōtingat. Cæterum si magna siti torqueantur, tātillū est, p̄pinandū, q̄ & molestiam soletur, & sitim levet. Ubi verò nutrimentum cōcoxerint, abundē bibere sunt sinendi. Manē autem post somnum, quum dejecerint, & paulū inambulaverint, modicē sunt fricādi, videlicet donec corpus incaleat: mox gestationibus utēdum. Deinde tū lavādi sunt, tum fricandi, idq; intra vel circa meridiem. Quum igitur cōvalescentium victus ratio media quēdam sit inter eam quæ sanorū propria est, & quæ ægrorum: difficile minimē fuerit, ex iis quæ de utraq; sunt prodita, ut per se ipsum quis mediā inveniat. Domus in qua cōvalescens nutritur, sit temperata: laborādumq; ut ad eos cibos reducat quiscq;, quibus insuevit: naturarū interim proprietate observata, necnon regionis & temporis. Sciendum aut est, universum corporis habitum exiccari à vigiliis: ac proinde eas infestissimas esse iis qui ex siccitate laborāt. Quod verò ad nutriendi modum spectat, si corpus modicē siccū sit, uberius nutrire id licet: propterea quod vires ejus, quæ utiq; alimentū conficiunt, penitus nō conciderunt. Si verò immodicē, parcius, contraria ratione. Porro intemperies sicca, ubi solida corpora cōtingerunt, si quidem in una quapiam parte consistent, veluti nunc in ventriculo propositum est, nunquam integrē sanabuntur: neque in eum statum qui ante morbum fuit, revertentur: sed in reliquam vitam particula affecta laborabit imbecillitate. Quod si intemperies sicca etiā solidas cordis partes occupet, celeriter

sic affecti in arescunt: quem marasmū, Philippus vocat ex morbo seniū. Is itaq; brevi mortem cōciliat. Proximē huic, qui à jecinore inceptus est. Mox qui à ventriculo. Qui ab aliis partib. ortum habet, tantō tardius, quantō quælibet harum ignobilior quā ille existit. Ceterum victus ratio eadē genere est, cum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humiditatē absumit, quæ nutrit solidas partes. Præterea etiam in tertia, quam supra memoravimus, siccitate. Facillima verò omnīū sanatu quarta est, in qua venæ succo suo sunt inanitæ. Imō hic affectus ut frigiditas potius corporis, quā ut siccitas, est curandus: ac proinde eius sanatio est celerrima. Scire autem licet, solidorum corporū siccitatibus, si perdurent, succedere necessariō frigiditatem. Celerrimē nanq; ex nutrimenti defectu refrigerantur partes, propterea quod ex calido sanguinis succo nutriūtur. Si igitur siccitati partiū juncta frigiditas sit, duplex erit medendi ratio, humectās scilicet, & modicē calfaciens. Nam quæ calfaciunt impensē, ijs vehementer siccandi vis inest. Quare calfacientis materiæ humectantibus medicamentis tantum miscendum est, quantum particula ad frigus ratione siccitatis inclinat. Proponamus ergo (exempli gratia) ventriculum tum siccum, tum modicē refrigeratum alicui esse: huic certē simul cū lacte uberius mel exhibebimus. Vinū verò, quod minus aquosum quā prius sit, & pluriū annorū, dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora offeremus: idq; tum naturali temperie, tum ignis opera, sic cōparata. Nardino præterea unguento ungendus assiduē est venter, sic ut nunquā siccus remaneat. Eius si copia non adsit, utere mastichino, aut opobalsamo, & p se, & misto dictis unguentis. Quod si cupis ut magis ea corpori adhæreant, ceræ non nihil est admiscendum. Si aer ambiens sit frigidus, lanam opobalsamo aut unguento nardino imbutā, in quibus liquata prius Chia mastiche fuerit, admovebis vētriculo. Præstiterit autem imbuiere optimā purpuram, qualis est Tyria: quando & astringi ipsum modicē, & cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidem quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerunt succus, tum particulas frigidis extrinsecus advenientibus obnoxias reddunt. Quæ vero valenter astringunt, ea siccant. Quo fit, ut medicamentum quod ejusmodi corpora calfacit, id neq; evocantem vim habere expediat, neque astrictoriam multā sibi immistam. Memineris etiā, qualitatem acerbam, sua quidē ipsius virtute, & refrigerare & siccare: quare etiā prohibenda est in hujusmodi affectibus. At si cum sicca intemperie multa frigiditas adsit, in nardino unguento similiter. Chiam mastichē quam pinguis simam solves, ac purpura excipiens, utēris. Commodissimē etiam adjeceris opobalsamum. Dandum præterea uberius cum lacte mel est, sed super prunas ex quercu vitæ, despumatū curiose, quo & minus sit excrementosum, & magis nutriat. Quinetiam mel ipsum despumatū per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, ut adversissimum calido. Vinum autem eligendū semper antiquū est, eoq; antiquius, quo major fuerit frigiditas. Sed nec adeo esse debet vetus

*Refectoria.
Victus ratio,
quomodo ad-
ministratur.*

*Hesternum
quā recens
necatum por-
cellum, faci-
lius concoqui
Vesp̄ri exhi-
bendum est
alimentum
valentius.
Macilentissi-
mi sunt cibā-
di parçē, sed
crebrō.*

*Cibi cur cras
leves in co-
nadandi.
Bibendum il-
licō à cōnā
quibus non
sit.*

*Cōvalescen-
tium victus
ratio, media
est inter eam
quæ sanis, &
eā quæ ægris
debetur.*

*Consuetis ci-
bis utendum*

*Vigilia qui-
bus sint ad-
versissima.*

*Senium
morbo.*

*Siccitas
cicis quæ*

*Siccitas
porum si
rum si p
ret. succo
necessar
gditate*

*Vētricu-
co, mod-
refrigera-
qua mea-
ratio de-
tur.*

*Vētricu-
siccō &
diori rem-
to, quæ
ctones c
Geniant*

*Purpura
Tyria.*

*Acerbā-
litatem
gerare &
care.*

*Mel cum
de confec-
Sētricu-
siccō, imp-
scō, refri-
rato.*

*Vinum a-
quius &
culo refri-
rato long-
ere.*

tus, ut jam amaricet. Siquidē vina amara, immodicē siccāt. Sanē optimū medicamentū talib. omnibus sit, quo picatores quōtidie utuntur. Ergo re eo totum ventrē, sicuti & alias oēs particulas, quæ alimentorū usū nō pmoventur, cōveniet, ac postavelli, priusq̃ refrigeretur. Quod quidē si bis uno die feceris, abundē fuerit. Naturalē vetriculi calorē tuetur & fovet ad motus puellus qui boni habitus sit, et minimē cute humecta. Sunt qui catellos pingues in hūc habeāt usum: q̃ etiā ex usu sunt ijs, qui propter siccitatē solā habēt imbecillum ventriculū. Nocēt autē intēperantiis ejusmodi, fomēta calida: quæ quidē sicca sunt, eō q̃ rorē similariū depascūt corporū: q̃ verō humida, q̃ hūc digerūt, potissimum ubi largius his utimur: præterea q̃ nimis rarū, frigoriq̃; opportunū corpus efficiāt. At si multē siccitati sit calor nō admodum multus adjunctus abstinendū à melle est, vinūq̃; minimē antiquū bibendū. Jam cibos offeremus repētēs: sed si ēstas sit, qualitate referentes aquā fontanā. Ventriculū autem ungemus oleo tum crudo, tum melino. Ac multō sanē magis, si pluscula caliditas sit, ipsum vinū tum aquosius exhibebimus, tum sub eo frigore, quod fontis aqua per medium ver exhibet: illud nobis persuadentes, ejusmodi affectū febris proportionē correspondere. Nam quod illa in toto animali, vel in corde est, id propositus nunc affectus est in ventriculo. Cæterum ubi validē in ambabus qualitatibus immutata quævis particula est, omnis eius actio perit, atq̃; labefactatur: nec faciliē quod sic est affectū, ad suam naturam reverti potest. Ubi verō altera tantum qualitas plusculum immutata est (veluti nunc siccitatem finximus) reliquarum autē aliqua se habet mediocriter: utiq̃; qui ita est affectus, sanari potest. Si ventriculus intemperie affligatur calida, cui mediocris humiditas juncta sit, faciliē affectus is frigida potione curatur: quum minimē ex ea lædantur partes vicinæ, utpote se habētes mediocriter. Nam in siccis vetriculi affectibus, necesse est nō ea modō quæ proxima sunt, sed etiā totum corpus gracilius reddi: ac proinde tunc potus frigida majori cum periculo administratur. Sicubi verō adeo vehemens caloris intemperies ventriculū occupet, ut usq̃; ad cor ipsum pveniat, febricitare hominē est necesse. At intemperies humida utcunq̃; accidat, facillimē omnium curatur. Cujus quidem, si sola cōsistat, remedia sunt cibi citra valentem calefactionem, refrigerationēve siccantes: præterea consuetē potionis parcitas. Eius autem quæ cum caliditate juncta est astringentium tum ciborum, tum potionum minimē calfacientium usus, nec nō potus frigida, quemadmodum illius quæ frigori est juncta, optima præsidia sunt acris omnia: quibus admisceri debent quæ acrimia sint, minimē tamen evidenter refrigerantia: præterea potio exigua, &aq̃; vini insigniter calidi, veterisq̃. In universum autem, calida intemperies ventriculi refrigeranda est, frigida calfacienda, humida siccanda, sicca madefacienda. Ad eundem modum quæ ex duabus qualitatibus intemperantiæ constant, reliquis contrariis sunt retundendæ. Pessima autem omnium est intemperies, inter simplices quidem, sicca: inter compositas verō, sicca si-

mul & frigida. Atq̃; hætenus de ventriculi intemperantiis, citra humoris affluxum. Ubi verō aliquis humor aut in ipso sinu vetriculi delitescēs, aut imbibitus in illius tunicis, aut intemperantiæ extiterit, expurgandus ille est. Quod si ab aliis partibus trāsmittatur (id quod ex toto corporis habitu, ac tum singularum partium exploratione, tum ex vacuationibus solitis retentisq̃; necnon cōsuetā victus ratione cognoscēs) primō illis est succurrendū: dein verō roborandus ventriculus, quō eorū quæ ad sese confluunt, minus promptē quicq̃ admittat. Verum si quidē ex minus momentaneis facta translatio sit, quod superfluum est, rursus ad ea revelles. Sin ex ijs quæ majoris momenti sunt, ambobus simul consules, eū semper affectū submovēs, qui fluxionē excitet. Fiet id, si omnes corporis partes ad bonam reduxeris habitudinē: omnesq̃; expulsionēs naturæ, fluxiles semper reddideris. Quod si ob æqualiū in toto corpore redundantiā humorū, ventricul⁹ fluxiones tentetur, totū corpus est evacuandū. Si propter mali succi abundantiam, ea purganda est: atq̃; hinc ad ventriculum cōvertenda curatio. Quæ igitur in sinu eius cōtinentur, cōmodē expurgantur per vomitum. Verum si quod plures dies pravus humor decubuerit in ipsum, vēter aliqd sibi vitii cōtraxerit, haud intēpestivē, qui sic laborat, absinthii potione utetur. Per cōtraria autē corrigi inducta intemperies debet. Si vitiosus succus in ventriculi tunicis sit receptus, curari is affect⁹ debet phar-
 macis quæ modicē purgent. Cæterū quæ ex aloë componuntur, omnium sunt longē aptissima: nec secus ipsa sola aloë. Quæ quidē si illota sit, valentius vacuat: elota autē, purgat quidem minus, sed roborat ventriculum magis. Expedit ergo paratam habere hierā, tum ex aloë illota, tum ex elota confectā. Admiscetur autē hujus drachmis cētēnis, cinnamomi, xylobalsami, asari, spicæ nardi, croci, & Chiæ mastiches, singulorū sex drachmę. Præstantissimū hoc medicamen est cōtra vitiosos succos, qui in tunicis ventriculi habentur: utiliusq̃; fuerit eo sicco ex aqua uti duūm parvorū cochleariū mensura, ubi mediocriter illo uti studeamus. Siquidem maximus eius modus, est magnorum duūm cochlearium potio, in aquæ temperatæ cyathis tribus: ut minimus, unius parvi. Utendum verō hoc tempore et ptisanę cremore est, qui prim⁹ à balneo sumet⁹. Nam medicamē ipsum solito purgantium medicamentorū tempore dabitur. Post id verō, ubi modicē inambulaverit, de reliqua victus ratione nihil est immutandum. Sunt q̃ reponunt medicamentum, excipientes id despumato melle: & sit quidē sic durabili⁹, cæterum nō proinde ad propositos hoc loco affectus utile, quum & minus ventriculum roborat, & magis alvum subducit. Verum quib. lenta pituita est infixā ventriculo, ijs prius sunt exhibenda, quæcūq̃; eā dissecant: post deinde purgandū. Quod si ad vomendū sint apti, nō inutile fuerit per radiculā ex oxymelite vomere. Sin verō nec lentus humor sit, nec crassus, utiq̃; abundē fuerit à ptisanā solius cremore vomuisse: item à mulsa. Quo casu sumendum utriusvis plus est, q̃ vel nutrimentū, vel etiā dejectionis causā sumeretur. Idoneū verō est, etsi mulsa, in q̃ coctū absynthiū sit, bibatur.

Ventriculi
 intemperan-
 tias quibus
 copulatus est
 humor, quæ
 ratione curā
 ri cōveniat.

Absinthii po-
 tio quibus sit
 congruens
 præsidium.

Aloë pur-
 gare humo-
 res in tunicis
 Ventriculi
 imbibitos.
 Aloë elota
 facultas.
 Hierapicra
 duplex.
 Hierapicra
 composita.
 Hierasicca
 usū ex aqua
 unice Gale-
 nus commen-
 dat, contra
 vitiosos suc-
 cos Ventri-
 culi.

Hierā cum
 melle confe-
 cta minus vē-
 triculum ro-
 borat, sed ma-
 gis alvum
 subducit.
 Attenuan-
 dos esse prius
 crassos suc-
 cos, quam
 evacuandos.
 Vomitus quē
 bus ē per
 quæ pro vo-
 canda.

Affectus non in maxima urgenti, di igitur semper curantis consilium debet.

Affectus magnitudo est triplex.

Ventriculi gravissimè laborantis ob defluxum humoris à capite descendens, curatio.

Affectum nullum perfecte sanari posse, manente adhuc ipsa, unde ortus est, causa.

Indicatio remedium à natura partis laborantis desumpta, est multiplex.

Recessibus à naturali temperie exiguis, exigua mutatione esse opus ut corrigantur: maximis vero, maxima. Cognato natura sua morbo laborantes minus periclitari.

bibatur. At verò si plures affectus in unum coeant, ad eum qui magis urget, dirigi primum curatis consilium debet. Ubi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa causa spectanda. Sin autem curari hoc ante illud non licet, ad id quod ordo dicitur, est respiciendum. Atque in eo quidem curationis consilio, quod ab urgente initur, affectus magnitudo ppendenda est: quæ sanè triplex existit. Alia namque ex læsæ actionis præstatio spectatur, alia ex propria affectus essentia. Tertia præter has, ex facultate quæ læsum corpus gubernat. In eo vero consilio quod ex causæ ratione initur, animadvertendum est, quidnam eorum quæ inter se sunt conjuncta, augere aut gignere reliqua possit: quæ rursus vel gignatur, vel incrementum ab alio accipiat: at in eo quod ordo præscribit, quid ante quod, vel quid cum quo, vel quid post quod, sanari possit. Fingamus igitur in ventriculū defluere ex cerebro superfluū quendam humorē frigidū: atque eius occasione intemperiem quandā in ventriculo contractā jam esse: vel potius malū jam succū per totū eius corpus media omnia similariū particularū spacia occupasse: ab eoque, si placet, etiā mordicationis sensum, ac proinde tum deliquiū animi, tum sudores, cum syncopes quadā dissolutione excitari. Manifestū utique est, in primis esse occurrendū ei, quod vires resolvit. Ubi autem vires firmatæ erūt, nec plurimū vitiosi succi in ventriculo aderit: tūc nimirum ad fluxionis causam nos convertemur: illud pro cōperto habentes, non posse ad perfectionem ullū affectū sanari, manente adhuc ipsa, unde natus est, causa. Ergo si sic persanamus cerebrū, ut sensibile amplius redundantia non creet, veluti fontē fluxionis in ventriculū evertemus. Cæterū si neque copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec eorum quæ in capacitatem ipsius continentur, nec eorum quæ in tunicis, sed nec mordicatio quæ officiat viribus, tum omnium primum sanandū ipsum cerebrū est. Ab hoc, sinus ipse ventriculi vacuandus, extergendusque est: postea expurgandæ tunicæ. Postremo intemperiei medendū. Ac reliquarū etiā partium intemperantia, similiter ijs quas in ventriculo posuimus, sanabuntur, adhibentibus semper nobis remediū affectui cōtrariū, illique remedium indicationē, quæ à laborantis membri natura sumitur, adjicientibus. Ea autem indicatio est multiplex. Una quidē ac prima indicatio à laborantis loci temperie sumitur, quæ mensurā introducendæ qualitatis præscribit. Secunda ex ea sumitur, quæ actio eius omnibus animalis partibus sit cōmunis, aut quæ cōmunē virtutē subministret. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta, ab ipsius positura: cujus portio est ad vicinas partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentiendi vel acrimonia, vel hebetudo. Porro quæcūque calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc & liberalius, & diutius calferi postulant. Si verò calido morbo ægrotet, exigua brevissime temporis refrigerationē desiderat. Siquidem parvus hic est in id quod præter naturā lapsus: quare & in id quod secundum naturā, reditus. Eatenus namque redeat ad naturā suā unumquodque est necesse, quatenus à natura recessit: ac veluti quadā via retrò feratur, quæ in diversum agat ei, quæ facta in ipso est, transmutationi. Minus itaque periclitantur, quicūque cognato naturæ suo morbo laborant. Quemadmodū au-

tem reducendā esse ad mediocritatē diximus calidam & frigidā intemperiem, sic reducuntur & cæteræ, sive ex simplices sint, sive cōjugatæ. Porro in ijs temperaturis quæ sunt ex humoribus ortæ, si particula sibi soli inserviat, audacter evacues licet, prout affectus suadebit, sed tamē etiā virtuti attentus. Sin necessariū opus eius sit omnibus animalis partibus, veluti ventriculi & jecinoris, non levis habenda sollicitudo de robore virtutis est, ne hæc, magna semel vacuatione usus, dissolvas. Est autem commune opus & venarū, & arteriarum, & cordis, & thoracis, & renū, & utriusque vesicæ. Cerebri verò opus, quum sani sumus, ad voluntarias actiones est necessarium, ijs scilicet instrumentis, quibus ejusmodi actiones obimus. Quum ægri sumus, necessariū non est, nisi ijs tantum, quæ ad respiratū sunt deputata. Reliquorum verò organorum actio certè non est: ministerium tamē est ad vitam necessarium, veluti pulmonis, & asperæ arteriæ, & gutturis. Ergo ex ejusmodi particulis quamprimum vacuare redundantiam licet, prout volueris. Ex ventriculo verò & jecinore utcūque vacuare non licet, sed cum cautione, ut ne quid virtuti officias. Habenda præterea est & dignitatis actionū ratio. Maxima autem est cordis officii dignitas, ægrotantibusque omnium maximè necessaria. Cerebri verò ad vitam par est momentum: non tamen par robur eius in ægrotis requirimus, quum necesse omnibus non sit nervorum ac musculorum opera uti. At jecinoris opus omnibus particulis per necessarium est: non tamē adeo saltem perpetuam necessitatem habet, sicuti ipsius cordis. Ad portionem autem jecinoris, etiā ventriculi opus se habet. Itaque ex partium functionibus facile intelliges, quatenus cujusque robur custodiri expediat. Ad eundem modum, & quæcūque partes aliis sunt facultatū authores, harum quoque robur servare decet, pro facultatis earum usus portione. Etenim cerebrum nervis ac musculis, cor arteriis, jecur venis facultatem suppeditat. A figura verò, indicatio ipsius modi vacuandi excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ventriculus vomitu, dejectioneque inanitur. Intestina dejectione tantum: sicuti & jecinoris cava. Renes verò, & vesicæ, & jecinoris gibba, si multo vitioso succo redundant, per dejectiones & pharmaca dejectoria expurgantur: sin mediocri, per urinarios meatus. Cerebrum, per palatum, & aures, & nares. Pectus & pulmones, per asperam arteriā, & fauces. A situ indicatio dabitur, tum ad solidarum intemperies, tum ad succorum vitium, non levis. Nam qui per summa corporis intemperie laborant, ijs medicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in summo corpore intemperies est, in ijs rationē intervalli inibimus. Si enim medicamentis ijs utere, quæ intemperies postulat, utique multo imbecilliora, quam pro usu tuo, ad affectum locum pervenient. Jam ad vacuationes quoque situs non nihil indicat, dum societate laborantis particulæ cum aliis docet. Non spernenda verò indicatio est, & ea quam sensus partium acuitas, hebetudoque suppeditant. Quandoquidē omne medicamen contemnunt, quæ tardi sunt sensus, etiam si non leviter mordeat. At quæ acuti sunt sensus, earum vires dolore solvunt.

Partes etiam quæ audacter quando videantur debeant.

Partium etiam quæ sunt in corpore, quædam sunt utiles.

Cerebrum, Cor, Hepar, Vacuationis modus quoque modo à figura partis sumitur.

Situs partium affectus quoque indicatio exhibeat.

Sensus partium affectus quoque præbent indicationem.

solvuntur. Expedi igitur his, nec cōfertim, nec semel, valentibus auxiliis mederi tentes, sed tuto potius in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est, licet, semel usus remedio quod sit idoneum.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, Lib. VIII.

QUOD igitur ex calido, frigido, humido, & sicco, similariū particularum natura cōstet: quodq; ipsa simplices atq; primę particulae secundū tales tēperaturas inter se dissident, alibi a nobis est traditū: quemadmodum etiā duo esse morborū genera, quę simplicibus ipsis particulis accidunt: alterū, q̄ cōpositis est etiā cōmune, & dicitur unitatis solutio: alterū peculiare ipsarū, q̄ in calidi, frigidi, humidi, & sicci tēperie cōsistit. Quarū sanē intēperantiarū, quatuor diximus esse simplices, quatuor verō cōpositas. Simples quidē, quę secundū unā qualitātē a naturę ordine aberrat: cōpositas verō, in quib. secundū oppositionē utranq; ipsa natura variatur. Febris aut, unus morborū est, quos intemperies gignit: utiq; quū adeo immodicē est auctus calor, ut & offendat hominē, & eius functiones lædat. Porro primariū differentiarū febriū, una illa est, in qua causa adhuc adest febriū creas: aut febri excitata, jam desijt. Altera verō, qua agrē solubiles, a solutu facilibus febribus distinguuntur: illas hecticas, has Græci schiticas vocāt. At verō prima indicatio, omnis febris, veluti a morbo est, ablationem eius pręscribēs. Secunda aut, veluti a tali est morbo, quę certā quandā sublationē indicat: nepe intēperie febrilem, quū sit caloris excessus, p̄ occursum refrigerantiū tollendā esse. Omnis quippe excessus p̄ contrariū excessum sanatur. Ergo si febris ipsa sit genita, causa aut quę eā excitavit, jam desijt, huc tantū sanādā eius dirigetur cōsiliū, ut refrigeretur. Si verō in generatione adhuc febris est, causa quę accedit illā, est submovēda. Sin pars eius jam genita est, pars etiamnum gignitur, cōsulendū utriq; fuerit: primū quidē, submovendo quę eā accedit causam: dein extinguēdo, quę ab hac accensa est, febrem. Excitare aut vel maxime febrem solet cōstipatio meatuum, in ijs corporibus, quibus quod transpirat, halituosum nō est, sed mordax, acre, & fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci temperataq; lavatio, tum frictio quę rarefaciat, & exercitationes mediocres, & victus q̄ dulces efficiat succos. Adversissima verō sunt lavatio frigida, & aluminosa, et lavationis abstinētia, & exercitatio acuta, & frictio vel planē nulla, vel dura, & victus mali succi, & vigilię, & ira, & tristitia, & cura, ustioq; in sole, & fatigatio. Gravissimē aut peccare mihi videtur, a carnificibusq; nihil differre, qui medici hominibus natura biliosis, tenuissimam per morbos rationē victus injungūt, eosq; tridui inedia cōficiunt: quum nimirū tales naturę, ex longiori abstinētia cibi, acerrimis acutissimisq; febribus corripiantur, a quibus promptus est in hecticas transitus, atq; ab his rursus in marasmū torridum, aut (si os ventriculi est injuriis obnoxium) in eum qui syncopen infert. Etenim in quorū temperie siccum pręvalet humido, &

calidū frigidū: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperatiis, quę hac minus calidę sunt, tactu calidior advertitur. Plurima quoq; his flava est bilis, urinęq; ac dejectio bili saturā, & pulsus magni, & somni leves & pauci, & animi impetus vehemens. Quare his tum refrigerationē, tum aquę potionē, atq; adeo requiē & cibū largiorē cōgruere proficitur Hippocrates. Quum autē refrigeratio ipsa cōcilietur corporib. tum ex aliis quibuscūq; tum nō minimē ex ciborū exhibitione: cōveniet utiq; ubi corpus calidius siccusq; solito est redditū, frigidum humidūq; nutrimentum ei exhibere: sed q̄ nec medicamentosam ullā sensu perceptibilem facultatē obtineat: nec ipsum quod nutrit, plurimum: quemadmodum neq; minus quā sit ex usu. Cōmodissimus itaq; tali corpori est ptisana cremor ad unguē coctus, in quo nullum sit cōdimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine siti servare hominē potest, cum eo q̄ nec halituosum, nec humidū, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringēdi, nec obstruēdi aliquā vim sortiatur. Ac quod nō astringat quidem, vel gustus ipse docet, cuius unius id iudicare est proprium. Quod verō nec obstruat meatus, hinc licet etiā conijcere, quod nō secus q̄ aphronitrum, sordes cutis extergeat: vomituq; a ventriculo mediocrem pituitam eliciat, nihilo infelicius quā multa: quę sanē nec sitim restringit, ut ptisana: et in naturis biliosis bile scit facile. At verō si multa, & vehementer glutinosa & crassa pituita ventriculo adhæreat, hanc radica ex oxymelite, nō multa, aut ptisana detergere est habilis. Optimum itaq; biliosis tēperamentis nutrimentum est ptisana. Proximum huic, alia, cui paululum aceti ad faciliore distributionē adiectum fuerit. Tertium, quę sine aceto liquida existit. Injecisse verō huic, dū coquitur, aliquid porri, satius est. Nam quod tum anethi, tum salis aliquid necessariō habebit, neminē latet. Quinetiam panis in furno coctus, est utilis cibus: sicuti etiā omnes pisces saxatiles: nec ipsis minus asellus. Proximē asellos sunt, solea, torpedo, lupus, mullusq; post, mugil ē pelago. Omnis aut piscis deterior est, q̄ prope lacū qui mari jungitur, aut magni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt perdices, ac montanę oēs aviculę. Ab his, gallinacei, & phasiani, & columbę juvenes. Sed nec hæc tamen intus claudendę, quum excrementosa sint omnia, quę exercitatione carēt. Excrementosa verō non minus sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut ex ipsis etiā suillis carnibus, optima sit montana. Ab his deinceps sunt hædi. In omnibus autem fugiēda tum vetula, tum recens ædita sunt: illa nanq; duriora, concoctūq; difficiliora sunt: hæc immodicē humida, & excrementosa. Igitur, quibus acre aliquid quotidie transpirat (revertamur enim rursus ad institutum) ij, si cutis eis constipetur, facile corripuntur febri. Stipant verō ipsam, tum quę astringunt omnia: tum quę lentitia, crassitudine sua, in exiguis hærent meatibus. Aliquādo etiā ipsius cutis immoderatio siccatas, exiguos meatus densat. Qui ergo ex stipata cute febri laborant, ij inclināte prima accessione, ducendū omnia.

Calida & sic ea tempera-
tura iudicā

Calidis et sic
tis naturis
qualis & sit
ratio conde-
niat.

Ptisana cre-
moris facul-
tas.

Gustui quid
proprium.

Ptisana ines-
se vim deter-
soriam.

Multa in na-
turis biliosis
bile scit faci-
le.

Alia biliosis
naturis con-
venit.

Pisces biliosis
naturis con-
gruentes.

Pisces dam-
nandi qui
sint.

Volucris bi-
liosis congru-
entia.

Exercitatio-
ne carentia
esse maxime
excrementi-
tia.

Hædi biliosis
apti.

Animalia
vetula, re-
censq; ædita,
esse inc-
pissima.

Stipantia cui
tim quę sint.

Febrientes a
constipata
cute, quali-
ter sint fricā-
di et abluerē-
di.

*Febris ab ani-
mi affectib.*

*Febris ab
ustione indu-
cta, curatio.*

*Rosaceum re-
frigerandi
modus.
Capitis refri-
gerandi ra-
tio.*

*Febris à fri-
gore orta cu-
ratio.*

*Diariarum
februm in
bilioso tempe-
ramento, tum
communis o-
mnium, tum
cuiusq; pro-
pria, curatio
ratio.*

*Diaria febre
detentis vi-
num esse pro-
pinandum
aquosum.*

*Vinum acu-
tis febribus
Hippocrates
porrigit.
Calida natu-
ra, frigida
potione in-
santur.
Aquam in fe-
bribus non
esse propinan-
dam iis, qui
uti illa non
consueverunt.*

nes ad balneū sunt: tum pinguius, molliorq; fri-
candi, si quidē ex aliquo, q̄ astrinxit cutim, labo-
rent. Nam si ex siccitate, fricādi quidē & ipsi, sed
parcius: lavādi aut uberius. Respiciendū verò ad
virtutis modū semper est, in huiusmodi auxi-
liis. Atq; irā quidem, tristitiā, vigiliā & curā, nec
frictione, nec lavatione multa indigent. Sed om-
nibus qui ex eiusmodi occasione febricitarint,
oleū infundendū est tepidū largeq; , cui minimē
astringēs vis insit: tum paululū fricādi, ex consue-
tudinēq; lavādi. Ustio verò protin⁹ ab initio refri-
gerationē desiderat: tum crebriore lavationē: mi-
nimē tamen aut oleū largū, aut frictionē crebrā.
Sint aut q̄ refrigerēt, & rosaceū, & omphacinū,
salis omnino expertia. Efficies hęc magis frigida,
si ita vas, in quo cōtinentur, in puteo suspēdas, ut
aquam tangat. Præterea si defluxus frigida aquæ
vasi se illidat, magis humorē refrigerat: magisq;
adhuc nix circūposita. Infundere aut oleū ipsum
sincipiti, sublata in altū manu, per mediocrē la-
nā modū oportet. Hęc usq; ad inclinationem fa-
ciens, in balneū duces. Si verò qui memorato est
temperamento, ex frigore febricit, etiā ducendus
ad balneū in remissione is est. Si aut cum grave-
dine & destillatione febricitet, prius quā hęc
sint cōcocta, lavādi non est. At qui ex ustione fe-
bricitat, ij vel quum hęc adsint, lavari debebunt.
Post lavacrū verò iisdē quibus ante madefaciēda
amborū capita sunt: eorū quidē qui ex ustione fe-
bricitarunt, refrigerantibus: qui ex frigore, calfa-
cientibus: cuiusmodi sunt irinum & nardinum
unguentū. Porro qui ex ustione febricitant, ijs in-
tendēda, quæ ex refrigerantib. cōstat, curatio est:
ijs verò qui ex frigore, quæ consistit in calfacien-
tibus, remittenda fuerit. Omnium autem cōditio-
num comprehensarū in proposito temperamē-
to, ubi febris diaria laborat, victus communis est
ijs, q̄ & sit boni succi, & cōcoctu facilis, & q̄ nul-
quam exiguis cutis meatibus hæreat. Sed ijs qui
exusti sunt, cū eo quod refrigeret, & humectet.
Pari modo ijs, quos ira mala habuit. Iis verò qui
refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modi-
cē. Iis qui pervigilio, & tristitia, & nimia cura cō-
fecti sunt, victus esse debet humectās, atq; som-
num cōcilians. Ad eundem modum ijs qui defa-
tigati sunt, magis nutriendus: minus aut, ijs qui re-
frigerati. Reliquis, qui medius sit amborū. Vinū
verò ipse his omnibus exhibere soleo, sed quod
tum aspectu, tum viribus sit aquosum. Id enim
ad omnia utilius quā aqua est: utpote quod &
concoctionem juvet, & urinas ac sudores provo-
cet. Etenim constat Hippocratem, non in diariis
modò febribus, verum etiam in acutis, vinū por-
rigere. Cæterum naturā calidā, magnoperē fri-
gidā potione juvatur: neq; in diaria febre, ijs qui-
bus in usu fuit, ipse eam circuncido. Si quis verò
non assuevit, huic per febrim dare nō inceperim
nisi pristina sanitate prius reddita. Porro si pro-
pter obstructionem morata sit trāsspiratio, si par-
va quidem ea sit, qui rectē deterferit, secūdam fo-
re accessionē verabit: si momentanea, non pos-
sis ita promittere. Quod si & multi, & crassi, &
glutinosi impacti sint succi, quæ hos excipit fe-
bris, fieri non potest ut intra fines diariarum con-
sistat: quādō ex necessitate huic in mali succi na-

turis, ea quæ ex putredine humorum accēditur,
succedet. Nam in aliis saltem temperamētis, quæ
in sequētibus exponam, excitari ex tali causa po-
test, citra humorum putredinem, aliqua cōtinen-
tis febris species. Itaq; nisi vitiosus succus trāspi-
ret penitus, necesse est ut putrescat: ut transpiret
autem, valido auxilio est opus. Ac si quidem vel
puer, vel senex sit, sanguinem detrahēre nō licet.
Inter has ætates, ubi robur ægro non deest, secan-
da vena est, vel si plenitudinis signa non adsint.
Præstat enim vitiosi succi maiore parte emissā, ad
detergēdas obstructions accedere: quum alio-
qui verendum sit, ne si obstructionibus liberan-
dis, prius q̄ vacuaveris, studeas, ipsas multò ma-
gis impingas. At solvunt quidem obstructions,
quæ deterforiam obtinent facultatem, seu foris
admota cuti, seu intrò in corpus accepta. Peri-
culum verò etiam est, ne quæ foras trahunt, u-
nā cum ijs quæ obstruunt, etiam aliud quippiam
attrahāt: & quæ ab interno sursum feruntur, ali-
quid secū ex ijs quæ in vasis continentur, rapiant.
Quod ipsum si tenax & crassum sit, obstructio-
nem planē geminabit: si aliter, multitudine cer-
tē sua, nō parum omnino nocebit. Ne igitur hęc
contingant, utilissimum est inanisse corpus. Dis-
cernitur autē magnitudo obstructionis ex ipsa
magnitudine febris, ut quæ ex maiore obstructio-
ne, major: ex minori, minor inciderit. Ubi verò
modicē jam vacuaveris, haud multò post aut nu-
trimentum aliquod, aut pharmacum ex ijs quæ
detergeāt, exhibebis. Atq; in alimentorum qui-
dem ratione sunt ptisana & mulsæ: in pharmaco-
rum, oxymeli, & quæcunq; incoquere in mulsæ
licet, ceu calamintham, hyssopum, origanū, ser-
pyllum, irim, & apium. Verum hęc omnia iusto
sunt calidiora, ideoq; febres accendunt, æquē ut
vinum. Oxymeli verò solum nec febres accēdit,
& strenuē deterget, sic ut ea quæ glutinosa cras-
sāq; sunt, dissolvat, & meatus obstructos liberet.
Inter mulsam & oxymeli medium locum habet
quod apomeli dicitur. Nec immeritò arbitror &
saccharum inter hęc numerandū. Ex hoc victu
observabis, quantum de febrili calore minuitur.
Etenim si tertio die manē videris minimum esse
quod de febre relinquitur, ac nec putredinis hu-
morum in pulsu nota subfit, neq; in urina crudi-
tatis, suspecta verò hora, qua primo die febris oc-
cupavit, extra meridiem sit: audacter hominem
quamocyssimē lavabis, longē ante sextā horam.
Abundē tamē sit, si intra tertiam horam lavatio-
nem cōpleveris. Ad eundem modum & in deci-
mam horam suspectā habueris, usq; ad septimā
laves licet: quum tres æquinoctiales horas qua-
tuorve, inter balneū accessionisq; tempus inter-
poni abundē sit satis. Debet autem in balneo cor-
pus prius unctum ac moderatissimē frictū, mox
detergeri extrinsecus, abluīq;. Moderatissimē de-
tergent tum erui, tum hordei, tum fabarum fari-
na. Præterea mulsæ quæ sit aquosæ. Magis verò
quā hęc, iris, & panacis radix, & aristolochia,
& mulsæ quæ mediocri est mistura: veluti etiam
hęc magis quæ meracissima est. Possunt autē vel
hęc magis detergere, tū spuma nitri, tum nitrū i-
psū, tum aphronitrū. Sapo etiam ex ijs est, quæ
maximē detergere valent. Egressis balneū, præ-
ter

*Contine-
febris spe-
aliquam
citari p
absq; ha
rum pun*

*ne.
Sanguin
nec pue
nec seni
trahend*

*esse.
Sanguin
detrahe
interdu
se, absq
nitudin
notis
Obstru
nes sol
qua de
ria fac*

sunt pr

*Vacuam
cur pri
corpus
obstru
bus lib
dum.*

*Oxymel
aperiet
obstru
bus qu
api, s
Apom
Saccha*

*Balne
tra co
febris
tia, pr
angi a
moder
meq;
ac de
geri
Deter
qua*

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, Lib. IX.

Diariarum igitur curationem precedenti libro exposuimus. Quarum sane febrium unica accessio est, unico plurimum die, ex ipsarum saltem natura, circumscripita, Ceterum nisi quae eas commodum tractet, in reliqua duo genera febrium, nempe in putridas & heceticas, transiunt. Putridas. n. appellamus, quae ex humorum putredine: heceticas vero, quae ex immodica solidarum partium nascentur calfactione. At vero in illo transitu a diariis in reliqua illa duo febrium genera, alterum quoddam febrium genus medium licet imaginari, quod neutri extremitatum sit idem. Ceterum medium id, quum inciderit, nec nosse non possunt, nec reprimere, quod extremitatum, quarum existit medium, specie ignorant. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, perturbatione animi, vel bubone ab evidenti causa aliqua oborto, nunquam ad tertium usque diem progredietur febris accessio, nisi quod delictum circa laborantem fuerit. At quibus stipatio febris accessio est, iis etiam ultra hos porrigi accessio potest. Etenim stipatio fit, vel obstructis exilibus, meatibus, propter glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos: aut continentibus. ob ea quae corpus siccarunt: vel denique improbe condensatis, ob occursum causarum refrigerantium. Quas igitur febres vel continentia meatuum, vel reces corporum densatio excitat, haec & post primam accessionem desistunt, si quis recte ipsas tractet: & vere diariarum sunt, tum dicuntur. At quae ex obstructione creatur, si haec quidem pusilla sit, solvi quoque ipsae similiter ut aliae diariae possunt, si quis eas legitime sanet. Sin autem adeo vehementer sint humores impacti, ut valentius aliquid quod eos eximat, postulet, id genus febres porrigi ultra unum diem necesse est, ac, inde diariarum genus videri egressas. Verum si neque humor putrescens subsit, neque ipsum corpus febrile calorem susceperit tanquam habitum, utique genus id febris, ab aliis duobus diversum erit. Quare huiusmodi febris natura quidem eadem est cum diariis, nomen vero non idem. Siquidem quae febres ab initio ad finem usque unicam accessionem sortiuntur, in multos dies porrecta, ex synocha, hoc est, continentes vocantur. Quarum natura est duplex. Quaedam namque earum manifesta habent putredinis notam: quaedam prorsus non habent: quas nimirum ex diariarum esse genere constat. Quum enim accessionis remissio ex ferventium humorum transpiratu contingere soleat, non transpirent autem prorsus in stipatione vehementi necesse haud dubie est, multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febre nulla subest occasio, quae alterius accessionis principium excitet, non modo multorum dierum evadit febris, sed absque invasione ullius accessionis, ab initio ad finem una febris persistit, nec quotidianam, nec tertianam, nec quartanam referens. Quoniam igitur ex duobus his fieri febris potest, & quod totus vapor non transpiret, & quod idem vapor ea quae contingit exalfaciat: necessum est tres esse synochorum differentias in universum: nempe vel parvi permanentis magnitudine ea, quam in primae accessionis vigore habuit: vel adiciente semper exiguum aliquid, minuentem: atque haec vel aequaliter faciente, vel inaequaliter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec au-

geri nec minui febrilis calor cernetur. Verum si eorum alterum vicerit: utique si quod vacuatur, nec cessarium est febrim minui: sin quod adjicitur, omnino incrementum. Haec itaque est continentium febrium species una, quae eandem naturam cum diariis sortita, absque humorum putredine in plures dies extenditur. Altera vero contingit, ubi in omnibus vasis, ac potissimum maximis, aequabiliter succi putrescunt. Quarum sane febrium in gracili & frigido corpore neutra solet consistere, sed plurimum in iis qui sanguine abundant, & corpulentis: quando nec obstructio citra putredinem excitare febrim valet, nisi id quod transpirat, & copiosum, & calidum sit: nec humorum putredo in omnes quae inter inguina & alas intersunt venas, aequabiliter ac cito porrigi in frigido habitu potest. Debent enim quae putrescunt, tum calida & humida esse, tum difficilem habere transpirationem. Eoque fit, ut neque in frigida aetate, neque in frigido corporis temperamento, continens excitetur febris: quemadmodum neque in gracilibus, vel qui raro sint corporis habitus: sed prorsus in temperamenti, corporibus atque naturis contrariis. Proinde fit, ut qui ita febricitant, iis & pulsus maximus sit, & aequalis, & vehemens, arteriarumque consistentia inter molle & durum mediocriter. At celeritas atque frequentia pulsus, pro ipsius magnitudine febris. Haec itaque sunt ambarum febrium communia. Alteri tamen privatim insunt notae putredinis, non modo in lotio, sed in pulsu etiam, calorisque qualitate injucunda. Quarum sane febrium dignotionem, & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didicimus, qui statim ab adolescentia philosophiae studio capti, primum nos ad eam contulimus: mox patris evidenti insomnio moniti, ad medicinae studium excolendum accessimus. Est porro continentium febrium praesidium maximum, si modo vires valentes sint, sanguinis diminutio, vel usque ad deliquium animi. Primum namque in contrarium statum agitur corpus, celerrime ex animi defectu refrigeratum. Hoc vero nihil inveniri possit neque ipsis agris, nec naturae quae animantes gubernat, jucundius utiliusve. Postmodum in corporibus ipsis necessario supervenit alvi dejectio, nonnunquam & vomitus bilis. Quas res statim a toto corpore maiores sudoresve excipiunt. Etenim vel sola sanguinis detractione sic obita, restitui olim ipse quendam adolescentem ardentissima laborantem synocha. Cui sane post duas a sanguinis missione horas paulum nutrimenti exhibui, permisi quoque ut quiesceret. Jam vero eorum quos ex sola obstructione febricitantes mihi videre contigit, nemo in putredinis febrem incidit, qui sanguinem prius detraxisset. Quem quidem, ubi valida virtus subest, & aetas permittit, usque ad anni defectum (ut diximus)mittere expedit. Ubi horum alterum haud satis respondet, tutius est, quantum satis visum fuerit, tantum principio detrudere: quod defuit, iteratione supplere. Quo quidem praesidio omissio, in summum agri discrimen veniunt: nisi eos vel virium robur, vel largum profluvium sanguinis, vel sudor copiosus, ex manifesta perniciem eripiat. Agimus itaque impraesentiarum de iis febribus, quae ex stipatis per obstructionem meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine

Putredinis
quae requiritur.

Continens febris in quibus non possit gigni corporibus.

Galenus patris insomnia admonitus Medicinae navavit operam.

Continentium febrium praesidium maximum est, missio sanguinis vel ad animi deliquium usque.

Sanguine detracto in ardentissimis febribus, interpositis quoque horis duabus esse modice alendum aegrum, permittendumque ut quiescat.

Sanguinis missio quando sit celebranda usque ad animi defectionem.

quidem consistant, ex diariarum esse genere dixi. *Synochi quā do oriantur.* Sin iis putredo aliqua superveniat, ubi in omnib. venis ac præcipuè magnis ea consistit, synochas, five continentes excitari febres: ubi in unica animalis parte, exacerbationes quæ certo ambitu repetant. Quib. igitur corp⁹ ex succorū abundantia inhabile ad transpirationē jam redditū, tantū caloris cōgessit, ut inde jam febrat, iis tantū sanguinis detrahendū est, quantum vires tolerāt. Alioqui certè verendū est, ne aut suffocet^r, aut corripiat^r syncope: nisi eos vel viriū robur, vel plurimus sudor, vel largū sanguinis pfluvium à morte liberet. *Acceffiones febriles unde originem ducant.* Nec verò existimes de plenitudine illa, quæ cōparatur ad vires: hūc à nobis sermonē fieri (quippe quæ nec sic obstruit venarū ora, ut refrigerationē phibeat, nec tunicas earū distendit, nec ruborē, nec tumorē invehit) verū de ea quæ cōtineri à vasis ultra nō valet, quæq; ob id ipsum solet prædicta symptomata inducere. Siquidē copia hæc, dum bonitatē suā servat, ut pariter augeri cum virium robore est nata: ita si quādo has gravat, nec de cætero augebitur, & bonitatē naturæ amittere: quare tunc fieri nequit ut nō putrescat. Ergo festinare ad sanguinē detrahendū oportet, quō vasorum natura, ex transpirādo ventilandoq; natura lem temperiē servās, humoribus, eo quo inter initia modo, dominet^r: quādo si ad temperiē versa laborabit, metuendū est ne hi putrescant. Excitatur aut intēperies in ea, ex febris calore. Optimū itaq; utendum, si est in eiusmodi febrib. statim nō numero dierū sed uni viriū robori attentū esse. Quocirca nō solum sexto septimove, sed etiā sequentib. dieb. sanguis mittendus est. Quod si aut alii medici, aut æger, aut ppinqui ipsius, nō pmittāt ut feces venā, ad frigidā exhibendā accedes, sed diligenter antè discernēs, quantum nocumentū ex ea cōtingere possit. Quippe intēpestivè immodiceq; exhibita, lentos & crassos humores attenuari, digeriq; prohibet: imbecillas particulas corporis cōcutit. Nō nullis illicō spirandi difficultatē, convulsionem, atq; tremorē conciliat. Tū verò quibuscunq; in particula principe tumor aliquis ē phlegmones, oedematos, aut scirrhi genere constitit, iis frigidā offerre nō licet. Sed neq; iis quibus obstructio, putridusve humor non concoctus incōmodat. At si per continentes febres concoctionis humorū notas videris, absq; impedimētis expositis, audacter ægris frigidā quantum appetāt, dabis: præcipuè, si tali potioni assueverint. Porro erysipelas verū, consistens in aliquo viscere, non aliter quā frigidæ potu sanabis. Sin verò mistū cum phlegmone sit, in hoc cōcoctionis expectandæ sunt notæ. Cæterum minus tuta iis qui paucillum sanguinis carnisq; obtinent, frigidæ potio est: celeriter nanq; ad solidas animalis pervenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens. Qua ratione etiā hecticæ febres nec prorsus frigidā, nec multā aquā desiderāt. At cōtinentiū febriū maxima remedia hæc duo sunt: detractio sanguinis, & potio frigida. Verū illa nullo non tempore, modò vires sustineāt: hæc, quum & in pulsu & urinis, cōcoctionis evidentes cernuntur notæ, febris autē est maxima. Est etiā habenda ratio in missione sanguinis, tam eorum quæ præcesserūt, quā quæ cōsequeuntur ipsam. Nam si præcedat ciborum crudi-

tas, tanto tempore differre venæ sectionē jubebis, quantum satisfacere tum ad eorum cōcoctionem, tum ut excrementa descendant, videbitur. Sin sequer^r necessario vacuatio quæpiā (ut, exēpli gratia, muliebre pfluvium) tantum illi relinquendū est, ex eo q supfluum existit, quantum est p eam vacuandum. Sed nec negligenda interim natura ejus q venit vacuandus: sicuti neq; ætas, nec cœli status, sub quo & regio, & anni temp⁹ cōprehenditur. Sunt .n. nōnulli ad extrahendos digerendosq; succos, natura propensi: nempe q humidi & calidi existunt, quiq; raro sunt corporis textu. Ad hæc, quib. os vêtis aut amara bile redundat, aut imbecillū est, aut supra modum sensibile. Pueri certè ppter ætatē ppetuò. Cœli verò stat⁹ ubi calidus nimium & siccus est, corpus in ambientem resolvit. Atq; hi quidē scopi sunt, qui à sanguinis detractioe dehortantur. Eā aut postulat, unā cū affectu, cujus causa primum regrebat, habitus durus densusq; , quiq; digeritur ægre: tum ambiens humidus frigidusq; . Quum autem in universalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat, fieri nō potest, ut sine multiplici in ægris singulatim exercitatiōe, quod ex usu sit, facias: nec sine universalium cognitione, pbere exercitatio procedat. Non licet siquidem ullius artis scientiā nanscisci, nisi & methodum quandam habueris p universalia theoremata, & in particularibus te exemplis exerceas. Ut igitur revertar ad methodum: eqdem virtutis cōsiderationem ad curationem morborum sæpe maximè necessariam arbitror, sic ut quæ circa ægrum administrantur, omnia fermè ejus unius causa fiant: ali-quando mediocriter necessarium, sic ut aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, consili-j petatur, non tamen præcipua faciendorum ratio huc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutem adeò exiguum ad invenienda remedia conferre, ut propter exilitatem etiam lateat: al-lias verò prætermitti, ac silentio præteriri, quasi prorsus ex utiliter considerandis nō sit: ut in dia-ris febribus, in quibus vires nullam providen-tiam requirunt, utpote validæ. Verū quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ ali-quid faciendum indicant, usu venit. Horum au-tem omniū aditum Hippocrates nobis ostendit, incultum tamen, quem methodo postea nos ex-planavimus: perinde ut Trajanus fecit, qui om-nes Italiæ vias asperitate difficiles refecit, instau-ravitq; . Ut verò accuratius de ipsis viribus disse-ram, operæ precium est scire, tribus diversigen-eris facultatib⁹ five animis universum animal gu-bernari. Quarum sanè prima: quæ stirpibus est communis, quamq; vocant naturalem, atq; etiā appetitricem, jecur pro fonte habet, per venasq; illinc sparsas in universum corpus, id alit. Secun-da autem est, quæ non modò ut stirpibus, aut vi-ta præditis, sed etiam ut animalibus anima, est in-sita. Hæc in corde, fonte caloris insiti, residens, ab ipso per arterias ab eodem ortas in totum corp⁹ disseminatur: diciturq; tum vitalis facultas, tum irascibilis anima. Tertia deniq; est anima ratioci-natrix, q in cerebro domiciliū habēs, voluntariis actionibus præsidet, per nervosq; ceu canales, to-ti corpori sensum, & motū largitur. Has igitur fa-cultates

cultates servare, nihil planè est aliud, quàm vitā servare. Siquidem qualibet earum amissa, necessum est reliquas simul perire. Ac proinde in opere De sanitate tuenda, huc omne consiliū direximus. In hoc verò, primū ppositū est, morbi sublatio. Nā cuiusmodi in illo est sanitatis tuitio, ejusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorū utriq; cōmunis est ipsa vitæ custodia. Hoc tamē interest, quæ secundæ valetudinis tuendæ gratia gerūtur, eadē statim vitam tuentur: quæ verò affectiones præter naturam in morbis discutiūt, ea nō omnino vitā custodiant. Quippe aliqua ejusmodi prædita sunt facultate, ut si immoderatè aut intēpestivè utare, vitā adimant: quæ solent vacationes immodicæ. Ergo quū virt⁹ tantoperè necessaria sit, eā aut lēdāt omnia vacuātia remedia, si qs ipsis parum moderatè utatur: utiq; adversæ inter se faciēdorum indicationes in talibus corporib. sunt, in quib. affectus, quò expugnet^r, notabilē vacationem desiderat: virtus aut hanc ferre nō valet. Cæterū quemadmodū nihil quod sanitatē tuetur in valentib. vires corrūpit: sic in ægrotis aliquādo virtus succedit iis, quæ veluti in perniciē eius administrantur: ut si evacuemus in plenitudine quæ est supra vires, aliquādo ab ipsis dissolvitur. Etenim in synochis febribus, ex meatuū stipatione ortis, quoniā valida plerunq; virtus est, citra periculum vacuatio adhibetur. In aliis verò quæ ex corruptela humorū gignuntur, existit maxime periculosa. Siquidē corruptū est, alienu à natura quū sit, id se auferendū dicitur, vel vena incisa, vel purgatione. Horum autē præsidiorū neutrū feret imbecilla facultas, si quādo cum corruptela coiverit. Oportet igitur, ubi indicationes ita si bi adversantur, paulatim quod vitiosum est, vacuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locū reponere: quam curationē vitiosi succi, Medici epicrasin nominant. Quum igitur sectio venæ, sanguinis sit vacuatio: sanguis aut ipse utilis, possessio naturæ existat: sic utique oportet venæ sectionē fieri, ut quod inutile ex sanguine ipsi nature est, emittatur. Fit porro sanguis bifariam nature inutilis: vel quum propriam qualitatem ad unguem non servat, nec amplius nutrire, sicut prius, potest: vel dum ita multitudine crevit ut premat vires, aut distendat vasa, vel rumpat ea, vel obstruat. Atq; in his quidem missio sanguinis utilis est, ceu vacuantium præsidiorum unum: in aliis autem, ceu quod humorum vehementiorē impetum ad partē diversam revocet, vel ad latera derivet. Postulat autē semper valentes vires, quæ modo vacationis eius respondeant. Quoties igitur virtuti notabilis ex vacuantib. auxiliis noxa incidet, toties ipsa utile aliquid indicabit, æquè utique, ut quum manifestè juvabitur. Ubi verò ex iis quæ affectum submovent, nec commodum illi accedit ullum, neq; incommodum, ibi veluti inutilis prætermittitur. Porro quicquid aliquam præstat indicationem, si natura id simplex sit, etiam quod indicatur, utiq; simplex erit. At si illud compositum sit, & hoc erit quoque compositum. At sanè quædam custodia sui, quædam amotionem indicant. Virtus itaq; semper unam rem indicabit, utiq; sui custodiam. Custodietur autem, primò quidem, si quod ex sub-

stantia ipsius vel inanimatum, vel alteratum est, correxerimus. Secundò verò, si quæ ipsius substantiam vacuare, alterareq; possunt, prohibuerim⁹. Estimari autem debet interim, quod magnitudine, dignitatēve antecellit. Maxima igitur dignitas virium ipsarum est, quādo vivere ipsum nobis ex harum custodia constat: utpote quum vitam, aut ipsas esse vires, aut earum actiones, necesse sit. Virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est. A viriū indicatione proxima existit, quæ ab affectibus, quos curare conamur, subministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, adversatur, id secundi est loci. Quæ verò cum iis quæ cōducunt viribus, in idem comperunt, hæc utrunq; calculum referunt, & eorū quæ primæ sunt, notæ, & eorum quæ secundæ. Quare citra controversiam facienda. Quæ verò adversantur, aliquando administranda prorsus non sunt, aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omniū est, quæ a virtute sumitur: non tamen sic prima, ut curationem nos doceat, quum ex numero curatrici indicationum non sit, sed vitalium. Nam neque ut valeamus, neque ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus, sed ut vivamus: quamvis ex accidenti interdum virtutis robora- tio ad affectus curationem conducatur. At verò medicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aëre, qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas possit. In omni itaque curatione agendorum, indicationes in his tribus ad summum consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, oriuntur. Cæterum affectus ipse haudquaquam in causas diduci est aptus, quemadmodum temperies atq; ambiens aër, sed tantummodo in differentias. Nam aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentariis. Ac in similaribus quidem, vel simplex est intemperies, vel composita. In instrumentariis, circa simplicium partium vel posituram, vel formā, vel numerum, vel magnitudinem, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentia, consistit. Porro affectuum qui simplices partes occupant unus, est intemperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur febris. Ideoq; omnis febris, quæ febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandū humectandumq; veluti ad finem, dirigetur omne medentis consiliū. Quare materia inventa, opportunum tempus ex quatuor febris temporibus sumes: quantitatē verò, ex conferendo cum naturali habitu morbum. Quippe quantum is recessit à naturali habitu, tantum opus est ægrum refrigeres & humectes. Ambiens autem aër (cujus fugere commercium non licet) si contrariā morbo temperiem habeat, è præsidiorū numero est unum: sin similem, una est morbificarū causarum. Idcirco tunc inhibenda ejus noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis, adaugetisq;. Ipse autem arte reddendus est talis, qualis ad profligandam febrem, aut aliam quampiā dispositionem, desideratur. Si igitur morbus siccus & calidus sit, humidiores frigidioresque domos

Virtus quos
modis servat
da sit.

Indicantiū
dignitates es
se estimandas.
Vitam esse
aut vires i,
psas, aut ipsa
rū actiones.

Indicatio om
niū prima
est quæ a vir
tute sumi
tur, non sic
tamen ut ex
rationem nos
doceat.

Indicationes
medicatrices
unde suman
tur.

Morbi diffe
rentia.

Febris quid.
Febris reme
dia hume
ctatio, refri
geratioq; ex
stis.

Aëris com
mercium nos
fugere haud
quaquam
posse.

*Febrientibus
quales ades
eligere, præ-
parareq; de-
beamus.*

& eligemus, & præparabimus. Sicuti è diverso, si frigidus humidusq; eas quæ calfaciant & siccent. Sunt itaq; deligendæ quæ ex seipsis eiusmodi sint: alioqui industria nostra præparabimus ipsas, per æstatē quidē eas subterraneas molientes, & ad Septentrionē conversas: ac pavimenta ipsarū assidue humore aspergētes: tum ut ex euripo aliquo aura expiret, machinātes: flores præterea & germina, q̄ frigida humidæq; sint facultatis, per arēā disseminantes: per hyemē verò, cōtraria horū facientes, præsertim ubi morbus suadet: ubi non suadet, excessus tantum utriusq; tēporis remittentes. Poterunt rursus tres illæ indicationes prædictæ ad duas tantum reduci: nēpe ad morbum & sanitatē. Neque. n. aliud ipsa sanatio est, quā morbi in sanitatē translatio. Qui affectus cōtrarii quū sint, necesse est per cōtraria fiat eorū alterius in alterum trāsmutatio. Atq; ita rursus una erit sola curationis generatio, videlicet cōtrarietas. Cæterū ad accuratā contrariorū administrationē, necessum est curandorū corporū prius & naturas & tēperamenta cognoscere: quæ quidē tum ex iis quæ in libris temperamentorū tradita sunt, noscuntur: tum ex ætate, & tota antea acta vita, q̄ nimirū in victus & exercitii ratione cōsistit: præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc cœli statu, cōversatione. Ex ipso autē temperamento invēto, administrandorū indicatio suppediabitur. Sed neq; parvū quid negligendumve, ad remediōrū inventionē consuetudo adfert: vel uti nec ad sanitatē tuēdā, quū singulorū corporū etiā naturā ostēdat. Nos siquidē via rationeq; ab ea procedentes, invenimus ipsarū partiū affectū: dein ex illo rursus pervenimus ad faciendorū indicationem. Consuetudo itaq; curationis rationem indicat, per corporis naturā intercedentem quemadmodum ætas: quæ & ipsa temperamenti interventū, præstat indicationem. Advertere autem oportet, corpora frigida & sicca, quæq; ex ter restri natura cōstant (cujusmodi sunt mineralia) quam ægerimē solvi. At quæ calida & humida sunt, eorum substantiā celerrimē dissipari in ambientem. Quæ verò in medio horum, ex diametro pugnantium, consistunt, ea corpora quo magis ad hæc vel ad illa accesserint, eò vel aptiora ut dissipentur erunt, vel contumacia magis. In summa, citra calorem non potest in halitum digeri corpus ullum, quandiu substantia eius coacta densataq; manserit. Puerorum autē substantia, facillimē omnium digeritur, dissipaturq; propterea quod est ut humidissima omnium, sic nulla frigidior. Quo minus vacuantis præsidii eget, quum ex se ipsa naturaliter abundē vacuetur. Fit autem profectò & propter calidam siccāq; regionem & tempus æstivum, & statum cœli impensē siccum & calidum, notabilis per cutim vacuatio. Ita que hac de causa, qui sanguinis detractionem desiderant, iis aut prorsus non secabimus venā, aut parum detrahemus. Eruntq; in hac detractione quoq; spectanda, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis, anni tempus, cœli status, necnon is, quem curamus, affectus: aliāq; ratione ante hunc, laborātis facultas. Quū verò affectus sint numerosi, cuiq; ipsorū sua est curationis per contraria indicatio. Quocirca, octo intempera-

menta quum sint, octo erunt etiam morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultraq; has, una eius affectus, qui instrumentalium cōmunis est, diciturq; continui divortium: cujus sanē est indicatio curationis, unitio. Est igitur unum morbi genus, quod similes & simplices animalis vexat particulas, quam intemperiem vocant. Hujus aliqua differentia oriuntur, ubi corpora nudis qualitatibus alterantur: aliqua ubi accedente etiam humorum affluxu. Qua sanē dispositione utraq; vel afficitur una pars corporis, vel plures, vel universum corpus.

GALENI PERGAMENI de methodo medendi, Lib. X.

ERgo in diariis febribus simplex quidem est in corpore præter naturam affectus: utpote causis quæ primum eas excitarunt, jam ademptis. In quib. verò causa quæ eas accendit adhuc manet, in iis neq; affectus simplex, neq; sanatio est. Siquidem quod febris jam receptū in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: q̄ adhuc est futurū, id propulsare, ac ne fiat, vetare. Verabit autē, si quæ id excitat causa prorsus summotā sit. Itaq; in diariis faciendorū indicationē maximē ex ipsa febre capiemus. In reliquis verò, quæ accensionis suæ causam intus habet, prima indicatio ab ipsa sumet causa. Quare si febriū quæ multos dies cōtinuant, rectē ostēdimus putredinē esse causam, hæc nimirū sananda est prima. Sed nec interim extinguendæ febris, quæ per eā jam accensa est, ratio nō habenda. Ac si quidem in idem consentiant, & quæ febrē extinguunt, & quæ oppugnant causam: in quæ utraq; cōspirant, quum unum sit, sine cunctatione est agendum. Sin febris, quæ jam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc excitavit, est auctura, aut quæ causam submovent, febrē exasperabūt, diligens habenda consideratio est de remediōrū specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendum nō est, ut per ea quibus causam adimimus, febrem augeamus. Sin ita mediocris sit febris, ut quo tempore contra causam tantum pugnas, obruendæ interim vires ægrotantis nō sint, utiq; contemnendus is curationis modus non est. Non cōtemnendus autem nec ille est, qui contra id, cujus maius momentū est, instare jubet: nec tamen alterius omnino negligentem esse. Quum autem in examinandis iis, ad hominis salutem non parum momenti facultas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in propositis jam ob putredinem febribus: agendorum indicationē nobis prima largiantur: febris videlicet: eius effectrix causa: præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo submovenda sunt, tertium est custodiendum. Erit itaq; rursus & hic necesse, ut tū febrem, tum eius causam, cum facultate ipsa conferas. Mox si eadem ambo remedia requirāt, ea promptē exequaris. Sin indicationes pugnabunt, unam præferas, vel quæ à viribus sumitur, vel quæ à causa, vel quæ à febre: sic ut quæ cæteris sit valentior, hanc magis sequaris, nec tamen cæteras negligas. Nunc verò ad particularium præsidiorum differentias nos convertamus.

*Sanatio
quid.*

Indicatio curationis generatio, est unica, videlicet contrarietas.

Contrariorū exhibitioni, quarum rerum desideratur cognitio.

Consuetudinem ad inventionem remediōrum, & ad sanitatē tuendā plurimum posse. Consuetudo quomodo curationis rationem indicet.

Corpora dissipatu facilia quæ sint.

Puerorū substantia cur omnium facillimē digeratur.

Puerilis substantia cur minus cæteris eget præsidio vacuante.

Sanguinis detractionē prohibentia. Sanguinem detracturo quæ sint consideranda.

*Intemper-
simplicium
partium
octo, tota
illarum p-
ricularum
dicatione
Solitione
rini ma-
tio est un-
Intemper-
differenti-*

*Diariarū
affectus
plex.*

*Indicatio
psa quan-
a febre, &
quando a
brili cau-
sumenda
Putredinē
esse causa
februm
plures in-
stanti dies
proinde
tollenda*

*Indicatio
agendorum
in putridis
febris
mi a febre
psa, & ab
fectrice illi
causa, & a
facultate.*

vertamus: repetita tamē mētiōe diariarum quū
 & ipsæ, inscitia medicorum, in plurimum dierū
 febres aliquādo degenerent: idq; vel earum effe-
 ctrice causa abeunte, vel etiam nū persistēte. Por-
 rō abiit effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vi-
 gilia, cura, æstivo sole, fatigatione, & bubone qui
 jam desivit, citra stipationē febris est excitata. Ma-
 neret, quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa fe-
 bre, stipatio aliqua est orta. Nā & frigiditas, & a-
 stringentium usus, per mediā stipationē semper
 febrem excitat. Ultio præterea nōnunquam cōsti-
 pat corporis habitum. Jā ipsum febris principiū,
 ubi cum horrore invalit, stipationem subinde fe-
 cit. Quinetiā glutinosi, & crassi, aut etiā copiosi
 succi, ubi mediocriter obstruxerūt, diariā aliquā-
 do febrem accendunt. Dicuntur autem id genus
 febres omnes diariæ, quia solvi uno die sunt apte:
 computata cum hoc una & nocte. Caterum nō
 est idem diariarum omniū affectus: sed ab aliqui-
 bus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus mini-
 mē inseparabilis, sed vel ut plerunq; simul adest,
 vel ambigua sorte, vel rarō. Inseparabilis stipatio
 est iis, qui ex aluminosa aqua, vel chalcantode,
 vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut levi ob-
 structione febricitarunt. Plurimū verō iis adest,
 qui ex unctione febricitant. Ambigua sorte, iis, qui
 ex fatigatione. Quicūq; verō ex ira, vel tristitia, vel
 vigiliis, vel pertinaci studio, vel cruditate, vel bu-
 bone febricitant, iis rarō adjuncta stipatio est. Atq;
 harū omniū febriū nulla (q; utiq; ex ipsa sit) ad se-
 cundā usq; accessionē p̄durat, sed intra quatuor
 & viginti horas omnino desinit: idq; cū sudore,
 vel madore, vel trāspiratu quodā halituoso. Aut
 si quādo earū aliqua (quod tamē rarius cōtingit)
 longius trahūt, duæ iis accedūt causæ quæ ipsas
 solvi vetant. Earū una frigus est, quod vel ex am-
 biēte aere, vel ex unctione quapiam extrinsecus
 admota p̄veniat. Altera egregia illa diatritos, est
 si qui videlicet hāc transire, medicorū inscitia cō-
 guntur. Multæ igitur apparent diariarum esse fe-
 brium differentia particulares. Una, quando jā
 prorsus recessit ipsarum effectrix causa: veluti u-
 stio. Altera, quādo hāc etiā adest: sicuti stipatio.
 Cujus duæ sunt differentia: nempe exiguorū mea-
 tuū & densitas, & obstructio. Sanē densitudo i-
 ipsa, aliās ex siccitate p̄venit, aliās ex frigore, eoq;
 vel simplici, vel cum astrictoria vi. Jā verō obstru-
 ctionum ipsarum, alia est quæ abundātia, alia quæ
 ex qualitate succorū, scilicet qui aut lenti, aut cras-
 si sint, incidit. Præferetur autē inter media, in ea
 quā copia facit, sanguinis missio: in ea quæ ex hu-
 morum qualitate cōsistit, attenuatium usus. Cō-
 silium verō sumptum à viribus, ut in diariis sanē
 est exiguum, ita in iis qui pluribus diebus urgent
 satis magni est momēti, eoq; majoris, quō hæ sūt
 longiores. Enimverō ubi naturaliter vires se ha-
 bēt, ne minimū quidem in diuturnis febribus va-
 cuationum usum morantur ubi autem sunt infir-
 miores, pro magnitudine imbecillitatis, impedi-
 tur usus auxiliorum vacuantium. Rarius autem ac-
 cidit ut protinus in primo, secundove die, vires
 imbecillæ cernantur: id quod tamen interdū acci-
 dit vel propter ægrotantis malum corporis habi-
 tum vel propter senium. Nōnullis etiā fatigatio:
 ubi tristitia, vigiliaq; præcesserūt, & inedia per to-

tum secuta est diē, dein febris prius quā homo
 cibaretur, circa vesp̄rā occupavit, & nox insom-
 nis est acta, vires impensē resolvit. Porro quibus
 temperies corporis ad siccum calidumq; conver-
 sa, febrem accendit, si interdum vel in prima inva-
 sione accessionis nutriendi sunt, nedum ante illā.
 Eis autem soleo ipse sorbitionē ex alica exhibere,
 injectis in eam mali punici granis: qui cibus bilio-
 so stomacho est optimus. Nam & roborat hunc
 malū punicū: & alica, quū diutissimē in eo citra
 corruptionē maneat, sensim cōcoquitur, idq; nec
 acescens, nec etiā innatās. Igitur mordēs halitus,
 succusq; ubi per sensibilia corpora fertur, horro-
 res & inæquales totius corporis cōcussiones fa-
 cit, in iis, quibus cute stipata, quæ prius transpira-
 bat, jam sunt detenta. Quæ quidem, si fuliginosa
 sint, febres accēdūt. Eiusmodi autē halitus, suc-
 cosq; tum multa & vehemens dimotio, tum vigi-
 lia, & ira, & dolor, & cura, augment: tum proximē
 ab istis, unū illud per se interdum augere eos suffi-
 cit, utiq; si cibū quis nō sumpserit. Efficere nanq;
 corporis halitus in iis naturis, quæ faciliē amaram
 bilem gignūt, ex longa inedia biliosus. Cōcussio
 itaq; si ve rigor succedet, propter eorū quæ ferun-
 tur excrementorū, tum multitudinē, tū acrimo-
 niam, tum impetus celeritatē, tum laborantis vi-
 riū imbecillitatem. Horror verō fiet, ubi & qua-
 litas eorum, & impetus velocitas est remissa: tum
 copia minor, ac potissimū quū vires tristati obli-
 stat. Quod si largius remittatur jam dicta, ne hor-
 ror quidem cōtinget: sed vel quidam ceu ulcero-
 sus sensus, vel tantum inæqualitas. Porro quibus-
 cunq; virtutē existēte imbecilla, squalidoq; ipsius
 corporis habitu, incipientis adhuc accessionis vi-
 di adesse symptomata, iis omnibus panem ex vi-
 no diluto & calente, maturē exhibens, horrore
 statim inhibui. Quāto verō hos citius cibave-
 ris, tantō scilicet magis febrem prohibueris. Sin-
 duæ horæ ab initio inæqualitatis interpositæ sint
 nutries tunc quoq;, modō adhuc duret horror:
 prædicens tamē, quod hi febricitabunt, cæterum
 innoxia febre, & cui cutis mador succedet: quo fa-
 cto, tum lavare, tū nutrire debebis. Quod si hor-
 ror præterierit, ac jam planē febricitēt, id tēporis
 non sunt cibandi: sed decrescēte jā accessione,
 atq; interdū in summo vigore, nutriendi sunt, so-
 lutionis integritate nō expectata. In nullo nanq;
 squallido affectu cōmodē finitur accessio, priusq;
 illi vel ex lavacro, vel humido victu, humectatio
 accesserit. Calidis itaq; & siccis naturis, si ve à pri-
 mo ortu sint tales, si ve sint etiā acquisititiæ maxi-
 mē inedia adversatur, febriū paratissima causa. In-
 ter alia autē, calidus in summo, siccusq; cœli stat⁹,
 jā dictā tēperaturā efficit. Hic aut status alio anni
 tēpore, q̄ æstate, planē incidere nequit: sicuti nec
 humidissimus pariter frigidissimusq;, in alio q̄
 hyeme. Corpora igitur calida & sicca, ex inedia
 faciliē in febres ardentes incidūt: à quibus, nisi pri⁹
 mors occupet, in hecticas trāseunt: atq; ab his, in
 marasmū: vel protinus ab initio, ardentibus præ-
 teritis abeūt in hecticas. Maximē autem siccas, ca-
 lidasque dispositiones corporum, à principio fe-
 bris hectica corripit: id quod olim cuidā juveni
 contigit, qui ex ira febricitavit. Cui quidem, quo-
 ties nutritus est, fontanæ planē gelidæ dedimus

*Nutriendi
 etiam in pri-
 ma invasio-
 ne accessio-
 nis qui sint.*

*Punicū ma-
 lum, ventri-
 culum robo-
 rat.*

*Succos acres
 quæ gignunt.*

*Rigor unde
 accidat.*

*Horror unde
 proveniat.*

*Ulcerosus sen-
 sus quando
 fiat.*

*Horrorē in-
 cadentem in
 principio ac-
 cessionis, in-
 hibet panis
 ex vino dilu-
 to & calente
 exhibitus.*

*Nutriti inte-
 rim dum hor-
 rent quā pos-
 sint.*

*Inedia ad-
 versatur ca-
 lidas & siccas
 naturis.*

*in cap. 5: 8
 meth.*

*Hectica fe-
 bris à prin-
 cipio corripit
 calidas & sic-
 cas dispositio-
 nes.*

interim binos cyathos, interim ternos: quando frigida simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non fuerunt. Quocirca utilissimum fuerit ubi febris ideam perspexeris, in prima statim occasione, minori cum periculo, copiosiori frigida uti, corporibus ad validam siccitatem nondum perductis. Jam vero quemadmodum in quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam ex calfacti attenuatiq; a Sole, inedia & laboribus, succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: sic est diverso, ubi ob copiam, vel obstructionem, vel phlegmonem, vel humoris alicujus putredinem: febris est orta, maximo malo est cibus. Quare hos quidem, nec in febris inclinatione, citra noxam nutrias, nedum ipsa accessione invadente: illos vero, omni certe tempore, sed potissimum per inclinationem. In summa vero, illa duo a primo statim die, sunt tibi in omni agro spectanda: morbi summus vigor, & agrotantis vires, a quibus cibandi consilia petas. Postea si transiri summum incrementum sine omni cibo potest, in cibi abstinentia hominem ipsum servabis. Sin exiguum admodum requireret, abunde erit sola mulsca. Quod si majus desiderat quam sit ex mulsca, ptisanæ cremor satis erit. At si fas non est summum morbi incrementum aut tenui victu, aut inedia transmitti, id agendum, ut homo statim in prima accessionis inclinatione nutriatur Aliquos vero ipsorum, & quum invasura adhuc est, & quum incipit, cibabis. Sint porro hi sicco temperamento & calido, oportet, tum viribus necessario imbecillis: quum fieri nequeat, ut abunde siccum calidumq; corpus, si febricitet, viribus sit valentibus. Si autem cum ejusmodi febris & corpore, momentanei membri phlegmone sit conjuncta, omnino ager morietur, magisque id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis, vel angina, vel ventriculi, vel jecinoris phlegmone infestet. In quibus sane effectibus una salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonem quæ in iis est partibus attinet, minimè planè est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, utique sæpe. Ac proinde necessum est, aut resolvantur vires, aut phlegmone augeatur. Quoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel longa inedia, vel universis unà coeuntibus, siccatum corpus est, ac febris invasit, quæ & aridam reddit cutem, & igneum calorem refert: utiq; hunc talem timor est hectica febre correptum iri, potissimum in estate, ac cæli statu sicco calidoq;. Oportet autem quamprimum ptisanæ cremore, & sorbitione ex alica nutritum, panemq; post oblato, aquæ frigida potione hominem cures. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris, modo nec phlegmone aliqua ei sit adjuncta, nec putridus humor. Quanquam ego etiã vel si hæc ad erant, agrotorum non paucis aquam frigidam dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præsens augere, quam sinere hominem in hecticam febrem prolabi. Caterum si magnam fore incommodum, vel humori putri, vel phlegmone sit suspicio, a frigida quidem danda abstinerebis: refrigerantibus autem remediis, quæ foris applicantur, uteris: modo ea super os ventriculi, aut tota præcordia, modo super pectus imponens, ubi scilicet plurimum subesse caloris, maximè judicabis. Balnea etiam iis

qui siccato plurimum corpore sunt, & citra humorum putredinem febriunt, non incommoda existunt. At phlegmonas subsequuntur febres propter putredinem humorum, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamen vel citra phlegmonem, in ipsis vasculis aliqui humores putrescere: idq; aut in una animalis particula, in finibus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehensi. Ubi igitur citra putredinem squallenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis in iis remediis quæ refrigerent humectentq;, statuere oportet. Porro duplex genere est harum rerum prima materia. Una, eorum quæ foris incidunt: altera, quæ intus in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tum aer ipse qui nos ambit: tum pharmaca, quæcunq; humectandi refrigerandiq; vim obtinent: & tertium præter hæc, dulcis aquæ balneum. Intrò in corpus sumuntur, quæ eduntur, ac bibuntur. & inspiratus aer. Ab his generibus tentandum est propositis hoc loco febribus, tum humiditatem, tum refrigerationem comparare. Verum refrigeratio, quoniam per efficacissimam qualitatem inducitur. & parvi temporis est, & periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectent, curatio, ut longi temporis est opus, ita minus, est, quam refrigeratio, periculo exposita. Si igitur temperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo est utendum, nihil amplius de eo nobis sollicitis. Sin vero admodum calidus, vel admodum frigidus sit, pro calido inducendus arte contrarius est, subter raneis inventis domibus, quæ & frigidissime sint, maximeq; perflata: & ad septentriona conversæ: tum auris quibusdam suavis operibus nostra paratis, alias ex euripis, in quos multi se aquarum fontes præcipitent: alias aqua frigida ex vasculis in vasa transfusa, id quod etiã conciliat somnum: præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosis plurimis humifusis, aut vitium capreolis, aut ruborum claviculis, aut lentis ramis, aut deniq; reliquarum, quæ refrigerent, stirpium aliquibus: turba quoq; hominum ingredi prohibita, ut quæ domum similiter calfaciat. Ac sic quidem calidissimum aërem, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, refrigerare est tentandum. Qui sanè si modicè frigidus sit, hoc esse contentos oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui vero frigidissimus est, utiq; quatenus respirando attrahitur, admittendus est, ut qui admodum calorem cordis refrigeret: non tamen quatenus extrinsecus ægrum contingit. Quippe densat coagulatq; cutim, putrilaginosorumq; humorum effluxum, atq; transpirationem cohibet. Siquidem per pulmonem, quod rarum est viscus, difficile non est, ut tum qualitas ipsius, tum etiam substantia, facile ad cor perveniat: per cutim vero, utpote densatam, fieri id non potest. Caterum ex frigida inspiratione majus sequitur commodum, quam incommodum ex cute densanda, præsertim cum operimentis hanc nobis calfacere liceat. Porro utendum maximè ejusmodi aëre est in iis hecticis, in quibus primum quæd afficitur, ipsum est cor: æquè ut si ventriculus primum affligatur, ipsi per comesta & bibita succurrendum esset. At jecinori ex inspiratione aëre nulla certe accedit utilitas: a coestis vero

Nutriendi qui non sint, ne in ipsa quidem accessionis declinatione. Nutriendi consilium sumendum esse a summo vigore morbi, & viribus agrotantis.

6. ep. hectica febris quando sit expectanda.

Balnea bus coant.

Phlegmonas cur feb quant Putredinem morum duplici cedere

Remedia refrigerantia duplex materi

Refrigeratio in febre cur bre tempore que pericula

Aedes fronsibus les esse c Geniat.

Somnum ciliari a quarum pitu.

Turba num in scere am tem.

Aer calidus quom do refrigerat.

Aeris fr effectus.

Jecinori inspirato aere null accedit utilitas.

verò & bibitis, minor planè quàm ventriculo, ali qua tamen haud obscurè advenit. Còmunis au- tem omniù sanatio est, per ea quæ extrinsecus ap- plicata refrigerat, & humectant. Atq; ob hæc qui- dem viscera; magna ex parte hecticas marasmo- desq; febres accidere còtemplati sumus. Supervē- niunt tamē aliquādo & pulmonū intemperatiæ calidæ & siccæ. Incidūt præterea & pectori, & mē- senterio, & jejuno, & colo, interim verò, & utero, & renibus. In septo aut trāsverso marasmū nō vi- di, febrē hecticā vidi. Eiusmodi aut affectum, & spirandi difficultas, delirium excipere solet. Ex quib. magna ex parte prius moriuntur, q̄ hecti- ca sit prorsus perfecta. Est autem eorū agnitio fa- cillima, tū ex pulsus duritia, tum ex eo q̄ præcor- dia plurimū trahuntur sursum, tum ex difficulta- te respirationis, quæ illis est inæqualis, & varia: in- terdum admodum rara magnaq; utiq; quum de- lirij malum præcipuè dominatur. Frigidus itaq; aër tunc vel maximè cōfert, quum quod primū afficitur, ipsum est cor: quāvis confert & in reli- quis febribus non parum: quandoquidem in his quoq; necesse est cor similem intemperiem reci- piat. Pulmones etiam ubi ij sunt qui primum pa- tiuntur, plus cæteris omnibus aërem refrigeran- tem postulant. Porro ex medicamentis, quæ ad- mota extrinsecus in ejusmodi affectibus, refrige- randi humectandi; vim possident, deligenda ea sunt, quæ non modò citra astrictionem refrige- rent, sed etiam corporis substantia sint tenui. Ac quæ quidem absolutissimè tenuium partium sit, substantiā exactè frigidā invenisse fortasse nō est. Dixi exactè, propter acetum: quod quum omniū (quæ novimus) potestate refrigerantium, planè te- nuissimarum sit partium, admistam sibi aliquam habet caliditatem. Præterea corpora quæ contin- git, siccat: quāvis ad imaginationē sit humidū. Quo fit, ut ad eos affectus, quos humectari & re- frigerari expedit, solo eo non utamur, sed tanto a quæ frigida admisto, ut possit bibi. Hoc autē me- dicamē quod subdam, humectantium & refrige- rantium omniū simplicissimū est, optimūq; ad erysipelata, pudendorum phlegmonas inter- initia, & prius quàm depascēs aliqua subindictet putredo. Olei rosacei ex omphacino oleo citra fa- lem cōfecti, uncias iij. vel iiij. Cera albæ, & elotē unciam unā. Liqueantur simul in vase duplici, ac fiat ceratum humidum: cui abundè refrigerato, misceatur paulatim in mortario tātum frigidissi- mæ aquæ, quātum in se, dum cum ea molitur, ac- cipere possit. Quod si aceti quoq; admodum te- nuis & clari paululum adjicere velis, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medica- mentum efficies. Non debet autem medicamē tum hoc eo usq; super ægrum corpus manere, dū manifestè incaleat, sed assiduè subinde mutari. A- liud: Oxalidos, aut oxylapathi succus, cū exigua polēta mistus: excipiat duplicato & detricto pe- niculo, aut linteo, affatimq; frigidū, totum id ad- moveatur. Quinetiam portulacæ, & sempervivi, & uvæ immaturæ succus similiter polentē miscē- tur. Ad hæc lens palustris, & viridis tribuli, & po- lygoni, & lactucæ, & intybi succus, aliaq; refrige- rantia, cum tenui polenta miscentur. Licet etiam absq; polenta uti integris herbis tuis. Jam verò

quod epithema ex pinguibus conficitur palmu- lis, salutare medicamentum est. Porro coquere o- portet harum carnem, omni membranoso exē- pto, alias ex solo claro aceto, alias aqua ipsi pmi- sta: atq; hac, ubi tenera satis reddita est, tūta uti. Est verò salutare medicamē ad talia, etiā succus rosarum frigidus, unā cum polenta. Salutares si- militer sunt & ipsæ rosæ cōtusæ. Præterea stirpiū quæ moderatè astringūt, germina trita. At quem modum uti aliquādo licet herbis mediocriter a- stringentibus, ut solano. Hujusmodi tamen refri- gerantia omnia, illi tantum admoventur sunt par- ti, quæ primariò est affecta: non aliis quæ refrige- rari non postulant. Ego nanq; hominem scio qui imposito præcordiis refrigerante medicamēto, laborarit statim dispncea: sicuti alterum, qui tuf- sierit protinus. Verum ex remediis ipsis, nonnulla quidem per se, neq; intercedēte alio, refrigerare sunt nata: ut gratia exempli, frigida potio, necnō succus uvæ immaturæ. Alia autem ex acidēti: ut sanguinis missio, quæ calidam aliquando intem- periem sanat. Ad eundē modū & clystere & pur- gatio, & fomentū, & cataplasma: q̄ videlicet di- gerant, concoquantve. Utranq; verò facultatem in se comprehensam habet dulcis aquæ balneum temperatum: utpote ex partibus varia facultate præditis constans. Siquidem quum primum in id ægri ingrediuntur, in aëre versantur calido: po- stea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac egressi, in frigidam. Postremò sudorē detergent. Potest autem prima eius pars materias per totū corpus tum calfacere, tum liquare: præterea quæ inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare: & mul- ta, quæ sub hac ante detinebātur, vacuare. Secun- da eius pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea utitur, potest madorē utilem solidis partibus im- mittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida utitur & totum corpus refrigerare, & cutim den- sare & vires firmare. Quarta verò corpus per su- dores, citra refrigerationis noxam, vacuare. At ubi quis intempestivè lavatur, in horrores, cutis- que densitudinem incidit. Est autem continens i- psius horrores causa, mordentium excremento- rum, aut etiam crudorum humorū, confertim a- ctorum, citatior motus. Proinde quibus horum est abundantia, caro verò ac cutis densa, sive bal- neum sint ingressi, sive steterint in sole, sive quo- quo modo vel gestati, vel perfricti, vel exercitati, vehementius dimoti fuerint, utiq; iis horror inci- dit. Contrā, quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus ut remittatur laxeturque à balnei calore, promptus, ij non modò non horrent, sed etiā me- liores redduntur, utpote excrementis per id vacua- tis. Quo rationabilius, neq; in primo invasionis initio, nec incremento, quisquam ægotantē la- vit. Quippe densata est hoc tēpore, coarctataq; & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substā- tia: At in febris inclinatione vel incipiēte, vel pro- cedente, vel amplius progressa, sæpenumero nos ægrotos lavantes, non parū eis cōtulimus. Si quis igitur balneum ingressus, minimè inhorruit, sed laxata illi, necnon rarefacta est cutis, huic succe- dent planè excrementorum vacuatio, æqualis per universum corpus calor, exiguorū meatuum ra- refactio, tenforum laxatio, dēfatorū fusio. Ac va-

Refrigerant-
rium ex pal-
mulis.

Rosarum frige-
rantes.
Rosæ.

Refrigerant-
rium reme-
diorum aliā
quidem per
se, alia ex ac-
cidenti refri-
gerant.

Balnei dul-
cis aquæ, tem-
peratæ, facul-
tas.
Balnei par-
tes diversæ.

Balneum in-
tempestivum
horrores, cu-
tisq; densita-
tē gignit
Horroris causā.

Lavandum
nec in acces-
sionis initio,
nec in ipsius
incremento,
febrientem
esse.

Balneū con-
tulisse persā
per in accessio-
num declina-
tionibus.

Balnei tem-
pestivi usus.

cuatio

*Calor omni
febri inimi-
cus est.*

*Phlegmona
quando au-
geantur.*

*Balnei singu-
la partes
quos usus
praestent.*

*Balneum fri-
gidum quib-
us intrepide,
et phlegmone
subsit, sudabit,
si in frigida se co-
jece-
rit. Quod si sit
frigida lavationi
assuetus, securè
re-
medio utetur. Qui
aut ex calida &
sicca intempe-
rie febricitat hec-
tica, ac potissimum
qui jam maras-
modos fiunt, iis
ubi tale praesidi-
um petunt, tutum
non est in totam
cojici: aequè ut
nec gracilibus &
imbecillis, qui
aestate calida &
sicca, & longa
via peracta, re-
frigeratione in-
digent. Nam ne-
que his tutus
est frigidi solij
usus, nisi prius
fuerint in balneo
& qualiter ex-
calfacti. Siquidè
simile quiddam
nobis videtur
accidere, quum
in frigidum so-
lium post bal-
neum ingredimur,
ei quod ferro
accidit, quum
tingitur. Etenim
tum refrigeramur,
tum roboramur:
quemadmodum &
illud, ubi candens
jam redditum
frigida mergitur.
Atque huius rei
causa ad imbecilla
corpora inventa
sunt balnea, quae
ea praecalfaciant,
atque ad frigidum
solum praeparant.
Non dissimile
quiddam faciunt,
& qui sine balneo
frigida utuntur,
quum scilicet se
ab exercitatione in-*

curatio quod excrementorum, omni febre est utilissi-
ma. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fusio
tamè, & calor, non itè: sed calor omni febre inimi-
cus est. At fundi aequaliter, id solidis quod animalis
partibus, non est alienum: succis certè non perpetuo est uti-
le: sed quoties in animali vel phlegmone, vel affe-
ctus phlegmonae similis constitit, vel utraque pleni-
tudo, omnium inimicissimum. Nam phlegmonae qui-
dè, quum calfacti & liquati succi ad ipsas confluunt, au-
gètur. Tunicae verò vasorum, impares plenitudi-
ni, quae jam ex liquatione est repleta spiritu, disten-
duntur, ac vires hoc nomine male habent. Ergo
calidis illis siccisq; affectibus, effusio mordentium
est salubris, liquatioq; eorum contingit citra pericu-
lum. Calfactio tamè noxa non caret. Atque haec quod ex
prima balnei parte optimè administrata sumun-
tur. In secunda autem (quae lavacrum erat) ut febrilia
corpora ex humectatione juvantur, sic ex calore
nihil illis commode accedit. At in tertia refrigeran-
tur innoxie quae fuerant excalfacta, & vires firmā-
tur. Si qua verò & laxata, & justo plus sunt remis-
sa, ea in naturalem redeunt mediocritatè: id quod
quarta balnei pars, quae deterfusio est, indicat. Quip-
pe quibus rite sunt omnia adhibita, iam post frigide
usum adhuc sudat, & omnia ipsis excrementa va-
cuantur. A balneis igitur (ut unam omnium veluti
summam colligam) vacuatur quicquid in corpore vel
humidum, vel fuliginosum praefuit. Reducuntur ad
naturalem symmetriam, tum caro ipsa, tum cutis: cor-
rigitur solidarum partium ariditas: & calor non mo-
do is qui ex lavacro accessit, sed qui etiam praefuit,
ex frigida usu extinguitur. Maximo huius rei do-
cumento est praesidium, quod sentiunt homines ex
hujusmodi balneo, ubi à ferventi sole exiccati,
lavantur. Quippe quum accedat ad id, ritu stipu-
lae aridi, egressi è frigida, illico in naturalem habi-
tum redeunt. Si itaque certam febricitantium natu-
rae haberemus notitiam, non dubitaremus eorum a-
liquos assidue in aquis frigidis citra balneum lava-
re. Quia verò exacta nobis dispositionum non est
notitia, ac maxima ex errore impendet noxa, uti-
que ejusmodi recusamus praesidia, potissimum in fe-
bribus hecticis: quando per has & pauci sanguinis,
& nudum carne, & expers adipis, corpus est reddi-
tum. Etenim juvenis corpulentus, aetatis tempore,
ac in febris summo vigore, modo nulla viscerum
phlegmone subest, sudabit, si in frigida se cojece-
rit. Quod si sit frigida lavationi assuetus, securè re-
medio utetur. Qui autem ex calida & sicca intempe-
rie febricitat hectica, ac potissimum qui jam maras-
modos fiunt, iis ubi tale praesidium petunt, tutum
non est in totam cojici: aequè ut nec gracilibus &
imbecillis, qui aestate calida & sicca, & longa via per-
acta, refrigeratione indigent. Nam neque his tutus
est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo &
qualiter excalfacti. Siquidè simile quiddam nobis
videtur accidere, quum in frigidum solum post
balneum ingredimur, ei quod ferro accidit, quum
tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur:
quemadmodum & illud, ubi candens jam red-
ditum frigida mergitur. Atque huius rei causa ad im-
becilla corpora inventa sunt balnea, quae ea praecal-
faciant, atque ad frigidum solum praeparant. Non
dissimile quiddam faciunt, & qui sine balneo fri-
gida utuntur, quum scilicet se ab exercitatione in-

eam saltu demittunt. Siquidè quod nobis balneum,
id praestat illis exercitatio: ut quae non calfaciat tu-
rum, sed etiam insiti caloris motum à profundo
corpore extrorsum concitet, sic ut & frigida im-
petui occurrat, & quo minus viscerum aliquod fe-
riat, adversetur atque prohibeat. Neque enim im-
psum frigida substantiam, neque eius qualitatem
omnino integram, usque ad viscera pertingere est
salubre. Imò satius & tutius fuerit, solam qualita-
tem, eamque retusam calidorum occursum, descen-
dere. Jam verò qui hectica febricitantes ad bal-
neum accedunt, nisi in frigidam sint demissi, nihil
juvantur, contra quam aliis correpti febribus.
Nam quum iis solidarum partium affectus can-
denti ferro sit similis, calfecisse duntaxat eos hu-
mectasseq; haudquaquam videtur satis (sic enim a-
limentum incrementumque praebuerimus febre) sed
opus est, ut meris in frigidam, extinguamus calo-
rem. Quod si ex violento ipso subitoque frigida
usu male fuerint affecti, utpote in contrariam qua-
litatem mutati, hos licet in toto quod sequitur tem-
pore calfaciendo sanare: quum neque par pericu-
lum sit in frigido affectu, nec in remediis quae illi
adhibentur. Quum autem insanibilis solidarum
partium summa siccitas sit, ad quam per hecticas
febres via expeditissima patet, melius est homi-
nem in frigidam temperiem transferre, ac cui
curationem adhibeamus habere, quam tenden-
tem recta ad interitum sinere, desperatamque illi
salutem facere. Ergo eos qui hectica febriunt, il-
lico omni ratione refrigeremus, antequam pro-
gressi in marasum perveniant. Nam quem jam
occupavit marasmus, hunc neutiquam sanare ten-
taveris. Ipsum tamen alterum transferre maras-
mum quem appellant ex morbo senium, licebit:
ac sic superstitem, non tantum plures dies, sed et-
iam menses servare. In ceteris autem febribus,
quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accē-
derunt, nihil offendes, etiam si in frigidam aegrū
ipsum non merferis. At in hecticis, id quod
remedium affert, calidae solium non est, sed fri-
gida. Quicumque igitur hectica febre laborant,
atque ex iis praecipue, qui jam marasmode tenen-
tur, modo his nulla alia febris, vel ex solo putre-
scente humore, vel cum phlegmone sit adjuncta:
eos omnes audacter lavabis: sed prorsus citra om-
nem laborem, ne resolvantur vires. Sint ergo
tres domus balnei: in quarum primam, quae satis
esse calida debet in lectulo cubans ducatur, ini-
biue nudetur. Illinc autem valida sindone in se-
cundam portari debet: quae non tantum situ sit
media, sed etiam temperie: tanto scilicet prima ca-
lidior, quanto est tertia frigidior. In ea itaque oleo
tepidum super sindone perfundatur. Hoc facto, ad
tertiā ducatur domum, ubi nimirum est solium.
In cuius quidè moretur aqua mediocriter: idque
sustentus sindone, nullaque infusione aquae, cujus-
modi in alijs uti solemus, adhibita, imò nec ca-
piti ejus quicquam infundi velim, quum sit satis
id quoque; bis terve una cum toto corpore in a-
qua mergi, demissa mediocriter deorsum sindo-
ne, ac rursus per quatuor juvenes, qui eum por-
tant, levata. Mox hinc eductus, in frigidam semel
totus tingatur, ne vel brevissimo quidem spa-
cio illie moratus. Protinus verò alter partem ha-
bens

*Exercitatio
praeparat
corpus ad bal-
neum frigida
Exercitatio
usus.*

*Hecticos, ad balneum
accedunt, nihil
tamen sanari
nisi in frigida
sint demissi.*

*Siccitatem
summam
solidarum
partium
curare
insanibilem.*

*Hectici
sum esse
omni
ratione
regerandos.
Marasmi
esse incur-
abilem.
Senium
et morbo.*

*Balnei
primam
domum
designat
prior.
Hecticos
quomodo
sint
portandi
quatuor
personae
balneum
tractandi.*

*Balnea cali-
da ad solij
frigidi usum
corpora pra-
parant.*

bens calentem sindonē, ipsi injiciat. Deinde æger suo in lectulo collocatus, primū spōgiis detergeatur: dein mollibus linteis, quoad fieri potest, blandissimē. Postea verō unctus, amictusq; vestibus, rursus super lectulo reducatur in aliquā aliā domū vicinā, ubi cibari consuevit, inibiq; nutriatur. Porro humidum esse ac frigidū q̄ hec̄ticis febribus sit cōducturum, nemo nescit. Ejusmodi verō sunt tū cremor ptisanæ, quū frigidus sumitur: tū alica, similiter ptisanæ cremori cōdita: id verō est ex aqua, & exiguo porri, & anetho, tū sale, oleo, & aceto. Cōmodus præterea iis qui sic laborant, est & exiguus in aqua frigida panis. Cæterum nullius horū pura frigiditas esse decebit, sicuti potio nis. Quippe hæc maturē tū incalescit, tū per corpus digeritur. Illa, quū plusculum temporis in vetriculo morētur, ipsum fortassis refrigerāt, si fuerint immodicē frigida. Ubi autē febris jā traxerit, dandum quoq; asininum lac est: sed diligenter observato, ne in ventre cōcreseat. Cavebitur autē id, si mel illi admisceas: aut salis, quo vescimur, exiguum. Abstinendum tamē in hec̄ticis, quoad fieri poterit, à melle est, atq; idcirco etiam à mulla: quippe protinus in bilē cōvertitur, & sicciore, acriorisq; caloris febres reddit. Dandus itaq; principio asinini lactis est non plus cyathus: sed inducta in ipsum cubiculum asina, quò nullum tēpus interponatur: æger autē id protinus bibat. At verō si corruptū in vêtre lac fuerit, pulsus parvos atque inæquales inuenies, quales accidunt in compressione vetriculi. Sin autē nō sit corruptū, & majores & valentiores eos, q̄ pro consuetudine, inuenies. Qua ratione observata, licebit tū lactis, tum aliorum ciborū omnium modū sensim augere. Qui igitur jam marasmo vexantur, eos, sicuti dictum est, lavabis. Quos verō hec̄tica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiā lavas sine subjecta sindone, utpote viribus adhuc valētes. At qui ex his minus sunt valentes, eos nō tutum est pmittere in frigidā natationē descendere, sed foris ipsos poti⁹ perfundere, primū tepida, secūdō frigida, qualis fontana est. Ac si quidē omnia curiosē administrentur, utiq; sanandi jam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error vel in uno cōmittatur, is reliqua subvertit ōnia. Quippe quum exitialis horum affectus sit, ne levissimū quidem errorē tolerat. Ac si quis talium est servatus, huic carnosam tantū portionē marasmus jā occupaverat. Ipsi verō solidis reficcat, fieri nequit ut homo prorsus sanetur. Etenim primū ejusmodi febris propriā partium humiditatē, ex qua nutriūtur, depascit: hinc transit ad genus carnosum: deinde solidas populatur particulas. Vocatur autē caro tantū ea quæ in musculo est. Nā quæ in visceribus cōspiciuntur, non carnes, sed parēchymata nominantur. Porro singulārū particularū substantiæ moles, ex tali maximē cōpleta est natura, q̄ & perire, & regigni possit. At verō nec fibrosa, nec nervosa, membranosa natura eandē generationē habere cernitur: nec fas est ejusmodi singularū partiū fibras à febrib. malignis liquari, perinde ut carnes: quando animal ipsum, priusq̄ hæc prorsus sint exiccata, interemerint. Sanē sunt & quas marasmodos febres vocāt, universæ ex earū genere quæ colliquant: sed in eo

differunt q̄ in his quæ portio carnis colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur: in illis defluit in ventrem. Nam quemadmodū quo magis animal vel adipe, vel carne abundat, eò q̄ ab ipsius carnis, dū in craticulis torrētur, defluit, copiosius cernitur: ad eundē modum in calidissimis, febrib. si carnes humidæ ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas. Sin absq; adipe & sicca sint, insensibiliter absumūtur, & in febres marasmodos trāseunt. Hæc præmonitus, colliquantium febriū iisdem methodis curam ages, tum ad frigidā, exhibēdā, quam primū properas, tum iis quæ refrigerent & humectent, nutriendis. Mulsam verō inimicissimā illis esse censebimus.

GALENI PERGAMENI

de medendi methodo, Lib. XI.

MOdum igitur curandarū ephemerarū, in octavo hujus operis cōmentario: cōtinentiū, in nono: hec̄ticarū deniq; in decimo satis accuratē exposuimus. Nunc verō, quēadmodū quæ ex putrescentibus humoribus excitantur, methodo sint sanandæ, aggredi est animus. Duo autē sunt scopi curationis in universū: affectus nempe ipse atq; ægrotantis tēperies. Affectus quippe: ex iis, quæ sibi contraria sint adhibēda esse remedia indicat. Laborantis verō tēperies, simul cum ipso morbo, mensurā contrarietatis definit. Potest etiam ambiens nos aēr (qui ex cœli statu, anni tempore, ac regionis natura suas mutationes fortitur) unam efficere indicationē, ac vel ægritudinis causis, vel sanitatis, annumerari. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos utimur, prima & ultima dicitur sanitatis causa, diversis tamē rationib. Dicitur quippe ultima tempore: quandoquidē, & natura, & ars, & fortuna, priores, secundū tempus, eo sanitatis existūt causæ. Prima verō est, quatenus id primò laborantis corpus tangit, alteratq; eius effectū. Ars siquidem artifexq; & fortuna, nō per se primū, sed per auxilia morbos profligant, materiæq; interventu operantur: quemadmodum per seipsam natura. Quæ nimirum ex tum spiritus, tum solidarū particularium (quæ ex semine genitali oriuntur) tū carnosarum substantia, constat. Quarum trium substantiarum singulæ propriam pro natura suam qualitatem, tum quantitatem habent. Ac qualitas quidem earum, ex congrua temperie humidi, sicci, calidi, & frigidi efficitur. Quantitas verò solidarum partium par semper manet: sed iis qui adhuc inaugētur, numero duntaxat: qui verò absoluti jam sunt: etiam magnitudine. Carnosæ verò substantiæ magnitudo variatur, etiam si jam nō augeatur animans. Pari modo & substantia spiritus * propemodum quolibet momento tum major, tū minor conspicitur. Ergo ad duos illos scopos prius traditos, etiā unica virtus addetur, juxta earum trium substantiarū enumeratio nem: aut tēperies per se distinguetur quæ & ipsa rursus bifariā scinditur: nempe & in originalem naturā, & in acquisitivam dispositionem: sic nimirū, ut ex istis, & aliis quæ prius dicta sunt, propria quædam cujusq; remediorū sit indicatio. Ex ætate etiā, vitæ studiis, consuetudineq; remediorum indicationes sumuntur. Proponatur igitur nobis

Colliquantium febrium curatio.

Curationis scopi sunt duo: affectus & ægri tēperies. Tēperies laborantis quid indicet. Aër unde suas mutationes fortitur.

Auxilium cur primæ et ultimæ sanitatis causa dicatur.

Fortuna per auxilia morbos profligat. Natura ex quibus constet. Solida partes ex semine generantur.

Virtutē esse unam ex curationis scopis.

Tēperies est duplex. Indicationes remediorum unde sumantur.

*Intemperie
per contrari
am aliam sa
vandam esse.*

nobis intemperies quædam curanda: ea utiq; per contrariam intemperiem sanabitur. At quoniam universi febrium generis intemperies est calor, utiq; per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materias præsidiorum pervenimus, eodem etiã modo à singulis reliquorum generum primorum, ad eas est descendendum: veluti à virtute, quæ morbo ceu adversatrix opponitur, & cui omni ratione opitulari & subvenire est cõfiliũ. Quare virtus quidem ipsa erit unus ac pri

*Custodiam
fieri per simi
lia.*

*Sublatio
morbi fit per
contraria.*

*Partium sin
gula per quæ
custodienda
sint.*

mus scopus, alter aut atq; secundus, q̃ ab ea significatur, nempe custodia ipsius. Pari etiã ratione, morbus q̃dem dicitur esse primus scopus: secundus autẽ, sublatio ipsius. At verò custodia, similiũ indicabit exhibitionẽ: sublatio, cõtrariorũ. Quo

*Temperies
optima, sem
per servanda.
Intemperies
vitiosa quan
do servanda,
et quando sit
alteranda.*

niam verò virium substantia tum ex spiritu, tũ ex carnosa specie, tũ solidis ipsis cõpletur: ex iis quæ similia sunt, moliri cuiq; suam custodiã oportet. Spiritui, ex respiratione, transpiratione, & vapo

*Indicantium
scoporum di
gnitates esse
expendendas*

re qui ex sanguine attollitur. Solidorum verò ge

*Synochos fe
bris quæ di
catur.
Synochorum
curatio.*

neri, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturam, quæ in medio humidorum ac soli

*Putrescunt
calida & hu
mida, quæ in
simili loco cõ
clusa, perfla
ri nõ possunt.*

dorum corporum est. Porro cuiusq; horum modum ex conservandæ substantiæ modo invenies: qualitatem verò, ex ipsius temperie. Quum autẽ horũ cuiusq; temperies, vel optima sit, vel aliqua

tenuis vitiosa: quæ q̃dem optima est, semp̃ servari debet. Quæ verò omnino vitio nõ caret, hæc in sanis q̃dem vel servanda est, vel alteranda: in ægris verò servanda. Quum autẽ diversitas non parva sit

in partium animalis temperamẽto, propriã cuiq; mensurã, eorũ quæ ipsi similia sint, oportet accommodare. Nempe ei q̃ terrea est magis, eorũ q̃ magis sint terrea: & ei quæ humidior est, eorum quæ sint humidiora: ac sic de cæteris cõstitutionibus. Hinc verò jã materiæ particulares oēs in cibis, portione, aëre, & omnibus peragi solitis, inveniendæ sunt. Quod si mutuò inter se pugnent aliquæ indicationes, ppendenda * indicantium scoporũ tũ magnitudo tum dignitas est, efficiendumq; id q̃ tum majores, tũ digniores scopi admonent. Quo

rum dignitas q̃dem judicanda est, vel vitæ, vel sanitatis respectu. Magnitudo autẽ est duplex: vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis è naturali habitu. His igitur præmissis methodis, jã in febrium genere exercitemur, q̃ ex putredine nascitur. Ac primum ab illa febre exordiamur, quæ ex putredine humorũ in maximis vasis, vel in omni

bus simul cõputrescentiũ oritur: quãq; necessum est synochon, hoc est, continentem existere. Fieri autem nequit, ut talis febris sanetur, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanè inhiberi, causa manente nõ potest. Quare submovenda ipsius causa est, si modò putredo ipsa prior, mox post ipsam, febris sanari debeat. Ostensum autẽ est, illa tantum putrescere corpora, quæ quum calida humidaq; natura sint neq; perflata, neq; ventilata, in calido humidoq; loco includuntur. Quod si in motu sint, ventilenturq; ac perflentur, posse ea nõ putria, in

tegraq; servari: potissimũ quæcunq; corpora sua ipsorum natura reguntur: ut animalium, stirpiumq; Ea nanq; ab initio cõgenitos secũ motus habent, quib. supflua excernat. Nec minus etiã est demonstratum, quanta sit tum respirationis, tum pulsum utilitas, ad perflatum, ventilationemq; corporis, atq; ejus nativum calorem tuendum. Itaq; si

quid in eo manifestè putrescere debeat, dictas transpirationes esse impeditas oportet. Fieri autẽ non potest, ut illæ per totũ sistantur animal, nisi finibus vasorũ stipatis, vel tota cute. Porro accidere in finibus vasorũ stipatio potest, vel vehementi extrinsecus refrigeratione, vel ex succorũ, qui ex

trorsum in ipsos confertim ruerint, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex iis exercitationib. quæ in palæstra, vel aliàs obeuntur, & itinere laborioso: vel ambientis statu, quũ ex rigore in æstum mutatus est subito. Nonnullis verò fervētes ira succi, ac foras simul impetu ruētes, effecerunt dictas stipationes. Quisquis igitur propositã sanaturus est febrem, hic simul causã ejus oportet adimat: simul calorem qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum qui dem ille refrigerandus sit, prius est dictũ. Causam verò adimi oportebit, propria cuiq; naturæ inventa cõtrarietate. Utiq; si ex frigida causa stipa

tum, densumq; redditũ corpus est, relaxato eo, omniq; ratione rarefacto. Sin ex obstructione ita est affectũ, hac reclusa. Quod verò recludet, hic quoq; ad cõtrarietatis indicationẽ attentus invenies. Ubi nanq; abundantia humorum est, hos vacuabis. Ubi crassi, glutinosiq; sunt, eos tenues & fluxiles reddes. Si plures causæ aliquando coibũt, omnibus per contraria occures. In ejusmodi autẽ dictarum causarum cõplexu, cœpisse à sanguinis missione conveniet: ac abundantia vacuata, tum

ad extenuandos humores venire. Ab hoc ad remittenda quæ sunt cõstricta, & rarefacienda quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicativè sumenda sunt. Quũ autem ciborum atq; potionũ, necnõ spirituum decens quantitas qualitasq; virtutem ipsam custodiant: ac modus quidem quantitatis ipsorum à virtutis substantia inveniat, qualitatis verò à temperie: nimirũ estimari debet, quemadmodum vires quæ corpus regunt, se habet. Quæ quidem si sint valentes, au

daçter vacuantibus præidiis uteris. Sin infirmiores sint redditæ, vacuantia remedia cautius administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desumendus est. Quippe quum vires legitimum robur suum habent, & morbi summus vigor brevi expectatur futurus, tenuissimo cibo uti licet. Ubi verò infirmiores fuerint, non licet sine gravi noxa: sed adjicere ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore virium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, unã cum solidorum corporum temperamento præsentis, sumenda est.

Tempus autem nutriendi, quod quidem ad reliquas febres pertinet quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicitur. Quæ verò unicũ tantum à principio ad finem usq; accessionem habent, synochiq; dicuntur (de quibus impræsentiarum est sermo) in iis tunc offerendus est cibus, dũ ægri melius se habent: eoquẽ potissimum diei tempore, quo in sanitate prius cibari erant fueri. Est autem frigida quoque iis propinanda, quum succi & jam concoquuntur, & crassitudo eorum est extenuata. Cæterum jã operæ precium est explicare, quot sint febrium, quas putredo accendit in universum differentia. Dein, quanam sit ipsius generis earum communis utilium auxiliorum indicatio. Mox, quæ sit singulatim cuiusque propria. Quod igitur ad differentias pertinet,

*Transpirationes
prohibitæ
singulas
stipationes
finibus
rumen
contin*

*Stipatio
curatio*

*Nutritio
quantitas
à virtute
qualitas
à temperie
sumenda*

*Tenuis
bo quæ
utenda*

*Nutritio
qualitas
affectus
periculi
menda*

*Nutritio
tempus
le sit in
chis apt*

*Frigida
do sit p
nada in
laboran
nacho.*

net, prima sanè ex eo est, quod causæ ipsi⁹ putredinis, vel adfunt, vel non adfunt. Secunda ex eo, quod p totū animal, aut ejus partē aliquā, diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone, aut citra hāc. Ergo ordiamur ab humorum putredine, quæ primū indicās in divisione fuit. Cujus quidē natura, ad curationē erit inventionis principiū. Porro natura putredinis est mutatio totius putrescēris corporis ad corruptelam, à calido externo. Non .n. profectō à proprio calore corrumpitur quicquā : imò prius cōtrā, quicquid in rebus subsistit, id augetur, roboratur, sanum est, ac vivit, dum pprio calore regitur : veluti nimirū ipsa animalium corpora, quandiu servatur pprius eorum calor, in cordis quidem corpore, p respirationem : in reliquis omnibus partibus, tum per cōmunitatem quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratione, perspirationē dicitur. His verò læsis, unā etiā calor nativus læditur. Alter verò quidā alienus, ac præter naturam corporib⁹ excitatus, primum quidem ipsos succos, ppter humiditatē putrefacit corrumpitq[;]. Spacio verò, tum adipem invadit, tum etiam carnem. Putredinem in corporibus ortam sanabimus, id quod jam corruptum est, omni ratione vacuantes : quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante pspiratu ad exactam symmetriā reducentes. Ac vacuationē quidem illius per urinam, dejectiones, sudores, vomitumq[;] moliemur, si putridus humor ad os ventriculi aliquādo sua sponte impetum faciat. Post hanc dimotiones mediocres, unā cum ambientis bona temperie adhibebimus. Causam verò putredinis, si adhuc perseveret in corpore, per cōtraria tollemus. Itaq[;] quoniam trāspirationis prohibitio fuit occasio putredinis, hanc submovere oportet. Quia verò ea (quemadmodū exposuimus) à variis causis est orta, ipsarū singulis cōtraria medendi ratione occurremus. Sciendū tamē est, nō easdē omnes partes vacuationes, medicamentāve requirere : cum & temperamentis, & posituris, & forma, & omni deniq[;] cōstitutione, naturaq[;] inter se diffideant. Cum autem major pars medicamentorū vacuatiū, febrem ipsam adaugent, utpote facultate calida & sicca : deligenda medico sunt, que citra calfactionem siccationemq[;] valentem, ipsas vacuationes moliantur : cujusmodi sunt, cremor ptisanæ, aqua mulsa, oxymeli, apomeli, & apij radix, in qua, quæ potui datur, incocta. Hæc autē ipsa ventri sunt quæ idonea : qui si nihil reddat, injicienda per clysterem mulsa cum oleo est. Sanè totum corpus, priusquā id vacuaris, rarefaciendum nō est. Ubi vacuatū sit, utiq[;] licebit id medicamento aliquo, cui calor tepidus insit, rarefacias : cujusmodi est quod ex chamælo conficitur. Hoc tempore si vinū quoq[;] aquosum bibatur, id omnes vacuationes promoverit. Idē faciet & temperatū dulcis aquæ lavacrū. Cæterū ubi magnitudo febris obstat, sicuti in cōtinentibus, nec vino est utendum, nec lavacro, nec iis, quæ habitū rarefaciunt, unctionib⁹. Jam verò id genus ardentissimis febribus, potus frigida confert : nisi subsint putrescentes humores, per alvum, urinas, vel sudores

vacuandi. In universum autē, dum plura simul coeunt symptomata, idq[;] maximum omnium est, aggredi oportet, atq[;] ei vel soli, vel magis q[;] cæteris, subvenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantū requirimus vires ipsius pulsus firmas : sicuti nec ejus facultatis quæ voluntariū motū largitur, sed multo magis ipsius cōcoctricis. Ergo si & vires cūctæ valentes sint, & ardentissima febris, & cōcoctionis notæ planè evidentes, frigida intrepidè ppinabis. Quod si etiā æger bona corporis habitudine sit, tū status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidam nationē hunc dimittas, haudquāq[;] lædetur. At si mediocris est febris, & vires non validæ, sed cum notis cōcoctionis, iis qui ita se habent, balneum prodest, & vini potio : tum verò ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt : idq[;] multo magis, cum ambiens est frigidus. Neq[;] enim aut frigidam in balneo lotionē, aut frigidam potionē in ejusmodi cœli statu ferè expetunt, utpote inspirationibus assidue refrigerati : cum si quando in frigido ambiente vehementer uriaegrotū cōtingat, exigua salutis ejus habenda spes est. Si verò nec cōcoctionis habeat signa, nec vires validas, servari is planè nō potest. Quo minus aut idem lavandus in balneo est, aut medicamentis iis quæ rarefaciunt, ungendus, aut vinū illi dandum, frigida ve offerenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudētis consilii fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere salutis. Febris igitur, pro ut febris est, aqua frigida est perpetuò remedium. Quod verò ad alia pertinet, nō perpetuò. Veluti cum ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & redundantiam in toto esse corpore, tum virtutē nō imbecillam. In ejusmodi etenim complexionibus, cum multa præter naturā in corpore sint, quædam eorū præcedentes causæ erunt : veluti redundantia cum glutinosis & crassis humoribus. Horū nanq[;] vitio obstructio est orta : quæ morbus instrumentalis est, eorū quæ obstructa sunt corporū. Hanc symptoma sequutū est, ipsa transpirationis cohibitio : quā rursus putredo humorū excepit, antecedens quædā ipsius febris causa. Ergo qui febrē curare vult, necesse est inhibeat putredinem. Ac sic duæ indicationes se exhibent, altera à febre, altera à putredine. Atq[;] à febre rursus duæ : scilicet ut portio febris, quæ jam accensa est, percuretur : quæ verò etiam nūc ignitur, inhibeatur. Aliæ autem duæ rursus à putredine erunt indicationes : ut & quod putredinis jam factum est, sanes : & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro q[;] in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rursus alia duæ indicationes nascentur : tum ut quod retentum est, vacuetur : tum quod retinendum est, prohibeatur. Prohibetur sanè, si obstructioni medeamur. Cujus quoq[;] ipsius, quod jam occupavit, sanandū est, per ea quæ obstructa liberant : quod futurū est, propulsandum, per ea nimirum, quæ affluxum obstructentium succorum compescunt. Ergo quod ultimū in ipsa methodo resolutiva est inventum, id primū omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si iis auxiliis, quæ obstructiones eximant, uti, non vacuata

Frigida quādo sit propinanda intrepidè febris synocha afflicta.

Frigida natione quando possimus uti in continentibus febribus.

Vinum quando exhiberi possit per continentibus febres.

Letalia signa in synocha.

Infamanda salubria medicamenta non esse ubi salus est deplorata.

Febris, ut febris, aqua frigida est perpetuò remedium.

Obstructio quid.

Putredo est antecedens ipsius febris causa.

nus à missione sanguinis, pro naturæ suæ ratione homo se haberet. Verum quoniā nec obstructio, nec putredo per solam curari missionē sanguinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spaciū curationis debet, quo minus intempestive nutrire necessitate ulla cogamur. Quantum nanq; ad huiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriendum non est. Siquidem ostensum prius est, solum virtutis respectū esse, qui nutrimento præbeat indicationē. At verò evacuationis ratione, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterū, aut febrem, si nutris, augere: aut vires, si non nutris, deicere. Satiū itaque fuerit aliquid sanguinis, quod propriū partibus animalis nutrimentū sit, relinquo, ac ipse paucissimas sorbitiones, portionēq; exhibere contentus sis: quibus utique ceu medicamentis, potius q̄ nutrimentis egemus. Porro cum ars ipsa tota sit magna nō levissima ejus pars est, scientia ordinandi victus: quæ utique ex his maximè remediis constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus & clysteribus. Cæterum calfacere præcordia cataplasmatibus aut perfusionibus, nō est perpetuū tutum: sed in iis tantū agris, quibus in toto corpore nullum errat superfluum. Cæteris omnibus extrema est perniciēs. Nam siue redundantia utraque sit, vel ad vasa, vel juxta vires: siue etiam in una parte pluribusve vitiosa excrementa habeantur, omnia ad partem exalfectam trahuntur, inibiq; sepe phlegmonas excitant. Quare in ejusmodi morbis divites potius q̄ pauperes perperam solent curari. Nempe & quod raro illis mittatur sanguis, vel si maximè tali egeant auxilio: & quod medici, ut agere aliquid semper videantur, de profundendis præcordiis maximè sint solliciti. Itaq; accidit, ut illo ipso tempore phlegmone incipiant divites, quo jam pauperibus morbus propemodum perductus ad finem. Saluberrimū igitur est in febribus venam incidere, non synochis modo, verum etiam aliis omnibus, quas putrescens humor cōcit: ubi præsertim neque ætas, nec vires prohibent: Levata enim quæ corpus nostrum regit natura, exonerataque eo quo veluti sarcina premitur, haud ægrè quod reliquū est, vincet: concoquens quod concoqui est habile, & excernens quod potest excerni. Porro ubi humor ad locū affectum confluit, remittere repellereq; hunc expedit, nō ad ipsum trahere. Ad repellentia remedia, quæ certè astringendi vim obtinent, in principiis idonea sunt duplici ratione: & quod robur affectis particulis inferant (unde minus promptè affluxū excrementorum in se recipiūt) & quod eorū quæ in iis jam recepta sunt, tenuissimū extrorsum exprimāt. Quod si tum fluxio humorū per ea remedia cōpescitur, tum densitas quæ in affecta particula relicta est, crassiora detinet, jam tempestiva relaxatio est, quod ea quæ retenta sunt, vacues. Præcipue autem astringentibus est utendū, ubi in jecur aut ventriculum, supervacuum aliquid profluit: quando & è primoribus admodū hæ partes sunt: & ut munus suū obeant, vel in ipsis morbis est necessariū, cum alimentū corpori universo cōficiāt. Quare ciborū cōcoctio, siue ea in jecinore, siue in ventriculo sit in prospera, febres intēdit, ac suæ vitio exacerbat. Quo ma-

gis in omni febre, ciborū cōcoctioni prospicere magnoperè oportet. Atq; eius rei gratia, roboris quoq; instrumentorū quib. perficitur, non levis habēda est cura. Si ergo vel minima sit suspicio jecur aut ventriculū laborare, absinthiū propter oleo incoquemus, ac eas particulas perfundemus. Cum autē duplex in omni absinthio facultas sit, utiq; in pontico astringendi facultas nō parva est. In reliquis omnibus amara quidē qualitas est vehementissima: astrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde ponticū ad jecinoris & ventris phlegmonas elegi præstat. Est autē id tum folio, tum flore longè q̄ cætera absinthia minore. Odor quoq; huic nō modo nō insuavis, verum etiā quid aromati-cum referēs. Reliquis omnibus planè est fœdus. Quare hæc fugere oportet, uti autē semper pontico. Etiā reliquorū medicamentorū, in quibus mista cum amaritudine astringendi vis est, aliquid in oleū cōjicere, atq; ad eundem modū uti licet. Amara siquidē qualitas præit, viāq; astringenti facit. Ac si quidē intendere astrictionē studeas, oleū ipsum etiā astringendi vim habeat: cuiusmodi est q̄ Hispanū vocant, & quæcūq; cum oleæ frōdib. præparantur. Sin leviori uti astrictione placet, aliud olei genus præparabis, præcipue quod tenuiū sit partiū: quod genus Sabinum est. Optimū tamen ubi astringere vehementius expedit, est histricū oleū. In penuria verò absinthij, inter initia vel melinū, vel mastichinū, vel lentiscinum satisfecerit. Quod si exigua febris sit, etiam unguentū nardinū: quod utiq; valentius iis omnibus calfacit. Quare si aliorū copia nō est, invalescente febre rosaceū illi admiscebis. Sanè myrtini astrictio idonea nō est: cum crassiorū sit partiū, q̄ ut altè descendere possit. Ad eundē verò modū et cataplasma cōpositam vim obtineat, ex ea quæ tenuiū sit partiū, ac relaxet: tum etiā ex amara, astringenteq; Superet autē in iis, ubi scilicet tum reprimere, tum robur addere studemus, quod astringat. Ubi tenuare ac digerere, amarū: ubi evocare, quæ ex relaxatibus tenuiū maximè sint partiū. Siquidem quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus moventib. sunt accommodata. Cataplasmate aut quod sequitur fuimus nos feliciter usi, cōtra jecinoris phlegmonē. & olei in quo absinthium decoctū fuerit, & cydoniorū decocti, sing. unc. ij. myrobalanorū & rad. ireos, pulverisatorum, sing. drach. ij. ceræ quod sit satis. Fiat emplastrū juxta artis præcepta. Coquitur & in vino austero cydoniū, ex ipsiusq; carne aliqd ejusmodi cataplasmatibus inditur: ubi videlicet & quod cōfluit copiosum est, & particula ipsa infirmior: tunc siquidē stringentem vim inaugemus. At verò nec colo laborante, nec reliquorū intestinorum quovis, nec musculis qui in præcordiis habent, aut ipso peritonæo, miscenda astringentia sunt. Sed nec cum vesica malè habet, uterusve: modo nihil ultra ad locum fluat, nec sanguinis redundantia, nec excrementorū copia, in toto sit corpore. Porro renes & pectus in media prædictorum cōditione cōsistunt: quantū scilicet à ventriculi jecinorisq; sollicitudine absunt, tantum reliquis antecellentia. Siquidē in ventriculo jecinoreq; resolvi robur perniciosissimū est, minimè in

Concoctione ciborum magnoperè providendum esse in singulis febribus. Absinthium hepati optime latur. Absinthij duplex facultas.

Absinthium ponticū esse eligendum ad iecoris & ventris phlegmonas.

Amara qualitas etiam astringenti facit. Olei species diversa.

Myrtinum oleum esse crassiorum partiū, quod ut altè descendere possit.

Phlegmonis hepati commodissimum cataplasma.

Astringentibus in quarum partiū affectibus non sit utendum.

illis periculosum. In his verò est quidem periculosum, nò tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore aut pulmone, aliquando sit opus. At in liene curando, si vel æger exiis sit, quæ atræ bilis excrementum naturaliter congerant, vel etià eo tempore succus in eo redundet, necesse est reliquis astringentia permisceas, quò visceris robur custodias: ita enim & excrementa ad se trahet, & cū corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculū excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astringendum nò est, aut parçissimè. Ad hæc, si in quavis phlegmone obsessa particula, calor tumore superet, agendum ut sensim per ea quæ tepentē calorem obtinent, digeratur: quod genus est tum lini semen, tum chamamelū. Quibus adjici vel hordei, vel fabarū farina debet: quippe quorū neutrum exalfacit. Sæpe verò & artomelite ad ejusmodi phlegmonas utimur: cui aquæ aliquid admiscemus. Ad lienē verò etià aceti aliquando aliquid. Si verò laborantis phlegmone partis calor nò multū à natura recesserit, tumor autē ipse fuerit notabilis, digerere haud timidè sine aqua debebis, etià scœnigræci aliquid supradictis immiscens. Si veluti scirrhusa duritie phlegmone sit, propter humoris quē cōtinet vel crassitudinē, vel lentorem tum aceti aliquid, tum amara medicamenta, simul immiscenda curabis, potissimū in liene. Etenim viscus hoc, ppter ea quòd ab jecinore crassum humorē trahit, ejusmodi humoris occasione plerunq; laborat. Quo magis cataplasmata quæ ex oxymelite, & absinthio, & cappari fiunt, illi sunt idonea. Cæterū nec eorum qui ex putrescente humore febricitat, quenq; ipse lavabo: nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q̃ supervacua purgarim, utar. His vacuatis, nò solum audacter lavem, sed etià cataplasmatibus utar: in aliis quidē membris, iis quæ relaxent: in jecinore verò ac ventriculo, additis etiā quæ astringant mediocriter. Parcius autē ad pectus, q̃ ad ea, utendum astringentibus est: quando talia humores qui phlegmonē excitat, in pulmones & cor nōnunq; reprimūt. Ac cibis potius horum firmitudini est consulendū. Neq; enim sicuti in jecinore & ventriculo phlegmone laborantibus, ita hīc tenuissimo victu est utendū. Ac longè quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendū ab astringentibus est: quando in eo ipsis quoq; relaxantibus admiscendum aliquid acriū quodāmodo, & evidenter calfacientiū est. Quippe foras trahere, potius 50 quàm reprimere, in eo debemus. Itaq; etiā cucurbitula, in iis qui sic laborāt, si prius sint vacuati, applicabit. Si verò abundantia succorum adsit, magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transferet, q̃ ex toto corpore attrahet in utrūque Eadem ratione, neq; in cerebri & ejus membranarum phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio utemur: verū ubi nec influit adhuc quicq; & totū corpus prius est vacuatū. At reprimētibus in his quoq; inter initia utendū. Sed cū per cranii ossa mediā occupatā regionē, in altū descendere reprimentiū vim cupimus, eorū quæ præire, ac deducere ea possunt, aliquid reprimētibus admiscebimus. Ea sunt, quorum substantia ex tenuibus partibus cōstat. Sane acetū nò modo te-

Phlegmonas
quarum calor
tumorem
superat, quibus
curare
medicamentis
debeant.

Artomeli.

Phlegmona
quarum calor
tumorem
superat, qua
ratione curanda
sint.

Acetum quādo
miscendū
phlegmonarum
medicamentis.

Lienis affecto
qua medicamenta
conveniant.

Putrida febre
detentos, nec
laxandos, nec
relaxandos esse,
ante quam corpus
vacuatum fuerit.

Hepatis cataplasma
est miscenda
astringentia.
Pectore affecto
parcius
miscenda est
cataplasma
astringentia.

Pulmone inflammato,
abstinendum
ab astringentibus.

Pulmoni inflammato,
applicandam
cucurbitulā
esse, si prius
fuerit corpus
vacuatum.

Cerebri & membranarum
eius inflammationibus,
quando cucurbita
conveniant.

Tenuia quādo
miscenda
sint astringentibus.
Aceti facultas.

nuium partium est, sed etiā nò mediocrē reprimendi vim obtinet. Quo profectò rationabilius in principijs affectuum ipso utimur, rosaceo admiscentes. Procedente verò tempore, etiā spodylij & serpylli aliquid miscēt: quò scilicet tempore trahere ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōvenit. Sane ad eum modū & castoreo utimur: cū tamē ipso in aliis phlegmonis minimè utamur, q̃vis etiā in summa inclinatione consistant. Est nanq; 10 calidius id, q̃ ut phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singularū particularum meatus, q̃ iis ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, vetriculo, mesenterio, & jecinoris cōcavis, intestinū rectū. Renibus, vesicæ, jecinoris gibbis, venæ cavæ, arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habent, eum qui vesicæ inservit. Pulmonibus & pectori, arteriā asperam, atq; fauces. Cerebro & ejus involucris, eum qui per palatū & nares descēdit. Paratur fluxibilitas 20 iis quidem quæ per sedem excerni debent, mulsa, & cibis iis qui ventrem liquant, & pharmacis quæ modicè proritare possunt. Ad ventriculum verò, jecur & lienē, si quādo phlegmone sint vexata, nec mulsa ipsa est utilis: quoniā ilicò in bilem transit, ac viscerū phlegmonas auget. Excrementa autē, ut cum urina excernantur, diureticis promovebis: quemadmodū quæ in pectore & pulmone hæret, iis quæ tussim excitant, evacua 30 bis. Porro balneū in remissione febris administratū, corpore jam mediocriter transpiratē, non exiguū cōmodum affert, omnia ex eo tum fuliginosa excrementa, tum humida educens. Curandum tamē est primò, ut citra horrorem administretur. Secundò, ut nullum primæ notæ viscus sit imbecillū. Tertiò deniq; ne multitudo crudi humoris in primis venis cōtineatur. Horror siquidem & auget, & gignit febrē. Partes verò imbecillæ, per balneū liquatos humores multò facilius alliciunt: & quòd succi liquati sint, & q̃ via 40 dilatata. At crudorū humorū copia in totū corpus digerit. Horū si nihil obstat, ex balneis duo hæc agro cōpendia accedēt: & quòd redundantiæ humorū vacuabitur aliquid, & quòd multū transpirabit caloris febrilis. At verò cū particula, quā obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit, febris ipsius veluti focus sit: si ei propter calorem suū sponte trahēti, alia quæpiā occasio extrinsecus, ex iis quæ potestate exalfaciant, accesserit, necesse est affectū intendi. Si quis aut prius toto vacuato corpore, relaxantibus curet, 50 ubi scilicet maxima febris nò adest, utiq; prodesse aliquādo potest. Quo tempore etiā lavare citra noxā licet. Cavendū tamē à frigido solio iis est: quādo & crudi & putrescentes succi, minus apti sic ad exhalādum redduntur. Itaq; in progressu morbi, ubi & assumpta jam supervacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia cōcocta, & cataplasmatibus relaxantibus, & balneis sine periculo utare. Porro aptissimū in febribus quæ intermittunt 60 & repetunt, tempus est, cū exhalare febrilis calor jam cœperit. Statim siquidem corpus ad nutrimentum præparant: huius quoq; opportuno tempore ex duplici cōjectato respectu, nēpe summo præcedētis accessionis vigore, & future principio. Ad hæc nanque spectantes, operam dabi-

Castoreum
esse calidius
quam ut
sentiat
phlegmonis.
Partium
singularū
meatus
esse
fluxiles.

Fluxibilitas
meatus
medicamentis
paratur.

Mulsa quæ
non
convenit.

Balneum
quod
conducit.

Balneum
quod
modo
administrandum.

Balneum
duplex.

Balneum
apertissimum
tempus
intermittentibus
quæ
nam sit.
Nutriendi
tempus
conjectum.

mus, ut quod longissimè ab utroque nutriamus. Verum si febris ipsa sit continens, constat eam brevi finientem. Si igitur ultra septimum ne utique progressura videtur, prorsus continendus à cibo aeger est, si virtutem non defutura conjicimus. Si ad nonum, aut undecimum, aut quartumdecimum usque progressura videatur, aut etiam finienda septimo, ceterum aeger vires infirmiores habere, quam ut in tantum tempus, sufficiat, necessum erit nutrire, ac deligere id, quod minus sit noxium. Etenim ubi vel jecur, vel ventriculus phlegmone prehenditur, perniciosissimum est ante accessionem cibare. Ubi hæc abest, quibus infirma est virtus, utilissimum. Porro summum vigorem febrilis accessionis expendes, an circa magnitudinem febrilis caloris sit siccus, squalensque, an citra siccitatem urès. Priorem namque humectante victu quod primum madafacere oportet. In secundo, dum plurimum sese calor remittat, manere. In principij vero accessionis more æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & magnam sanguinis revocationem ad interna corporis faciat: an omnino corpus non premat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulò ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redundantia subsit, cavenda est ante accessionem cibatio, ceu res maximè noxa.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. XII.

Quæ cum symptomatis consistunt febres, non sunt ad febrium genus ullum, aut species, aut differentias distincta. Porro graviorum symptomatum, & quæ rarèter febrientibus incidunt, primæ differentia sunt tres. Aut enim in læsione actionum consistunt, aut in retentorum vacuatorumve immodico excessu, aut in corporum ipsorum affectu. Ex quibus duæ quidem differentia priores, si contristent, ad se totam curationem convertunt, affectumque deferere cogunt. Tertia vero, alterius quidem quem curare oportet, affectus est signum: nullam tamen seorsum curationem exigit, utpote cum affectu, unde nascitur, una cessans. Nullum autem symptoma, quæ symptoma est, nec curationis rationem indicat, nec primum immutat: licet ex accidenti interdum id faciat, ubi scilicet causæ locum sortitur. Porro eorum omnium, ubi veluti causæ curationem immutat, unum caput est, ipsa læsio, sive virtutis sit, sive dispositionis. Lædunt autem vires, vigiliae, dolor, atque vacuatio immodica. Affectui vero eadem, non utique semper, ceterum magna ex parte, nocet: ac potissimum cum fuerint immodica. Quæ de causâ, quandoque cogimur prius submovere symptoma, quam morbum, mutato videlicet instituto. Ergo si labant vires, non tamen vehementer sint resolutæ, sed adhuc resistunt, ad symptoma tantum sumus attentus, atque id quod primum tollere maturamus. Sin jam resolutæ vehementer sint vires, non modò symptoma sedare, sed illas etiam firmare contendimus. Ubi vero virium roboris fiducia est, adeo nunquam contra symptoma pugnamus, ut (quod prorsus contrarium est) per ea

nonnunquam præsidia, quæ dolore afferunt, morbos ipsos curemus: veluti profecto dysenteria ipsi, mordentibus maximè medicamentis tum potissimum medemur, cum utique est gravissima. Est autem duplex medicis contra dolorem instandi ratio. Altera, quæ deliciis cubantium subscribunt: altera, ex artis ratione. Quippe si licet ægrum doloribus obnitentem valentibus remediis uno die persanari, quod tota curatione neglecta dolori tantum intentus est, non ex artis ratione, sed in gratiam ægrotantis id facit. At si ex dolore vires solvuntur, atque ex eo impendet periculum, mitigari dolor, & roborari vires debent, quod & morbo resistere, & curationis spacio sufficere valeant. Esto igitur terminus in ægrotantibus, quem non transibit is, qui ex arte generose contra morbum pugnat, ut tutò medicetur. Ei vero qui dolorem mitigat, ut vires custodiat. Porro dolorem mitigat, quæ ex papaveris succo, vel alterci semine, vel radice mandragoræ vel denique styrace constant. Ceterum si fas sit, iis remediis quæ morbum sanent, utendo, quod optimus efficere, cavendum ab id genus soporiferis medicamentis est. Sin vero ex vigiliis & viribus resolvendis, aeger ad mortis discrimen tendat, profecto ipsis tempestivè utare: non ignarus scilicet corporis habitum non nihil ex eis lædendum, eligendam tamen potius læsionem ipsam, quam mortem. Hac nimirum persuasionem ipse quoque, tametsi omnium maximè ab usu graviter sopientium abhorrens (quod rebellem valentemque in corpore frigiditatem relinquant) aliquando tamen ea & colicis exhibeo, & iis qui vel oculorum, vel aurium, vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciantur. Interim vero, & cum aeger ex tenui destillatione, vigiliis, & vehementi tussi urgetur paucillum ejusmodi medicamenti offero: facile noxæ ejus, si quis semel sit usus, spacio emendatum irritatus. Omnia tamen id genus magis salubria sunt, si post annum à compositione sumantur: vel uti quod ad Philonem refertur, quod ad dolores stupefaciendo sedandos, nullo minus est celebre. Id vero etiam si duorum, triumve aut quatuor annorum sit, multò sanè fuerit præstatius: sed neque inutile tamè sequentibus annis, ad decimum usque. Ergo sicuti cavendus est, quoad fieri potest, ejusmodi medicamentorum usus: ita si necessitas urgeat, nec admodum recentia sunt offerenda: quod frigida quæ in his sunt, prævalentes vires adhuc habeant: nec ita antiqua, ut spem nostram frustrentur: sed tandiu dimittenda sunt, quoad violentia refrigerantium, ab eorum quæ calfaciunt vi mitigetur. Et talium quidem medicamentorum usus, eorum quæ adversus symptoma pugnant, est proprius, potissimum ubi ex frigida causâ dolor est excitatus. Ob sunt enim talia plurimum toti affectui, curationique contumacem eum reddunt. Ad sanguinis missio, quæ scilicet vires non dejicit, symptoma spectatis medici opus non est, sed ejus quod totum affectum adimere studet. Ad eundem modum & balneum, & purgatio, & fometa calida, & vini potio. Quæ omnia, dum affectus sanant, una cum ipsis etiam dolores, sedant. Eodem modo & nutrimentum exhibitum ubi sicco & squalente morbo os ventriculi afficitur, dum affectum ipsum sanat, hominem prehendi syncope prohibet. Porro qui ex copia cru-

Vacuatio per frictionem solam, quibus debeat administrari, & quomodo.

Oleum Sabinum.

Oleum Hispanum.

Oleum Sicyonium.

Oleum chamæmelinum.

Frictio uberior allicit somnum.

Somnus diuturnus crudos succos digerit prohibet, & viscerum reddit graviora.

Somnus concoquit.

Vigilia digerunt.

Mulsa exhibitio.

Cataplasma tis utendum

nō esse priusquam super

vacua partium sint & acuata, par-

tium concocta

Inediam longissimam fe-

ru it, quibus corpus cru-

dis succis re-

dundant.

dorum humorū, unā cum oris ventriculi offensione febricitāt, ij neq; missionē sanguinis, neq; purgationē tolerāt, cum tamen vacuationē desiderēt. Quare eis vacuatio p frictionem solā administratur. Ergo linteis mediocriter asperis statim in ipsis auspiciis morbi fricandi sunt, à cruribus supernè deorsum. Debet enim radi ab his cutis, cum simul & calferi per eam, & digeri corpus postulet. Dein tota brachia, simili modo ab humeris supernè deorsum. Ubi verò artus omnes abundè calere jam videbunt, & met⁹ fuerit ne q̄s ex multitudine frictionis, contusa jam carne, superveniat lassitudinis sensus, oleo relaxāte uteris: quod gen⁹ est Sabinū. Ab astringēte verò abstinebis, cuiusmodi Hispanum existit. Hyems verò si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerentiū aliquod transferis, quale Sicyoniū est, aut etiam chamæmelinū. Ubi igitur oleo membra ipsa abundè fricueris, oleum est detergendum, atq; ad spinam dorsi transeundū: quam totā pariter fricare, primū quidē sicca frictione, post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura te conferes, & ab his ad brachia, denuoq; dein ad spinā: sic totū diem agens, in domo & lucida, & tēperata. Sanè mulsa, in qua coctū hyssopum fuerit, his est aptissima: qua sola primis tribus diebus utetur. Ipse verò eo tantū tempore dictā intermittere frictionē, quo somnus hominē occupaverit. Ad quem etiā alliciendū, & frictio uberior facit. Cæterū somnus uberior his minimè est salutaris: cum nec crudos succos digerit, & viscera reddat graviora. Sed si quis alius affectus est, qui somnū & vigilias modicas postulet, hic profectō in his est. Quippe somnus cōcoquit, vigilie degerūt. Quorum utroq; est opus iis qui ex multitudine crudorum succorum ægrotant. Ac si pulsus his parvus admodū infirmusq; sit, aut etiā supra hæc vehementer inæqualis, extremū periculū indicat: nec quicq; præter jam dicta, molliendū est. Sin verò mediocriter sit robustus, nihilq; intercisus videatur, si sua quidē spōte alvus cōmodè nō deiciat, solvenda est, mulsa injecta. Quod si major justo superfluatorū impetus ad alvū citetur, principiō q̄dem percoquere mulsam amplius oportet. Ea nanq; sicut minus alvum subducit, ita magis nutrit. Post hæc, si supervacua largius descendant, ne sic quidem sistenda: sed exhibend⁹ pro aqua mulsa ptisanæ cremor est. Si verò fluere pergant, alicæ sorbitione ægrū nutries. Si pulsus interim ad imbecillitatē, vel inæqualitatē, vel parvitatē mutetur, panē imbutū diluto vino porrigere cōvenit: utiq; si nec ventriculus, nec jecur laborent phlegmone: quando si hac infestentur, corpore crudis succis referto, salus deplorata est, pulsib. sic immutatis. Minimè autē utendū cataplasma tis aut perfusionibus est, priusq; supervacua magna ex parte partim vacuata sint, partim concocta. Interimq; sola mulsa, in qua coctum hyssopum sit, usq; ad septimum diem utantur. Siquidem longissimā sic affecti cibi abstinentiam ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet, succis cōcoquendis alto. Verum si alvus impensè fluat, vel æger mulsam fastidiat, ad ptisanæ cremorem est transeundum. Sin hunc quoq; aversetur, alicæ ad eundem quo ptisana modū ei

præparabitur. Neq; n. eis qui sic sint affecti, acerū incōmodum est. Imò sicubi crudas affatim succos esse animadverteris, oxymeli assidue promulsa dabis: si quidem æstas sit, & æger frigida assuetus, frigidum: sin hyems aut, omnibus calidum. Maximè verò pulsus parvus, tardus & rarus, frigidus subesse succos ostendit. Sanè propositis adversissima sunt tum balneū, tum aer ambiens, quoties vel nimīū calidus est vel frigidus. Itaq; ut lavandi hi nō sunt, sic & reclinādi in domo sunt: æstas quidem, quæ frigeat: hyeme, quæ caleat. Læduntur nanq; nō parū ab utroq; excessu. Atq; hæc quidē agenda sunt tibi, ubi à primo die curationē susceperis. Si autē ad eos quos jam premit syncope accitus fueris, si ea quæ retuli loca phlegmone vacēt, panē exhibebis nō multū, eumq; ex vino aliquo, quod celerē in corpus digestionē adjuvet: statimq; ad frictiones venies, quas ut diximus administrabis. Ac si quidē cœli status sit vehemēter calidus, cum frigida vinum dabis: cum calida aut mediocriter, si tēperatus. Quæ tamē secundò & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendā curabis, ut quæ succorum crudorū concoctionē adjuvet. At quibus ex flava bile, quæ os vetriculi infestet, syncope incidit, iis frigida exhibenda potio est. Vinū tamen quod & calidū natura sit, & deductionē in corpus promoveat, omnib. quos syncope malè habet, offerre convenit. Constat autē ex vinis ea deligenda esse, quæ & flavo colore sint, & substantia tenui, & ætate vetera. Talia nimirum & boni odoris cōtinuò fuerint. Quinetiā si paululū ubi mista sunt, gustes, senties calorē per totū corpus transmitti. Cæterū amara præ vetustate vina ne sunt, præsertim quæ iis exhibebis, quibus stomachus flava bile urgetur. Cōmodissima igitur his vina sunt, quæ cum naturaliter sint austera, sensilem jam astringendi vim, propter vetustatē nō amplius exhibent: calorē tamē admodū evidentē habent. Hujus igitur generis vinorū optima sunt, Surrentiū, Signinum, Sabinum, Tiburtinum, & Marsum, omnia quidē Italica, astringentiaq;. Quibus tamen ex crudis humorib. syncopes periculum imminet, sanè Falernū tantò jam memoratis præstat, quantò tū melioris est succi, tum etiā calidius: utpote quod & veloci⁹ illis digeretur per corpus, & crudis succis cōcoquendis auxilio erit. Ita summa verò, quibus ex abundantia crudorū humorū syncope incidit, iis crassa vino, ceu noxia: aquosa, ceu parū efficacia, fugienda sunt. Deligenda autē eorū sunt media, quæq; flava existat & calida. Neque enim invenias ex albo vinorū genere calidū ullum: quādo etiā austera, & mediocriter alba, cum inveteraverint, quodā modo fulviora reddūtur. Quotquot autē in ipsis calidissima sunt, omnia profectō sunt flava. Reliquorū vini generū, austera quæ mediocriter alba, crassaq; sunt, certè nullū ad digestionē in corpus est idoneum. Si tamen abundè inveterarint, nec aliorū copia sit, uti illis licebit, quod stomachum roborent. Cæterū vina quæ calfaciunt immodicè, iis offerenda nō sunt, quib. caput est imbecillū, facileq; ab id genus vinis repletur. Porro vina quæ odora fulvaq; sunt, quantū ex ipsorum est natura, omnia caput gravāt. Eoq; tū Falernum,

Oxymeli cingere illi qui crudis succis redudant

Frigidos se esse succos quos pulsus indicet.

Syncopes cruditate ratio.

Syncope latransibus nibus quæ vinum sit exhibendum

Vinorum genera varia

Vinum album quod calidum sit, reperiri nullum.

Vina impen-

lernum, tum Tmolites, tum Lesbii, infirmo capiti noxia sunt. At vina austera ventriculum roborant, caputque inter omnia vina minimè tenant: digestionem tamen in corpus non promouent: quò magis fugienda tibi in syncope prehenfis sunt, non secus quàm aqua. In penuria verò vini quod accommodum utique; syncope sit, ei inquit quæ ex multitudine crudi succi oritur, & ex qua ex bile incidit, coactus uti vino, utens aquosis, magisque; si antequa fuerint. Talia namque; tametsi non valenter excalfaciant, facile tamè deducuntur in corpus: quo nomine urinas præter cætera omnia promouent. A quibus secundum locum obtinent, quæcunque; fulvorum maximè sunt tenuia: quæ etiam ad syncopas præcipue sunt deligenda. Est autè syncope, præceps virium lapsus. Cum autè essentia virium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & ubi corrupta sunt, ad integrum revocari omnino debent. At verò substantia spiritus, ipsaque; solida corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis, ut tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, se naturaliter habeant. Curandum itaque; est, ut quæ substantiæ portio ab eis defluit, hanc per appositionem sarciamus: quod in ipsis verò alterascit, in debitam temperiem per contrariam alterationem restituamus. Si igitur tum vacuatio, tum alteratio sensim paulatimque; fiant, etià correcto utriusque sensim administrabitur: quod munus ad artem sanitatis tuendæ pertinet. Sin cõfertim & semel, ac magna aliquando vacuatio, vel etià adjectio incidat, sic sanè & efficietur morbus, & medendi methodum ad eorum sanationem desiderabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, veluti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur aliturque; At vitalis spiritus continetur in corde, & arteriis; nutriturque; tum ex aëre inspirato, tum ex sanguine halituoso. Quod si naturalis quoque; aliquis spiritus sit, utique; continetur in jecinore & venis. Virium igitur lapsus, qui quidem solidorum corporum substantiæ resolutæ succedit, in longissimis morbis subinde incidit, animante ex frequenti atrophia extenuato: præterea in colliquantibus febribus. Qui verò ex substantiæ temperie mutata provenit, is, vel ubi immodicè ipsa fuerint calfacta, frigefacta, madefacta, vel exiccata, vel horum aliquibus copulatis affecta, provenit. At alteratio spiritus, tum ex vitiosis oritur succis, tum ex ambientis aëris malitia: præterea venenatis facultatibus, aut animalium quæ virus ejectionis, venenis. Ipsius verò essentia spiritus corruptio (quæ tum ob animi affectus, cujusmodi sunt, timor subitus vehemensque; nec non mœror, ira, curæ, atque; summa voluptas, tum ob ingentem dolorè: præterea ob plures motiones vigiliasque; obque immodicam ipsius tenuitatem, & continentium eum vasorum raritudinem, atque adeo ante hæc omnia, ob respiratum prohibitum, & nutrimenti defectum incidit) diligentius corrigi postulat. Sciendum autem est, in omnibus perturbationibus, ipsam per seipsam moveri animam: quæ nimirum in aliis activis functionibus movet etià & ipsa corpus. Ob idque; resolvitur eius

robur, utroque; motuum suorum genere si modum excedant. Ergo nec rarefaciendum immodicè agrotatis est corpus, si spiritum retineri in ipso studeas: sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita valenter extenuanda. Est etiam ad virium robur tuendum, ciborum atque; potionum habenda ratio, ut sint tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti. Aër præterea quæ inspiramus, debet esse ut optime temperatus, sic ab omni corruptela & inquinamento alienissimus. Curandum similiter est, ut ipsa corpora solida in quibus vel maximè consistere virium substantia videtur, sint sano temperamento. Quippe ad conservandum virtutis robur & syncopalem accessionem prohibendam, singulare præsidium est temperamenti custodia: ante omnia quidem, trium principiorum: mox verò reliquarum partium, quæcunque; in consortium affectus, principia secum ex facili trahunt. Cujusmodi est os ventriculi, quod propter exquisitum sensum, accersit syncopas. At verò si humores crudi vires sua copia premant, ac propter multitudinem simul & crassitudinem exiguos animalis meatus obstruant, is affectus multis nominibus exitialis est, ac syncope opportunos reddit. Quippe succi crudi nutrire prius quam sint concocti, nequeunt. Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopen in certè non inferunt, sed deliquia animi. Siquidem resolvuntur agrotantes huiusmodi, nisi frequentius nutriantur. Sunt autè nutriendi hi extenuantibus calfacientibusque; idque; non copiose, nec semel. Medicamenta similiter sint extenuantia calfacientiaque; sed moderatè. His & aquosum vinum idoneum ab initio est, nisi tamè vehementer febricitent. Etenim qui laborant ex huiusmodi succis, hos quotidie accessiones exercent, præcipueque; ad vespèram, nocturneque. Qui verò ex tenuissimis succis urgent syncope, diversa à jam dictis ratione curandi sunt. Illos namque; paulatim & assidue vacuamus. At qui sic se habent, hos paulatim & assidue nutriemus. Quod si viribus imbecillis, aliquod his viscus phlegmone obfatum sit, eorum salus est deplorata: quando nec ipsos licet assidue nutrire, sed tantum in remissionibus: & servari non possunt, si non nutriantur. Non solum autè extenuatis ad eum modum spiritu & sanguine solent sæpe vires resolveri, sed etià facultate expultrice per universam corporis molem immoderatus concitata: id quod accidere maximè sollet ob retentricis imbecillitatem. Ergo nutrire, quicquid horum inciderit, est necesse: sicuti etià corporis summa densare, non secus quam priorum rarefacere. Frigidum itaque; iis aërem astringentemque; comparabimus. Ungendi præterea sunt astricto riis unguentis. Tum cibi iis dandi, qui non admodum promptè diffluent: cujusmodi sunt, panis, forbitio ex alica, fructus austeri, & qui non facile corrumpantur, ovorum vitelli (quandoquidem album ægrè concoquitur) gallinaceorum, qui late alti sint, testiculi, ac denique; suillum cerebrum diligenter assum, vel in albo jure legitimè elixum, porro & anetho injectis. In summa, omni ratione agendum, ut & succorum materiam crassiorem reddas, & cutim densas, & exhalationem inhibeas. Vinum verò ipsis aquosum, necessarium inter initia est, sumptum post cibos. Quod si ex

Virium roborem custodiendo qua requirantur.

Synopes ab ore ventriculi orta, curatio.

Vires resolutæ etiam ob excreticæ & immodicè concitatas. Vires imbecilliores reditæ ob excreticis motus immoderatos, quomodo reficienda.

Albumen ovorum ægrè concoquitur.

sententia nobis omnia responderint, etiam carne iis aliquid nutrimenti post alia dabimus, potissimum post quartum diem, succis qui febrem excitaverunt, jam ad concoctionem venientibus. In omnibus autem ejusmodi curationibus, si jam adsit syncope, omnis sollicitudo medentis ad symptoma vertetur. Sin expectetur, utriusque curam habebit, & ut symptoma non incidat, & ut paulatim discutatur morbus: quæ celerius discutere, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe quæ multitudine crudi succi gravatur, huc si modo justam semel vacuationem ferre posset, nec metus aliquis syncopes impenderet, semel arbitror, vacuatum explicaremus à morbo. Eum verò cujus spiritus & succi facile exhalant, si ante accessionem cibare non cogeremur, longiorem illi morbum certè non redderemus. Sunt & aliæ quinque, occasiones quibus succedunt syncopæ: nempe dolor vehemens, vigiliæ, immodica ventris inanitio, motus in delirantibus, ac denique principiorum intemperantia, vel nuda, vel cum humorum affluxu. Si igitur causam ipsam, unde excitatur dolor, adimere possis, ita utique contra symptoma non pugnaveris, sed curaveris ægritudinem. At si qua occasione prohibitus, affectui submovendo intentum esse non licet, vehementiam mitigabis doloris. Dolent porro tantum particulae sensibiles, idque vel ob continuitatis divortium, vel ob aliquam alterationem, non sensim, sed confertim & violenter factam. Quippe videntur corpora, non solum cum in non naturalem habitum confertim aguntur, tristem mutationem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi is sensim fiat, torqueri. Ac ex alterantibus quidem dolore afficiunt, omnia vehementer calfacientia, atque refrigerantia. Ipsam autem solutionem continui, necesse est vel rptionem vel contusionem, vel erosionem existere. At ruptio ex distensione quadam, contusio ex gravante aliquo, erosio ex mordente provenit qualitate. Ergo cum nihil extrinsecus sit, quod vel distendat, vel gravet, vel erodat, sed ex seipso horum aliquod corpus sentiat, neminem latere potest, distensionem ab aliqua intrinsecus substantia quæ multitudine sua corpus se continens distendat, aut immodica siccitate, provenire: contusionem, ex eo quod aliquod corpus occurrat extrinsecus, quod vel durum, vel magnū, vel grave, vel simul ambo extitit: erosionem verò, ex succo aliquo, cui mordens natura insit. Qui quidem si sit in tunicis intestinorum imbibitus, commodissime hiera picra expurgatur. Quod si aliquam exulcerationem pepererit, nutriendus certe æger est calente alica, sed injectis mali punici granis. Potus autem illi offerendus est, mali punici cremor. Porro si sanguinis abundantia sit quæ distendit, protinus sanguis mittendus est, modo vires ægri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis missionem timeat, vel viribus sit imbecillis, tum revellendus in diversum est sanguis, tum per propinqua derivandus. Quod si his peractis dolor etiam perstat, patet profecto in ægotante particula impactum esse quod contristat. Patet verò non minus, & quod curatio ipsa per digerentia medica metā molienda sit. Similiter etiam curantur dolores

à flatulento spiritu orti: magis tamē in extenuantia remedia desiderant. Si moles aliqua gravando, contundendove dolorē excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor, adversissima huic sunt, quæ extenuant & calfaciunt. Postulat namque hujus generis affectus, ut ea quæ contristant vacuetur, aut alteretur, aut medicamentis torporem inferentibus retundantur. Ea quippe minus hos affectus lædunt, quam alios, qui à crassis glutinosisque humoribus perficiuntur. Hujusmodi tamē succos, dolor vehemens non comitatur, nisi aliquis eis halituosus spiritus copuletur, qui ex iis corporibus quibus continetur, erumpere prorsus non possit. Nam sic, gravissimi solent excitari dolores. Etenim cum tunicae intestinorum sint duplices, si in medio ipsarum spacio frigidus ac viscidus humor collectus sit, à calore liquatus in flatulentum mutatur spiritum: qui crassus frigidusque cum sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tempus quidem, post bibitum medicamen stupefaciens, prorsus indolentes redduntur ægri, ceterum affectus iis variis modis fit major. Nam & intestinorum tunicae medicamentorum frigiditate densiores, minusque flatui transmittendo habiles redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior evadit. Quare id genus dolores omnes, per ea quæ incidunt & concoquant, præter ea flatu discutiant, desiccantque, citra valentem calfactionem, curandi sunt. A nullo autem in ejusmodi succis tam est metuendum, quam à calore qui & eos liquet, & in flatum vertat, sed non valeat discutere. Porro agrestis quidam, allio comesto, vinoque ad vespertinam meraciori bibito, à dolore colico fuit liberatus: neque id injuria: allium siquidem flatum discutit, ac minimè sitim infert. Quamobrem ipse allium theriacem agrestium appello: estque commodissimum iis omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex supra dicta causa vehemens intestinorum dolor citra febrem exercet, iis & allium esse licet & theriacem bibere. At si cum febre una talis dolor aliquando incidat, principio quidem, si id ferunt, febris, a fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non quiescant, semen aliquod, quod flatum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteum, quod purum sit, oleum colare, dein anseris, aut gallinaceum sebum, nec falsum, nec admodum vetus, in ipso oleo liquare, & per sedem infundere oportet. At si neque hoc remittatur dolores, secundò rursus injiciendum est idem, adjecta etiam castorei & papaveris succi, utriusque fabæ non amplius magnitudine. Olei verò hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa forti filo, quam penitissime in rectum intestinum inferi debet, quod utique & cum libet, id facile recipiatur, & evidentem utilitatem conferat. Similiter & oculorum, & aurium dolores, qui ab iisdem causis in febre excitantur, sedare conveniet fomento ex milio. Sed infundimus etiam auribus medicamentum id quod ex castoreo & papaveris succo conficitur, sapa liquatum. Quod sanè auri instillatum, oculorum etiam ac dentium dolores lenit. Jam verò si cataplasma imponi aliquando res ipsa suadeat, papaverum capitibus in aqua coctis, ac fœnigræci,

vel

Syncope quibus succedat anafis.

Doloris causa.

Solutio continui quotuplex sit.
Ruptio.
Contusio.
Erosio.

Distensio spontanea unde accidat.

Contusionis causa.

Erosio unde fiat.

Hiera picra expurgat humores acres tunicis intestinorum imbibitos.

Dysenteria qualis sit etus conve-niat.

Distensionis à sanguinis copia curatio Reversio nem esse in contrarium molientiam.

Derivatio fit per propinqua.

*Doloris
rulentus
tu orti
tio.
Doloris
mordens
more o
curatio*

*Intestini
tunica
duplices*

*Stupefaciens
tia me
menta*

*tundunt
dem do
affectu
me ma
reddunt*

*Dolores
stomaci
crassus
producti
sint rari
curantur*

*Allium
siliatum
ri colico*

*Allium
tuo dis
Allium
tur the*

*rusticorum
Theriac
bus uti
Colici do*

*cui sit in
febris, a
tio.*

*Pessary
ficiendi
dus, ad
endos do*

*res colico
Dolores
lorum ex*

*rium qu
tione leni
di.*

*Auribus
stillatum
dicamen*

*castoreo
co papav
sapa
flans, ocu*

*rium atq
rium dol
lenit.
Dolori ma
gando ca
plasma q
mum.*

vel hordei, vel lini seminis farina aquæ immissa, cataplasma conficies. Porro collyria ex opio cōfecta, vehementissimos oculorū dolores laxant: utendumque his est, cum maxima necessitas urget. Nam tametsi imbecilliores ex frigidityte in reliquam vitam ipsas reddant particulas, occurrunt tamen præsenti discrimini: ac postea frigiditytatem ab opio relicta, licet nobis corrigere, tum oleis calidis, tum etiam collyriis. Nempe aurib. oleum id quod solum castorum recipit, instilla-
 10 mus: oculis verò, ex cinnamomo collyriū. Qui à solo spiritu flatuoso cruciantur, ilicò cucurbitula admota, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur, in quacunq; corporis parte dolor sit excitatus. Quibus verò non spiritus modò flatuosus, sed etiam humor quispian, unde is oritur, ventris dolorem excitat, is ilicò ad tempus dolor sedatur: redit tamen vel in sequenti nocte, vel postridie, vel etiam tertio die similis dolor. Quare in his primū doloris accessio est cu-
 20 randa, admota scilicet cucurbitula. Postea vacuandus humor, infuso per sedem aliquo medicamento calfaciente simul & attenuante. Ego verò oleo quopiā tenuis substantiæ uti assuevi, rutam in eo præcoquens. Quo injecto, nonnulli ægri paulò post excernunt humorē vitreū: atq; ex hoc protinus simul & à dolore, & ab effectu liberantur. Si dolor ex tenui acriq; excitet humore, qui cōvulsiones vehementes etiam inducere solet: si quidem in ventriculo talis humor consi-
 30 stat, vomitu expellendus est, aqua tepida propinata: sin autē intestinis, injicere per sedem oportet aliquod medicamen, quod blandè eluere, de tergereq; ejusmodi humorē possit. Cōmodissimus itaq; ad id fuerit cremor ptisanæ. Cibi verò exhibendi his sunt, qui & boni sint succi, nec facile corrumpantur. Qui ob siccitatem vehementem distenduntur, & discrutantur, si curari ij debeant, humectationem desiderant. Cæterum si affectus is, sit febris occasione cōtractus, percuratu est difficilis, vel potius curationem non recipit. Quippe convulsiones quæ ex plenitudine nervosarum partium, vel ex humore mordente, vel denique ex ingenti frigore oriuntur, curari possunt. Quæ verò ex nervosarum particularum ariditate proveniunt, nullus certè iis ad sanitatem est locus.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, Lib. XIII.

IN hoc tertiodecimo cōmentario acturi de tumoribus præter naturam, primò quidē tractemus de phlegmone, quòd hæc & frequentius incidat, & febres inferat, gravissimaq; inducat symptomata. Gignitur autem omnis phlegmone ob confluxum sanguinis, copiosioris scilicet, quam pars possulet: quo tumore obsessa particula, auctior, quam pro naturali habitu, calidior & rubicundior, redditur: tenditurque, ac tangenti renititur, cum dolore ac pulsatione sensibili. De phlegmone tamen generatione, varii vario modo opinantur, licet ipsa curandi ratio omnibus cōmunis existat: nempe vacuatio sanguinis, in particula inflammata contenti. Cæterum phlegmone quæ etiamnū gignitur, est du-

plex curationis scopus: quippe quod ex ea generatum jam est, id profligare oportet, præsidio illius medicinæ partis, quæ morbos curat: quod verò superest generandū, inhibendum est prorsus, beneficio alterius, quam præcautricem vocamus. Porro sanguis copiosior influit, alia quapiam, aliisve particulis aliquando eum mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquando particula quæ affligitur, ipsum ad se trahente. Sanè quæ mittunt partes, alias ut copia supervacuū, vel qualitate molestum: alias utroq; nomine succum propellunt. Quæ attrahunt, ea morbofo calore trahunt. In doloribus, incipit quidem causa ab eo quod affligitur: sed quicquid est phlegmone, id superpositæ partes efficiunt. At verò tumorū omniū, qui præter naturam sunt, varietas, ex ejus quod influit, natura nascitur. Ubi enim flatulenta materia uberior accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phlegmonæ magis similes, ubi sanguis: sicuti erysipelati, ubi flatua bilis: & œdemati, ubi pituita. Similiter scirrhusi, ubi vel crassus, vel vehementer lentus humor parti fuerit infixus. Cæterum crassus humor quodammodo jam melancholicus est. Lentus autem, ex glutinosis provenit cibus. Ubi igitur particula aliqua, phlegmone urgeri cœperit, videndum est, an propter calorem aliquem, qui in illa præter naturam sit ortus, an propter dolorem vel ipsius, vel propinquæ alicujus partis, hanc ipsam cōtraxerit, quò scilicet adempta causa, phlegmone non amplius increseat. Dein proximè expendendum est, nunquid vicina aliqua pars sanguinē largius ad particulam phlegmone obsessam transmittat. Postea verò, num totū corpus plenitudine succorū laboret. Siquidem supervacanea, quæ expelluntur à valentioribus, ea semper in imbecilliores procumbunt. Unde accidit, ut glandulosa corpora, imbecillima omnium cum sint, facile fluxiones ipsas recipiant, tum moribusq; præter naturam (quos bubones appellamus) celerrimè corripiantur, cum alias, tum vel maximè, ubi propter magnā arteriam aut venam, fuerit ulcus aliquod ortum. Quòd si scirrhusior earum partium phlegmone aliquando fuerit, hæc & curationi renititur, & struma vocatur. Ergo si vel totum corpus plethoricū sit, vel pravo succo redundet, difficilis bubonum curatione redditur. Sin sanum planè sit, facilis. Quippe excalfacere & humectare modicè totum membrum, quò dolor mitigetur, oportet, lana quidem imbuta calente oleo, id circundantes: ipsi autem ulceri tetrapharmacum liquatum oleo rosaceo, calidum aut etiam Macedonicū pharmacum (quod solo thure tetrapharmacum præstat) ex linicinio imponentes: atq; insuper calidum cataplasma ex farina vel hordeacea, vel triticea, vel ambabus, aqua & paxillo olei cōfusus constans, extrinsecus applicantes. Non secus verò ipsi adeni, qui phlegmone urgeri cœpit, prima quidem die imponi debet lana oleo calente madēs, sed citra salem. Cujus postea nōnihil indemus, ubi & tumor per totū membrū remissus fuerit, & ulceris dolor sedatus. At si vel plethoricum corpus sit, vel vitioso succo redundet, curatione per ea quæ sic calēt, fluxionē ad mēbrū citat: cogimurq;

Tumorum præternaturarum varietas, pro differentia fluxionum humorum nascitur.

Phlegmonem curaturò quæ sint consideranda.

Supervacanea expelluntur semper à fortioribus ad imbecilliores particulas. Glandula curantur maxime obnoxia fluxionibus.

Struma quid.

Bubonis curatione.

cogimurq; alias sanguinē mittere, idq; aut vena incisa, aut membris ijs, quæ læsa nō sunt, scarificatis. Manu etenim laborante, scarificabis crura. Altero crure malè habete, reliquū. Has nanq; vacuationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum vitium, redundantis succi purgationē. Sed quæ etiam Græcè dicuntur phymata, glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem accidunt. Ubi ergo distentē vehementer glandulæ sunt, aut alia quævis particula, quæ premit phlegmone, cogimur, toto corpore prius vacuato, ipsam scarificare. Sanè vacuamus totum corpus, etiam cum mediocritatem succorū continet, si morbi magnitudo id suadeat. Siquidem dolor, & membri inflammati calor, etiam si putrum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ fiunt. Tunc tamen parcius vacuare expedit: idq; habita ratione ætatis, naturæ, anni temporis, regionis, ac denique consuetudinis ipsius ægrotantis. At ubi jam phlegmonis ipse veluti fervor subsedit, mitigatoriis emplastris dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transeundum. Ac primum cum mitigatoriis ipsis paulum mellis miscendum. Mox triticea farina in totum est auferenda, contentis hordeacea cum melle uberiore. Deinde ad aliquod ejusmodi digerentium medicamentorum veniendum, quæ vel humida consistentia sint, vel cerati specie. A duris autem est abstinendum: nam & phlegmonarum reliquias contrahunt, & rursus phlegmonem in ægra particula excitāt. Quod si pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentū, non expedit incidere protinus; sed digestionem moliri medicamentis ad id valentibus. Cum autem quod ex phlegmone ipsa relinquitur, scirrhum effectum videtur, fidenter jam valentibus medicamentis uteris. Si quādo ergo ægram partem medicamenti acrimonia irritatam videris, mitigabis eam interea fomento, quod per spongiam administrabis. Id autem aliquando ex aqua dulci esto: aliquando etiam sal habente, ubi scilicet scirrhomiosiores sunt phlegmonæ. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, quod sic abscellit secare, eo potissimū loco oportet, quo est editissimum: observata interim effluxus indicatione: quippe tenuissimam illic etiam cutim invenies. Post sectionem verò, medicamentum aliquod, eorum quæ sine morfu siccant, impone. Quod si cōputruisse portio aliqua suppurantis partis videbit, excidi eam est necesse. Sectio igitur qua utemur in suppurante particula, myrti imitetur folium, sitq; planè nō magna: quali nos semper cōtenti fuimus. Cæterū cum in tali incisione longitudo major q̃ latitudo sit, esto in inguine longitudo per transversum ducta, non autem per rectitudinem membri. Quippe ita dum membrū inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. Post excisam cutim, medicamento, quod mannā vocant, affectam partē implebimus. Est enim ea purgamentū thuris: levi astrictione prædita: quo nomine etiam thure ipso ad nōnulla utilior. Thus siquidem puris tantū movendi facultatem obtinet, utpote nullā astringendi vim habens. Magisque id facit, quod pinguius ex eo

est, & magis albicans. Sicuti quod magis est flavum, potentius siccatur. Mannæ verò, etiam corticis thuris paululum est admistum, unde astrictoriam vim habet. Ipse autē cortex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaque eo solo utimur ad sanguinis perfusiones. Quinetiā mitigare prius incisam partē oportet, fomentis primū, dein cataplasmate, mox humectate aliquo medicamine, aut nō siccante, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso ulcere tum mannam, tum pus moventia, dein quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ, si cavitas etiam nū ad sit, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricē inducant: veluti quod ex cadmia conficitur. Utendū verò medicamentis id genus est prius, q̃ ulcus ad æqualitatē prorsus impletum fuerit, ne ipsa fortē cicatrix circūposita sit cute eminentior. Porro ubi æqualiter inter se succi omnes sunt aucti, plethora, sive plenitudo is affectus vocatur. Ubi verò vel flava bile, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum corpus jam fuerit, eum habitū cacochymiā vocamus. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atq; etiam inedia. At succorū vitium, purgatione, quæ redundantis succo sit accommodata, corrigitur. Cæterum si jam æger febricitet, nec exercitatione vacuare licet exuperantiam, nec unctione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imò sanguinis missione, unā cum inedia, vel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus jam dictis utare, optimum quodque ad id quod instat, deligens. Verū cui crura laborāt phlegmone, ambulatione vel cursu exercitandus non est: sed nec stare jubendus. Satiū quippe est, ut sedens fricetur plurimum, moxq; manuum motu exerceatur. At si quæ ex supernis partibus urgeri videatur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est quæ cruribus adhibetur, illis quæ in supernis partibus administrantur. Siquidem in omnibus talibus revulsio debet fieri in contrarium. Neq; igitur cum vel circa sedem, vel aliquā huic partem vicinam, initium phlegmones incidit, alvum dejicies. Neq; cum in vesica, vel colo, vel renibus cœpta est, pharmaca quæ urinas provocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in utero, vel pudendo insedit, menses huic provocabis, sed ad partes quæ maximè longinquæ sint, semper revulsionē molieris, æstimata tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nam si plurima succorū abundantia sit, nec exercitatio ne, nec balneo sine periculo utare. Sin exigua sit, licet & per hæc vacues. Jam verò, si phlegmone oborta sit ab affectu partis quam vexat, primò quidem affectus ille sanāndus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum. Quæ ambo interim iisdem præsidis tolluntur. Cæterū ad incipientes phlegmonas, frigidis astringentibusq; magis utendum est, quā iis quæ digerunt: atq; etiam num magis, ubi crassum quod confluit non est. Sed si sanguis in inflammata particula vehementer impactus fuerit, nō est amplius utendū repercutientibus:

Manu laborante scarificanda esse crura.

Crure altero affecto, reliquum scarificandū esse.

Phymata, phlegmone affecta, particulas quando scarificare cogamur.

Vacuare quando solemus corpus, etiam si mediocritatem succorum contineat.

Fluxionis causa sunt dolor et membri calor.

Phlegmone quando sit digerenda.

Phlegmones curationi ad Versari dura medicamentis.

Phlegmonem suppurantē non esse incidendam protinus, sed digerendam medicamentis ad id valentibus.

Abcessus quando secandus sit, & quā in parte.

Sectionis forma qualis esse debeat in suppurante particula.

Inguinis suppurati sectionem per transversum esse descendendam.

Mannā thuris buboni seculo inspergendam esse.

Thus puri movendo idoneum nullā astringendi vim habet.

Thuris

tex as

et sic

Incisa

tes esse

quo for

circa in

nem l

das.

Ulcera

parte

relicti

tio.

Cicatr

induce

medic

tis ut

esse pri

quam

ulcus p

sus imp

fuerit.

Plethor

quid.

Cacoch

quid.

Plethor

ratio.

Cacoch

correct

Crura

gmone

sa quon

sint cum

Phlegm

superna

partium

modo s

randa.

Reversio

bet fieri

contrari

earum p

tum, q

phlegm

urgenta

Phlegm

incipien

frigida

astringe

cutientibus: sed tunc digerere est tempestivum.
 Quod si ex animalis punctu morisve dolor in-
 cidit, a quo exorta sit phlegmone, duplex sanan-
 di doloris ratio est, vel virus ipsum vacuando, vel
 quod dolorē excitat, alterando. Ac vacuabis sa-
 nē id, eorum medicaminū ope, quæ vehemēter
 attrahunt: alterabis ijs quæ sunt contraria. Va-
 cuant itaq; tum calfacientia omnia, tum quæ ad
 se citra calfactionē alliciūt: ut cucurbitulæ, & cor-
 nua quædā. Sunt qui & ore suo virus extrahant.
 Huc pertinet & cauterium, & medicamēta quæ
 cauteriis similiter escharam efficiunt. Alterū au-
 xiliorum genus est eorum, quæ qualitātē per con-
 traria alterant. Variantur autem medicationes,
 pro laborantium particularum diversitate. Una
 quippe indicatio ex similaribus sumitur parti-
 bus, altera ex instrumentariis. At ea quæ ex simi-
 laribus sumitur, modum calfaciendi, refrigeran-
 di, siccandi & humectandi determinat. Quæ ve-
 rō ex instrumentariis, tum locū ipsum, per quem
 vacuare oportet, tum vacuationis rationē, tum
 verō in similis speciei medicamentorum usu i-
 psum pluris minorisq; modum. Porro vacuatio-
 nis indicatio in phlegmone, refrigerationis indi-
 cationem vincit, contrā q̄ in erysipelate. In hoc
 nanq; refrigerationis indicatio magis urget, quā
 vacuationis: etsi ubi refrigeratum erysipelas est,
 ad ea quæ digerūt medicamenta cōvertimur. At
 in phlegmone tantū per refrigerandū est, quate-
 nus & ad incrementum eius sistendum, inhiben-
 dumq; est cōmodum. Quippe refrigeratio reper-
 cutit id quod affluit, & ex eo quod in laborante
 continetur particula, aliquid in proximas partes
 repellit. Simili modo & quæ modicē exalfaciūt,
 utraq; interdum ratione profunt: quod & dolo-
 rem sedent, & cōtenta in parte ægra digerāt. Si-
 quidem mitigando dolorē, augeri phlegmonas
 vetant: digerendo, quod earū jam cōceptum est,
 sanant. Si jecur inflammationē cōtrahere cōpe-
 rit, ac totū corpus egeat inanitione, virtusq; va-
 lida sit, atq; æger pubertatē attigerit (puer enim,
 quæ per dissectam venam fit vacuationem non
 feret) pariter tum revellendus, tum educendus,
 qui ad ipsum fluit, sanguis est, interna in dextro
 cubito infecta vena: propterea quod & ē dire-
 cto, & ampla via, cum vena quæ cava dicitur, so-
 cietatem habet. Hac nō apparente, media secan-
 da est. Quod si nec illa se ostēderit, reliqua & tē-
 tia incidenda venit. Ac modum quidem vacua-
 tionis, ex redundantia modo, ætate, natura, an-
 ni tempore, regione, consuetudineq; atque ante
 hæc, ipsa laborantis virtute, invenies. Venæ au-
 tem secandę electio a parte laborante indicatur.
 In universum aut, quā longissimē a tentata flu-
 xione parte quod redundat revellere, nequaquā
 ad eam trahere, convenit. Hac ratione, nec si he-
 par, aut ventriculus, aut intestina phlegmone
 occupare jam cōperit, medicamine quod alvū
 dejiciat, uti conveniet. Eandem cum his indica-
 tionem & uterus sortitur, sicuti cum venæ vasis
 pudenda. At vomitu uti pudibundis laboranti-
 bus, in diversa revellens auxilium est. Eadem ra-
 tione in omnibus quæ circa caput accidunt, alvi
 subductio in contrariū avertit. Si qua verō cir-
 ca fauces, & palatum, aut linguam, aut denique

in ore phlegmone laborare cōperint, in his om-
 nibus cavenda sunt, quæ pituitam per os evocāt,
 Græci apophlegmatismos appellant. Satiū nan-
 que tunc fuerit derivare ad nares, incidereq; hu-
 meralē in manū venā: vel, si ea nō cernitur, me-
 diam. Ubi jecur, pectus, pulmo, aut cor sic affici-
 untur, internam. In angina primas in manibus:
 secundas eas quæ sub lingua habentur. At iis quæ
 in occipite sunt afflictis, etiā eam quæ in cubito
 est, necnō eam quæ habetur in fronte. Renibus
 verō, & vesica, & pudendo, & utero sic habenti-
 bus, eas quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum
 quæ sunt circa poplitem. Sin minus, eas quæ sunt
 juxta malleolum. Ac perpetuō quidem in omni-
 bus, eam quæ ē directo est. Ubi jecur phlegmo-
 ne invadit, quæ in dextra sunt manu: ubi lienē,
 contrā. Itaq; statim prima vacuationis diversitas
 pro particularum diversitate variatur: constatq;
 communē, quod sit vacuandum, indicationem,
 non magis esse utilitatis quā noxæ causam. Por-
 rō ubi pectus, aut ventriculus, aut partes circa
 collum caputve laborant phlegmone, etiā exco-
 gitatū est artus vincire. Quippe ipsum quod in-
 festatur phlegmone, haudquaquā vinciendū est.
 Sed si in manibus sit phlegmone oborta, crura.
 Sin in cruribus, manus. Jam verō nec refrigera-
 re inter initia, aut astringere, citra laborātis par-
 ticulæ indicationē, utilitatis magis quā noxæ
 sunt causæ. Nam particulis quidem quæ juxta ar-
 tus sunt sitæ, tutō ministrare possis frigidam ali-
 quam fomentationē. Jecinori verō, si phlegmo-
 ne infestari cōperit, non licet imponere actu fri-
 gidum, aut fomentum, aut cataplasma. Rursus
 astringens oleum, nec oculis, nec oris partibus
 admovebis, sicubi hæc tentari phlegmone cōpe-
 rint. Auri verō, etiam si acetum cum rosaceo in-
 fundas, nihil offendes. Victus etiam pro partiū
 ratione variatur. Quippe ijs quibus glandulæ,
 aut aliquid circa artus tētatur phlegmone, tot &
 talia exhibenda sunt, quot & qualia facili-
 mē cō-
 coquent. At si jecur vētriculusve infestet phle-
 gmone (cum munus eorū sit toti animali cōmu-
 ne) victu exquisitissimo est opus, qui videlicet
 meatu aperiat detergeatq; citra rosionē, ac bre-
 viter omnis tenacitatis sit expers: qualis utique
 in cibis est prisana, & in pharmacis oxymeli, a-
 qua distemperatū. Cæterum dulcibus omnibus
 tum jecur, tum lien intumescit. Jam verō astrin-
 gentia omnia, mala jecinoris phlegmonis sunt
 incōmoda, præsertim iis quæ in cavo eius consi-
 stunt. Similiter ea quæ mordent, phlegmonas
 quæ in cavo sunt visceris, quā quæ in gibbo cō-
 sistunt, magis irritant. Iis quippe quæ in gibbis
 sunt, mutata jam veniūt quæ assumpta fuerūt: &
 quod prius concocta sint, & quod sanguini, qui
 in jecinore prius erat, admista. Cavo aut jecino-
 ris phlegmone obsessio, protinus etiā venas quæ
 in mesenterio sunt, unā phlegmone laborare est
 necesse, cum ex vena portę exoriatur: protinusq;
 etiam, quæcunque osculis earum incidunt, vim
 suam ostendere. Porro ubi jecur phlegmone ob-
 sessum est, mediocriter astringi per cataplasma-
 ta mistæ materiæ debet, quod altricis facultatis
 principiū animalib. sit, & venosum ab hoc exo-
 riat genus. Ut autē jecinoris cavum per alvum
 purgatur,

Apophlegmatismos fugi-
 endos esse, ubi
 partes oris
 sunt inflama-
 tæ.
 Phlegmone
 occupante or-
 tis particu-
 las, dixerit
 dum ad na-
 res esse, secan-
 dam, hume-
 ralem in ma-
 nu venam,
 aut mediam
 vena secan-
 dam in ie-
 coris, pulmo-
 nis, pectoris,
 cordis, fau-
 cis, renū, &c.
 scia, pudendi,
 & uteri affe-
 ctibus.
 Vincula non
 esse injicien-
 da inflama-
 ta particula-
 sed illi quæ
 opposita est.
 Jecinori, si
 phlegmone
 infestari cō-
 perit, nihil
 actus frigidū
 esse applican-
 dum.
 Auri inflam-
 mata nihil
 nocebit, sed si
 acetum cum
 rosaceo in-
 fundas.
 Victus pro
 partium ra-
 tione varia-
 tur.
 Victus iecori
 Ventriculoq;
 inflammato
 conveniens.
 Dulcibus in-
 tumescit tū
 jecur tum
 lien.
 Cavo hepa-
 tis phlegmo-
 ne obsessio, &
 nas mesenterii
 eas similiter
 inflammari.
 Jecur phle-
 gmone obses-
 sum, cur me-
 diocriter a-
 stringendum
 sit, per cata-
 plasma mi-
 stæ materiæ.

*Hepatis par-
tes per quas
vias, & qui-
bus purgan-
da remediis.*

purgatur, sic gibba eius, per ea quæ modicè urinas movent. Cujus generis apium existit. Procedente autem tempore, ubi phlegmone jam concoquitur, etiam valentioribus uti licet: ut asaro, Celtica nardo, phu, petroselino, smyrno, et meo: sicuti etiam per ventrem vacuare, si cavum afficitur, cnico cibus admisto, & urtica, & mercuriali, & epithymo, & filicula: omnibus præterea quæ modicè alvum dejiciunt. Magisq; in remissionibus, tum his ipsis audacius quam antè utendum: tum verò quæ ijs sunt valentiora, partim in ptisana incoctis, partim tunsis, ac in molissimum pulverem redactis. Exhibenda verò & hæc sunt vel ex ptisana, vel ex aqua. Ego nanq; etiam filiculæ aliquid in ptisana aliquando incoxi, & nigri vertari corticem. Sed clystere etiam ipsos vacuare expediet: inter initia quidem, vel sale, vel nitro, vel aphonitro cum mulsa distemperatis contentis: in remissione verò, potissimumque si quid scirrhusum relictum è phlegmone est, etiā 20 valentiora medicamenta miscentibus nobis.

*Hepati ob-
fesso phlegmo-
ne quales
clysmi conve-
niant.*

*Scirrhus esse
opportuni-
ssimum hepar
lienemq;.*

*Lienis sub-
stantia quæ
hepatis, esse
variorem.*

*Lien crasso
nutritur san-
guine.*

*Renes facile
scirrhum con-
trahunt.*

*Calculos qua-
sileant gigne-
re.*

*Calculis qua-
medicamen-
ta congruat.*

*Hepatis in-
flammati cu-
ratio.*

*Lien nutri-
tur ex melan-
cholicos an-
guine, quem
expurgat ab
hepate.*

*Lien obstru-
ctum aut in-
flammatum,
qualia medi-
camenta po-
stulet.*

Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & origanū, & colocynthida, & minus centaurium. Opportunissima nanq; ad scirrhum sunt jecur, lienq; si quis, parum habita de his ratione, glutinosus cibus utatur. Etenim substantia lienis, tametsi rarior quam jecinoris sit (est enim illis substantia lutosa) crebrius tamē scirrhusis vitis affligitur, propter nutrimentū, quod alitur, speciem. Siquidem crasso nutritur sanguine, qui veluti li- 30 mus purioris est, facillimeq; nigra bilis efficitur. Renes etiam facile scirrhis deprehendi, atq; idcirco nephritidas alias omnino solvi non posse, alias ægrè solubiles esse, ratio docet: cum & crassa substantia sint, & nō careant excrementorū vitio. Quo fit, ut qui crassi succi cibus vescuntur, calculi vitio vexentur. Medicamina igitur horū affectuum ea esse constat, quæ dissecant, dissolvant & frangant: quæ utiq; ex eorum sunt genere, quæ obstructions erunt atque detergent: cæterū vi- 40 ribus valentiora. Curationē autem unā coindicant, virtus, natura, ætas, anni tempus, regio deniq; cōsuetudoq;. Jecinore itaq; laborante phlegmone, quæ extrinsecus applicatur, ea mista esse facultatis esse debent: idq; non in generatione phlegmones modo, sed etiā cum nec affluit amplius quicq;, nec repelli quod in laborante particula cōtinetur, potest. Quo quidem tempore duplex nobis indicatio suggeritur: altera quidem à phlegmone, sui evaporationē poscente, nimirū 50 digerentia: altera verò ab affecta parte, quæ per astringentia robur eius servari jubet. Quare cōeuntibus unā contrariis indicationibus, compositum quoq; esse medicamentū oportet: nempe astringens simul atq; relaxans. Verum tuendi roboris indicatio, in ijs tantum partibus est cōmunis, quarum munus ex usu est universo corpori. Igitur nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quoq; ex jecinore quicquid limosum & melancholicū est expurget, propterea sci- 60 licet, quod ex eo humore nutritur. Idcirco quoties obstructio aut phlegmone, sed præcipuè scirrhusa, in eum incidit, tum ea quæ obstructions eximant, tum quæ dissecant, vehementiora exigit. Nam quale medicamentum jecinori absyn-

thium est, tale est lienis capparis cortex. Quale rursus jecinori est eupatoriū, tale scolopendriū lienis. Siquidē similia genere medicamenta, quæ admodum & nutrimenta, ambo viscera postulant: cæterum tantò valentiora & acriora lien, 10 tantò crassiore utitur alimento. Jam verò cum gibba jecinoris expurgari per renes oporteat, sicuti cava per inferiorem ventrem: lienis sanè per renes nulla administrari potest vacuatio, sed tantummodo per intestina. Proinde ubi phlegmone premitur, dejectoriis ipsum medicamentis tū detergemus, tum lacesimus, quò demittat deponatq; superflua. Est autē duplex ratio ejusmodi medicamentorū usus. Nempe, ubi partes superius sitæ laborant, per ea quæ eduntur bibunturq; cum inferiores, per id quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem quæ eduntur ac bibuntur, eorum vis, anteq̃ ad inferiores partes perveniat, resolvitur. Quæ infusa sunt, ea omnino ad 20 jejunū usq; ascendere nequeunt. Porro gula (quæ stomachus propriè vocatur) affecta cataplasinata super dorsi spinam imponimus: nō autē in anteriori parte: quod facimus, ubi phlegmone os ventriculi urgetur. Siquidem spinæ gula superiacet, per collum & pectus deorsum usq; ad ventriculum exporrecta. Jam quemadmodū lien & jecinoris cava, per intestina: gibba illius & renes per urinas purgantur: sic pectus, ubi interna eius tentantur phlegmone, per succingentem membranam, aliquid in mediū sui pulmonumq; spaciū transmittit. Id autē expurgari per eandem 30 qua pulmo viam debet. Propināda igitur ijs qui sic affliguntur, sunt, quandiu quide ipsa invalescit phlegmone, medicamēta quæ mediocriter vias aperiant, & crassos humores dissecant: ut ptisana & mulsa: in exquisita autē declinatione phlegmones, dum educi jam excrementa postulant, quæ id valentius molliantur: ut urtica semen, & mulsa, in quam fuit cōjectum paululum acrium herbarum: quales sunt, origanum, hyssopum, calaminthæ, pulegium, & Illyricæ ireos radix. Oxy- 40 meli etiam quod ex marrubio conficitur, crassiora pectoris pulmonisq; excrementa incidere potest. In universum autē quæ in alto corpore affliguntur phlegmone, eæ partes paulò acriora, & pro phlegmones natura, medicamenta desiderant. Resolvuntur siquidem eorum vires, dum altè descendunt. Hac ratione & cucurbitula (stre- nuum planè auxilium) est inventa, tum ut foras evocentur quæ sunt in alto, tum ut eximantur & 50 eruantur, quæ jam in scirrhum abeunt. Verum utendum cucurbita in ipsa parte quæ phlegmonem urgetur, inter initia non est, sed posteaq; universum corpus vacuaveris, * atq; ex usu jam esse videatur, eorū quæ in inflammata particula cōtinentur, aliquid aut vacuare, aut versus exteriora revellere. Proinde ubi affectus * etiamnum in generatione consistunt, minimè ipsis membris quæ laborare incipiunt, sed iis quæ continua his sunt, cucurbita imponi debet, avellendi in cōtrarium causa. Sic nanq; ad mamillas cucurbitas imponimus, cum sanguis ex utero profluit, defixo maximè in ipsis cōmunibus pectoris & uterivasis, eius ore. Sic si è naribus sanguis profunditur, præcordiis maximas cucurbitas affigimus. 60

*Lien hep-
similia n-
utimenta
medicam-
ta requir-
Lien cra-
si utitur
mento qu-
hepar.*

*Hepar pe-
quam re-
nem & ac-
tur.
Lien per
testina &
cuatur.*

*Clysmos
posse usq;
jejunum
scendere.
Gula aff-
da, cata-
maesse a-
candam
per spinam
dorsi.*

*Pectus pe-
quam re-
nem pur-
tur.*

*Pectori p-
gmone ob-
que med-
menta co-
niant.*

*Inflam-
nes altius
ta, cur pa-
medicam-
ta acriora
stuler, qu-
pro ipsa
ratione.*

*Cucurbit-
quorsum
genta.
Cucurbit-
quando u-
dum.*

*Cucurbit-
quorsum
mamilla
figi solent.*

Sic & omne aliud sanguinis profluvium, ad contrarium per communes venas avertimus: quemadmodum rursū & sanguinē (si ita est opus) attrahimus. Siquidē quū mēses evocare in animo est, pubi & inguini cucurbitā affigimus. Ad hęc, in occipite cucurbita defixa, efficax est remediū ad oculorū fluxiones. Vacuari tamē prius totū corpus expedit. Nam si refertū sanguine corpus sit, in quacunq; parte capitis cucurbitā defixeris, totum ipsum implebis. Adverte autē, ubi dicimus, 10 astringere incipientē phlegmonē esse opus, non quodlibet astringēs in iis q̄ devorāda sunt, exhibendū esse, sed ea tantū, quib. nulla corruptrix admista vis infit. Nā chalcāthus inter præcipua astringit: sicuti etiā misy, & sori, & chalcitis, & diaphryges, & æs ustū, & squama eius, & flos. Verū hęc medicamēta, noxia devorata sunt: quocirca stomaticis ea miscere tutū non est. Defluit nanq; interdū ex his aliquid ad ventriculū. Sed nec aloē, p̄bē miscueris iis medicamētis, q̄ phlegmo- 20 nes alicuius causa, quæ intus cōstitit, devoranda sunt: quando huic quoq; purgādi vis quædam inest. Cæterū ubi phlegmone p̄sus inclinaverit, si quis paululū aloēs admisceat, deijiciēdi ventris gratia, qui prorsus nō dejecerit, nihil lædet. Quāq; satius fuerit mercuriali, ut urtica, aut cnicō, alvū sic laborantiū subducere. Admodū itaq; necessaria est indicatio quæ a particulis sumitur. Quæ nec ipsa sat est ad curandos morbos, nisi etiā methodos de medicamētis didiceris. Ut autē 30 ad affectus capitis jam nostra revocetur oratio, oxyrhodinū quo caput phreniticorū perfundimus, sanē universos redarguit, quicūq; principē animæ partē in corde statuūt. Siquidē per id genus affectus, non capiti, sed pectori præsidia admovēda essent. Atqui non in phrenitide modō, sed in lethargo etiā (q̄ vitiū illi contrarium quodammodo secundum speciē existit) universi applicant ipsa remedia capiti, in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo quum humor qui 40 in capite redundat frigidus est, insensibilitas immobilitasq; hominem opprimunt: quū verō calidus est, perpetuus potius motus, unā cum rationis noxa. Accidit enim segnitia ex frigore: ex calore, immodicus motus: ex humoris verō vitio, de mētia. Igitur in eiusmodi affectibus, si virtus valida sit, ac nihil aliud prohibeat, ut crudi humoris copia, vel ætas puerilis, vel anni tempus, vel regio in qua sit extremus calor, vel frigus, statim ab initio vena tundenda est. Atq; hoc quidē 50 cōmune utiq; vitio, & ei quod cum sopore, & ei q̄ cum vigiliis incidit. Commune præterea utriusq; est, ut oxyrhodinum in principio admoveas. Nam repellendus a capite humor est, quicquid is fuerit. Quæ sequūtur, cōtraria sunt. Nam quæ cum vigiliis cōiuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cū immobilitate, excitare. Jure ergo quū in summo incremento sunt, in vitiis quæ pervigilio & delirio iūstent, perfusiones ex papaveris capitib. applicabimus. Odorē quoq; naribus 60 objiciemus: ac na riū alas intus, vel frontē ex similibus medicamētis illinemus. Quippe sopire ac stupefacere principē facultatem oportet, cerebrū scilicet, quod supra modū incaluit, refrigerādo: in contrariis autē vitiis excitare: ac noxiū hu-

moris, q̄ citra putredinē, & citra febrim, altos sopores invehit, crassitudinem incidere, exalface req; Tales nimirū altos sopores, Græci apoplexias, caros, & catochas appellant: Quod si quādo humor putrescat, utiq; cum febris incidunt ea genera, vocaturq; morbus Græcē lethargus. Incoquētes igitur in aceto thymum, & pulegiū, & 10 origanū, aliāq; id genus, naribus sic affectorum admovebimus, quō vapor sublatus ad cerebrū, humoris crassitudinē dissecet. Mox etiā palatū valentib. & acribus medicamētis ungemus. Ab his verō etiā sternutamētis utemur: tū capiti similes præsidiorū facultates imponemus, adaucta semper eorū, etiā ad ipsum usq; sinapi, vehementia, si vitiū diu p̄severet. Quinetiā cucurbitis ad utruq; vitiū, si diutinū sit, utemur: itēmq; castoreo, q̄p̄pe q̄ ipsum p̄bē cōcoquit, debitē administratum. Quoties aut medicamēti alicujus vim exactē ad cerebrū descēdere voles, ad coronalē vocatā futurā (cujus plurima diversitas in 20 hominibus est) id applicabis. Nam præter reliqua, tenuissimū, & rarissimū eo in loco est cranii. Cōmodius etiā fuerit, si & cū infrictione id facias, aut tonsis capillis, aut etiam planē abrasis. Quod si humidū sit q̄ applicandū est, si id ex alto effundas, ac veluti fontis ritu illidas: quippe penitus intrō ab ictu magis impellitur. Sicuti autē hic vehemētiōr humoris casus cōducit, ita in oculis adversatur. In capite nanq; insensile os est 30 q̄ feritur: in oculis mēbranosa quādā & imbecilla, maximēq; sensilia corpora. Et in capite q̄dē, aliud est q̄ ictū excipit, aliud q̄ curatur: q̄q; ut ictū nō sentit, ita facultate, q̄ ex incussu ad ipsum p̄venit, fruit. Ac in oculo, q̄ est curandum, idem valenter feritur. Quare infundere huic sensim medicamenta, liquata humoribus micissimæ facultatis, oportet, attollentes palpebram superiorem blandissimē. Merito autem cōmendatur ad 40 phlegmonem oculorū, ex ovi humore, id quod tum glutinosum est, tum minimē mordēs. Ceterū quæ terrea corpora oculariis medicamētis miscēda sunt, ea lævigari exactissimē debēt. Dolerē porro vehemēter oculi, aut ex vehemēti acris cōfluentis humoris morsu, aut quod eorū tunc plenitudine distendantur, aut p̄pter crassiorū humorum, flatuosive spiritus extensionem. At morsum quidem, tum purgantibus medicamentis, deorsum nempe revellendo, & vacuando, 50 curare convenit: tum ipsi particulæ ovi humore infuso, quō p̄ eum acris fluxio sine offensa eluatur. Ubi autem concocta jam ipsa phlegmone fuerit, & simul corpus vacuatum, tum utique lavationes in balneo his sunt aptissimæ. Nam & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem ejus parte inter lavandum per totum corpus excreta, reliquo verō temperato. At distentionem quæ ex repletionē p̄venit partis, missione sanguinis, & alvi dejectione, & infernarum partium frictione, curare conveniet. Quod si necessitas aliquādo urgeat, etiam ligandis artubus: mox fomentis ex aqua dulci modicē calida, laboranti particulæ adhibitis. Ad humorum, vel flatuosi spiritus extensiones curabimus: vacuato prius in his quoq; toto corpore: sed & humorum momen-

Lethargus
quid.

Coronali
futura esse
applicanda
medicamenta,
quorum una
ex altē ad ce-
rebrum de-
scendere vo-
lumus
Capiti insi-
tuta fomen-
ta humido,
esse illidenda
ab alto.

Oculorū phle-
gmonas in-
vat albumen
ovi.

Oculorum
dolor unde-
exoriatur.

Oculorū mor-
tis curatio.

Oculorum in-
flammationē
quando, &
cur balneum
conducit.

Oculorum di-
stentionis a
plenitudine
curatio.

Oculorum a
flatulenta
substantia
extensorum
curatio.

Fæno græci decoctū oculorū tensio ni confert. Digerentib⁹ non esse utendum fidenter priusquam univēso corpori, aut parti quæ excrementū transmittit, consultum fuerit.

Oculis & afa adiacentia præcidenda tunc esse, dū imbecilliora reddita, aliorū vasorū excrementa recipiunt. Vasa conspicua posse abscindere chirurgiæ corroborari, illis medicamentis quæ robur inferant.

Vasa excidē. di rario.

Varices quæ ratione curantur.

to averſo deorſum. Mox localib. remediis utendum: nō tamē medicamētis iis quæ reperiunt, ac reprimant, ſed potius iis quæ diſcutiāt. Igitur fæno græci decoctū iis infundendū eſt: quod omnium maximē ſine offeſſa digerat. Verū tū reliquos morbos, tū phlegmonas, ſicubi curas, nullo evaporate auxilio prius fidenter uteris, q̄ totū corpus, aut pars quæ excrementū transmittit, vacuetur, aut cōtrariis qualitatib. alteretur, ſi aliquam intemperantiā ſortiatur, quæ ipſius fluxionis exiſtat cauſa. Sic. n. diutinas oculorū fluxiones curamus, oculis ipſis dimiſſis, atq; ad capitis cuſtodiam cōverſi. Plurimum aut vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida: nec dubiū eſt, quin etiam ambæ congregiantur. Rariores ſunt, quæ propter calorem, acrem oculis fluxionē immittunt. In quibus oleo crudo, & Hiſpano, & roſaceo, uti expedit: tum frequenti ex aqua dulci in balneo lavatione. Quod ſi arteriæ, venæque juxta oculos ſunt, imbecilliores ſint redditæ, adeo ut aliorū vaſorum ſupervacua recipiant, aliqua earū parte exciſa, aut etiā totis abundē altè præciſis, dura cicatrice quod intereſt intercipimus. Cæterū in reconditis vaſis hoc fieri nequit, ac proinde eorū vitia ægrè curationem recipiunt. Vaſa verò cōſpicua, vel abſq; chirurgia licet corroborare, illis medicamētis quæ robur inferāt. Eſt & quādo calidus ſanguis, ac vaporum plenus, ad caput aſcendit, ac maximē in arteriis redundat. Cui vitio ſaluberrimum eſt remediū, ut eæ incidantur arteriæ, quæ circa caput & calidiores apparent, & majorē exhibent pulſum. Quæcunq; verò & parvæ, & prope cutem reſident, harum vel ſi partem aliquā excideris, veluti facere in varicibus crurū ſolemus, aptius erit. Quod ſi inter nudandum appareat tibi vas magnū, aut magnū exhibere pulſum, tutius fuerit vinculo id prius excipere, moxq; in medio eſt, præcidere. Sunt aut ejuſmodi vincula ex materia aliqua minimē putreſcibili, potiſſimū ſi iis arteriæ ſint excipiendæ. Etenim quæ caro in abſciſſis vaſorū partib. coaleſcit, ea p̄ operculo eſt, atq; ipſorū oſcula claudit. Quod quidē ubi factū jam cernimus, decidere tunc tutō vincula poſſunt. Ac ſic etiam varices curamus, quæ dilatatæ ſunt venæ, potiſſimum circa crura & teſticulos.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. XIII.

Eryſipelas unde gignatur.

Eryſipelas quomodo à phlegmone differat.

Phlegmones generatio & ſymptomata

HAud lōgè verò abeſt à phlegmone alius morbus eryſipelas dictus: qui quidem ex ſucco bilioſo ortus, tumorē caloremque cū illa ſortitur communē. Diſſident inter ſe tamen affectus ii, primū maximeq; colore. Quādo quidē ſi is ruber ſit, vitiū vocatur phlegmone. Sin pallidus, flavūſve, vel ex pallido flavoq; colore miſtus, eryſipelas. Præterea pulſatio eſt magnæ phlegmones proprium ſymptoma: quippe quæ copioſo ſanguine in aliquā particulā procūbente, orta, altè magis in corpus dimittitur: inibiq; dolorē pulſatile, cum tenſione & renixu excitat. Eryſipelas verò in cute potius conſiſtit, ob tenuitatē ipſius pallidæ bilis. Ac corpore quidem p̄ naturæ modo ſe habente, amaræ bilis ſuccus exhalat inſenſibiliter. Ubi verò is vel longè co-

pioſior, vel craſſior, q̄ pro modo naturæ, redditus, univerſus ad cutim cōpulſus fuerit, eam tum perurit, tum in tumorē attollit, aliquid etiā ſubjectæ partis occupans. Hiic itaq; affectus eryſipelas nuncupatur. Qui quidē interdū cum exulceratione ſupremæ cuticulæ accidit, ubi ſcilicet bilis ipſa craſſior ſimul atq; acrior exiſtit, interdū aut ſine hac incidit. Ubi verò nec planè bilioſa, nec ſanguinea fluxio eſt, ſed ex ambab. conflata: utiq; ab eo q; in miſcella exuperat, nomē tumori indatur, dicaturq; de eo id q; præpollet, ſicut vel phlegmonē eryſipelatoſam affectum ipſum vocemus, vel eryſipelas phlegmonoſum. Cæterū ubi neutrū vincit, ibi vitiū phlegmones eryſipelatoſq; mediū vocetur. Ergo omnib. q; ſic præter naturā cōſiſtunt tumoribus, cōmunis indicatio vacuatio eſt: quæ nimirū adminiſtrat dupliciter: una repellentiū ad alias partes, altera per halitū digerentiū. At quoniā eryſipelas nō quantitate modo affligit, ſed etiā ob vehementē inflammationē qualitate ipſa cruciat, requirit ampliorem refrigerationē quā phlegmone. Cavendū tamē eſt interim, ne in princeps aliquod membrū ipſam bilē repellas. Ac proinde, quemadmodum in phlegmones curatione, poſt totius corporis vacationem auxiliis repellentib. utimur, ſic facies in eryſipelate: ſed p̄ ſanguinis miſſione medicamento q; bilē trahat purgās, ipſam verò afflictam partē refrigerās. Cujus ſanè refrigeratio nis terminus eſto, ipſa coloris mutatio. Etenim q; purum eryſipelas eſt, ſtatim cum hoc cōquieſcit. Quod nō purū, ſed quodāmodo phlegmonodes, ſi pluſculum refrigeres, lividā cutim præfert: nigricatq; ſi magis. Quāobrem ſatius fuerit, ubi laboratis particulæ alteratū colorē videris, à refrigerantib. aſtringentib; ad contraria tranſire, prius q̄ vel livida vel nigra prorsus fiat. Refrigerāt porro, ſolanū: ſempvivū, portulaca, umbilicus venēris, pſyllium, altercum, lactuca, intybum, paluſtris lenticula, cerata ex aqua admodū frigida, & alia id genus. Ubi verò inflammatio ægrotantis membri jam deſiit, cataplaſma illi, prius quā liveat, ex hordei farina imponendū. Quod ſi livor jam occupavit, id inciſa prius cute imponatur, perfundendusq; locus plurimū quidē ex aqua calida. Sed & marina aqua, & muria cōducet interim. Quinetiā ipſi cataplaſmati ejuſmodi aqua, vel acetū, vel oxalme miſceatur. Nullum autem valenter calfacientium eſt medicamentum la eryſipelatis, prius q̄ id quod mutatur, deſinat eſſe quod antea fuerat, atq; alterū jam, illiq; contrariū evaſerit. Interdū etiā eryſipelas miſcetur œdemati, diciturq; eryſipelas œdematoſum: quē admodum ubi ex nimia refrigeratione durū ægreq; ſolubile eſt redditū, eryſipelas ſcirrhoſum vocabitur. Quod igitur ad curationē pertinet, potiſſimum contra exuperans eſt pugnandum, non neglecta interim alterius indicatione. Sicuti autē ex bilioſa fluxione eryſipelas, ita ex pituita conſtat œdema, exiſtens laxus quidam tumor & indolens. Qui quidē in aquæ inter cutim diſpoſitionibus, necnon in phthoë, ſolet etiā pedes affligere. In illis tamen affectibus, quum talis tumor ſymptoma ſit, nullā ſeorſum propriā curationem requirit. Nam ſatis erit tunc perfri-

Eryſipelas quid.

Phlegmon eryſipelatoſum.

Evacuatio in tumor præter naturam, dupliciter.

Eryſipelas curatione.

Eryſipelas refrigeratio terminatio ipſa coloris mutatio.

Eryſipelas refrigeratio medicamentis idem.

Eryſipelas œdematoſum unde acci-

Oedema ex humor laxo & indolens ortus à pituita.

Oedemati curatione.

care

care erura, alias oxyrhodino, alias oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente oedema constitit, abunde aliquando satisfacit spongia recens, potabili oxycrato madidata. Deligare vero ipsam debes, ab inferiore parte incipiens, ac supra definens. Si recentis copia non sit, antiquam detergebis, expurgabisque nitro, aphronitro, & aqua lixina. Quod si sic oedema non subsidat, ubi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis concicies, ac novam spongiam admovebis: aut etiam ellychnion molle, madefque ex posca, quae aluminis non nihil receperit. Sit autem arctatio mediocris, veluti in ossis fractura. Ac primae quidem fasciae injectiones, quae scilicet inferne incipiunt, magis arctandae: quae deinceps sunt, sensim remittendae. Idoneum etiam medicamentum ad haec est glaucium ipsum, liquatum in posca: nostrumque medicamentum, quod ex eo conficitur: quodque non oedemata modo, verum multo etiam magis tumore erysipelata, tum phlegmonas incipientes sanat, ac potissimum calidas. Porro scirrhus affectibus (quod a glutinosis, aut crassis, aut utriusque rationis particulis humoribus trahit ortum) nullum vehementer excalefaciens, siccansve medicamentum est aptum. Nam quae ejusmodi sunt, digerunt quidem subtilia: quod vero reliquum est, multo magis impingunt. Qua ratione etiam calculi gignuntur in renibus, alio scilicet in his crasso glutinosoque succo. Quare ea tantum sunt admovenda tumoribus. Induratis, quae molliendo digerere possunt: cujusmodi sunt, tum cervina medulla, tum vitulina, tum sevu hircinum, taurinum, & leoninum. Ad haec, ammoniacum thymiam, bdellium utrumque, sicuti etiam styrax. Sed ex his, humetiora sunt praeferenda. His igitur artetis indicationibus, etiam complicatos affectus sanare poteris. Ceterum si tendones & ligamenta indurata fuerint, aliquid incidentium emollientibus admiscere oportet: cujusmodi vel in primis acetum est. Equidem pyriten lapidem, aut molam, sed candentem, in aceto quam acerrimo extinguere soleo: dein scirrhusum ligamentum, vel tendonem exponere, ut calente vaporem excipiat, in eoque dimoveatur. Postea vero medicamentum quod emolliat impono, oleoque aliquo tenui, a principio curationis, particula laborantem profundo. Itaque curatio quae per acetum administratur, utilis est vitio jam adulto: & quum praeparata jam sub molliantibus pars fuerit. Ad ligamenta autem & tendones, nec saepe, nec inter initia, nec longo tempore, medicamentis quae ex aceto componuntur utendum est: quamvis in liene & carnis musculi partibus tutus eius sit usus. Ac ammoniacum quidem thymiam liquatum aceto, ad luti scilicet crassitudinem, complures lieni imponunt: idque solum ei curando saepe fuit satis. Induratis etiam musculis, ubi emolliati per alia medicamenta jam fuerint, ammoniacum aceto liquatum maximum usum praestat. Sufficit autem eo uno alterove die usus, rursus ad emollientia reverti. Ego vero medio tempore cataplasmata ex althea sum usus. Cuius radix sevo anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, salutare ad emolliendos scirrhus medicamentum existit. Sylvestris quoque malva, quae passim nascitur, folia, cum supradictorum aliquo tunsa proficiet. Meliora tamen crudis sunt, quae modice ante

sunt cocta. Variatur itaque curationis motus pro differentiis particularum. Quippe laborantibus praecordii oedemate, nemo ex posca frigidam applicuerit spongiam, nec absynthii oleo incoquens, genui quisquam perfudit. At jecinori agrotanti & lieni, cum maxima utilitate adhibetur. Vocatur igitur scirrhus impraesentiarum tumor durus & indolens, non tamen omnino absque sensu. Talis enim non est sanabilis. Reliqui omnes, sicuti agrius sensibile ipsam partem affectam reddunt, ita omnino insensibile non efficiunt, utique si sensibilis sit natura. Ligamenta namque scimus insensibilia esse. Sed iam ad inflammationes nos convertamus quae quidem ex flatuoso spiritu in aliqua cavitate collecto oriuntur. Differt autem inflatio ab oedemate, quod ille tumor sit latus & digitis cedens, utpote a pituita exortus: inflatio autem maxime renitatur tangenti, sonitumque veluti tympanum reddat. Scopus autem omnium inflationum communis est, ut, quod praeter naturam est, vacuetur, in quocumque id contineatur: proprius vero, ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo quidem, inflatisque visceribus, oleum quod tenuium sit partium, quodque rutam habeat incoctam, aut semen cumini, aut apii, aut petroselinum, id praestabit. Aliquando vero & cucurbita magna bis terve sine incisione medio ventri affixa. At in artubus & musculis, qui sub cute, aut etiam membranis quae ossa vestiunt, sunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, lixivium nova spongia exceptum, abunde fuerit. Sin dolor quoque urgeat, unguenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendi, vim habeat. Musculi vero simul & inflati & dolentes ob contusionem, satius est, ut in principio sapa cum vino & aceti paulillo, mediocrique olei portione, omnibus una modice calfacitis, atque lana succida exceptis, foveatur. Quod si succidat facultas non sit, ipsius oesipus injiciendus supradictae miscellae est. Ceratum etiam quod ex oesypo componitur, ad idem non inidoneum fuerit. Debenet enim contusi musculi leniri medicamento, cui mista facultas sit, quae simul concoquat, digerat, & modice astringat. Quandoquidem si nihil astrictionis fortitur, auget aliquando phlegmonas, praecipue in iis corporibus, quae sunt plethorica. Igitur si dolor vehemens urgeat, mitigativa magis medendi ratione uteris. Sin vero ille absit, majori vi contra inflationem instabis, per valentiora medicamenta: cujusmodi sunt lixivium, acetum, & post haec, vinum. Quoties ergo de mitigando non laboras, illorum plus in misturam concicies. Rursus ubi repellere studes, vini nigri, austerique, plus quam ipsorum, immittes. At si digerere malis, lixivii plures indes. Acetum vero si his miscebis, ad ambo erit utile, propterea quod mistas habet facultates. Quod si musculi prorsus sine dolore sit, licet in lixivii penuria, pro illo aphronitrum immittere, idque minimè lapidosum, sed spumosum magis. Inflationes autem inveteratas, primo quidem aliquo ex iis quae ex lixivio constant, fovebis. Secundo vero strigmetis gymnasiolorum fervefactis, & mox colatis, pollinem calcis vivae inspergito, usque ad crassitudinem luti, ac tandem cataplasma id affectae sedi admovebo. Salutare etiam his medicamentum est, quod ex sycomoro conficitur. Est & alius inflationis affectus, priapismus dictus: quo detentis,

*Halituosus
spiritus gi-
gnitur ex suc-
cis sensim ex-
calfactis.
Priapismi
curatio.*

*Nymphaea.
Vitici semē.
Ruta semen.*

*Lingua ma-
xime tume-
facta qua
ratione cura-
rit Galenus.*

*Aversio est
molienda in
contrarium.
Color tumor-
is humoris
a quo est or-
tus, declarat*

*Atrabilis ge-
neratio &
facultas.*

*Fermentatio
quid.*

*Melancholi-
cus succus.*

vel invitis, pudendum arrigitur. Etenim quum nervus propriā colis substantiā constituens, natura cavernosus existat, ubi halituoso spiritu impletur, ejusmodi affectū excitat. At halituosus spiritus in animalis corpore gignitur, ex succis sensim excalfactis. In primis ergo ea vacuatione universum vacuandū est corpus, q̄ maximē videbitur ex usu fore aegrotanti. Dein verō imponendū ipsi laborāti particulā medicamentū est, si ea calidior sit effecta, quod ad portionem caloris abundantis refrigeret. Sin aliter, inter initia qdē, omnino quod modicē refrigeret: postea verō id necessum nō est. Pari modo & quæ circa lumbos sunt particulæ omnes, ejusdē facultatis medicamēto cōprehendendæ sunt. Etiā reliquus victus exhibend⁹, q̄ & flatui adversetur, & siccet. Equidem quendā adolescentem sic affectum curavi, primū qdē sanguine misso: dein cerato, facto ex rosaceo simplici, imbutoq; aqua frigida, pudēdo ac lūbis imposito. Simili modo & aliū, qui post missum sanguinem, humido medicamēto, quod ex chamæmelo conficitur, est usus. Porro istis etiam nymphaea aliquid potandum exhibeo, saltem in principio. Mox viticis semen: ac si traxerit adhuc vitium, rutæ semē copiosē comedendum. Est enim illud cōmune præceptū omnium ferme, quos vitiosus succus creat, morborum, quod in fine calfacientibus & siccantibus sit utendum: quippe hæc, quod reliquum humoris est, prorsus absument. At verō maximē tumefactam cujusdam linguā curavimus, catapotis ex aloē, scāmōnia, & colocynthide, vesperi datis illum purgātes: lactucæ autem succo ipsam linguam colluentes. Quod autem in priapismo vomitoriis medicamentis potius quam subducantibus sit utendum, in linguæ vitio contrā, id ex partium situ indicari perspicuum est. Nam aversionis in contrarium, non a substantia, sed a curandi membri positu, inventio præstatur. Porro ex tumorib. rubeus quidē, subesse humorē sanguineum indicat: sicuti flavus & pallidus, persimile ipsi bilem. Subalbidus verō & laxus, pituitam. Sunt & alij tumores fusci, lividive, tactui admodū renitentes. Quod si membrū sortiatur evidētiōres venas, exaltatas eas juxta hosce tumores a crasso & nigriore quodāmodo sanguine, videre licet. Qui humor, ubi incaluerit impēsius, aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodē, nigram efficit bilem, quam ne mures quidem ipsi gustaverint. Terra quoq; ab ea raditur: ac partes quæ raduntur, omnes attolluntur in altum: vocaturq; is affectus tum fervor, tum fermentatio. Est nanq; is humor talis, quale esse acetum docuimus: in vomitionibusque non raro percipitur acidus: ut amarus, qui pallida dicitur bilis. Quæ igitur verē dicitur atrabilis, acidā certē est, atque terram fermentans, omniq; animanti injucunda. Quæ verō ut talis fiat est apta, ea dicitur melancholicus humor, vel nigra etiā bilis: ita tamen ut distinguatur ab altera quæ ex affatione oritur. De nominibus tamen anxia disceptatione neglecta, nonnulli præter naturā tumores ex ejusmodi naturæ succo proveniūt, cujusmodi est sax in vino, & amurca in oleo. Qui quidē spatio temporis putrescēte humore, pro-

pterea q̄ sit impact⁹ in vasis, exulcerant. Atq; huiusmodi sanē affectū cōmuniter omnes cancrū appellant. Quod vitium, perinde ut reliqua omnia, plurimā habet in majoris minorisque ratione differentiā. Igitur cōmunis cancri curatio, est melancholici succi vacuatio. Mox, phibitio, ne de cætero talis humor colligatur in venis: particulæq; ne amplius redundantē succum recipiat, corroboratio. Solvemus aut melancholicū succum, drachmis quaternis epithymi, in sero lactis, aut mulsæ exhibitis: aut propinato medicamine nostro, q̄ ex duob. & triginta simplicibus cōstat. Post purgationē, dictū jam de omnib. ejusmodi affectib. est, q̄ vel repellere humorē qui in membrū pcubuit oportet, vel ipsum digere: præterea q̄ in principio quidem tam in ipso purgationis tempore, quā ante id, repellere: ubi jam totum corpus exquisitē purgaveris, digere. Ubi tamē mediocris tantum purgatio præcesserit, mistū esse q̄ applicabitur pharmacū, ex repellente digerenteq; facultate cōveniet. Cæterū ad discutiendos cancrōs, mediocriū viriū medicamentis est opus, quæ nec propter imbecillitatē vincatur, nec ppter effectus vehementiā, ipsum sanguinem crassent. Quia verō ipsius vitii malignitas, ab iis quæ mordent irritatur, & efferatur: ob id utiq; nō modō mediocria viribus, sed etiā minimē qualitate mordentia, ejusmodi affectib. sunt idonea: materia quorū, ex ustis elotisq; metallicis desumetur. Quippe quæ medicamēta ex his cōponūtur, ad sanandos incipientes cancrōs, magnā vim obtinent. Majores verō sat fuerit, si his prohibeatur augeri. Cæterum si quando cancrum per chirurgiā curare audebis, cœpisse quidem ab evacuando p purgationē melancholico humore oportebit. Ubi verō q̄ vitiatū est, totum prorsus excideris, sic ut nulla supersit radix, si nes effluere sanguinē: nec pperē eum inhibebis: imō premendo potius quæ circum sunt, venas, exprimes ex his crassiorē sanguinē: mox aliis ulcerib. similiter curabis. Est aliud vitii, carbunculus appellatus, quod ex humore crasso ferventeq; nascitur. Incipit hoc plerunq; a pustula: aliquādo verō & sine hac. Cæterum inter initia, quib. hoc instat, scabūt omnino particulā. Mox oritur pustula quædā, modō cineris colorē referens, modō etiam nigrior: qua rupta, ulcus cum crusta gignitur. Omnibus præterea his circūposita caro, in summā pervenit inflammationē: colore, magis q̄ phlegmone, nigricans. Necessariō aut sic affecti febricitat: quare ab incisa vena incipienda curatio est, detrahendusq; sanguis ad animi usq; deliquiū: nisi aliud aliquid obstat. Imponi verō sibi ægra particula, quod ad humorum inflammationem spectat, refrigerantia desiderat: propter crassitudinē tamen humoris, atq; etiam malitiā, nec fluxionē avertere unquā poteris: & si quando id feceris, aliud quippiā, q̄ in alto sit corpore, offendes. Atqui nec affluere is permittendus est. Quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cū modicē reprimendo, etiā digerere possint. Tale pfectō est tum cataplasma quod ex plantagine conficitur, tum quod ex cocta lente: scilicet miscentibus nobis his tenerā micam panis, & miscellanei, & in clibano cocti. Etenim panis omni-

*Cancro
ratio.*

*Cancro
tio.*

*Melancholicus
succus
purgans.*

*Metallum
medicamentum
sanans
incipiens
bus can-
idonea.
Cancro
chirurgi-
curatio.*

*Carbunculus
descriptio.*

*Carbunculus
ab q; febre
non reperitur
Carbunculus
curatio.*

*Carbunculus
cataplasma
idonea.*

no puri substantia in cutis meatibus hæere est apta. Furfuraceus autem, crassiorum est partium. Super ipsum verò ulcus valens aliquod imponendum est medicamē: cuiusmodi est Andronis, Passionis, vel Polyidæ: liquariq; id cum vino aliquo dulci ad sordium crassitudinem debet. Quæ autem pharmaca reliquis adhiberi ulceribus solēt, nempe quæ cōcoquant & pus moveant, ea nunc adhibenda nō sunt, quando ita particulæ putredinem auxeris. Scarificare etiam eiusmodi tumores post sanguinis missionē alienum non est. Sunt autē incisiones altiores mediocribus, propter infestantis humoris crassitudinem. Inflammatione cessante, ulcus ad cicatricē similiter reliquis, est perducendum. Atq; hætenus de carbunculis. Nunc verò de strumis differam, quas choeradas Græci vocant: quæq; fiunt, glandulis in scirrhum affectum mutatis. Est autem duplex ipsa glandularum natura. Quippe nonnullæ earum in quorundam vasorum medio, diductorum in varios ramos, ad tuendum eorum robur, sunt constitutæ: quarum haud magnus usus animantibus est. Aliæ verò ad excipiendam salivam, vel lac, vel semen, vel aliquem humorē alium gignendum, sunt fabrefactæ. Atq; harum sanè major est usus: nec aliter sanandæ sunt, si cōtraxerint scirrhum, quam ceteræ omnes corporis partes. At quæ medium vasorum spacium implent, in iis alia curationis indicatio præstat, quæ simul cum vitio etiam pars ipsa tollitur: idq; dupliciter, vel excisione, vel medicamētō quod putrefaciat. Sed tempestivum mihi jam est, ut nōnihil de abscessu etiam dicam: cuius duplex est genus. Unum, quum phlegmone in pus versa, pus ipsum tanquam in aliquo est sinu collectū. Alterum, quū nulla præcedente phlegmone, humor aliquis acris, iisq; aliis specie aliis, statim ab initio in aliqua parte colligitur, circūposita corpora excorians. Frequentissima verò huius morbi sunt tria genera: nempe atheroma, steatoma, & meliceris: à similitudine contentarum in tumoribus substantiarum, sic appellata. Est enim aliud eorum veluti sebum, aliud veluti mel, aliud pulicula, quam atheram vocant, simile. Curationis ipsorum indicationes sunt communes: nempe id quod continetur, vel digerere, vel totū putre reddere, vel excidere. Aliqui igitur ejusmodi tumorum triplicem curationis rationem admittunt, quotquot scilicet ex tenuiore humore constant, ut meliceris. Aliqui duplicem tantum, veluti atheroma: quippe quod tum excidere, tum putrefacere licet. Steatoma verò, sola manu opera curatur, quum nec putrefieri possit, nec digeri. In iis porrò abscessibus, qui in alto corpore delitescunt, ac potissimum in visceribus, medicamenta quæ ex aromatis componuntur, maximè sunt ex usu: utpote quorum vis collectum humorem tum in halitū resolvat, tum digerat. Theriace etiam, Athanasia, Ambrosia, medicamenque nostrum, ex Cretica calamintha confectum, unice commendatur. Quicumque igitur ex tumoribus toto genere existunt præter naturam, ij sui ablationem indicant: ut, exempli gratia, myrmecia, acrochordon, calculus in vesica, hypochyma, & mola in utero, hoc est, caro quæ-

dam informis. Siquidē omnia ejusmodi summo vere in totum cōtendimus. Quorū verò etiā locus ipse affectus una quæpiam naturalium est partium, prima indicatio est, ut affectus sanetur. Secunda ab hac, si is insanabilis sit, ut unā cum vitio pars quoq; ipsa excidatur: sicuti in cancro, & ulceribus omnibus, quæ curationē respuūt. E contrario verò in suffusione, q̄ hypochyma vocant, victi in prima indicatione, ad alium eam locū, q̄ minoris sit momēti, trāsferimus. Non desunt tamē, qui hanc quoq; evacuare conētur. Jam verò humor q̄ in hydrocelis visitur, alienus à corporis substantia, tota natura est: sicuti etiam quæ in ascitis hydropib. cōtinetur aqua. Quarū certē vacationē vel medicamētis quæ digerāt, molimur, vel chirurgia: in hydrocele quidē immisso siphone: in ascite verò, punctione adhibita. Quemadmodum autē in iis quæ antē cōprehensa sunt, cum affectu ipso exciditur etiam affecta pars, sic & in herniosis aliquid peritonæi. Pari modo & columella aliquādo unā cum vitio amputat: itidemq; in crurib. & in testiculis unā cū varicibus ipsæ venæ. Ad hæc tunica in naso cum polypo, & foratus dens cum foramine. Verum ex his nullum est, q̄ ad naturalē habitum reduci possit. In columella verò id omnino est cōnatum: nec properandū ad eam excidendam, sed quando ad lori videtur tenuitatē redacta, tunc auferenda est. Similiter & excrescentias carnis reducere ad mediocritatē oportet. Danda autē in hisce semper opera est, ut tum brevi tempore, tum citra dolorē, tum quamtutissimè cures. Verum ut tutò cures, tribus sis intentus oportet. Unum primūq; est, ut omnino absolutionē operis cōsequaris. Alterum, ut sicubi hanc nō cōsequaris, saltem cubantē nō lædas. Tertium, ut vitium nō facile revertatur. Ex horū autem consideratione facilē cognitu est, quando ipsius chirurgiæ, & quando medicamentorū ope pugnandum sit. At chirurgiæ quidem studium, in iis præsertim quæ nunc sunt proposita, ad interemptionem eorum festinat. Quod verò ex medicamentis petitur, primū huc tendit, ut quod præter naturā est, tum vacuet, tum digerat: aut si per membri naturam, aut rebellionē vitij non licet, ut id tum in pus vertat, tum putrefaciat. Similem curationē desiderant iis quæ cōprehensa sunt, etiā ea quæ in numero & magnitudine convenientē naturę modum excedunt, quæq; in iis ambobus deficiūt. In quibus amputare quidem cōveniet quod magnitudine redundat vel numero: reficere autem & fingere, quod deest, ubi videlicet fieri id licet. Quintum nanq; digitum non licet medico gignere, sed unius naturę opus sunt omnia talia. Ut autem à prodigiosa corpulentia curatione auspiciemur, si quis adeò obesus existat ut nec incedere, nec respirare possit, ei calidior ficiorq; temperies (quādoquidē hæc corpus exile reddit) est procuranda: adhibitis nimirū acutis exercitationibus, tenuatē victu, & id genus medicamētis, ac deniq; cogitationib. animi. Porro quæ ad articularia vitia medicamēta adhibentur, quæ scilicet valentē incidendi facultatē habent, iis tu quoq;, quū nimia obesitatem curabis, utilior. Sunt autē talia, rutæ sylvestris semen, aristo-

Sal Theriacus extenuat corpora. Obesum in Genem qua victus & me dicinaratio ne extenuavit Galenus.

chia rotunda, minus centauriū, gentiana, & polium. Præterea ex urinā cientibus, ea quæ pollentes habent vires, ut petroselinū. Sed & sal quod ex cōbustis fit viperis, potenter etiam extenuat. Ego verò juvenē quendā quadragenariū, oppidoq̃ obesum percuravi, usus tum antidoto, quæ adversus articularia vitia est cōposita: tum sale theriaco, ipsaq̃ theriace, ac reliquo extenuante victu, & p̃ exercitatione, cursu veloci. Præparavi tamē hominē ad cursum, perfricādo primū

Vina extenuando corpori apta quæ sint Extenuata corpora reficiendi ratio.

lintheis asperis, quoad cutis ruberet: dein statim cū oleo, q̃ in se digerēs aliquod medicamentum habebat: qualia sunt sylvestris cucurbitæ radix, althea, gentiana, aristolochia, panacis radix, polium, atq; centauriū. Per hyemē aut etiam à balneo reunxisse hominem jam dicto oleo profuerit. Verū cibum exhibere non statim à balneo, sed interposito somno, expediet. Quod si velit rursus etiam ante cibū lavari, permittes. Magis etiā ad rem pertinebit, si aquæ ipsi digerēdi facultas, aut insita, aut etiā acquisiticia insit. Verisimile aut est, aliquādo ex multo simul obito motu, febris hominē corripit: quæ tamē ad rē propositā neutiq̃ erit aliena, utiq; si medicus rectē omnia

Picatio macilentis conducat.

pegerit. Sanē fugere in obesis curādis conveniet vina quæ multum nutriūt, cujus generis crassa sunt: uti verò, vel aquosis, id est, colore albis, & substantia tenuibus, vel quib. aqua marina sit mista. At ubi eos qui extenuati sunt, reficere in animo est, iis vinū exhibebimus crassum, cibū verò q̃ succū efficiat crassum, exercitationes paucas, friccionē mediocrē, ac breviter omnia jam com-

Frictionis terminus, dū reficere est animus, fit tumor partis

prehensis cōtraria moliemur. His verò etiā picari est cōmodum, * idq; trib. aut quatuor diebus. Hoc quippe ad carnis generationē optimum est præfidiū, quum humectet & calfaciat, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assidue picari corpus ægrotās oportet, nec quū oportet, sæpe illinire: verū in hyeme bis, in æstate semel id fecisse est satis. Itaq; quibuscunq; particulis bonā habitudinē reddere cupimus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & picare oportebit, tantisper dum intumescat. Hoc ubi factum est, p̃tinus desistere cōvenit, pri⁹ q̃ digeri cœperint. Etenim quæ calfaciūt omnia, sicuti attrahere, sic sunt etiam digerere apta. Jam verò quibus totum corpus est extenuatū, iis lavari quoq; post cibum est cōgruum: quanquam timendum sic est, ne jecur eis obstruatur, potissimū propter ciborum speciem: quum nimirum aliter quoq; obstruere soleant, quæ succū crassum gignūt, si quis his liberalius utatur. Incidit etiam ex tali victu diutius exhibitō, calculi in renib. generatio. Quod si is qui dicto modo cibatur, gravitatis sensum in de-

Cappari ex oxymelite cōfert obstruccioni iccinoris.

Thapsia sanguinem attrahit ad partes quib⁹ fuerit applicata.

Præputij reficiendi ratio

xtris præcordiis aut circa lumbos pcipiat, protinus cappari ex oxymelite in principio cibationis donec constiterit gravitas, dabit. At mēbra verò quæ agrē reficiebant, ac plusculū jam refrigerata erāt, usus aliquando & thapsia sum, aliās ea ex melle membrū illinēs, aliās etiam ex cerato. Si quidem attrahit ea quoq; partibus quibus superposita fuerit, sanguinis copiā. Quibus autem exiguum aliquid pudendi præputio de naturali deest quantitate, iis non rarō sola tentione debi-

tum modum restitui, membranulā mollem, firmamq; * ex charta, cuti gummi illitæ extrinsecus circumvolvens. Ex interna tamē parte præputio ipsi rotundū aliquid ac mediocre, aut ex plūbo, aut ex charta, veluti fulcrū, supponi prius oportebit: q̃ videlicet, posteaq̃ agglutinata membranula fuerit, facillē eximas. Porro imminutio præ-

putii, duplici chirurgiæ rationi subicit: interim in superna pudēdi parte circulo incisa cute, quō videlicet eius unitate soluta, eaten⁹ deorsum trahat, quo ad glandē cooperiat: interim verò scalpro ex interna parte, qua glandis initiū est, excoriata, mox deorsum tracta, ac deinde molli vinculo deligata. Similiter q̃ in labiis, aut nariū alis, aut aure deficiūt (Græci colobomata vocant) cu-

rātur: primū quidē excoriata utrinq; cute: dein adductis, conjunctisq; inter se cutiū oris, atq; utriusq;, quod callosum est, detracto: mox quæ reliqua sunt, assutis agglutinatissq;. Eiusdem generis sunt, & quas in majori oculi angulo rhædas Græci vocāt: utiq; vel impēsius minuto, vel prorsus perduto ipso angulo. At prorsus quidē perduto eo, omnino insanabile relinquitur vitium. Minuto verò, iis quæ modicē astringūt curatur, si ta-

men totū corpus primū antē purgaveris, dein caput. Sunt mediocriter astringentia medicamenta, quæ ex glaucio cōponuntur, & croco, & quæ nardina vocantur: itē in primis & q̃ ex vino sunt confecta. In summa verò, quib. aliquid perit substantiæ, maximē quidē curandū est, ut ei quāsimillima substituat. Si id fieri nequeat, saltē aliqd quod eundē præstet usum machinabimur: ut, exempli gratia, pducetes callum pro osse. Por-

rō venas sensibiles regeneratas aliquando vidimus: verū has, non tam similes iis quæ antea perierant, q̃ easdē renasci dixeris, veluti in cavis ulceribus carnē. Cicatrix verò quæ in hac, calli modo durata, gignitur, ea cuti q̃dem est q̃ simillima, cutis tamen nō est. Nunc aut ad alia transeamus morborū genera. Serpens ulcus, q̃ herpes dicitur, ejusdem est generis cū exulcerato erysipelate. Ramex verò (quā sarcocelē vocant) cū scirrhis. Etenim herpetas biliosus, pcreat succus, sub cute hærens. Quo fit, ut eatenus affectus is, ejusdem sit cū erysipelate generis: atq; hujus quoq; magis etiā cum eo q̃ exulceratū est. Differt aut ab erysipelate, humoris tenuitate. Est. n. admodū tenuis q̃ herpetē excitat. Ex eo aut quod alter humor altero sit tenuior, crassiōrve, ulcerū differentia, quæ ex profunditate spectantur, proveniūt.

Hujus certē generis est, & quæ phagedæna Græcè dicitur, & exulcerati cācri. Quorū omnium cōmonis curatio est, ut inhibeatur primū humoris confluxus, post sanetur ulcus. Propria verò cujusque tum ex membri invenitur natura, tum ex humoris non solum specie, sed etiam quantitate. At tenuissimus quidem in ejusmodi humoribus est is, qui exulceratum herpetem excitat: crassissimus, qui cancerum. Proximum ab his locum occupat, quod ad crassitudinē attinet, qui phagedænas producit. Harum species quædam sunt, quæ Chironia, & Telephia dicuntur. Si quis igitur, toto prius purgato corpore, mox quæ influentem humorem reprimant, regerantq; medicamentis utatur, jam curaverit herpetem. Sin neutrum horum fecerit, sed tantum

Præputij rauran duplex n chirurgi

Coloboma

Angular imminutiones in oculis quo modo sint curantur

Venas sensibiles regeneratas Galenus. Cicatrix nata ulcere non est cum

Herpes ejusdem est generis cum exulcerato erysipelate. Ramex. Herpes ab erysipelate quomodo differat.

Phagedæna. Cancris exulcerati.

Chironium ulcus. Telephium. Herpes curatio.

tam ea quæ cicatricem inducunt, adhibuerit, utiq;
exulceratam cuticulam sic sanaverit: proximè ta-
men illi, quo minus exulceretur, non cõsuluerit.
Postmodum verò illa quoq; cicatrice inclusa, quæ
ipsi continua est, exulceratur: idq; longo spacio,
ceu malo ipso serpente, fit, donec humor unde o-
ritur, sit inanitus. Vacuadus itaq; est perejusmo-
di affectus semper is q; redundat humor, aliquan-
do medicameto q; flavâ purget bilem: sæpe eo q;
nigram: modò eo q; mista sit facultatis, quodq; si-
mul bilem & pituitâ educat, veluti in miliari her-
pete, qui nò protinus ulcus facit, quemadmodum
alter: sed admodum exiguas pustulas ad speciem mi-
lij, quæ ipsa interposito spacio in ulcus etiã dege-
nerant. Adeò non absq; ratione quibusdã est vi-
sum, in ejusmodi vitio bili esse aliqd pituitæ cõ-
mistum. Cæterum ad generationem ulceris, in ijs
quæ extrinsecus admoventur, exuperare debe-
bunt, q; repellendi facultatē habent. Ubi verò non
amplius cõfluit in ægotantē particulā vitiosus
humor q; digerunt. Siquidem exiguum vitiosi humo-
ris etiã si quis ad viscera reprimat, leve damnum
cõmittet. At si ejus quantitas sit momētanea, in
princeps aliquod membrum aliquando pcumbit.
Ac repellunt quidē, non solum ea quæ astringunt,
sed etiã quæ sine affectione refrigerant: digerunt
verò q; calfaciunt. Porro flavæ quidē bilis vacua-
tio est facilis, pituitæ verò & nigræ bilis, diffici-
lior, quo magis purgantis medicamenti ope indi-
gent. In herpete aut, quoniã tenuis est humor q;
ipsum creat, abunde est etiã alvū solvisse: vel uri-
nas, per ea q; modicè efficiunt, citasse. Quod ve-
rò ad acrochordonas & myrmecias curandas pti-
net, nò deest Romæ q; eas apprehēdas primorib.
dentib. exerat. Sed & scalpro ad myrtacei folij
speciem formato, & ferrameto q; scolopomachæ-
rion dicit, eas faciliè quispiã excidere possit. Ae-
quæ verò & valēte aliqua pinna circulo mirme-
ciæ imposita, ipsa educimus. Debet tamē pinna
fistula esse myrmecia crassitudini par, ut eam un-
diq; prorsus cõstringat. Quæ postea circūacta, ac si
mul deorsum impulsâ, celerrimè ita myrmeciã
totã etiã cum ipsa radice educet. Jam verò, q; ve-
hemēter attrahētib. sursum myrmecia vellet, &
putrefacientib. enecabit, ratione ab aliquo invē-
tum est. Quum igitur interdum quædam partes
deficiant, quæ adesse debuerāt: quædã verò red-
undent, quorum non erat opus: adimere quidē
q; supervacaneum est, sanè haud difficilè fuerit:
aliud verò producere, q; simile ei sit, quod de-
fuit, id in quibusdã quidē est faciliè, in quibusdã
difficilè, in alijs planè fieri nò potest. Si nãq; car-
nosum sit q; deest, haud magno negotio id refi-
cias. Sin os sit, ipsum quidē instaurare nò licet, cæ-
terum aliud pro eo durum efficere. Diximus au-
tē vidisse nos venas alias sensibiliter generatas.
At si digitus desit, is restitui nò potest. Cæterum
quæ in naso, vel aure, vel labio sunt curta, ea qui-
dem ut refecisse non licet, sic decorem aliquē his
adjicere licet, si quis divisam utrinq; cutim, mox
in unum conductam queat agglutinare. Porro
quemadmodum in sinuosis ulceribus generatio
carnis, sic in capite & palpebris productio pilo-
rum, opus naturæ existit. Etenim ex succis qui
per cutim transpirat, quod limosum est, id pilos

tum à principio gignit, tum de cætero veluti suc-
crescendo augeat. Hoc igitur, quoties vel prorsus
perit, vel redditum est vitiosum, toties pilos cor-
rumpi est necesse. Corruptuntur nãq; & stirpes
ipsæ duplici de causa: aliàs nutriente succo desti-
tuta, aliàs nò idoneo usæ. Ac prorsus quidē per-
dito eo qui pilos alat succo, calvities oritur. Eodē
vitiato, ophiafes & alopecia proveniunt. In qui-
bus & inhibere quod influit, & absumere & di-
gerere quod jam occupavit languentem locum,
conveniet. Ergo ceu in ulceribus illis purgationē
nocētis succi primū adhibuisti, eodem modo
in pilis ipsis ab hac primū exordienda curatio
est: scilicet æstimato prius cutis colore, cujus cer-
nis corruptos pilos. Nam si is albidior quàm pro-
naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationē
molieris: sin pallidior, ejusmodi bilis purgatio-
nem: non secus quàm si nigrior conspicitur, quæ
nigram detrahunt bilem offeres. Quū autē jam
planè purū ex purgatione corpus æstimas, eum
qui in cute cõtinetur humore digerentibus me-
dicamentis discuties: sic tamen ut in his caveas,
ne adeò calida, acriq; admoveas, ut cutis exul-
ceretur. Quinetiã ea quæ valenter siccant, cavere
conveniet: ne videlicet cū vitiato humore, utilis
etiam absumas. Ego verò iis medicamentis quæ
alopeciam sanarent, exiguum thapsiæ admiscui.
Cæterum ubi vel tumefactum plusculū, vel ex-
coriatum ex ipsius usu, pericranium conspexi, il-
lo quidem die à medicamento abstinui: ille vi-
tem particulā, vel galli. vel anseris liquato sevo:
deinde postero die, si nihil tale apparuerat, rur-
sus eodem medicamento sum usus. Jam eos qui-
bus periēre ciliorum pili, similibus genere medi-
camentis sanabis: ne utiquā tamen cõmittes, ut
medicamentum intra oculorū tunicas cõfluat.
Quare sicca longè tutiora existant. Porro ptery-
gium, tametsi à sanitatis habitu sit alienum, non
tamen substantiæ ratione, quemadmodum athe-
roma & meliceris, à natura alienum existit. Eius
verò sanatio, si quidem parvum & molle sit, per
ea medicamenta quæ detergent, perficitur. Ubi
magnum durumq; evasit, chirurgiam postulat. Si-
mili ratione & aquularum quæ magnæ sunt, chi-
rurgia curabis. Quæ parvæ existunt, siccantibus
medicamentis curantur. At chalazion, quū toto
genere sit à natura alienum, auferri postulat. Ad
eundem modum & oculorū pus. Verum id ple-
runq; medicamentis digeritur. Hypochyma ve-
rò jam incipiens digeritur, ubi diu constitit, non
potest. Justus medicus ætate nostra concussione
capitis multos hypopios sanavit. Mansit enim
horū pus deorsum, propter gravitatem substan-
tiæ. Hypochyma autem levius quum sit, nebu-
læq; similis q; pus, haud ita dehiscere potest. Cæ-
terum quod serosioris naturæ est, id punctione
ad præsens discutitur: interposito tamen haud
longo spacio, ceu vini saxe quædã revertitur. At
quando pus oculorum digerere est animus, col-
lyriis quæ myrrham habent, maximè utemur.
Quæ verò vehementer siccant, ad præsens cer-
tè valenter vacuant, sed quod reliquū est, ita co-
gunt: ut ægrè resolvi possit. Multum autem pu-
ris vacuabimus, divisâ tunica ceratoide, paulò
supra coronam. Sunt præterea ex genere eorum

*Pilorum gē-
neratio unde
Pilorum cor-
ruptela unde
accidat.
Stirpes dupli-
ci de causa
corrumpi.
Calvities.
Ophiafis.
Alopecia.*

*Pilorum vi-
tiis quomodo
succurrendū*

*Thapsiæ uti-
batur Gale-
nus ad alope-
ciam curandā.*

*Pterygij cu-
ratio.*

*Aquularum
curatio.
Chalazij
curatio.
Oculorū pus:*

*Hypopios sa-
nabat Iustus
capitis con-
cussione.*

*Hypochyma
semel discus-
sum punctio-
ne, reverti.*

*Oculorū pus
collyria ex
myrrha di-
scutiunt.*

*Pus oculorū
vacuari dicit
sa tunica ce-
ratoide, paulò
supra corō-*

*Ascarides.
Helminthes.*

*Vermes peri-
muntur ab
amaris medi-
camentis.*

quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides & helminthes, siue eæ rotundæ sint, siue latæ. Quocirca expelli prorsus eas è corpore expedit. Expelles autem, si prius enecaveris. Enecabis amaris medicamentis. Ac teretes quæ ablinthiū perimere potest. Latæ vehementiora medicamenta desiderat, sicuti & quæ ascaris græcè vocatur

GALENI PERGAMENI
de arte curativa ad Glauconem, lib. I.

CAP. I.

Naturam cuiusque propriam medicum agnoscere oportet.

Non cōmunē tantum omnium hominum naturam medicum cognoscere oportet, sed etiā uniuscuiusque propriam. Nō tamē propriam singulorum naturam, æquē atque cōmunē; possibile est scribere. Quū igitur ad rectē medendū plurimū conferre temporis occasio, & quāritas auxiliorū videatur, hæc autē propria in unoquoque ægro se contemplanda obijciāt, nec quicquid propriū possit sermone explicari: ob id nimirū quod cōmune est, scribere cogimur, quævis id sit usu secundum. Etenim quantū quisque à naturali recessit habitu, ad tantā morbus magnitudinē pvenit. Distantiā verò recessus, facile deprehendet is, qui naturalē uniuscuiusque ægri statū exquisitē cognovit. Quod quidem quū nobis non liceat, confugimus ad communes notiones, in quibus artifex plus aliquid, quā inertes, assequitur. Porro qui omnia quæ secundū naturam & præter naturam sunt, divisione artificiosa complexus fuerit, atque ab iis omnibus, quæ sufficienter divisa erūt, indicationes sumpserit, solus is, quantū humanis permittitur viribus, minimē errabit medendo. Atque illos quidem quorum habebit notitiā, melius curabit, quā ceteros. Ignotos verò, proximē illis, quoad fieri poterit, ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam ætatum: postea eam quæ secundū temperaturas, potentias, colores, calores, habitudines, pulsuum motus, assuetudines, industrias, animiq; mores habet: atque his quoque adjunxerit maris fœminæque discrimen, expenderitque regionū, temporū, atque adeo ambiētis aeris temperies, hic ad propriam laborantis naturam agnoscendā proximē accedet. Nunc verò de his solum ægrotis dicere proposuimus, quorū natura, antequā morbū contraherent, nobis erat exquisitē perspecta. Cum quibus tamen reliqui omnes intelligentur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris. Cap. II.

Ephemerarum causa.

Febres cum bubone, si absque ulcere oriatur sunt suspectæ.

Ephemerarum curatio. Inedia tri-duana ex ephemeris reddit acrioris febres.

Primò igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis differamus: quæ nimirū ob lassitudinem, ebrietatē, iram, exandescētiā, mœrorē, atque alias vehementes animi sollicitudines excitantur. Ex quarū genere sunt quæ ab inguinum inflammationibus trahunt ortum, præterquam si absque ulcere fiant manifesto: tunc siquidem & suspectæ sunt, minimēque mites apparent. Vigiliæ plerūque induxerunt simplicem febrem: sicuti frigefactio, & exustio quandoque. Atque hæc omnes febres solvuntur facillimē, in hunc modum. Oportet enim ipsos cōfestim ducere ad balnea, deinceps ad consuetā victus rationē. Nam qui triduanū terminū absque cibo expectat, sæpius acrioris febres efficiunt. Quū igitur ad agrum accedes, pri-

mum à maximis quæ circa ipsum sunt, est cōsideratio inchoanda: deinde & ab aliis, adeo ut nec minimū quicquid omittas. Nā ut magis aut minus ei quod sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum sit adjunctione. Maxima quidem in omnibus febrientibus signa in pulsibus atque urinis consistunt. His verò addere oportet, quæcunque alia circa faciē scribit Hippocrates: accubitu quoque & respirationem. Item ea quæ ab ore excernuntur, atque alvi

sedimina: & si quid aliud accidere circa aliquā corporis partē, aut operationē videris. Quæ omnia cōmunia sunt omnibus febribus. Postquā ita ex pulsibus atque urinis febris naturā perceperis, quū pulsus nullū inflammationis signū habuerit, neque omnino inæqualitas in aliqua arteriæ cōpulsione se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: urinæ autē, aut prorsus similes iis quæ secundū naturā se habent, aut nō multum à naturali statu recesserint: tunc sanē & ad omnia illa quæ nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: et quum veluti chorus quidam omnia cōcinnē loquuntur, tunc certē fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. Si quid enim huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lavare: quū tunc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarum motus in hoc in totū assimilatur ei, qui in sanis deprehenditur, quum in nulla alia febre ad naturalē habitū revertatur.

Jam verò plurimis ephemerarū humidi quidā vapores, & quibusdā etiā sudores utiles cōspiciuntur, accessione cessante. Quo tempore etiā urinæ multo meliores, quā circa febris initia, videbuntur: & si capitis aut alterius partis dolor simul invaserit, neque, hic amplius persistet. Aegrotatis quoque in tolerandō facilitas, magnū & ipsa signū, febris suavitatē tibi indicabit. Et si dū lavant, nec horror aliquis insolitus molestaverit, nec alia tristitia adfuerit, post balneūque & deinceps bene se habere perseveret, tunc ne verearis offerre cibū, & vinum, adhibito tamen per tempore modo. Cōmuniter autē omnibus detentis ephemera, urinæ rufæ excernuntur. Adjungitur verò his qui propter tristitiā febricitant, acritudo potius quā abundantia caloris: quemadmodū è diverso iis, qui propter furem. Sed & extenuatio corporis in iis quos tristitia aut cura vexarunt, cōspectior existit: oculorū præterea cavitas, & quædā inconsueta decoloratio. Hæc quædē sunt & iis qui quovis modo aliter cōgitarūt, cōmunia. Maxime itaque ex oculis distinguere oportet. Nam ex his etiam in sanis animæ mores cōjicere possumus. At eos qui diu vigilarunt, arguit quædā palloris forma, faciesque sub-tumens, nec non ipse oculorum motus, quo vix palpebras, humore quodam imbutas, attollere possunt. At qui tristatur, aut cogitationibus detinentur, iis exiccantur palpebræ. Cavitas est commune accidens omnibus, mœrori, vigiliis, cogitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec oculorum cavitas, nec manifestus pallor, & plus caloris atque celerius ex imo prumpit: nec pulsuum magnitudo destruitur, quemadmodum in vigiliis, tristitia, & cogitationibus. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est sic-cior, quā in aliqua alia ephemera. Quæ autem

Signa maxima in omnibus febribus à pulsibus urinis petuntur.

Ephemerarum signa.

Pulsus in nullis febribus intermissi ne ad naturalem statum reverti possint quāquam ephemeris.

Diarrhæa solutionis accedunt.

Ephemerarum ex tristitia sollicitudo indicat novatio animi. Mores animæ ex oculis etiam manifeste cognoscuntur.

Cavitas oculorum quæ indicat.

ex densata cute accidunt febres (densatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) hæc quidē solæ inter omnes febres passio astricta existunt: ac vel solo tactu noscuntur, tum ob densitatē cutis, tum ob differentiam caloris, qui mitis quidem in primo tactu sentitur, acris autem, si plusculum tardemus. Non tamē & his urinae sunt ruffæ: neq; moles corporis cōcidit: neq; oculi redduntur aut cavi, aut aridi: sicuti nec pulsus minores, quemadmodum in mœroribus, cum ris, vigiliis, aut exercitiis immoderatis.

¶ De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap. III.

Febres quæ ex inguinū inflammatione fiunt, pulsus habet maximos, veloces, atq; frequētes: plurimusq; illis calor inest: ac postq̃ febris constitit, statim ex profundo quādā emergit humiditas, calida quidem, sed mitis. Atq; in totum facies rubicūda illis & magis tumēs, urinæq; subalbida. Cōmunis autem omnibus hujusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidē oportet balneis. Cæterum qui ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione febricitant, si in aëre balnei immorari jusseris, haudquāq̃ nocebis. Reliquos omnes quamcitissimē oportet ab aëre semovere. Si verò diutius in aqua immorari voluerint, permittere. Oleo aut multo, & tepido, & manibus mollibus perficere quamplurimum, sed eos præsertim, qui ex labore febricitant. Secundo autē loco, qui meatus habet astrictos: at tertio, qui inguinum patiuntur inflammationem, quos nimirum sæpius lavare expedit. Cibū autem cōcoctu facilē assumere qui ex labore febricitant, possunt multoties: nō æquē tamē, qui ex densitate, cutis aut inguinis inflammatione laborant, quorū etiā utriq; tenuis victus est utilis. Sed & vinum potare quantum possunt convincere sunt permittendi, quibus labor febris occasio extitit. Mensuræ aut ratio, ex viribus & ætate sumitur ægrotantis: necnon ex naturali temperie, consuetudine, anni tēpore & regione, alijsq; id genus. Qui verò ex inguinū inflammatione febricitant, arcendi sunt à vini potu, donec inflammationes solvantur. At qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non multum hoc affectu laborent, nec plenū corpus habeant, non sunt à vini potu prohibendi. Qui autē suprā modum refrigerati sunt, aut pleniore corpore; prohibere utile est. Rursus, qui ex vigiliis, aut aliquo animi affectu februnt, postquā balneaveris, cibo humido ac boni succi reficere oportet: vinū verò omnibus iis qui vigiliā passi sint, intrepidē offerre, nisi capitis dolore premat, aut pulsum venarū in temporib. sentiant. Sed & iis qui ex ira aut mœrore aliquo, aut cogitatione febricitant, vinum est exhibendum: sicuti & illis, qui furore perciti fuerunt, quando omnino perturbatio fuerit refrigerata: nam prius sanē usus vini erit periculosus. Tentare autē oportet semper adferre contrariū ei quod infestat: labori quidem, quietem: vigiliis, somnum: iræ, furori & tristitiæ, sermonibus, actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucunditatē. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino ratiocinationes omittat. Et qui ex inguinum inflammatione fe-

bricitat, eius curationi intendat: ac multo prius ulceris, unde originem habuit. Atq; hæcenus de ephemerarū indicibus, remedijsq;. Reliquæ verò febres, nōnullæ ex inflammationibus, nonnullæ ex humorib. accenduntur. Et quæ ex inflammationibus fiunt, sunt veluti symptomata quædam partium inflammatarum.

¶ De febribus putridis. Cap. IIII.

Atq; ex humorū putredine acceduntur febres, eæ & dicuntur putridæ, & sunt nō morborū symptomata, sed ipsæ morbi. Ex his verò nōnullæ, quædem absq; accidentib. accidunt, & mitissimæ sunt: nōnullæ item cum accidentib. urgēt. Earū igitur quæ accidentibus carent, pauca quidem ad exactam sui cognitionem, diem quartū desiderant.

¶ De signis febrium intermittentium. Cap. V.

Quæ igitur cum rigore invadunt, non ab re ex earum esse numero judicabis, quæ per circuitus infestant. Tertianæ enim atque quartanæ in totum cū rigore accessiones faciunt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt: quartanam autem non vidimus cum vehemēti rigore incipientē, sed procedente tempore magnitudo ei supervenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris ut plurimū solet invadere, sed alijs quæ antecesserint, subsequi. Quartana itaq; solet errabundis febrib. supervenire. Quotidiana verò, rarò accidit absq; læsione oris ventriculi. Rursus quartana ex malè affecto splene gignitur: ut tertiana ex affectu jecinoris. Quæ verò cū valido rigore incipit, magis febris tertiana, q̃ aliqua aliarum febrium fore speratur. Quod si reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognosces. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autē magni, calidi, vehementes, veloces, atq; frequētes, omnisq; inæqualitatis, præterquam febrilis, expertes. Rigor porro, veluti si à re aliqua acuta, plus quā frigida, corpus perpungeretur: quum ij qui quartanā aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autē anni æstivum: sicuti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægrotantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis: & exercitationes potius quam ociositas antecesserint: magisq; deustio, q̃ refrigeratio, & parcitas cibi, potius quam crapulæ. Vigiliæ quoq;, mœrores, atq; labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducūt. Quod si multos alios eodem tempore laborantes contigerit tertianis corripī febribus, hoc quoq; maximū aliquod, præter ea quæ nuper diximus, signū erit. Si igitur hæc omnia adfuerint indicia, aut saltem quæ maxima sunt, & sitis quoq; vehemēs adjungatur, vomitusq; bilis, aut sudor, vel utraq; supervenerint, tunc nulla dubitatio relinquitur. Quod si inter hæc à febre quieverit homo, hac inquam quæ ex suo motu est omnibus nota, propria verò febrium inæqualitas in arteriarum motu relinquatur, tūc firmiter poteris esse tertianā febrem ostendere, ac si tertio jam die accessionē fecisse vidiſſes.

¶ De signis quartanæ. Cap. VI.

Dum rigent q̃ quartana tenetur, pulsus habet satis tardos & raros. Quum autem consistit febris, atq;

Febres ex inflammatione sunt symptomata partium inflammatarum.

Febrim putridarum differentia.

Quartana non solet ut plurimū statim a principio invadere, sed alijs subsequi.

Intermittentium singula, quarum partium committuntur læsiones.

Febrem tertianam quæ arguant.

Quartana rum indicia.

atq; etiam augetur, necesse quidē est ut veloces fiant, atq; frequentes. Servatur tamē & tunc propria ipsius tarditas raritasq; , si additā velocitatē atq; frequentia in accessionibus mediteris. Jam quæ omnib. cōmunis est febribus , in uno pulsu inæqualitatē, in hac manifestissimē licet cōprehendere. Multo nanque velocius principium, si nemq; motus invenies q̄ medium. Præterea æstum, & deustionē, & quendā veluti fervorem, qualis in tertianis videt̃, in quartanis haudquam invenies. Sed & ægrotantis natura inspicunda est, an atra in ea bilis abundet: & tempus quoq; anni, an sit autūnus: & præsens status, an inæqualis. Sic verò & loci natura, et morborum pervagantiū vulgariter, & an lien intumuerit, febrisq; antecesserit inordinata, & ætas senior q̄ cōsistentiū, & an cum sudore febres desinant. In his verò bilis flavæ vomitus minimē expectandus est: quemadmodū nec in quotidianis intermittentibus. Hoc etiam tertianarū est propriū 20 signum. At quum febris cessaverit, si adhuc vestigium febris remanserit, pulsusq; iis, qui secundū naturam rariores atque tardiores fuerint, quartana proculdubio erit hujuscemodi febris.

¶ De signis quotidiana intermittentis.

Cap. VII.

Quotidianarum indicia.

Quotidianæ intermittētis calorem humidiorē cum quadam acrimonia esse oportet, non quū primum manus admoveatur, occurrentem, sed per moram. Nam quædam fumosa caliditas 30 cum multo vapore cōmixta, perspirare videbit̃. Sed & his lōgē minores sunt pulsus pulsib. quartanarum, q̄ istarum pulsus pulsibus tertianarū. Rursus verò, tantō rariores sunt in quotidianis intermittētib. pulsus, his qui in tertianis, quantō illis pulsus quartanarum. At tarditas in utrisq; eodē modo se habet. Minus verò siticulosa hæc febris est, tantumq; eam quartana excedit, quantum istam tertiana. Humidissimum etiam totum corpus in his febribus est, & vomitus pituitosi. Quæcūq; aut excernuntur per ventrem, frigidiora, humidiora, crudiora, & pituitosiora existūt. Et quidem ætatibus, naturis, anniq; statibus, & temperaturis humidioribus, hæc febres accidunt, Nam adolescentē billosa & sicca temperatura, nunq̄ vidi quotidiana corripere. Pueri autē præsertim minores natu, & ex adultis pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; ocio plurimo dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis assiduis, post cibū præsertim, utētes, facile à quotidianis capiunt̃. Loca etiā humidiora, atq; ex anni temporib. hybernū, ex statibusq; humidiores, hanc præcipuē cōciliāt febrē. Quod si populariter etiā grassetur, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendā conducet. Non tamen harum febrium declinationes, quemadmodū tertianarū & quartanarū, sudoribus terminantur: quare neq; ad integram quietem, exceptis paucis perveniunt. Quotidianarū urinæ sunt albæ, & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubicundæ. Tertianarum rufæ, vel subrufæ. Quartanarum variæ quidem, sed crudæ omnes.

¶ De signis febrium continuarum.

Cap. VIII.

Febres autem cōtinuas hinc cognosces, quod

nullum eis adest signum, ex iis quæ adesse intermittētib. diximus: & quod intra quatuor & viginti horas nō cessent. Si verò inæquale incrementū habuerint, hoc quidem præter alia signa, longius etiam tempus ostendit: necnon si proprium febrium signum in pulsibus manifestum adsit. Quod si inordinatio etiam ac inæqualitas 10 ipsis vel incōcinnitas insit, & hoc etiā indicium simul magnitudinis atq; continuitatis. Si verò in hoc statu permanentes, tertio die majorē accessionem ostenderint, aut excremēta & urinæ omnino crudæ apparuerint, nō possunt hujuscemodi febres ante septimū diem terminari. Ad hæc, si quarta dies tertiæ diei similis fuerit, & febris veluti deurens, nec facies, aut reliquum corpus collabatur quicquā, hujuscemodi febris ad longius extendi tempus consuevit. Actales quidem sunt differentiæ earum febriū, quæ accidentibus carent. Curatio autem cujusq; earum deinceps scribetur: primum tamen intermittētium, dein cōtinuarum. Ex intermittētib. igitur brevissima mitissimaq; est tertiana. Longissima autem, & quantum in ipsa est, haudquaquā periculosa, 20 quartana. Quotidiana verò, & longa, & nō sine periculo. Porro* ubi morbi existunt acuti, celeriterq; ad statum perveniunt, etsi valdē tenuem victum exhibeas, non multum lædes. Ubi verò sunt diuturniores, nisi ab initio cibo uberiore reficias, hominē simul cum morbo perimes, aut 30 intempestivē victus modum commutabis. Neq; enim oportet statu accedente offerre largiorem cibum quā prius: sed contrā, potius tenuissimum victum, qui toto morbo exhibeatur, in statum reservare. Distinguendum autē est, num exquisita, an minimē exquisita sit febris. Etenim exquisita tertiana, ad maximū septem circuitib. 40 judicatur, estq; minimē periculosa. Alteram verò non exquisitā, quandoq; vidi, quū in autumno incepisset, in vere desuisse. Quantū autem hæc natura inter se differunt, tantum rationale est & rationem victus mutare. Ergo si quæ in principio sermonis tertianarū febrium indicia scripsimus, omnia adfuerint, exquisitā reddunt tertianā. Cujus accessionis tempus breve, quatuor, aut quinq; aut sex: ad longissimum, undecim aut duodecim horas cōplectitur. Atq; hujuscemodi febrium urinæ, tertio die, aut ad summum quarto, coctionis signum ostendunt. Quibus sane indicib. exquisitā, à non exquisita tertiana distinguas. Eadem quoq; ratione exquisitam quartanam & quotidianam. Cui enim omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribus antea descripsimus, hæc vera & exquisita est quartana. Cui verò minimē, spuria & nō exquisita existit. Quotidiana etiā cui omnia quæ diximus insunt, exquisita est: quæ autē eam naturā non habet, spuria. * Nō igitur quemadmodū exquisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam non exquisitæ, sunt longæ. Nam quemadmodū exquisita tertiana est brevis, sic & quotidiana & quartana diuturna. 60 Cæterum non licet nobis bene prænoscere, nisi re illius quantitatem morbi atq; virium accuratē expendamus. Etenim si vires adeo validæ fuerint, ut morbum vincere possint, necesse est ægrotum evadere. Sin verò contrā, omnino morietur.

Tertianæ brevisissima mitissima

Quartana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

Quotidiana est longissima

§ Cura exquisitæ tertianæ. Cap. IX.

Exquisitam ergo tertianā, ut quæ ex flava bile comota invalescat, quæ maximè fieri potest refrigerare, atque humectare oportet. Nam contrariorum contraria remedia sunt: quæ quidem quæ superfluum est reprimant: quæ verò deficit, suppleant. At flavæ bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus calidissimusque existit. Hunc igitur, quum ad ventriculum repit, per vomitum educere oportet. Quum verò vergit ad inferiora, eodem modo per alvum: id quod fieri solet spontè in exquisitis tertianis. Per urinam quoque, & sudores oportet ipsum vacuare. Ac venter quidè, mollibus clysteribus inaniendus est: urina verò, potionibus, in quibus apiu, aut anethu maduerit, provocanda. Quod si tibi coctionis signa monstrentur, jam cum fiducia aliquid absinthij exhibebis: quod alioqui summum est remedium, ubi infestaverit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit satis, accipies, melicrato intinxis. Balnea verò calida ex aqua potabili, sunt: tum quia aliquid bilis educunt: tum quia sua qualitate & humectant, & potentia refrigerant. At marinæ aquæ salæ, nitrosæ & sulphuræ, plus quidè bilis educunt, sed magis sua qualitate nocent, quæ evacuationibus juvæt. Semper autem oportet contrarias qualitates, illis quæ invaluerint præternaturā, opponere: quum hoc multo plus juvæt, quæ quomodolibet evacuare. Hic itaque in balneis scopus sit, ut corpus madeat, utque humectetur. Ubi igitur plurimum olei calidi infuderis, ad aquam perducere, ac madefacere oportet. Quod si in ea natæ voluerint, quantum id facere possunt, permittendum. At qui balneis admodum delectatur, si etiam bis in die lavari permiseris, non aberrabis. Sed illud semper habeto in memoria, ut tempestivè id faciant. Si verò etiam coctionis signa ostendantur, si sæpius laveris, nihil deliqueris. A vino autem, antequam morbus coquatur, prorsus est abstinentum. Verum ubi concoqui is coeperit, dandum est ab initio tenue, aquaticum, atque paucum. Ubi verò jam propè est ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicunque humectant, atque refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis. Cæterum quantitas in ipsis sit tanta, ut bene concoqui possint. Ex oleribus quidem, atriplex, blitum, lapathu, malva, lactuca, & cucurbita. Ex aliis, verò ptisanæ succus, sorbitio ex alica, ex piscibusque saxatiles. Ex volatilibus denique ea, quæ mollibus constant carnibus. Quæ autem talia non sunt, eorum alæ, testiculi quoque, gallorum & suum pedes, & cerebra. Parvorum verò si etiam dederis carnes assas, nihil nocebis. Sed & ova ad sorbendum sunt offerenda, & præsertim vitelli eorum: nam hi facilius quam pars alba coquantur. Ex fructibus autem illos tantum degustent, qui non sunt omnino difficiles cocti: Oportet abstinere à melle, sinapi, salitis & acris omnibus: sicuti & à vinis satis vetustis & calidis.

§ Cura tertianæ nothæ. Cap. X.

In iis verò quæ non adeo exquisitæ sunt, providendum est, ne morbus augeatur, neve ægrotantis vires corrumpantur, quæ laborare longiori tempore debent. Quare operæ precium est scire, ad quam magnitudinem morbus ipse sit perventurus, & quæ sint ipsius ægri vires: ut ad ea inspiciens

quæ majus auxilium postulant, inedia quidè in valentioribus utaris viribus, & morbo concoctu difficili: largiori autem cibo, ubi vires sunt infirmiores, nec morbus admodum ad concoctionem contumax. Jam verò in tertianis non exquisitis, nec statim circa initia balneare expedit, sed quum primum coctionis signa apparuerint. Nec cibum quotidie offerre expedit, sed alternis diebus. Quies verò & calfactio circa præcordia juvæt, & sorbitiones quæ concoquuntur facile & clysteria non admodum mollia. Quod si sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum est: sed ab initio statim tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigit. Sit autem totius victus ratio, non quæ humectet, atque refrigeret universum corpus: sed quæ aliquem modum etiam assumat, ad calfaciendum, incidendumque. Plurimum igitur eos juvat ptisanæ succus pipere adjecto. Ad hæc, hyssopu, vel origanu, vel spicæ nardi mulsa infundens, & decoquens, ad bibendum propina, & quæcunque alia provocantia urinam, exceptis illis, quæ præter modum calefaciunt, exiccantque. Maxime verò post diem septimam danda eis jugiter est absinthij coma. Et quidem oxymel potionem plurimos juvat: & aliquid ex iis quæ molliter ventrem subducunt. Vomitus etiam post cibum, adeo his quibus hæc febris perduraverit, utilis est, ut multos sciam solis vomitibus statim fuisse curatos.

§ Cura quartanarum. Cap. XI.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullum forte medicamentum, aut evacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehementer superabundans appareat. Cæterum si vena incisa, is qui fluit, niger & crassus videatur (qualis in iis præcipuè visitur, qui liene laborant) audacius mittendus est. At si flavus, aut tenuis cernatur, subito supprimendus. Venam verò secare oportet, vel anteriorem vel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victum deinceps instituere sine flatibus, ac optimum: ventremque emollire, iis quæ usitata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus utendum est, à principio quidem mollibus, postmodum verò acrioribus. Arcedi sunt autem à suillis carnibus, ab omnibusque edulis quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, quæque tum refrigerant, tum siccant corpus. Vino verò utendum est albo, tenui & mediocriter calido, & volatilibus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui facile concoquantur, ac molles carnibus, nihilque tenax habentes. Utendum est autem salsamentis, & sinapi: ac certis diebus medicamentum diatrion pepereon, vel diosporiticu est assumendum. Quod si quotidie pipere tantum cum aqua biberent: rectè etiam facerent. A frictionibus autem, ambulationibus, atque balneis, non sunt penitus prohibendi. Quamquam si omnino possent à balneo abstinere, solis continenti frictionibus, inde plurimum juvarentur. Jam si quartana ipsa sit brevis, nec admodum violenta, nihil nocuerit si diebus interjectis ad consuetam exercitia se transferant. Hæc igitur ab initio, & usque ad statum sunt peragenda. In statu autem subtilior victus ratio adhibenda est, quæ ante, vel post. Statim verò æger continendus in quiete est: ac visceribus providendum unguentis & cataplasmatibus, quæ

Tertianis nothæ victus ratio conveniens.

Tertianis nothæ confert plurimum vomitus provocatus post cibum.

Quartanas in principio esse tractandas leniter, nullamque temerè molendam esse fortem evacuationem: Sanguinis missio in quartanis quatenus celebranda.

Quartanis victus ratio conveniens.

Diatrion pepereon quartanis utile. Piper cum aqua singulis diebus bibendum ad quartanas facere.

Quartanas decedentis videntur esse visceris unguentis, cataplasmatibus, emollientibus.

Quartana detentos, esse pluries purgandos, sed apparentibus signis coctionis.

Quartana prodesse vomitum.

Theriace in quartana principio exhibita quid molietur.

Quotidianæ curatio.

Febrim continuarum quæ sola citra accidentia insistant curatio.

Vitus humidus in febribus omnibus acutis conducit.

Aquam frigidam propinandum esse in ardentibus febribus quæ primùm apparent si quæ coctionis.

Febrim cum accidentibus insistentium curatio.

quæ mollire & laxare possint. Deinde medicamentis utendū, quæ ciedi urinā vim habeāt. Ubi verò coctionis signa apparuerint, tunc sanè purgare oportet iis quæ humores atros inaniāt, nō semel tantum, sed sæpius, si videat' necesse. Utendū aut & vomitib. statim à cibo: & nihil phibuerit, eleborū album est exhibendū: primò quidē, permistum radiculis: quòd si nihil profecerit, ipsum per se. Cæterum qui nequeunt evomere, ij vehementius p inferiora purgētur ac postmodū offeratur eis in potu, medicamē confectū ex viperis: necnon quod succū cyrenaicū recipit. Quicumq; verò ab initio aliquid ex hisce medicamentis exhibuerūt, aut omnino ante statū, quartanā quæ erat simplex, duplicem reddiderūt: aut omnino majorem, atq; difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut omnino ambas difficiliiores.

§ De cura quotidiana. Cap. XII.

Quotidianā aut quum volueris curare, oxymelite utitor post primos dies, & illis quæ probè possunt urinam ciere: universumq; totius vitus caput sit ad incidendū efficacius. Circa statum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de ipsius ore præsertim. Deinceps jubendum est, ut post radículas & cibos assumptos vomāt. His etiam quæ pituitam subducunt, utendum.

§ De cura febrium continuarum, quæ carent accidentibus. Cap. XIII.

In cōtinuis autem febribus, quibus non ultra septimū futurus status est, si vires validæ sint, & ætas cōsentiat, admodū exquisitus & tenuis victus est instituenodus. In quib. verò vel status totius morbi longius abest à septimo, vel vires robustæ nō fuerint, uberiori cibo ægri sunt reficiendi: quemadmodū prope statū tenuiori. Quū aut jam adest status, tenuissimū victū servare oportet: deinde rursus semper uberiorē. Sanguinē verò mittere oportet, & ob morbi magnitudinem. Quibus aut rubor multò intensior, quàm p naturæ ordine, & major, quàm pro consuetudine, totius corporis moles, venæq; eminentes, extensa; fuerint, iis etiam est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid cōmemoratorū, prohibuerit.

Quòd verò humidus victus in febribus acutis omnib. juvat, rectè jam dictum est. Cremorē igitur ptisanæ, iis quibus nō acescit, exhibere oportet: & melicratum quibus non bilescit, & sorbitiones ex alica, & panem ex aqua. Porro in febribus præter modum calidis, urentibusq;, quū primū coctionis signa apparuerint, tunc auda cter aquam frigidam propinabis. Modus verò in quantitate servetur, quemadmodum tempus anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.

§ De curatione febrium cum accidentibus. Cap. XIII.

Quæ febres cum accidentibus urgent, non æquè simplicem exigunt curationem: sed pro viribus metiendum est, quanta sit ipsa febris, quantumq; ex accidentibus immineat periculum: atq; ad id quod vehementius fuerit & difficilius, intendendum, non posthabita omnino etiam alterius cura. Etenim ubi simul cum ipsa febre sentitur circa os ventriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanè vacuandi humores non sunt, quàm os ipsum ventris corroboretur, etiā si cru-

ditate aut cacochymia æger ipse laboret. Sed nec si fuerit febris cū ventris profluvio, alia est opus evacuatione. Verū hæc sola sufficit, quāvis nō sit pro ratione ipsius plenitudinis. Jam verò si quis simul & distentione nervorū laboraverit, & sanguinis eguerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est linquendum, cujus causa sæpe sudores eveniunt, & vigiliæ molestant, & vi-

ro ægroti debilitantur. Ita etiā si vehementes vigiliæ, aut dolor intensus ægrotū cruciant, cavendæ sunt subitæ evacuationes, ac multæ. Ipsa præterea ambiētis aeris tēperies, loco accidentis cujusdam habenda est, dū exquisitè calida & sicca fuerit: qualis est tēpore medio inter Canis & Arcturi ortū. Si etiā valdè frigida fuerit, tūc quoq; sanguinem mittere formidandum. Ob hæc etiā neq; in locis admodum calidis, aut frigidis, sanguinē mittere audemus. Quòd si regioni temporis status cōsentiat, etiā omnino abstinemus: si verò nō cōsentiat, evacuamus quidē, sed multò minus, quā si neutrum phiberet. Tolerantia etiā ægri, ceu quoddam accidens, expendenda venit: nec secus ipsa tēperatura. Nam quicumq; calidi & sicci naturæ sunt, hi omnes faciliè ab integris evacuationibus offenduntur. Cōsuetudo quoq; nō parvi momenti est, quū ad omnia alia, tū præcipuè ad evacuationis indicationē. Quidā enim nunq; prius fuerunt vacuati, & multis cibis sunt usi. Nōnulli cōtrā nec multis cibis sunt usi, & evacuationib. assueverunt. Hos igitur intrepidè evacuare oportet, si reliqua etiam cōsentiant: alios verò, ne si reliqua omnia id suaserint. Eodē pariter modo & corporis habitus cōsiderandus. Nam qui dēsa & solida carne cōstant, nō offenduntur faciliè. Quare non oportet vereri ipsos vacuare ex toto, si quidē & alia id jubent. At qui mollē, & tenellā, & diffu-

tem carnē sortiuntur, ij mirū in modū sunt ad patiendū habiles. Quare vel si reliqua omnia sanguinem esse mittendū suadeāt, nō tamen id facere audendum est, sed utendū aliis evacuationib. moderatè. Eodē modo & in iis qui supra modū crassi aut macilēti sunt, ab incidēda vena super sedendū, cæterasq; integras evacuationes vereri oportet. His etiā & ætas annumeranda est, veluti quoddā symptoma, qd prohibendi integrā vacationem vim habet. Neq; enim pueri, neq; seniores hāc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes, si dispositiones hortētur, nō semel, nec ex toto, sed paulatim oportet vacuare, inediis moderatis, frictionibus, clysteribus mollibus, perfusionibus, atq; balneis. Quòd si duo cōtraria symptomata aut morbi coeant, adversus id qd magis urgeat instandū, nec interim alterū negligēdum. Eas verò quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, nō simpliciter, sed secundū causam à qua singula fiunt, cōsiderare oportet: qualia sunt defectus animi, & exolutio: quæ duo nomina de unica re dicuntur, cujus plures existūt causæ. Siquidem non solum p varios affectus corporis, sed etiā in vehementissimis perturbationibus animi, nōnulli exoluti fuerūt, præcipuèq; senes, & natura imbecilli. Etenim plures eorum tristati, aut latati, aut irati, animo defecerūt. Qui aut magis robusto sunt corpore, ex immodicis evacuationibus

Febribus cum alio ore infestis non esse opus evacuatione.

Evacuatio nes sub multa, & do causantur.

Sanguinis missione habet aut consuetudinem impendenda aut da.

Calidi & sicci offenduntur ab integris evacuationibus. Consuetudinem plerumque ad evacuationem indicant.

Habitus corporis quænam facit sanguinis fontem & quæ ducit.

Pueri senesque, integritate evacuationem non ferunt.

Animi defectus, senes præcipue affectus, senes præcipue atq; imbecillos exoluntur.

bus idem patiuntur. Jam verò si abscessus quispiã rumpat, vires vehemèter lædit, ac tũ præcipuè, cum materia simul tota ad ventriculũ, vel ipsius os, aut thoracẽ defluerit. Quòd si quãdo etiam nos abscessus secantes, totũ simul emittere p̃voluerimus, animi defectũ subsequi est necessarium. Nec verò laborantibus aqua inter cutẽ, tota simul humiditas (q̃vis ea præter naturã sit) potest sine noxa vacuari: sed tunc quoq; necessum est, hominẽ deficere animo. Ex dolorũ etiã vehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quintiã nervus percussus, & musculi caput, & maligna in articulis ulcera, & immoderata quædã frigiditas aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio, præterea insignis cruditas, obstructioq; aut inflammatio alicujus præcipuæ partis, aut os ventriculi malè affectũ, aut improba evacuationes, aut deniq; alia multa, de quib. postea dicem⁹, inferre possunt defectũ animi. Quarũ sanè causarũ singulæ p̃pria curationẽ desiderat. Porro eos q̃ ex choleris, & alvi p̃fluvio, & aliis tum largè, tũ uno impetu factis evacuationib. dissolvunt, frigida spargere oportet, & nares cõprehendere, & os ventriculi perfricare, jubereq; ut vomant, stomachũ irritado digito vel pennæ immisione, ac deniq; alligare pedes & manus. Oportet aut nexus fieri, plures quidem ac fortiores circa manus, quãdo per inferiore partẽ fiunt evacuationes. Nam si vacuatio per superiora fiat, plures ac vehemẽtiores ligaturæ cruribus admoliendæ sunt. Situm quoq; aliquem parti fluxionem patienti expedit invenire, in adversum tendẽtem, sed moderatè. Nam si nimĩũ tendat, atq; ex hoc fatigetur, nihil omin⁹ irritatur, q̃ si inclinaret ad eundẽ. In universum autẽ, aut ad cõmunia membris patientib. in adversum trahere oportet, aut ad ea in quib. est fluxionis origo. Atq; ideo vehementes evacuationes quæ ex matricib. fiunt, cucurbitulæ* juxta mamas appositæ, statim sedant. Quæ verò ex naribus, hepatis ac spleni, secũdum narẽ patientẽ. Quòd si ex ambabus narib. simul plurimus sanguis effluat, utriq; visceri applicandæ sunt. Vinũ etiam aqua frigida temperatũ, curat eas, quæ ex magnis sũt evacuationib. dissolutiones: ac tũc præsertim, quãdo humores fluũt ad ventriculũ. Cæterũ si aliquod viscus sit inflamatũ, aut caput doleat vehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardẽs in morbo crudo, magna & penè insanabilia ex potu vini, hujuscemodi affectib. nocumẽta proveniunt. Jam verò qui frigidum potare nō sunt assueti, aut manifestè ex ipso læduntur, quiq; natura sunt frigidiores, & qui in extrẽa sunt senectute, & loco degũt natura frigidiori, & tẽpore hyberno, cavere a potione frigida debent. At qui cõtrario modo se habet, iis intrepidè illã offerre licet. Sit aut vinũ, in fluxionib. quæ ad ventriculũ fiũt, calidũ simul & tenue, quale Lesbium. In sanguinis verò fluxibus, crassum & nigrũ, & acerbũ. Ipsi aut locis imponere oportet, veluti vetriculo, matrici, stomacho, & thoraci, quæ corroborandi vim habent: capiti aut & fronti, præter hæc, illa etiã quæ refrigeret. Et quibus vel in superficie, vel in naribus, vena aliqua disrupta est, medicamen aliq; ex iis quæ sanguinẽ suppressere possunt, est im-

ponedũ. Porro balneæ in fluxionibus ad ventriculũ quidem aptissimæ sunt: at sanguinis fluxum acriter irritat. Et quicũq; ob sudoris copiã animi defectũ patiũtur, his etiã plurimũ nocent: ut quas potius astringere oporteat, atq; refrigerare. His etiam vinũ frigidum exhibendũ est, ac nihil omnino calidum. Sed nec etiã artus ipsorũ ligare oportet, neq; cogere ad vomitũ, neq; ullo modo movere. At ventis refrigerantib⁹ aditum præparare: aërẽ quoq; domus alterare frigida & acida qualitate, myrtorum frondibus, & vitium capreolis, ac rosas pavementum cõsternentes. Nihil verò horum cõfert, ubi fluxiones ad ventriculũ fiunt. Atq; exolvuntur ob plenitudinẽ eorũ art⁹ q̃ plurimũ p̃fricare oportet, calfacere, ac deligare. A vino verò & cibis sunt abstinendi & a balneis, si febriant. Sufficit autẽ, si eis dederimus melicrati potũ, in quo ebullierit thymus, vel organum, vel pulegiũ, vel hyssopus. Cõvenit quoq; oxymel. Quæ ex matrice laborant, atque exolvuntur, nō aliter sunt curandæ, excepto oxymelite. Fricare autem ac deligare magis earum crura oportet, quàm manus. At quib⁹ uterus aut sursum, aut ad latus revellitur, inguinibus & coxis cucurbitulas applicamus: & naribus quidem, ea quæ fœtidissimum habent odorem: matricibus autem odorata, & ea quæ laxare calfacereq; possunt, medicamẽta offeremus. Si verò ob imbecillitatẽ ventriculi, animi sequatur deliquim, ea quæ roborandi vim habent, oportet emplastra adhibere: quale est quod fit ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloe, & mastiche. Madefacere aut iis quæ cõstant ex absinthio, oleo melino & mastichino, necnō nardo, vino, & ænante. Quòd si exurantur, miscere ex refrigerantibus aliqd convenit, veluti cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, intybi, atq; uvæ acerbæ succum. Aqua etiam frigida plerũq; juvat malè affectos stomacho, si tempestivè, hoc est, in declinatione, exhibeatur: alioq; plurimum obest. Atq; his qui os ventriculi imbecillum habent, vinum calidum exhibere oportet, si nihil p̃hibeat. Plurimũ verò juvat eos qui sic laborant, etiã frictio extremorum. Quòd si ex iis remediis nihil melius se habuerint, eos quidẽ q̃ adusti sunt, quamprimum ad balneas ducere oportet. Qui verò aliqd frigoris sentiunt, medicamen diatrion pepereon, ipsumq; pip̃ solum, atq; etiã absinthium bibant. Atq; exitiosis humoribus os ventriculi mordicantibus exolvuntur, hos post aquæ calidæ, aut hydrelæi potum, fac vomere. Vacuatīs humoribus, partem læsam oportet modis omnibus roborare, partim iis q̃ admoventur extrinsecus, partim absinthij potione. Cæterum si humores adhuc in ventre consistant, minimè sanè astringere, sed tantũ cõcalfacere oportet. Ubi verò multa pituita in ore ventriculi acervata fuerit, fovere quidem plurimum oleo, in quo ebullierit absinthium: postea melicratũ exhibere, in quo hyssopum, vel qd simile infusum fuerit: itẽ oxymeli, & pip̃, & diatrion pepereon, & diospoliticon medicamẽ. Victus ratio in summa, incidendi vim habeat. Quæ verò ex nimia frigiditate eveniunt exolutiones, eodem modo curandæ sunt, quo bulimi, omnimodo calefacientibus. Vinum igitur

Deliqui animi ob sudorem curationis.

Exoluti à plenitudine quo modo sint curandi.

Vteri suffocationis curationis.

Exolutionis ob ventriculi imbecillitatem curationis. Ventriculi roborantia.

Vinum calidum propinandum imbecillo ventriculo.

Exoluti ob prædorsales, ventris os infestantes, quomodo curandi sint.

Exolutionis ob refrigerationem curationis.

*Exolutionis
à calore orta
curatio.*

*Exolutionis
ob febris, aut
phlegmones
magnitudi-
nem, curatio*

*Exolutionis
ob siccitatem
futura, pre-
cautio,*

*Exolutionis
præter expe-
ctationem ob
orta curatio.
Exolutionis
ob membri
præcipui ob-
structionem
facta, cura-
tio.*

*Exolutionis
ex immodica
puris aut a-
qua intercu-
tem & vacua-
tione, cura-
tio.*

*Exolutionis
ob animi af-
fectus orta,
curatio.*

*Exolutionis
ob dolores in
testinorum,
curatio.*

*Exolutionis
orta à viriū
imbecillita-
te, curatio.
Facultas vi-
talis, natura-
lis, et anima-
lis unde pro-
ficiuntur,
& ex quibus
dignosci ea-
rum imbecil-
litas possit.*

eis exhibere oportet, calida temperatū: ac cibos
q̄ calfaciendi naturā habeāt: fricareq; & calface-
re ad ignē simul. Quē ex calore nimio accidūt de-
liquia animi, iis quē refrigerādi & roborādi vim
habēt, curātur. Statim igitur ipsos corroborabis,
si aqua frigida sparseris, & flabellaveris, & os vē-
tricoli p̄fricaveris, & agitaveris, vinoque & cibo
refeceris. Atqui ob inflāmationis magnitudinē,
aut vehemētis febris malignitatē animi defectū
patiūtur, & in principis accessionū refrigerant, 10
iis artus fricare fortiter, & calfacere, cruraq; ac
manus alligare, & vigilias, cibiq; & potus omni
modū abstinentiā præcipere oportet. Optimū ve-
rò in his, quid futurū sit, præcognoscere. Eos etiā
qui ex siccitate in principis accessionū, defectū
animi sunt incursuri, optimū est prævidere. Nam
si duabus aut tribus horis ante accessionē exhi-
bito cibo cōcoctu facili, manus ac pedes cōstrin-
gi iusseris, nō interibūt. Quod si magnum immi-
nere periculū suspicatus fueris, vinū in alicā eli- 20
xam infusum, dare anticipabis: aut panē quoque
ex alica. At si mediocris expectatur defectus ani-
mi, parcendū est vino: sed sufficit tunc mālā pu-
nica, aut pira, cibis ipsis miscere. Iis q̄ præter ex-
pectationē in periculū inciderūt, vinū calidum,
& panis est exhibend⁹: parumq; aliquid cum eo
alica calidā. Qui ob præcipui membri obstru-
ctionem linquuntur animo, iis oxymel dare o-
portet, atq; ex hyssopo, origano, pulegio, & mel- 30
le potum: cibosq; incidendi naturā habētes. Sed
nec deterius fuerit artus perficere, deligareque.
Prodest etiam hisce potibus uti, qui urinā cien-
di vim habent: veluti qui anethum, fœniculū, a-
pium, petroselinū, ammi, daucum, & spicam nar-
di recipiunt. Quæ ubi manifestē iuverint, jam
vino albo & tenui, nec admodum antiquo, est u-
tendū. Fiunt verò & in huiuscemodi dispositio-
nibus, cum vehementes fuerint, pulsus inæqua-
les intercurrentesq;. Qui ex abcessus disruptio-
ne, aut sectione exolvunt, aut ex superflua aqua 40
inter cutim inanitione, ij quidem cōfestim opti-
mis odoribus sunt fovendi. Paulò aut post, for-
bitionibus cōcoctu facilibus sunt reficiendi. Si
verò ob tristitiā, aut gaudium, aut timorē, aut irā
aut terrorē, exolvi videantur, odoribus, & nariū
apprehensionibus revocandi sunt, cogendiq; ad
vomitum. Eodem pariter modo, qui ex vulne-
ribus, aut purgationib. aut dolorib. qui in arti-
culis, nervis, & musculorum chordis eveniunt,
exolvūtur, revocandi statim ab eo affectu sunt: 50
postmodum verò, conveniens passioni cura affe-
renda. Defectus animi quæ ex intestini laxioris
doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatib. fiunt,
ex patientiū locorū calefactione frictioneq; ex-
tremorū curantur. At quæ ex ppria imbecillita-
te virium, quæ regunt corpus, eveniūt exolutio-
nes, ex intemperie videlicet ortæ, partiū à quib.
vires p̄ficiuntur, contrariis intemperaturis cu-
randæ sunt. Virtus ergo vitalis quæ ex corde na-
scitur, ex pulsuū imbecillitate cognoscitur. At q̄ 60
ex hepate oritur, & naturalis dicitur, ex sangui-
neis egestionib. ab initio aquosis atq; tenuib⁹, post
modū verò crassis, ad modū facis. Quæ ex cere-
bro originē ducit, quam animalem appellant, ex
motuū voluntariorū imbecillitate deprehēdit.

De cura capitis à varijs occasionib. lesi. Cap. XV.

Igitur symptomatū causæ, congruā curatio-
nem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, si-
milq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordica-
tionem, jubendus est ut evomat: nam vel bilem
vomet, vel pituitam, vel utrunq;. Porro qui cum
gravitate dolores capitis fiunt, multitudinem in-
dicant. Qui autem cum mordicatione, vaporis
humorisve acritudinē. Cum pulsu verò, inflam-
mationem. At cum tensione, si quidem sine gra-
vitate ac pulsu, spiritus flatulenti & crudi multi-
tudinem. Si verò cum pulsu, inflammationē cor-
poris membranosi. At si adsit gravitas, multitu-
do intra membranas contenta significatur. Cum
igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum
singula fiunt, cōsiderare oportebit. Veluti si mul-
titudine vaporis atque humoris contineatur, ad-
vertere oportet, nūquid ob magnitudinē febriliū
humores diffusi, ac veluti effervescentes, ad ca-
put ascenderint, aut propter eius partis imbecil-
litatē, aut ob totius corporis plenitudinē: hanc
enim totius corporis evacuationibus, haud diffi-
cilter curabis. Eam verò quæ ex partis imbecil-
litate contingit, partim quidem in contrariū tra-
hendo per totū corpus, partim ipsi capiti reme-
dia adhibendo. Atq; in contrarium quidē trahes,
clysterib. acribus, nexibus, frictionibus plurimis
infernarū partiū, & si expediat, sanguinis aliquā
tula detractio. Partem aut sanabis eo tempo-
re quo ad universum corpus retrahis, iis utens
asperginibus, quæ à capite vim repellēdi habent:
ac dein evacuantibus: postremò deniq; corrobo-
rantib. Repellit aut oleum quod immaturū dici-
tur, ac tum oxyrhodinū, tum rosaceū, & quæcū-
que ex capitibus papaveris, & teneris olivæ ger-
minibus, & hederæ corymbis, mentaque viridi,
& sisymbrio fiunt. Utendū verò ipsis, in multitu-
dine crudiori & frigidiori, tepidis: in calidiori
autem & biliosiori, frigidis. Evacuat etiā dissol-
vitq;, oleum calidum, ipsum per sese: & magis si
antiquum fuerit, & Sicyonium, aut anethum fer-
vesfactum in ipso fuerit. Quod si spondylion, vel
serpyllū, vel pulegii comam, vel calaminthæ, vel
menthæ, vel sisymbrii, intus decoxeris, ita etiam
crassiores succos vacuaveris. Hæc verò ipsa, vi-
rium etiā aliqd mēbro imbecillo adjiciūt. Quod
si etiā ex usu videat⁹, per nares atq; palatū expur-
gatio moliēda est, sternutamentūq; excitandū. Si
ad balneas hominē duxeris, siccis sindonibus ca-
put est perfricandū, salq;, & nitrū, & synapi, sine
oleo imponendū. Hæ itaq; sunt ex particulæ im-
becillitate, doloris capitis medicina. At quando
ex magnitudine febris accidit, & medicamēta ad-
hibere cōvenit, frigidæ qualitates ac vires, & quæ
ex hydrelæo & oxyrhodino, & papaveris capitu-
lis, perfusiones cōstant, expediūt. In dolore autē
capitis, q̄ sanguinis fluxū, aut vomitū decretoriū
significat, remedia investigāda nō sunt: cū nō ac-
cidēs, sed talis dolor bonū existat signū. Siquidē
ubi natura excretionē aliquā, ac præcipuē vomitū,
aut sanguinis per nares fluxū molitur, horū in-
separabile indicium est capitis dolor. Cōsiderandæ
igitur ad cognoscendā crīsim, primū quidē sunt
febriliū species, an calidæ sint, * atq; urentes: nā hæc
per excretionem judicari cōsueverūt: quæadmo-
dum

*Capitis do-
ris per con-
sensum cur-
tio.*

*Capitis do-
rum specie-
varia.*

*Capitis do-
ris ob imbe-
cillitatē con-
tracti, cura-
tio.*

*Refluxionis
modi diversi.*

*Repellere
mores à ca-
te, quæ com-
modè possit.*

*Vacuare de
scutereq; ca-
pitis humo-
res quæ com-
modè possit.*

*Capitis do-
ris ex mag-
nitudine febr-
oris, curatio.*

*Capitis do-
rum ex
cretionum
signum in-
parabile.*

*Ardentes fe-
bres consue-
verunt iudi-
cari per ex-
creta.*

dum quæ molliores sunt, ac veluti *fumigantes, diu durât, & sæpius in abscessus cõtendūt. Secundo loco, an morbus sit salutaris. Nam quis, obsecro, bonā crīsim in morbo pñcioso expectaverit? Tertiò ad hæc totius morbi tempus considerandū. Nam si principij vel augmēti adsit signū, minimè aut status, nec cōcoctionis signa in urinis vel sputis, vel alvi excremētis cernant, nō est quòd bonā speres crīsim. Porro difficilis tolerātia antecedere omnē crīsim solet. Quæ qdem si in die accidat, crīsis sequetur noctu, si aut noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, cōsiderandum est, quotus sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, etiā ex parvo naturæ apparatu, ad crīsim per excretionem movetur. Sextus verò magno apparatu indiget, & sæpe neq; ulla in eo sit crīsis, nec sine periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor capitis statim ab initio non invasit, sicuti quoddam ipsius morbi symptoma, sed *in ipsa ante crīsim perturbatione: dein si collum etiam aliqd cōdolescat, & præcordia retracta sint, aut repentē supvenerit difficilis respiratio, pulsusq; in tumorem subito elati, nō reciderint in parvitatē, neq; debiles fuerint, statim crīsis per sanguinis fluxum ē naribus expectanda est. Si verò nō modò non deciderint, sed etiā in altū attollantur, & vehementiā assumpserint, faciem jam ægotantis inspicere oportet. Nam si quod in ea membrū *palpitet, aut venæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malū, vel nasus, vel oculus rubidior sit factus, magis etiam talis crīsis est expectanda. Quòd si etiā inviti illachrymēt, vel imaginētur se splendores cernere, ac nares ipsas scalpant, tunc nō jam fluxurū, sed jam fluentē cōspicias sanguinē. Nec verò ex his pterrearis, si hominem desipientē, aut resilentē videris. Nā & hæc humorum repentium ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægrotus sit adolescens, aut alio qui natura calidus, aut multo sanguine abundas magis adhuc de hoc sperandum erit. Quod si sæpius etiā antea illi sanguis ē naribus fluere est visus, hoc vel solum sufficit fluxus sanguinis spem cōfirmare. Si verò & tempus anni æstas sit vel calidus cœli status, & si plures eo tēpore crīsim ex sanguinis fluxu habuerint, ægriq; corpus plenū extiterit, & consueta excretionē retentæ, hæc inquā omnia spem vehementiū augebunt. Has itaq; & alias excretionē omnes prænoscere licet, si hæc duo tantū exploraverimus, & unde naturæ motus agatur, & in quam partem. Si quidem quæ deficiunt adjuvabimus, & quæ immoderate feruntur, coërcebumus, si ista noverimus. Veluti cōfestim sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ sinistris præcordiis superpositæ, facillè retrahunt. At qui ab hepate, pficiscitur, dextris. Qui ab aliis membris, eadem ratione.

GALENI PERGAMENI
de arte curativa ad Glauconem, lib. II.

CAP. I.

DEiis autem quæ in singulis corporis partibus fiūt passionibus, deinceps sumus dicturi, ab inflammatione auspiciati: q; sæpius hæc accidat, plurimæq; ipsius sint differentiæ, ex quarū singulis solent febres oriri. Cōmu-

nis igitur in omnibus est immoderata caliditas, & veluti quædā effervescentia, unde & phlegmionēs, nomen de ipsis efferre veteres cōsueverunt. Propriam autem quandā in singulis differentiā invenies, ex qua eius speciem agnosces, & convenientem assequeris medelā. Porro prima inflammationis differentia est, secundum q; hanc quidē humidam, illam verò esse siccam contingit. Humidā quidem, quæ ex calida fluxione membrum occupante accidit. Siccam verò, quando nullo humore influente, calor naturalis effervescit. Hæc autem, usq; ad aliquid quidem, veluti febris est membri. Cum verò jam ad immoderatā caliditatem ac siccitatē pervenerit, corruptio atq; extinctio omnimoda fit. Rursus illius differentiæ q; cū humorum affluxu accidit, multæ species extant. Nam fluente sanguine, altera: flava bile, altera ambobus simul, alia tertia. Et quidem in eorum singulis, vel jam putruit id q; influxit, vel in membro impactum putrescit. Præterea vel crassum est, vel tenue, vel optimum, vel deniq; acre. Sanguine igitur optimo ac mediocriter crasso ad particulā aliquā confluentē, atq; ob multitudinē cōculcato, vehemens dolor arripit hominē, nisi hebetis sensus ipsa fuerit particula: pulsusq; in profundo permolestus sentitur, tendiq; omnino & cōtundi membrū apparet, cum vehementi incendio, renitentia & rubore. Quæ sanè passio totius generis nomen recipit, inflammatioq; vocatur, ex omni ferè occasione pveniens. Quippe vulneribus, distentionibus, disruptionibus, contusionibus, scissionibus, exercitiorum laboribus, exarticulationibus, ac præterea fracturis, & spōtaneis ulceribus advenit. Quinetiam si quando immodicam plenitudinē venæ ipsæ cōtrahant, tunc id quod superfluū est, effundunt ad aliquā partem, quæcunq; eo tempore fuerit aptior ad recipiendum. Eadē nanq; erit reliquis omnibus imbecillior, vel rarior, vel ad motum proclivior, vel minus mobilis. Flava verò bilis, quando propriam naturā servans, unā cum sanguine per totum corpus defertur, morbum regium producit. Cum autē secernitur sola, in aliquamq; decumbit partē, herpetem gignit. Cæterum si sit cōsistentia crassa, totam exulcerat cutim, usq; ad carnem subiectam, qui affectus herpes exedens vocatur. Si verò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum, veluti deurit: quæ species generis sortitur appellationē, quum simpliciter herpes dicatur. Nam ex reliquis speciebus duabus, *illa quidem cujus nuper mentionē fecimus, vocatur herpes exedens: altera verò, miliaris, quòd in ea pustulæ parvæ ac multæ, per summā cutem similes milio excitentur. Fit autem herpes huiusmodi etiā ex bile quidem, sed minus calida & acri, q; illæ species priores. Quòd si ex sanguine & flava bile calidioribus quàm oporteat, mista ipsa fluxio fuerit: aut ex sanguine quidē, sed fervido, & substantia tenuissimo: erysipelas hic affectus vocatur, multò inflammatione calidior, magisq; flavū colorē referens. Non dolet tamen affectus hic, quemadmodū inflammatio: nec ut aliqua inflammationis species pulsus, aut cōpressionē, aut similem invehit tensionē. Cæterum interdum miscetur inflammatio cū erysipelate. Si igitur in mi-

Inflammationibus omnibus est communis caliditas.

Inflammationis prima differentia.

Inflammationis quæ cum affluxu humorum infestat, multiplex differentia.

Inflammationis orta a sanguine indicia.

Inflammationis causa.

Recipientes superflua particula, quales necessario esse debeant.

Regij morbi productio.

Herpetis generatio.

Herpes exedens unde accidat.

Herpes miliaris unde exoriatur.

Erysipelas unde gignatur.

*Erysipelas
phlegmono-
des quando
accidat.
Phlegmone
erysipelato-
des quando
fiat.*

*Erysipelas so-
lus cutis est
passio.*

*Carbunculi
generatio.*

*Bubo quid.
Phyma quid.
Phygethlon.*

*Ophthalmia
quid.*

*Synanche.
Peripneumo-
nia.*

*Inflammatio-
nis causa
una est flu-
xio.*

*Inflammatio-
nis curatio.*

*Evacuatio
corpus qua
sint primo
consideran-
da.*

*Genu inflam-
mati curatio*

scella ipsa exuperet propria erysipelatis acciden-
tia, affectus is erysipelas inflammationis parti-
ceps nominatur. Si vero inflammationis acciden-
tia prepolleant, dicitur inflammatio erysipelato-
des. At si accidentia utriusque esse appareant æqua-
lia, tunc erysipelas & inflammatio ex æquo mi-
sceri dicuntur. Exquisitum itaque erysipelas, cutis
soliis est passio. Non tamen ipsa inflammatio per-
tinet tantum ad cuti subjectas partes, sed ad has
quidem præcipue: nonnunquam verò etiam ad cu-
tim. At verò si sanguis influens calidus sufficiens
fuerit & crassus, quodcumque membrum invaserit,
hoc exurendo, ulcus cum crusta excitat: quicquid
autem circumiacet, in inflammationem attollit effe-
vescentem, graviterque dolentem: qui affectus carbo
appellatur. Similiter etiam, si sanguis influens ni-
ger extiterit, crassusque & fæculentus, & fervens,
simul autem & sanie quandam tenuem admixtam ha-
buerit, pustulas per summam cutis excitat, similes
iis quæ ex igne fiunt. Quibus disruptis, crusto-
sum sub ipsis ulcus invenitur. Qui affectus etiam est
carbo. Phlegmone itaque in hæc species univer-
sales distinguitur, ad quas nimirum referuntur aliæ
omnes particulares. Etenim bubo, phyma, &
phygethlon, glandularum affectiones existunt:
bubo quidem, inflammatio: phyma, quod statim
augetur, atque ad suppurationem festinat. Phygeth-
lon autem erysipelas particeps inflammationis,
aut inflammatio erysipelatis particeps nomina-
tur. Sic etiam & ophthalmia, eius membrana quæ
corneæ inhæret, est inflammatio. Pleuritis verò,
costas succingentis membrana. Quemadmodum
& synanche gutturis: atque peripneumonia, pul-
monis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus
conspiciuntur inflammationes, promptum est qui-
dem cognoscere. Quæ verò in occultis, & febres
omnino afferunt, non æque discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. II.

Est autem una quidem apparentium inflamma-
tionum causa, eaque non usque adeo occulta, quæ
fluxio appellatur: nisi quandoque eis coniungatur,
quæ aliqua alia ex causa evidente, facta videntur.
Cum enim nulla ex his præcedente, repente me-
brum inflammationem patitur, ea quæ hunc affe-
ctum gignit causa, fluxio vocatur. Affectus autem
ipse, dispositio rheumatica. In curatione cuius,
duo magni committuntur errores, ubi statim in
ipsis auspiciis, vel nulla de toto corpore provi-
dentia habetur: vel ipsum calfit, atque humecta-
tur membrum. At qui rationem simul & experien-
tiam sequuntur, ii totum in primis corpus vacuare
quibuscumque evacuationibus consulunt: ipsam ve-
rò inflammata partem, perfundere, ac superlinire
eis, quæ id quod influit repellendi vim habent.
ac denique quod in membro patiēte continetur, e-
ducere: vimque ac robur adjungere iis, quæ jam af-
fectæ sunt partibus. Verum ut recte quis vacuatio-
ne utatur, ætatem, anni tempus, regionem, præsen-
tem aeris statum, robur ejus qui afficitur, habi-
tumque & consuetudinem, necnon ipsius morbi na-
turam oportet considerare. Ex his namque, quan-
do vacuandum sit, aut minimè, & unde, & quomo-
do, invenitur. Si igitur ad genu fluxio ferat, atque
id plurimum attollatur, præterea totum corpus san-
guine plenum appareat, & valida laborantis vis,

tempusque anni sit ver, & temperata regio: æger
verò sit adolescens, aut juvenis: is sanguinis eva-
cuatione ex superioribus partibus indiget: oportet-
que ejus incidere in cubito venam, aut scilicet in-
teriore, aut mediam: cum semper fluxionis mo-
tum ad contrarium revellere oporteat. Ipsi autem la-
boranti particulæ, si quidem non admodum doleat,
emplastrum ex semper vivo, & corticibus punico-
rum malorum in vino decoctis, & rhu, & farina
hordei constans, est admovendum. Hoc si quidem
repellit quod influit, atque id quod continetur exic-
cat, & circumjacētia membra corroborat. Cum
magno autem dolore fluxu incidente, sufficit ve-
hementia doloris lenire, cum aliquo ex iis, quæ
ex vino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera, in u-
troque liquata, constant. Oportet autem hæc lanis ex-
cipere pinguibus, quæ plurimum habeant æsypi:
& æstate quidem frigida, hyeme autem tepida ap-
ponere. Sic etiam cataplasmata ex arnoglossio, len-
te, pane, & rosaceo oleo adhibere: paulo verò su-
pra patientes particulas admove spongiam vi-
no austero intinctam, aut aqua frigida, cui mi-
stum parum aceti fuerit. Quod si ex hac meden-
di ratione magnus usus sentiatur, nec alicubi pus
se ostendat, mollibus medicamentis ad fluxiones
utendum. Optima verò ex his sunt, quæ exicca-
di & repellendi vim fluit, sine dolore vim habent.
Quemadmodum ea quæ vehementer cōtendunt,
atque idcirco dolorem afferunt, plus doloribus ob-
sunt, quam exiccando proficiant. Tale igitur sit medi-
camentum, quale est quod ex chalcitide constat, re-
missum oleo rosaceo. Si verò lanam mundam vi-
no acerbo humectaveris apposuerisque, plus ju-
veris. Quod si pus se in particula ostenderit, ca-
taplasma offerre oportet semel aut bis. Plus ve-
rò ad præsens juvat farina hordeacea. Adjungen-
dum tamen aliquid vel aceti, vel vini. At postquam se-
cueris, & pus evacuaveris, cavendum est deinceps,
ne oleum aut aquam imponas. Quod si quan-
do vulnus abluere oporteat, melicrato, vel oxy-
crato, & vino, & mulso est utendum. Superponen-
dum verò, si adhuc inflammatur, ex lente catapla-
sma. Si verò absque inflammatione fuerit, aliquid
ex iis medicamentis, quæ emplastica nominantur,
& præcipue quod ex chalcitide constat. Imponen-
da autem super hæc extrinsecus, spongia, aut lana
vino acerbo infusa: ad quæ quidem opportunum
est, quæ aquam marinam recipit. Vulneri autem, nullum
ex pinguibus medicamentis est admovendum:
quandoquidem exquisitè exiccare expedit. Ac si
sanè sanare oportet inflammationes ex fluxione
ortas. Quæ verò alia de causa fiunt, humectare cal-
facereque, nihil prohibet. Quas quidem si perduce-
re ad suppurationem volueris, cataplasma ex fari-
na triticea, quæ in oleo & aqua ebullierit, est ap-
ponendum. Quod si quando scarificare oporteat,
ne hoc quidem verendum est. Si verò eas quæ ex flu-
xionibus fiunt inflammationes scarificaveris, ma-
gnū adferes malū, ac per initia præsertim. Quæ-
cumque autem ex ipsis, jam inveteratæ existētes, post
totius corporis evacuationem, quasdam durities
atque nigrities retinent, ab his per scarificationem
sanguinem auferre nihil prohibet: & emplastrum ex
farina hordeacea, & ceratum, & aliud aliquid me-
dicamenta ex discutientibus admove. Non tamen
ex vena

*Refluxio
fluens
morum
in contra
molenda
Genu infl
mato em
strum con
modum.*

*Genu infl
mati dolo
magnum
nientia,
me quid
calida, a
sunt ad
da frigida
Repercu
tia esse
canda p
supra pa
ros parit
las.*

*Fluxion
scitida
medica
ta com*

*Vlcus,
pure, qu
sit ablu*

*Suppur
inflam
ni con
catapla
ex fari
tricea, q
oleo &
ebullier
Inflam
nes qua
scarifica*

ex vena in talibus sanguis necessario mittendus est: sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilem flavam educat: vel solo clysteri acri, si affectus ipse sit parvus. Quæ verò ex ulceribus fiunt erysipelata, & quæcunque adeò manifestas causas sortiuntur, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si antè scarificaveris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erysipelate sunt conjunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mista curatio est: semperq; illi, quod magis præpollet, resistendū. Herpetes autem quantum ad totius corporis evacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet: quantum verò ad* eam quæ patienti debetur particulæ, nō omnibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpetes, & erysipelata: nō tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, humectare etiā sunt apta: sed sola admittunt refrigerantia, quæ maximè exiccare possunt. Quare superimponere ipsis oportet, ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & plantaginis. Post hæc verò & lentè adungere oportet, & aliquando mel, & hordeaceam farinam, quodq; antea scripsimus ad inflammationes quæ ex fluxione eveniūt cataplasma, dempto ab eo semper vivo. Ipsas verò partes exulceratas inunge medicamentis, quæ ad herpetas in pharmaceuticis libris descripta sunt: quæ quidem, ubi uti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimè tamen acri, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa vice horū aliquando usus fueris, nihil deterius feceris. At in longum tēpus protractis ulceribus, ad id vina sufficienter austera cōveniunt: præcipuè verò nigra. Quo tempore ipsis etiā medicamēta cōgruunt, quæ ad Polyidam, Pasionem, Musam, & Andronem relata extāt. Herpetas verò qui summa tantummodo exulcerāt, nisi diu pduraverint, nullo horum inungere oportet (adurunt .n. fortiter, & vehementer exiccant) verū istis sufficiunt, quæcunq; vim glaucij habent medicamēta. Quæ quidem aqua diluenda sunt, vel aceto, si nil ex aqua profecerint. Quod si etiā solani succo intinxis, vel arnoglossi, plus etiam conferes. In summa verò, omne ulcus exiccare possit, idq; medicamento neutiquam irritante, nisi ubi malignū, putrilaginosumq; ipsum ulcus fuerit. Talia siquidem, acriora medicamina postulant, & quæ igneas vires possideant: quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx, atq; sandaracha. Sepe verò ubi ista cesserint, admovemus ignem. Eadem ratione vocatis carbonibus, super ipsam crustam, hujuscemodi medicamentorū est natura cōveniēs. Non tamen loca circumjacentia tangere expedit, alioqui dissolves ea, exulcerans quæ minimè expedit. Sed Andronis trochiscis potius utendū est. Si quando verò invaluerit rubor, plurimaq; inflammatio, medicamentū ipsum dulci diluendum est, vel succo plantaginis: quemadmodū si magnus tumor simul infestet, vino quidem acerbissimo in principio, postmodum verò & aceto. Cataplasma etiam ex orobi farina & oxymelite confectum, est apponendum: atq; ante hæc omnia,

statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit satis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passionum per genera curationes, quæ pro naturæ instrumentorū patientium varietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes sunt: ab eorum nempe temperie, à formatione, à situ, ac deniq; à facultate. Oportetq; in curationibus intentionē habere ad membri naturā: hæc .n., quousq; in frigidandum, aut exiccandum sit, docet. Nam si carnosæ partes inflammationē patiantur, paulum sunt exiccandæ. Venosæ quoq; quamvis sint carnosæ longè sicciores, non tamen & ipsæ multum exiccare desiderant. Sed quæcunq; natura arteriosæ sunt, magis venosæ sunt exiccandæ: atq; his amplius nervosæ: & multo magis cartilaginosa, ossæq;. Etenim priusq; ad propriam naturam particula redeat, nondum curationi est impositus finis. Porro sicciores temperaturam inducunt, quæ siccissima sunt: & frigidiores, quæ frigidissima: & secundum alias qualitates eodem modo. Ad mediocrē verò habitum referunt, quæ sunt in unaquaq; mediocria. Ac sic sanè partium temperaturæ, curationes affectuum variant. At formationes hoc modo. Nam quædam intra sese habent cavitates: quædam extrinsecus, quædam utrobique, quædam neutra in parte. Quæ igitur neutra ex parte cavitates possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes fortiter exiccare oportet, vel si nō fuerint natura sicciores: ut nervos, & præcipuè qui in artubus sunt. At quæ intus & extrā relaxare aliquid possunt inflammationis, nō multum hujuscemodi fortiter exiccantibus egent: si præsertim laxā carnem habuerint, quemadmodum pulmo. Indicatio autem ex politu, loca per quæ sit vacuum, & quo pacto, demonstrat. Fluentium ergo humorum, revulsio medela est: derivatio autem eorum quæ jam obsederunt membrum. Utrūq; autem evacuationis genus per communes venas molendum est. Si quidem à matrice revelles, si eam quæ in cubito est, venā secueris: aut* juxta mamillas cucurbitas admoveris: vel manus cōcalfeceris, fricueris, deligaveris. Derivabis autē, si eas quæ in poplitibus sunt, aut in talis, venas divideris, & *feminibus cucurbitas admoveris, & crura calfeceris, perfricaveris, atq; vinculo exaceperis. Et si quidē in parte dextra matricis ipse affectus consistat, à dextra manu, vel crure, sanguis est detrahendus. Sin verò in sinistra, à membris quæ illi è directo sunt. Cæterum interiores venas tunc incidere oportet, quod viciniore, magisq; è directo sint patientibus membris. Si militer si liene inflāmato sanguinē vis detrahere, interiores in manu sinistra venas secato: ut si hepate, eadē ratione in dextra. Si quid verò ex superioribus inflammationē patiat, veluti in ophthalmia, & angina, in cæterisq; infestatibus caput, eas quæ extrinsecus sunt, atque è directo, pertundito. Si verò artus patiatur, à* conjugatis membris sanguis detrahendus est, sive revelle, sive derivare sit animus: præterq; ubi passio fuerit inveterata: tūc quippe à membro ipso patiente detrahimus. Si ergo in angina eas quæ sub lingua sunt venas incidimus, ubi totum corpus vacuum cum sit,* producit ipse affectus. Sic

Indicationes
quatuor sunt
ab affectibus
paribus

Natura partium
affecta
quid indicet.
Partium inflammationem
quam magis
exiccanda.

Temperatura
partium
curationes
affectuum
variant.

Formationes
particularum
quomodo curationes
variant.

Situs partis
affecta quæ
indicationem
exhibeat.

Revulsio est
fluentium humorum
medela: ut derivatio,
eorum qui
iam obsederunt
partem

Revulsio est
derivatio à
matrice quibus
fiat modis.

Liene inflammatio,
interiores
venas in sinistra
manu

venas secandas
esse: ut in
dextra, si hepar
affectum
fuerit.

Superioribus
partibus inflammationem
matris, exteriore
venas di-

rectas illas secandas
esse.
Artubus inflammationem
affectum
conjugatis est

se mittendum
sanguinem,
nisi passio
fuerit inveterata.

Angina protrahente,
venas sub lingua
secandas
esse.

*Scarificatio-
ne quando
attendum.*

*Vacuari in
quod modum
singula par-
tes debeant.*

*Altera recom-
dati affectus
valentiora
medicamen-
ta exigunt,
quam si in
superficie cō-
sisterent.*

*Ventriculo
stomachoq;
affectis, solu
talia exhibe-
tur, qualia
ab affectibus
exiguntur.*

*Partium dis-
crepantia.*

*Principia fa-
cultatū uni-
verso corpori
sunt, hepar
et cerebrū
atq; testes.*

aliud quodcunq; membrum affectum scarifica-
mus, si non amplius humores influant (tunc e-
nim magis irritaveris, ipsumq; duplicaveris ma-
lum) verum ubi universum corpus jam expurga-
tum fuerit, nec quicq; præterea influit, sed quod
prius influxerat, jam hæret in membro impa-
ctum. Et quidem laborantibus convexis hepa-
tis partibus, quod per urinam trahere oporteat:
concavis autē, per subductionē alvi, situs ipsius
visceris indicat. Atque etiam thoracē, pulmo-
nemq; per tusses expurgari debere: ventriculū
& stomachū, per vomitū: intestina per deje-
ctiones: quemadmodum per urinas, & splenem,
& renes: matricem autē, per menstrua: cerebrum
atq; ejus membranas, per palatū, gargareonem,
nares & aures. Sed & quod his quæ in superficie
sunt partibus, talia medicamēta apponere oport-
teat, qualibus eget passio: iis autem quæ in pro-
fundo sunt sitæ, & quas per multa interposita de-
bent eorum virtutes attingere, non qualia nunc
sint, sed qualia futura sint, ex situ membrorum
agnoscimus. Tantum quippe adventitii robo-
ris adungere oportet medicamentis, quantum
in transitu exolvitur: ut quod relinquitur, æqua-
le remaneat ei, quod tactu juvat. Ob id igitur in
thoracis inflammationibus, quæ in superficie
consistunt, ea quæ solum laxare possunt, suffi-
ciunt: intrinsecus autem, sicuti in costas cingen-
te membrana, requiruntur acriora. In universis
autem visceribus eadem habenda est ratio. Sæ-
pius enim ex medicamentis impositis ulceratur
cutis, quamvis durior, minusque ad patiendum
habilis sit, quam viscera. Quod si ipsis visceri-
bus medicamenta applicare possemus, quibus
frequenter indigent, tantò molliora oporteret
esse, quantò ipsorum natura, ut afficiatur, est prom-
ptior. Quia verò hoc neutiquam nobis datur,
ob id nimirum, quæ eduntur ac bibuntur medi-
camenta, conferentia affectibus viscerū, ea mul-
tò acriora & potentiora esse conveniunt, quibus
indigent ipsæ partes affectæ: exceptis tamen il-
lis, quæ ventriculo stomachoq; auxiliantur. Hæc
si quidem sola talia exhibentur, qualia à passio-
nibus exiguntur. Reliqua verò omnia, acriora
& fortiora sunt, & præsertim quæ vel renum, vel
pulmonis occasione sumuntur. Sed indicatio quæ
a facultate sumitur, etiam curationem immutat.
Nam ex partibus corporis nonnullæ ab influen-
tibus virtutibus gubernantur, quædam verò à
propriis atq; nativis. Atq; ex iis ipsis, quædam si-
bi ipsis duntaxat, quædam etiam aliis fons & ori-
go sunt facultatum. Et aliæ quidem opus pecu-
liare habent, aliæ autē commune. Permutare ita-
que opus est curationis formam, pro ratione ha-
rum omnium differentiarum. Nam pleraque ex
remediis dictis, morbum quidem finiunt, sed na-
tivas membrorum facultates offendunt: quæ qui-
dem offensio ad totū perveniet corpus, idq; ra-
tione duplici: vel quia membrum est alicuius vir-
tutis origo, omnibus partibus cōmunicatæ: vel
quia ipsius opus universo corpori est utile. Ete-
nim hepar, cor, cerebrum, atq; testes, cōmuniter
universo corpori principia sunt facultatum. At
ventriculo matriciq; propriæ facultates insunt,
nulli alteri parti communes. Opus tamē ventris

quidem toti corpori confert, matricis autem ne-
quaquam. Quæ igitur immodicè laxant, exol-
vunt robur, quare & facultatem particulæ. Quæ
autem supra modum refrigerant, nativum calo-
rem extinguunt, qui fortassis substantia faculta-
tum existit, aut certè primū & maximè necessa-
rium instrumentū ipsarum. Nonnullæ etiam aliæ
qualitates * immoderatæ, facultates exolvere
possunt. Ad hanc autem indicationē, quispiam
referre posset & facilem & difficile sensum. Ete-
nim quæ facile sentiunt partes, acia medicamen-
ta non tolerant, licet neque acres humores. Ob
idq; os ventriculi, atq; eo magis oculus, infesta-
tur ab erodentibus medicamentis. At quæ sen-
sum obtusum habent, cataplasmata gravia susti-
nent, atq; medicamenta mordacia. Qui igitur se-
cundum solam, nudamq; intemperiem absq; hu-
morum affluxu fiunt morbi, per contrarias qua-
litates curantur: ut (exempli gratia) calida intē-
peries, per refrigerantia, sive primò, sive ex acci-
denti refrigerent. Perfusio siquidem frigida, cal-
facit ex accidenti, ubi caloris revocationem fece-
rit: calidumq; refrigerat, ubi calorem naturalem
discusserit. At quæ ob materiæ influxum labo-
rant, si quidem fuerint optimè temperata, solam
evacuationem desiderant: si verò distemperata
sint, unā cum evacuatione, per contrarias qua-
litates alterationem postulāt. Sed jam dicamus
de oedemate.

De oedemate. Cap. III.

Oedema est mollis quidam tumor, atq; dolo-
ris expers, ex pituitosa substantia, vel spiritu va-
poroso ortus: qualis in cadaveribus, & pedibus
hydropicorum & tabidorū plerunq; cernitur. In
hiscæ tamen morbis oedema symptoma est, pro-
pria curatione nō indigens. Sola quippe frictio
ex oxyrhodino, aut ex sale & oleo, compescit i-
psū. Cum verò propter influxum pituitæ in ali-
quam partem gignitur is affectus, spongia re-
centi, imbuta oxycrato, quod possit bibi, eum
sedat. Quod si ex his non discutiatur oedema, a-
luminis parum est adjiciendum. Si verò in ali-
quo artuum tale fuerit oedema, inchoanda liga-
tura est ab imis partibus, finienda verò in altio-
ribus: universam injectionem & cōpressionem
facientibus nobis, veluti in fracturis. Quod si
morbus dictis remediis non cedat, aliquid for-
tiorum medicaminū adjicere oportet, cui discu-
tiendi simul & constringendi facultas insit.

De scirrho. Cap. IV.

Exquisitus scirrhus est tumor præter naturam,
insensatus durusque. Non exquisitus verò, non
omnino insensibilis est, difficulter tamen omni-
no sentit. Porro insensibilis scirrhus minimè cu-
rationem recipit. Qui verò cum difficultate sen-
tit, nec incurabilis est, nec facilem curationem
admittit. Fit autem ex humore viscido & crasso
* tenacissimè partib. induratis infixō. Scirrhus
itaq; interdum ab initio concrescit, atq; augetur
paulatim. Crebrius verò inscitia medicorum pa-
ratur, ubi vehementer erysipelata & inflamma-
tiones astringunt refrigerantque. Quod si quis
fortiter discutientia induratis medicamenta ad-
hibeat, digeret quidem tenuiora: quod verò reli-
quū est cōpactum, lapidis instar relinquit. Non
igitur

*Laxantia
immodicè,
olunt roba-
atq; facul-
tem particu-
la.*

*Calor nati-
vus quid.*

*Sensu acui-
simo pradi-
acria me-
dicamenta
tolerant, na-
ta quib. se-
sus obfuscu-
mest.*

*Intemper-
simplices
contraria*

*qualitate
curantur.*

*Frigida per-
fusio calfa-
ex acciden-*

*Calidum
accidenti
frigerat.*

*Oedema
quid.*

*Oedema
quibus
ptoma ex-
stat.*

*Oedemate
ex influxu
ti, curatur.*

*Scirrhus
quid.*

*Scirrhus
sensibilis, me-
dicamentis
nem recipi-
Scirrhus
de contrab-*

*Scirrhus
modo ob in-
epiam cura-
tionem gign-*

igitur curandæ sunt induratae particulæ medica-
mento siccate immodicè, sed emollieti, quodq;
calorem possideat tepidum, humiditatem verò
nec multam, nec omnino minimam. Siquidem
quod superfluum humorem habet, nihil omni-
no dissolvit: quod verò minimum, plus quàm
oportet exicat. Ergo medicamenta idonea scir-
rhis sunt omnes medullæ atq; adipēs. Ex medul-
lis primas partes obtinet cervina, dein vitulina.
Ex adipibus, anserinus leoninusq;. At verò qui
ex gallina sumitur, anserinū: qui ex pardo, leoni-
num sequitur: postea verò ursinum, atque tauri-
nū. Ceterum qui ex capris accipitur, & crassior,
& siccior prædictis est: idq; magis, si ab hircio ca-
piatur. Porro tendonibus induratis oportet u-
nā cum præsidis iis quæ simul & emolliunt &
digerunt, (cujusmodi sunt, bdellium, ammonia
cum thymia, solutum in quā acerrimo ace-
to, opoponax, chalbanūq;) etiam pyritem lapi-
dem candentem, aut (si eius copia nō sit) mola-
rem, acerrimo aceto aspergere, ac dein super i-
psū dimovere partem affectam, ut à vapore
sursum elato, scirrhus dissolvi possit.

¶ De splene jecoreq; induratis. Cap. V.

Induratum splenem, non tantū foris, fortibus
medicamentis curare convenit. sed intus etiam
potionibus vehementissimis: nam eas sine mo-
lestia tolerat. Inter quæ sanè primas sibi vendi-
cant partes, cortices radicum capparis, & scolopendrii, & myricæ tum radix, tum germina, om-
nia videlicet hæc in aceto & oxymelite cocta. At
sæpenumero splen, cum tangitur, reniti videtur,
nō ob scirrhum, sed ob flatuentiū tumore. Tūc igitur
ubi ipsū absinthii decocto foveris, aliquod
cataplasma mistis facultatibus præditū superim-
pones: quale est quod ex sulfure & alumine con-
stat. Verum ubi lien in scirrhū obduruit, præ-
pollere vim digerentem oportet: parum autem
eius quod astringendi possidet facultatem, est
admiscendum. Merito igitur salis flos indura-
tos splenes sanat, si extrinsecus ipsis in vesica ap-
ponatur. Porro hepatis scirrhum, initio quidē sa-
navimus: inveteratum autem, neq; ipse potui sa-
nare, neq; aliū vidi qui posset. Quippe omnibus
ita affectis omnino aqua inter cutē subsequitur.
Nec verò perfert hoc viscus fortia medica-
menta, ut splen. Quare si sit induratum, augere opor-
tet ea quæ ratione inflammationis illius appo-
nuntur, in mistura emollientium adhibita etiam
congruente victus ratione, unā cum potionibus
& dissipantibus, & abstergentibus eum, qui in
viscere cōtinetur, humorem. Admiscere autem
oportet, & ex iis quæ ciere possunt urinam, ali-
quid. Jam verò in omni flatulento tumore, atri-
um corpus est relaxandum, extenuādus autem
ipse crassus spiritus. Si igitur subtiliori aliquo me-
dicamine anodynoq; ubi dolor adfit, calfeceris,
id quidem quod densatum est, rarefacies: exte-
nuabis verò, quod crassius est redditū. At patien-
tium particularū natura, coindicabit convenien-
tem auxiliorū materiam, in ipsaq; majoris mino-
risq; rationem. Ac secundum differentiā earun-
dem, materia etiam curationis variatur, intendi-
turq; atq; remittit. Si igitur à crasso spiritu obo-
riatur dolor in ventre inferiore, subtile oleū per

ima, unā cum medicamentis quæ in ipso ebullie-
rint, per clysterem injiciens, statim dolorem se-
dabis. Quæ verò debent bullire in oleo medica-
menta, cum partium tenuitate calfacientia, sunt
cuminū, apij, petroselini, marathri, finonis, ane-
si, libystici, seseleos, dauci, atq; spondilij semen.
Quod si conjectura comprehenderis frigidam
esse dolentium partium dispositionem, rutam
& marathrū, & grana lauri intus decoques: mi-
scebisq; asphaltum, ipsumq; oleum laurinum, &
si quæ similiter calfaciūt. At si inflammationem
dolori adjunctam putaveris, auferes ea quæ ad-
modum acia sunt, quæq; calfaciunt impensius:
ad relaxatā verò, quæ vires illas mediocres pos-
sident, transibis. In oleo itaq; anethum coques,
miscebisq; adipem anserinū, vel gallinaceū. At
verò mediocres dolores extrinseca tantū cal-
factione juvantur, ea præcipue quæ ex miliis sit,
vel ex sale calfacto, vel ex lini semine crudo. Cu-
curbita etiam magna cum multa flamma absq;
cutis scarificatione, sæpius statim dolore amo-
vit, umbilico admota. Quod si etiā tum dolores
permanserint, uti medicamentis ex opio ne dubi-
tes, quale est quod ad Philonē refertur. Sic enim
hominem liberaveris à cruciatu, & sequentibus
diebus noxam ex opio cōtractam, corriges. Au-
ferunt enim id genus medicamēta dolore, non
tamen dispositiones sanant, sed vim sentiendi
quodammodo stupefaciunt. Uti autem oportet
Philonis medicamento, omnibusq; ex opio con-
fectis, non statim, sed post tempus compositio-
nis annum, aut omnino semestre. Non modi-
ca verò fit virtutis distributio, & ex ebibitis ad
inferiores intestinorū partes, dum afficiūtur &
ex iis quæ injiciuntur per sedem, ad superiores,
ubi dolore cruciantur. Porro discutendo flatui
in partibus carnosīs collecto (qui & nōnunquā
vacat dolore, & longiori tempore durat) ea me-
dicamenta cōgruunt, quæ insigniter subtili cō-
stant substantia: cum quibus misceri debent, quæ
molliendi facultatem sortiuntur.

¶ De abscessibus. Cap. VI.

Dispositiones in quibus à se invicem distant,
quæ prius se contingebant corpora, cōmuniter
abscessus vocantur. Spacium igitur vacuum in
medio fieri oportet, quod aliquam substantiam
spirituosam, aut humidam, aut mistam ex utrif-
que comprehendat. Quæ substantiæ ubi diutius
hærent, varias alterationes suscipiunt. Nam &
lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbo-
nibus, & limo, & amurcæ, & permultis aliis id
genus similia in abscessibus corpora sæpe con-
tineri inveniūtur. Transeunt verò in abscessum
inflammationes quædam, atque erysipelatosa
phlegmones: sicuti & erysipelata phlegmonosa
non pauca: nimirum ab uno loco humoribus
translatis in alterū. Quæ igitur per summa, sub-
cute consistunt, facile dignosci possunt: neq; est
sanatio ipsorum difficilis, cum solis medicamē-
tis quæ extrinsecus applicantur, curentur, nec
medicamentis intrò assumptis indigeant, veluti
quæ in visceribus accidunt. Curatio igitur earū
quæ in superficie cutis abscedūt inflammationū
fit incipiente quidā jam abscessu, per ea quæ do-
lorem sedant relaxantq;: procedente verò tem-

Flatua dissen-
tientiā medi-
camentis.

Dolores ven-
tris medio-
cres vel ex-
trinsecus tan-
tū calfactio-
ne sedantur.
Cucurbitula
umbilico ad-
mota, ventris
dolores sedat
Opium reci-
pientiā medi-
camentis do-
lore tollunt,
ipsam tamen
dispositionē
relinquunt.
Opio constan-
tibus esse utē-
dum post tem-
pus compositio-
nis ad mi-
nus semestre.
Intestinorū
dolores ubi-
cūq; sint, iis
variā bibi-
tis, & per se-
dem injectis
medicamen-
tis.

Abscessus
quid.

Abscessibus
qualia soleant
inesse corpo-
ra.

Abscessuum
curatio.

pore ad ea quæ cōcoquendi, suppurandi; vim habere dicuntur, transferri oportet. Statim igitur aqua abundanti in qua fuerint decoctæ altheæ radices, perfundere, atq; oleo calido partem inflammata[m] conspergere, nec non ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si aut suppurat[i]onem prohibere sit animus, panē in oleo & aqua plurimum ebullire permittito, postea verò subigens admoveto. Sit tamen aquæ ad oleū proportio multiplex. Plus autē quàm hoc suppurat[i]onē prohibet hordeacea farina, similiter præparata. Si verò per summa cutis in parte inflāmata tensio valida fuerit, multis ac mediocribus scarificationib. in superficie incidere oportet: ac postmodū ex farina hordeacea (ut diximus) elixata, cataplasma apponere. Cæterū in quib. difficulter ad suppurat[i]onem pervenit, nec faciliè discuti tumor potest, sed suspicio est humores crassiores & tenaciores ibi impactos existere: in iis tantum dispositionib. convenit ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Convenit etiam id quod ex caricis pinguibus, dulcibusq; & decoctis, cōficitur cataplasma. Quarū sanè decocto, aliquando hordeaceam farinam adjicimus: aliquando panē syncomistum, hoc est, miscellaneum, sed qui ex generoso confectus sit tritico. Porro farina triticea maximè ad suppurat[i]onē promoveret: hordeacea verò resolvit plurimum. Si igitur resolvatur tumor, minus tamen quàm optes, cum caricis hyssopum & origanum simul coquere oportet. Quod si vehementius exiccare tumorem volueris, sal decoctioni adjicias: dein farinā hordeaceā, detracto prius furfure, insperge: & postquā plurimū ebullierit, appone cataplasma. Si verearis ne tumoris reliquiæ in scirrhu[m] durecant (quod cōtingit, ubi quis fortiter exiccantibus utitur) radicem agrestis cucumeris, aut bryoniæ, aut asari, in aqua decoque: sæpius quidem per se solas, nōnunquam caricas pingues adjiciens. Deinde aquæ farinam admisce, injiciens aliquid adipis anserini, vel gallinacei, vel etiam suilli. Eadem quoq; radices, atq; etiam quæ producit althea, si post moderatā decoctionem cū pane & adipe cōmadatur, hujusmodi discutiunt tumores. Fortior aut hisce omnibus est draconitii radix. Verū fortiter solventibus medicamentis semper sunt miscenda emollientia, ne tumores ipsi in pertinaces scirrhos degenerent.

De tumore suppurato. Cap. VII.

Porro ubi suppurandi tumore[m] amissa spes est, ex farina triticea utere cataplasmatib. Dein verò postq[ua] suppurata secueris, si videris ea quæ circa sectionē sunt omnino ab inflāmatione libera emplasticis medicamētis utitor, sed quibus exiccandi resolvendiq; citra morsum facultas insit. Equidem sæpius in hujusmodi usus sum medicamento ex fermēto & ostreis cōbustis cōfecto. Si verò pars aliqua circa sectionē inflāmata videatur, quod ex chalcitide cōstat, liquabis oleo: atq; ubi sensim refrigeratū fuerit, infundens vinū, in mortario emolles & subiges, ac deniq; vsui accommodabis. Ubi verò cutis per suppurat[i]ones plus quā par sit, colliquata & veluti lacerata fuerit, nō faciliè subjectis corporib. agglutinat: qua-

re necessū est ut p[er] linicina latiora vulnus ipsum curetur.

De sinu. Cap. VIII.

Sin autem amplius agglutinandi cutim subiectis partibus creverit difficultas (qui sanè affectus vocatur sinus) satius est fistulā directè perforatā, vel ex ære, vel ex cornu factam, habere in promptu: aut etiā aliquod ex iis instrumētis, quibus pus extrahi consuevit, quod foramen latissimum habeat: ac per id exiguum medicamētum nostrū, q[uo]d ex charta cōbusta constat, liquatū oleo rosaceo in ipsum sinū infundere: ac deniq; linamēto cōcerpto, ipsius os claudere. Cæterū quæ sic liquantur medicamenta, oportet ut sint acriora, q[uam] quæ linamētis excepta illinuntur: qualia nimirum sunt quæ omnib. sunt in usu, colore viridi. Nam cum hæc ipsa oleo rosaceo nō pauco solvere expediat, ut injici possint in sinum, necessario certè ipsorū virtus exolvitur. Quæcunq; igitur medicamenta exquisitè emplastica, quale est Machætionis, Epigoni, & quod Isis cognominatur, ubi ad emmotorū usum perducuntur, cerati indigēt admistione, eadem etiam ad curandos sinus sunt cōmoda. Siquidem qua ratione ipsis ceratū miscetur (nempe quod vires mordaces haberent, si per se sola liquecerēt) eadem sunt ad sinus utilia. Ubi verò sinus mediocriter fuerit oppletus carne, tunc agglutinantia medicamēta apponere oportet: veluti si recenti, & sanguinolēto vulnere medicareris. Sciendum aut est interim, omnia metallica medicamenta subtiliorū partiū existere: fortiriq; majorē vim exiccandi, ubi plusculum ebullierint. Quanto verò subtiliora medicamenta fuerint, habuerintq; majorē vim exiccandi, tantò plus in sinū operabuntur. Porro cum ad superiorem locū ipse sinus extenditur, faciliè per os humor vitiatus elabatur. Si verò ad ima declinet, cum retineatur intus, partem aliquam cōtinuam erodit. Quare in hujuscemodi sinibus, nisi prius ad effluxū sectionem feceris, nihil proficies, nec cum carnem gignere, nec cum agglutinare volueris. In aliis verò non est opus sectione, si modò cōvenientem figuram in patiente parte servaveris. Ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem vergentē, facere ut deorsum inclinet: sicuti & vergentem ad ima, convertere ad superiora. Adverte autem melicratū esse aptum ad conglutinandas penitiores ipsius sinus particulas. Post cujus usum, prius quàm aliud glutinans medicamen adhibeam, aliquando vino solo, aliquando vino mulso, ipsum soleo sinum abluere. Etenim ad abstergendam, expurgandamq; adhærentem saniem, melicratum est præstantius: ad cōglutinandum verò, vinum est melius, & efficacius: præcipuè quod in medio dulcis & austeri cōsistit. Et quidem post medicamenti agglutinantis appositionem, spongia recens ex mulso, aut vino, circumjiciatur, quā mollissimè fieri possit. Atque alligatio quidem incipiat à fundo sinus: desinat autem ad os. Linteorum verò circunductiones constringantur quidem in fundo sinus, sed non ita ut dolo-

Scarificatio-
nes profun-
diores quan-
do consentiāt
Emplastrum
ex caricis.

Farina triti-
cea quidem,
maximè ad
suppuratio-
nes promo-
vet: hordea-
cea verò di-
scutit.

Tumoris in
scirrhu[m] abeu-
tis curatio.

Discutienti-
bus fortiter,
cur semper
sint miscen-
da emollien-
tia.

Tumoris sup-
purati cura-
tio.

Sinus qu-
Sinus cu-
tio.

Medicam-
ex charta
busta.

Sinus, cum
do utilian-
dicamen-
qua sint

Metalli-
omnia se-
maiorē
exiccant
ubi plus-
ebullierit

Effluxu-
rus esse fa-
dam secū-
nem app-

Melicrat-
esse aptu-
m conglu-
tinanda

Sinus qu-
do abluo-
ex vino
Vinum
glutina-

Sinus qu-
do delig-
ans.

humores vitiosi, si qui excernuntur à sinu, facile effluere possint, parvo aliquo alio ipsi imposito emplastro, usque ad solutionem: quam tertia quaque die faciens, auferes hoc ipsum, quod veluti operculum hæret: id quod per totum sinum circumjectum est medicamentum relinquas. Jam vero ex quantitate, & qualitate emanantis humoris, præterea ex dolore, vel indolentia, tumore, vel depressione partis affectæ, cognoscas num pars ipsius sinus profunda sit probe conglutinata. Siquidem si neque in ipso sinu dolor sentiatur, neque tumor appareat, sed totus locus depressus, siccus, atque expers doloris existat, viderisque ad osculum pus exacte concoctum, necnon quantitate paucum, bene sperandum est de sinus glutinatione. Si autem contraria se ostendant, nondum sinus conglutinatur. Sit vero medicamentum quod circumlinitur sinui, vehementer siccans, citra tamen mordacitatem: quale utique nostrum existit, sine cera confectum ex metallicis medicamentis elixatis, & oleo cicino, & acetico: quod nimirum vulnera cruenta cum conglutinatur, sinusque sine molestia siccatur, si lixivio prius sordes ablutæ fuerint. Porro ubi qui abscesserunt tumores tardè secti fuerint, cutis ipsa admodum extenuatur, redditurque laceræ vesti per similes. Quo tempore utendum medicamentis est, substantia quidem humidis, potentia autem siccis: quale est quod constat ex lithargyro, & suillo adipe antiquo, & chalcitide, quibus additum sit vetustissimum oleum. Confert etiam in lacera cute non minus mel, si usque ad consistentiam emplastri elixetur. Satius tamen fuerit ei myrrham subtiliter tritam, aut aloë, aut thus, aut aliquod ex his, vel omnia simul aspergere, tum præcipue, cum linteo inundatum humidius apparet. Usus etiam sum aliquando & tenui centauro, quod mirum est ad ejusmodi medicamentum. Post ipsum vero & symphytum utile est: deinde ireos Illyricæ radix. Postea farina ex orobis: omnia hæc & per cribrum subtile transmissa, & inspersa melli, dum ab igne amovetur.

De gangrana. Cap. IX.

Nunc vero opportunum videtur de gangranis aliquid dicere. Sic enim vocant mortificationes eas, quæ ex magnitudine inflammationum fiunt, nondum tamen absolute sunt factæ. Etenim cum ita membrum effectum est mortuum, ut nec punctio, nec sectio, nec etiam ultionem sentiat, statim ipsum recidere oportet, quæ vicinam sanam partem attingit. Cæterum quod sit affectum est, denigratur. Quod vero in medio consistit ut ad mortem proficiscatur, appellatur gangrana. Curatur autem, evacuantibus quidem nobis plurimum sanguinis, qui in patiente membro compingitur (cujus causæ mortificationes fiunt) reliquo autem, exhibentibus transpirationem. Igitur aut cutem universam multis sectionibus profundis secare oportet, unam cum subjecta substantia: aut plurimis scarificationibus profundis incidere. Ubi vero sanguinem effluere permiseris, imponendum aliquod medicamentum est, ex iis quæ ad putrescentiam conducunt: cujusmodi est ex oxymelite farina orobi, lolivæ. Si vero talia non adsint, fabarum farinam adhibe, atque ipsum oxymel solū. Quod si fortius medicamentum apponere vis, adjice sal, aut ex trochi-

scis aliquem exquisitissimè tritum, qualis Andronis, & Polyidæ, & Pasionis, & Musæ existit. Verum qui duras natura carnes sortiuntur, ij fortissima medicamenta desiderant: mollia vero, qui teneras. Ad majorem autem securitatem, quando abscindis aut circūcidis id quod jam putruit, satius est ipsius mali radicem, parti sanæ conjunctam, adurere, uti sæpius consuevimus in pudendis facere, nonnunquam ipsis affectis partibus admoventes cauteria, nonnunquam linamentum interponentes. Facta vero adustione, solemus uti succo porri, aut, si is non adsit, recitatis trochiscis: ad detrahendam aut crustam, medicamentum dicto Cephalico, ex melle utere: aut pane ex hydrelæo decocto. Iuvat etiam hordeacea farina similiter præparata, aut cum ipsa triticea mista, illitaque. Præterea tetrapharmacum, & Macedonicum nominatum sunt crustarum suppurationibus, atque earum excidentis accommodatissima: & quæcunque vim habent perducendi ad suppurationem. Panis etiam cum apio, vel ocymotus, optimè crustas dirumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus autem medicamentis, iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori ex melle. In mollibus vero corporibus sat est farina orobi, cum melle, vel thure. Aufert etiam crustas Machæionis medicamentum. Cum vero exciderint crustæ, atque hujusmodi ulcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci cicatrix.

De Cancris. Cap. X.

Carcinosi tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mamillis mulierum, * quæcunque naturali sua purgatione privantur. * Nam quandiu hæc, ut oportet, adtuerit, tandiu mulier integra sanitate fruatur. Hi vero tumores omnes ex atræ bilis recremento gignuntur. Qui humor facci vinariæ similis, dum sanguis in hepate fit, ab splene expurgatur, cui est nimirum nutriendo, Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum genuerit, optimaque victus ratio præcesserit, & ex ipso qui generatur, splen abundè satis attraxerit, nulla hujusmodi superfluitas coacervatur in venis. Si vero contraria accidant, tunc succus is melancholicus multiplicatur in venis, à quibus nonnunquam facultate expellendi extranea præditis, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decubitat. Quandoque ad cutim universam expellitur, ubi gignit elephantiæsim. Est cum ad alias corporis partes, quæ cæteris imbecilliores sunt, humor iste decumbit. Quo tempore evidenter apparent quæ in loco affecto sunt venæ, crasso & nigro sanguine imbutæ. Qui quidem quanto crassior fuerit & nigrior, tanto deterior est passio. In mamillis autem sæpe vidimus tumorem figura animali cancro per simile. Hunc igitur morbum per sui initia sæpe sanavimus, medicamentis quæ atram bilem educerent. Ubi vero in molem insignem attollitur, curari sine chirurgia non potest. At scopus in hujusmodi curatione est, totum qui circumstat tumorem præter naturam, quæ partibus sanis adhæret, abscindere: ob vaforum tamen magnitudinem, præsertim si fuerint arteriæ, perfluvii sanguinis statim periculum imminet. Quod si laqueis ipsa excipias, * per consensum afficiuntur

Adurendam esse radicem putrescentis particula.

Eschara qua detrahant.

Cancris ubi ex quo humore gignantur.

Atræ bilis ex purgatur à splene, quem alit.

Atræ bilis quos morbos excitat.

Cancris duplex curatio.

Cancris medicatio pericula lesa.

innum glutinum in ex utribus signis colligi possit.

Medicamentum a sinu circumlinenda, se debent vehementer siccantia.

in lacera in abscessibus medicatio.

Gangrana quid.

Membrum mortificatum, quatenus sit abscindendum.

Gangrana curatio.

Putrescentibus apta medicamenta quæ.

*Elephantia-
sis in Alexan-
dria in Gale-
scit plurimū.
Elephantia-
sim in Ger-
mania repe-
riri rarissi-
mē Gal. affir-
mat.*

*Cancris exul-
cerati reme-
dia.*

*Cancris Si-
ctus ratio
conueniens.*

afficietur cōtinuæ particulæ. Si verò radices mor-
bi exurere animus sit, neq; huic rei maximū peri-
culum deest, * si prope loca principalia insignis
adustio fiat. Porro in Alexandria plurimi, ob cras-
sam victus rationē, atq; regionis fervorem, ele-
phantiasis corripiuntur. At in Germania & Mysia,
rarissima hæc passio videtur: & apud Scythas la-
ctis potatores, nunq̃ ferè apparuit. Huic igitur
morbo melancholici succi conferunt purgatio-
nes. Quod si ætas atque virtus permiserint, san-
guis prius mittendus est. Sed neq; in cancris inu-
tile est, ubi nihil prohibet, primò sanguinē mitte-
re, ac dein purgare evocareq; mēstrua, si sint mu-
lieres, nec attigerint quinquagesimū annū. Ipsi
autē patienti particulæ, succus solani imponatur,
vel medicamen ex pōmphyge cōstans, quo u-
tor ad caneros exulceratos: vel etiam quod ex
chalcitide fit, si copia illius non detur. Quod per-
tinet ad victus rationē, succus ptisanæ abundan-
ter est exhibendus, & serū lactis: at ex oleribus,
malua, atriplex atq; blitum. Cucurbitis etiam, si

ocasio ferat, utendum, & piscibus saxatilibus,
avibusq; omnibus, exceptis palustribus.

¶ De elephantiasis. Cap. XI.

At iis qui elephantiasim patiuntur, mirabile au-
xilium est viperarū esus. Quas quidē, ubi caput,
caudamq; , usque ad digitos quatuor abscideris,
excoriaverisq; , ac deniq; interanea exemeris, in
olla prius ablutas coques, donec exquisitè mol-
les reddantur. Adjicere tamē debes aquæ, in qua
illæ elixantur, porrū, anethumq; , & olei nōnihil.
Ipsū etiam medicamentū confectū ex viperis,
confert in potu exhibitū, iis qui huiusmodi mor-
bo laborant, vel cuti etiam illitum. Porro ad sa-
nandas strumas, optima sunt quæ astringere &
exiccare, & pus etiam facere possunt. Ad melice-
ridas autē, quæ ipsas dissolvendi vim habent, &
quæ pus discutiunt medicamenta. At verò cura-
tio hydropū, ad has tres reducitur intentiones: ut
sanemus durum tumore, quo viscus affligitur:
& apponam⁹ ea quæ humiditatē dissolvāt, & pro-
pinemus medicamenta quæ moveant urinas.

*Elephan-
tiasis
conduci-
perarū
Viperæ
cinnamō-*

*Theriac-
phantica
fert com-
illitaq;*

*Hydropū
rationis
pi tres.*

ILLUSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D. JOANNI FURTADO A MENDOZZA, apud Venetos Oratori Cæsareo longè dignissimo, Andreas Lacuna Se- cobiensis, Doct. Med. miles S. Petri S. D.



IX MAXIMAM INGRATITUDINIS NOTAM, AUT DECLINARE, AUT ELUE-
re, semel inustam, possem, Vir illustris. si ex lucubratiunculis meis, sub umbra amplitudinis tuæ
ad absolutionem perductis, portionem aliquam tibi non impertirer. Nam cum ex mercimoniis
singulis, quæcunque inter subditos Cæsaris in hac Venetorum urbe splendidissima contrahun-
tur, ad egregium & consularem virum Thomam Sornozzam, vel Cæsareo decreto, nonnihil
frugis pertineat, quod perpetuò illis patrocinetur, eorumq; universas lites componat: multò magis, mea qui-
dem sententia, rationi consentaneum videtur, ut optima quæq; ingenia, quibus contingit huc suos labores
advehere, ex meditationibus suis aliquod dignationi tuæ literarium etiam tributum pendant, à qua nimirum
foventur, aluntur, locupletantur: cuiusq; instudiosos omnes patrociniū atq; benignitatem sum ipse omnium
maximè expertus. Consiliū impræsentiarum est præterire silentio immortales istas virtutes tuas, pruden-
tiam, temperantiam, continentiam, constantiam, animi magnitudinem, multiplicemq; doctrinam, quibus
totus splendes: ne aut earum sublimitatem claudicante oratione non assequar: aut reluctari videar singulari
modestia tuæ, quæ ut popularem semper auram contempsit, sic nihil magis exosum habet, quàm huiusmodi
encomia. Amplissimum quippe integritatis tuæ, vel me tacente, argumentum est, quod CAROLUS V.
Imp. te præter expectationem vocaverit, ut in hac tam angusta Repub. vices suas gereres, gravissimæq; admini-
strares negocia. Cum igitur minimè contemnenda artis medicæ pars, in vacatione redundantium consistat:
ac vacuatio quidem ipsa, partim per venæ sectionem, partim per purgantis pharmaci exhibitionem, partim
per hirudines, cucurbitulas, atq; scarificationem soleat administrari: haud ab re me facturum existimavi, si
Galenī tres commentarios de phlebotomia, quorum primo titulus est de venæ sectione adversus Erasistratum:
secundo, de sectione venæ adversus Erasistratæos Romæ degentes: tertio, de curandi ratione per venæ sectio-
nem: ac præterea alios tres, unum de hirudinibus, cucurbitulis. & scarificatione: secundum, de purgantium
medicamentorum facultatibus: tertium deniq; , in quo docetur, quosnam purgare, & quando, qualibuscq;
medicamentis oporteat, offerrem amplitudini tuæ, hisq; etiam veluti auctarium quoddam adiungerem libel-
lum de ptisana, consiliūq; à Galeno conscriptum puero cuidam epilepsia laboranti. Nihil ergo iam superesse
videtur, nisi ut ipse, Pater observandis, hosce octo commentariolos, pusillos quidem, si chartularum tantum
ratio habeatur, sed mortalium vitæ admodum salutares, pignora quedam officii erga te mei, quam benignissi-
mè excipias, munerisq; tenuitatem non asperneris, memor eos qui thure carerent, fuisse olim Diis mola salsa li-
tare solitos. Vale, musarum hospitium amplissimum. Venetiis, ex adibus tuis, III. Idus Aprilis,
M. D. XLVIII.

GALENI PERG. DE VE.
na sectione adversus Erasistratum,
lib. unus.

Mihi quidem illud inquisitione quod dili-
gētissima dignum esse videtur, cur
nam Erasistratus, cum cætera quæ
ad artem spectant omnia, etiā mini-
ma quæq; satis superstitiosè tracta-
rit, de venæ tamē sectione, præsentaneo illo uni-
coq; remedio, & quod apud veteres fuit maximi
ponderis, ne minimū quidem, nisi obiter & per
transennā, sermonē fecerit. Nam dum ait, inflam-
mationes (exempli gratia) quæ vulnerib. super-
veniunt, vacuatione quæ per inedia[m] fit, esse cu-
randas, miror sanē, quod auxilio expeditissimo
omisso, ad tardissimū, minimeq; tutum cōfugiat.
Ego verò, quandoquidem per inflammationes ne-
cessaria vacuatio est (vel Erasistrati testimonio)
eam omniū facillimā promptissimamq; venæ se-
ctione perfici arbitror, utpote per quā ipsas etiā
phlegmonas solas, celerrimè curare possimus:
cum ē diverso inedia, præterq; quod longū tem-
pus requirant, æqualiter etiā universum corpus
evacuant, id quod certè nō est expediens: ut in-
terim alia reticeam incōmoda, quæ in medias * lō-
gas necessariò sequuntur: cujusmodi sunt virtus
defatigata, succi biliosiores atq; amarulentiores
effecti, morsus cordis frequentes, inquietudines,
dejectiones suppressæ, ac breviter, omnia recre-
menta * mordaciora & aciora reddita. Quorū
Erasistratus nihil animadvertens, cæcorū more,
qui amplam cōpendiosamq; & planam viam in
propinquo habentes, sæpenumero angustā, pro-
lixam, asperamq; errabundi ineunt, & ipse pro-
pinquam admodū, satisq; expeditā & amcēnā se-
mitā aspernatus, ad impeditā illam, salebrosam,
& longam se cōtulit: quippe qui hoc tantū con-
sideraverit, num quò ipse contendit, via eò ver-
gat: nō autē, an cōpendiosè, & sine periculo du-
cat. Nam quòd vel inedia ad plenitudinis vacua-
tionem cōferat, ego non eo inficias: verū lōgo
tempore, magnoq; cum nocumento, eam effice-
re id profiteor. Jam verò cum Erasistratus per-
petuò admiretur naturā, ceu artificiosam, provi-
damq; animalii gubernatricem, nusquam tamē
eam imitatur. Aut cur illā plurimis morbis san-
guinis evacuatione medentē cernens, ne in uno
quidem, ipse tali præsidio utitur? Itaq; mihi aut
modis omnibus demens, aut in naturæ operibus
quāminimè versatus esse videtur. At omniū bo-
norum, quæ ad medicam artem spectant, nobis
autor Hippocrates, nos monet accuratissimè (id
quod etiam Erasistratus nos monere debuisset)
ut quandiu natura fortis atq; vegeta existens, se-
se ad crisim accingit, nō perturbemus quidē mo-
tum ipsius, perficiamus autem ea, quæ superata
morbosarū causarū vehementia, nō potest ad in-
tegritatē perducere. Quæ judicantur, & judicata
sunt (inquit) integrè, nec movere, nec novare,
sed sinere. Istud quidē habes propriū naturæ in-
tegrè moventis præceptū. Quod verò huic suc-
cedit, naturæ & ipsum, verū diminutè ad crisim
moventi congruit: eamq; ob rem ut illi simus au-
xilium jubens, ait: Quæ ducere oportet, hæc quò

maximè natura vergit, p loca cōferentia, ducen-
da sunt. Natura si quidē tum temporis expellere
adversariū conatur: cum autē præ imbecillitate
imponere operi finē nō possit, auxiliū nostrum
implorat. Propterea etiā laborantes dolore late-
ris, jugulū affligente, aut regionē quæ supra præ-
cordia est, secta interna cubiti vena dicit esse va-
cuandos. Ubi verò dolor sub septo transverso
fuerit, ut subducatur alvus vel nigro veratro, vel
peplio, cōsultat. Similiter in quopiā renū affectu,
venam quæ in poplite est, incidendam censet.
Idem etiā Margei famulam, cui ob contortū ad
vertebras coxarū os, uteri purgatio suppressa e-
rat post partum, atq; inde gravis dolor secutus,
restituit, venam prope malleolū secans: quævis tre-
mores totū corpus jam occupassent. Sed neq; ex
iis qui rationalem empiricamq; sectam amplexi
sunt, quisquā à venæ sectione abstinuit. Ut autem
naturæ opera producamus, an non ipsa cunctas
mulieres singulis mensibus, quòd obignaviā &
ociū, multitudinē humorū coacervēt, superfluo
sanguine evacuat? An non etiam idem post partū
molitur, quævis foetura ipsa quædam species vacua-
tionis existat? At hæc verò, postquam foetus æ-
ditus est in lucem, lactis generatio in mamillis
non parva & ipsa evacuatio plenitudini existit.
Una siquidem & lactis & menstruorum substan-
tia est: amborumq; (ut quispiam dixerit) rivorum
fontes cōmunes, sunt venæ. Quamobrem qui-
buscunq; per ætatem menses fluere cessarunt, iis
neq; in mamillis lac amplius gignitur. Quæcunq;
etiam purgandi tempora adhuc habent, atq; in-
terea lactant, eæ non purgantur. Præterea cum la-
ctanti mulieri sanguis per locos erumpit, ilico
huic lac evanescit. Insuper quæ animalia non ge-
runt utero, iis neq; lac unquam adest: rursus qui-
bus id suppetit, illa etiā ad cōcipiendum idonea
sunt. Porro si mulier per excretionē illam men-
struā probè expurgetur, nec podagris, nec articu-
lorum doloribus, nec pleuritide, nec peripnev-
monia, nec aliis deniq; ex plenitudine affectibus
infestabitur. At mēstruis retentis, eā cuilibet ma-
lo implicari facile est: huicq; rursū evacuatione-
nes medentur. Ex hominib. etiā, quibuscunq; pro
consuetudine superflua per hæmorrhoides va-
cuantur, ij omnes vitā morbis minimè impeditā
agūt: quibus item supprimūtur inanitiones, hi in
perniciosissima quæq; labūtur. Ac proinde cum
vel in tremorē, vel in hydropem, vel in aliū affe-
ctum frigidum, mas quidem ob hæmorrhoidū,
mulier verò ob mensiū retentionem, inciderit,
Hippocrates cōmendat meritò evacuationē san-
guinis, per convenientia loca, cum nimirū cōtra-
riorum contraria remedia existāt. Natura quip-
pe (quā ille vir imitatur) inedia[m] adjectione, re-
pletiones evacuationibus, frigus calfactioni-
bus, caloresq; refrigerationibus curat. Nam (ut
alia multa sub ticeam naturæ miracula) frequen-
ter conspexi canem sese provocantem ad vom-
itum. Vidi & avem Ægyptiam, quæ clysmū imi-
tabatur. Grues etiam, aquilasq; prælongo usq; ad
ultimos terrarū fines volant, partim frigus, par-
tim æstus vitantes, quò cōtraria contrariis pro-
pulsent, videre licet. Sectio itaque venæ (ut eò
unde digressa est, nostra revocetur oratio) ob
causas

Pleuritici
quomodo sint
vacuandi ex
doctrina Hip-
pocratis.

Menstruā
cur mulieri-
bus prosuāt
singulis men-
sibus.

Lactis et me-
struorum una
substantia
est.

Lac iis non
gignitur, quib.
menses
cessarunt.

Lactantes
non purgan-
tur.

Lac iis non
adest quā nō
gerunt utero
Mulier cui
menses probè
fluunt, quib.
morbis
non infeste-
tur.

Hæmorrhoi-
des fluentes
suppressæq;
quorum bo-
norum exi-
stant causas.

Contrariorū
esse contra-
ria remedia.

Bruta sibi
ipsis naturā
duce, meden-
tur.

Sanguinis detrahendi mensuram, quam aliorum auxiliorum, multo facilius deprehendi.

Sanguinis evacuatio nis sistenda, medicus habet liberam potestatem, aliarum autem nequaquam. Purgationi superuenientia discrimina.

Cibi in mensura erratum, gravissima incommoda inducit.

Inedia, privatio cum sit, nec nutrire, nec inanire potest. Interisse ob ciborum inopiam neminem.

Latentibus que cibo rare.

Inedia non, sed raritas cutis evacuat.

Inflammationes omnes sola inedia evacuandas esse censebat Erasistratus.

causas dictas perperam ab Erasistrato omittitur. Quod autem mensura in venæ sectione multo facilius deprehendatur, quam in cæteris quibusvis auxiliis, hinc declaratur. Nam & coloris mutationem, nunc quidem in ipso fluente sanguine, nunc verò in ægrotantis corpore, despiciere licet. Animi quoque defectio in plurimis affectibus vacationis terminum obtinet: quemadmodum sanguinis fluentis vigor languescens, & pulsus mutati. Adde quod & medicus hujus solius evacuationis liberam habet facultatem sistendæ, quandoque illi placuerit: aliarum autem nullius. Nam ubi propinandum sit aliquod medicamen, prima exhibitio in tua potestate sita est: cætera verò, fortuna administratrice obtingunt. Ingens præterea in propinationibus pharmacorum periculum est, cum vel non commovetur purgatio, vel quod in alium attractum est, non facile excernitur, vel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pulsu evanescentia, ac defectu animi exprimitur: vel cum corpus vehementer perturbatur. Interimque paulum admodum evacuatur, aut evacuatio modum excedit: id quod sæpius, ceu extremum malum, contingit. Neque enim ut venæ incisa fluxum mox digito superposito sistes, sic sistere alvi pluvium poteris. Cibi etiam cujusque in mensura erratum gravissime incommoda inducit: ut in hominibus extenuatis & imbecilibus constat. In quibus si quid minus, quam par sit, nutriat, virtutem tabidam reddet. Si verò modum exuperet, naturæ potius oneri, quam nutrimento, fuerit, illamque penitus & extinguet & suffocabit. Ut autem funditus Erasistrati opinionem evertam, solam instituentis inediam, ad evacuandas omnes inflammationes, nemo ignorat, mea quidem sententia, inediam ipsam privationem quamdam existere, ac proinde nec nutrire, nec evacuare posse, cum inter inanitionem & vacationem sit media. Nec verò existimandum est, aliquem unquam periisse ob inopiam ciborum: alioqui animantia delitescunt in latebris sine ciborum copia, perdurare nequaquam possunt, quemadmodum certe perdurant: quia nutrimento non indigent: quandoquidem ob desiderium atque torporem, in quo versantur, necnon ob strictam cutem, nihil ab eorum corpore exhalat, quod cibo instaurari postulet. Itaque non inedia, sed raritas cutis evacuat: quam si frigore & quiete densaveris, quid commodi fuerit ex fame expectandum? Cæterum dum Erasistratus cuique instituere inediam contendit, videtur mihi ipsemet affectuum qui inedia opus habeant, autor & promotor existere.

GALENI PERG. DE VENÆ SECTIONE ADVERSUS ERASISTRATOS ROMÆ DEGENTES, LIB. UNUS.



Um Romam initio venissem, incidi in medicos quosdam, qui a venæ sectione tantopere abhorrebant, ut cum aliquando æger quispiam propter plenitudinem jam præfocaretur, ne tum quidem hoc auxilio uti vellent: idque secuti Erasistratum, qui nusquam venæ sectionem probans, omnes inflammationes sola inedia evacuandas esse censebat. Quam in re quætopere vir ille hallu-

cinatus fuerit, qui nos cernat? Etenim si ob id inedias probamus, quod vacuatis per eas venis, affectum minui contingat: multo hercle commodius fuerit, ut semel adhibita evacuatione, potissimum quæ per sectam venam administratur, ab inediis abstineamus, ut quæ & ægrotos ingenti molestia soleat afficere, & vigilias, & inquietudines, afflictionemque; oris ventriculi, tum corruptionem succorum, necnon alvi, atque interdum urinæ suppressionem inferat. Quamobrem nonnulli in Romana urbe medici, præcipue qui medebantur mulieribus, cum explorassent infelicem cujusdam puellæ, ob non sectam venam, successum, in quibus sanguis ferebatur ad superiora, tempore quo eruptio menstruorum expectabatur, venæ sectionem jam usurpabant. Nec verò quietem, nec inedia eis injungebatur, sed melicratum propinabant: victumque humectante ac lavacris affatim uti eis permittebatur. Ab his enim, si vel mediocri quantitate sanguis fuerit detractus, purgationes exoriri cõfestim solent, præsertim si infra poplitem, aut juxta talum venæ sectio fiat. Sin autem quis vena secta injunxerit ipsi mulieri inediam, menses prius fluentes, cohibebit, inculpabilesque reprimet purgationes. Sanguis namque ciborum inopia arefcit, & desior seipso redditur: eamque ob rem, ad fluxum ineptus evadit. Quæ igitur tum lotæ fuerint, melicratumque & cibos idoneos sumpserint, ac vinum neque austerum, neque crassum biberint, his purgationes proculdubio contingent: ob idque ego inedias post venæ sectionem non frustra tantum, verum etiam adhiberi cum magno damno profiteor. Jam verò cum nostra hac tempestate mulieres quædam Romanæ frigidissimæ ex nive potarant, ob idque aut nullo pacto purgarentur, aut diminutæ: eas tamen medici sectione venæ adeo incolumes servaverunt, ut nec sanguinem spuerent, nec pleuritide, peripnevmonia, aut angina unquam corriperebantur. Porro in auspiciis inflammationum, omnis sorptionum ciborumque adjectio subtrahenda est: utendum verò venæ sectione. Siquidem inflammationes quæ febres faciunt, ut plurimum ex plenitudine fiunt. Quamobrem si vasa nutrimento impleantur, majores ac vehementiores ipsæ inflammationes redduntur. Cæterum si adolescentes quæ neque de sanguinis detrahendi mensura, nec de venarum secandarum ratione quicquam audiverint, ad præsidium hoc sese accingant, ægros in exitum perducent. Plures namque ob perperam sectam venam perierunt, quam quibus adhibitum id auxilium non fuerat. Quippe seniores medici tum temporis venas secantes, utebantur aliis evacuatoriis auxiliis quæ idem quod & venæ sectio, verum longiore tempore, efficere poterant: nisi quod quandoque ob principem partem affectam, aut ob plenitudinis exuperantiam, æger morte præoccupabatur. Verum quæ febres cunctas in principio venæ sectione indigere autumant, non mediocri etiam noxa ægrotos afficiunt. Itaque minus aberrare eos consentaneum est (ut Plato ait) qui non aggrediuntur illa quæ ignorant, quam qui ea tractant, quæ didicerunt nunquam. Porro quod vas aliquod ruptum possit absque inflammatione coalescere, dummodo nos cætera rite administraverimus, sanguinisque quantum nobis visum fuerit, in tempore evacuaverimus,

mus, liquidò constat. Frequenter siquidem vidimus, quò quibusdā pugnantis singulari certamine * totum crus brachiumve dissectum esset; coaluisse tamen vulnus, antequam inflammatio oriretur: quò quidem multò magis continget, (si ut Hippocrates ait) illicò sanguis copiosus fluxerit. Sæpius etiam vulnus in cavas thoracis partes illatum, triduò conglutinatum vidimus. Quò autem Erisistratus nusquā fuerit usus venæ sectione, hinc perdiscere licet, quò in plenitudine omni semper in ediam iungat: id quod neitiquā facturum esset, si eam sanguinis detractio vacuaret: quum minimè consentaneum rationi sit, ut quis circa unum eundemq; ægrum, utraq; auxilia, nempe in ediam, & venæ sectionem, usurpet. Nec verò existimandum est, plethoricos omnes sanguinis esse detractio vacuandos. Prius siquidem distinguenda natura plenitudinis est, habitudoq; & ætas ægri expendenda: tempus item, regio, & aeris constitutio consideranda, necnon quæcunq; antecesserunt, quæq; ipsum ægrum etiam nū infestant symptomata. E conversò alios plerosque tibi ob oculos ponam, qui absq; repletionem quum sint, nihilominus venæ sectione opus habent.

GALENI PERGAMENI DE
curandi ratione per missionem sanguinis,
Liber unus.



Qui de sanguinis missione speculantur, primò quidem investigare debent, quanam corporis affectiones evacuatione indigeant. Secundò, quæ illa, quæ per sanguinis fit detractio. Tertio, qui innoxie hanc ferre possint evacuatione. Quarto, quonam potissimum tempore ipsa molienda sint. Quintò, quæ ex venis secare oporteat: quum nimirum haud parum intersit, hancne, an illam incidas. Porro hac quoq; cõtemplatione absoluta, succedit de scopis oratio. Quibus mentē adhibens quis, vacationis modū facile per cõjecturam invenerit: necnò in quibus semel auferre præstet, & in quibus repetitam ablationē moliri: tum in quibus nam inanire usq; ad animi expediat deliquiū: & in quibus id, ceu summū malū, vitare. Cum aut per omnē vitam, omnia, quæ in quæstionē veniūt, duo inventionis organa obtineāt, nempe rationem & experientiā: necesse esse arbitror & nunc quoq; me, aut ratione sola, aut sola experientia, aut junctis ambabus, quæ proposita sunt, scrutari. Si quis ergo affectiones quæ vacatione indigent, velit experientia collectas exponere, sola opus est ad explicationē memoria. At si via rationali id efficere instituat, necesse est, ut prius cõmune ac generale inveniatur, ex illiusq; deinde in species differentiasq; sectione, usque ad species ultimas, affectuū numerū, vacationē desiderantiū, inveniat. Etenim ratio ipsa, hæc quidē, ex cõmunib. tantum progrediens notionibus, invenit & demonstrat: hæc aut, etiā quæ ex istis invēta sunt, ad demonstrationē adhibet. Ac priori sanè ratione, omnes artes, omnesq; homines uti affolēt. Secunda verò, nō omnes homines: nam propriè ad artifices pertinet. Eā igit nos impræsentiarū sequuti,

utemur multis, quæ in aliis cõmentariis sunt demonstrata. Nempe cõplures esse facultates quæ animalia gubernāt: quarū alias naturales, alias animales vocari. Generationes aut principiis materia quatuor elementa subjici, eaq; tota per sese mutuò misceri: esseq; invicē in se agere nata idq; per qualitates suas effectrices, caliditatē, frigiditatē, humiditatē, & siccitatē: ex quibus utiq; omniū temperamenta cõstantur. Præterea dari duplicē plenitudinē, nempe secundū vasa, & secundum vires: primariaq; actiones, à similibus corporibus perfici: ut secundarias ab instrumentariis. Quum igitur plenitudo bifariā & fiat, & dicatur: uno quidem significato, ut ad vires: altero, juxta laxitatē continentū vasorū: utriq; sanè opus est vacatione, sive ea in homine valetudinario, sive etiam in valente cõtigerit. Voco enim plenitudinē juxta vasa, magnā humorū colluviē, ipsa vasa tendentiū. Juxta vires autem, eam quæ vel si minimè vasa distendat, vires tamen gravat, & premit, hominemque reddit ad motiones pigrum & tardū. Quò si simul adsit ulcerosus etiā aliquis sensus, ac potissimū dum movemur: signum est affectū ipsum vitiosi succi esse sobolem. Quandoq; autem & in partibus quibusdam corporis, nō in tota mole, plenitudines adsunt similes iis, quæ universum corpus solent opprimere. In omnib. igitur id genus affectibus, maximè ex usu sunt vacationes humorum, aut vaporū, aut spiritūū peccantiū: minimè tamē semper sectio venæ desideratur, sed sufficit interdum purgatio, frictio, balneum, inunctioq; ex aliquo digerente medicamento. Quæ autem affectiones venæ sectione indigeant, deinceps dicemus. Non solum nutrimentū animæ partibus præstat sanguis, sed calorē etiam naturalem conservat. Itaq; ipsius cordis calor interdum quidem seipso minor efficitur, aut propter sanguinis copiam, à qua nimirum extinguitur, aut propter ingentem inopiam, aut propter frigidam qualitatem: interim verò major, aut propter calidā sanguinis qualitatem, aut propter exiguam inopiā. Quicquid aut cor in caliditate frigiditateq; perpetitur, eius quoq; & aliæ corporis partes protinus participes fiunt. At quæ membratim accidunt caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quidem affectæ vicinæ sunt, unā alterant, in totum tamē extendi corpus, priusquam cor immutent, non possunt. Cæterum quandoquidē omnia simul calida & humida * citissime computrescunt, sanè si quod nutrimentū suggeritur à ventriculo ad hepar, à natura non superetur, inq; probum sanguinem non convertatur, aliā aliam perpetietur putredinem. Quum autem quæ ex materia putrescunt, calida, quam an ea calidiora reddātur, calidior an profecto erit, ipse sanguis putrescēs, ac inde etiam particula, in qua ei putrefieri contigerit. Quia verò ab insigniter calidis, simul quæ vicina sunt incalescūt, utique calor ille acris & mordax (qualis à putredine oritur) illis quæ ulterius sunt, cõmunicatur. Ergo si pars quæ hoc pacto incaluit, insignis sit, aut calorem suum in cor extendere valeat, unā & ipsum accendet, ut quod natura calidissimū sit. Quò si semel illud accensum fue-

Facultates
animal dispo
santes sunt
plures.

Elementa
quatuor sub
jici princi
piis genera
tionis, eaq; to
ta per tota
misceri.

Plenitudo est
duplex: nem
pe iuxta vi
res, & iuxta
vasa: quarū
utraq; eget à
vacuatione.

Plenitudo
iuxta vasa
quid.
Plenitudo
iuxta vires,
quid.

Sanguis non
solum alit
animal, sed
calorem eius
naturalem
conservat.
Cordis calor
unde minor
atq; major
reddatur.
Cordis intē
peries proti
nus ceteris
partib. com
municantur.

Putrescunt
citissime ca
lida & hu
mida.

Putrescentia
reddi calidio
ra quam an
tea.

Febris quid. rit, facile totū ipsius jam corpus simul exalfiet: qui affectus vocatur febris. Nonnunquā verò, prius quā computrescat sanguis, ingens ipsius vis decūbit in partem aliquā: quam aut extinguit omnino, ita ut actio ipsius pereat: aut illi certe noxam non contemnendā infligit. Hoc siquidē

Apoplexia sunt multo sanguine incumbente in animantis principium. Phlegmones generatio. Scirrhus. Oedema. Erysipelas.

Plenitudo iuxta vires facile in putredinē abit.

Sanguinem detracturo qua sint prius expendenda.

Plenitudinis utriusque, quā sitas qualitasque, quibus signis sit discernenda.

Color humorum indicat.

Facultatū nos dispensantium robur imbecillitasque, ex propriis indicantur functionibus.

Sanguinis detractione quando sit plenitudo vacuanda.

Quod si in aliam particulam ruat, tumorē inibi præter naturā excitat. Cujus generis phlegmone existit. Verum si crassior sit, atræque bilis magis naturam referat isque decubuit sanguis, scirrhusior tumor efficitur: sicuti si pituitosior sit fluxio, laxis: & si biliosus, tumor erysipelas dictus. Quum itaque plenitudo (quemadmodū exposuimus) sit duplex: & ex ipsis, ea quidē quæ ad vires refertur, facile in putredinē abeat, interdumque in partes quasdam ingruēs, inibi tumores præter naturam excitet: altera autē, quæ juxta vasa dicitur, sæpe etiā in partes quasdam decumbat, tumoresque & apoplexias, venarumque ruptiones molitur: utranque celeriter evacuare tentandū, prius quā aliqua pernitiē conciliet. Si igitur qui plenitudine gravatur, aut tenditur, nec puer sit, nec senex, an illi venam secare oporteat, expendes, præ oculis habens hosce principales scopos: plenitudinis nempe tum quantitatem, tum qualitatem: virium robur atque earundē infirmitatem: naturalem totius corporis habitum, tempus, regionem, antea actam vitam: tum, an cibi potusque copia, & præcipue affatim nutrientium, qui sic affectus est, fuerit usus: ad hæc, consuetudinem, & res præter consuetudinem actas: quo usque motus exercuerit, quas excretiones habuerit, aut præter solitum compescuerit. Præter omnia autē hæc, num gravior, aut crassior evaserit. Porro utriusque plenitudinis quantitas, ex propriorum signorum magnitudine definietur. Quāto enim gravior sibi homo videbitur, tantum & plenitudinem quo ad vires crevisse constat. Ad eundem modū, quantum auctus fuerit tensionis sensus, tantum & auctam alteram plenitudinē, quæ secundū vasa vocatur, utriusque plenitudinis qualitatem, partim ex coloribus judicabis, memor colorem humorū esse, si quidem ab externo calore vel frigore totum corpus haud immodicē affectū fuerit: partim ex iis, quæ humorū naturæ cōiuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur, ut frigidiores, frigidior: tum eos qui in venis quidem acervantur humores, vasorum tumor atque diffusio: qui verò in carne, sensus in ea vel gravitatis, vel tensionis, vel etiā caliditatis. Porro dispensantium nos facultatū infirmitas atque robur, propriis indicantur functionibus: voluntariis quidē, illiusque in nervis cerebroque consistit: pulsificis autē, ejus quæ in corde ac per arterias movetur. Nam secundū bonam nutritionē aut abolitam, & colorem probum, aut pravū, tertia facultas, quæ nutritrix est, & à jecore proficiscitur, cognoscenda venit. Ubi ergo extantibus plenitudinis signis, valentes facultates extiterūt, incidēs venam: videlicet si tensiva quidē sit ipsa affectio, nihil distinguēs: magisque etiā in phlegmonode: sin verò degravans sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molienda detractio est. Nam fie-

ri potest, ut crudus per corpus collectus sit humor, à quo talis affectio gignatur. Quem succum sanguinis missione vacuare non expedit, sed frictionibus, unctionibusque mediocriter exalficientibus: necnon potionibus cibisque, & humoris crassitudinē incidentibus, & calfacientibus modicē. Siquidem quæ valenter exalfaciunt, nimis subito vires deiciunt: sæpe etiam vires adaugent.

At verò qui sanguine rejecto ex pectore, in præsens quidem curati, ceterum eam sortiti sunt thoracis pulmonisque structurā, ut vel pauculo plus collecto sanguine, protinus aut vasis alicujus osculum referetur, aut ipsum rumpatur: iis, vel si nullum in corpore etiamdum adfuerit symptoma, ineunte tamen vere sanguinē mittere oportet. Similiter in iis, qui promptē morbum comitalem, aut apoplexiam, aut peripneumoniam, aut pleuritidem, aut anginam incurrūt, ejusmodi affectus anteverte di sunt sanguinis detractione. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissimum si natura sint atrabilia, quæque quotannis æstate plethoricis morbis corripit assolent, & hos quoque veris initio vacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiam vere illiusmodi malis vexantur. Ceterum intemperantes & vinolentos, ventrique & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere juvenis: nam per vitæ intemperantiā rursus crudorum humorum copiam quamocyssimē colligūt. Quare iis ne manum quidem admoveas. Eis verò qui præceptis salutaribus obsequuntur, summo perere profueris, si principio veris primum quidē evacuaveris: dein autem ad exercitia, salubremque victus rationem perduxeris. Sed nec tantum ubi adest plenitudo, sive ea secundum vires sit, sive secundum vasa, mirificē prodest venæ sectio: verum etiam citra plenitudinem initio phlegmones, quæ aut propter ictum, aut propter dolorem, aut partium debilitatem provenit: quippe dolor sanguinē ad se trahit, & sæpe partium debilitas phlegmonē, absque corporis plenitudine, contrahit: quum videlicet partes fortiores, per venas, ceu per carnales quosdam, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant, donec tandem ad partem imbecillissimam omnium defluerint, & quæ ex se amplius propellere, quod in ipsa redundat, nequeat: id quod accidit illis partibus, quæ vim excretricē vicinis omnibus imbecilliores possident. Quamobrem omnium primæ infirmiores partes corripuntur excrementitiis morbis: quemadmodum glandule, quæ sunt fluxionibus excipiendis idoneæ, tum ob substantiæ laxitatem, tum quia inter omnes partes minimè robustas naturales facultates (excepta alteratrice) sortiuntur, sicuti & pinguitudo. Post glandulas sequitur pulmo, fluxioni recipiendæ promptissimus. Nam & hic tres facultates infirmas possidet, corpusque laxum. Deinde est lien. At cerebrum, aut perinde ut illi, aut etiam plus, excipiendo fluxui est habile: cōstructionem tamen habet ejiciendis iis quæ recepit, appositissimam. Quibus ergo carnosio genere pulmo, lien, ac cerebrum, natura sunt robustiora, in iis ad glandulas carnesque perveniūt fluxiones, ubi totum nimirum habitus infirmus fuerit, veluti in rhevmaticis affectibus

Crudus humor quāto vacuandus.

Sanguinis detractione quibus sit prospiciendum ineunte.

Intemperantibus curandum non sit.

Phlegmones incipientes, etiam si plenitudo non adsit, confessione sanguinis missio.

Dolor sanguinem trahit. Imbecilliores particule a fortioribus humoribus capiunt.

Imbecilliores partes curantur primis corripantur excrementitiis morbis.

Glandula curat proprie excipiant fluxiones. Pulmo. Lien. Cerebrum.

etibus accidit. Merito igitur in his curandis scopus est, non evacuatio, sed totius corporis roboratio: quamvis tamē curationis initiū illis oriatur à misso sanguine, & si excrementa pravā qualitatē habuerint, unā etiam adhibeatur purgatio. Rectē autē admonemur in libro de victus ratione in acutis morbis, ut si magnus sit ipse morbus, & æger floreat ætate, adsitq; robur, sanguinē detrahāmus. Cæterum principes scopi mittēdi sanguinis, sunt duo: nempe magnitudo morbi præsentis, imminētisve, & cum ea viriū robur: quibus si adjicias etiam florentē ætatē, nihil sermōni defuerit: modō sub ætate florente, præcedens sequensq; illam intelligant, excipianturq; distinctione, tantū senilis atq; puerorum ætas. Quamvis ætas senilis in virium verbo cōprehendi potest, quum eorum nulli adsit robur. Si itaq; magnum fore morbum timemus, aut jam præsens est, aut incipit, venā secabimus, virium habitatione, tantumq; ex oratione exēptis pueris. Nec verō ubi tanta humorū crudorū copia accumulata est, ut secandam venā * prohibeat, sermo hic redarguitur, quū ipsis viriū robur non adsit. Estq; hoc indicium eos haud posse sanguinis missionē perferre, * quod præter colorem totius corporis, degenerantem in ipsis ab eo, qui sole sanguinis copiam ostendere, etiam ipsorum pulsus inæqualis in vehemētia & magnitudine existit: præpollentibus secundū ipsam inæqualitatē, imbecillis simul & parvis. Itaq; ex morbo, ætate & viribus, minuendus esse sanguis cognoscitur. At vacationis quantitas, cum ex istis, tum etiam ex plethorica vocata syndrome, aeris nos ambientis tēperie (quæ in tempus & regionē dividitur) antea acta victus ratione, excretionibusque factis, aut impeditis, cōmodē deprehenditur. Igitur ad hæc omnia respiciens, tum podagricis, tum arthriticis, tū morbo comitiali obnoxiiis: præterea melancholicis, quiq; sanguinem antea expuerunt, aut thoracis structurā sortiti sunt ad id malum idoneā: vertiginosis etiā, quiq; assidue corripiti solent angina, peripnevmonia, pleuritide, hepatitide, ophthalmia vehementi, ac breviter morbo aliquo insigni, sanguinē detrahēre consuevi. Porro in redundātia melancholici humoris, sanguinē mittere oportet, aut certē medicamento uti expurgante, atrā bilem. At ubi crudi succi exuperat, anteq̃ morbus invaserit, cautē evacuas: ubi verō jam corripuerit febris, nequaquā. Indiciū aut crudorū humorū est color plumbeus, aut albus pallefcens, omniaq; potius quā rubeus: tum inæqualis pulsus. Verum si ob hæmorrhoides suppressas cumulatū alicui sit sanguis in corpore, audacter venā incidēs, etiam si antea expertus gravem morbū nō fuerit. Sed nec evacuatio iis proroganda est, quibus restitit menstrua purgatio. Nō tamen necesse est, illis semper secare venam, quū malleolorū scarificationes quandoque superfluitati vacuandæ sint satis. Plenitudines tamē à suppressis mensib. ortas, omnino p̃ crura evacuas, sive venā secare oporteat, sive etiā scarificare. Secta quippe in cubito venæ, muliebrem purgationē revellunt. Jam verō quæ ex mulierib. albidiores sunt, acervare tenuem sanguinē solent: quocirca scarificatio-

nibus malleolorū adhibitis, maximē solent vari. At quæ nigriores sunt, eas venā secta curabis, quum tales crassiorē sanguinē, ac magis melancholicū gignāt, præcipue verō si magnas habere venas appareant: id quod accidit illis, quæ graciliores simul atq; nigriores fuerint. Etenim carnosæ & candidæ parvæ insunt venæ, ac proinde ipsis malleolos scarificare, q̃ secare venam, præstiterit. Porro validā sanguinis eruptionem, venæ sectio solet sæpe cōpescere, tanq̃ revulsorium auxiliū. Secare autē in cubito venā, si ex dextera nare prorūpat sanguis, in brachio dextro expedit: sic in altera, in sinistro: minimē tamē usq; ad lapsum viriū detrahendus est sanguis. Simul aut, quū agis, artubus vincula injicito, aut ex laena, aut canabe, hypochondrioq; directē supposito, cucurbitulā admoveo: quandoquidem his remediis semper erumpentem ē naribus sanguinem cōpescimus: quum antea q̃ inserunt in nares, atq; fronti illinuntur, infirma omnia cōperimus. Nihil aut æquē artem medicā in agendo cōjecturalem efficit, ut cuiusq; remedij quantitas. Siquidem interdum exploratum habemus, quid nam ægro, quale, & quādo sit exhibendū: at quantum exhibere oporteat, non novimus. Hoc tamen summum bonum in sanguinis missionē habetur, quod potes sistere evacuationem, dum opportunum videtur: ac rursus si quando animus sit, sinere ut fluat, quousq; videbitur tibi rectē se habere negotium: id quod nō licet in purgantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in ventrem devoratum est medicamē, quominus omne sit devoratum, fieri non potest: neq; possibile est, ubi plus quā conveniat, purgetur, partem oblatis auferre. At verō dum alicui sanguinem mittimus, nisi quid urgeat, præstat priori missionē minus detrahēre, iterumq; illā repetere, imō, si lubet, tertio. Ubi igitur multa evacuatione est opus, sed vires sunt imbecillæ, in iis evacuationem partiri expedit, uti & me fecisse vidisti, in iis quibus crudorum inerat humorum copia. Nam detracto pauculo sanguine, protinus exhibeo melicratum, probē coctum, cum incidentium medicaminū quopiam veluti hyssopo, origano, nepita, pulegio: aut certē cū melicrato oxymeli, aut oxyglycy: ac si rursus sanguinem minuo, vel ipso eodem nonnunquam die, interdum die postero: in quo rursus exhibitō propositorum medicaminū quopiam, aliquid de sanguine aufero: ac rursus tertio die similiter bis. Cæterum ubi fervescētis inest sanguinis plenitudo, acutissimā febrem accendens, subito ac simul vacuare expedit, eamq; priusquā in principem aliquā partem ingruat, inanire tentandum, vel ad animi usq; deliquiū: viriū tamen inspecto robore. Quare nec per noctem sanguinem detrahēre verearis. Utile autem fuerit, fluētē etiamnum sanguine, expendere pulsuū diminutiones: ne videlicet, nobis non advertenti bus, pro animi deliquio mors hominem occupet. Quinetiam & revulsionē, nō leve & ipsam auxiliū, quodque sæpe secta adhibetur vena, quanto majorem in numerum particulares auferis detractiones, tantō efficaciorē effeceris. Ergo si magnitudo morbi, missionem sanguinis

Scarificatio quibus sit adhibenda mulieribus, & quibus sectio venæ.

Vena quibus lata, & quibus exigua, in sine mulieribus.

Sanguinis eruptionem Vena sectio compescit. Sanguinis eruptio per naves quare tione curanda.

Quantitas remedium præcipue reddit artē medicamē coniecturalem. Sanguinis detractione qua commo-ditas insit.

Purgantis pharmaca, ubi devorata semel in ventrem sunt, revocari non posse.

Evacuatio-nem quando partiri expediat.

Sanguinis missio, in quibus adest crudorum humorum copia quomodo celebranda.

Sanguis quādo mittendū sit ad animi usq; deliquiū.

Sanguis quādo fluit, pulsus esse explorandos.

Revulso per sectam venā, quānam sit efficacior.

*Sanguinis de
trahenda scopi
Vacuandi
qui sint libe-
ralius, et qui
parcius.*

*Pueris ante
quartumdecim-
um annu-
m sangui-
nem non esse
mittendum.*

*Vires robu-
stas quis pul-
sus indicet.
Septuagena-
riis quando
mittendus
sit sanguis.*

*Sanguinem
fluentem per
sectam & enā
supprimen-
dum esse, quā
alterantur
pulsus.*

*Sanguinem
detrahendū
per inflam-
mationes ef-
se, donec ru-
brior, flavior
se, aut livi-
dus conspici-
atur.*

*Sanguinis
mutatio post
sectam venā,
quando expe-
ctanda non
sit.*

*Gallis parū
sanguinis de
trahendum.*

*Sanguinem
esse parcius
detrahendū
sub Cane, &
in regionib.
calidis simul
& siccis, ut
in frigidis
etiam consti-
tutionibus.*

*Sanguinis
sex libras in-
to detractas
fuisse.*

postulet, adsitq; viriū robur, nulla potest esse tan-
ta crudorū humorū copia, q̄ inhiberi id auxili-
um possit. Cæterū quib. amplæ sunt venæ, quiq;
modicè graciles sunt, nec candidi, nec tenera car-
ne præditi, eos copiosius vacuabis: cōtrarios aut
parcius, quū exiguū habeāt sanguinis, carnemq;
facile transpirabile. Qua ratione nec pueris per-
tundes venā, ante quartum decimum annū: post
quē, si multus cōgestus sanguis appareat, tēpus-
que anni sit vernū, & regio tēperata, puerq; natu-
ra sanguinea, aut alicujus acuti morbi discrimen
impēdeat, sanguinē minues, in primis quidē ad
cotylā usq;: q̄ si postea vires validæ pmanere vi-
deātur, dimidium ejus adicies iterata missione.
At vehemēs, equalis, & magnus pulsus, incorru-
ptū viriū robustarū est signū. Quare si in septua-
genariis is adsit, affectusq; jubeat, etiā secabis ve-
nā. Proinde nō tantum annorū numero, sed cor-
poris etiam habitui animus intendendus est. Ad
hec, ubi incisa vena effluit sanguis, mutationē e-
jus, & maximē quū adest phlegmone, labascēsq;
fluxionis robur, expendere oportet: sed potissi-
mū alterationē pulsuū: quib. quidē alterascenti-
bus, aut in magnitudine, aut in quavis inæqua-
bilitate, cōtinuō quiescendū est. In quib. aut ju-
xta sectam venā phlegmone est ingēs, optimum
est sanguinis & in colore, & in consistentia expe-
ctare permutationē. Id q̄ sentiēs Hippocrates in
curatione pleuritidis, ait: Secāda verò in cubito
vena interna. Nec verearis multum detrachere,
donec rubrior, flaviorve multò effluat: aut p pu-
ro ac rubro lividus: utrūq; .n. accidit &c. Ejus si-
quidem trāsumptionis, qua nō nihil sanguinis à
parte phlegmone obsessa rapit in vulneratā ve-
nā, constituit signū, ipsius sanguinis mutationē.
Quē tamē nō omni ex parte expectāda est, quum
aliquando, priusq̄ ipse sanguis mutet, cessandū
nimirum duplici nomine: vel ob vires infirmas,
vel ob malignitatē phlegmones, à qua interdum
nihil emittitur, sed inibi fortiter impact⁹ est san-
guis. At si ex vacuatione vires minimē resolvi vi-
deantur (id quod ex pulsu cognosces) æger au-
tem sit ætate florēti, expectanda mutatio sangui-
nis est, potissimū si ambiens sit temperatus. Mi-
nus autē detrahimus, quā plenitudo commo-
net, secundum ætates quidem, in pueris: secun-
dum corporū habitus, in cādidiis, & carne mol-
libus, cujusmodi Galli existunt, secundū tempo-
ra verò, sub Cane: ac similiter secundū regiones,
cōstitutionesq; in iis quæ calidiores juxta & sic-
ciores existunt, quū nimirum hæc omnia, quā
maximē ad resolutionē sint apta. Alia autem ra-
tione in contrariis, hoc est, temporibus & regio-
nibus frigidis, largam fugimus vacuationē, pro-
pter insequentem refrigerationē. Quare unum
vacuationis modum in dictorum singulis defi-
nire nō licet. Memini enim quibusdam ad sex us-
que libras sanguinem fuisse detractum, ita ut fe-
bris protinus extingueretur, citra ullam virium
jacturā: quibusdam verò sesquilibram tantum,
nec id absq; insigni damno. Porro ex venis quæ
ad magnos oculorum angulos conspiciuntur,
aut sub lingua, quod certē mētionē sit dignum,
effluere nū solet: sicuti nec si quis summa in ma-
nu, aut pede venam secet: quemadmodum pu-

tant ii, qui lienē curari aiunt, à sectione venæ si-
tæ juxta secundum ex digitis parvis. Quod verò
ad differentiam venarum pertinet, quibuscunq;
nar⁹ igit, hoc est, è directo eruptio sanguinis acci-
dit, summum id commodum laborantibus ad-
fert. Quibus autē contrā evenit, nihil juvat, aut
etiam interdum nocet: quòd vires scilicet, circa
morbi levamen, dejiciat, ut si lienē turgēte, dex-
tra nare sanguis efflueret: aut hepate, ex sinistra.
10 Dextra igitur nare sanguis erumpēs, ad dextrum
hypochondrium fixa cucurbitula, clarē, celeri-
terq; sistitur: sicuti ad sinistrū, si ex sinistra pro-
fluat. Similiter si venā revulsionis studio seces,
secundum rectitudinem quidē secta, oppositis
sanguinis eruptionibus citissimē: conspicuam u-
tilitatem adferet. At si cōtrā seces, nihil sanē pro-
fuerit. Quare lienē affecto, perinde adjuverit ve-
na secta in sinistra manu, * juxta annularem digi-
tum, ac si internam cubiti venam secueris. Pluri-
20 mum nanq; juvat afflictum lienem, sanguinis ex
sinistra manu interdum usq; ad libram unam,
detractio. Præstat autem nō semel quantum cō-
veniat, detrahere: sed in duos dies ipsam evacua-
tionem partiri. Pleuriticis etiā, quæ è directo la-
borātis lateris adhibita fuit sanguinis missio, cla-
rissimam sæpe utilitatē attulit. Quæ verò ex bra-
chio opposito, aut omnino obscuram, aut certē
post temporis intervallū. Ad hæc, oculorum per-
sæpe dolores gravissimos è directo venæ hume-
30 ralis sectio, aut medianæ, quæ ab ea dirivata est,
intra horæ unius spatiū compescuit. Conari au-
tem in omnibus affectibus præstat, post modicā
missionem sanguinis, iteratò mittere, interim eo
die, interim postridie: nisi quando ad animi usq;
deliquium, vacuationē ducere oporteat. At do-
lente latere aut pulmone, aut septo transverso,
aut lienē, aut jecore, aut ventriculo, secta vena,
quæ per axillas ad cubiti juncturā pertingit, aut
etiam quæ illi & humerali est communis, luculē-
40 tam utilitatem adfert. Sunt etenim cæ tres venæ,
ex quibus in cubito mittitur sanguis, interior, ex-
terior, & media. Inter quas sanē interior utilis est,
in iis quib. inferiores collo partes patiuntur. Ex-
terior verò, in iis quibus, q̄ his superiores sunt:
ut facies, aut caput. At media, medio genere am-
bigit: quum inter utranq;, versus anteriore mā-
num, suos ramos producat. Quare si vena quæ
parti affectæ propria est, aliquando fuerit obscu-
rior, cogarisq; ob id aliquam mediarum incide-
50 re, conare ut quæ à propria diducitur, eam po-
tius pertūdas. Interdum etiam, eas quæ inferio-
res flexura cubiti sunt, nempe quæ in ulna consi-
stūt, nihil prohibet venas secare, sed tamē recto
tramite particulis affectis correspondentis: idq;
ubi venæ quæ in cubito sunt, non appareant. E-
quidem divitis cujusdam æconomum, oculo-
rum maxima inflammatione, atq; fluxione affli-
ctum, quam ocysimē in pristinam sanitatem re-
stitui, detractis primū ex humerali vena, libris
60 sanguinis ternis: ac dein, modico interposito tē-
pore, alia. Qua ratione, soluta phlegmone, po-
stea in palpebris relictā asperitatem absterfi: ali-
quo ex medicamētis mordacibus: quod neutiq;
æger ferre potuisset, nisi fuisset prius * evacuatus
Siquidē acria omnia medicamenta parti cuius
adnota,

*Salvatore
Sulgo ap-
lata si di-
tur, credi-
curare li-*

*Sanguin-
eruptione
directo f.
sunt uti-
borantib.
alioqui
inquant.
Sanguin-
fluxus p
naves, q
do suppr
mendi.*

*Lienem
atum in
secta Sec
sinistra
nu iuxta
nularer
gitum.*

*Vacuati
quando
duos dies
tiendas.
Pleuriti-
esse secan-
Genam
bito pau-
affecta
Oculorū
lores cer-
sci secta
merali
media.
Iteran-
esse sang-
nis detra-
nem.*

*Venarū
biti quæ
quibus
stibus
canda.*

*Vena in
cubito
ciuntur
rior, ex
(qua h
ralis es
media.
Venis
obscura
se nos
na ab eo
ductas
re.*

*Oculorū
maxima
flamma
quarati
curavit
lenus.*

admotā, nisi vacuū excrementis universum corpus repererint, fluxionē attrahūt, phlegmonēque producūt. Quemadmodum igitur supremæ omnes jam dictæ partes, secta in cubito vena iuvantur, sic iis inferiores, incisis quæ per poplites & malleolos decurrunt. Sunt autem inferiores dictis, coxendix, uterus, vesica. At renes, quarum collegio adscribi debeant, ambigūt. Quare misso ex cubito sanguini, interdū auscultāt: si videlicet & recēs ipsa phlegmonē sit, & copia sanguinis adsit. Ubi verò propria nephritis infestat, eam quæ in poplite est, secare cōvenit venam: aut certē quæ in malleolis sunt. Sunt uteri inflammationes, magis etiam quā renū, a venis in crure sectis iuvant. Nam quæ ex cubito sunt evacuationes, purgationes menstruas reprimunt, sanguinemq; retrahūt ad supernas corporis partes. At quæ fiunt ex cruribus, tantū abest ut retrahāt, ut etiā menses promoveāt, si trib. quatuorve diebus, ante tempus cōsueti mulieri circuitus, admittrentur: idq; aut vena incisa, aut scarificatis unius cruris talis, atque inde exiguo sanguinis evacuato: quod sanē postero die in altero crure similiter etiā faciendū est, sic tamē ut in ipsis dieb. in quibus vacuas, atque in aliis ante eos quatuor aut quinq;, mulieri extenuantē victū instituas. Sed mulierib. abundē menses provocāt nepita, pulegiumq;, si redacta in pollinem, coctaq; in melicrato, propinent. Convenientissimū autem potui tempus est a balneo, adhuc involutis linteis. Valentiora medicamenta sunt savina, & dictamnū: quorum usus est antedictis similis. Datur autē hoc tempore & hiera picra, * illa scilicet in cuius cōpositione centū aloēs drachmis, cuiusq; aliorū medicaminū senā tantū miscēt. Quod sanē medicamentū optimū est, ubi cinnamomū receperit. Porro ischiadas sive coxēdices, ubi nō a frigore, sed impletis sanguine quæ in coxa sunt venis, proveniūt, secta in poplite vena curabis. Scarificatio autē nihil perspicuē eis prodest. Igitur, ut summam dicā, incipientes phlegmonas revulso evacuare oportet: quæ verò inveteratæ jam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis particulis: aut, si id fieri nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus avertere quod influit, expedit: in inveteratis aut, ipsum tantū, quod affectæ parti infixū est evacuare. Atqui evacuabit optimē per venas diductas ab iis, quæ in partibus ipsis sunt sitæ. Quocirca quæ in gutture & aspera arteria, gravi torquētur inflammatione, iis in principio quidem aperta in cubito vena, post principium autem in ipsa lingua, magnificē prodest: incisis videlicet venis, quæ sub ea sunt ambabus. Sic indurata phlegmonarum in oculis reliquiæ, incisa quæ ad magnum decurrit angulum vena, exolvuntur: sicuti capitis gravitates, & inveteratos in eo dolores ex plenitudine, levare manifestē solet secta in fronte vena. At incipientes, aut etiā vigentes, per cucurbitā in cervice procurata retractio, interim quidem solam, interim cum scarificatione. Cæterum prævacuum esse corpus universum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores, aut etiam vigentes, incisa frontis vena solatur. Quippe revulsiones unā cum evacuatione adhiberi ma-

gis debent, in fluxionibus incipientibus: eas vero quæ fiunt ex ipsis affectis partibus, aut illis vicinis, in phlegmonis, quæ veluti scirrhī naturam referunt. In quibus autē corporibus, nulla dum particula affecta est, cæterum vacuatione. Vere ineunte antevertimus: in iis, siquidē talis sit homo, ut quotānis æstivo tempore corripiat morbis febrilibus, atque in eo exundantia evacuare studemus, æquē pars quævis, ut ex ea detrahatur sanguis, est cōmoda: quemadmodū etiam, si arthriticus omnibus articulis affligatur. Quibus autē eximiē pars quæpiā, ubi prius evacuati non fuerint, infestatur, haud perinde licet ex quavis parte evacuationem moliri, verum sicuti in iis, qui pati jam occipiunt. Quamobrē podagricos * evacuabis ex cubito: comitialibus verò morbis, vertiginibusq; obnoxios, potius ex cruribus. At si retentæ hæmorrhoides mittendi sanguinis occasionem præstiterint, si quidē cohibere eas volēs, quæ in brachio sunt: sin provocare, quæ in cruribus consistunt venas, secare cōvenit. In iis verò qui repressi sunt menses, semper in cruribus. Jam verò ad sanguinis detractionē, dierum numerus cōsiderandus non est. Siquidem quocunque die mittendi sanguinis scopos in laborante inveneris (nempe morbum ingentem, & viriū robur, excepta ætate puerili, & ambiente admodum calido) auxiliū illud non prætermittes, vel si is vigesimus a principio extiterit. Nam exolvitur in plerisq; morbis temporis tractu virtus, ac proinde mittendi sanguinis occasio, nūmero dierū deperditur. Poterit etiam quis sanguinem mittere vel quacunque die noctisq; hora, scopum sibi proponens, in febrientibus quidem, particularium (quæ expectanda est) circuitū declinationē: in quibus autem aut ob oculorum lippitudinem, aut aliud simile citra febrem, hoc est opus auxilio, magnitudinem aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus, in quo secta vena desideratur. Ubi verò nihil eiusmodi aut urget, aut prohibet, præstat manē venam incidere, haud protinus ex somno excitis, sed circiter horam unam jam antea vigilantibus. Atq; iteratæ vacuationis tempus, in quib. simpliciter quidē vacuare conamur, eodē die esto: in quib. autē revellere, si vel post duos deinceps dies fiat, melius fuerit. Interim tamen animus sit circa laborantis vires intentus, manu jugiter arteriis illius admota. Consueverūt etiā medici interdū secare arterias, quæ in temporibus, & quæ secus aures consistūt: illas quidem, infestatibus oculos fluxionibus tum calidis, tum spirituosiss: has verò quæ secundū aures, in vertiginosis maximē, et iis qui calidis & diuturnis, spirituosissq; capitis doloribus infestant. Etenim ubi calid⁹, spirituosissq; sanguis in arteriis coacervatus infestat, illic communib. parti affectæ sectis arteriis est opus. Verum quia vulneratæ arteriæ agrē suppressi possunt, ob id ipsas medici incidere metuūt, quā si quis dum venā secat, arteriā convulset, difficillimē compescere eruptionē sanguinis possit: aut si res optimē cedat, ad cicatricem perducta divisione, tamen aneurisma contingat. Quamquam possumus sanē arteriā vel magnam, absque aneurismate ad cicatricē perducere, totam

Arteriam
inter indicē
pollicemq;
quum secus
set Galenus
ab insomnia
monitus, libe-
ratus est à
diurno pra-
cordiorum
dolore.

Arteria in
malleo o dis-
secta, diutur-
num coxa do-
lorem solvit.

transversim secantes. Ego verò aliquādo moni-
tus per quædā insomnia, secui dextræ manus ar-
teriam, inter indicem & pollicē sitam: permisiq;
ut inde fluere sanguis, donec sisteret spontē: su-
bitoq; diurnus mihi extinctus est dolor, qui in
illa maximè parte erat fixus, qua jecur septo trās-
verso committitur. Minister etiam Dei Perga-
mi, à diutino cruciatu lateris, similiter liberatus
est, arteria in summa manu incisa, idque monitu
insomni. Porro alteri, cui ex vulnere in malleo-
lo inflicto, dissecta fuerat arteria, sanguinis qui-
dem cursus haud quievit, donec ipse dissecui to-
tam: ac medicamēto ex aloë, māna, ovorū albu-
mine, & leporis pilis imposito usus, absq; anev-
rismate ulcus ipsum curavi. Vir aut ille prorsus
sanus relictus est à coxæ dolore, quo jam diu fue-
rat exiguis temporum intervallis vexatus.

GALENI PERGAMENI DE
hirudinibus, revulsione, cucurbitula, & scar-
ificatione, Libellus.

DE HIRUDINIBUS.

Hirudines as-
serendi, ali-
di, & appli-
candi ratio.



Hirudines quæ sunt recens captæ, eas
diem unum asservare oportet, pau-
culo sanguine in pastum exhibito.
Sic .n. prorsus earū venenū expri-
mitur. Pars autē cui jam admoveri
debēt, nitro prius perfricetur, aut unguibus scal-
patur: nam sic promptius eā apprehendent. Inji-
ciendæ autē sunt in aquæ tepidæ vas purum, la-
tiq; oris: deinde spongia eas comprehendentes,
viscositatemq; ab eis detergētes, tandē manu ap-
plicabimus. Ubi autem adhæserint, infundendū
particulæ oleum tepidū est, ne scilicet refrigeretur.
At si manibus aut pedibus admovendæ sint,
ipsam partē, aquæ cui insunt sanguisugæ, immer-
gere oportet. Quod si parum depascantur, forsi-
ce caudam præcidito, secundū rectitudinem fi-
lamentorū. Nam effluente semper sanguine, tra-
here non desistent, donec salem, aut cinerē, ipsa-
rum ori insperferimus. Ubi verò deciderint, cu-
curbita venenū est avellendum, aut pars foven-
da ex spongia. Quod si particula emorsa lachry-
met, cum inū, aut farinā inspergito: superq; lana
madidata oleo paxillo, involvito. Sin sanguis
erūpat, lintea ex aceto injicito, aut gallam ustā,
aut spongiā liquida pice madentē, posteaq; u-
stā imponito. Sciendum autem est, hirudines
haud eum qui in profundo est sanguinē, sed tan-
tū quo caro est imbuta, exugere. Utimur eis p
cucurbitulis: detrahimusq; ipsas, ubi dimidiam
sanguinis partem jam exactam conjicimus. Pro-
hibemus autē, & nō permittimus effluere, quo-
usq; quod satis est evacuetur: quandoquidē par-
ticula tū à sanguisugis ipsis natura frigidis, tum
ab aere nos ambiente refrigeratur.

De revulsione.

Vehementissimos humorū influxus remediis
revulsoriis prohibemus. Qualia sunt, incumbē-
te in pectus aut in ventrē humore, ad manus re-
tractio. Vomitus, ubi deorsū decumbit. Sicuti in
vomitu, p aciores clysmos revulsio. Duo verò
hæc momenta, quæ ad superiorem inquam ven-
trem, & inferiorem vergunt, ad urinam, sudo-
resq; revelles. Quin & urina, ad sudores, & deje-

Revellendi
modi diversi.

ctionem trahitur. Revulsoriū quoq; auxiliū est,
* juxta mamas cucurbitula admota. Caterū
hypochondriis affixa, sanguinis ad nares impe-
tū revocat: sicuti & immodicū ex utero effluxū.
Porro vergēte, ad caput aut viscera humores re-
trahunt acia in sinus impo- sita medicamina. In
summa, revulsio moliēda, humorib. sursum
fluentibus, deorsum: deorsum verò, in contrariū.
Rursus, intrò vergentibus, foras: sicuti si foras
ruant, ad interiora. Similiter si ad dextram incli-
nent, ad sinistram: ad sinistram verò abeuntibus,
in partem adversam. Sic quæ retrò cōcedunt, an-
tē: quæ verò antē, retrò revocabis.

De cucurbitula.

Cucurbitulæ iis qui antē evacuati sunt, cōve-
niūt. Nam in plethoricis, minimè sanè ipsis uti-
mur. Eadem ratione neq; in cerebri aut menin-
gū phlegmonis incipiētibus utimur cucurbitu-
lis: sicuti nec alia in parte ulla phlegmone obfes-
sa: verū ubi nihil præterea etiā influat, fueritq; to-
tum corpus antea vacuatū, atq; opus nobis jam
sit, aut movere, aut amoliri, q in phlegmone ob-
fessa particula infixum est, aut deniq; foras extra-
here. Porro dum affectus etiamnum fiūt, haud
in ipsis jam laborare occipiētib. partibus, sed in
eisq; illis continuæ sunt, revulsione causa est cu-
curbita imponēda: in principio aut utēdū repel-
lentib. est. Cucurbitula potest evacuare materiā,
dolorē solvere, minuere phlegmonē, inflationē
discutere, revocare appetentiā, ventriculo infir-
mo robur recuperare, animi liberare deliquio,
ab alto fluxiones trāsferre resiccareq;, sanguinis
eruptiones cohibere, facultates mensium corru-
ptices extrahere, ac deniq; menses ipsos levare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone
scirrhoue tentatas, aut tensas, aut dolore vexa-
tas, aut fluxione affectas, sed q jam restitit: aut a-
cri imbutas materia, aut ubi extrinsecus aliqua
virulēta facultas in corpus incidit, aut ubi mate-
riā ex alia parte in aliā traducere est animus. Velu-
ti crura scarificamus affecto capite, aut materiā
in corpore exundantē minuere statuētes, potissi-
mū ubi exundātia pvenit à suppressa materia,
q solēnter evacuari cōsueverat. Sic suppressis hæ-
morrhoidib. scarificamus crura, prius ea per spō-
ngiā fovescentes calida. Nam sæpius venā incide-
re in anno, haud expedire arbitror, quū unā cum
sanguine vitalis exhauriat spiritus. Prodest autē
scarificatio & oculis diutina fluxione afflictis: tū
capitis affectibus, quiq; pectori atq; dorso eve-
niunt: ad hæc anginæ, atq; impactis humoribus.

GALENI DE PURGANTIVM
medicamentorum facultatibus libellus.



Adem de causa medici verustissimi
pravas opiniones reliquisse irrepre-
hēsas vident, qua gravissima etiam
delicta antiquissimi legulatores im-
punita siverūt. Quū .n. eo tempore
minor esset malitia hominū, ut qui nec maxima
crimina perpetrare aggrediebantur, nec manife-
stissimis impudenter cōtradecere, quomodo ali-
quis punitionē iis quæ nondum admissa erant,
prescriberet, vel redargueret ea quæ nemo pror-

fus

Cucurbitula
hypochondriis
affixa san-
guinis ad na-
res impetum
revocat, im-
modicumq;
ex utero efflu-
xum.
Revulsione
esse semper
in contrariū
moliendam.

Cucurbitu-
lis utendum
esse ubi cor-
pus est abun-
dē vacuatū.

Cucurbitu-
lis utimur
dum exeller-
est animus,
quod in par-
tes phlegmo-
ne obfessas q
impactum.
Inflammari
ne incipien-
te, repellent-
bus est uten-
dum.

Cucurbitu-
lae facultas.
Scarificare
quas & in
quem usum
partes solen-
mus.

Scarifican-
da crura,
prius esse fo-
venda per
spongiā ca-
lente aqua.
Venam sæ-
pius in anno
incidere non
expedit.

Scarificatio
quibus mor-
bis conve-
niat.

Delicta gra-
vissima cur
antiquissi-
mi legula-
tores impuni-
ta relique-
runt.

sus dixisset? At quia temporis spacio eò crevit ho-
 minū pravitas, ut nihil non aut facere, aut dice-
 re ausi sint, legū quidem latores multas punitio-
 num rationes novas adinveniūt, quibus facino-
 rosos plectant: veritatis aut studiosi, varias con-
 tra sophistas reprehensionū species excogitant,
 quib. ipsos coërceant: id quod nos impræsentia-
 rum quodāmodo facere cogimur, improbatu-
 eos, qui medicamentis purgantib. vim attractri-
 cem humorū quos evacuāt, inesse negant: muta-
 tricem verò quandā omniū ex æquo illorū, quæ
 10 ipsis appropinquāt, eis tribuūt. Qua nimirum fa-
 cultate ajunt medicamentū quod flavā efficit bi-
 lem, quencunq; humorē contigerit, hunc in pro-
 priam sui speciē mutare: vocariq; medicamen id
 cholagogū, quod bilem flavā & efficiat, & mo-
 veat: alijsq; similiter medicamentis sua esse indi-
 ta nomina, non quidē ab humorib. quos natura-
 liter vacuant, sed ab ijs, quos suo contactu effici-
 unt. Ex cuius sanē opinionis absurditate sequi-
 tur, si bilem ducēs, si pituitā, si atrā bilem,
 si seorsam humiditātē, aliquis medicamentū
 assumpserit, universos ex venis humores vacua-
 ri. Neq; alia ratione purgatio ab huiusmodi me-
 dicamento petita, differt a sanguinis evacuatio-
 ne per venę sectionē, quam quod in hac quidem,
 ille qualis prius erat, excernitur: in purgationib.
 aut, inalteratur, nō colore tantum, sed etiā confi-
 stentia: id quod, maximē ridiculū est. Si quidem
 per detractionem sanguinis æqualiter omnes,
 qui in venis sunt, humores vacuātur. Per purga-
 tionem verò (quæ scilicet sanguinē ipsum purifi-
 cat) non æquē omnes, sed unus aliquis, præci-
 pueq; is, ad quem naturaliter educendū medica-
 men ipsum est aptum. Atq; hæc sanē existit opti-
 ma Aīclepiadarū sentētia, cui etiā ratio simul &
 experiētia patrocinantur. Nam si ex tribus absq;
 febris laborantib. morbo arquato, uni quidē san-
 guinem detrahas, alteri autē medicamen quod
 atram educit bilem exhibeas, tertio deniq; propi-
 nes pharmacū eliciens diffusam illam bilem per
 corpus, certē duo illi priores longē deterius ha-
 bebunt: tertius aut, cui exhibitum medicamen
 fuerit familiaris succi attractivum, nativum co-
 lorem recuperabit. Atqui juxta illorum insaniā
 perinde erit si ve missione sanguinis, si ve medi-
 camento quod bilem ducat, arquato morbo la-
 borantē inantias. Idem etiam & in reliquis mor-
 bis est ineundū iudiciū. Igitur opinionib. ipso-
 rum valere iussis, singula medicamēta purgantia ini-
 tio familiarē humorem trahunt: postea verò il-
 lum qui ut sequatur, habilior atq; aptior fuerit.
 Exempli gratia: medicamen quod flavæ bili du-
 cendæ est, primo quidem illam expurgat: dein a-
 quosam humiditatem: pituitam tertio: mox atrā
 bilem: ultimò deniq; sanguinē, quod sit is natu-
 ræ familiarissimus. Reperiuntur tamē aliqua me-
 dicamina, quæ statim ab initio sanguinē ducant:
 cæterum iis nemo utetur, quādoquidem hoc ju-
 gulare esset hominē, non purgare. Siquidem pur-
 gantia, hoc nomine talia dicuntur, quod repur-
 gent sanguinem ab illis recrementis jam dictis.
 Quare inter deleteria, id genus omnia medica-
 menta annumerant, quæ sanguinis evacuatio-
 nem, per venas ventris, & intestinorū moliuntur.

GALENI PERGAMENI QUOS

purgare, qualibus medicamentis, & quan-
 do oporteat, lib. unus.



Qui sano sunt corpore, purgationes
 graviter ferunt. Nam quū purgans
 medicamentū familiarē sibi humo-
 rē attrahere desideret, sanē dum eo
 destituitur, sanguinē & carnes eli-
 quat consumitq; ut quod illis propriū est, trahat.
 Porro q; sani quidē sunt, verum ægrotaturi, nisi
 fuerint vacuati, inaniri vere ineūte debent: idq;
 vel sanguinis detractione, si plethoricis corri-
 piatur morbis: aut purgatione, si factis ex corru-
 ptione affligatur. At melancholia, cancer, elephā-
 tiasis, cæteri q; id genus affectus q; ab humore a-
 tro proficiunt, atræ bilis purgatione indigēt:
 quā nō vere tantū, sed autumnō etiā ipse moliri
 cōsuevi. Jam comitiales morbi, apoplectici, su-
 spiriosi q;, vacationē pituitæ postulāt. Articula-
 res affectus, qui quidē unā cum insigni calidita-
 te affligūt, biliosorū: qui aut cū tumorib. frigidita-
 tis, pituitosorū vacatione juvātur. Quidā æsti-
 vo tempore tertianis febrib. semper corripi soliti
 sunt, jam multis annis nō febricitavit, quod bilis
 flavæ purgatione ad finem veris a nobis admini-
 strata, illi prospectū sit. Sic. n. satius est tales va-
 cuare: quemadmodum comitiales, articulares,
 melancholicos, quiq; ob humores crassos ægro-
 tant, ineunte vere melius vacuētur. Cæterum hu-
 mores crassos & viscidos prius attenuare & inci-
 dere oportet: meatusq; p quos transmūtatur, atq;
 trahunt, ij aperire, ante medicamēta purgantia, si
 purgatio modis omnib. optima sit futura, præ-
 fertim in ijs q; veratrū assumūt. At verò q; ægrē p
 superiora purgantur, ij, nisi prius reddantur habi-
 les, præparenturq; ad vomitū, minimē assumāt
 veratrū. Præparabuntur aut medicamētis vomito-
 rijs mediocrib. necnon cibo uberiori: & quiete.
 Etenim nos radulas ex oxymelite propinavi-
 mus, quas arūidine pforatas, ac ramulis veratri
 albi transfixas, p totū diē atq; noctē reliquimus.
 Atque ejusmodi ex elleboro facta purgatio erit
 imbecilla. Verum q; angustū habēt pectus, eoq;
 etiā cōpressum, ineptissimi ad purgationes exi-
 stunt, quæ p vomitoria medicamēta fiunt, ac po-
 tissimū p albū veratrū: siquidē thoracis aliquod
 vas, ipsis rumpitur. At bilis suprà, pituita p infer-
 na vacuari debet. Est quādo cōtrario modo acci-
 dat, si quidem in ventriculo pituitosus, biliosus
 aut in intestinis humor resideat. Melancholicū
 verò semper p inferiora vacuare oportet. Sic æ-
 state quidē superiores ventres, hyeme verò infe-
 riores movere cōvenit, ut autor est nobis Hippo-
 crates. Sed regionis etiā, anni tēporis, ætatis, cō-
 suetudinisq;, nō exigua ratio est habenda. Siqui-
 dem q; (gratia exempli) vomere soliti sunt, faci-
 lius purgationes ferūt p superiora: q; nō assueve-
 runt, haud citra periculum: magisq; ex veratro.
 Morbi etiā species examināda est. Nā in hydro-
 pe, leucophlegmatia, medicamēto q; pituitā du-
 cat, egemus: prius sanē p inferiorē ventrē, dein
 per vomitū, tertio per apophlegmatismos. U-
 bi. n. id quod redundat, per universum corpus
 dispersum est, omnes vacationes sumemus:

Sani cur pur-
 gationes gra-
 viter ferant.

Vacuandi
 qui sint verē
 ineunte, &
 quomodo.

Atrabilis
 purgatione
 qui affectus
 indigeant.

Vacationē
 pituitæ qui
 morbi postu-
 lent.

Crassos suc-
 cos prius te-
 nuandos esse
 quam evacu-
 entur.

Vomitus quā-
 liter præpa-
 rari ægri de-
 beant.

Vomendo inē-
 pti qui sint.

Flava bilis
 per superio-
 ra, pituita
 per inferiora
 maiori ex
 parte vacua-
 ri debet: ut
 atra bilis
 semper per
 inferiora.

Hydropicos
 evacuandū
 ratio.

*Ictericos pur-
gandi ratio.*

Porro in ascite, medicamentū aliquod aquæ ciē-
dā idoneū, exhibebimus: sicut etiā in arquatīs,
q̄ bilē eliciat. Nam & in his etiā bilem multifariā
suprà & infrā, per urinas, palatū, & nares, purga-
re convenit. Morbi itaq; dispositio & vacuandū
humorē indicat, & locū per quem debet vacuari.

*Hepatis par-
tes affecta
qua sint re-
gione vacu-
anda.*

*Tenuēs hu-
mores statim
esse vacuan-
dos: crassorū
esse expectā-
dam coctio-
nem.*

*Vacuandum
in accessio-
nibus quidem
per superio-
ra, in remis-
sionibus aut
per inferiora.*

*Dierum ac-
cessoriorum
decretorio-
rumq; temp-
us cavendū esse
dum per in-
ferna purga-
mus.*

*Purgantia o-
mnia facul-
tate esse cali-
da.*

*Purgationi-
bus inepti
qui sint.*

*Humores esse
tenuēs red-
dendos ad
purgationem
Acuti morbi
raro per ini-
tia indigent
purgatione.*

*Turgere quā-
do humores
dicantur.*

*Humores
quando va-
cuandi.*

*Crises quan-
do accidunt.*

*Naturā ad-
iuvandam
esse medica-
mentis.*

Verbi gratia, iis qui in jecore habent inflamma-
tionē, ubi tumor cōcoctus fuerit, eius expurga-
tionē molimur, per inferiorē sanē ventrē, ubi ca-
vas ipsius partes affectus occupat: per urinas au-
tem, quū gibbas. Accedit his omnib. temp⁹ & oc-
casio. Per initia nanq; serosos tenuesq; humores
vacuabis: in crassis aut & viscidis, expectabis co-
ctionē. Ad hęc in accessionibus quidē, per supe-
riora vacuabis: in remissionibus aut, per inferiora.
Atq; hęc sanē, si spōte accidāt, juvant: in acces-
sionibus quidē, dum multi & vomunt, & per na-
res sanguinē fundunt: in remissionibus autem,
dum urinæ dejectionesq; excernuntur. At tem-
pus dierum accessoriorum & decretoriorū, quū
infrā copiosē purgare aggredieris, cavere oportet.
Ubi enim humorū impetus sursum vergit,
medicamentū purgātis facultas impiedietur. Por-
ro in morbis diuturnis, semper eorū maturatio
expectanda est: in acutis autem, quum turgent,
ac pruriunt, vel per initia uti medicamētis licet.
Verum quū omnia purgantia medicamenta fa-
cultate calida existant: febris autem sui ratione
humectātia & refrigerantia postulet: certē non
ipsius caloris gratia purgatio à nobis admini-
stratur, sed humorum causa, qui nimirum illum
accendunt. Igitur ut ij evacuentur, primū sanē
dispiciendum venit, unum æger sit ad ejusmodi
purgationem idoneus. Nam qui ex cruditatib.
multis, aut viscosis crassive cibis laborāt, item
quibus præcordia intenta sunt inflataq; , aut su-
pra modū calida & ignea, aut aliqua inflamma-
tione laborent, omnes hi ad purgationes inepti
sunt. Proinde hęc abesse, & humores quāmaxi-
mē licet fluidos facere oportet, hoc est, tenues, et
nullius lentoris participes, meatusq; p quos pur-
gatio futura est, ad apertos. In acutis autem mor-
bis raro per initia purgantibus medicamētis e-
gebimus, eō quod nec frequēter noxij humores
per initia turgeāt, pruriāntve: nec, si hoc detur, æ-
ger sit ad purgationē idoneus, ac ne tempus qui-
dem nobis præbeat præparadi idoneum. At hu-
mores prurire, seu turgere dicūtur, quum motu
vehementiori agitati, & à particulis in particulas
transfluentes, per morbi initia molestant, homi-
nem dolore afficiētes, irritantes, & quiescere nō
permittētes. Tales igitur evacuare convenit. Par-
ticulæ autē alicui infixos; nec alio quodam præ-
sidio movere oportet, nec medicamentis solici-
tare, priusquā fuerint concocti. Tunc siquidē
& naturam vacuationi opitulante habebimus:
quippe quæ post coctiones & discernere humo-
res, & superfluum deponere apparet: quo tēpo-
re etiam crises accidunt. Quod si natura ipsa ab-
solutē moveatur, nihil tūc est opus medicamen-
tis. Ubi verō imbecillius actionem obit, id quod
deest, oportet nos per medicamēta adjicere. Sciē-
dum autem est, transfluxiones humorū ab una
in alterā partem raro accidere: sed majori ex par-
te ipsos in unico loco hære, in ibiq; per totum

morbi tempus ad solutionem usq; concoqui. Si
nō acutus modō sit ipse affectus, sed etiam cum
febre vehementissima accadat, medicamen pur-
gans exhibendum non est, præsertim si quis non
habuerit naturam ægri exploratam. At si febris
vehemens non fuerit, norisq; ægrotantis natu-
ram minimē abhorre à catharticiis, elleboro
nigro uteris, aut hiera diacolocynthidos, q̄ elle-
borū recipit, absq; scāmōnio. Assumpto pharmā-
co, cōducit mox super sorbere cremorē ptisanæ:
ut qui id quod in trāsitu affixū applicitumq; est,
abstergere, & deorsum trahere: qualitatem verō
medicamenti, particulis insidentem, cōtempera-
re & inalterare possit. At ubi purgatio fieri inci-
pit, ptisanam amplius nō dabimus, ne actio me-
dicamenti, exolvatur. Porro alvus nōnunquam
medicamento purganti nō cedit: vel ob ægri na-
turæ proprietatem, vel ob medicamēti exhibiti
paucitatem, vel ob stercus durum, atq; in aliquo
intestinatorum impactum, quod clystere evacuari
potuisset, ante pharmaci exhibitionem. Fieri e-
tiam potest, ut natura impetum ad urinas facien-
te, pharmacum nihil proficiat. Ex ipsis, autē ca-
tharticiis quæ sua actione frustrantur, hęc qui-
dem interdum non modō nihil offendunt cor-
pus, sed alimentū illi etiam fiūt: hęc verō in cor-
ruptelam atq; exitium vertuntur. Quum autem
omnia purgantia medicamenta ventriculum vi-
tient, præcipueq; os ipsius, quod maxime sit ner-
vosum & sensile, odoratorum mistura commo-
dē excogitata est, ne videlicet sola, ac syncera, i-
psorū facultas, os ventriculi attingat. Convenit
itaq; ea quæ miscētur semina, ejusmodi esse, quæ
& malignitatem possint obtūdere, & actionem
ipsorum non impedire, extenuatoria & incidē-
ti facultate prædita, qua crassos humores disse-
cent, & vias ipsorum aperiant. At purgantia quæ
miscentur, sibi invicem congenere esse, & nulla
ex parte dissidere oportet. Dissident autem, non
quū aliud bilem, aliud pituitam evacuat (ambo
enim eodem modo vacuari possunt) verum ubi
hoc statim, illud multo post quā assumptū est,
purgationē movere solet. Ita enim inæqualis fit
evacuatio ex illis simul assumptis. Dico inæqua-
lem, quum una cessante, altera vacuatio incipit.

GALENI PERGAME NI

*consilium puero comitiali morbo
laboranti.*



Amet si nec filiū tuū viderim, nec
ab initio quæ fuerit ei⁹ natura ante
morbū cognoverim, nec etiam nū,
ut in ipso morbo se habeat, mihi
cōpertū sit, Ceciliane charissime,
sed id tantum ex te intelligā, comitialib. eum ac-
cessionibus infestari: ut tamen obsecundem tuis
votis, curabo quā dilucidē fieri poterit, eam ti-
bi victus rationem præscribere, qua si (ut par est)
utatur puer, tum non parum juvabitur, tum ab
eis etiam quæ sibi inopinatē accidunt, minus læ-
detur. Etenim nōnunquam necesse est homines
in frigus atq; æstum incidere: ad hęc in validio-
res ventos, vitiosa balnea, alimenta stupefacien-
tia, revolutiones vertiginosas, convulsiones,
tonitrua, vigilias, cruditates, tristitiam, iram,
lassi-

*Cathartici
medicamen-
ta.*

*Pharmā-
co sumpto
ptisana
morem
bendum*

*Pharmā-
co curat
dum non
dat.*

*Odorata
modē im-
sceri phar-
maci.*

*Purgantia
quæ mult
miscentur
congener
se oportet*

lassitudinem, atq; id genus alia, quæ vehementer commovent atq; perturbant corpus, & morbi tum memoriam innovant, tum eius accessionem accerunt. Quare omnia id genus multo ante sunt præcavenda. Quod si quando ubi illa præcesserint, subsequatur dein morbi accessio, tum temporis puer penitus ab omni motu se absteineat, domique sese contineat, ac victu valde tenui utatur, quousque corpus exacerbationis molestia prorsus destituatur. Igitur inter veris initia (tunc enim prope contingit eos morbos moveri, qui per intervalla redeunt) puerum purgandum censeo, idque purgatione mediocri. Post purgationem autem, hac victus ratione utetur. Mane quidem, ubi è lecto surrexerit, priusquam ad præceptores accedat, modice inambulet, non admodum tamen citato gressu. Dein verò usque ad palæstræ tempus, disciplinis ex eius more incumbat. Cum primum aut illinc discesserit, ubi rursus inambulaverit modicum, sic ad prudentem paedotribam comitetur. Quippe totius curationis summa in hisce duobus est sita: nempe usu medicamenti olim tibi à me dati, et idoneis exercitationibus. Reliqua verò, tanquam præparationes quædam ad ista existunt. Cæterum exercitationum scopi, quo ad earum modum, sunt hi: nempe ut prius quam fatigetur puer, quiescat: utque corpus illius calfiat, necnon moderatè evacuetur. Quod si ultra hos terminos producat exercitatio, non nihil jam attingit solida corpora, atque habitudinem ipsam colliquat: in articulis aut potissimum, atque in musculis, colliquationes congregantur: unde viri infirmitas sequitur: deinde ulcerosus sensus, quando æger conatur aliquam movere particulam. Atque hoc est, quod lassitudo appellatur. Scopi autem exercitiorum, quo ad qualitatem, in eo præcipue consistunt, ut inde omnes corporis partes, & caput præsertim, & ventriculus, roborentur: potissimumque illæ partes, quæ ad os ipsius pertinent. Quum igitur vehementes exercitationes caput repleant, ab his illum abstinere præcipio. Quibus si quando sit opus, erecto capite constitutus partes inferiores commoveat, & potissimum crura. Verum à parvis tardisque motibus paedotribam orsus, ad vehementiores & celeriores ipsum puerum conducat. Sed & frictio exercitatio quædam existit, imbecillioribus præsertim corporibus. Imò nonnunquam si sola ea deceter fuerit administrata, nullis aliis præterea motibus indigent. Proinde primum linteis corpus rubefacere oportet, à supernis ad inferiora sensim manus detrahentes, à brachiis manibusque sumpto initio: ita deinde ad pectus & venter est procedendum. Postea verò & crura exactius fricanda sunt, ut aliquid huc à superioribus defluat. Ultimò denique ipsum caput est perfricandum, si absque aliqua pinguitudine administraretur frictio. Nam ad ipsum statim accedere, admodum periculosum existit. Si verò oleum in frictione admoveris, nihil prohibet caput simul cum aliis membris fricari, ita ut hic quidem caput fricet, alii verum duo pectus & venter, duo item alii crura: atque eodem pariter modo post exercitationes: imò & tunc magis simul membra omnia fricare conveniet. Namque citius hoc pacto conquiescit corpus, & minus refrigeratur: cuius est non levis habenda cura. A lavacris autem ut

plurimum abstinere convenit. Nec palæstram cōfestim puer ab exercitatione egrediatur: sed ubi spiritus exactè conquieverit, & quæ exercitationem sequitur perturbatio prorsus sedata fuerit. Tunc verò caput linteo diutius est confricandum, sapientiusque pectine utendum. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid olerum ventrem mollientium, aut balsamentorum, aut ptisanæ, aut olivarum, unam cum tertia panis parte ipsi offeratur: in cœnâ tertias duas partes reliquas cum valentioribus opsoniis reponentibus nobis. Ex oleribus itaque nec lactuca, nec malva, nec atriplex, nec blito, ut prorsus absteineat, jubeo. Verum non semper idem, sed modò hoc, modò illud, moderatè sumendum est: nec diutius eorum usui assuescendum. Hujus autem generis est & beta, & brassica. Nam & hæc modice degustare opus erit. Pari-ter & porrum, & apium, & smyrniū aliquando conducet attingere. Ita ex autumnalibus etiam fructibus, quicunque non omnino crudi, & natura col-lectu difficiles sunt. Igitur mora, & quæ præcocia appellantur, & ficus & si qua alia id genus sunt, citra molestiam descendunt: ad hæc & sativa cucurbita, nulli molliissimorum olerum est inferior: pari modo & syciopepones. Præterea & uvæ maturæ, & malis, & piris, & palmulis potest vesci nonnunquam puer: parce tamē, & raro. Quos fructus & in arbore, & domi maturuisse priusquam edantur, oportet. Pituitosa autem cibaria summo-perè illi vitanda sunt. A fungis etiam ut omnino absteineat, consulo: quemadmodum & à rapis, & à reliquis aliis, quorum radix est esculenta. Sunt enim hæc ex iis quæ crassos humores gignunt, & perque difficulter intra corpus elaborantur: exceptis quibusdam, quæ nonnihil acris & calidi in seipsis continent: quemadmodum pastinace & raphani. Verum raphanos ex aliquo dierum intervallo degustare non prohibeo: hortor tamē, ut pro viribus à pastinaca absteineat: & magis etiā à rapis. At eorum cibariorum copiosus usus, salubris erit, quæcunque acris quippiam atque incidentis obtinent, citra insignem pravi succi notam aut odorem aliquem, capiti adferre noxam valent. Sunt autem & in hoc genere, quæcunque ob caliditatem caput replent, sicuti vinum, sinapi, petroselinum, pastinaca, cæpa, & smyrnium. Hæc siquidem plus quam par est, excalfaciunt, vitiososque succos producunt. At oxymelite audacter utendum est: ex quo etiam capparæ potest sumi, pauxillo olei instillato. Quod si acetum ipsum scilliticum fuerit, oxymeli longè magis juvabit. Cæterum si oxymeli bibere puer velit, temperet copiosiori aqua: & hyeme quidem, calidum: æstate autem, frigidum offeratur: sic siquidem præter cætera, maxime si tim sedat. Permittere autem ei palam & in tempore convenit, quæcunque non insigni noxa ipsum possint afficere, ne clam atque intempestivè eis potius, multo magis lædat. Quippe voracius & largius implentur iis quæ desiderarunt, qui palam eis uti prohibentur. Porro à prandio, ubi modicum quid interquieverit, priusquam ad studia literarum accedat, nonnihil ipsum lentè inambulare præcipio. A quibus ubi redierit, rursus ante cœnam deambulet modice: ac deinceps panis offerantur portiones reliquæ: aliorum verò

Epilepticos esse abstinentes à lavacris.

Fructus epilepticis dandi.

Cibaria epilepticis apta qualia esse debeant.

Oxymeli epilepticis dandum.

Capparæ epilepticis congruit.

Acetum scilliticum.

Pueris curæ permittendæ sit, ut sciant illis quæ non intempestivè laudantur.

*Epileptici
quibus & si
carnibus de
beant.*

*Suis extre-
mas partes
conferre epi-
lepticis.*

*Condimentū
simplex ex
quibus con-
fer.*

*Legumina
congruentia
epilepticis
qua.*

*Medicamen-
ex scilla confe-
ctum confer-
re epilepticis*

*Oxymelitos
differentia.*

*Scilla succū
excipiendi
ratio.*

*Scilliticum
medicamen-
optimū epi-
lepticis.*

*Scillā in ace-
to coctam, ef-
se non inno-
xiam nervis.*

unumquodq; Verum carnes omnium ferè vola-
tilium conveniēt, exceptis iis quæ in stagnis de-
gunt. A quadrupedū autem omnium carnibus
abstinere debet. Quod si & quādoq; his opus sit
uti, suis quidē domesticiis extremis atq; ventre ve-
scatur. Sed sylvestris etiam suis carnibus uti po-
terit. Hædos etiam gustare licebit, atq; nonnun-
quam lepores, probè tamen conditos, aut citra
nidorē assatos. Simplex cōdimentū sit ex aqua,
quæ anethum, porrum, oleum, atq; salem recepe-
rit. Quantū verò ad marina pertinet, omnia re-
stis intecta sunt perniciofa. Ex piscibus autē, sa-
xatiles cæteris omnibus præstant. Torpedo au-
tem sola ferè ex cartilagineorum genere illi con-
veniens est. Inter legumina, ptisana quidem pri-
mum locum obtinet: deinceps lentes, alica & pi-
sa conveniūt: reliqua noxia existunt. In univer-
sum autem, quæcūq; glutinosa sunt, & crassi suc-
ci, quæq; inflant, & excrementa gignunt, necnō
quæ ægrè coquuntur, ea prorsus vitare debet. At
verò medicamēto confecto ex scilla, post purga-
tionem, quæ adventante vere molienda est, utē-
tur singulis diebus, priusquam palæstram acce-
dat. Et sanè, nisi valdè rebellis sit morbus, spero
quadraginta dierū spatio ipsum sola, ejus medi-
camenti ope, prorsus solutum iri. Post purgatio-
nem tamē, antequam eo medicamento utatur,
absinthium & semel & bis in potu accipere cōve-
nit. Cæterum oxymel quod acidissimum quidē
est, quartā ad mel aceti portionem habet: quod
verò dulcissimum, octavam recipit. At crassis &
glutinosiis existentib⁹ succis, acridiori atq; mera-
ciori est utendum. Sin autem minus sint tales, di-
lutiori, atq; dulciori. Quo pacto autē ipse scillæ
succum excipiam, jam adjiciā. Primum vase me-
litero præparato, in ipsum scillam frustatim ma-
nibus cōminutā injicio: deinceps angusto oper-
culo cōoperiens, & extrinsecus corium univer-
so corpori vasis circunducens, & diligenter li-
gans, in locum omnino ad meridiem cōversum
repono: ita tamen ab aquiloniis flatibus cōmi-
nutum, ut nullatenus ab ipsis perflatur. Id autem
eo anni tempore efficio, in quo exoritur Canicu-
la, nempe ante illius quidem ortum, viginti die-
bus, postq; ipsum etiam totidē. Tunc igitur per
aliquot dies paulatim sitū vasis permuto, ut æ-
quē quacūq; sui parte incalescat. Quo tempore
exacto dissolvens vas, in eo scillæ corpus perni-
de ac decoctum invenio, atq; adhuc ex ea humo-
rem quendam effluere, quem excipiens optimo
melle condio. Et hujus quotidie plenū cochlea-
re unum, infantibus quidē parvum, adultis ve-
rò magnum, exhibeo. Quinetiā quod totius scil-
læ corpulentum superest, exquisitè contundens,
& cum melle levigās, ejus quoq; cochleare unū,
ut prædictum est porrigo: istud tamen viribus
est longè inferius. Qui verò scillā in aqua coque-
tes subigūt, planè illius vires dissolvūt. Quemad-
modum quicūq; ex aceto eam decoquunt,
calidum quidem medicamentum
abundè efficiunt: at nervis
sanè non inno-
xium.

GALENI PERGAMENI de Ptisana, liber unus.



Quandoquidem cōposita quædam
res est tum ptisana, tū eius cremor
(ex hordeo enim probè decortica-
to, & aqua, & certa quadam coctio-
ne conficitur) prius de illius partib.
summatim aliquid dicere est animus, quā de ejus
cōpositione atq; usu differā. In primis igitur ad
conficiendā ptisanam aquam optimam deligere
oportet, quæ nimirum nec olfactu, nec gustu, ul-
lam extraneā qualitatem referat. Præterea sit pel-
lucida, & pura, operæ precii est, minimèq; limo-
sa, sed veluti exactè colata. Porro hujuscemodi
aqua, quò ad usum quidē, satis erit accommoda:
natura aut ipsa, neq; hoc pacto prorsus sincera
fuerit, sicuti nec ullum aliud sensibiliū elemēto-
rum. Erit tamē tenuium partiū atq; ad cōcoctio-
nem, distributionemq; prompta: nec tātum à na-
turali calore alterabitur facile, verum etiam igni
externo admota, protinus calefiet: quod etiam
testatur Hippocrates, aquā quæ calfit citò, & ci-
tò refrigeratur, levissimā esse existimans: idq; nō
æstimatam pōdere, sed quod partium tenuitate
præpolleat, facileq; cōtrarias qualitates recipiat.
Itaq; hujuscemodi aqua, frigida & humida, pro-
prieq; omnino aqua censenda est. Hordeum au-
tem ipsum, refrigerat exiccatq;: habet tamē nō ni-
hil detergentis & flatuosi. Quod si inspiciat⁹ par-
ticulatim, illius extremus cortex furfuraceus, &
ficcior existit, & magis detergendo accōmodus.
Quod verò intus, ceu carnis vicem gerens, atque
nutriēdo idoneū habetur, deterget quidē & id,
sed fursure lōgè minus, & pariter quippiā flatuo-
si in se cōtinet. Quamobrē fursure qdem abster-
git min⁹, valētius aut hordeo. At verò, quod hor-
deum ad ptisanā cōficiendam eligimus, esse ple-
num oportet, nec admodū recens, neq; antiquū
valde, & q̄ omnis ascititiæ qualitatis sit expers:
in tumoremq;, dum coquitur, attollatur ingen-
tem. Ubi aquā & hordeum delegeris, ipsum hor-
deum crudum in aqua præmacerato: deinde ita
manib. versato, quousq; deglubatur tenuis men-
brana. Postea rursus valētius etiam manib. eo-
usq; confricato, ut quicquid paleaceū inest, deci-
dat: nisi quis fortè velit eam magis detergentem
efficere: tunc siquidē satius fuerit ipsum unā cū
membrana decoquere. Ipsius aut decoctio sit ta-
lis, ut primum quidē ebulliat plurimū: posterius
aut lento igne, quousq; abundè in succum verta-
tur. Hac enim ratioe percocta ptisana, quicquid
inerat flatuosi, deponit, restinguit sitim, deter-
get, abluit, facile coquitur, atq; absq; astrictione
aliqua humectat. Jam verò quum cætera visci-
da quo ad gustum nullam sanè suavitatem obti-
neant, ptisana gustui nescia quid suavis & blan-
di affert, & præsertim ægrotis. Facile etiā in tho-
racis partes descendit: estq; ad dejectionem, atq;
distributionē, accōmodata. His de causis maxi-
mè ex usu est ardentibus febribus: quod nimirū
eis quacūq; ex parte obsistat, refrigerans & hu-
mectans, necnon putridos humores detergens,
& corpori non exiguum nutrimentum suppeditans:
eos verò humores qui ex dimidio putru-
runt

*Ptisana
quibus
stet.*

*Aqua
maqua
nam op-
beat.*

*Elemēto-
nullum
prorsus
cerum.*

*Aqua
sit levis.*

*Hordeum
frigerant
catq;.*

*Hordeum
ficiendae
ptisana app-
quale m-
esse debe-*

*Hordeum
corticam
ratio.*

*Hordeum
haudquā
decortica-
tis abster-
tem efficit
Ptisana
cultas.*

*Ptisana
ximè ex
est arden-
febris.*

runt concoquens, atq; in optimum succum permutans. Præter has itaq; vires omnes, nullam habet aut astrictiōem, aut stomachi subversionē ptisana. Nam astrictio quantum ad ventriculum roborandū idonea est, tantū ad incrassandos humores prompta: at ea humiditas quæ quod crassescat non habet, facile subversionē molitur. Pti-
 10 sanæ sic cōfectæ, læves, æquales, atq; ex æquo omnes partes continuæ & unitæ existunt. Cate-
 rum nec eam iis qui in discrimine sunt, porrigere cōvenit: nec iis q̄ venę sectione, aut purgatione, aut clystere, aut fomento indigēt: nec eis qui excrementa plurima in regione ventriculi con-
 gesserūt, aut ingenti dolore vexātur. Sed neq; in
 20 ficcissimis etiā morbis eam dare cōvenit: quod scilicet valētioribus egeant potionibus quàm sit ptisana, ut humectentur uberius. Tempus sorbitioni opportunū tunc fuerit, quando æqualiter dispositum corpus redditum est: id quod tātum morbo inclināte accidit. Porro morbi ficci sunt,
 lateris pulmonisq; inflammationes, atque adeo q̄-
 cunq; morbi in thorace fiunt, si nihil per excrea-
 tum excernant. At morbi qui circa jecur, & ven-

triculum, & intestina accidunt, tunc sanè ficci di-
 cuntur, quum nihil excernunt, aut dura, & non
 ut necesse est, neq; effatu digna. Siccitates verò q̄
 in venis & arteriis consistunt, ex lingua & exte-
 riori cute noscuntur: pariter & affectus qui in ca-
 pite sunt, si nihil per palatum excernatur, aut na-
 res. Eadem etiā ratione, & inflammationes &
 ulcera esse contingit ficca; ex quibus nihil per sa-
 niem excernitur. Igitur in huiusmodi morbis
 10 ptisanam minimè propinare conveniet, quod fa-
 tis eos humectare non valeat. At verò quando
 corpus humidius extiterit, aut ex pulmone ali-
 quid excreatur, tunc eis semper sorbitionem au-
 gere, atq; adjicere oportet. Verum neq; ipsam sta-
 tim ptisanam offerre expedit, sed prius sanè ejus
 cremorē solum, aut cremoris quidē plus, ptisanæ
 aut parum, mox utriusq; æqualiter: deinceps &
 solam ptisanam: idq; non ignorātes, ad corpo-
 ris robur & nutritionem, maximè conducere pti-
 20 sanam: ad facile verò coctionem, atq; in corpus
 distributionem, cremorem ipsius.

*Siccitates
particulares
quibus notis
deprehendā-
tur.*

*Ptisana cur
in ficcis mor-
bis non dan-
da.*

*Ptisana cre-
mor.*

SECTIONIS TERTIÆ FINIS.

EPITOMES OMNIUM GALENI OPERUM SECTIO QUARTA.

ILLUSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. PE-
 TRO PACHECO, GIENENSI EPISCOPO, ATQUE S. R. ECCLESIAE
 Senatori Vigilantissimo, Andreas Lacuna, Secobiensis, Doctor Medi-
 cus, Miles Sancti Petri, S. P. D.

SI UT CORPUS ERECTUM SORTITUR HOMO, SIC ANIMUM AD SUBLIMIA
 erigeret, ne utquam caducarum (ut solet) rerum teneretur admiratione, Pate-
 10 sed perpetuò & divina suspiceret, & assidue in eorum exerceretur meditatione. Caterum quum
 ita sit naturā comparatum mortalibus, ut pars quidem victi, ac veluti captivi ducti à suis cupi-
 ditatibus, illis tantum inserviant: pars autem adeo ignavi stupidiq; sint, ut animam habeant
 nec ne, ignorent penitus: contingit sanè, ut per pauci eorum sursum aspicere queant (lux enim lippos maxime
 offendit) sed omnes ferè humi serpent, instar crocodilorum. Id quod certè est in causa, ut si quando videant
 canem trasilientem per circulum, aut tripudiantem simiam, aut deniq; foedissimum Scytham supra funem
 saltantem, universi, sui ipsorum obliti, confertim ad id genus spectacula confluant, atq; ea quidem admirentur
 stupefacti: negligant autem & aspernentur conditoris illius nostri opera: quæ si, ut decet, expendere-
 20 nentur, omnium spectatorum animos in maximam admirationem sui, commendationemq; converterent. Nam ut
 impræsentiarum præteream ordinatas illas orbium cœlestium lationes, constantissimos ortus syderum, vicissitu-
 dines temporum, animaliumq; generationes & incrementa, quæ captum humanum superant, de iis autem
 differam quæ indies calcantur pedibus, quid obsecro admirabilius possit unquam contingere, quàm ex eruca,
 nasturtii, aut alio vix perceptibili semine, oriri herbam picubitale? ex nucleoq; aliquo exiguo, nasci prodi-
 30 giosæ magnitudinis arborem? Etenim posteaquàm semen in terram, veluti in matricem quandam, conie-
 ctum est, attracti humoris copia intumescit, intumescensq; rumpitur, ac duo de se emittit germina: unum qui-
 dem, quo terra adheret, ab eaq; sibi alimentum sugit, quæ est radix: alterum verò, quod solem versus, à quo
 vivificatur, erumpens, ab uno caudice in varios tandem ramos divaricatur. Atq; hic sanè plantarum est or-
 tus: quas quidem universi Philosophi & Medici, animatas esse dixerunt, neq; id iniuria: quod nimirum ani-
 mantium ritu gignantur, crescant, vivant, atq; senio absumantur. Primo siquidem sunt molliuscula, du-
 40 elilesq; & tractabiles, ut infantes. Dein processu temporis adolescunt, suisq; articulis roborantur. Postea ve-
 rò iam consistentes, ubi crescere destiterunt, & renituntur trahenti, & solita fructuum ubertate pinguescunt:
 donec tandem concedentes naturæ, hominum instar senescunt, atq; fatiscientes dehiscunt. Reperitur etiam, ut
 in animalium generibus, sic sexus uterq; in stirpibus. Discernitur autem à fœmina masculus, quod folia hu-
 ius prius germinent, foliisq; fœminæ sint minora. Quod si masculus adeo coniunctus sit fœminæ, ut foliis mu-
 tuo sese contingant: aut si ex fragrantia masculi portio aliqua ad fœminam, ventorum beneficio per-
 50 venerit, ipsius fœminæ fructus citò ad maturitatem perveniunt. Sunt autem stirpes ut cæteris rebus omnibus
 longè amoeniores & iucundiores visu, sic earum usus mortalium vitæ multis numeris necessarius: utpote à qui-
 bus non

bus non modo alimenta ipsa, sed etiam medicamenta, quibus utimur ad profligandos morbos, multaq; alia pertinentia ad vitæ commoditatem, proficiantur. Vnde non immerito Marcus Curius, Lucius Quintus Cincinnatus, Marcus Valerius Corvinus, Cyrus Persarum Rex, aliq; viri gravissimi, lecti plantarum amœnitate, plurimum agricultura indulserunt. Quum igitur undecim commentarios Galeni de viribus medicamentorum simplicium: septem, de compositione pharmacorum secundum genera: ac deniq; decem alios de compositione medicaminum iuxta singulas nostri corporis partes (in quibus non modo universæ dotes, ac facultates plantarum, sed varia etiam morborum genera, eorumq; absoluta curationes exaggerantur) superioribus diebus ad Græcorum exemplarium fidem restituissem, restitutosq; contraxissem in methodum ut brevior, sic multo studiosis aptior: statui equidem hos ipsos vigintiocto commentarios, Naturæ thesauros quosdam opulentissimos, tibi, Antistes Reverendissime, nuncupare: idq; non ut ex hac ipsa dedicatione aliquid splendoris accederet tuæ Celsitudini, quæ iam pridem ob insignem prudentiam, variam eruditionem, raram incredibilemq; clementiam, ac deniq; summam pietatem, conciliavit sibi omnium bonorum animos, atq; extra omnem ingenij aleam est posita: sed ut tui nominis fulgore illustrati, inirent multo maiorem gratiam eruditorum hominum: sub tuoq; patrocinio, veluti sub clypeo Aiæcis delitescerent, non tam facile impeterentur à virulentis quorundam moribus, quibus aliena fama detrahere, & exercitium, & summa voluptas est. Si quidem quum olim summi Imperatores & principes, adversus impendentes fluctus & tempestates fortune, committerentur literis: nunc ingenuæ artes & disciplinæ, ut tuto prodire possint (proh dolor) fautoribus & Mecænatibus egent. Ceterum si T. C. hæc nostras lucubrationes defendendas susceperit, nulla invidia, aut calumnia, in nos quicquam moliri poterit. Quod si quæ barbarorum ac sophistarum cohors (hi namq; præcipui sunt, infestissimiq; bonarum disciplinarum hostes) accedat propius, ut facessat nobis negocium, confestim in pedes se conferet, vel solius nominis tui fulmine perterrefacta. Adeo si quidem heroicas illas ac nondum satis laudatas virtutes tuas, quadam severitate gravitateq; prudentissima adornas (quod passim de te omnes prædicant) ut non minus tetræ ac flagitiosis hominibus, terrori ac formidini sis, quam ingenuis omnibus admirationi. Quibus quidem rebus adductus Divus Carolus V. Imp. Tridentinæ synodo te unum inter alios omnes præfecit, ut singulari sapientia tuâ Ecclesiæ causam tuereris: sibi nimirum persuadens, te præsentem, nihil transactum iri, quod non pium, non æquum, non sanctum, non deniq; universæ Christianæ Reip. maxime salutare futurum esset. Quam provinciam adeo alacriter suscepisti, eaq; fide & pietate suam pacem, religionemq; Ecclesiæ restituendam curasti, ut S. D. N. P. III P. M. te inter purpuratos illos Patres censuerit tandem annumerandum: sentiens haud dubie se non minus accessu tuo illustraturum Senatum illum Patrum amplissimorum, quam exornaturum amplitudinem tuam tam splendida, tamq; iusta pietatis tuæ, atq; integritatis corona. Quocirca Illustrissimi illi, Reverendissimiq; omnes collega tui, summo desiderio tenentur visendæ T. Celsitudinis, in eaq; suos pascendi oculos: sed inter omnes præcipue Illustrissimus & Reverendissimus D. D. Franciscus à Bovadilla & Mendozza, Cardinalis Cauriensis, meusq; Mecænas maximus. Qui quidem tuarum virtutum præco, ut est studiosissimus tui, iam vellet ut moram rumpere, quò liceret sibi ac ceteris frui isto conspectu tuo, splendoreq; illis tam exoptato. Cui nec potuissem equidem (quod certo scio) rem unquam gratior facere, quam si hosce labores meos, futuros ceu testimonium quoddam ætissime illius necessitudinis, quam inter vos mutuo alitis, consecrarem tuo numini: nec poterit Tua Celsitudo, quam si ipsos singulari suo patrocinio dignetur. Deus Opt. Max. amplitudinem istam tuam, Antistes observandis. diu nobis quam florentissimam servet, ut tum pietas, tum religio, tum bonarum literarum studia, sub tali coryphæo & protectore invalescant. Vale. Venetiis, ex ædibus Illustrissimi & sapientissimi viri, D. D. Joannis Furtadi à Mendozza, in hac Rep. Oratoris Cæsarei vigilantissimi.

XV. Cal. Maias, M. D. XLVIII.



GALENI

GALENI

PERGAMENI DE SIMPLICIUM

medicamentorum facultatib. lib. I.

CAPUT I.

mplicium
dicamen-
um cogni-
ad quid
ferat.

edicamen-
um quid.

trimen-
um quid.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

cultas est
plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas

id.

plex, actu

icet et po-
tia.

edicamen-
um quid.

plex quid
cultas



edicamentorum simplicium facultates exquisitè cognoscere, cum ad variorum compositionem, tum ad inventorum opportunum usum, admodum necessarium est. Porro medicamentum omne id dicimur

quod alterare nostram naturam potest: sicuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur. n. utrumque ad aliquid. At verò medicamentum simplex, & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatur. Estque id quod secundum naturam suam, sincerum est. At facultas, causa quaedam est effectrix: eaque partim actu, ut calefaciendi in igne, partim potentia, sive futuro tempore: quali nimirum calefacit pyrethrum. Cum autem singulis medicamentis propria quaedam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut vomitoria, aut alterius generis alia: nosque alibi demonstraverimus, ex calido, frigido, humido, & sicco, corpora universa constare, certè facultatum effectricium essentias (de quibus neque inter medicos, neque inter philosophos convenit) tum in aliis omnibus, tum in medicamentis, has ipsas qualitates statuemus.

CAPUT II.

In primis autem ac maxime sumendum est iudicandae facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Nam quam vim in homine aliquod medicamentum habet, in alio animali eandem non necessario sortietur. Proximè est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario & per se. Nam aqua frigida calorem quandoque revocat, cutem refrigerando contrahendoque: ad quod sanè consequitur revocatio caloris. Rursum calida quoque ipsa refrigerat saepenumero, digerendo excalfaciunt humorem. Quae igitur admota corporibus nostris, primario ac per se excalfaciunt, ea sanè facultate dicuntur calida: si verò contra refrigerent, frigida: non autem quod alba vel rubra sint tale facultate sunt praedita.

CAPUT III.

Etenim quod ab initio ad finem usque dum applicatum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda autem opera est, ut quodcumque medicamentum in iudicium vocare velis, diutius hæreat applicatum, omnisque sit alienae tum frigiditatis, tum caliditatis expers, ne nativam facultatem illius ascititia adulteret qualitas. Porro quaedam tota substantia in se mutuo & agunt, & patiuntur: quaedam una duntaxat, aut duabus qualitatibus. Ad hæc, alia quidem tenuium partium sunt, alia crassarum: tenuium quidem, quae facile in tenues comminui partes possunt, crassarum vero, quae contra.

CAPUT IV.

Si igitur primò aquam, quae & communissima universis hominibus tam sanis quam aegris est, & ad vitam maxime necessaria, nec frigidam in-

signiter, nec calidam, corpori temperato applicueris: dein iis quae natura sunt intemperata: tertio, quae aliquo affectu tenentur: temperato quidem admota, plusculo tempore omnino ipsum refrigerabit: intemperato verò, citius quidem refrigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius autem quod calidius: semper tamen refrigerabit, cum videlicet talis existens, nequeat revocare calorem, quemadmodum summè frigida, quae si quadrato, aut juvenilis corporis naturae pauculo fuerit tempore admota, caloris molietur revocationem. Sin aliter utaris, semper refrigerabit: id quod etiam facit admota iis, qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primario à medicamento fieri, aliud ex accidenti: ut licet cernere in phlegmone, quae calidae copiosaeque fluxionis est soboles. Siquidem quae modicè excalfaciunt pharmaca, dum superfluitatem evacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiunt. Aqua itaque potabilis utrobique videtur frigida: id quod non licet de iis asserere, quae sulfureae, bituminosae, atque nitrosae existunt. Imò verò neque marina ipsa, priusquam ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare conspicitur. Ergo quae exactè ac sincere aqua est, omnis alterius substantiae mixtione vacans, ea necessario ex sua facultate est frigida. Si qua verò per bituminosa, sulfurea, nitrosa, aut aluminosa loca distillans, aliquid secum ejus substantiae absterferit, mixta jam ea est, non autem exactè aqua. Quod si etiam ipsi aquae potabili igneam aut essentiam, aut qualitatem adjeceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quin etiam aqua limosa, quali apud Aegyptum utuntur, composita quadante-nus est: sed ea per fictilia vasa optimè percolata, quam purissima efficitur.

CAPUT V.

Judicatur autem aqua gustu, visu & olfactu. Siqui dem gustu est pura, si omnis qualitatis expers videatur. Visu, si sincera & pellucida fuerit. Sic nec odoratu ullam praese ferre qualitatem debet, ut sunt quaedam pravitate extremae, quae aut aciditatem, aut acrimoniam, aut salsedine, aut putredinem praefereunt. Igitur aqua, quae absque his est omnibus, ut ad naturam certè, ne ipsa quidem ad amissum sincera fuerit, sicuti neque aliud ullum sensibile elementorum, sed ut ad sensum & usum, sincera est. Quae itaque examinanda venient medicamina omnia, omnis extraneae qualitatis valentisque aliena sunt.

CAPUT VI.

Quod autem omnis aqua dulcis manifestò refrigeret, hinc discas licet, quod si cera oleo liquaveris, humidumque ceratum confeceris, ac postea ipsum refrigeratum, largiori affusione frigide ablutum admoveris, valenter eos qui febre uruntur refrigeret, si hypochondriis supponatur: nec non omnem phlegmonem, herpes, carbunculos, erysipelata, phygethla, & breviter omnes calidos morbos: id quod non contingeret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quae calidis adversantur affectibus, calidae nimirum cum sint.

CAPUT VII.

Ceterum quod aqua quoque potabilis sola sit

Aqua summa frigida in quibus calorem revocat.

Aqua potabilis frigida existit.

Aqua omnis sincera est naturaliter frigida. Aqua mixta quae sunt.

Aqua limosa apud Aegyptum utuntur.

Aqua debet indicari gustu, visu, & olfactu.

Elementum purum mixtum reperiri.

Aqua omnis dulcis refrigerat. Ceratum humidum ablutum frigida, calidos omnes affectus refrigerat.

Aqua potabilis sola est humida.

inter propositas humida, ex eadem discas methodo. Nam si ulcera supra modum sicca, hac irriges, statim admodum humida & mollia reddentur, cum alia aqua universa ulcera deficcant, nonnulla quoque etiam ob acrimoniam exasperent. Quin etiam sitienti, dulcis aqua remedio est: cetera vero, acerbior etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutim laborantibus adversissimum est & poculum & lavacrum aqua dulcis. Salsarum vero, nitrosarum, sulfurearum, bituminosarumque omnium, sane perutile. Imitari autem potes, sicuti marinam, ficaliarum quamlibet, substantia videlicet admista, quae in quaque vincere cernitur.

CAPUT VIII.

Aqua naturalis.

Aquam summam humectat.

Aqua igitur propria natura humida & frigida est. Ceterum summam quidem humectat, sive tepida, sive temperata ea sit: non autem calfacit summam, nisi quae extremum ferveat. Quod si corpus aliquod eucratum, calida moderate perfundas, in ipso quidem perfusionis tempore, calidius simul atque humidius efficies: paulo vero post, id seipso evadere frigidius, non tamen siccius, conspicias. Nam tamen humores qui in vasis, aliisque communibus spatiis sunt, per id genus perfusiones universi exhauriatur, ipsa tamen vasorum corpora, & universum genus carnosum seipso humidius reddit. Quale exemplum, quodvis ratione diversa, licet videre in senibus: qui cum genuinas partes, quam adolescentibus, magis siccas sortiantur, pluribus tamen excrementis redundat. Hanc itaque humectandi vim solam, nunquam aqua deponit: neque, si sive fervens sit, sive etiam extremum frigida, partem cui affusa fuerit, siccior efficit: quam ob evaporationem quae a calida perfusione excitari solet, perfusa particula nonnullis longe siccior videatur, cum praesertim vapor, humor sit extenuatus.

CAPUT IX.

Vapor humor extenuatur.

Ignis potentia est, quod facile in ignem vertitur.

Facultate aliquid, ex adverso dividitur et quod actu.

Nec vero usque adeo absurdum fuerit, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate putare. Unum quippe ex iis quae facultate talia dicuntur, est id quod propria eiusque dicitur materia, tale est facultate, ut, si quid facile in ignem vertitur, id non actu, sed facultate est ignis. Nam hoc quod est facultate, ex adverso ei dividitur, quod est actu: sicuti & quod est per se, huic quod ex accidenti contingit.

CAPUT X.

Calida potestate, ut nos calfacere possint, debent prius in tenui comminui.

Piper calfacit.

Ignis omnium tenuissimus & calidissimus est, ob idque facile penetrat.

Caliditas nostra crassa est essentia.

At quibus consilium est, tutum a rebus extraneis, ad corpora transire animalium, videre primum debet, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorandum venit. Secundum, an sibi continuum, densumque, ac solidum: an intervallis interceptum, an rarum.

CAPUT XI.

Eorum autem quae in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calfacere, priusquam in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper integrum cuti inspergat, nullam planum caliditatem percipiet: si vero pollinis instar cuti inspergatur aut linguae, excalfaciet utique, ac potissimum si fricueris. Quare multa quidem facultate sunt calida, facileque in ignem vertuntur, quae nos tamen haud facile excalfaciunt. Ignis siquidem, ut qui omnium tenuissimus & calidissimus sit, minimo negotio penetrat illa, atque vincit. Nostra autem caliditas, praeterquam quod crassa est essentia, halituosaque, adeo existit infirma, ut aegre quod contingit per-

mutet. Quare nihil eorum quae calfacere nos videntur, perinde ut ignis calfacere potest, sed tanquam materia quae accenditur facile. Siquidem mutationis principium a nostra caliditate accipiente, ut calami aridi ab igne, nos contra recalfaciunt, & veluti partes fiunt quaedam nativi caloris, ut ignis illi. Quare mirandum non est, si quaedam medicamenta primae quidem mutationis principium a nostro calore nata, inde jam pergant, cum quoque qui mutabat, vincere & superare.

CAPUT XII.

Porro cutis omnis, in primo statim ortu sibi continua cum sit, temporis spacio pertunditur, sicut ut universum corpus fiat perspirabile, arteriaeque ipsae (quae in cutis meatus, quemadmodum venae, aperiantur) unde quaque se dilatantes, per poros attrahant, non aere modo, halitumque, sed quicquid etiam trahi facile potest, ac praetenuitate sua, motum ipsius spiritus consequi. Quamobrem quicquid piperis ad exactissimum fuerit reductum pollem, verisimile est, simul cum ambiente aere, ab ipsis arteriis attrahi, protinusque a calore nativo alterari, idque tum ob parvitatem, tum ob ingentiam ut a calore alteretur aptitudinem. Quod quidem si semel illi insit, per totum corpus, temporis progressu, perlatum, ipsum recalfaciet: prius tamen calfacies sibi proximiores particulas. Unde liquet, crassorum nullum, priusquam ad unguem comminatur, neque ipsum a nostro corpore quicquam perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod vero in pipere adduximus exemplum, idem licet ad alia transferas, sive ea calfaciendi, sive etiam refrigerandi facultatem sortiantur.

CAPUT XIII.

Considerandum autem est non solum, crassarum ne sit partium, an tenuium, explorandorum medicamentorum substantia: verum etiam, rarene, an spissa, densave. Voco sane raram, cuius partes inanibus spatiis sunt interceptae. Ubi igitur spatiis ejusmodi multis, quae plena semper sunt aere, corpus fuerit distinctum, facilius quam spissum accenditur, etiam si calidius illo non fuerit. Nam qui in iis spatiis continetur aer, primo statim ignis occursum accenditur, atque inflammatur (aer enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) una vero secum corpus universum accedit. Sic itaque calamos aridos ignis exurit celeriter, tamen si minus alia substantia calidos, idque ob meatuum multitudinem, quos prius aer occupabat, quorum argumentum summum, calamorum levitas est. Nam siccum natura corpus, leve esse alioqui non posset. Quaecunque autem fistulosa sunt, multumque vacui obtinent, pondere existunt levia. At calamus a nostro corpore aegre calferi potest, quod essentiae sit crassa. Si igitur alicujus medicamenti substantia tenuis sit & continua, eandem in nos naturam ostendet, quam prius in ignem: si autem rara sit & crassa, fieri poterit ut ab igne quidem alteretur per facile, non tamen a calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

CAPUT XIII.

Quamvis aqua ipsa tenuis substantiae sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit: nec proprium est ignis nutrimentum, sed potius extinguit illum, ut quod illi sit adversissimum. Nec mirum si cum igne tum calidissimo, tum siccissimo pugnet aqua,

Calfacient corpus, ab insitum caloris assumen

Corpus universum esse perspirabile

Medicamenta omnia quae pacto in corpore suas res exercent

Rara quae sunt

Rara quae sunt spissa cur cendantur facilius

Flamma aer accensus Carbo est rarus succensus

Fistulosa omnia sunt levia

Aqua igni adversissima, nimis frigida & humida

aqua, frigida & humida existens. Porro oleum, tamen si in flammâ vertatur facile, non tamè admodum celeriter, nec manifestè nos calfacit, ob lentorem substantiæ, quo tenaciter inhaeret iis, quæ semel cõtigit: neq; ab ambiētē facile aut extenuari, aut augeri valens; nec pròptē intus in corpus transumi. Aqua verò & celerrimè in halitū solvitur, & expeditè digerit. Quod si in idem vas coniectam aquā, oleumq; decoquas, prior aqua absumetur.

CAPUT XV.

Ut autem calfacientium, aliud est simpliciter calidum, ut ignis: aliud exuperantia, ut qui in nobis est calor: sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud quidem ad id quod primò & absolutè est calidum, aliud verò ad id quod per exuperantiā refertur. Non ergo quod citius accenditur, protinus ad nos simpliciter apparet calidius.

CAPUT XVI.

Sed neq; citrà limitationem, ex eo quod aliquid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. Nam in iis quæ eandem habent aut tenuitatem, aut crassitudinē consistentiæ, quod ocyus à frigore cōgelatur, temperamenti est frigidioris. Si verò alterum sit tenuius, puta (exempli gratia) vinum: alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius aut magis cōcrescere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quæ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

CAPUT XVII.

Est autē refrigerari, frigidam qualitatem recipere: at congelari, durescere est præ frigore. Quæcunq; igitur corpora tenuis essentia sunt, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æque congelantur, ut aer & ignis. Nam hic planè non congelatur: ille autem, nempe aer, non perinde ut vitrum, pix, cera, resina, & bitumen: cujus quidem tamen calidissimū sit, terrenitas tamen crassitiesq;, ad congelationis celeritatem adjuvat. Porro aquam quæ celeriter & incalesceret, & refrigeraretur, meritò levissimā esse dixit Hippoc. Nam quanto tenuior fuerit, tanto pati erit pròptior. Atqui quæ tenuior est, minimū habet limi terrestris. Non ergo absolutè ex materiæ passionib. ad ignē, cōjicere ejus ad nos facultatē oportet: cum multò securius sit hoc judiciū, quod ad nostrū corpus quippiam examinamus. Quod lac simile non sit, nec undequaq; sibi simile, coagulatio indicat, qua serosæ partes à caseosis facile separant. In universis etiam liquoribus, qui à fructib. exprimuntur, crassum defertur quippiā, quod spacio temporis subsidet, vocaturq; sæx in vino, in oleo autē amurca. In aceto verò est ejusmodi quippiā, ac forsā ipsum est, qd caloris est particeps. Nam quod frigoris, id quod tenue est. At acetū majori ex parte frigidius est, q̄ calidius.

CAPUT XVIII.

Perperam igitur faciūt, qui usque adeo calidū esse acetū pronunciant, ut cauterio illud assimilent: cum tamen nec tantā sensu percipiamus in aceto caliditatē, nec ipsum crustas, instar cauterii, excitet. Constat siquidē ubi per cauteria cōsiliū est sanguinē sistere, crustam relinqui haud exiguā, quæ veluti operculū sit corporibus sanguinem profundentib. Ac proinde illis cauteria planè candentia applicamus, quæ haud quidem

quod calfaciant, sed quod urant, atque subjectis partibus operculum, quam Græci vocant escharam, relinquant, fluentē sanguinem supprimūt. Itaq; acetū, haud perinde ut crustas facientia medicamenta, sed potius ut astringentia, citra crustam, sanguinis fluores cohibet: qua ratione non excalfacere, sed refrigerare potius ipsum existimandum est.

CAPUT XIX.

Si verò idiotam aut plebeium aliquem (nam horum in istiusmodi rebus incorruptū est iudiciū, quia nulli dogmati serviliter sunt addicti) tēperato aceto ex spongia foverimus, dein autē interrogaverimus, num calorem an frigus percipiat, fatebitur quidē se, primò sanè frigus percipere: postea autem, nempe spongia sublata, sensim nascentis in parte quandam caloris phantasiam sentire. Unde perspicuū est, omnino quidē frigidum esse acetum, obtinere tamen quendam calorem, qui acrimoniæ ratione per accidens successu temporis corpora calfacit: nisi fortè ubi latus ac doloris expers tumor infestat. Si quis etiā illo ab illata thapsia utatur, ardor aceto restinguitur: non quod acrimoniam & mordacitatem obtundat, ut oleum atq; rosaceū, sed quod evidenter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis asperitas illi inesset, non alio utendum ad refrigerationem foret.

CAPUT XX.

Cum autē alij ob acrimoniam ipsius, calidissimū esse acetum contendunt: alij contrā, maximè frigidum, quod putent ipsum grumos constringendo dissolvere, verisimile est id juxta medium cōsistere. Quippe si longè ab extremorum utroq; distaret, non tanta incidisset de facultate ipsius controversia.

CAPUT XXI.

Quia verò quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secundū divisionē Herophili, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc hujus: mihi sanè tum acetum, tum etiā rosaceū, utriusq; extremi necessitudine, esse neutra videtur: & quod nūc quidem sensibilibiter calfacere, nunc refrigerare cernatur.

CAPUT XXII.

Quod verò ad aerē spectat, judicatur ejus tenuitas, ex sola in tenuia divisionis celeritate. Ceterum si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, cum es & ferrum fiat ignis, non tamen q̄ antea tenuius. At flammæ, cum aliud sint ignis genus, revera tenues existunt. Quocirca non omnis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam pruna ignis quidē est, & non tenuis: & aer tenuis, verū non ignis.

CAPUT XXIII.

Quocirca minimè cōcedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, calidū continuò esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: fortè verò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

CAPUT XXIV.

Eorū igitur medicamentorū quæ vehementer aut refrigerant, aut calfaciūt, non sunt facultates ambiguae. Verū ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse necesse est. Pleraq; autem, ut ad sensum simplicia, expugnantibus facultatib:

constant: ob quas quidē fieri potest, ut acetū vim illam obscure calefaciendi, quam ostendit, sortia-
tur, existens alioqui renue, refrigeratorium atq;
exiccatoriū medicamentū. Etenim quidā efflore

Aceti facul-
tas.

CAPUT XXV.

Facultatum
medicamen-
torum exces-
sus et gradus
discendos esse

Ceterum nō sat est generaliter vires medica-
mentorū cognoscere, quod hoc videlicet calfa-
ciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarū fa-
cultatum excessus & gradus, accuratissimē didi-
cerimus. In qua quidē cognitione, tum artificia-
lis simplicium usus est constitutus, tum ratione
proficiens ac methodo compositio: ipsorumq;
compositorum recta usui accommodatio.

CAPUT XXVI.

Composita co-
gnosci non
posse, simpli-
cibus ignora-
tis.

Perperam autē superioris seculi homines à cō-
positis orsi medicamentis, eorū quæ in illa ingre-
diuntur medicamentorū simplicium vires dijudi-
cabant, cum nō liceat rectē cōposita ipsa cogno-
scere, priusquam simplicia sigillatim examinari-
mus.

CAPUT XXVII.

Atq; hi quidē, cum citra iudiciū simpliciterq;
compositis omnibus facultatibus fidem habent,
vel Empiricis ipsis reprehensionis locum & oc-
casionem exhibent.

CAPUT XXVIII.

Sensus cur
non sint con-
temnendi.

Cum autem non aliunde ignem calidum es-
se, ac glaciem frigidam cognoscamus, quam ex
sensu ipso: omnino stupidi sunt, qui sensus esse
contemnendos existimant.

CAPUT XXIX.

Oxycrati & a-
res.

Aquam ab
aceto deduci
per universum
corpus
Aqua vino
permixta,
quam sola,
cur efficacius
restringat si-
tim.

Vinum sem-
per adauget
sitim.

Porro æstivo tempore oxycrati potu, quidam
planē refrigerantur, atq; sitis expertes permanent.
At nōdum constat, an id acetī causa cōtingat. Di-
xerit tamen aliquis, aliquā, tardioris distributio-
nis cum sit, ab aceto, tanq̃ vehiculo, duci dige-
riq; in universas partes. Sic etiam si cum vino bi-
batur aqua, sitim efficacius extinguī q̃ si sola. Re-
frigeratione itaq; sitisq; sanationem ab aqua pro-
venire, ut quæ frigidaq; humidāq; naturæ sit: cæ-
terum adminiculo esse, ac velut alas illi ad om-
nes corporis partes permeandas, tum vinū, tum
acetū: quæ ipsa nequaquā frigida sunt & humida:
alioqui ad restringendam sitim, præstaret ea so-
la, quā cū aqua, exhiberi. Porro ut à vino appa-
ret homini semper sitim incrementum, sic ab aceto
epoto, interim quidē augeri, interim verò sedari.

CAPUT XXX.

Sitis unde
exoriatur.

Acetum cui
sitis remediū
sit.

Oxycratum
ex aqua &
aceto constat
Aqua humi-
dorum om-
nium est hu-
midissima.

Medicamen-
ta qua iudi-
care solum,
qualiter ex-
pendere oportet.

Cum igitur sitis, partim humoris inopia, par-
tim caloris copia proveniat: neq; à sicca disposi-
tione proveniente sitim, neq; à calida & sicca, e-
potum sanare unquam potest acetū. At si quan-
do in unū coeant humiditas atq; caliditas, ejus-
ce sanē sitis, acetū medela optima existit. Siqui-
dē humectare neq; at refrigerare, nō instrenuē.
Verum siti q̃ ex cōposita affectione, videlicet ca-
lida & sicca, nascitur, composita medela est oxy-
cratum, quod ex aceto constat tenuium partiū,
atq; refrigerante: & ex aqua, quæ non modò re-
frigerat, sed humorū etiā omnium est humi-
dissima. Nihil enim aqua est humidius.

CAPUT XXXI.

Per se autē solum, quod iudicandū est, expen-
dere oportet, tum in sanis temperatisq; corpori-
bus, tum etiā in intemperatis: ac præterea in iis

qui alicui sunt morbo obnoxij. In tēperatis qui-
dem, ut suprā: in intemperatis autem, sicuti dixit
Hippocrates: Naturis picrocholis utilissimū es-
se acetum, at melancholicis adversissimū. Porro
in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in sim-
plici exploretur affectu: sin mistum alicui, neces-
sum est id cui miscetur, temperatura sit medium
Siquidem quod medio conjunctū fuerit, ipsum
eorū quæ pficiuntur, existet causa. Quare si acetū
simplici cerato cōmisceas, cerato ipso longē fri-
gidius medicamen effeceris: eritq; tibi id reme-
dium vel optimum, ad erysipelata, phlegmonas,
herpetes, & carbunculos. Sin autem quod mistū
est, tanq̃ simplex expendas, hallucinaberis. Nam
quemadmodum ærugo nequit carnem produ-
cere, sed ceratum quod illam recipit: sic ulcerū
glutinatorium, non autem, sed oxycratum est.
Quippe acetū per se, ulcera erodit & mordicat.

Acetū bil-
is esse uti-
simum, ad-
versissimū
melanchol-
icis.

Ceratum si-
plex acetū
ablutum,
tra tumore
calidos op-
timum esse
fidium.

Oxycratum
vulnera ag-
grinat.

CAPUT XXXII.

Jam verò cum liceat ex astrictoriis complura
offendere, quæ minimē sanē conglutinent: sicuti
ex conglutinantibus haud etiam pauca, quæ mi-
nimē astringentia videntur, fallunturq̃ absurdis-
simē, qui astrictoria omnia conglutinare, cōglu-
tinantia omnia astringere profitentur.

Astrictor-
ia omnia ha-
quaquā
glutinare
neq; glut-
ina omnia
astringere

CAPUT XXXIII.

Miserē etiam hallucinantur, qui astringentia
omnia refrigerare dicunt: cum si nihil aliud, sal-
tem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ valenter
astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut
nos etiam exurant.

Astringen-
tia omnia
haudqua-
quam refrige-
rare.

CAPUT XXXIV.

Herodotus autē & Dioscorides, quod medi-
camenta quædā profluvii alvi, atq; dysenterii
medeantur, ob id astringentia ea esse colligunt:
cum tamen ne minimum quidem astrictionis for-
tiantur, sed potius rarefacientia & laxantia sint.
Nam (exempli gratia) caprinus adeps, omnibus
quæ & gustu & facultate sunt astringentia, adver-
sissimus est: iis tamen quæ acria & mordacia per
alvum fluunt, manifestē efficaciterq; auxiliatur:
quod scilicet concreseat facile, inungaturq; inte-
stinis, ac plurimo tempore inhærens, illa demul-
ceat & foveat: cum videlicet condensare, con-
stringere & constipare, opus sit astringentium.

Dioscoria
suggillat
lenius.

Caprillus
deps contri-
succos in-
na erodem-
cur sit salu-
tare præsi-

Astringen-
tium opus

CAPUT XXXV.

Unaquæq; sensibiliū natura, privatim subje-
cta est, tactui quidem caliditas, frigiditas, duri-
ties, atq; mollietates: albedo verò, nigredo, atq; ut
summatim dicam, universum colorū genus, vi-
sui: amaritudo, dulcedo, austeritas, acerbitas, aci-
ditas, salcedo, acrimoniaq; gustui. Planeque de-
mens videatur, si quis gustu colores judicare ten-
tet, aut sapes visui: similiterq; & de aliis sensib.
Siquidē tactu iudicandæ sunt differentiæ tangibi-
les, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Om-
nis autē invētionis demonstrationisq; principia
sunt, quæ sensui atq; intellectui evidētia existunt.

Tangibilia
qualitate
Visui quæ
subijciuntur
Gustui quæ
subijciuntur

CAPUT XXXVI.

Porro Plato in Timæo, sapes (quos Græci
χυμὲς appellant) duos primum assignat, eosq; ut
speciei ejusdē, sic ratione majoris & minoris in-
ter se differētes. Quorū sanē alterū austerū, alte-
rum acerbum (qui ex illius intensione procedit)
nominat. Secundam speciem facit, eorū qui illis
opposita

Saporum
divisiones ex
doctrina I-
tonis.

opposita sunt, nitroforum videlicet, salforum & amarorū. Et in his quoque; amarus ex nitrofi provenit intensione. Salsus verò, aut nitroso imbecillior est, aut astrictionis quoque assumens aliquid. Deinde à Platone acris expositus est: mox acidus: postremo dulcis. At à Theophrasto additus est unctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut quid ad gustum nihil attineret.

CAPUT XXXVII.

Exponere aut hos saporos exactè, impossibile est: quandoquidè neque; aliam ullam sensoriam passionē: eum tamen qui tali sensu cōmunicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguæ nostræ fuerit ad motū corpus, vehementer deficcat, contrahit, & in multam profunditatem usque; illam exasperat, sicuti pira sylvestria immatura, & corna, ejusmodi omne appellat acerbum, ab austeris tantū intensione diversum. At quod astringens vocamus, idem videtur significare quod austerū, aut etiam cōmune esse genus tum hujus, tum etiam acerbi. Quæ verò linguā, dum cōtingunt non cōtrahunt, neque; constipant, sed derergunt potius & abluunt, etiam si astringentium quippiā permistum habeant, hæc omnia falsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergūt, ita ut etiam molestè exasperent, amara vocantur. Porro quæ mordicāt roduntque; idque; cum valida quadā caliditate, dicuntur acia: si hæc absit, acida: cæterum hæc fermentandi quoque; vim obtinēt. Rursus, quæ veluti inungūt atque; implent, in statumque; suū restituūt exasperatas ac veluti erosas linguæ particulas, hæc, si cū voluptate manifesta contingant, dulcia: si hac sine, pingua vocātur. Quod si ex calido, frigido, humido & sicco, coeuntibus, universa consent, verisimile profectò est, dictarum quanque; qualitatum, ex horum etiam miscella conflari.

CAPUT XXXVIII.

Verum nō quale unumquodque; ex se sit, & ad totam naturam, sed quale secundum corpus nostrum, cōsideramus. Alioqui nec acetū, nec marina aqua nos exiccare possent, sicuti nec sicca dici, cū utrunque; illorum sit actu humidū. Cæterum si nos exiccare appareāt, sicca dicentur, ad nos videlicet, & nostram naturā, parem siccandi vim obtinentia: de cæterisque; qualitatis. idem est ferendū judiciū. Quare facultatum omnium quæ medicamentis insunt, experientia erit certissima judicatrix. Quam qui relinquunt, nō solum falsa pro veris ducunt, sed tractationis etiā utilitatē destruūt. Idcirco prius delendi sunt dispungendi que; omnes paralogismi à discentium animis, quam vera disciplina imbuantur. Nam quemadmodū corpora impura, tantò magis nutries, tantò magis lædes: sic quoque; si impuris animis nutries sermones offeras, non modò nihil profis, verum etiam magnoperè obfueris.

GALENI PERGAMENI
de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. II.

CAPUT I.

Non desunt qui nobis, mortales cū simus, à sensibus auspicandum esse cōtendant, ad facultates omnes examinandas:

in illis tamē perpetuò immorandū non esse, sed ad partem diviniorem accedendum, nempe rationem. Sensum quippe & animantibus, inesse rationis expertibus: rationem autem solam, hominibus esse cum Diis cōmunem. Qui sophistæ non sentiūt, si à sensibus recedendum sit, demonstrationis primordia futura esse longè incertiora, quam ea quæ demonstranda veniunt.

CAPUT II.

Equidem optarim nullas nō res clarè sub sensus nostros cadere, nec quicquā esse quòd illos fuget. Hoc .n. pacto nihil ambiguū unquam aut anceps foret. Verum quoniam illos quædam effugiunt, rationē ipsis superinducere conandū est, sic tamē ut nec confusa, nec infinita colligamus, sed ante omnia, nominum significata diligenter definiamus: deinde quòd ex se quid agit, ab eo quod per accidēs, separet. Irridendi autem meriti sunt, qui de olei aut rosæ colore nimis anxie ratiocinantur, cū rebus ipsis variè uti liceat, de illisque; periculū facere. Ac tales mea quidem sententia, perinde factitare videntur, atque; ii qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conantur, quem etiam vivū intueri, maxime illis est licitū.

CAPUT III.

Tribus ergo modis in sermone peccant, qui ajunt rosas temperatura esse calidas, quod sint rubra. Primū, quòd nō demonstrata hac propositione, Omnis ignis rubet: convertere ex hac aliā, videlicet, Omne rubrū est ignis, tanquā veram conantur. Secundò, quòd nesciunt, propositiones quæ ex mutuò veris convertuntur, non aut simpliciter cōvertentes, veras existere. Tertiò, quòd etiam si mutuò converterentur, nō tamen omne colore sit rubro, calidū esse, ex mutua illa conversione sequatur, sed rubrū omne esse igne: id quod minimè investigamus. Eodē errore tenentur, qui ex odoribus, medicaminum facultates cōjiciunt. Nec .n. quicquid benè redolet, calidū est: nec quicquid calidū est, bene olet. Quin etiā nec si quid graveolens est, calidum etiam fuerit: nec si calidum, etiam graveolens. Sic nec si quis, quicquid graviter oleat, frigidū dicat: nec si quicquid frigidū sit, olere graviter, verū dixerit. Si quidē calidorū innumera sunt, partim bene olentia, partim graviter, partim neutra: atque; frigidorum similiter. Quantū quid calida dico, ac frigida: cū dicere debeam nos calfacientia, & refrigerantia? Etenim aliud est facultate calidum, aliud actu. Et hujus quod actu calidum est, aliud absolutè dicitur calidū, aliud per exuperantiam, aliud ad symmetrū sui generis, aliud ad quidvis obviū collatum. Homo aut non absolutè calidus, quemadmodū ignis, sed exuperantia calidus dicitur: quòd major in eo portio calidi sit, quā frigidi. Ergo & quæcunque; ad hunc modū dicuntur calida potestate, illa dicuntur exalfacere: facileque; de ipsis judiciū sumitur per experientiam solam, cui adjuxeris paucos quosdam epilogismos. Quare neque; à calore, neque; ab odore, neque; à consistentia, aut hujus generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

CAPUT IIII.

Taceo sophistas minimè quidem rationibus scientificis uti, sed aut inductionibus, aut exemplis.

plis. Differt autem, ex exemplis quippiam suadeas, an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum aut duo generis eiusdem affert, aut certè planè paucula, plerisque ceteris præteritis. Qui verò ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam sunt cognita. Quare talis inductio vehemens est, ac plurimum persuadet.

CAPUT V.

Inductio quæ exemplum validior.
Olei effectus varij.
Oleo incocta redduntur sicca.
Oleum oculis mordicat.
Oleum alvum subducit.
Oleum insecta perimit.
Oleum lassitudinē lenit.
Archidami opinio contestatur.

Quod verò ad oleū spectat (quod de multa Archidamus citra demonstrationē atq; ineptissime prodidit) quæ in ipso coquuntur omnia, sicca & friabilia efficit, contrā quā in aqua contingit: quæ verò sunt illo imbuta, magis propriam humiditatem conservant, q̄ si eo madidata non essent. Quinetiam scillæ & urticæ morsus oleū per sanat: & cum reliquū universum corpus demulceat, tantū oculos mordicat, nec non guttur exasperat. Subducit aut alvum, lassitudines tollit, tueturq; inunctos frigore, atq; lora emollit, insectaq; animalia perimit. Quorū omniū causam reddere debuisse Archidamus. Porro coci oleo tum carnes, tū pisces, interim dum assant, oblinunt, quod sicca adustaq; extimæ eorū reddat partes, si assentur citra talem unctionē. Athletas etiā oleo gymnastæ inungūt, quod præsentē quidem lassitudinē solvat, occurrat autē futuris: ac breviter frictionem tum æqualem, tum mitem efficiat, corpusq; ad motus futuros præparet.

CAPUT VI.

At Archidamus nō solum quæ in multis perspicuè apparent contemnit, sed hac etiā parte iure taxandus est, quod dicat, meliorē esse frictionem siccam ea quæ cum oleo adhibetur, quæ corpus durius & siccus iis qui inunguntur, evadat: mollius autē iis, qui fricantur sicci. Falli præterea mihi in hoc videtur, quod similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur, tum eos qui fricantur. Neq; enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut fervens, sicuti neq; aquam ipsam. Nam qui obscuro simile fuerit, herbas in oleo fervente coquere, ac exercitantiū corpora oleo temperato fricare? Etenim si quis velit expēdere oleum, ab omni prius aliena qualitate (à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atque ita demum ad explorandum se accingat.

CAPUT VII.

Olei vires qualiter expendenda.
Qualitatem propriam ab aliena obscurari.
Olei refrigerandi ratio.
Olei per fusio calidi, quibus conveniat.
Oliva. Olea.
Oleum simpliciter & per abusum dici.

Præparare oleū solemus, non aliter atq; aquā, nempe prius excalfacientes, ac deinde in aquam mergentes summè frigidam. Quod si etiam fons in ipsum cum strepitu decidat, vasculo cui inest oleum, antè diligenter occluso, magis quoq; ac magis ita reddetur frigidū. Multum item frigesceris, si præcalfactum ita in puteum demittas, ut aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigidum: * contrariū autem modo, calidum. Quo sanè utimur in refrigeratis corporibus, in alveum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiā obstupuit, aut qui tremuli sunt, aut cōvulsione, aut tremore, aut motus sensusve oblatione tentantur. Porro fructus ex quo premitur oleum, oliva nuncupatur: & arbor, olea: atq; hoc quidem simpliciter & primariō oleum dicitur, reliqua autē omnia per abusum & translationem.

CAPUT VIII.

Olei differentia coplur.

Cæterum veri olei plures sunt differentiæ. Secundum ætatem quidem, cum aut recens est, aut ætate vicens, aut inveteratū. Secundum præparationis modum, cum simplex atq; impermixtū fuerit, aut præparatum cum sale. Secundum fructus diversitatē, cum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, cum ut ab initio fuit, sic relinquitur, aut candidum redditur.

CAPUT IX.

Experiri.
qua & quomodo menta demus.

Experiri aut solum oportet, quæ impermixta sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaq; primū in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in morbis simplicibus.

CAPUT X.

Oleum lassitudinē lenit.

At nonnulli medicorum non solum in explorandis medicamentorū viribus hallucinantur, verumetiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinis remedium sit, omnes propemodum confitentur, cæterum quis affectus sit lassitudo, nō consentiunt: ac proinde secundum ipsorum doctrinam, nihil certi de olei facultate colligi potest.

CAPUT XI.

Oleum expers.
salis, & sum, quatione subcant ab.

Nec verò parū interest, an injiciatur in ventrē pituita scantentē oleum expers salis, an quod plurimum accepit salis, in ventrem purū. Utrunq; enim alvum subducit, facultatibus tamen diversis: nempe illud quod sale vacat, in pituitoso ventrē per lubricitatem: quod verò salem habet, in puro per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanè hoc radet, alterū nō radet.

CAPUT XII.

Salsuginis ex accia nonnulla mordicantes sanant.
Dolentibus intestinis quæ solea opistulara.
Cera elo est morditionis exp.
Vacuana protinus qui ab i qua temp di natura habent, e asperant.

Nonnunq̄ autem mordicationes ex accidenti quod salsuginosum est, sanaverit, unā secum educens acres & mordaces humores, perinde ut cætera omnia quæ abluunt. Sed non statim ubi immissa sunt id genus medicamenta morsus sanant, quin potius tunc etiam magis exasperant. Siquidem evacuationis, haud missionis ratione, sanationem moluntur. At ceratum ex rosaceo & adipe infusum, sæpenumero moribus continuo succurrit, idq; cōmissionis ratione. Oleum etiā solum, sed dulcissimū, idem frequenter præstitit: sicuti certè adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem sæpenumero quibus ex frigore torquebantur dolore interna, injecto oleo calido liberavimus: atq; ubi majus esse frigus cōjecimus, addidimus & anethū: si verò adhuc etiam majus, rutam quoq; & bitumen. Cæterū occurrunt interdum quædam affectiones permixtæ, ex intemperie videlicet atque mordicatione, in quibus consuevimus nos anethinū, aut rutæ oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltem gallinaceo, aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis experite, qualis nimirū est lota. Unumquodq; autē medicamentorū temperantium, ubi valentius evasit humoribus mordicantibus, morsum eorū retundit. Verum si aut valentioribus facultatibus, aut multis, paucū permixtū fuerit, unā & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymiam. Quamobrē protinusevacuandi sunt, qui ab iis quæ temperandi naturam habent, exasperantur.

CAPUT

CAPUT XIII.

Sic sanè lac frequenter simulatq; sumptū fuerit, aliis acescit, aliis in nidore vertitur, priusquā probè concoctū corruptionē temperet. In quib. utiq; primum cacochymia pars evacuari debet: atq; inde sumendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia: quæ ubi probè fuerint cōfecta, conferunt ad boni succi generationē. Porro ptisana, ex sua propria natura boni quidem est succi: verum interdum unā cum iis succis, qui excitāt mordicationes corrūpitur, atq; ipsum auget symptoma.

CAPUT XIII.

Cæterum cacochymia, nō temperando, sed id quod mordicat educendo, mordicationes sanāt. Ac proinde, donec vacuētur, hominē mordicare non desinunt: & insuper evacuata, in partibus asperū sensum relinquūt, aliud medicamen desiderantem: quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi existunt chondrus, lac, atq; ptisana, quæ in id genus affectib. & edenda præbemus, & per sedē injicimus, ubi aut melle, aut quopiā ejusmodi, quod infestabat exterferimus. Quo tempore opportunus est & adeps, & ceratum dulce, & oleum dulce. Quatuor itaq; indicia, cum possis quod per se leniens est distinguere, ab eo quod per accidens, facile cuiusq; talium medicamentorū facultatē invenies. Primum indicium est, an statim mitiget, an non. Secundum, an simul cum lædentibus evacuetur, an nō. Tertium, an asperitatem quandam in corporib. ipsis relinquat, an non. Quartū, an nō ita affectis commodum utileq; videatur. Nam cum nec p̄tinus mordicationē sanat, nec intus leniēdo remanet, molestamq; asperitatem parti affectæ relinquit, quam, si denuō offeratur, exasperat: argumentū est rodentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ, ex accidenti tamen quandoq; morsus sanare. At quod cōtinuō mitigat, & nullā excretionē provocat, sed nec exasperat dum intus manet, imō exasperatorū medela existit, ipsum quidē natura bonū est: verum interdum à cacochymia quæ ipsum alterat corrumpitq; mordax efficitur.

CAPUT XV.

Lavanda porro est nō modò cera, sed pix, resina, & oleū, omniaq; breviter, quæ cal fieri & fundi cum possint, aquæ misceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta, in vas latioris orificii & magnū, cuiq; insit aquæ copia qualitatis expertis infundito. Dein tundito & frangito, manibusq; impēsē subigito. Postea effusa priori aqua, rursus q̄ abluatur excalfaciēs, in aliā æquē synceram aquā injicito: rursusq; in aliam & aliam, donec aqua nullā ex eo qualitatem recipiat: q̄ quidē gustu datur cognoscere. At si quæ sunt lapidosa & dura, & cadmia, & æris squama, & æs ustum, ea cōminuentē exactē in tenuia plurimū terere in aqua fontana & purissima oportet, idq; sæpius aqua priori effusa, aliaq; denuō instillata, donec nihil in eo innatet, maneatq; aqua prorsus à contriti medicaminis qualitate immunis. Sic itaque abluta omnia quæ elui possunt, expertia mordacitatis redduntur. Ac præter id sanè, oleum etiam candidius redditur: mitius tamen id verberari, quàm alia, debet, ne videlicet adeo ipsi aquæ misceatur, ut ægrè postea secerni possis.

CAPUT XVI.

Oleum aut quod immaturū nō fuerit (hoc. n. *Oleum omphacinum astringit.*) nec præparatū sale, nec recens, ac veluti etiam nū fervens, ad hæc adamussim lorū, id neq; epotū, neq; infusum, excitabit mordicationem. Quod si guttur ad tussis imperum p̄vocet, nō idcirco mordax dicendū erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tussim incitat: non tamen quicquid ad tussim incitat, existit mordax & acre: cum & pingua movere impetū ad tussim appareant. Sequitur itaq; si quid nō cieat ad tussim imperum, id haudquaquā mordax existere: nō tamen perinde cōstitit, quicquid ad tussim impetum moveat, cōtinuō mordax esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus propositiones: quod scilicet ex duabus universalibus affirmativis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conclusio ex necessitate sit vera.

CAPUT XVII.

Natura hominibus sternutandi vim indidit, ut præsidio ipsius, quæ in naribus infesta molestaque sunt propulsarent: tussendi verò, ut quæ in gutture. Contingit autem hæc affectio dupliciter: aut resiccata exasperatæ, quæ in arteria est mēbrana: aut à melato corpore, inæquali reddita. Hinc sive panis micula, aut alterius cuiuspiam edulij, nobis invitis in spiritus meatū decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus affatim ipsius potus quippiā eò influat, similiter ad tussim cōpellimur. Percolatur tamē per asperā arteriā perpetuò in pulmonem ipsius potus tā exile quippiā, ut protinus ab instrumentis raptū, perfacile quocunq; distribuatur, nec animal ad tussim irriter. At ubi vel id ipsum plusculum, vel aliud quodpiā seu liquidū, seu solidū corpus, per asperam defertur arteriā, jam inde tussire est necesse donec à spiritū vehemētia molestū id excutiat. Mordacia itaq;, gutturis exasperatione: oleosa verò & pingua, illitu, inæqualitatē, & ad tussim impetum faciunt. Spiritus siquidē in eminentia quædam impingēs, efficit inæqualē concussionem in gutture, ad tussimq; animal provocat. Cæterum non eo inficias, ex oleis esse mordacitiam pleraq;, qualia tum salsa, tum recentia videntur: atq; hæc quidē non p̄pria essentia, sed quod omnibus plantarū succis geminū excrementū insit, alterum crassius, tenuius alterū. Quæ ambò cum reperiātur etiam in oleo, ad cōcoctionē & discretionē tempus sanè postulant. Procedente verò tempore, quod crassum quidē est nuncupatū amurca, subsidit: quod verò tenuius & veluti aquosius & ipsum compositū quodammodo est, ex acri scilicet essentia, & tenui serosa.

CAPUT XVIII.

Cæterū serosum istud rufi coloris est, à cra illo scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsū, tū minimè mordax, tum candidū sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementū secretū fuerit, candidius & dulcius reddetur. Separatū aut ipsū, aut insolantes oleū, cōchisq; attollētes in altū, aut vasculis in quibus est oleum, calidos subjicientes cineres, aut olivarum nucleos, aut frumentū circa ipsa apponētes, aut deniq; medicamenta in vasa ipsa injiciētes. In summa, quod aqueum est consumūt: reliquum verò

*Olei dulcis
natura &
vires.*

reponunt. Tale igitur oleum, si salis expers, lotumq; sit, medicamentorum omnium minimè mordax erit, maximeque humectat & mollit, si nec summè frigidū, nec calidū applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla quoq; necessario mordacitas inest. Frictio itaq; ex oleo, magis quā sicca, lassitudinē tollit: emollitq; corpora, cohibens ocludensq; quicquid ē nobis foras effluere est natum: haudquaquam digerens & exiccans.

CAPUT XIX.

*Frictionem
ex oleo quidē
aqualet, sic-
cam vero in-
aqualet.*

Quæ autē ex oleo fit frictio, prorsus æqualis existit: inæqualis verò quæ sicca. Cutim siquidē per siccam frictionē manus coadducūt, ac veluti duplant, violenterq; ac præter naturam cōplicant. Deinde ubi non amplius prior veluti duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atq; ad continuum revellitur: manus autem semel ac uno impetu in alteram cutis partē transeunt, inferiorem transgressæ ipsius duplicationis partem: ac proinde inæqualem, duram & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod si lævis lubricaq; exactē sit cutis, nec duplicari facile poterit, nec inæquabiliter admittere ipsos manuum decursus. Quare externo aliquo medicamento indiget, quod rugas impleat, manibusq; lubricitatē cōciliet: quas ad res oleo nihil aptius invenias.

CAPUT XX.

*Oleum frictio-
nibus accom-
modatissimū
esse.*

*Oleum expe-
riundum esse
in hominib⁹.*

Cum autem liceat in hominibus de ipso oleo periculum facere, nescio equidem quānam occasione ducti cōplures veteres, ad diversa alia veruntur, ut illius facultates explorent.

CAPUT XXI.

*Experiendi
rationes di-
versæ.*

At recta experiundi ratio, in primis quidē ea est, quæ in corporibus sit temperatis: dein ea quæ in intemperatis: mox, ut sæpenumero antea monuimus, quæ in simplicissimis sit, hoc est, calidis, frigidis, humidis atq; siccis affectibus: distinguen-
tibus semper nobis id quod per se fit, ab eo quod ex accidenti. Curandum etiam est, ut oleum de quo experimentum sumitur, alienæ qualitatis sit expers; id quod est in omni medicamento observandum. Si igitur ita oleum adhibeas, manifestē cōperies, refrigerarē ne, an sit calfacere natum. Atq; hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum quod perficitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ardore tenentur, tantum abest ut à calore liberentur, ut etiam magis & æstuent, & processu temporis calidiores evadant. At agentibus ex olei in unctione, perspicua nulla aut noxa, ut utilitas conspicietur. Ex quo liquet, calfacere quidem ipsum, non tamen admodum, nec evidenter, ut resina, pix, & bitumen, quæ videlicet spontē fluūt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inungi nō possumus, sic nec simplicia, nec spontē nata medicamēta existunt. Cæterum in ardoribus, si salis sit expers oleum, perfundaturq; frigidum, nonnullum sanè solatium affert. In erysipelatis autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile fiunt fluxionibus, quantumvis sit frigidum, vel maximè lædere est natū. Quæ verò ex sanguine fiunt

*Oleum calfa-
cit quidem,
sed non evi-
denter ad-
modum.*

*Oleum quib⁹
si noxium
fluxionibus.*

*Oleum & de-
tur calorem
parem eis
quibus appli-
catur accen-
dere.*

misto cum bile, eas fluxiones minus aliquantulo affligit: videturq; calorem parem eis quibus applicatur, accedere: quandoquidem modicè calida, calfacit mediocriter: immodicè autem illa, quæ magno ardore æstuat.

CAPUT XXII.

Igitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipiētia principium partim similiter nos recalfaciūt, partim valentius. Atq; ex iis sanè quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleum esse mihi videtur: ac proinde nec cōvulsionēs, nec tremores, nec sensum tum difficile, tum deperditū magnoperè aut juvare, aut lædere potest, nisi ascititium sibi comparit calorem, tunc siquidem plurimum proderit. Unde meritò veluti materia quædam cæterorū medicaminū fuerit. Nam si frigida illi commisceas, frigidū efficiet quod mistū erit: sin calida calidū. Quippe quod ex media temperie est, utrisq; summis inservit. Porro non calfacere oleū hac ratione quis dixerit, quod caliditatem quam reperit, non augere, sed conservare videatur.

CAPUT XXIII.

Calfacere itaq; nos dicuntur, & quæ energia, si ve actu, sunt calida, ut ignis: & etia quæ potestate. Hæc tamē partim alimēta sunt, partim medicamēta, partim tegumenta. Sed & calidū actu est, quod simpliciter calidū est, ut ignis: & quod per exuperantiam, ut animal: et quod ad sui generis symmetrū comparatur, & quod ad quidvis obvium. At quod potestate dicitur, primo quidē distinguitur ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidem habet significationū differentias, quot actu calidum. Etenim cum sit veluti quædē apta materia ei quod est actu calidū, partim ad ea quæ absolutè calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei deniq; & ad obviū quodvis collatum, propria fuerit materia. Quocirca cum ea calida quæ ad hominē referuntur expendimus, ut alia omnino omittātur, æquum existimamus.

CAP. XXIII.

Accidit autem fortassi oleo, ut tanq̃ alimentum nos calfaciat, ubi intrò in corpus assumitur: cum pbatis medicis quibusdā videatur, sicut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositionem. Accidit etiam illi, ut tanquā medicamē, sit mediū inter nos calfaciētia & refrigerātia: tum ut ipsum nos veluti tegumentum excalfaciat. Nam quemadmodū vestimēta à nobis excalfacta nos excalfacere cōsueverūt. ita & oleum. Et quemadmodū illa excalfaciēte corpore calidiora minimè evadūt, ita quoq; neq; oleū. Mediæ si quidem aeris nos ambientis temperaturæ similis est, tum qui à vestimētis, tum qui ab oleo proficiscitur calor. Quamobrè tum vestimenta ipsa, tum oleum, calfacere nos non propriè, sed per abusum dicuntur, quod frigori obstant. Quem admodum si duos æquè temperatos adolescentes, qui contingantur mutuò, sese dixerimus calfacere, tamen si haudquaquam excalfaciant, sed duntaxat arceant frigus ambientis. Quæ enim similia undequaq; corpora sunt, à se mutuò nullam mutationē accipiunt. Respondet itaq; calidiori aeri pyrethrū, & piper: moderato, autem, oleum & pinguitudo: actu tamen aeris sunt calidi, potētia verò, medicamenta. Siquidem à nobis accipientia excalfactionis principiū, partim nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim minus. Oleum igitur ex genere eorū, quæ æquè recal-

*Medicamē-
ta faculi-
calida, q̃
modo calfa-
ciant.*

*Oleum ef-
fusi mat-
reliquora
medicamē-
num.
Mediū
perie, ut
extremū
servit.*

*Calfacere
nos quæ
cantur.
Calidum
cultate
actu, ut
quotupla-
ter accipit-
tur.*

*Oleum
refarian-
citur non
facere.*

*Vestimē-
ta nobis cal-
facta, nos
faciunt.
Oles cū
stimentia
latio.*

*Oleum
fles non
priè nos
faciunt,
obstentia
frigori.*

*Similia
pora à se
tuò nullā
mutatio-
nem accipiunt
Medicamē-
ta quomodo
nos calfa-*

recalfaciunt nos, existens, duplici ratione ut ex cal-
facere videatur evenit, q̄ nimirū instar vestimen-
ti, aut muni mēti illinatur: & quod meatus infar-
ciat, prohibeatq; foras effluere magnam vaporosi-
tatem in us calorē partem. Hac ratione, quos largius
sudare volumus, nō protinus iis ab initio admo-
vemus oleū. Verū eos quidē qui morbo labora-
rūt, ubi sudare inceperint, tū ex calfacto perfun-
dimus: eos verō q̄ etiam nū laborāt, ubi abundē
jam satis sudaverint. Porro sanis quavis occasio-
ne exhaustis, inungi & ante sudorē permittimus.
Verū quibus cruditas inest, aut corpus laborat
plethora, his neq; in balneo inungi concedimus.

CAPUT XXV.

Quemadmodū inter calfaciētia, & refrigeran-
tia, sic oleum mihi inter humectātia nos, & sic-
cantia, medium esse videtur. Atq; humectat qui-
dem aqua: exiecat verō tum laurinū, tum cedri-
num oleum. At expers qualitatis alienæ oleū, ta-
lem servat nostrā temperiem, qualē scilicet acce-
pit, vaporosas omnes expirationes vel maximē
prohibens. Quod si plusculū membra oleo fri-
ces, cōparabis ascititū calorem: qua ratione las-
sos nō parum juvabis, q̄ videlicet in minutos cor-
poris meatus pingue ingrediatur, ac si quæ dura-
ta sunt, molliat: & quod acré & subtilem humi-
ditatē, quæ latebat sub cute, per habitū digerat.
Nam cum in lassitudine similes quidē anima-
lis partes siccēt, spaciola aut vacua, tenui, acri,
& mordaci humore impleāt, ea certē corpora
remediis indigent, quæ & siccitatē irrigent, & hu-
morem acrem discutiant. Cui negotio aqua per
se sufficeret, si inhærere posset corporibus. Quia
verō facile diffluit, ob id nimirum illi cōmodissi-
mē oleū miscetur: maximeq; ex utroq; frictio au-
xiliatur siccis æqualibusq; corporib. cum ipsius
olei ratione diutius aqua adhærescat. Quare hu-
meccantiū, & exiccantiū, sicuti calfacientiū atq;
refrigerantiū, oleū veluti materia existit. Nam si
exiccanti cōmisceas, totum effeceris exiccās: sin
humectāt, & ipsum humectans, ea plerunq; ma-
gis q̄ antea reddideris: ut in aqua exēplo docui-
mus. Cum itaq; omnibus quæ sibi cōmiscantur
subserviat oleū, recta ratione veluti omniū ma-
teria existit: nam licet eorum necessariō propriā
actionē retundat, ac minuat, nō tamē utilitatem:
imō est ubi tam quoq; adaugēat. Quippe cōtusa
cum oleo aqua, magis auxilio est lassitudinib⁹, q̄
si esset sola: non sanē quod intendatur virib. sed
quod iis quibus opus est, diutius inhæreat.

CAPUT XXVI.

Quod aut, nisi mediam habeat temperiem, id
quod ea quæ primariō affectib. auxiliatur veluti
devinciet, sæpenumero ipsorum repugnabit a-
ctionibus, generatim quidem ex ipsa rerum om-
nium natura: speciatim aut, ex medicamentorum
historia licet addiscere. Etenim generatim, quo-
niam id quod miscetur, si in cōtrarium retrahat,
admisti sibi facultatem medicamēti vincere in-
terim poterit, & in alterā planē speciem id quod
ex ambobus miscetur, transferre. At speciatim,
sic etiā ad ipsum cognosces. Nam si ex calfacien-
tium resiccantiumq; medicamentorū cuiuspiā a-
quam miscere velis, non modò nihil eorum quæ
agere nata est, fieri videbis, sed omnino obscura

tam esse, perinde ac si admista nō esset. Omnino
ergo constat mediam obtinere temperaturā de-
bere, quod utrisque extremis tanquam materia
inserviet. Quem in ordinem si oleum statuat, u-
tique nihil peccaveris.

CAPUT XXVII.

Cum igitur oleum veluti media quædam ma-
teria sit medicaminum calfacientiū atq; refrige-
rantium, constetq; tantum ex oleo & rosæ rosa-
ceum (quod saltem exactum & simplex est) uti-
que & ipsum talis temperaturæ fuerit, qualis ro-
sarū succus existit. Quare illos qui adustione tē-
tantur, experieris ab eo refrigerari, protinusque
aliquam utilitatem percipere: qui verō refrige-
rati sunt, omnes lædi. Non tamē valida in ipso
apparebit refrigeratio, sed quæ in primo refrige-
rantium gradu collocari mereatur.

GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum facul-
tatibus, lib. III.

CAPUT I.

Corporum unumquodq; aut calidū, aut
frigidum, aut humidum, aut siccum, & di-
citur & apparet, interim quidē ex sua na-
tura, hoc est, primariō, & per se: interim aut ad-
ventitia qualitate assumpta, quod est per acci-
dens. Porro eorū quæ propria sua natura calida,
aut frigida, aut humida, aut sicca dicunt, quædā
actu sive energia talia existunt, quædam poten-
tia. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud qui-
dem absolutē est calidū, frigidū, humidū, sic-
cū, veluti elementa: aliud excessu, ut homo, e-
quus: aliud ad symmetrum, seu generis sui, seu
speciei, ut leo cum homine cōparatus, homo au-
tem ætate florens cum puero: aliud ad quidvis
obvium, ut Dion ad Theonem. Quin & corpo-
ra quæ potētiā talia aut talia dicuntur, unūquod-
que ut ad id quod est actu relatum dici necessa-
riō monuimus: id quidem quod facile acceditur,
ad id quod actu est absolutē calidum: hoc verō
quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiā.

CAPUT II.

In eo igitur corpore periculū est sumendū, ad
quod unūquodq; tale & est & dicit: a cæteris aut
recedendū. Elementa nanq; huiusce tractatio-
nis, in primariū quatuor qualitātū, videlicet cali-
ditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis co-
gnitione cōsistunt. Porro alimentū a medicamē-
to differt, quod hoc quidem alteret in qualita-
te, illud autem substantiæ corporis assimiletur.

CAPUT III.

Verū cum duplices sint in genere alteratio-
nes: aliæ specificæ, quæ propriē sanē & primariō
dicuntur alterationes: aliæ verō quæ cōtundunt &
cōtrahunt corporis nostri particulas, quas utiq;
per abusione potius quā propriē alterationes
cognominant; in primo sanē genere cōtineri vi-
res medicamentorū censem. Nec enim quic-
quam mutari ex specie in speciem possit citra
excalfactionē, refrigerationē, humectationem,
& resiccationē, etiam si cōstringatur, contunda-
tur, cōvulneret. Dico aut mutari ex specie in spe-
ciem, veluti cum ex pane fit sanguis, aut ex hoc
caro

*Qualitates
specificae quae
sunt, et cur sic
dicantur.*

caro. Itaq; nō ab alio q̄ a calore, frigore, humiditate, siccitateq; specificas alterationes singuli corporis affectus accipiūt. Quia ratione quatuor earum qualitates elementares, primae & specificae nominantur. Earū igitur q̄ unūquodq; medicamentū in mistura pollentem sortiatur, investigamus.

CAPUT IIII.

Cum autem totius naturae respectu bifariam unumquodq; dicatur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, partim absolute, ut singula elementorum: partim per exuperantiam, ut homo, equus & bos: minimè profectò nos medici investigamus, an in aqua marina humidi simpliciter plus sit quàm sicci (id enim clarè cōspicimus) sed an corpus humanū facultate sua aequaliter resiccare valeat. Cujus sanè rei sumemus periculum, si eam admoveamus corpori, per fomenta aut emplastra: id quod ex accidenti, ab eo quod propria medicamentū vi proficiscitur, distinguentes.

CAPUT V.

Cæterū quod per exuperantiā dicitur, id philosophi accipiunt dupliciter: aut enim secundū substantiæ molem, aut secundum qualitatum effectum. Atq; hi quidem calidum vincere in omnibus plantis, pronunciant, ob incrementa earū & germinationes id judicantes. Quibus sanè, cum de tota natura scrutentur, rectè hæc & similia alia dicuntur: medicis aut nō rectè. Siquidem nulla planta, quod planta sit, calida dici debet, sed quod hominē calfaciat. Sic enim & salamandrā, & cicutā, ad hominē frigida esse dicemus: quia ratione sunt alia omnia etiā dijudicanda. Nam cicuta nō modo sturnos non refrigerat, & enecat, uti nos, sed alit quoq; ob idq; nimirū etiā & calfacit. Insunt quippe omnib. rebus amicitiae quaedam, & qualitatum pugnantiae. Præterea quod familiare est, promptissimè assimilatur: quod verò contrarium, ad internecionem ducit, tum animalia, tum plantas. Cæterū familiaritates illæ, a totius substantiæ proprietate exoriuntur. Porro cum acetum & rosaceum nos primariò & per se refrigerent, nemo ea calida dixerit.

CAPUT VI.

Quod applicitū nobis videtur actu esse calidū, eodem gradu quo nos, aut ex contactu similiter calidū redditur, id ex media est temperie, nobiscū collatum: ac per se etiam calidum secundum exuperantiam, quemadmodum nos. At si quid nōdum adeo calidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcunq; in eo caliditas exuperet: ac proinde admodum, nostrum calorem minuet.

CAPUT VII.

Ea autem est cōmunis alterabilitū corporū omnium natura, uti in se agant & patiantur admodum: quodq; minus est calidum, a magis calido calidius reddatur: quod verò magis calidum, a minus calido remittatur. Nam id vel ex ipso tactu clarissimè discas. Etenim eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse videntur: calidiori quidē facto, frigida: frigidiori verò, calida. Quæ sanè causa est, ut in balneis quidem frigida videatur nobis urina, foris verò calida: cum tamen semper ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigemus frigare, aqua ex puteo profundissimo hau-

stam, calidam judicamus: quæ eadem nobis in balneo, aut balneum egressis, apparet frigida. Itaq; tactum calidi frigidiq; dignoscendi normā ponentes, atq; ejus dispositioni cuiusvis judicium omne tribuētes, meritò sanè crebrò fallimur: ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidū esse dicamus: quod verò calidum ex se nō est, id calidum pronunciemus. Absolutè autē & urina & aqua putealis, qualis ad nos optimè temperatos, atq; ab aliena qualitate immunes videtur, talis profectò & est, & dici etiam potest.

CAPUT VIII.

Cum igitur nec an absolute unumquodq; calidum sit ut ignis: nec an per exuperantiā, ut sanguis: nec denique an cum symmetro sui generis aut speciei collatum, considerare nobis propositum sit, sed an ad hominē sit tale vel tale: nec rursum ad hunc, tanq̄ id quod ad aliquid aliud comparatur: sed an ad motum ipsi, eam partē quam tetigerit, reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē: certè in experientia omnis judicandi & dignoscendi cōsistet ratio: per quam nimirū docemur, & rosas (exempli gratia) & rosarū succū evidēter refrigerare.

CAPUT IX.

Sive enim in iis qui inculcata sanitate fruuntur, sive in iis qui laborāt simplicissimo affectu, videbitur tibi planè oleū quidem in media temperie existere: quod verò cōponit. ex ipso rosaceū, ex primo esse ordine refrigerantiū. Siquidē rosarum succus frigidioris naturæ est q̄ oleum: sed nō ita multò, cum tepidam quandam in se caliditatem possideat. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem quidem tepidum attinet, linospermum: ab eo tamē haud minimum tenuitate relinquitur. Nam rosarū succus est exquisitè tenuis essentiae: proinde q̄ celerrimè arefcit, odoresq; aliorū unguentorū exolvit. Est & chamamelum tenuitate quidem rosæ persimile: calore verò, ad olei vires magis accedens, homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut si quid aliud, in primis cōfert, doloresq; sedat. Præterea tensa remittit & laxat: mediocriter dura emollit, cōstipataq; rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris inflammationē infestāt, cōcoctas discutit ac dissolvit: & potissimū quæ ex cutis densitate & humorib. biliosis pveniūt: ob idq; Soli a sapiētissimis Aegyptiorū est cōsecratum. Est aut hypochondriis gratissimū. Quibus etiā lini semē est gratū, minus tamē q̄ chamamelum, cum & minus calidū sit, & essentiae crassæ. Cæterū ad ascensus, augmentaq; inflammationum, chamamelo rosaceum præfertur, cum hæc tepida caliditate cum levi astrictione indigeant. In principio siquidē, quæ refrigerant atq; astringunt: per incrementa verò tepida, & mediocriter constringentia: at in vigore ac statu inflammationum, quæcunq; tum moderatè calfacere, tum laxare possunt, magis cōpetunt: sicuti in declinationibus, quæ valenter calfacereq; & discutere.

CAPUT X.

Cæterū quæ mediæ temperaturæ sunt, & quæ utramvis in partem declinant leviter, interim calfacere videbuntur, rursusque refrigerare: interim talia servare corpora, qualia in principio accepe-

*Tactum
bere esse
omnis al
qualitatem
munem
sensibili
rectè iudicatur.*

*Medicamentorum
familiaritates in
modum
minimè
medicamentorum
Rosas rosarum
evidentè
refrigerant
Oleum
medium
perie.*

*Rosaceum
se ex primo
refrigerant
tuum or
Rosarum
cuius tepiditas
quandam
laxitatem
facit, odore
que aliorum
unguentorum
exolvit.
Chamamelum
facilitat
signes.*

*Chamamelum
Soli ab Aegyptiis
prius est cōsecratum
Linospermum*

*Inflammationes
quales
medicamentum
ita desiderant*

*Salamandra
est frigida respectu hominis.*

Cicuta sturnos alit & calfacit.

Consensus quosdam & discrepantias qualitatum inesse universis rebus.

Familiaritates unde exoriantur.

Media temperie prædictum, quomodo cognoscatur.

Alterabilitas omnium naturarum quæ sunt.

Urina cur aparet nobis frigida in balneo.

Putealis aqua cur aparet rigens & frigida.

acceperunt. Nec mirum sanè, cum aqua tepida, *in balneo* urinaq; in balneis quidem frigida, algentibus *la.* verò calidæ appareant. At rosaceum, oleo quidem minus, succo autem rosarū magis existens *ceum re* calidum, refrigerat sanè exustos, idq; suæ caliditatis tēpore: algētes verò, paulatim etiam exalfacit: qui effectus etiam caloris est tepidi.

CAPUT XI.

Quocirca si aut refrigerantibus medicamentis aut calfacientib. rosaceū indideris, sicuti necio *enda* magnoperè obfueris, ita nec admodum profueris. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadē curare potens. Siquidem quod curari debet, tanq̃ quod ab immoderatione ad symmetriam reducitur, non id quod propè temperatum sit postulat, verum id quod contrariam habet temperaturā, & æquē recedentē à media. Etenim si quod curari desiderat, multò frigidius sit, necessariò oportet quod ipsum curabit, multò etiam calidius existat: *aperiē* *edio-* *d com-* *g* *ue à* *rece-* *rafi-* *bulat.* paulò frigidius, paulò etiam quod curabit calidius erit: ac de cæteris intemperaturis, pari iudicio. Porro si exquisita utamur nominū appellatione, quod medium in singulis est, id eucratum sive tēperatum dicemus: quod aut ab huius excedit modo, si ad calidius quidē, tum plus, tum minus calidum: si ad frigidius, plus minusq; frigidum: nec de aliis alia ratione. Quandoquidem igitur corpora humana, tum iis quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tum iis quas ab ætate postea acquirunt, tum iis quæ ex vitæ cōsuetudine adveniunt, plurimū inter se differunt, ab iisdem ea medicamentis variè alterentur necesse est.

CAPUT XII.

Medium ergo horum mihi quempiā intelligas, qui & natura sit temperatus, & moribus & consuetudine convenienti, hanc ipsam eucrasiam tueatur. Deinde hos tres optimæ temperaturæ scopos concipiens animo, secundum corpus illius, veluti secundum regulam quandā, vires omnium medicamentorū explores. Quodq; simile illius temperiei caliditatē accendit, temperatum vocetur, etiam si vel maximè excalfacere senem refrigeratū videatur. Quod verò calfacit aut refrigerat corpus ejusmodi, illud quidē calidum, hoc verò vocetur frigidū. Esto autē ipsorum excessuum ordo, ad frigidum quidem primus, cuius esse dicas rosaceū: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc tertius & quartus, quoad sermone ad frigidissima pertigerimus, nempe cicutā, succum papaveris, mandragorā, hyoscyamū. Rursum ad calidum, anethū quidem & fœnumgræcum, prima: secunda verò deinceps, tertiaq; & quarta, donec ad exurentia perventū sit. Adeundem modum in medicamentis humectantibus & exiccantibus est ineundum iudicium.

CAPUT XIII.

Verum omnia propemodū medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen cōposita sunt, diversissimaq; in se facultates possident, excernendi, sistendi, incrassandi extenuandi, atque alias id genus universas oppositiones. Nec mirum id esse debet, cum uni eidemq; medicamento, vim calfaciendi & refrigerandi esse appareat, aut exiccandi humectandiq; Quæ primæ

efficacissimæ virtutes nisi hoc pacto cōplicarēt, haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter cōplicatæ forent. At si nos ipsi rhu succum melli misceamus, quod ex ambobus cōficitur, astringendi simul & abstergendi vim possidet: sicuti & cohibendi ventris, atque laxandi. In lacte aut duas esse facultates, nempe sistendi ventrem atque evacuandi, nō item cōcedimus: tamen si caseus quidem secretus, ventrem sistat, serū autē resolvat.

CAPUT XIII.

Quod verò & brassica duas easq; contrarias in sese facultates obtineat, neq; id quidem promptè cōcedimus. Nam tamen si succum eius planè aut solum, aut ex melle purgare cernamus, attamen quoniā quod reliquum est, edere minimè possumus, astrictoriū esse id diffidimus. Quanquā si bis tēve aut quater elixam, ipsam brassicam edamus, cōperiemus sanè, succum eius qui in aqua fuit relictus, purgare: ipsam verò ventrem astringere. Eadem est ratio in beta, lente, atq; in iis quæ testa p cute integuntur: ac breviter in omnibus ferme illis, quibus sapor aut acris, aut salus, aut nitrosus inest. Gallorū etiam veterū jus, ventrē subducit, tamen si caro eundē sistere possit. In æris autem squama, sicuti duplex qualitas, ita gemina quoq; facultas inest: nā & astringit & mordicat: ceterum si intra corpus sumat, purgat quidē ventrem, verum non cohibet. Quippe vincitur eius astringendi facultas, ab acri purgatoriaq; potentia, quemadmodum si rhu succum scammonæ commisceas. Sic enim cum mālī cydonii carne, aut cum alio quopiam eorum quæ & astringentia & grata ventriculo sint, non pauca purgatiū medicamentorū dum mista exhibentur, gustum quidem fallunt, at effectu solo quid valeant cōmonstrant. Persæpe siquidē lingua à materiæ victa est copia: at actio, pro facultatis robore, viribusq; perficitur. Itaq; cum substantia exigua quidem, sed validis prædita viribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidemq; imbecillæ, corpus ingreditur, gustū quidem fallit, attamen effectum, q̃ illa, efficaciorē exhibet. Porro si ab aloë quod purgat, ab eo quod est astringens, eluatur (id quod fieri potest p exactam lotionem) tunc certè aut debiliter, aut planè nihil purgabit: id quod usu etiam venit æris squamæ, æriq; usto. Jam verò ipsius quoq; qualitatis medicaminosus sapor, primo statim gustu facultatis missionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas unicuiq; gustu astringentiū medicamentorum inesset, haud sanè inter ipsa, alia esui apta, alia medicaminosa existerēt, sed tantū intensio- *Caseus sistit ventrem. Serum alvū laxat.* *Brassica bñ tēve elixa succum ventrem solvere, ipsam autē suppressere.* *Gallorum veterū ius ventrem subducit, caro autē cohibet.* *Aloë lota aut nihil aut parum purgat.* ne aut remissione astrictionis differrent. At non ita res habet: cū videamus æris squamā mālō cydonio astringentem min⁹, gustu tamen eo longè insuaviorem existere: q̃ gustus absurditatem proficisci à vehementia astrictionis, dicere id quidē nō possumus. Si itaq; ut astrictio, ita etiā astringens unum perpetuò esset, sanè unum quoque perenniter ejus esset opus. Verum cum præter astrictionem insuper alias qualitates, neq; paucas, sortiatur, semper quidē omnibus illis ager: sed evidentius alias per aliam, nempe vincentem: idq; ut ad corporis cui admotum est affectionem. Astringens igitur hac ratione, non est.

Astringens non esse contrarium purganti. Rose partes quaternae.

Succos alios acescere, aut computrescere: sola autē, oleum, mel et vinum, in longum tempus durare.

Rosarum succum afferēdi ratio.

Summitates frangunt contrariorum mixtura.

Similarium inter se ac dissimilarium differentia unde nascantur.

Linguae secundum diversas partes a diversis saporibus affici.

Lipyrice febres. Hepiala feb.

Saporum qualitates afficiunt reliquas etiam partes, ut lingua licet non perinde ab eis percipiatur.

ei quod purgat contrariū: quanq̃ si quis illa esse cōtraria statuatur, nihil inde absurdū sequetur. Etenim in rosae succo, aliud quē gravissimū est amurcæ & faci proportionale: aliud levissimū, & ipsū p̃portione respōdēs flori in quoq; succo supernatanti: aliud tertiū, quale est quod in musto fervet: ad hæc quartū, ipsum videlicet purissimū ac syncerissimū, cuius hæc tria excrementa existunt. Evenit autē alios quidē succos aut acescere, aut corruptos putrescere: sola verò, oleum, mel & vinum, in longū tempus durare. Quare nec per ebullitionē, nec per secretionem in aliis succis, has excrementorū differētiās invenire perspicuē licet: verum protinus ab initio coctione quadā illis est opus, aut saltē alicujus perdurantis succi mixtura. Nam si rosae succū melli misceretur, aut totas rosas ei immergentes, reponimus. Cum autē rosa nō astringēs modō, sed etiā dulcis atq; amara gustanti appareat, satis apertē ostendit, se habere illorū succorū quatuor miscellam. Quinetiam vel ex hoc tantū, quod non extreme astringat, aliorum quoq; saporū mixturā intelligere in ea possemus. Quippe si dolor sapor austerus illi insit, summus itidem fuerit: quo modo si sola corpori cuiuspiam caliditas summa infuset, id ignis utique foret: at si nō sumus, sequitur quod neq; etiam solus. In universum enim cōtrariorum mixtura, summitates ipsas frangunt.

CAPUT XV.

Atq; in similaribus quidem corporib. calor, frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares differentias efficiūt: in dissimilaribus verò acrimonia, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritudines, salsedines, aquositates, & pinguitudines. Quare unūquodq; corporū similarium, hoc est, quæ non ex diversis substantiis constant, in ipsis partibus non multas, sed unā ex his qualitatem obtinet: quod verò totū est dissimilare, cōplures: quarū hæc quidē astringūt, hæc laxāt, aliæ aliam facultatē ostendunt, sic ut omnes quidem linguā partibus diversis, pro contactus ratione afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod primò affectum est, in totam eam quam celerimè diffundat. Cujus simile in trāquillis aquis videre licet. Nam si in duas eius partes duos conijceris lapides uno eodemq; tempore, ij sanē duos efficient circulos, q̃ mutuò p̃ sese ferentur, cōtrariosq; cernes in quavis ipsius aquæ particula motus. Quod si unum pedem in calidā, alterum verò in frigidā simul demittas, haud dissimile habebis etiā exemplū. Quippe in totū corpus utriusq; affectionis motus pervadit, contrariūq; invicem sibi occurrunt: id quod etiam evenire autumno in lipyriis, & hepialis febribus, nisi quod in illis nō extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisq; affectus oritur. Si verò parem absinthii portionē melli exquisitē cōmistam, linguæ imponas, simul dulce & amarum, quod ex ambobus mixtū fuerit, videbitur: cū nō alio tempore mellis saporē lingua ipsa sentiat, alio autē absinthij, sed utrunq; simul. Quemadmodū igitur ab ijs lingua afficitur, ita necesse est quanq; aliarum corporis partiū ab eis similiter affici, etiam si qualitates ipsas non sentiat. Neq; enim in patiēdo, aut non patiēdo, ab aliis linguam dif-

ferre est putandum, verum eò quod ipsam familiarium affectuū, ob exquisitā sentiendi facultatem, nihil latere possit. * Ad quod sanē non nihil ipsius conducit raritas, sic .n. succi facilius penetrant. Porro si solano & anthemide alicui parti simul applicitis, neque ita densa, dura, tensa, lividaq; reddatur, ac si solo usus solano esses: neque adeo rara, mollis, tepida & rubēs, ac si anthemide sola usus fuisses, sed dictorum mediā accipere affectionē particula cōspiciat: consentaneū certē est, utrunq; medicamentū secundū suam facultatem esse operatū, ac proinde particulā ipsam eodē tempore contraria simul perpeffam fuisse. Igitur quemadmodū mirū non est, * si a medicamentis cōpositis cōtrarii simul affectus corporibus infligantur, ita nec si a simplicibus: cū & ipsa sensui quidem simplicia appareant, natura autē cōposita sint. Siquidem quemadmodum nos in iis quæ indies cōponimus, sic natura in simplicibus ipsis, contrarios temperare succos consuevit: quorū sanē actiones, si pari facultate & portione ipsi in mixtura cōeant, evadent similes: si dispari autē, diversæ. At verò, ut astrictio quidem una res est, ita astringens, duplex. Aliud quippe summū existit, ut allumen & galla: aliud autem quod astrictionis sit particeps, ut pirum, vinum, & rosa: nam huius minimum est id quod astringit, quare medela existit inflammationum.

CAPUT XVI.

Rosaceum verò (utpote cuius natura olei rosæq; in medio est) in inflammationū augmentis, hoc est, in illarum medio, optimū est præsidium. At oleum cōmodū est, ubi inflammationes maxime vigent. Etenim per initia repellere comprimereq; influxus oportet: in vigore autem ita per halitus digerere, ut morsus absit: at in incrementis, repellere simul ac digerere. Utrunq; autē rosaceum præstare potest. Nam præterq̃ quod tenuium est partiū, levem quandam astrictionem sortitur, nimirum inter oleum & rosam existens medium. Quippe medium omne ex contrariis mixtum existit, iisq; totis per tota cōtemperatis, aut per exiguas particulas, sensum effugiētes eorum quibus admoventur. Etenim quæ magno perē austera acerbæq; sunt, primo statim contactu superficiem densantia, humorē ingredi prohibent. At quæ modicē astringūt, cæterum plurimum in se continent essentia tum tenuis, tum tepidæ, tantū abest ut præ astrictione ingredi altius corpora admotā prohibeant, ut etiam ab ea, magis scilicet impellente, juventur. Quæ autem penitus tenuia calidæq; sunt, magis digerunt humores ex corporibus quibus admoventur, quam alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt & essentia crassioris, omnino nullum introducere humorē queunt. Quæ itaq; humida, tenuia & modicē astringentia sunt, ea inter omnia humectantia efficacissimè humectant.

CAPUT XVII.

Ad hæc autem omnia non mediocriter cōfert innata nobis caliditas, & intrō ad sese attrahēs, & cōminuendo extenuans. Hinc est quod frigida deleteriaq; medicamenta, utputa cicuta, papaver, hyoscyami semen, mandragora, & alia id genus, citius magisq; in calidis naturis vim suam exerant,

Lingua sensum beat ex tum.

Simpli medicamentis affici contra naturam posita.

Adstrictio duplex.

Rosaceum do com inflammationibus.

Rosaceum cultura.

Medicamentis ex his mixtis existit.

Humores quæ per omnia cunctas caliditas condit.

Frigida leterius cunctis que in die non sunt.

exerant. Nam quū sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigeret, necessum sanè est, ut intrò cōminuta ingrediatur: id q̄ ex sua natura præstare nequeunt, crassa & inepta ad motum quum sint. Quare ascititiam caliditatē requirūt, quæ in minuta extenuet, ac veluti manu ducat in subriles meatus. Itaq; si quando ea absit, cunctantur, in maioribus hærentia meatibus, in ipsisq; fluctuantia arteriis & venis, tēporis spatio aliquid perpetiuntur. Siquidem qualitates omnes quadantenus in sese agunt. Nam & lapis ab assiduo stillicidio exacuat: gladiusq; ceram secundo hebescit. Quādiu igitur solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus medicamentis nondū refrixerint, tandiu animas sup- sit, est necessariū: refrigerari aut nequeūt, prius q̄ illa subierint proprios harū meatus, id q̄ sua ex natura nō possunt. Deducit q̄ppe succos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secunda verò & materialis, ipso tenuitas: qua destituta quū sint, frigidiora & crassiorū partiū medicamēta iis opus habet, q̄ præbeat. Cæterū corpora frigidiora tractū arteriarum imbecilliorē possidēt, medicamentorūq; substantias cōminuere nequeūt: p̄inde medicamēta ipsa cunctari est necesse, p̄cessuq; tēporis tū immutari, tum cōcoqui: q̄ solet succus lactucæ: q̄ si integer ad cor perveniret, non secus ac cicuta perimeret. Hæc igit & similia, nisi celeriter perimāt, nullus tandē effectus reddūtur. At quæ aut erosione aut putredine enecant, iis ut tempore vires acquirant, accidit: quū temporis spacio putrescant omnia, eoq; magis, quo fuerit humidior atque calidior locus. Merito ergo fit, ut quæ frigore suo noxā inferūt, iis actionis celeritas ad perniciē p̄ficiat: quippe quæ alioqui spacio excalfacta, vim per quā agebant, deperdāt. At quib. in putredine actio cōsistit, iis tempus actionē adauget, quoniā & putredinem. Nullum autē animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset: at fieri ut cesset nō potest, citra maximam intemperie. Cicuta itaq; hominē è medio tollit, tum ob meatuū amplitudinem, calorisq; multitudinē, tum ob validā arteriarū in attrahendo vim, usq; ad cor ipsum perveniens. Sturnos verò ob causas contrarias haud enecat, ut puta quū & retineat, & cūctet, ac sese temporis tractu concoqui, præparariq; à corde patiat: quēadmodū & in ipsis lactucis accidit, quæ moderate quidē sumptæ, alunt hominem: si verò quispiā expressum earum succū largiter hauriat, nō secus proculdubio morietur, quā qui aut cicutā, aut papaver sumpserint. Ad eundem quippe modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnos autem tarditate ipsa, nutrit. Sin aut exiguum quippiam sumatur, mortem homini haudquāq; inferet: id quod anus illa Atheniensis experimento docuit, quæ ab exigua cicutæ portione auspicata nullo detrimento ad permagnā progressa est copiam: adeo consuetudo videtur esse adscititia natura.

CAPUT XVIII.

Eorum ergo medicaminū quæ frigore interimunt, nullum genere letale est, sed sola quantitate: quū si exigua portione sumatur, mortē nō inferant. At in erodētibus, putrefaciētibus, & cal-

ficientibus, haud ita res sese habet. Ad hæc, quæ admodū frigida medicamenta, nisi calorem offendant validū, qui cōminuat atq; deducat ipsa, non perimunt: sic si quod cōminuit deducitq;, multo valentius fuerit, devincet prorsus, mutabitq;, ac alimento ut sibi sit medicamentum, efficiet.

CAPUT XIX.

Quum igitur medicamenta refrigerantia quæ dantenus à nobis accipiant suam refrigerandi vim sicuti & calfaciendi calida (neq; enim quicquā moliri possent, absq; corporis patientis auxilio) iure potestate dicuntur frigida. Nam ut actū nos refrigerent, non prorsus ex sese obtinent. Ea propter meconiū & cicuta, si cum modico eoq; minimè generoso vino bibantur, ocyus quidem interimunt. Si quis verò papaveris succum, quantus interficere potest, hauserit, ac etiamnū tamē supersit, huic largè epotū vinum vetus generosumq; & calidum auxiliabit. Cæterum quod tenui pellucidaq; substantia est, colore vermiculo aut flavo, odore gratū, quodq; multam atque mituram postulat, id tum admodum excalfacere est natum, tum facile undiq; per corpus universum deferri. Tale ergo natura vinū, ætate vetus, multū atq; impermixtū, non modò perfrigeratorum omnium, sed eorū etiam qui aut ex oris ventriculi, aut cordis dolore, animi deliquiū patiuntur, præsentaneum remedium existit.

CAPUT XX.

At eorum medicamentorū quæ erosione atque putredine interimunt, pleraq; sanè perinde ut illorū quæ potestate dicuntur calida, actu etiā calida existūt: sed idcirco nos fugiūt, quoniā aut ipsi plurimū habemus caloris, aut crassa est ipsum substantia. In balneo quippe urina nobis videtur frigida, quemadmodum argentib⁹ hyeme, aqua putealis, calida: cæteris aut frigida. In summa. n. pro suo unumquodq; affectu, admota cōsuevit sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidā, eam in tritici acervū immiseris, luculenter calorem percipies. Sin calidā nequaquā. At si columbino stercorei accumulato, potissimū colubarum sylvestrium, manum inseras, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatē. Sic mysi, fori, chalcitis, ærugo, calx, aliæq; id genus innumera, si illis acervatis manū altius injicias, protinus videbuntur excalfacere. Cæterum si bolum ex eis unum acceperis, cuius extrema superficies ab ambiēti fuerit refrigerata, meritò nullum percipies calorem. Quam ob rem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actu videantur.

CAPUT XXI.

Quæ igitur nos contactu per putredinem aut erosione enecant, ea recta quidem ratione deleteria humanæ naturæ toto genere existimantur, nō ut refrigerantia, quantitate duntaxat. Hæc. n. interdum vincuntur, & nutrimentū animati redduntur: putrefacientia autē, vel si sumantur portione minima, omnino tamē corrumpūt, quod videlicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humilitateq; putrescāt, calidus autem humidusq; sit sanguis. Proinde longo etiam post tempore quo sumpta sunt, nonnulla interimunt potissi-

mum quæ crassa terrenaq; essentia sunt prædita.

CAPUT XXII.

Eroderentia.

Interdū aut ipsa erodentia medicamēta adeo exigua sumuntur, ut excerni cū excrementis possint, prius quā injuria corpus afficiat. Interdū etiā q̄ illa sumpsit, opportunis remediis usus, asseritur. Nam ubi gravis ab iis noxa illata est, malum ipsum fisti nullis præsidii potest. Cæterum cātharides medicamētis diureticis cōmodè permiscuntur: sicuti alexipharmacis alia pleraq; letalia. Feruntur. n. alioqui spōte sua per urinā ad vesicam cātharides, ac sic rodendo illā exulcerāt, nisi ubi copia modica indūtur. Ex quibus patet, quæcunq; frigiditate interimūt, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quæ putrefaciendo, nequaq̄, quum naturæ humanæ adversentur.

CAPUT XXIII.

Cātharides cōmodè misceri diureticis.

Alexipharmacis cōmodè misceri interdum letalia.

Cātharides Vesicam exulcerant.

Medicamentis multas diversis generis substantias esse immistas

Purgantium medicamentorum discrimina.

Purgantia, ubi a natura vincuntur, talem gignūt humore, qualem dūctura erant.

Ut igitur in alimētis mistos esse varios sapes diximus, sic in medicamētis intelligere oportet, multas diversi generis mistas esse substantias: id quod invenias facile, si consideres granum cniidum solum hoc à cnico differre, quod plurimū habeat caliditatis. Porro attractio q̄ in ipsis cernitur, à qualitatū proprietatibus, quæ sunt in substantiis, perficitur. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi fortè purgatione frustrantur, quædam præterq̄ quod noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia verò in corruptionē ac venenum vertūtur. Omnino siquidē medicamentū purgans, vel cum uno saltē humorum, qui in nostro corpore sunt, si multitudinem habet: non autem perpetuò mista est vis virosa. Quamobrē nec perpetuò, licet nō purget, injuria afficiet, verū & concoctionem admittet, talemq; producet humore, qualē erat natum educere.

CAPUT XXIV.

Purgantia medicamentis esse familiaria purgandis humoribus.

Magnes ferro est specie similis, eo tamen fortior.

Cnicus est pituita similis.

Veratrū alit coturnices.

Attractio fieri substantiarum similitudine.

Similitudo differt ab identitate.

Purgantium medicamentorum differentia.

Pleraq; itaq; attractiones fiunt qualitatis familiaritate: ac p̄inde singulæ animalis particulæ familiare sibi alimentū attrahūt: ad q̄ sentētiā sequitur, medicamenta purgantia familiaria esse purgādis humoribus quodammodo efficaciora, valētioraq;: sicuti magnes ferro, quippe q̄ ad ferri naturam accedat, reperiaturq; in ferri fodinis, eiq; specie magnoperè sit persimilis: verū fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quā trahi. Cnicus etiam (quem carthamum vocant) colore quidē pituitæ similis, calore illā superat, sic ut trahere quā trahi sit p̄mptior. Ad eundē modū granū cniidū, si quando à corpore nostro vincat, vice purgationis alimentū efficit: veluti veratrū semper coturnicib. Verū enim vero quoniam attractiones, substantiarū similitudine fiunt, necessum est ut si q̄ purgat pituita est, id q̄ trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differt siquidem similitudo ab identitate.

CAPUT XXV.

Ad hæc, purgatiū medicamentorū quædam jam actu possident idoneam ad attrahendum si similitudinē: quædā ab animantis illā corpore accipiūt. Præterea in unoquoq; medicamento, permisti similibus sunt alij succi dissimiles, qui partim quidē medicamentosi sunt, partim minimè. Quare ubi purgationem haud assequūtur, quædam in perniciē, quædam in alimentū vertūtur.

CAPUT XXVI.

Cæterum ubi purgās pharmacum usque adeo invaluit, ut in vasorum ad ventrem pertinentiū osculis mordicationem apertionemq; multā relinquat, assidueq; irritans, convellensq; corpora, vasorū facultates dissolvat, vacuationes immoderate contingunt: ita, ut si quod pituitam educit medicamentum exhibitum fuerit, prima quidem omniū ipsa evacuet, dein flava bilis, mox atra, quarto deniq; loco sanguis. At si quod flavā bilem detrahat, pituita consequetur: postquam atra bilis, quartus demum reddetur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: postquam, flavam: dein pituitā, ac omnium ultimò sanguinem, tanquā ex inanimis vasis effluentē, ut q̄ summa jam imbecillitas occupet, quæq; ad extremam osculorum apertionē pervenerint. Ex quibus manifestū est, postremū in immodicis purgationibus vacuari humore qui familiarissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi existunt, aut tenues.

CAPUT XXVII.

Quum igitur vascula non amplius in se continere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neq; irritare medicamentū desinat, nec possit amplius familiarem succū attrahere, necessū est reliquos quoq; quo diximus ordine, sequi. Fit autem orificiorum apertio, ob medicamenti violentiam, ob quam videlicet mordicatio etiā provenit. Vasorum autem imbecillitas, tum ob ingentem defatigationem, tum ob intemperantiam, quæ immodicas purgationes præcedit.

GALENI PERGAMENI DE simplicium medicamentorum facultatibus, Liber IV.

Constat igitur universas corporis partes peti afficiq; ab alterantibus qualitatibus, quemadmodū lingua afficitur: sed passionum sensum nō exactè percipere: at linguā ob perfectionem quam habet sensus, posse naturas earū omniū dignoscere: tamen si passionū similitudinem invenire sit etiam in aliis partib. universis, ac præcipuè in exulceratis: quandoquidē cutis duritas densitasq; prohibet, quo minus foris incidentium facultates intrò in carnē penetrent.

CAPUT I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictū est, Ulceribus frigidum mordax: tamen si cuti prius q̄ exulceraretur, mordax nequaq̄ esset. Porro quæcunq; frigus contingit, eorū & contrahat, & condenset, & constringat substantiam, primumq; tenues tum excernantur humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea verò etiā mordax appareat, licet alia ratione, quam in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed divellendo, mollemq; substantiā in arctū contrahēdo, ac breviter ipsius partis cōtinuitatem per divulsionē solvendo, molestum, ac mordax est frigidū. Cæterū ut in his protinus contractionis cōdensationisq; sic in illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis & fusionis sensus percipitur. Ad hæc, in refrigerantibus quidē utcunq; tardior est atq; cunctantior mordacitas: in exalfacientibus verò quā celerrimè penetrat.

trat. Quam ob rem medicaminū mordicantiū, alia sanè calida facultate, alia necessariò sunt frigida. At q̄ moderatè calida sunt, quæq; temperata potius quàm calida dici deberēt, ut poculum atq; balneū, dum mediā temperiē sortiuntur, nobis grata & amica existunt. Funditur enim per ea, quod in corporibus nostris constiterat atq; concretū fuerat, unde animantibus voluptas maxima oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sensum quidē & ipsa molesta evadunt, idq; nō quod mordicatione infestent, sed quod substantiā nostram solventia digerentiaq; deliquiū animi, ac tandem mortē inducāt. Quæ autem his calidiora sunt, secant, distrahuntq; substantiā: quare necessariò mordacia videntur, ut tum aqua fervens, tum ignis. Igitur subjectam materiā contrahere condensareq; frigidi semper est propriū: fundere autem atque liquare, calidi: utriusq; verò immoderatus aucti, communis est mordicatio. Verum quæ à summa frigiditate, aut caliditate absunt, minimè cutem mordicant. Plurimum autem ad id genus affectiones facit essentia medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidē frigida quæ tenuiū partiū sunt, quum magis in profundum transeant, vehementius mordicant. Calida verò quæ crassarū sunt partium, quoniā plus ulcerant, vehementius idcirco affligunt. Tenuiorum itaq; partium aer est: crassiorum terra: medium eorū tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma: terra autem pruna: at aqua vehementem sanè caliditatē recipit, sed nec flamma, nec pruna, propter innatam humiditatem, efficitur. Siquidem flamma & pruna ignis sunt genera: ignis autem omnis, calidus est & siccus: aqua sicca ut sit, fieri nequit. Nullum autem est adeò calidum pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut aqua fervens. Procedit tamen usq; ad uestionē ipsa medicamentorū caliditas, ubi in crassa consistit essentia. Quæ verò subtiliū partium sunt calida, nonnunquam omnino nō mordicant, sed calfaciunt duntaxat. Est ubi mordicent, non tamen urant.

CAPUT II.

Porro quæ celeriter in tenuia solvuntur, tenuiū dicuntur partiū: quæ id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea solvantur, calor animalis, cui applicantur, est causa: quod in tenues crassasve partes comminuantur, id à propria natura obtinent. Quocirca refrigerantiū medicaminum ea quæ crassarū sunt partium, mordicare nequeunt, quod extimam cutis superficiem penetrare non valeant. At quæ tenuiū sunt partium, maximeq; si inæqualem temperiē sortiantur, valenter mordicant. Sed suprā demonstratum est, inæquabilia esse propemodū omnia: ubi ostenderemus, & in vino, & in oleo, quatuor reperiri succos diversos, in summaq; universa medicamenta facultatibus contrariis constare. Enimverò acetū, tametsi ingenitū vini caliditatem amiserit, ex putredine tamen sibi aliam adeptū est. Quippe vinosa vini partes, dum ipsam in acetū transit, refrigerantur: at aqueum recrementū putrescens, ascititia caliditatē acquirit, veluti quæ putrescunt omnia: sitq; acetum quiddā ex contrariis facultatibus mixtū, partim refrigerantibus, partim calidis: sicuti uestorū lignorū omnes cineres, qui ex adustione nō nullas partes igneas conservant, quas macerati

postea solent in aquam deponere. Hanc enim aquam marinæ & muriæ per omnia correspondentem, vulgò lixivium appellāt. In universum autem, quod tantum est acidū, quicquid id fuerit, planè frigidum est, eoq; uti cōtra omnes calidos affectus cōmodissimè poteris, ut omphacij succo. Qui quidem quū omnino acidus sit perfectè etiam refrigerat, uniceq; ardoribus pdest, inimicus affectionibus frigidis, quemadmodū omnia exquisitè refrigerantia. Ea aut quæ quū acida sint, habent etiam saporem quendā acrè permixtum, qualis planè inest aceto, haud dubiè non nihil caliditatis possidēt. Verum si frigiditati astrictio cōiuncta sit, aliud est frigiditatis genus. Quippe acida frigiditas tenuium est partium: at astringens, crassarum.

CAPUT III.

Non igitur sola ratione per methodos logicas nos exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo experiamur lingua, quæ namquāq; qualitatem præ se ferunt manifestissimam. Ut, si acrimoniā cogitatione complecti velis, in allio, capis, atq; his similibus, ea sæpe gustando te exerceas oportet. Sin astrictionem, in galla, rhu, & similibus. Si amaritudinem, tum in nitro, tum felle. Si qualitatem saporis expertem, in aqua immuni ab omni qualitate ascititia. Nam hinc exorsus, promptius ad aliorum obscurorū omnium saporum cognitionem pervenies.

CAPUT IV.

Sinaut qualē præbet sensum aqua planè omnis qualitatis vacua, talem in re aliqua sicca invenias, ea nimirū medium constitutionem sortietur, aut certè ad frigidius paululū inclinabit. Quod si talis quum sit in caloris & frigoris differentia, in super consistentiā nacta sit siccam, terrestris sit, ac citra morsum deficcet, est necesse. Atque huius generis medicamenta omnia, medici appellant emplastica.

CAPUT V.

Duplex autem est emplasticorum natura: alte exactè terrea & sicca: altera viscosa quidē omnino, sed ex aqua & terra, & plerūq; etiam aère, commista, sicuti oleum dulce. Hoc siquidem ex aërea, terrea, aqueaq; essentia cōflatur. At ovi albumē, ex iisdē quodāmodo, sed magis terreū est oleo. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoq; est: & suillus adeps. Nam tauri, & hirci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam possidet: bovis itē, ovifq; adeps acris existit. Porro anseris & gallinacei calidior est pinguitudo, & siccior quàm suum: necnon subtiliorū partiū, & minimum terrestris, sicuti & avium omnium. Quæcunq; ergo pinguedines nō dum ullam nactæ sunt acrimoniam, emplastica & illinendi poros possident facultatē, eamq; tantò efficaciorē, quantò sicciores, magisq; terrenæ fuerint. Huiusmodi enim est cera elota, quæ ex melle tū aquosiore, tum minimè mordaci conficitur.

CAPUT VI.

Astringētia porro terrena sunt, & crassa corporis consistentia: qualitate verò frigida. Acida autem, tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringētia refrigerant. Et in arborū fructus, quotq; nobis, ubi maturaverint, dulces apparent, sapores,

Lixivium.
Acida omnia sunt frigida. quate-
nus acida
Omphacij sa-
cultas.

Acida frigiditas tenuium est partium.
Astringens frigiditas crassarum est partium.

Sensus quo pacto exercere debeamus

Emplastica medicamenta quæ dicantur.

Emplastica-
rum natura
duplex.
Oles partes.

Adipis differentia.

Cera elota est emplastica.

Astringentium natura.
Acidorum natura.
Fructuum

*Fructuum
differentia.*

*Fructus om-
nes coquun-
tur, & manu
rescunt cali-
do.*

*Calidum du-
plex.*

*Acerbus sa-
por acido ma-
gis terrenus
existit.*

*Acerbus sa-
por est frigi-
dus.*

*Acerbi et aci-
di saporis di-
scrimen.*

*Astringens
omne exqui-
sitè, esse frigi-
dum.*

*Dulcium esse
nullum frigi-
dum.*

*Amara om-
nia calida.*

*Acerbū cor-
pus exolvi
tripliciter.*

nuper enati, acerbi sicciq; sunt cōsistētia: progres-
su verò tēporis, humidiores reddūtur, acquiruntq;
ad acerbitem, aciditatē quandam: quam exuē-
tes sensim, postea dum perficiuntur ac mature-
scunt, dulces evadūt. Sunt qui nō in arboribus,
sed postea quā repositi aliquandiu fuerint, dul-
cedinem indipiscantur. Alij nō interveniēte aci-
ditate, paulatim in dulcedinē transeunt. Omnes
tamen coquūtur & maturescunt calido: quod q-
dem duplex existit: alterū nempe & p̄prium, &
cuiq; ingenitum: alterum externum, à sole vide-
licet, sed naturæ ipsorū conveniens & familiare.
Si igitur quum initio acerbi essent, tēpore matu-
rescentes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis pro-
venire dulcedinē: acerbitem verò aciditatēq;
ex frigore. Ad hæc etiam, initio quidem lignosi
quū sint, necnon sicci & acerbi, postea verò hu-
more adveniente reddantur acidi, palām est, sa-
porem acerbum acido magis terrenum existere.
Quinetiam, si ab acervo sapore manifestē lin-
guam cōtrahi, siccari, asperariq; contingit (quæ
unius frigiditatis sunt opera) liquet planē frigi-
dum esse saporem acerbum. Quoniam verò inæ-
quabiliter etiā desiccatur (idenim est quod exaspe-
rat) fuerit utiq; omnino etiam terrenus: nam a-
queus, omnia æquabiliter penetrat. Præterea, ve-
lox quidem acidorū saporū transitus in partib.
fit sentientibus, acervorū autem tardus: tum aci-
da quidē in alto magis agere apparēt, in superfi-
cie autē acerba. Quæ omnia, crassarum esse par-
tium acerba indicant: acida verò tenuium. Cæte-
rum utraq; dicuntur astringere, tum quæ acerba
sunt, tum quæ austera: sed in majoris minorisq;
ratione differunt. Insunt autem ipsis medicamē-
tis qualitates complures, non diversę modò, sed
pugnātes etiam, atq; interim subcontrariæ. Qua-
re ubi astringentiū (exempli gratia) diligēter ex-
plorare actionē contendis, ea tantum disquiras,
quæ gustui exquisitè acerba videntur, nullamq;
saltem manifestam habēt qualitatem admistam.
Quæ quidē ubi nactus fueris, tum in optima sa-
norum corporum constitutione, tum in affecti-
bus simplicissimis, de illis facies periculum. Nā
si corpus sanum manifestē cernatur refrigerare,
& calidis p̄sit affectibus, intrepidē sanē poteris
de astrictione ipsa, q̄ refrigeret, pronūciare. Sin
cōtrā appareat, taleq; medicamen acerbū in illis
conspiciam caliditatem inducat, calidū natura
putandū est, in ceterisq; saporib. pari iudicio ex-
periundum. Ego verò, etsi facultates medicamē-
torum, vel citra sapes, sola experientia noscū-
tur, usus tamen prædicta methodo, omne exqui-
sitè astringēs, frigidum perpetuò comperi: non-
nullaque modicè dulcia, aut amara, aut acria, si-
mul cū astrictiōe sum expertus etiā apertè refri-
gerantia. Item quæ astringunt pariter atq; aci-
da sunt, ea quòq; manifestē refrigerare experien-
tia didici. Sola verò dulcia omnia pro dulcedinis
modo, protinus etiam calorem continent. Quo-
circa eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum
omnino est frigidum. At amara omnia, calidam
possident facultatem.

CAPUT VII.

Austerus igitur sapor, exolutus acerbus est. Quū
autem corpus acerbum, terreū sit atq; frigidū,
tripliciter necessariò exolvitur: nēpe aut incalc-

scens, aut humescēs, aut utrunq; simul perpetiēs.
Si ergo incalcescat duntaxat, solidam dulcedinē
contrahat, qualis castaneis inest. Sin tantum hu-
mescat, si quidem ea crassarum sit partium, & a-
quea humiditas, austerū evadet: sin verò aërea,
acescet. Si pariter humescat & calfiat, humidita-
te quidē aquea, in dulcedinem: aërea verò transi-
bit in pinguitudinē. Ac sanē secundum propo-
sitarum qualitatū misturas, varias fructus mu-
tationes sortiunt. Cæterum acerbus ad extremū
perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, & corni. A-
cerbus simul & dulcis, myrti fructus est, piri a-
grestis, & roboris. Austerus unā & dulcis palma-
rū fructus. Pinguis exactē, tū fructus, tū succus
oleæ.

CAPUT VIII.

Quicumq; ergo fructus oleosi duntaxat sunt, e-
dendo ii sunt, & dulces. Quib. verò altera senti-
bus amaror advenit, ii edi non possunt. Quippe
amarum omne edi nequit: taleq; efficitur à calo-
ris excessu. Verū dulce omne calidū ne, nec im-
modicè calorē nostrum exuperat, sed inter limi-
tes se continet fundentis, lævigantis, mollientis,
Quū autem quædam sint quæ una, quæda quæ
duabus in sese qualitatibus & agunt & patiunt,
quædam verò etiā totis substantiis suis: in horū
certē numero medicamenta nō pauca ponūtur,
sicuti & nutrimenta universa: quorū duplex est ge-
nus. Siquidē quædam sunt pingua, ut ipsa pin-
guedo: quædam dulcia, magis minūve, ut om-
nia illa quibus nutrimur.

CAPUT IX.

Est tamen & pingue ipsum, & quicquid nu-
trit, dulce. Nam quū nutritio evacuati repletio
fit: quod evacuatum autem est, familiare & beni-
gnum esset: certē etiam id q̄ nutrit, familiare, ju-
cundum, & amicū sit est necesse: ac proinde cali-
dum modicè, respectu illius q̄ nutritur. Sed in
hoc non parva est majoris minorisq; ratio: quan-
do quidem nec ad cibos accedimus exactē securi-
dum naturam affecti. Corpus siquidem eorum
qui cibos appetunt, sit duntaxat inanitum oportet,
si absoluti futuri sint familiaris ipsorum qua-
litis cognitores. Nā si præter id calidiores q̄ cō-
veniat, aut frigidiores evaserint, non solum quæ
nutriant, verum etiam quæ refrigerent aut calfa-
ciāt, postulabunt. Quocirca cibi quoq; illis aliis
alii jucundiores vidētur. Nam quum duplex sit
genere jucundū: alterum quod impleat id quod
vocatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alte-
rum q̄ medeatur ei quod alteratum est, id quod
medicamentum existit: evenit utiq; cibis, ubi nō
modò vacuatis exhibentur corporibus, sed etiā
qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus
delectent, ut cibi scilicet, & ut medicamenta.
Quamobrem nec eduliorum nec medicamen-
torum una est animantibus omnibus species: si-
quidem pro sua unaquaq; familiari substantia si-
mul & affectione, tum delectantur, tum juvantur
ab utrisq;. Sed si hæc sic habent, id quod in cibis
minus erit dulce, minus quoq; erit calidū: quod
dulcius, tantò nimirum erit calidius, quantò vi-
delicet dulcius: sin ad immodicū recidat calorē,
nec ejusmodi dulce erit, sed jam apparebit ama-
rum.

CAPUT X.

Etenim ut à moderato calore bifariā cuiq; cor-
pori dulcedo provenit: partim .n. sunt proprio
& insito

*Acerbitati
in aliis qua-
litate muni-
tio.*

*Saporum a-
ferentia in
varius fru-
ctibus.*

*Fructuū q-
nam sint
sci, & qua-
litate.*

*Amara ea
nequeunt.*

*Dulcis sa-
poris natura.*

*Nutrimen-
tum dupe-
genus.*

*Nutrimen-
omne esse
dulce.*

*Nutritio
quid.*

*Nutrimen-
esse medicamen-
ter calidum.*

*Jucundum
esse dupe-
genere.*

*Dulcedo
moderato
lore pro-*

& infuso calore dulcia, partim verò ascititio: ad eundem modum amara. Alia nanq; sunt, quæ suapte natura exalfaciunt: aliis aut id accidit ab acquisitione calore accensis. Porro dulcia omnia proximè accedunt ad naturam eorum quibus apparent dulcia: idq; aut proprio calore, ut mel: aut acquisitione, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur. At mustum non suo modo, sed etiam ascititio calore dulce esse videtur. Siquidem haud parum veluti ardoris ex solari calore tum acinis, tum aliis inest fructibus, à quo id quod illis aqueum ac veluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur. Nam ex quibuscumq; pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atq; mustum fervere deprehendes: tanto tamen fervoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diversitas. Cæterum ubi quod semicoctum erat, transmutatum jam fuerit, evacueritq; is qui excitabat fervorem calor, jam tum deniq; syncera succorum proprietates cernuntur, propriaq; vinorum natura agnoscitur. Jam verò quæ inveterantur vina omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quandam dulcedinem acrimoniamq; asciscunt: quæ verò prius inerat illis astrictio, austeritasq; tempore ipsam deponunt. Dein rursus acrimonia incrementum, dulcedinem indies abjiciunt, paulatimq; amarescunt. Unde constat, dulce esse calidius austerum, sicuti & dulci amarum. Atqui si verum est dulcedinem provenire à moderatione caloris, patet astrictionem à frigido vincente perfici.

CAPUT XI.

Ut igitur vinum acerbum, tempore dulcius primum, mox acrius amariq; ultimum verò plane amarum naturaliter redditur: ad eundem modum quod veluti rigorem præter naturam perpeffum est, protinus acidius efficitur: ac si prius refrigeretur, aceseit penitus. Prætereaq; in vindemia ipsa per assiduam pluviam, aliena humiditate fuerit imbutum, levi occasione aceseit. Contra verò accidit iis quæ talia quum sint, igni admovetur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora reddunt: tandemq; si perduraverint, aliis similiter amarescunt. Quum itaque omphax sit acida, uva verò dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à solari calore proveniat, planum est, imperfectius & frigidius esse quod acidum: perfectius verò & calidius, quod dulce fuerit. Cæterum diversis viribus acetum atque succus omphacis constant. Nam acetum proprio quidem vini calore, est frigidum: ascititio autem, contractoq; ex putredine, calidum. At omphacis succus calorem non habet, ac proinde nec acrimoniam. Præterea omphacis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas quæ ab aceto infligitur, excellit eam quæ procedit à succo omphacis, idq; & vehementia, & missione. Nam tametsi succo omphacis ne minima quidem caliditas inest, aceto autem acrimonia quædam exalfaciens: hæc tamen satis non est, ad superandam ab aciditate proveniente frigiditatem: sed potius veluti sternens viam, atq; aperiens meatus, illius celeritatem promovet. Caliditas si quidem quæ à præcedente aceti acrimonia oritur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguatur, ita ut multo major ex aceto frigiditas percipiat. At hæc aut, si pari mole acetum melli permiscas, aceti frigiditas superabit mellis caliditatem:

eoq; magis, quo fuerit major aceti copia. Quod si multo plus mellis quam aceti indideris, parum calorem atq; frigiditatem in ea mistura comperies. Siquidem multis numeris acetum plus ab iis quæ moderate sunt calida, ad frigiditatem recessit, quam mel ad caliditatem. Porro omphacis succus, & ipse (ut omnes fructus in primo sui ortu) est acerbior, ad ardentia hypochondria longè præstantior est, quam acetum: quod nec violentiam, nec ferientem, nec mordaci calori junctam frigiditatem sortiatur.

CAPUT XII.

Porro quod vina quædam invalida Vere atq; æstate acescant: quodq; vehementius mota, in meridianisq; locis reposita, idem etiā patiantur: contra verò hyeme atq; versus aquilonem defossa, integra & secundum suas vires serventur: nonnulli à calore nasci aciditatem existimarunt. Se autem iij falsos esse deprehendent, ubi viderint non calida & vetera vina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorem acescere.

CAPUT XIII.

Per simile autem quid vinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flammis exiguus & imbecillis. Quippe si eas ad fervidum solē exponas, prius obscurari, aut etiam extinguī conspicis. Quod si valido etiā flatu concutias infirmam ac parvam flammam, citius illam extinxeris quam inaureris. Natura enim infirma, validum nec motum, nec calorem sustinet. Cæterum multis in locis fortiora vina ex industria commovent & transportant, nec non soli exponunt, & calfaciunt, ac denique ad meridiem obvertunt cellas, ut citius sic maturefiant, & potui idonea evadant. Namq; multo tempore aliis, hoc iis quæ sic exalfacta sunt, brevissimo accidit. Quemadmodum igitur exercitia valida & sol, calida & robusta corpora, etiā validiora efficiunt: prosternunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic vina natura calida, motus veluti ventilas, sol exalfaciens, à quibus concuantur celerius. Quæ verò frigidiora & aquosiora existunt, eorum arguunt omnia id genus imbecillitatem, celeriusq; perpeti cogunt, quam alioqui post passura essent: quum nimirum res quælibet in propria natura fervetur calore proprio: corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, non minus caloris, quam frigiditatis.

CAPUT XIII.

In universum aut aciditas nascitur calore quod mutante, non aut vincente sive alimentum, sive medicamentum: quemadmodum videre est in acidis ructibus, qui à semicoctis cibis oriuntur. Quod autem opus sit calore alterante, argumentum sunt lac, & prisanæ succus, quæ tempore æstivo citius acescunt quam hyeme. Quum enim sapor acidus sint essentie simul tenuis & frigide, quæ admodum constitutio borealis, nasci certe sine calore non possunt, sicuti nec ille ipse aer: ac proinde licet frigidi sint omnes sapor acidus, nullum tamen eorum quæ extremè refrigerando enecant, acidum est. Exploranda porro acidus saporis natura est in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperitur maximè syncerus & simplex. Etenim qui proprie in saporibus appellat acidum, à sola lingua percipi potest, sicuti & acre: cæterum quod utrique est commune, nempe mordacitas, etiā à tactu sen-

*Generatio-
nes omnium
corporum ex
quatuor ele-
mentis con-
stare.*

titur. Porro ex quatuor elementis impari mistura coeuntibus, particularim omnium corporum constant generationes. Ex ea autem imparitate perficiuntur proprietates corporum particularium. Quippe ex elementorum inæquali mistura, plantarum: ex plâtis autem, animalium proprietates oriuntur. Ac trãseunt sanè quædam protinus in se mutuò: nonnulla mediantibus aliis: veluti terra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursum horum singula in carnem humanam: quum ta-

*Similium fa-
ciliorem esse
transitum in
se invicem.
Lingua fa-
cultas.
Lingua cur
plures nervi
tributi.*

men ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, transiliendo eam quæ in medio est mutatione. At eorum quæ in sese mutuò transeunt, quædam cele-

*Dulcedo est
communis o-
mnium qua
nutriunt.*

rem, quædam diuturnã alteratione obtinent. Verum quæ maximè sunt inter se similia, celerè: quæ dissimilatio, tardior. Lingua igitur exactissimo sensu prædita, oēs qualitates dijudicat, nec non familiaria & similia, ab iis quæ sunt contraria discernit. Cujus usus gratia in hanc solã particulam complures nervi inseruntur: quum in alia

*Familia-
re cuique esse
unicum: alie-
na autem,
plura.*

rum singulas inseratur aut unus tantum, aut alter, nec is magnitudine insignis. Quum igitur quædã naturæ nostræ magis sint familiaria, quã minus: atq; hæc quidè temperamento huic, illa aut illi: necessariò plures qualitates ipsius gustus existunt. Cæterum omnium quæ nutriunt cõmunis dulcedo est: quandoquidem quicquid nutrit, necessariò plus aut minus sit dulce oportet. Quæ verò nõ nutriunt, ea aut nõ dulcia, aut salsa esse, est dicendum. At verò id quod cuiq; rerum fami-

*Acrida ama-
ra calidiora.*

liare est, unum est: nam & natura eius una: quæ autem aliena, complura, partim plus, partim minus à substantia eius dissidentia. Porro quæ dulcia simul & acerbata sunt, ea crassioris essentia sunt, & temperaturæ frigida. Quæ acida simul & dulcia, tenuiora sunt quàm acerbata, refrigerant tamè & ipsa. At amara, calida sunt: sed acrida his calidiora. Nutriunt ergo hæc omnia, si junctã habeant dulcedinem. Per se autem nullum dictorum nutrit, quorum saporum mistiones minimè quidè fiunt subito: sed in alteratione cõsistunt. Nam iis quæ à natura mutantur, sensim fiunt alterationes. Sicuti igitur quod est summè dulce, aptum esui est: quod verò exquisitè amarum, ineptum esui: ita quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, verum minus quàm dulce. Eadè ratio est in cæteris qualitatibus: siquidem præter dulcem, nulla nutrire potest. At elementa multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq; gustui qualitatem offerunt.

CAPUT XV.

*Elementa
nec nutriunt,
nec ullam gu-
stui qualita-
tem offerunt*

Sed quemadmodum edulia quæ nutriendorum naturæ quam simillima sunt ea & dulcedine præse ferunt, nec ullam præparationem requirunt: sic quæ temperaturam nacta sunt remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia utroq; indigunt. Etenim condimenta, quum ex se edendo non sint, suavitatem tamen iis quæ per ipsa præparantur, cõciliant, quod illa reducant ad medium. Apparet etiam natura calidi, quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliã mutare specie. Quædam tamen suaviora, quædã insuaviora igni applicata redduntur: sicuti & quædam longo tempore, quædã minimo, ut coquant, indigent. Etenim quæ nutriendorum corporum temperaturis similia sunt, ea vel citra coctionem, aut præparationem, jam dulcia apparent. Quæ verò dissimilia

*Condimento-
rum usus.*

existunt, omnia insuavia sunt, anteq̃ præparentur. Atq; ea quidè quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debet: quæ verò impensè frigida, calidorum mistura obsoniorum, & igni. Adeundè modum humiditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate, quæ humidiora sunt quàm expediat. Maxima eorum quæ dicta sunt, faciet fidem, quæ in ore fit transmutatio. Nam qui plusculum sustinuerunt jejunium, iis saliva salsa redditur: qui verò plurimum, amara. Sic etiam universum corpus biliosum redditur. Est aut ipsa flava bilis amara: atra autem, acida: sanguis q̃ secundum naturam est, dulcissimus. At pituita linguam contingens, nunc dulcis, nunc acida, nunc salsa videtur.

*Alimenta
tempera-
re quomodo
vigenda*

*Humori-
in corpori-
bus sunt sapa-*

CAPUT XVI.

Nihil igitur mirum, nec cur rerum omnium dulcissimum mel, succum generet amarissimum: nec cur id maximè ætate florentibus & calidis natura, & febrientibus accidat. Nam ut foris quum plusculum igni admoveatur amarum efficitur, ad eundem modum in animantium corporibus, ubi syncerum validumq; nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperaturis & affectibus, frigidioribus, facile in moderatum sanguinem vertitur. Nec verò ab alieno tantum calore, sed à suo

*Mel quib-
in balneo
maris.*

*Mel plus-
culum igni
admoveatur
amarum effi-
citur.*

*Mel tempera-
tis spiritibus
marejarum
Lac in balneo
maris.*

*Lac ex tri-
bus substantiis
constat.*

etiã proprio, mel amarum temporis spacio redditur. Porro lac, etiam si gustu sit dulce, ex se tamen nunquam amarum efficitur. Vincitur .n. in eo caliditas à frigiditate, ac proinde acescit repositum. Constat autem ex tribus substantiis, qualitate diversis: prima quidem crassa, ex qua caseus cõficitur: secunda pingui, ex qua butyrum: tertia aquea, quam nominamus serum. Ex quibus pinguis quidem, maximè temperata est: crassa verò, paululum ab ea declinat: excrementum autem illud seorsum, frigidum est & humidum. Si igitur gustari lac posset, ubi in ventre & per venas concoctum est, ipso melle dulcius inveniretur. Nam quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Et

*Lac incidit
in Genuci
ingentem
lorem, tam
dulcedinem
contrahit
quantam
sit mel.*

quum admodum ingens calor in animante extiterit, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam deperdit mel. Rectaq; id ratione evenit. Etenim quod summè dulce est, ac proinde nihil apponi ad ejus dulcedinem potest, id ut in cõsequentem verti pergat qualitatem est necesse. At cui quid deest, id per concoctionem acquirit. Verum hac ubi cruditatem in vêtre perpetitur, in frigidiori quidè acescit, in calidiore nidorosum amarumq; efficitur: nunq̃ autem inter coquendum mel aciditatem contrahit. Porro utraq; tum quod acidum est, tum quod amarum, linguam mordicant. Cæterum mordacitas ipsa, à tactu proprie, non à gustu sentitur: tribusq; istis saporibus, acido, amaro, & acridi, est mordicatio communis: verum acido quidem, ut frigido simul atq; subtili: amaro verò & acridi, ut calidis.

*Lac quomodo
in aliena
qualitate
mutetur.*

*Mordicatio
acido, amaro,
& acridi
pori est com-
munis.*

CAPUT XVII.

Quod sapor acer sit calidus, non est cur in demonstrando sim anxius: quandoquidè id nemo addubitat: & evidentia sensus, demonstrationis fidem prævertit. Porro quæ ex acridi, idonea sunt esui, dulcem quandam, etsi obscuram, necessariò habet qualitatem admistam. Proinde multis ipso- rum, p̃ obsonio utimur: multis verò ut cõdimentis tantum: at ut cibo, ipso omnino nullo, idq; ob virium vehementiam. Eorum autem quæ non eduntur,

*Acer sapor
est calidus.*

*Acrida esu
lenta necessa-
rio habent
admistam du-
lcedinem.*

eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta: omnia* tamē cuti nostrae imposita, celeriter ulcus moluntur. Sunt & quae ne gustare quidem audeas, cujusmodi sunt catharides, thapsia, & ea quae erosione aut putrefactione interimunt. Multa verò etiā ipso statim odore pugnantiam cum homine indicāt: veluti & haec ipsa quae nunc diximus, & ex summē refrigeratibus, cicuta, papaveris, mandragorae, lycopersij, & hyoscyami succus. Terminus autē sive finis saporis amari, est abstergere: acris verò, urere: at dulcis, nutrire: ubi in sua quaeque natura absolutus fuerit, hoc est, minimē alienis qualitatibus offuscatus. Porro quod in ulceribus nati sunt praestare amari saporis, id ipsum assumpti in corpus efficiunt. Abstergunt quippe & expurgant, quaeque in venis est crassitiem incidunt, Quamobrē menses movent, educēdoque ex pectore & pulmone puri auxiliantur: comitialique etiam competunt morbo, si modò naturā deleteriam nō habeāt. Iis tamen qui sanguinem expuūt, sunt noxii. Aristolochia autem, iris, & panax, adeo amara sunt, ut proximē ad saporem acrem pertingāt: ob idque nec abstergāt tantum, sed etiam exedant et mordicent. Staphis agria etiā, nihil ab istis amaritudine vincitur, estque jam adeo & acris & calida, ut non modò sordem ulceribus auferat, sed ipsam etiā carnem colliquet.

CAPUT XVIII.

Igitur saporis acres, primum exactē esse calidos dicimus: dein exedētes, vrentes, crustam molientes, & colliquantes, si vel ipsi cuti imponantur. Nam intra corpus assumpti, si quidem tota substantia animanti adversentur, ipsum putrefacientes corrumpunt: sin verò caloris immoderatione duntaxat, si crassae sint essentiae atque terreae, interna exulcerant: sin tenuis, urinam atque sudores promovēt, in summaque incidendi & digerēdi in halitū obtinent facultatē. Ex quo genere quidam tum expuitionibus ex thorace, tum mensium motibus auxiliantur. Nec verò sola vehemēti caliditate ab amaris acres saporis differunt: sed quod amari omnes non modò calidam habeant facultatem, sed etiā sicca & fuligini assimilem: nimirum à dulcibus excalfactis & exiccatis suam suscipientes generationē: acres autem, quicumque amari non sunt, admistā nullam humiditatem sortiantur: quo fit, ut ejusmodi corporum à nobis non pauca esitentur. Ceterum astringentibus medicamentis non parum tenuiora sunt medicamenta amara: acris verò, crassiora. Quare nec facile crassos viscidosque humores pertranscunt, veluti ea quae tenuiori essentia sunt praedita: nec ad incidendum inepta sunt, perinde ut crassiora. In medio siquidē sint utriusque excessus oportet, quae incisura sunt. At verò ferro lapidique ignito, ea quae per erosionē interimunt medicamenta similia sunt: quae à corporis nimirum calore huc perducuntur: veluti chalcitis, misy, fori, arsenicū, hydragyros, lithargyros, & alia innumera. Crassarum enim sunt partium id genus omnia, & potestate calida: proindeque temporis spacio accensa, per eam quae ab animante proficiscitur mutationē, non aliter quam lapis ferrumque ignitum, ventrem tum exulcerant, tum exurunt: quū scilicet in corpus distribui praegravitate nō possint. His tamen tenuiora

sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnō aristolochia, & iris: quae quidē haec ultima duo, & magis sunt illis acris, minimeque deleteria existunt. Cantharis autē modicē sumpta, quibusque oportet admista, nō modò nihil offendit vesicam, sed renes etiam expurgat.

CAPUT XIX.

Quod itaque amarus sapor siccis temperie corporibus insit, hinc colligere est, quod & minimē omnium amara putrescant, minimeque tum vermes, tum animalcula illa, quae in radicibus, herbisque & fructibus putrescentibus oriri solent, producant. Maxime namque videmus in humidis nasci corporibus vermes ac putrilaginē. Quamobrē quae exactē amara sunt, animantibus propemodum universis sunt esui inepta: quū nimirum animal omne sit humidum. Porro absinthium non solū amarū est, sed astringit: marina verò aqua, salsa potius est, quam amara. At aqua quae est in lacu Syriae Palaestinae, quae alij vocant mare mortuum, alij stagnum bituminosum, alij denique Sodomenum, gustantibus nō salsa modò, sed amara videtur: estque adeo gravis & corpulenta, respectu aliarum, ut ne si coneris quidem insiliens, in profundum deferri possis. Inest enim ei salis substantia admodum gravis & terrea: ac proinde tantò est aqua quae in eo lacu est, marina gravior, quantò marina fluviali. Poteris autē ipsae aquam marinā efficere, colliquato sale in aqua fluviali: cognoscereque simul quantò gravior reddatur aqua ejusmodi, quam sit dulcis. Quin & modum jam invenerunt moderatā ad salientū conficiendi saluginē, si in ea ovū natum videatur. Quod si decoquere saluginem ipsam velis, protinus amarior reddetur. Nam quicquid salsum plusculum excalfeceris, amarum evadet. Ergo in eo Syriae lacu, quod nimirum aqua quae in eo est amaricet, nullum neque animal, neque planta inesse conspicitur. Imò quū duo in eum longē maximi fluvij confluant, pisciumque copia scatētes, praecipue qui prope Jerichontē fluit, quem Jordanem appellant, nullus omnino piscium fluviorum ostia excedit: & si captos quis in lacum injiciat, celeriter eos mori cōspicit: adeo est omnibus tum hominibus, tum plantis adversum, quod amarum existit. Omni autem sali obscura quaedam astringendi vis inest, quae eas quae condiuntur carnes constringit ac densat, potissimum ubi durus, & minimē fragilis fuerit. Talis est exactissimus quidem fossilis ferē omnis: minus autem illo, marinus: tum quod multis in locis aquis leviter salsis arescentibus provenit, tertium locum obtinet, abstergere magis quam astringere cōtrahereque potens: proximas his vires Sodomiticus habet, æque atque marinus durus.

CAPUT XX.

Propinquus est sapor salsus amaro, quum terreni sint ambo, & calidi: nō obscura tamē diversitate dissidēt: quod videlicet amarus à calore arido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in genere salis, quod durior, densior, atque terrestrior est, qualis ferē est universus fossilis, minus existit calidus, subtiliumque minus partium: qui verò rūpi facilis, laxesque, tenuior simul atque calidior est: in quo genere subamarus consistit, mediā naturā inter salem durum & aphronitrum obtinēs. At verò

Cantharis commodè exhibita, expurgat renes.

Amara minimē omnium putrescere.

Amara cum animalibus universis sunt esui inepta.

Animal omne esse humidum.

Maris mortui aqua cuiusmodi sit.

Saluginem eam esse ad salientum optimam, cui ovū inpatere videatur. Salsa amare scire amplius, excalfacta. Mare mortuum, cur nec plantam nec animal ullam alat.

Amara esse hominibus atque plantis adversa. Salis vires et differentia.

Salsi et amari saporis discrimina. Salis genera.

Spuma nitri omnium est jam dictorum tenuissima: veluti & Asiae petrae, flos, qui aphronitro tamen minus est calidus: quare hic excrescētias carniū minori cruciatu colliquat. Mordicat verò eas nitri flos sive spuma: mordicat etiā tum aphronitru, tum nitru. Ceterū quæ sunt crassa essentia, plus rodunt, ubi quendam fuerint calorem nacta.

CAPUT XXI.

Odores plerique similiter saporibus nos afficiunt.

Plerique odores similiter saporibus nos afficiunt. Siquidē acida omnia, & præcipue acetum, similiter odoratu gustumque movet. Tum acria quoque, veluti allia, capæ, & ipsa non minus quam gustum, odoratum offendunt, mordicantque. Itaque nonnullorum corporum, etiam non gustantes, qualitatem cognoscimus, veluti fimi: pinde ne gustare quidem aggredimur, quod maxima fides odoratu habeatur. Quinetiā si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendant, ne gustare quidē illa dignamur: fereque in omnibus mutuō cōsentiūt odoratus & gustus. Attamen in odore suavissimis, veluti rosa, plurimū sanē diffident. Tantū .n. abest ut gustantibus suavia sint, ut amaritudinē non vulgarem exhibeāt. Tamen si quod amarum est, nunquā sit odoratum. Siquidem generatio amari saporis ex dulcibus proficiscitur à calore extenuatis: ac proinde amara calidiora simul & tenuiora sunt dulcibus. Porro sensus odoris in cerebri collocatur ventriculis anterioribus: odorabilemque vaporosa est substantia. Ea quippe quæ à corporibus defluunt, aëri ambiēti permista, in cerebrumque per narium inspirationē delata, sensum movet. Recta ergo ratione odorata omnia, eadem & calida sunt quadantenus, quum vaporum copia à calore exciteatur. At novi quicquid odoratum est, suave continuo erit: siquidem non omne id spiritui contento in ventriculis cerebri, familiare existit. Jam verò in benevolentia & graveolentia odorabilem pleraque reducimus, appellātes benevolentia quidem proportionē quadam ad ea quæ linguæ sunt dulcia: graveolentia autem, ad ea quæ omnino insuavia. Ceterum ab ijs quæ exacte tum salsa, tum acerba sunt, aut nihil, aut omnino parum vaporis defluit.

CAPUT XXII.

Odor non perinde ut sapor sensibilibus temperies indicat.

Itaque haud solida res est, ex odore de sensibilibus temperatura cōjicere, perinde ut gustu: nimirū ob substantiarū inæqualitatem & differentiam. Etenim quæ odore carent, crassam quidem essentiam obtinent: ceterum quæ sit eorum in calore & frigore cōstitutio, id nondum constat. At quæ odorata sunt, tenuia utique sunt quadantenus calidaque. Porro quū in rosæ succo (præter ipsius rosæ corpus durum terreumque) tria excrementa inveniuntur: unum crassum, quale est in vinis fæx: alterum aerium, quod vini flori respōdet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitionem corruptionemque molitur: certē gustus id genus omnia dijudicat. Siquidem rosam gustantibus aliud quidem acerbum est: id quod terreum ut sit, & crassum & frigidum, est necesse: aliud verò amarū, quod tenue est & calidum: tertium denique aqueū, necessariō quidem frigidū, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione, quodāmodo extremorum, quorum vires exolvit, medium. Hæc itaque omnia de succo rosæ per gustū ipsum discernas:

Rosæ inesse excrementa tria.

Rosæ partium examen.

at per odorē, haud æquē: quum non perinde omnes eius partes evaporēt, nec pinde sensum moveāt. Multo minus ex coloribus de viribus medicamentorum licet ratiocinari: quum in coloribus singulis, calida, frigida, humida & sicca reparias. In particularibus autem seminum, radicū, aut succorū generibus, aliquam ex caloribus licet sumere indicationē. Ut si dicas, capā, scillā, vinum, quātō fuerint albidiora, tantō & minus calida: quæ verò subflavaque, fulvaque, calidiora. Idē usu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, i-reos radici, asphodelique, & aliis compluribus. In quoque enim genere in universum fulva, flava, rubraque omnia, albis sunt calidiora. Itaque etsi hinc quoque conjectura fieri queat, optimum tamen fuerit per experientiā discretam facultates invenire medicamentorū. Siquidē in hac falli non possis: licet prius quam experientia virtutem agnoscas, gustus pleraque indicet, pauculum etiam approbantē ipso odore.

GALENI PERGAMENI
de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. V.

Sunt ergo (quatenus dictum est) qualitates primæ, caliditas, frigiditas, humiditas, atque siccitas. Quæ verò ab illis denominantur corpora, ea sunt tum cōmunia omnium elementa: tum ea quæ per harum excellentiam, calida, aut frigida, aut sicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad cōveniētiā sive symmetrum generis eiusdem, aut speciei conferuntur: quæque ad quidvis obvium. Diximus præterea nutrimentum vinci ab eo quod nutritur: medicamentū autem vincere ac superare alterareque corpus cuius fuerit medicamentū: idque aut una qualitate, aut conjugatis duabus, aut universa substantia, ut compluralium medicamentorum, nec pauca etiam amuletorum: tum purgātia omnia, & pleraque eorum quæ attrahentia vocantur. Quæ verò una duabusve qualitatibus in universum nostrū corpus agūt, ea hoc in libro exponemus, hinc sumpta hypothēsi, quod simplicium medicamentorum pleraque dissimilium sunt partium, reque vera cōposita, tamen si appellentur simplicia, quod cuiusmodi sint, talia natura sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint.

CAPUT I.

Medicamentis frequēter utūtur homines, tum ob alterationē quæ qualitatibus primis molitur, dum videlicet calfaciūt, refrigerant, humectant, & siccant: tum ob eam quæ à secundis proficiscitur qualitatibus: quarum nimirum ratione, alia emollientia dicuntur, alia tendentia, alia laxantia, atque alia denique aliter nominantur. Siquidem quū particularim unumquodque medicamento non pari modo ex illis primis qualitatibus suam temperaturā acceperit, inde fit, ut hoc quidem ex iis vim laxandi, tendendi illud, aliud aliam facultatem sortiatur. De quibus sanē sive secundis, sive tertiis facultatibus, agere in hoc quinto cōmentario est animus. Porro ad simplices interperies facilesque affectus pellēdos, sæpe natura ducit plerique idiotarum ipsa remedia inveniunt. At phlegmones, scirrhi, œdematis, erysipelatisque, nullus ex illis sibi remediū ducit pervestigandū: tanquam

Colores medicamentorum siccitas conferunt.

Calidiora sunt alba, fulva, rubraque.

Qualitates primæ.

Nutrimentum vincit quod nutritur.

Medicamentum vincit alteraturque corpus cuius medicamentum existit.

Simplicium medicamentorum partiumque dissimilium.

Medicamentorum quorundam utantur homines.

Medicamentorum quorundam in agendis certitas de oratione.

tanquā unūquodq; eorum majus jam sit q̄ pro
capitu hominis plebei, ac scientiā requirat vene-
rabiliorē, quam Medicinam appellāt, sicuti &
illius professorē, Medicū. Atq; huc usq; & ipsi p-
cedunt, ut sciant ulcus cavū impleri carne, sordi-
dum purgari debere, æquabile cicatrice induci:
nō tamen norūt, qd carne impleat, quid purget,
qd cicatrice inducat: sed ea invenire, unius opus
est Medici. Cæterum quū ferē numerari neque-
ant omnes particulatim vires medicamentorū,
si secundū singula quæ ab eis perficiuntur, dum
huic aut illi morbo auxiliatur, imponamus ipsis
deflexa nomina: multo sanè præclarius videtur,
missa omni prolixitate, cōmodis speciebus cōposi-
tas definire ipsorum facultates cōpendiosimè,
sub quibus cæteræ omnes quæ dici possunt, com-
prehenduntur. Ut si dixerimus, nō puris moven-
di, aut doloris sedadi in triticeæ farinæ cataplas-
mate (exempli gratia) facultatem inesse, sed mo-
dicè tum humidam, tum calidam,

CAPUT II.

Quæ in cōmentario hoc discutienda veniūt,
ijs quæ in aliis exposita sunt, magis ad medendi
rationem pertinent. Igitur ab emollientibus &
pus moventib. orsi, dicamus utraq; calida & hu-
mida existere: cæterum hæc quidem, ceu simil-
imum corpori in pus movendo calorē produce-
re, absq; ulla existentis in eo humiditatis aut cō-
sumptione, aut adjectione: illa verò, ceu majo-
rem quam pro natura accendentia, nō nihilq; hu-
miditatis contrahentia. Est autem suppuratio
idem quod in pus motio.

CAPUT III.

Sed nec de emolliētibus medicamētis, nec de
ipsa emolitione, simpliciter loqui licet: quādo
qdē nec de corpore duro, vel molli. Siquidē par-
tim absolutē durū dicitur, ut terra: partim p ex-
cessum, ut unguis: partim ad symmetrū sui gene-
ris vel speciei, ut elephas nimirū ad Herculem:
partim ad quidvis obvium, ut Diogenes ad Ari-
stotelem: ac de molli pari judicio. Omissis tamē
significatis cæteris, de mollibus durisq; ut ad cu-
tem hominis temperatissimi, cōtemplemur: quā
sanè regulam & mensuram statuimus, omnium
quæ ita dicuntur. In idem autem recidit, si quod
per excessum ad totam substantiā dicitur, sic du-
rum molleq; appellites: quādo quidem medium
quoddā est tactus noster, uti & Aristoteli visum
est, & Plato quoq; sensisse videtur, ubi ait: Dura
quidem, quibus caro nostra cedit: mollia verò,
quæ cedunt carni. Quod verò in comparatione
ad quidvis obvium durum ac molle est, id in eo
quod magis minusq; cedat, judicare videtur. Por-
ro corporum præter naturā induratorum ad sta-
tum naturalem reditus, emollio est.

CAPUT IIII.

Verū quū variè quidq; efficiatur durius, nē-
pe aut siccescens, aut cōcrescens, aut nimia reple-
tione, sic ut vehementer tendatur, aut deniq; ali-
qua conjugatione: sequitur ut & propria suaque
cuiq; emolliēdi sit ratio. Cæterum quod in se ce-
dit, molle est, si quidē corpus id simplex fuerit.
Nam quod ex pluribus constat, ac sese invicem
contingentibus, ut tritici acervus: aut invicem
implicatis, ut lana, simul & cedere potest, nec ta-
men esse molle. Contra, in iis quæ summe plena

sunt ut utres, neutrum latius in se cedit: nec tamen
quod continetur est durū, sicuti neq; id quod con-
tinet, quā antea durius, etsi sit tensus affectū.
Ac talia sanè nō dura, sed renitētia appellamus.
Ut aut non est una induratorum natura, ita neq;
una medela. Nam quod à siccitate induratū est,
humectari postulat: qd à congelatione, excalfie-
ri: quod à repletionē, evacuari: quod à siccitate si-
mul cōcretionēq; humectari simul & incallescere,
p ea scilicet q̄ tantō sunt calidiora & humidio-
ra, quātō ipsa intēperies fuerit frigidior & sicci-
or: quod à cōgelatione simul & repletionē, pari-
ter & calferi & vacuari. Siccatur porro corpora
citra cōgelationem, tum in validis exercitiis, tū
in sole ferventi, tum in ingenti inedia, tum in ar-
denti febris, & medicamentis quæ siccāt, ut nō
refrigerent. Congelantur à vehemēti duntaxat
frigore: sicuti & implētur à largi tantū humoris
affluxu. At siccantur simul & cōgelantur, coeun-
tibus q̄ simul convenire possunt causis: ut si quis
supra modū laboret in frigore. Sic quoq; replen-
tur simul & cōgelantur ab influxu frigido ac par-
tis refrigeratione. Frigoris rursus causa triplex
est: una, à foris incidentibus: altera est ppria par-
ticulæ patientis tēperies: tertia ab influente in i-
psam humore pvenit. At emollientia pharmaca
peculiariter cōgruunt iis, quæ cōcretionē indu-
ruerūt, magisq; si in eis, collectus sit humor præ-
ter naturā, veluti in scirrhis. Nam si à siccitate
induruerint, humectanda, nō emollienda sunt.
Similiter q̄ sunt impleta, nō molliri, sed evacua-
ri postulat: idq; aut refrigerantibus, aut calfacien-
tibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigi-
da repellēdo, simulq; cum calore exprimēdo va-
poris plurimū: excalfaciētia autem, humorē con-
tentum discutiēdo in vaporē: quæ verò propriè
sicca appellantur, in halitus digerendo: idq; aut
ebibēdo humores, aut totam alterando particu-
lam. Porro oleū & aqua calida humectant simul
& calfaciūt, idq; multo magis, in unū coeuntia,
quā si singula per se adhibeantur. Idem efficit
eduliorū qualitas, si similiter habeat. Quæ quidē
ob id fami caninæ auxiliatur, quod affect⁹ is sit fri-
giditas siccitati cōjuncta. Cæterū cataplasma ex
farina triticea in temperatis naturis pus movens,
nec naturalem partiū humiditatem minuit, nec
quicquā illam adaugere: sicuti nec calorem inten-
dere potest, nec hebetare, sed tantū illius substā-
tiam augere. Id igitur genus medicamēta humi-
da & calida dicimus, ceu similem habētia nobis
temperiem, quæ calida existit & humida.

CAPUT V.

Medicamenta igitur quæ pus movent, substā-
tiam similariū particularum secundum naturā
se habentiū, tueri potius quā alterare sunt na-
ta, quū nimirū eis similem temperaturam ob-
tineant: humiditatē aut ipsam quæ in vacuis hæ-
ret, atque adeo etiā contusam carnem immutat.
Etenim quū tres in animalū corpore fiant al-
terationes, una planè secundū naturam est, qua
cibi in cremorē nutritioni aptum vertuntur: al-
tera contraria huic, præter naturā, qua cōputre-
scūt omnia: tertia ex utraq; mista & media est, par-
tim quidē cum prima illa cōmunicas, partim aut
cum hac secūda, q̄ præter naturā dicimus. Siqui-
dem alterationi secundū naturā, duo hæc insunt

Remittentia
que.
Induratoriā
varia meden-
di rationes.

Frigoris causa
triplex.

Emollientia
quibus con-
veniant.

Vacuationū
modi diversi.

Fames cani-
na qualis sit
affectus
Cataplasma
tis triticeæ
farina vires.

Pus moven-
tia, tueri, nō
immutare
substantiam
partis sunt
nata.

Alteratio in
animalibus
triplex.

Alterationē
naturalē,
præter natu-
ram, & me-
diā, quæ in-
sunt,
* ut

* ut & ex familiari materia animantis naturæ alteratio fiat, & materia ipsa à calore ingenito superetur. Ei verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio accidit, ea ad nihil utile. At media earum, quæ comitatur suppurationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non planè vincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna peragitur, nec etiā omnino aliena. Itaque quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato calore proveniunt: à simili juvantur extrinsecus (nam quid æquè cōcoctioni ventris conferre novimus, quā illi humanum corpus admotū? unde nonnulli tum pueros tum catellos, per quietē vētri imponūt) pari modo & quæ in movendo pure cōspicitur. Cæterum tale esse debet quod movēdo puri adhibetur medicamentū, qualis est in naturis temperatis calor natus. Quare si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamen quod pus movebit, tantō oportet sit tēperato calidius, quā tō & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Quare cuiusque singulatim hominis suū proprium est movendo puri medicamentū. Explorandæ aut sunt universæ facultates medicamentorū juxta hominem optimè temperatum: quo quidem proposito canone, quæ movendo sunt puri, calida & humida dicimus, quæ illius calidæ & humidæ temperatæ sunt cōsimilia: sicuti calidiora multo, quæ indurata emolliunt.

CAPUT VI.

Scirrhus quo modo fiat.

Initium autem sumit induratorū affectio ex fluxione viscida & crassa, parvis particulæ poris impacta. Digesto verò per halitū quæ in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod in reliquū est refrigerato, ac veluti cōcreto, vocata sequitur scirrhis. In qua quidē quoniā cum frigiditate humor redundat superfluous, idcirco etiam cōpositam eius esse oportet medelā: ob refrigerationē scilicet excalfaciētia poscēte affectu, ob supervacaneam autem humiditatem, vacuatiā. Quia verò quæ immodicè tum calfaciunt, tum siccāt, fluxionem ipsam magis impactā reddunt, manifestum est sola ea quæ non admodum calfaciunt, quæque non magnoperè exiccāt (vocant enim talia emollientia) ejusmodi affectus posse sanare.

CAPUT VII.

Emollientia et pus movētia quomodo differant.

Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodū sicca, à pus movētibz eō diffidentia, quod calidiora sint & sicciora. Illa enim cognatā ac simillimā corporibus nostris caliditatem possident: emollientia verò, licet validiorem habeāt, non tantā tamen, ut attractionis violentia desiccet reliquum. Præterea quæ pus movētia, humorē qui præfuit in partibus induratis cōservant: emollientia aut, paulum quidem eius absumunt. In summa, illa quidē quātitate potius quam qualitate caloris agunt: quæ verò indurata emolliunt, qualitate potius quā quantitate. Itaque si in parte quæ suppuratione indiget, assiduè impositas liceret servare manus, celerrimè suppuratio perficeretur. Porro inter emolliētia cōnumeratur bdelliū, styrax, galbanū, ammoniacū thymiana, medulla tū cervina, tum vitulina, adeps caprinus, taurinus, & quæ ejusdem sunt generis.

CAPUT VIII.

Pus movētia debere esse emplastica

Quinetiam quod emplasticū esse debeat id genus medicamentū, ut exactè puris generativum

fit, liquidò constat. Nam substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conveniat, poros corporis obstrui est necesse, quò videlicet halituosos transpiratus includat. Siquidem ea cataplasmata quæ aut detergentia, aut validius excalfaciētia halitus diffilari permittunt, exiccant quidē, sed pus non movēt. Talis est hordeacea, cicerū, fœnigræci, fabaceaque, farina: amplius etiā ærina, eruina, panici, lupinorū, milij, omniumque similiter exiccantiū. Per detergentia quippe, quod meatus referēt, particulæ calor evolat: ab immodicè aut calfacientibus, etiā nativi caloris substantia minuitur: sed qualitas ipsa intenditur: quā tamen hallituosus quidā exuberansque, spiritus desideretur, caliditate tamē cōmoderatus. Qui quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod nimirum intellexit Hippocrates, crescentia dicēs plurimū habere calidi innati) eorū omnes actiones naturales adauget. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam simulque aereā, unā cum spiritu, calidū inaudire innatū. Qui spiritus in omnibus animantis cōtentus partibus, licet non undequaque sui similis, si non sit essentia animæ (ut Stoici quidē existimāt) at certè primū eius est instrumentum. Continetur aut in spaciis inanibus quædā veluti spiritus ipsius materia, etiamnū mutationem exposcēs leviculā, ut spiritus innatus evadat, nihilo secius tamē cōducens admodū ad naturalia opera: ex quibus unū est quæ in pus fit cōversio, quū in ipsa quædā etiam perficiatur concoctio. Quū igitur aliquid cōcoquere nobis consilium est, quamplurimū spiritū intus servare oportet, non aut discutere: quod faciūt illa quæ nuper commemoravimus. Porro omnia ad puris generationem aptissimū est, exiis quidem quæ irrigantur aqua temperata, aut hydrelæū: ex iis verò quæ perfunduntur, oleū temperatū. At ex iis quæ ex hydrelæo illinuntur, farina triticea, & panis ipse, quidē videlicet modicè est coctus. Nā qui plurimū coctus est, quodammodo siccior est, aptusque phlegmonis, quæ ægrius concoctionē admittūt: qui verò minus, iis quæ fervētes sunt. Et sanè quod ex pane cōficitur cataplasma, difficulter coctioni cedētibus phlegmonis idoneū est. Siquidē panis, tū sal, tum fermentū miscetur. Quod verò ex triticea farina præparatū est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiā triticeæ farine quæ pura est, tum panis quoque qui purus est, puri movendo cōgruentior existit: quū fursus & minus sit calidum, & magis deficcet. Farina autē pura humida est & calida: qualia certè ad pus movendum conferunt. Itaque medicamentā quæ phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus movendū cōducunt, uti adeps suillus & vitulinus. Nam taurinus caprinusque illis acrior existit: quā obrem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis cōgruit. Est & adeps gallinaceorum phlegmonis coquēdis familiarissimus, magisque etiam anserum: quodammodo tamē ad digerendum potentior. At agrestium omnium animalium adeps, multo acrior & siccior est, quā domesticorū, maximeque pardalis, atque leonis. Quare horū nullus movēdo puri est idoneus. Porro pus movēt & pix, & resina: ad ferventes quidem phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiores verò, excalfaciētiū aliquo oleo liquatæ, ut puta cicino, raphanino-

Concoctio qua fit ab innato calore, ab externo calido iuvatur.

Pus movētia qualia esse debeant. Pus movētia medicamenta, aequalē habet calorem cum corpore, in quo pus movetur.

Pus movētia esse calida & humida.

Scirrhum tollentia qualia sint.

Pus movētia humorē qui præfuit in partibus induratis cōservant. Manibus assiduè applicatis perfici suppurationem celerrimè. Emollientia.

Pueri plurimū halitus.

Innatus spiritus aut sumam aut primum illius instrumentum.

Pueri non doque gruant.

Fursus cultas.

Adipis diffidentia.

phanino, veteri, aut sicyonio. Quum autem cera per se minus sit calida, quam ut pus movere possit, solis ferventibus. phlegmonis apta est, ex calido rum oleorum quopiam liquata. Igitur quæ pus movent, naturam modicè excalescentem & humectantem fortificant. Cæterum medicamentum puri movendo idoneum, facultate quidem est tale: ubi verò corpori nostro est admotum, fit actu tale, sive energia. Ergo scirrhum vocat tumorem præter naturam, doloris vacuum, sed durum: interdum etiã sensus expertum. Oritur scirrhus ex humore crasso & frigido, quales sunt duo duntaxat: bilis videlicet atra, & superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhosi omnino aut pituitosæ substantiæ sunt, aut atrabilariæ, aut ex utraque mixti. Propriè autem emollientia dicuntur, quæ medentur scirrhosis tumoribus, ex pituita exiccata, crassique humoribus. Cõsueverunt. n. ij potissimum in musculorum capitibus gigni. At quæ ab atrabilario succo duraverunt, cæcrosa sunt omnia, & ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his quo pacto prospicere oporteat, in cõmentariis methodi medendi docebimus. Quæ verò lento crassoque humore concreto indurata sunt, calida in secundo aut tertio ordine, sicca autem in primo, medicamenta desiderant. Sed quum non exigua sit in corporibus induratis majoris minorisque latitudo, necessum est medicamentorum illis medentium non parvam etiã latitudinem esse. In universum autem, ex emollientibus medicamentis præstantiora sunt, quæ recentia existunt. Siquidem inveterata, validius quàm expediat exiccant. Porro radix altheæ & cucumeris agrestis, nonnullaque aliæ plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicuti malvæ agrestis folia, tum cruda, tum cocta. Atque hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps inveteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti nec emollientium ulli. Valdè siquidem sal exiccat. In summa verò, quæcunque alia emollire possunt, calida sunt ex secundo, & interdum ex tertio ordine: leviter verò sicca. Sed & his etiam emplastica vis insit oportet, non secus quàm pus moventibus: at quæ non perinde meatus obstruat, quod magis, quàm illa, evacuare sint nata.

CAPUT IX.

At indurantia frigida sunt, & humida, ut semper vivum, portulaca, psyllium, lenticula palustris, solanum: quanquàm hoc, in medio exiccantium & humectantium consistit, duplicem in se habens substantiam, nempe terrenam & aqueam. At verò si quid simul & refrigeret & deficcet, sanè & ipsum indurabit omnino: improprie tamen, quum concretionem potius quàm evacuationem induretur corpus. Illa siquidem potius siccitas est, ac proinde non emolitione, sed humectatione curatur: quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

CAPUT X.

Porro laxatio in articulis fit, humectatis immodicè quæ circa os sunt ligamentis, pariter & tendonibus: tensio verò, non etiam simpliciter, sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrhus. In cute autem non tantum ira, sed musculis quoque subditis quoquomodo in tumore sublati: quemadmodum etiam in inflammationibus accidit. Quamobrem non sim-

pliciter una est species remediorum laxantium: utpote quum alia humectando, alia calfaciendo, alia emolliendo, quædam vacuando, nonnulla tumores præter naturam purgando alia etiã per conjugationem, horum quippiam agendo, laxare assolent. Est autem emplasticum medicamentum, quod terrena viscidaque substantia, minimeque mordaci præditi, illitum meatibus corporis tenaciter hæret.

CAPUT XI.

Quod emplastico contrarium est, dici queat poros repurgans, & infractu liberans: estque nec viscidum nec mordacitatis expers, sed subtile & nitrosum. Nam in ratione tantum majoris ac minoris differunt, tum emplastica ab his quæ sordes nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ poros obstructos referant, subtiliora extergentibus sunt, emplasticisque contraria. Sunt autem hæc tum nitrosa, tum amara. Cæterum ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requireretur ut citi extimæ imposita medicamenta ipsa, solam exactamque nitrosam qualitatem possideant. At intro in corpus assumpta, etiã si adjuncta sit quædam astrictio, possint tamen sic quoque magnos purgare abstergereque meatus, cujusmodi in vasis confistunt. Nam foris meatuum exiguitas prius ab astrictione occlusa, quæ probe queat expurgari, non etiã inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa ventris visceraque sunt partes omnes, quum maximos in se habeant meatus, majus accipiunt commodum ex vasorum corroboracione, quàm propter osculorum exiguitatem lædantur. Proinde intus absinthium repurgare potest, foris non potest: quippe quod ex amara acerbaque facultate est compositum. Quæcunque igitur repereris nitrosa & amara, ea ad purgandos meatus omnes, valere noveris. At cutis & ulcerum sordes, non hæc tantum, sed & viribus minora possunt auferre: qualia sunt dulcia quæ tenui sunt partium. Porro scilla, iris, nitrum per se, aphronitrum, spuma nitri, seriphon, abrothonum, cum cibo potuque assumpta, crassos viscidosque humores extenuandi vim obtinent. Quæ ob rem lentis ac pituitosis thoracis pulmonisque humoribus, aut purulentis & incidentibus, & extenuandis, & educendis, aptiora invenire alia præ istis medicamentis non possis. His ipsis & jecinoris obstructions expurges, & modicas etiã lienis. Nam quæ majores sunt vehementiora desiderant: nempe capparidis corticem, radices tamarices, scolopendrium, & scillam, & asplenon. Sed tamen istis utendum est, ad jecur quidem ipsis per sese duntaxat: ad lienem vero, mixtis aceto, aut ei in coctis: ad thoracem pulmonemque, melicrato, pti sanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuiquam.

CAPUT XII.

Quum autem plurimam urinam movere est consilium, non admodum dictis utendum est pharmacis, sed quæ acriora sunt & magis excalescent. Est enim omne acre calidum: cujus generis sunt, semen apij, petroselinum, feniculi, dauci, agrioselinum, symyrium, ipsumque seseli, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acoron: à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur & fecernitur: nepe seroso & tenui seorsum segregato ad renes, crasso verò in sese coeunte. Quamobrem puris ex thorace expuitioni ea omnia adversantur quum nimium

Laxantium species variæ

Emplasticeorum essentia qualis.

Emplastice oppositum quale.

Extergentia cutem quidam debent esse exacte nitrosa: & viscera autem, vel si aliquid astrictoris fortiantur, nihil nocuerint.

Absinthium intus repurgat meatus, foris nequaquam.

Medicamenta ad crassos viscidosque humores extorrendos commoda.

Obstructiones iecoris et lienis, quæ potissimum tollant.

Acria omnia esse calidissima. Diuretica medicamenta quæ.

Expulsionibus qua sunt idonea.

Callus incidendis discutientisq; congruentia, qualia esse debent.

Rarefacientia.

Aperientia.

Codensantia Occludentia.

Hæmorrhoidas aperientia.

Rarefacientia.

Colliquantia.

Anastomatia.

rum excafactoria exiccatoriaq; sint, necnon secretoria & coactoria. At quæ expui debent, mediocrem caliditatem desiderant, ne videlicet impenfe exiccentur: ac proinde medicamenta illis congruentia, ejusdem utilitatis gratia cum sorbitivis culis potionibusq; exhibentur. Quæ verò renes expurgant, & ipsa incidendi vim possidentia, larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas consistentias sunt incidere idonea, admodum quidem incidunt, sed minimum sanè caloris possident. Caliditas quippe callum per se nonve gignit, non incidit, nec dividit. Cæterum quæ & incidunt & mediocriter calida sunt, meliora existunt: ut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & vitrum ustum, & ex scilla confectum acetum, & consimilia.

CAPUT XIII.

Quæ cutis meatus reserant, ea rarefacientia dicimus: quæ verò vasorum oscula, aperientia. Quin & illis contrariorū, quod poros contrahit, condensans dicunt: quod autem osculum claudit, occludens sive obstruens nominant. Cæterum rarefacientium quidem natura modicè calida est, ac tum minimè siccans, tum tenuium partium: aperientium verò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, condensantium quidem, frigida sanè & aquea: occludentium autem, tum frigida, tum partium crassarum. Rarefacit igitur chama melū, & althea, quodq; ex ipsis conficitur oleum: nec minus quod ex agrestibus cucumeribus. Quin & vetus, & cicinū, & raphanum, ex eadem sunt nota. Aperiant aut cyclaminus, allia, capæ, fel taurinum, unguentumq; irinum & amaricinū, quæ & occæcatas hæmorrhoidas aperiant. Ac codensantia sunt, aqua frigida, sempervivū, portulaca, tribulus viridis, psylliū, auricula muris, lenticula palustris, ac deniq; quæcunque refrigerant, sed non astringunt. Proinde mandragora, cicuta, altercum, papaver, si eis quis modicè utatur, codensandi vim obtinent: sin liberalius, non modò codensandi, sed stupefaciendi, & necandi. Occludunt porro meatus omnia quæ validè astringunt, nec tamen acrimoniā habent adjunctam: quum nimirum essentia talium sit simul terrena & frigida. Medicamenta verò quæ frigida quidem sunt aut æquè, aut amplius, sed substantiā fortiuntur aqueā, ea inquā debiliter & contrahunt & constringunt, videlicet propter ipsam molliem: quare codensantia potius quā obstruentia dicuntur. Quippe quicquid valenter tum consipare, tum constringere debet, robur quoddam renitens, & durum, habeat oportet.

CAPUT XIII.

Quæ itaq; citra molestiā excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si verò non modò calida fuerint, sed etiā consistentia crassa, si quidè vehementia sint, & caustica, hoc est, urentia, ignis instar corpus colliquat, & sæpe escharas ritu cauterij inducunt. At si debilius quā ut urere possint, excalfaciunt, anastomotica, sive aperiendi vim obtinent. Quod aut causticum, non tamè vehementer, est, præterea essentia tenuioris: id prorsus ab omni mordacitate aberit: aut cum exiguo, tum dolore, tum morfu eliquabit partes carnosas. Nam quod non confertim alterat, ut quo vehementer sunt cali-

da, quodq; non ægrè penetrat, ut quæ crassa sunt essentia, ea latentè actionē obtinet. Porro alterationū subitæ confertæq; mutationes, sicuti & penetrationū quæ violētæ sunt, quales proficiscuntur à causticis & escharoticis, maximè sensibiles sunt. Cæterum de quib. nunc agimus, minimè faciunt escharas, vocanturq; putrefacientia, licet improprie, atq; ob symptomatis tantū similitudinē: quū ab utrisq; nullo doloris sensu corruptio fiat. Nam quæ verè putrefaciētia sunt, humectant simul & calfaciunt. Multis aut modis corrupti quid potest. Corrupti siquidè plus nimio refrigerata, aut excalfacta aut humectata, aut exiccata. Non tamè quicquid corrupti computrescit, sed quib. id cum foetore accidit. At medicamenta de quibus nunc sermo est, putrefacientia, qualia sunt auripigmentum (quod arsenicū vocant) sandaracha, chrysocola, dryopteris, pityocape, & aconitū, omnia colliguntur sunt nata, & potissimum carnē renellam, idq; absq; dolore. Ex quib. quidè nonnulla imbecilliora cæteris, ut ustæ petrae flos, extimam tantum superficiem, quam contigerint, exedendo, ulceribus excrescentibus cicatricem inducunt: quam medicamenta quæ verè ad cicatricem perducunt, nec detrahère, nec liquare carnē, sed durare, & siccare sunt nata: ut alumē, galla, omphacitis, æs ustum, ac maximè lotū, cum eisq; fructus spinæ Egyptiæ, siccaq; mali granati putamina.

CAPUT XV.

Id igitur est in planis ulceribus, ad cicatricē ducendis consiliū, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id quod perficitur per ea quæ illam contrahere, constringere, consipare, densare, siccare, & in callum cogere valeant: quum nimirum cutis, veluti in callum durata caro sit. Ea ergo medicamenta quæ sic agere possunt, primariò proprièq; dicuntur epulotica, sive ad cicatricē ducētia: cætera verò quæ exedunt carnem, secundariò, & per accidēs: sicuti & ea quæ absq; astringēte desiccandi vim habent mordacitatis expertē. Nam & hæc quoque ex accidēti cicatricem inducunt: cujusmodi utiq; medicamentum est, myrrha, lithargyrus, ostreum, & diphryges combusta: quandoquidè & ipsa cicatricem sæpe inducunt illita. At verò medicamenta citra morsum mediocriterq; abstergentia, cavitates ulcerum implent.

CAPUT XVI.

Porro attrahentes facultates, sunt, quæ ex alto vehementius extrahunt: reperiētēs verò, quæ in altū occurrētes sibi succos repellunt. At essentia illis quidem calida est & tenuium partium: his verò frigida, & crassarum. Attrahit enim perpetuò calidum: repellit verò frigidum. Verum quod calori iunctam partium tenuitatem sortitur, trahit vehementius: quod autè crassitudinem frigori, violentius repellit. Atq; astringentium quidè nota est essentia. Attrahentium autem alia spōtè est nata, ut dictamni, propoleos, thapsiæ, sagapeni, succiq; Cyrenaici & Medici essentia: alia verò à putredine exasperatè suam ducit originē, qualis tum fermento, tum psorico inest. Quod si finis quoq; ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attrahēdi facultate pollebunt: sed non parva illis differētia inest. Nam columbinus admodum attrahit. Ex æquo aut utrinq; ab eo recesserunt,

runt, ad calidus quidē anserinus, ad frigidius verò gallinaceus. Hoc etiam magis vincuntur humanus & suillus. At canum stercus simile est medicamentis extergētibus, maximē si vescant ossibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id perficit. Est & aliud attrahentiū medicamentorum genus, quod qualitatis familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quā totius essentiae similitudine, ceu quā nutriūtur, familiaria nutrimenta attrahūt. Talium enim medicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum nonnulla. Ceterum calida ut sint id genus omnia est necesse. Quinetiam inter ea quā essentiis similia sunt, quā calidius fuerit, id potentius attrahet.

CAPUT XVII.

Jam verò facultatum alexipharmacarum natura est duplex. Quādam siquidem alterant, quādam evacuant venenū lādens, aut deleteriū medicamentum. Alterant igitur una qualitate, idque ratione cōtrarietatis: aut duarum conjugatione: aut denique tota substantia. Evacuāt totius substantiae similitudine, & caliditate subtilium partium. Ceterum alexipharmaca medicamēta, sanē facultate sunt media inter corpora quā oblāduntur, & medicamēta lādentia: ut videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexiteriā, quā illius ad deleteriā. Quamobrem omnia prope modū quē deleteriis adversantur medicamentis, si largius sumpta fuerint, graviter animatis corpus offendunt. Quapropter ea exhibeantur moderatione, ut nec copia nimia corpus oblādant, nec exiguitate sua a deleteriis vincant. Evacuatur autem omne deleterium venenū a foris impositis medicamentis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiae similitudine. Quū igitur omnia deleteria medicamēta adversissima secundū temperiē sint corporibus, quā ab ipsis lāduntur, certē si a similibus temperie medicamentis vacuent, erūt utique; & hæc corporum naturis contraria: ut sunt haud dubiē aliqua ex parte contraria, non tamen adeo ut interrimant, sed in corporis perpetientis, & medicamenti lādentis medio liberentur.

CAPUT XVIII.

At facultas quā verē & est & dicitur anodyna, eorū est, quā primo ordine excalfaciunt, tenuēque essentiam sortiuntur. Quā verò improprie anodyna vocatur, iis medicamentis inest, quā suo ingenti frigore partem stupefaciunt. Est autem stupor paulo minus quā insensibilitas ac sensus privatio. Ceterum quā affectum sanando dolorem sedāt, nec merito dici anodyna possunt: nā id est omnium curantium commune. Quā itaque; revera sunt anodyna, partium sint tenuium, & calidiora quā quā symmetra sunt, est necesse: ut scilicet evacuent, digerant, rarefaciāt, extenuēt, cōcoquant, & æquabile reddant, quicquid partibus doloris est causa. Quare nihil prorsus astringentis habeāt oportet, ne si pars quidem aut affectus exposcāt. Ex quibus liquet, quod interdū affectionem non juvabunt, sed tantūmodo mitigabunt dolorē, quādo videlicet verē anodyna dicētur. Interdum adjuvabūt affectū, dicenturque; simul anodyna, & salubria. Igitur medicaminū anodynorum quādam ex primo sunt calfacientium ordinē, quā p̄prie anodyna dicuntur, ut an-

thinū oleum: quādam similiter ut corpus nostrū, qualia sanē pus movētia, Quā verò soporem epota inducūt, temperiem sortiuntur vel summē adversam iis quā revera sunt anodyna. Refrigerant siquidē omnia corpus, & sensum eo usque; stupefaciunt, ut si paulo liberalius bibantur, mortē afferant. Ceterum ad usum propositum optima sunt quā deficcant. Quā verò existentia frigida, humiditatis etiā copia obtinent, ut cicuta, ea potui nō sunt utilia. Talis est mandragora, excepto eius cortice sicco: & altercū, prater semē. Sunt tamen & quā nobis tota essentia adversentur. Proinde si vel minimum eorū assumptū fuerit, omnino lēdat necesse est: ceu dryopteris, pityocampe, thapsia, solanum manicum, hydrargyros, & fungorum nonnulli: praterea saliva & fel animalium venenatorū. Nam talia omnia genere sunt deleteria, nō quantitate: ac p̄inde nihil eorū in alexiterias antidotos inditur, ut solet papaveris succus myrrha, styrax, & crocus. Nam tametsi quādam horum dementēt largiūs bibita, quādam mortem inferāt, mensura tamen convenienti permittā aliis, adjuvant. Eorum porro quā mentem lādunt, pleraque; etiam caput degravant, vaporibus ipsum implentia. Sunt quā id affligant, oblādentia ventriculum. Communiter verò cerebrum universa duobus modis infestant: aut totius substantiae contrarietate, aut quum una duabusve qualitatibus illius temperaturam immutant.

CAPUT XIX.

Vocabulū hoc, purgans, una quidem, eaque; cōmuni ratione, de iis omnibus dicitur, quā quoque modo animalis excrementa expurgāt: alia verò de iis tantum enunciatur per excellentiā, quā aut per vomitum, aut per alvi dejectionem, purgationem moliantur: ita ut ab his diversi generis sint ea quā tum per nares, tum per os a capite humores eliciunt. Eiusdē cū istis sunt generis, quā vulvæ admota, vi quadam attractrice illius excrementa repurgant. Quaecunq; siquidē purgare animadvertimus, ea trahēdi vim possident, alia unum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: idque; illis inter sese commune existit. Nam quā crassos humores extenuando, aut urinam ciere possunt, aut ex pectore pulmoneque; ejiciendis excreationibus auxiliari, aut menstruas purgationes ciere, purgant sanē & ea aliquo pacto, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia menses moventia, hac re a superioribus diversa, quod nō habeant vim familiarium succorum attractricem, ut illa. Bisariam autem dicuntur bechica: partim quod tussim provocent, partim quod eandem sedent. Atqui contrariæ horum sunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atque; extenuandi quidē facultas, in calidis & tenuium partium substantiis sita est: incrassandi verò, frigidis, & crassarū partium essentiis inest.

CAPUT XX.

Lactis & seminis effectrices facultates sunt, partim in medicamentis tantū, partim in alimentis. In medicamentis quidem, quum succos pituitosos excalfacientes in sanguinem vertimus: in alimentis autē secundum substantiae totius similitudinē, ubi videlicet boni sunt succi, & humida,

*Humorum
corporis hu-
mani tempe-
ries.*

*Lactis tem-
peries.*

*Lactis gignē
diratio.*

*Lactis gene-
rationē qua
prohibeam.*

*Sanguis est
materia men-
sum et lactis*

*Venas esse cō-
munes uberi-
bus & ma-
trici.*

*Lactis mensi-
busq; gignen-
dis, eandem
victus & me-
dicina ratio-
nem deside-
rari.*

*Menses de-
mitti in ute-
rum, non ab
illo attrahi.*

*Menses &
urinas qua
eliciant.*

*Menses du-
centia à diu-
reticis quo-
modo disse-
rant.*

& tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediocris particeps: plus verò quàm mediocris, bilis: sicuti pituita frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit, propius tamen sanguinem versus inclinans. Ubi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis conficitur, humectante simul & calfaciente victus ratione est opus. Si verò quòd biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desiderat: mox victum quem nuper diximus. At si quòd pituitosus, medicamenta requirit exalfacientia aut primo, aut secundo ordine, nō tamē exiccantia. Verum inter eo potiora sunt, quæ nō tantum medicamēta sunt, sed nutrimēta, veluti eruca, fœniculum, anethū. Intelligo enim ipsas herbas etiam nū virentes & humidas: nam quæ sicca sunt, plus quàm par sit & exalfaciūt & desiccant. Hujus generis est smyrnion, apium, sion, polion, eaq; prius quàm exiccentur. In summa verò, quæcunq; calfaciunt plus quàm expediat, quæque desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiantia, partim ipsum minorē reddentia, lactis prohibent generationē.

CAPUT XXI.

Porro dictis ad similitudinem facultatē obtinent, quæcunq; provocare aut sedare menses possunt. Utroque enim cōmunis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Quare ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate temperatus, utriq; abundantem copiam suppeditat. Cōmunes præterea uberibus utroq; venæ sunt nō exiguæ. Itaq; ubi ad alterutram partē sanguis defert, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, iis lac minimè in mamillis colligitur. Quibus verò hoc largè suppetit, iis planè menses cohibentur. Quocirca mirandum non est, si tum victus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quæ gignunt, & sedant menstruas uteri purgationes: & ea quæ lactis in uberibus generationē tum procurant, tum supprimunt: quanquam hætenus differat, quòd & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menstrua purgatio indigeat: quum nimirum ea in parte sitæ venæ magis aperiri debebant, quàm quæ tendunt in mammās & sanguinem fluxilem magis requirāt, utero ad delationem ejus nihil conferente. Mittuntur enim in venas quæ comittuntur illi, non attrahuntur menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leviori subsidio medicaminum opus habet, quum non abundè in mammis confluit. Medicamenta etiam quæ juvant ut sanguis in mamillas feratur, imperfectas etiam purgationes promovent. Sim autem nimis oblata sint, aut planè retentæ, nullū ejusmodi eas sanare potest: verū sabina, mejon, iris, calamintha, pulegium, dictamnium, asarum, costus, casia, cinnamomum, amomum, aristolochia, buniū, & eius generis reliqua, exactas uteri purgationū retētiōnes persanāt: taliaq; etiam urinam promovent. Sed ab iis quæ diuretica tantum dicuntur, hoc quidem differunt, quòd non vehementer desiccant. Etenim quæ non desiccant, & modicè calfaciunt, lacti sunt generando utilia: quæ verò plus exalfaciūt, non tamen valenter desiccāt, mensibus eliciendis sunt cōgrua. Verum & utraq; hæc urinas provocant, necnon

in primis ea quæ desiccantia, etiam calfaciunt. At præter alia & reddendis ex pectore pulmone quæ excreationibus incōmoda sunt desiccantia. Poscunt quippe & ipse incidi quidem, non tamen exiccari, ceu & renum vesicæq; calculi.

CAPUT XXII.

Semē generant cibi qui probè nutriunt, & flatulenti sunt, familiaresq; totis substantiis: medicamenta verò flatulenta etiā & calida. Extinguunt autem desiccantia & refrigerantia omnia, quæq; totis substantiis cōtraria sunt. Porro provocant quæcunq; calida sunt & flatuosa absq; desiccatione: supprimunt verò contraria. Etenim quum seminis substantia ex bona superfluitate generationē sortiatur, sitq; etiam flatuosa: bene nutriat & flatulenta sint, necesse est, quæcunq; semen aut pcreare, aut provocare possunt. Quare bulbi, cicer fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicuntur & sunt. At scincus & satyriō medicamēta ad id apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multi seminis sunt, lini semen, & eruca. Cæterum quæ refrigerare sunt nata, tã edulia, quàm medicamēta semen cogentia, incrassantia, & stabile reddētia, vim habent ipsum suppressentem, non aut corrumpentem: ut lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres five maturi, five immaturi. Jam verò quæ desiccant, ne esse quidē semen permittunt, etiam si natura calida sint: ut ruta. Quòd si etiā non calfaciunt, multò minus: ut nymphaea. Eandem proportionem tum esculentorum, tum medicamentorum est invenire, circa lac & menstrua. Sub idem genus cadunt, quævis alio modo, quæ respirantium instrumentorum rejiciendis excreationibus auxiliantur, quæq; urinā ciere possunt. Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti contraria incrassandi.

CAPUT XXIII.

Tametsi collyrio diaphodon, & diapopholygos, & cygnio, & thure, uti possimus ad aures, aut os, aut nares affectas, necnon ad pudendum & anum: quia tamen frequentius ad oculorum morbos iis utimur, ob id nimirum ocularia medicamenta vocantur: sicuti alia hepatica, alia splenetica, stomachicæve, secundum differentiā particularum quibus solent auxiliari creberrimè.

CAPUT XXIV.

Dum aut ij qui Methodici nominantur, metaphyscriticas quasdam materias & facultates appellant, præterquam quòd obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipsorum hæresi maxime repugnancia astruunt.

CAPUT XXV.

Ex operibus autem contrarias judicare facultates oportet: dicentes quasdam esse facultates emplasticas, & his cōtrarias, tum extergentes, tum farctu liberātes: præterea emollientes, indurantes, laxantes, & contendentes. Nam astringentes, acres, amaras, acidas, atq; dulces, non facultates medicamentorū, sed gustus esse qualitates monstravimus. Quanquā & harum etiam tum actiones, tum temperaturæ nobis veniunt investigandæ. Etenim astringens, terrestre & frigidum: acidum, subtile & frigidū: amarū, terrestre & subtile: q; insignis qualitatis expers, frigidum simul & aqueū: acre, igneum: salsum, terrestre & calidum

*Semen quæ
gignant, e
tinguant*

*Semen pro
cantia sup
primentia*

*Semen sup
primunt o
nia refre
rantia.*

*Semen ne
se quidē
mittunt, q
siccant.*

*Ocularia
dicament*

*Gustus q
litates qu
sint.*

*Saporū
peratura*

dum, nondū tamen igneum: similiter dulce, calidū, sed nondū urens: quæ deniq; oleosa sunt, omnia aquea sunt & aërea. Sequuta sanè sunt temperaturas eorum, & opera. Nam astringens, contrahere, constringere, densare, repellere, incrassare, omniaq; refrigerare, exiccareq; est natum: acidū verò, incidere, extenuare, fæctū liberare, & purgare citra calfactionem, & cum aliquatula percussione potest. At acre similiter ut acidum extenuatq; & perpurgat, necnō perrūpit, attrahit, & escharam inducit: ceterum calfaciēs, & digerēs. Sic amarū quoq; meatus ppurgat, abstergit, extenuat, incidit humorū crassitiē absq; manifesta excalfactione. Quod qualitatis est expers, incrassat, cogit, contrahit, extinguit, & facitq;. Porro falsum cōtrahit, constringit, cōducendo servat, desiccatur citra apertā aut frigiditātē, aut caliditatem. Dulce verò cōcoquit, laxat, rarefacit: oleosum deniq; humectat, emollitq;, & laxat. Ex quib. sanè facile invenire licebit, quinā sapores temperie, & qui sint operibus contrarij.

CAPUT XXVI.

Symmetrū appellare medicamentum cōvenit, quod nec excalfacit, nec desiccatur, nec refrigerat, nec humectat: nec calidū, frigidū, humidum, siccūve existit. Quod verò aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccus est, à vincente, seu excedēte facultate cognominatur. Porro per unūquēq; excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit: calidum quidem, exempli gratia, nominātes primi ordinis, quod nos excalfacit, nō tamē evidēter, sed ita ut opus sit rationali demonstratione. Quæ verò manifestè calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse dicuntur. At quæ jam vehementer quidē, nō tamē summè, tertij. Quæ aut adeo excalfacere possunt ut escharā moliantur & urant, quarti: similiterq; in aliis exuperantiis existimandum. Nam quæ adeo vehementer refrigerāt, ut extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Ceterum nullū invenire est, quod quarto desiccet ordine, quod nō etiā urat. At tertij ordinis exiccantium quippiam esse possit, quod minimè urat, ceu omnia quæ vehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus, alumen, balauſtia, galla omphacitis. In his aut ipsis quædam vicina sunt adurētibus, ut squama æris, & æs ustum, quasi inter tertium quartumq; ordinem hæreant. In medio tertij est æs ustum, si lotum sit: in principio tertij hypocistis. Sic in secundo & quarto differentias licet cōstituere triplices: quū nō perinde urant cauterium & napy, licet ambo quarti sint ordinis.

GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum facultatibus, liber VI.

Generalis igit sermo de facultate medicamentorum simplicium, universus jam superioribus libris finem suū consequutus videtur. Tempus verò jam est ad sermones particulares, sive speciales trāsire, hoc solūmodo repentes: primum quidem, in natura tēperatissima: secūdo, in intēperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciendū esse periculum de facultate ipsorū medicamentorū. Ceterū quoniā

medicamenta omnia, partim quidem sunt animalium partes, aut plantarū, aut fructuū, aut horū liquores, aut succi: partim aut ex metallis sumuntur: optimū mihi visum est de plantis ante omnia differere: dein de metallicis pertractare, ac ultimò ad animalium partes transire, idq; observato literarū græcarum ordine. Curabimus aut semper, ut (quod monuit primo oraculo Hippocrates, vitā pronuncians brevem, & artem longam) festinantes quam maximo studio, viam incedamus compendiosissimā, per ea nempe quæ sunt in arte utilissima. Inter omnes porro Dioscorides perfectissimè mihi videtur confecisse tractatum de medicamentorum materia. At qui aggrediuntur figuras herbarum describere, quas ne per somnium quidē viderunt, ii certè vident præcōibus similes, qui notas ab aliis acceptas fugitivi mancipii publicant, quem ipsi nunquā viderunt, imò quem ne agnoscere quidem possint, si propè assisteret. Illos etiam non possum non accusare, qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari iis, qui ex libris prodeunt gubernatores.

¶ Abrotonum.

Abrotonū calidum & siccum est facultate, in tertio recessu, aut ordine, qui ad temperatā naturam expenditur, situm. Valdè siquidē est amarū: qui sapor, quū essentia terrena sit, à largo est calore extenuatus. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores, ante invasionem rigorum eos abrotono confrices, minus utiq; concutientur, subitoq; sensum caloris percipient. Quod abrotonum etiam lumbricos perimat, par quidem est, quum sit amarum. Ceterum & digerendi & incidendi quandā vim habet, ipsoq; absinthio majorem: quandoquidē paucissimæ acerbitalis participes est abrotonū, haud autē exigua absinthium. Unde inimicū sanè est ventriculo abrotonū, veluti etiam seriphum: gratū verò & amicum absinthiū. Per se quippe amarū omnifariā est infensū ventriculo: austerū verò, aut acerbū, aut in summa astringēs, amicum & familiare. Abrotoni duæ sunt species: quarum alteram sanè marem, alteram foeminam vocant. Similiter & absinthii tres species, aut differentia assignantur. Quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellat absinthium: cuiusmodi est Ponticum. Secundam autem Santonicum: ac tertiam deniq; Seriphum. Quibus omnibus absinthium quidem minus est calidum, nempe plurimam astringentem obtinens. Non tamen minus desiccatorium existit. Ceterorum autem, Santonicū à Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum, proximam habet facultatē, Seripho paulò imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccandoque. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est calidū, verum calidius absinthio, stomacho impendit inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quandam ferens falsedinem. Sed nonnullam tamen, etsi minimā, astringentem sortitur. Sic Abrotonum & Santonicum admodum sunt infesta ventriculo. Solū enim inter ea absinthium, & maximè ponticum, gratū stomacho existit. Abrotonum ustū, calidū siccūq; facultate est, magis etiā quam cucurbita sicca usta, & anethi radix. Illa

Vita brevis.
Ars longa.

Dioscoridem
exactissimè
tradidisse
historiam
plantarum.

Abrotoni
tēperatura
&
essentia.

Abrotono
si
quis
perfrice
tur
ante
in
vasionem,
mi
nus
a
febrili
rigore
infe
stabitur.

Abrotonum
sermes
peri
mit.

Abrotonum
inimicū
ven
triculo
Absinthium
ventriculo
gratum.

Astringen
tia
sunt
am
ica
ventriculo.

Absinthij
tres
species.
Ponticum.
Santonicū.
Seriphum.

Eucurbita
assa praputij
ulcerib' con-
gruis.

Abrotoni ci-
nis ex aliquo
oleo calido,
barbam tar-
dus nascentem
elicit.

Agnos.
Vitex.

Pitui semē
capiti gra-
uitate parit.

Vitex Gene-
reas intempe-
rantias com-
pescit.

Ruta facit
sal.

Vitex obstru-
ctis confert,
mensēsq; pro-
movent.

Agrostis.
Gramen.

Graminis e-
sculentum ra-
dix cruenta
ulcera gluti-
nat, frangit
que lapides.

Graminis
semen.

Anchusa
quatuor spe-
cie.

Onoclea qui
bis morbis
conueniat.

Lycopsos.

enim ulceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt: ac proinde maxime præputij ulcerib. congruunt. At cinis abrotoni ulceribus omnibus mordax est: atq; idcirco ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut Sicyonio, aut veteri, & maxime Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam tardius nascentem, in eorum aliquo, nec minus lentiscino maceratum elicit.

Agnos, Vitex.

Agnos, aut vitex, fruticoso illo planta, calidus quidem & siccus est tertio ordine: verum multum tenuis substantia, tum gustu acris simul & astringens: ipsas tamē vitices ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia, semenq; & flos, calida siccaq; sunt facultate, necnon tenui substantia: quare sæpe nobis sunt usui. Porro semen edendo est: tã perspicuo tamen calfacit, ut capiti dolorem hoc nomine pariat: quanquã si id frigatur, minus caput tentat. Utcunq; autē sumatur, flatus ventris discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia, venereas intemperantias compescunt. Quare non tantum esca potaq; conferre ad castitatem videntur, verum etiam substrata: unde planta ipsa, agnos, hoc est, casta vocat. At ruta quàm agnos, magis quidem excafactoria & exiccatoria existit. Ad hæc, agni quidem semen ac germina, modicam astrictionem ferunt: at ruta ubi aruerit, exacte amara est & acris: quandiu verò humida fuerit, subamara. Nulla tamen austeritas aut acerbitas illi inest, aut illa certè obscurissima. Quocirca & ad jecur & lienem indurata & obstructa, agni semen potius quàm rutæ competit. Præter dicta autem agnos & menses mouet, & indurata digerit, & lassitudinem tollit.

Agrostis, Gramen.

Graminis radix modicè frigida est & sicca, mordacitatem quandam exiguam, & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem recessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate existens quam moderata.

Gramen esculentum.

Ejus radix est modicè frigida & sicca: proindeq; cruenta ulcera glutinat. Ipsa autem herba illita non vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Radici porro mordacitas & tenuitas quædam exigua inest, qua nimirum lapides frangit, si quis eam decoctam bibat. At semen alterius quidem imbecillū est: ejus verò quæ in Parnaso nascitur: urinam ciet, ac fluxus ventris & stomachi resiccant. Vis enim ejus est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

De quatuor Anchusis.

Onoclea quam vocant, radicem habet admodum refrigerantem, desiccantem, astringentem, & subamarā, corporibus condensandis & modicè extenuandis idoneam: tum abstergendis quoque & abluendis biliosis & falsis succis. Quare aurigini & lienosis est utilis. Præterea cum polenta illita, iuvat erysipelata, & abstergit non modo epota, sed etiã admota extrinsecus: proinde acetomacerata vitiligines & lepras sanat. At folia ipsius herbæ imbecilliora radice sunt, non tamē a resiccatione & astrictione aliena. Ita profluvium sanāt cum vino pota. Lycopsos nominata, refrigeras etiam & siccans, similiter erysipelatis con-

gruit. Cæterum radicem quàm onoclea magis astringentē sortitur. Onochilo cognominatē vis & calidior & medicamentosior inest. Quare eos qui à viperis morfi sunt, admodū iuvat, tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua verò quæ quarta est, & parua, cæteris est calidior, amarior, & medicatior: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mēsurā cū nasturtio & hyssopo epota.

Agarici radix.

Primò quidē gustu dulcis, sed paulò post subamara apparet, acrimoniāq; & astrictionis leviculæ quandā speciē tēporis spacio inducit: estq; cōsistentia laxa. Quare composita hæc radix est ex substantia aërea & terrea, à calore extenuata. Minima autē habet essentiæ aquæ. Hac ratione & digerendi vim possidet, & crassitudinē incidēdi, tum anfractus viscerum expurgandi. Idcirco regio morbo laborātes ex obstructione jecinoris, necnon morbo comitiali obnoxios, sanant: tum rigores per circuitus recurrētes, ex crassis viscidisq; humoribus ortos exterminat. Iuvat & morfos à bestiis frigore lædētibus, aut cōpūctos, tum foris in affecta parte impositū, tum intrò in corpus assumptum, pondere drachmæ unius cum vino diluto. Est etiam & purgatoriū.

Ageranton.

Facultatem digerendi habet, & leviter quadantenus phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

Vulgò capilli Veneris.

In calore & frigore symmetrū est, siccatur tamē, & extenuatur, & digerit. Caput ex alopecia glabrū, capillis vestit: strumas & abscessus digerit: epotū lapides frangit: viscidorū crassorumq; è pectore pulmoneq; excreationibus, non mediocriter confert: ac deniq; ventris profluvium sistit.

Aizoon, Sempervivum.

Aizoon utrūq; tum majus, tum minus, desiccatur quidem leviter, utpote astringēs modicè: est tamē ex tertio ordine refrigerantium, in eoq; aquea essentiā præpoller. Quare ad erysipelata, herpes, & phlegmonas à fluxione ortas accommodatur.

Aegilops, Avena.

Digerēdi vim obtinet, existēs leviter acris. Unde phlegmonas induratas, & ægilopas sanat.

Aera, Lolium.

In principio tertij ordinis excafacientiū, secundū verò extremo exiccantiū consistit, sic ut accedere magis quàm iris, naturæ acrium videatur: à qua tamen essentiæ tenuitate relinquitur.

Aegyrs, sive populus alba.

Populi flores calidi sunt in primo recessu, paulumq; ad siccus declinant, subtiliorūq; potius quàm crassiorū sunt partium. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Resina etiam floribus similem facultatē, sed calidiorem obtinet. At semen, tum resina, tum floribus subtiliorum est partiū, & exiccantius: non tamen multo calidius.

Acacia.

Acacia & planta ipsa acerba est, & fructus, & succus: quod lotus acrimoniā deponit. Porro si parti illinatur, protinus eam sicciorē atq; contractam reddit: estq; tertij ordinis exiccantiū, & secundū refrigerantium, ubi quidem elotus fuerit: alioqui si illotus sit, primi. Est autem consistentia terreus, habetq; in se partes quasdam aqueas, necnon

nec non alias tenues & calidas.

¶ *Acalephe, Vrtica.*

Hujus herbae tum fructus, tum folia, admodum digerētis sunt facultatis, adeo ut phymata & parotidas sanēt. Sed & quiddā flatuosum exhibēt, dum coquuntur, quo extimulant venerē, & maximē ubi semē cum musto bibitur. Quod nō calfaciat vehementer, sed nimis tenuium sit partiū, testimonio est crassorū ex pectoreeductio; tum pruritus quem in partibus excitat. Porro subducit ventrem titillatione magis quā purgatione. In universum, quae exiccati citra mordicationē postulant, ea convenienter persanat.

¶ *Acanthos, Spina vulgaris.*

Folia quidem mediocriter digerentē facultatem obtinent: at radix exiccatoria est, & leviter in cisoria, & tenuium partium.

¶ *Acanthium.*

Radix hujus & folia facultatis sunt exalfactoriae, ut & iis qui convelluntur auxiliantur.

¶ *Acanthos leuce, Spina alba.*

Radix ei⁹ deficcatoria est, modicēq; astringēs: quamobrē & coeliacos & dysentericos juvat, & sanguinis rejectiones cohibet, oedemataq; illitu cōtrahit, ac dentes dolētes juvat, si decocto ejus colluant. Semē tenuis essentiae & calidae facultatis est: itaq; potui dari iis qui cōvelluntur cōvenit.

¶ *Spina Aegyptia.*

Validiusq; spina alba, tum astringit, tū siccāt. Quare profluviū muliebre radix ejus suppressit. Fructus verō & columellae prodest, & iis quae in sede inflata sunt: ulceraq; ad cicatricē perducit.

¶ *Acoron.*

Hujus radice utimur, q̄ gustu modicē amaro est, odoreq; non injucundo. Itaq; facultatis calidae est, & consistentiae tenuis. Quare & urinā movet, & lienes induratos discutit, ceratoidisq; crassitiē detergit, extenuatq; Ad q̄ succus praestātor existit: calfacit. n. & siccāt in tertio ordine.

¶ *Aconitum pardalianches.*

Hoc putrefacientis & deleteriei facultatis existit: quare in cibo potuq; fugiendum.

¶ *Aconitum lycoctonum.*

Est & hoc similis alteri facultatis: sed peculiariter lupos interficit, ut illos pardos.

¶ *Acte, quam sabucum: Chamaecte, quam Ebulum vocant.*

Utraq; potentiam habet & deficcandi, & cōglutinandi, nec non digerendi modicum.

¶ *Alimum.*

Semen simul & lac hae planta gignit, estq; gustus acris & subastringentis: ex quibus constat ipsam esse dissimilare. Major tamen pars ejus temperatē est calida, cum humiditate incōfecta, & leviter flatuosa.

¶ *Aloē.*

Hae herba, optima in India nascit, cuj⁹ liquor est id q̄ ad nos importatur, cognominatū aloē, medicamentū ad plurimas res, propter siccitatē mordicationis expertē, utile. Quod quidē astringit modicē, sed fortiter amarū est: ac pinde subducit ventrem. Est autem tertij ordinis exiccantium: calfacientiū autem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Ad hae verō, gratum est ventriculo medicamen, ut si quid aliud: & sinus glutinat. Sanat ulcera quae agrē ad cicatricem perdu-

ci possunt: & maximē quae in ano sunt & pudendo. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorū phlegmonas, nec non eas q̄ in ore, naribus, oculisq; oboriuntur. In summa, repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quātum videlicet, ulceribus purit non sit molestum.

¶ *Alysson.*

Nuncupata est hae herba Alysson, quod mirificē juvet morsos a cane rabido. Sed rabienti quoq; data, saepe in totum sanavit, ob totius substantiae similitudinem. Siccāt autem digeritque mediocriter, ac praeterea detergit nonnihil. Quae ratione vitiliginem, & ephelim purgat.

¶ *Alfine, Auricula muris.*

Hae quum essentiae sit aquae, citra astringentem refrigerat, tū humectat. Quare ad ferventes phlegmonas & mediocria erysipelata cōfert.

¶ *Amaracon, Maiorana.*

Calfacit quidem in tertio ordine: in secundo aut siccāt.

¶ *Ambrosia.*

Illita vim habet astringentem, ac repellentē.

¶ *Ami.*

Ejus semen est admodum utile. Quum enim sit subamarum & acre, constat ipsum & digere, & provocare urinas. Calfacit aut, resiccātq; intertio ordine intensq.

¶ *Amaranthum.*

Facultatis est incidentis & extenuantis. Quare comā ejus cum vino pota, menses educit: omnesq; pota fluxiones deficcāt: stomacho infesta. Grumos etiam sanguinis dissolvere creditur.

¶ *Amurca.*

Ex secūdo est ordine calfacientiū: at ficcantiū intenso quodāmodo magis, terrestres substantiae quum sit. Sic & ulcera corporum tēperatura ficatorū curat, quae verō in aliis omnibus sunt, exasperat: perinde ut resina, pix sicca, & bitumen.

¶ *Ampeloprason, Porrum agreste.*

Est enim herba hae porrum agreste: ob idq; acrius eo, atq; siccius, ut agrestia omnia hortensibus. Proinde stomacho quā illud, nocentius. At crassos & lētos humores potētius incidit, valentiusq; infracta organis obstructione liberat. Hac quoq; ratione saepe provocavit urinas, ubi a crassis & lentis renitebant humorib. Adeo verē est calidū, ut illitū cataplasmatismu ritu, exulceret.

¶ *Ampelos agria, Vitis agrestis.*

Racemi ejus extergēdi vim possident: ac pinde cutis extimae ulcera purgare possunt. Sed astringentem quandam sortiuntur extrema germina, quae & sale condiri assolent.

¶ *Ampelos hemeros, Vitis sativa.*

Vitis cultae assimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

¶ *Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.*

Prima hujus germina vere edi solēt, edulium vetriculo propter astringentē acceptū. Ceterum subamaram, & modicē acrē astringentem possident: quare & urinam modicē cient. At radix & abstergentem, & deficcantem vim habet, & moderatē calidā. Quamobrē & lienes induratos liquat epota: cum ficubusq; foris imposita, pforā & lepram sanat. Porro fructus ejus, racemi speciem praefrens, iis qui coria depant, est utilis.

¶ *Ampelos melena, Vitis nigra.*

Vocatur autem hae proprie bryonia, praedi-

Et ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

¶ *Amygdala.*

*Amygdalo-
rum vires.*

Quæ quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident. Siquidem ephelim purgat, & excreationibus ex pectore pulmoneque; crassorum lentorumque humorum mirè auxiliant. Obstructiones præterea jecinoris à crassis & viscidis succis ortas expediunt. Quin & lateris, & lienis, & coli, & renū dolores, ab hujusmodi causa natos persanant. Ipsius arboris etiā radices coctæ illitæque, ephelides purgat. Porro amygdala dulcia, quæ & ipsa non nihil fortiuntur amaritudinis, moderatè sunt calida.

¶ *Ammoniacum.*

*Ammonia-
cum.*

Cujusdā ferulæ est lachryma, intēsam emolliendi vim possidens, adeo ut articulorum tophos dissolvat, & lienes induratos sanet, & chæradasp halitū digerat.

¶ *Amomum.*

Amomum.

Acoro simile facultatē obtinet, nisi quod acorū siccus sit, majore autem concoquendi vi amomū.

¶ *Anagallis.*

*Anagallis
utriusque fa-
cultates.*

Anagallis utraq; & quæ cœruleū, & quæ purpureū fert florē, extergentis est facultatis. Habet verò non nihil etiā caloris, & quandā trahendi vim, qua corpori infixæ extrahunt. Succus earū ex naribus purgat eadem de causa. In summa, desiccandi vim habent citra mordicationem. Quamobrem vulnera glutinant, & putrida corrigunt.

¶ *Anagyris.*

*Anagyris fa-
cultas.*

Frutex est graviter olēs, & digerētis, excalfaciētisque facultatis. Cujus folia viridia tumores reprimunt: at resiccata, incidētis sunt exiccatisque potentia. Similem ferè vim habet ejus radicis cortex. Semē autem subtiliorū est partiū, vōitū tāen provocat.

¶ *Androsæmum*, Officinis *Milleperforata*, Hispanis *Coracocillo*, hoc est, *corculum*.

*Androsæmū.
Milleperfo-
rata.*

Planta est fruticosa, natura duplex. Unū enim dicitur *Ascyrō*, species hyperici: alterū à quibusdā appellatur *Dionysias*. Est autem semē eorū purgatoriū: foliorū verò facultas modicè extergens & desiccans, ut & ambusta curare credatur. Cæterum in vino austero decocta, vinū ipsum vulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

¶ *Androsaces.*

Androsaces.

Amara & acris est herba. Potest autem resiccata ebibitaque; tum ipsa, tum fructus ejus, magnopere provocare urinā, & nimirū etiā digerere & desiccare.

¶ *Andrachne, Portulaca.*

Andrachne.

Frigida & aquea est temperie, paucæ particeps austeritatis: pinde fluxiones repellit, maximeque biliosas & calidas. Estque tertii ordinis refrigerantiū: humectantiū autem secūdi. Quare maximè est utantes adjuvat, tum vētris osculo inposita, tum hypochondriis: ac præcipuè in febribus hecticis. Præterea dentiū stuporē lenit. Quoniā autem restringit, utiliter dysentericis edit, & muliebri pfluvio, & sanguinis rejectionibus. Sed ad hæc sanè multo est quam herba succus ipsius efficacior.

¶ *Anemone.*

Anemone.

Radix cōmansa pituitā evocat: succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerū anemonæ expurgant, & lepras detrahunt, mensesque; appositæ eliciunt, & lac trahunt.

¶ *Anethum.*

*Anethi fa-
cultates.*

Adeo excalfacit anethū, ut habendū sit aut secundi ordinis intensi, aut tertii remissi. Exiccantis verò ordinis est secūdi incipientis, aut primi

finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, crudos humores concoquit. Ultimum autem, tertij ordinis tum calfacientium, tum exiccantiū fit. Proinde ulceribus nimis humidis prædest, potissimū iis quæ in pudendis consistunt. At quæ in præputio sunt inveterata, ea præbe cicatrice inducit. Cæterum viride humidius & minus calidū est: itaque magis concoquit, & somnum conciliat, sed minus discutit.

¶ *Anthyllis.*

Anthyllis utraq; modicè desiccatur, ut & ulcera glutinet. At quæ chamæpityi assimilis est, subtiliorum est partium, magisque; detergit, præterea comitialibus competit.

¶ *Anthemis, Chamamelum.*

Calfacit, & desiccatur in primo ordine, estque; tenuium partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtinet.

¶ *Anisi semen.*

Calfacit & siccatur in tertio ordine. Proinde urinam movet, ac digerit, flatusque; ventris reprimunt.

¶ *Antirinum, Anarinum.*

Semen habet inutile, estque; cū bubonio similis facultatis.

¶ *Aparine, Philanthropos.*

Modicè extergit & desiccatur, habetque; non nihil subtiliū partiū.

¶ *Apios, Pirus.*

Piri folia pariter & turiones, austera sunt. Ex fructu autem, pars una terrea est, alia aquea. Cæterum utraq; frigida, necnō alia temperata. Proinde esu pira stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, modiceque; refrigerant. Unde etiam vulnera glutinant.

¶ *Achrades, Pira sylvestria.*

Magis quam pira reliqua astringunt & desiccant: ob idque; majora vulnera glutinant, fluxusque; reprimunt.

¶ *Apocynum, Cynocrambe, Cynomorum, Sylvestris mercurialis.*

Canibus juxta & hominibus est venenū, herba graviter olens, ob idque; vehementer calida: non tamen proportionē desiccatur. Itaque; illita, admodum digerentis est facultatis.

¶ *Argemone.*

Et hujus herbae facultas absterforia est, & digerens.

¶ *Arisaron.*

Multo minus est aro. Radicē habet olivæ magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

¶ *Aristolochia.*

Radix ejus est amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarū verò duarū, quæ clematidis appellatur, fragrantior est, infirmior tamen. At longa, tenuitate quidē à rotunda vincitur, abstergendi tamen calfaciendi; & ipsa potentiam obtinet: minus sanè quam rotunda abstergens & digerens, sed non minus calfaciens, imò forsan plus. Itaque; in quibus usus est modicæ absterfionis, comodior est longa: utputa in ulceribus carne implēdis. At in quibus crassum humorē validius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Proinde dolores à crasso spiritu inductos, rotunda exactius persanat, extrahit spicula, putredines corrigit, ulcera sordida purgat, dentes & gingivas splendidas facit: auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricisque; si cum aqua bibatur. Tum ruptis & convulsis, ut si quid aliud, medicamen idoneum est.

¶ *Arceuthus*

¶ *Arceuthus, Juniperus.*

Calida & sicca est tertii ordinis. At fructus, similiter calidus est: siccus tamē in primo ordine.

¶ *Arctium.*

Quod Thapso Verbasco est simile, radice tenera, cadida, dulci, caule oblōgo et molli, semine cymino simili, tenuiū est partium: ob idq; facultatis modicē exiccantis & extergentis. Quamobrem radix ac semē eius in vino cocta, quadantenus dentium dolores mitigant. Porro ambusta & chymethla non horum modō decoctum, sed & caules teneriores sanare possunt.

¶ *Arctium aliud, Lappa maior, Bardana.*

Digerit simul & deficcatur: astringit tamē nō nihil: unde folia eius antiquis ulceribus profunt.

¶ *Arnoglosson, Plantago.*

Refrigerat pariter et siccatur in secundo gradu: habetq; nonnihil austerum, ratione terrearū partium. Porro medicamenta, quæ cū hoc quod refrigerat, unā etiā astringūt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines cōveniunt. ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluvia sistunt, & si quid aduratur, refrigerant. Tum sinus quoq; glutinant, & alia ulcera recētia simul & vetera. Atque in omnibus ferē id genus medicamētis primas tenet, aut certē nulli secundū est arnoglossum, ob tēperaturē symmetriā & convenientiā. Nam siccitatē obtinet morsus expertē, & frigiditatē quæ nondū stupefaciat. Fructus etiam & radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris, tum minus frigida. Quin & semen subtiliū est partium: radices verō crassiorū. At herba folia exiccata subtiliū partium existūt, & minus frigida facultatis. Radicibus utuntur ad dentium dolores tum mandentes, tum collutionib. incoquentes: præterea ad jecinoris renūq; obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoq; & multo magis semina.

¶ *Arum.*

Mediocre extergēdi vim possidet, estq; primi ordinis calfacientium & exiccantiū. Radices eius comestæ mediocriter humorū crassitiē incidunt, ita ut sint excreationib. ex pectore idoneæ.

¶ *Artemisia.*

Duplex est, utraq; tamen calfacit secundo ordine: intenso autem primo, aut secundo remisso deficcatur: estq; tenuium partium: unde calculis renū, utriq; fomentationibus haud mediocriter congruunt.

¶ *Asarum.*

Radices eius facultate similes radicibus acorisunt: intensiores tamen.

¶ *Asclepias.*

Hujus nondum nos periculum fecimus.

¶ *Aspalathos.*

Acris simul & astringens est. Quare partibus quidē suis acris exalfacit, austeris verō refrigerat. Itaq; utriusq; ratione deficcatur: unde ad putredines & fluxiones est utilis.

¶ *Asparagus perrus.*

Abstergendi vim habet citra manifestam caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac jecur infarctū liberat &, maximē radices eius, & semen: quia & dentium dolores sanat.

¶ *Asplenium.*

Tenuium quidem partium, nō tamen calida

est herba. Hac utiq; ratione lapides frangit, & lienes liquat.

¶ *Astragalos.*

Radices astrictorias sortitur: quæ nō instrenuē siccatur. Nā & ulcera glutinat, & arum fluxionem sistit, si quis in vino decoctam radicē bibat.

¶ *Aster atticus, Bubonium.*

Partim quidem digerens est partim, autem refrigerans: verum id non astringit.

¶ *Astaphis, Vva passa.*

Culta quidem, cōcoquendi, astringendi, & leviter digerendi, facultatē obtinet. At agrestis, vehementer acris existit, adeo ut ex capite purget, abstergatq; valenter. Itaq; ad pforam accommodata est: Sed & urendi vim habet.

¶ *Asphodelus.*

Hujus radix extergētis est facultatis. Ustæ autē cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

¶ *Attractilis, Cnicus agrestis.*

Facultatem habet deficcandi, & modicē digerendi: exq; spinarum est genere.

¶ *Atraphaxis, Atriplex.*

Humida quidem est in secundo ordine, frigida verō in primo: estq; aquea similiter malvæ. Quin & ventrē celeriter pmeat, ut illa, ob lubricitatē. Hortēses autē atriplex & malva q̄ agrestes, tū humidiores sunt, tum frigidiores: p̄inde phlegmonis & phygethlicis incipiētibus, hortēses: vigentibus autē & declinatibus, agrestes magis cōveniūt. Semen eius abstergendi vim habet. Itaq; ictēritiq; ab obstructione jecinoris ortæ auxiliatur.

¶ *Aphace.*

Astringit, editurq; ut ipsa lenticula: ægriustamen cōcoquitur. Cæterum valentius deficcatur, & moderati caloris est.

¶ *Absinthium.*

Astrictoriā, amaram, & acrem qualitatem sortitur exalfaciēs, extergens, roborās, & exiccās. Proinde biliosos ventris humores dejicit, ac per urinā evacuat. Verum contentam in ventre pituitā nihil adjuvat sumptū. Sic nec si in thorace aut pulmone cōtineatur: nam astringēs in eo facultas quam amara, valētior est. Est autem calidū in excessu primo: siccū verō in tertio. Ac succus longē quam herba est calidior.

¶ *Balanus Myrepica, Glans unguentaria.*

Succo eius qui calidus est, unguētarij utūtur. Reliquiæ autē unde expressus est succus, vincentē habet qualitatem amaram, cui admista est quædam astrictio. Proinde extergentem, incidentē, contrahentem, & stipantem effectum possidet. Quod si quis carnē eius drachmæ pondere, cum melicrato bibat, medicamen experietur vomitorium. Sæpe etiam per infernā alvum subducit largiter. Sed lienes liquat, jecurq; indurescētia: ad quorum viscerum expurgationem, ex oxycrato ipsam exhibere cōsuevimus. Ex aceto etiam lepras, pforas, lētes, vitiligines, jonthos, ephelim, exanthemata, achoras, aliosq; id genus cutis affectus exterit. Abstergentē itaq; & incidentē cū astrictione obtinet facultatē. Cortex autem eius admodum astrictorius existit.

¶ *Balsamum.*

Balsamū deficcatur & exalfacit secūdo excessu: est autē tenuium partium, adeo ut odoratū sit. Ejus lachryma subtiliorum est partium quam ipsa

Carpobalsamum.

planta: non tamē adeo calida ut nonnulli existimant. Fructus eius per similes facultatis est, longē tamen in subtilitate partium inferior.

Balaustium. Cytinus.

¶ Balaustium. Flos est agrestis punice, sicuti domesticarū cytinum valenter gustū astringit. At verò si omne astringens terrestre est & frigidum, meritò quis dixerit ipsum valenter & exiccare, & refrigerare. Quo nomine ulcera ad cicatricem perducit. Quin etiam ad sanguinis rejectiones, dysenterias, necnon vētris uteriq; profluvia, nemo est qui non hoc medicamento utatur.

Rubus. Rubus.

¶ Rubus, Rubus. Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringēte, neq; obscura, participāt. Sed folia germinaq; recens nata plurimum in se habēt substantiæ aqueæ, parū verò astrictionis. Quare vulnera glutināt. At fructus maturus, nō parum habet succi calidi tēperati, qui existit dulcis: ob idq; & ob modicam astrictionē, non est insuavis gustui. At immaturus, acerbus est, & validē exicatorius. At sanē uterq; reconditur, validius quā recens desiccans. Flos eandē vim fructui immaturo possidet. Utraq; ad dysenterias, ventris profluvium, robur deperditū, sanguinisq; expuitionem sunt idonea remedia. Radix præter astrictionem, nō paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit.

*Rubi radix comminuit lapides.**¶ Batrachium, Ranunculus.**Batrachium Ranunculus.*

Hujus omnes quatuor species adeo acres existūt, ut cum dolore exulcerent. Quare si convenienter utare, psoras & lepras excoīāt, & ungues divellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & verrucas detrahunt. Quin & alopecias juvant exiguo tempore admotæ. Radix arefacta sternutationē provocat. Sed & dentes dolentes juvat, sic ut eos frangat. Est itaq; valdē calida & sicca, tum radix, tum universa herba.

*Edellium.**¶ Edellium.*

Quod Scythicum nomināt, estq; acrius & resinofius, emollientis admodum & efficacis virtutis est. Arabicū autem, quod splendidius est, magis quā emollientia exiccat: videturq; in potu sumptū calculos renū frangere, tum urinas ciedere, & crudorū flatuum discursus, præterea laterum dolores, rupturasq; sanare.

Bechion. Tusilago. Ungula caballina.

¶ Bechion, Tusilago, Ungula caballina. Tusses & orthopnoeas juvare creditur, si quis folia arida aut radicē in prunis urens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autē modicē acris: ut sine molestia, noxave, omnes thoracis affectus credatur rūpere. Folia virentia partē recēti phlegmone obsessam illitu adjuvāt.

*Blitum.**¶ Blitum.*

Holus est esculentum, humidæ frigidæq; temperaturæ in secundo ordine.

*Bulbus sativus.**¶ Bulbus sativus.*

Frigidior quidē & crassior agresti est, lentūq; succum pcreat. Nam & coctu difficilis est & flatuosus, & venerē provocans. Attamen illitus ob amaritudinem simul & astrictionem abstergit simul & glutinat, & nimirum exiccat.

*Bulbus vomitorius. Bubonium. Afer atticus.**¶ Bulbus vomitorius.*

Multò est calidioris temperaturæ quā superior.

¶ Bubonium, Afer atticus.

Creditur sanare bubonas & illitū, & alligatū

inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicē est calidum. Cæterum non ita ficit, ut tendat.

¶ Buglosson.

Humidæ calidæq; temperiei est: viniq; injectū hilaritatis causa esse credit. Sed gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato coctum sumatur.

¶ Bunium.

Adeo exalfacit, ut & urinas moveat, & menses provocat.

¶ Buphthalmos.

Flos eius floribus chamæmeli est tum major, tum acrior: vehementiusq; digerit adeo ut & duritias sanet, cerato mistus.

*¶ Brathy, Sabina.**Brathy. Sabina.*

Quātum in acrimonia cupressum vincit, tantum ab eo superatur in actione: quare illo & calidior est, & potentius digerit. Quin & similiter cupresso putredinibus accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint & diuturniores. Carbūculos itē solvit: mensesq; ut si quid aliud, essentiæ tenuitate provocat, & sanguinē per urinam movet. Foetū etiā viventē interficit, & mortuum educit. Esto autē hoc medicamentū tertij ordinis tum exalfacientiū, tum exiccantiū, ex numero eorum quæ vel maxime tenuiū sunt partium.

*¶ Bretanica.**Bretanica.*

Hujus folia astringentia sunt & vulnerū glutinatoria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est astringere, videturq; sanare jam putrescentia.

*¶ Bromus.**Bromus.*

Illitum desiccet, digeritq; mediocriter & sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiā astrictionis obtinet, ut ventris profluvia juvet.

*¶ Bryon thalassion, Alga.**Bryon thalassion. Alga.*

Compositū est ex terrea & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & gustum astringit, & calidis quibusvis illitum, ea refrigerat, adjuvatq;

*¶ Bryon aut Splanchnon, Muscus.**Bryon. Splanchnon. Muscus.*

Vim habet astringentē invalidā, cæterum mediocriter frigidā. Nam & digerendi, & emollienti facultatis est particeps.

*¶ Gallium.**Gallium.*

Inde nomen sumpsit, quod lac coagulet. Facultatem autē obtinet exiccatoriā, & subacrē. Flos eius cōpetere sanguinis profluvii videtur, & cōbustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

*¶ Gentiana.**Gentiana.*

Hujus radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat obstructione, utpote impensē a mara existens.

*¶ Gigarta, acinorum uvæ nuclei.**Gigarta. Acinorum uvæ semina.*

Ex secundo exiccantiū sunt ordine; refrigerantium verò, primo. Omnibus autem ventris cum profluvio junctis affectibus, impediō cōferunt, utpote quum acerbi apparent.

*¶ Gingidium.**Gingidium.*

Gustu amarum & astringēs quum sit, temperie calidum frigidumq; videtur. Secundū utraq; verò qualitatē desiccatorium est. Cæterā porro stomacho amicum existit.

*¶ Glaucium.**Glaucium.*

Astringit cum quodam fastidio: tum adeo insigniter refrigerat, ut solū sæpe crysipelata, si valentia nō fuerint, curare possit. Constat enim ex aquea terraq; substantia, utraq; frigida.

¶ Glanx.

Blau herb

¶ *Glaux herba.*

Ex lacticiiniis quum sit, calida quodammodo humidaq; fuerit.

Glech.

Pulegium.

¶ *Glechon, Pulegium.*

Quandoquidem acris & subamara est, valde extenuat & calfaciat. Quare & illita rubricat, & exulcerat si diutius hæreat. Quinetiam humida, crassa, & lenta, ex thorace & pulmone excreatu facilia facit, mensesq; movet.

Glaos.

Trigmenta.

¶ *Glaeos, strigmenta balnearum.*

Modicè emolliendi vim obtinet.

Glycyrrhiza

Dulcis radix

¶ *Glycyrrhiza, Dulcis radix.*

Similiter radici ipse succus, ducis leviterq; astringens existit. Proinde non modò asperæ arteriæ, sed vesicæ etiam scabritiæ lenire potest, idq; temperaturæ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ. Cæterum tepidam quandam caliditatē sortitur. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id quod modicè est dulce, jure sanè etiam firi congruens medicamentum est, nimirum modicè humidum, humanaq; natura frigidius. Dioscorides ait, arefactæ radicis pollinem unguibus oculorum mederi.

Glycyfida,

Ponia.

¶ *Glycyfida, Ponia.*

Radice[m] habet leviter astringentē, cum quadam dulcedine: at si plusculū dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarā subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quantitate. Expurgat porro etiam jecur obstructū, & renes: ventrisq; sistit fluxiones, si in aliquo austero vino cocta sumatur. Est præterea omnino resiccatoria: quare ex collo pueris suspēsa, meritò comitialē morbum persanat: idq; aut aliquem à se fluorem per infantuli inspirationē immittēs, aut aërem assidue mutās, atq; alterum reddens. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam juvat: & melanthium frictū palam catharrhos & coryzas desiccāt, si quis id in calidum linteū rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quinetiam si compluribus linis, & maxime marinæ purpuræ, collo viperæ injectis, illis viperam præfoces, eaq; postea cujuspian collo obvincias, mirificè profueris, tum paristhmis, tum omnibus iis quæ in collo expullulant. Ponia itaq; & exiccat, & tenuiū est partium: calfacit autem mediocriter.

Gnaphaliū.

¶ *Gnaphaliū.*

Folia eius modicè astringunt: quare ex aliquo vino austero dysentericis profunt.

Gongilis.

Rapum.

¶ *Gongilis, Rapum.*

Gongilidis semen venerē excitat, utpote spiritum flatuosum gignēs. Sic & radix coctu difficilis est: inflatq; & semen generat.

Damasoniū.

Alisma.

¶ *Damasoniū, Alisma.*

Decoctum radicis eius calculos renū comminuit. Quare abstersoria facultatis est particeps.

Daucus.

Staphylinus.

¶ *Daucus, Staphylinus.*

Domesticus esui aptior, sed imbecillior, acré calidamq; facultatem sortitur: ac proinde etiam extenuat. Ac radix sanè flatuosum quid obtinet, ac venerē. Semen autem, domestici quidem & ipsum quandam ad Venerē ciendi potentiā possidet: agrestis verò planè flatu caret, ac proinde urinam mensesq; ciit.

¶ *Dauci semen.*

Dauci semen

Adeò vehementer excalfacit, ut inter primā, tū urinā, tum menses provocet. Multum etiam digerere per halitū foris impositum valet. Ipsa verò herba, moderatè calida est, similemq; etiā vim obtinet, cæterum infirmiore[m].

¶ *Daphne arbor, Laurus.*

Daphne

Laurus.

Hujus folia calfaciunt & siccant vehementer: at fructus adhuc vehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus, cæterū plus amarus: habetq; etiā astrictionis nonihil. Quamobrem & calculos confringit, & jecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorū pondere.

¶ *Daphne herba quam Alexandrinā appellant.*

Daphne herba

Evidenter est calida, acris & subamara, potaque tum urinas, tum menses prolicit.

¶ *Chamedaphne.*

Chamedaphne

Perfimilis quidē est viribus daphnæ Alexandrinæ: sicuti & quod daphnoides vocant.

¶ *Dictamnū.*

Dictamnū.

Tenuiori essentia constat quā pulegium, cætera illi simile. At pseudodictamnū ad omnia imbecillius existit.

¶ *Dipsacos.*

Dipsacos.

Dipsaci spinæ radix ex secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil & abstersorium.

¶ *Dorycnidion.*

Dorycnidion

Aquea excellit frigiditate. Quamobrē pauculum quidem soporem conciliat, plusculum verò sumptu in perimit.

¶ *Dracuntium, Dracunculus.*

Dracuntium

Dracunculus.

Quiddā aro perfimile obtinet, tum foliis, tum radice. Cæterū illo acrius est, & amarius: ac pinde calfactorium magis, & tenuioribus partib. Habet etiam & astrictionem leviculā. Radix omnia viscera expurgat, optimumq; remediū est contumaciū ulcerum. Verum exterget etiam cætera omnia quæ extersionē desiderant. Folia præterea similem facultatē sortiūtur, ob idq; si sint viridia, recentia vulnera glutināt. Fructus valentior est, non foliis tantum, sed radice. Itaq; & caneros, & polypodas credit eliquare. Succus eius quoq; vitia oculorum expurgat.

¶ *Dryopteris, Filicula.*

Dryopteris

Filicula.

Dulcis, acris, amara, & in radice etiam acerba existit. Habet aut facultatē putrefaciendi: proinde pilis glabram cutim efficit.

¶ *Drys, Quercus, Robur.*

Drys.

Quercus.

Robur.

Fagus.

Ilex.

Exiccandi astringendiq; possidet facultatem, cum modiocri quadam tepidaq; caliditate. Cæterum plus cæteris eius partibus astringit, quæ in trunci cortice membrana subest: tum quæ ipsius fructus cōvestit carnē. Quamobrē ad profluviū muliebre, sanguinis expuitiones, dysenterias, & diuturnos ventris fluxus esse credunt accommodam. Valentius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarū folia tenella illita non instrenuē desiccāt, necnon vulnera glutināt. Eandem foliis vim habet & fructus roboris: eoq; Medici nonnulli utuntur ad incipientes atq; crescentes phlegmonas.

¶ *Ebiscus, Althea, Agrestis malva.*

Ebiscus.

Althea.

Malva sylva

stria.

Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mitigandi, & concoquendi difficiles coctu affectus est prædita. Cæterum & radix & semen quā folia, & tenuiorum sunt partium, magisq; exic-

exiccatoriam & extersoria facultatē ostendunt, ut & vitilignes detergant, & semen renū calculos frangat. At radicis decoctum, ad dysenteriam, diarrhoeā, & sanguinis rejectionem est aptum, quum nimirum etiam nonnihil astringat.

Ebenus.

¶ Ebenus.

Exiis lignis est, quæ trita in aqua solvuntur. Vis ei inest excalfaciendi, extergendi, & tenuiū partium. Quamobrem, quæ pupillas offuscant, extergere creditur: misceturq; aliis ocularibus medicamentis. ¶ Elea, Olea.

Elea.
Olea.

Olivæ rami quantum habent astrictionis, tantæ sunt frigiditatis participes. Fructus verò, si quidē ad unguē maturuit, moderatē calidus est: sin immaturus, magis tum astringit, tum refrigerat.

Eleon.
Oleum.

¶ Eleon, Oleum.

Oleum quod ex olivis exprimitur, humectatorium esse, & moderatē calidū, jam supra docuimus. Ejusmodi est, quod est dulcissimū: fitq; potissimum ex olivis quas druppas appellant. Cæ-

Olei differen-
tia.

terum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania vehitur, id quantum in se habet astrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus quod quidē ex dulci inveterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad evaporandū viribus: quod verò ex crudo, id, dum reliquum quippiam servaverit astrictionis, mixtæ permanet facultatis: ubi verò illam prorsus abjecerit, reliquo evadit simile. Quinetiam quicumq; in præparando ramos injiciunt, ij om-

Oleum lotū
est minimè
mordicans.

phacino simile oleum efficiunt. Porro quod oleum lotū minimè omnium mordacitatem contineat, supra etiam traditum est. Sunt autem varia oleorum genera: quibus sanè, cicinum & tenuius, & ad discutiendum potentius est, quam si millimū oleo ex oliva vetusto. Raphaninum autem, cætera huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiā calidius sinapinum: cui simile est quod ex melanthio conficitur. Pugnant cum istis myrtinum & sesaminum, tum quod astringant, tum quod crassarū sint partium. Mixtæ facultatis est lentiscinum, terebinthinū, & mastichinum. Nō enim tantum emolliūt, sed & astringunt. Amygdalinum porro amaritudinē exuperantem possidet, cæterum cujusdā astrictionis est particeps: non tamen caryinum, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum. Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur. Dadinum, minus quidem laurino calidum, verum valētius desiccans. Hyoscyaminū verò mixtæ facultatis est, emolliendi videlicet, ac refrigerandi. Oleum porro cicinū, ventrem subducit. Hoc verò magis quod fit ex Gnidio grano. Quod ex agresti oliva exprimit, extergit, simulq; astringit. Squalidissimū enim id est ex omni olei genere: & post, Istrium quoq; deinceps illis Hispanum. Pinguissimum est Lybicum, & Cilicium: simul autē pingue & tenue, Sabinum. In medio comprehensorum omniū sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciam, Asiamq; Etenim oleum pingue æstimatur viscositate: tenue verò, si pelluceat, si purū sit, sit plurimū minima ei portione inungatur, si facile à cuti cōhibatur. Omne autem oleum pro cuiusq; injectorum natura variari contingit.

Oleum pin-
gue, tenueq;
qua ratione
æstimetur.

¶ Elatine.

Elatine.

Modicè tum refrigerat, tum astringit.

¶ Elaphoboscus.

Elaphobosco.

Excalfacit, & tenuiū est partium: ob idq; exiccatur, maxime in secundo ordine.

¶ Elenium, Enula campana.

Elenium.

Enula cam-
pana.

Radix eius calida & ficca est cum recrementi humore. Quare eclegmatis q̄ faciunt ad educendos crassos ex pectore succos, idoneè miscetur. Juvat etiam ad rubrificandas partes vexatas frigidis diuturnisq; affectibus.

¶ Eleliphacos, Salvia.

Eleliphaco.
Salvia.

Evidenter excalfacit, ac leviter subastringit.

¶ Helleborus, Veratrum.

Helleborus.
Veratrum.

Tam albus quam niger helleborus extergentis calfacientisq; est potentia. Quamobrem ad alphas, lichenas, psoras, leprasq; accommodati sunt. Quinetiā niger si in fistulā callo induratā infundatur duobus tribusve diebus, callū detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt aut in tertio ordine excalfaciētium & desiccantium. Porro niger gustu calidior est, cādidus amarior.

¶ Helxine, quam Parthenium vocant.

Helxine.
Parthenium.

Abstergit, constringitq; cum humiditate subfrigida: unde phlegmonas incipientes usq; ad augmentum sanat, maxime si calidæ fuerint. Incipientibus etiam phygethliis cataplasmatibus ritu illinitur: ad auriumq; dolores phlegmonosos succus eius instillatus, sicuti ad paristhmia gargari-

30

¶ Helxine, quam Cissampelon vocant.

Helxine al-
tera.

Digerendi obtinet facultatem.

¶ Elynus, Meline, Panicum.

Cissampelo.
Elynus.
Meline.
Panicum.

Facultate pauci nutrimenti est, & exiccatoria. Sistit nonnihil ventris fluxus, ut milium. Si verò foris illinatur, exiccatur atq; refrigerat.

¶ Empetron.

Empetron.

Ad solas purgationes esse videtur commodū, bilem ac pituitam educens: juvat tamen ad alia, gustu salsum existens.

¶ Epithymum.

Epithymum.

Thymi facultatem habet, ad omnia efficacius. Exiccatur & calfacit in tertio gradu.

¶ Epimedium.

Epimedium.

Refrigerat moderatē, cum aquea humiditate. Uberius illitū, surrecta ea servare potest. Ajunt verò, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

¶ Epimelis, Pomus sylvestris.

Epimelis.
Pomus syl-
vestris.

Fructus eius acerbus est, stomacho tamen ingratus, & capitis movens dolores.

¶ Erebinthus, Cicer.

Erebinthus.
Cicer.

Legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, alvo movendæ habile, ciendæ urinæ idoneū, lacti & semini generando aptū. Prolicit verò & menses. Cæterum quod arietinum dicitur, efficacius urinam provocat: cujus decoctum renum calculos frangit. Reliquū erebinthorū genus eadem vi pollet puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè sicci: participes itē amaritatis, cujus vi & lienē, & jecur, & renes expurgat, psorasq; & lepras, & lichenas extergunt, tum parotidas & testes induratos discutiunt, tum ulcera maligna cum melle sanant.

¶ Erebinthus agrestis.

Cicer agrestis.

Calidior & sicciior domestico est, quanto & acrior & amarior existit.

¶ Erice.

¶ *Erice.*

Digerendi per halitum facultatē obtinet: sed præcipue flore eius ac foliis utendum.

¶ *Herpyllus, Serpyllum.*

Usque adeo calfacit, ut urinas & menses moveat. Estq; gustu admodum acre.

¶ *Erysimum.*

Semen eius igneum est, & calfactorium. Utile est cū eclegmatis ad promovendas crassorū ex pectore expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas uberum & testiculorū, juvat: & ut Dioscorides ait, etiā occultos cācros.

¶ *Erythrodanum, Rubia passiva.*

Est autē tinctorū rubia, radix acerba & amara: quare lienē, & jecur expurgat, & urinas crassas, multas, & interdum sanguinolentas promovet. Quin & menses ciet, extergitq; mediocriter. Proinde vitiliginēs albas cum aceto illa juvat.

¶ *Eupatorium.*

Tenuium est partiū, incidendiq; & extergendi vim, citra manifestam caliditatē, obtinet: quo circa obstructions jecoris aperit. Inest ei quādā etiam astrictio, per quam robur visceri addit.

¶ *Euphorbium.*

Urentem & tenuiū partiū facultatē sortitur.

¶ *Ephemeron, Iris agrestis.*

Astringit quidem, estq; suavis odoris. Quare & repellit, & per halitum digerit. Non ineffaciter autem radix eius in dentiū dolore colluitur. At folia cocta in vino, phymatum augmento & statui congruunt.

¶ *Echinus herba.*

Fructus eius acerbus est, atq; idcirco repellentis facultatis & exiccatorię. Utuntur eo ad oculorum auriumq; fluxiones.

¶ *Zeia, Spelta.*

Universa sua facultate, quodammodo in medio est tritici & hordei.

¶ *Zingiberis radix.*

Excalfacit, sed non primo statim occurso, vel uti piper: unde sanē & minus esse subtilium partium, quā piper existimanda. Etenim illaboratam quandam, & crassam retinere in se videtur humiditatem, quemadmodū piper longū. Quare diutius perseverat quā proficiscitur à zingibere, aut pipare longo caliditas, quā quā ab albo, aut nigro. Porro ubi totum corpus celerimē calfacere cōsiliū est, ea tunc exhibēda sunt quā & celerrimē à caloris nostri contactu incallescant, & prōptissimē unde quaq; ferantur. Verū ubi partē quamvis refrigeratam recalfacere studemus, contrā agendum: nimirum quē tardē calescētia, plurimo tempore perdurēt, ea prēbendo. Cāterū licet zingiber & piper * longum hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamen est differentia. At nasturtium, napy, thapsia, & agrestium columbarū sterus, majori tempore perfectē accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

¶ *Zythus.*

Non parum est acrior hordeo, succiq; pravi, quum ex putredine oriatur. Est & flatuosus, ac partim acris & calidus, parte verō plurima frigidus, aqueus, acidus.

¶ *Zyme, Fermentum.*

Tenuiū est partium, & mediocriter calidum:

proinde citra molestiam quæ in profundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine nata. Cui accedit ea quæ à sale est, * & quæ etiā à farina natura.

¶ *Hedyosmos, Mentha.*

Hedyosmos.
Mentha

Tam mentha, quā calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientiū ordine. Infirmior tamē est mentha, & minus excalfacit: cāterū mediocriter ad Venerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent. At calamintha, quum valentius calfaciat & exiccet, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbum. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate verō, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis rejectiones reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

¶ *Hedysarum.*

Hedysarum.

Hujus semen amarū & subacerbum apparet: ob idque potum stomacho gratum existit, viscerumq; obstructions expurgat. Idem præstat totius fruticis germinā.

¶ *Hemerocalles.*

Hemerocalles.

Radice habet lilij radici similem, figura & viribus: prodestq; ut illa, igni ambustis, nimirum leviter digerens, tum nihil astringens.

¶ *Hemionitis.*

Hemionitis.

Astrictionem simul & amaritudinē possidet. Quamobrē cum aceto pota lienosis auxilio est.

¶ *Erigeron.*

Erigeron.

Refrigerat & modicē digerit.

¶ *Eryngion.*

Eryngion.

Calore quidem est temperatū, nō parvā tamē siccitatem sortitur, consistentē in tenui essentia.

¶ *Thalietrum.*

Thalietrum.

Folia habet coriandro similia: caulē crassitudine rutæ. Vis eis inest citra morsum exiccatoria. Itaq; ulcera inveterata ad cicatricem perducit.

¶ *Thapsia.*

Thapsia.

Acrē habet ac valēter excalfacientiē facultatē cū humiditate conjunctā. Quare ex alto violenter extrahit, & quod extrahit, digerit: celeriter tamen corrūpitur.

¶ *Thermus, Lupinus.*

Thermus.
Lupinus.

Præmaceratus aqua, amaritudinē exuit, ediq; potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Ubi verō nativā etiam nū amaritas pmanet, extergendi, digerendiq; vim obtinet. Interficet autem lumbricos, tum illitus, tum addito melle linētus, tū ex posca epotus. Quin & decoctū eius lumbricos ejicere potest, tum etiā foris identidē perfusum, vitiliginēs, achoras, exanthemata, psoras, gangrænas, malignaq; ulcera, juvat. Expurgat jecur & lienē cum ruta & pipere suavitatis gratia sumptū. Elicit menses & fœtum cum myrrha & melle impositum. Lupinorū porrō farina, etiam mor-dicatione digerit: nec livida tātū, sed & chœra das & phymata curat, si in aceto, aut oxymelite, aut posca coquatur.

¶ *Thermos agrios, Lupinus agrestis.*

Lupinus
agrestis.

Amarior est, & ad omnia valētiōr domestico, ejusdem genere cum ipso facultatis.

¶ *Thlapsi.*

Thlapsi.

Semen eius facultatē acrē sortitur, adeo ut internos abscessus potū disrumpat. Menses ciet, & fœtum enecat. Per sedem infusum sanguinolēta eva-

evacuans ischiadibus prodest: evacuatq; supernè & infernè bilem oxybaphi mensura epotum.

Thridax.
Lactuca.

¶ *Thridax, Lactuca,*

Lactuca semen genitura profluviū cohibet.

Humida & frigida est, secundum aquæ fontanæ frigiditatē. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parva & levia erysipelata, est cōmoda: præterea restinguit sitim. At semen potum, genituræ profluviū cohibet. Sic & agrestis lactucæ semen. Cujus holeris colligitur succus, argemas & caligines purgans, inungiq; ad adustiones cum lacte muliebri solitus.

Thymum.

¶ *Thymum.*

Incidit & calfacit vehemēter, ob idq; urinam & mēses provocat, fœtum evellit, potum viscera expurgat, educēdis ex thorace & pulmone confert, ac deniq; excalfacit exiccatq; in tertio ordine.

Idea radix.

¶ *Idea radix.*

Admodū gustu est acerba. Quare sanguinis effusiones, lenterias & dysēterias, mēsesq; fluētes suppressit, tum pota, tū etiā admota extrinsecus.

Ixos, Viscum.

¶ *Ixos, Viscum.*

Ex plurima aërea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Quare ex alto humores extrahit, eosq; diffundit & digerit. Tempus autem ut calfiat postulat.

Ios, Viola.

¶ *Ios, Viola.*

Violæ folia aqueā & subfrigidam substantiam superantē possident. Proinde tum per se, tum cū polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuant, & oculis.

Hippuris.

Cauda equina.

¶ *Hippuris, Cauda equina.*

Astringentē cum amaritudine facultatē possidet, ac pinde valenter exiccantem, sed citra morsum. Itaq; vulnera etiam maxima glutinat, vel si perfectos esse nervos contigerit. Præterea vocatas enterocelas glutinat: necnon sanguinis rejectiones, fluentes menses, dysenterias, ceterosq; alvi fluxus coercet. Succus verò eius prodest sanguinis eruptioni per nares, & fluxui obnoxiiis in ventre passionibus, ex austerorū vinorum quopiam epotus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

¶ *Hippomarathrum.*

Unā cum fœniculo & de ipso differemus.

Isatis.

¶ *Isatis.*

Domestica quidem qua utuntur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondū tamē mordentis: est enim simul amara & astringēs. Proinde magna vulnera corporum durorū glutinat: & sanguinis profluvio laborantibus partibus utiliter illinitur: tumores laxos mirificè digerit, si mulac reprimat, & adversus omnia maligna ulcera mirabiliter resistit. At Isatis sylvestris manifestè jam acre quiddam, tum gustu, tum actione præfert. Proinde q̄ domestica magis desiccans, valentius etiā putredinibus obsistit: ad cætera jam comprehensa deterior.

Phasiolon.
Isopyron.

¶ *Isopyron, Phasiolon.*

Semen habet amarum & subacerbum. Exergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat, cōstringatq; Quare excretionibus pectoris confert, & jecur expurgat, crediturq; juvare hæmopticos.

Itea, Salix.

¶ *Itea, Salix.*

Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationē uti possis. Verū floribus eius maximè propè omnes utuntur ad exiccantis emplastri præparatio-

nem. Est enim vis eorū ita desiccatoria, ut morsu abstineat. Habet verò etiā quanda mastriktionem. Porro succus expressus medicamen exiccatoriū existit expersq; mordacitatis. Nec enim invenias aliquod medicamen ad plures res utilius eo, quod citra mordacitatē exiccat. Arboris cortex similē facultatē obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod tēperaturæ siccioris existit, veluti oēs cortices. Etenim. cinere corticis macerato in aceto, nonnulli callos atq; myrmecias tollūt.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. VII.

¶ *Calamintha, Nepita.*

Essentia quidē est tenui, temperie autem calida & sicca, quodammodo in tertio ordine. Est enim acris gustu, paulumq; amaritudinis obtinet. Extrinsecus admota, primum quidem valdè excalfacit & mordicat, cutemq; exigit: postremò etiam ulcus efficit. In corpus autē intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiā cum melicrato, perspicuò calfacit, atq; sudores ciet, omneq; corpus tū digerit, tum exiccat. Idcirco ea contra rigores repetētes per circuitum nonnulli utuntur, sicuti & contra ischiadicos morbos: trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem, totumq; adeò articulum excalfacit, et cutem non obscure adurit, mensesq; tum epota, tum apposita, admodū efficaciter provocat, ac deniq; elephantiacis etiam probè auxiliatur. Præterea cicatricibus atris candorem restituit, & sugillata digerit. Præstat autem in hujusmodi, ubi in vino decoxerimus, ipsam emplastri ritu apponere, & viridem magis quàm siccam. At sicca, ad venenatarum bestiarum morsus assumitur: veluti etiā cauteria, & quæcunq; medicamenta calida sunt & acria, Succus ejus aut infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & auriū vermes enecat. Sic & conceptū interimit, ejicitq; Igitur incidendi quidem ei vis adest, ob calorem, tenuitatem, amaritudinem: abstergēdi verò, propter solam amaritudinem. Quare asthmaticis atque ictericis convenit. At omnia tamen dicta montana efficacior existit.

¶ *Calamus odoratus.*

Leviculam quandā astrictionem, ac minimā acrimoniam possidet. Siquidē magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & aëria: temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, nisiq; valentius desiccet. Porro moderatè movet urinam: ac facultatib. quæ jecori stomachoq; imponuntur, necnon iis fomentis quæ inflammato utero, aut movendis menstruis administrantur, commodissimè potest misceri.

¶ *Calamus phragmites, Canna.*

Radix eius cum bulbis, aculeos stipitesq; infixos extrahere ex alto traditur. Etenim abstergentem, minimeq; acrem facultatem sortitur, quæ admodum & ipsa folia. Cortex verò cōbustus, admodum tenuium partium & digerentis facultatis efficitur cum nonnulla abstersione, ut exiccet & calfaciat tertio quodammodo ordine. Cæterum eius flos est vitadus. Nam si in aures incidat, adeò tenaciter hærens affigitur, ut avelli nō possit, auditumq; vitiat.

¶ *Canca-*

Salicis cineribus, callos tollūt.

Calamintha, Nepita.

Calamus odoratus.

Calamus phragmites, Canna.

Calami flos, vitiat auditum.

¶ *Cancanus, Cacalia.*

Radix cancani, crassam, empalsticamq; & exiccantē habet essentiam, sed mordacitatis exper-
tem. Quare macerata vino, sicuti tragacatha, &
linctā, aut cōmansa, arteriæ asperitates sanat.

¶ *Cannabis.*

Cannabis semē adeo flatus discutit exiccatq;
ut si largius edatur, genituram absumat.

¶ *Capnios, Fumaria.*

Acris, amara, & acerbæ qualitatē est parti-
iceps. Quamobrē urinā biliosam, multamq; pro-
vocat: sanatq; tum obstructions, tum imbecilli-
tates jecinoris. Succus ejus oculorū aciem acuit,
nō parū trahens lachrymarū, veluti ipse fumus.

¶ *Capparis.*

Capparis radicis cortex vincentē habet qua-
litem amaram, proximam acrem, deinde acer-
bam: ob idq; pugnantis facultatibus constat:
quippe abstergere, purgare, incidere, potest ama-
ritudine: excalfacere, incidere, digerere, acrimo-
nia: contrahere, densare, astringere, acerbitate.

Quare lienes induratos, si quid aliud, maximē
potest juvare, tum foris medicamentis quæ illi-
nuntur admistus, tum intra corpus assumptus,
sive decoctus in aceto oxymelitēve, sive cōtus
atq; illis permistus: cum nimirū crassos lentosq;
humores apertē hoc pacto sumptus evacuet:
nec eos tantū per urinas, sed per ventrem etiam
sæpe sanguinolentos defert: unde & lienes adju-
ti sunt, & coxarum dolores. Quinetiam menses
promovet, ex capite purgat, auxiliat' ruptis atq;
cōvulsis, necnō malignis ulceribus, cataplasma-
tis modo impositus. Præterea dentium dolores
adjuvat, interim cum aceto coctus, interim cum
vino, sæpe solus dētibus mansus. Ad hæc vitili-
gines cum aceto detrahit, & chœradas, duos
tumores digerit, idoneis ad eas medicamentis
mistus. Radicis cortici fructus proportionē re-
spondet, nisi quod ad omnia sit imbecillior. Imò
& folia, & caules similem etiā vim obtinent. Ad
miscemus tamen illis aliquid, quod eorum vehe-
mentiam obtundat. Nec mirum est, quod auriū
vermes sua perimant amaritudine.

¶ *Cardamum, Nasturtium.*

Nasturtij semē adurentis facultatis est parti-
iceps, veluti napy. Proinde omnia quæ rubrifica-
tionem postulant, eo excalfaciūt. Miscetur quo-
que remediis quæ exhibentur asthmaticis, tan-
quam valenter crassos succos incidere valeat.
Porro & herba arefacta, semini similem faculta-
tem sortitur. Nam quæ humida est & viridis,
multis numeris inferiorem.

¶ *Cardamomum.*

Quantò suavius magisque fragrans nasturtio
est, tantò & imbecillior ei calida facultas inest.
Nec enim ulcerare est idoneum. Habet autē ad-
jectum quiddam amaritudinis, qua lumbricos
interficat: & cum aceto valenter p̄foras detergit.

¶ *Caron.*

Cari semē calfacit & exiccat tertio quodāmo-
do ordine, moderatē acré possidens qualitatem.
Itaq; & flatus extinguit, & urinas ciet, tum semē,
tum planta.

¶ *Casia.*

Exiccat & calfacit tertio quodāmodo ordi-
ne: sed & tenuiū admodum partium est, habetq;

acrimoniæ plurimum, ac leviter nonnihil astrin-
gens. Incidit itaque simul & digerit, roburq; in-
strumentis addit. Quare mensibus est moven-
dis idonea, ubi à copia simul & crassitudine illi
suppressi fuerint.

¶ *Carya, Nuces.*

Arbor tum in foliis, tum in germinibus atri-
tionem quandam possidet, cæterū evidentem
multamq; in nucis putamine recenti pariter &
sicco. Ejus autem succo expresso, ac melle deco-
cto, nos vice stomatici medicaminis utimur. O-
leum quod ex fructu elicitur inveterato, admo-
dum per halitum digerit. Quare nōnulli eo gan-
grænas, carbunculos, & ægylopos sanant. Sunt
qui ad nervorum vulnera utantur. Cæterū si re-
cens sit, astringentis nōnihil qualitatis obtinet.
Nucleus arefactus & ustus, tenuium partium &
exiccatoriū citra morsum est medicamē. At pon-
tica nux, quam *λεπτοκάρυον* & avellanā appellant,
plus habet essentiæ terrestris ac frigida. Itaq; au-
sterior tum cortex, tum planta, tum fructus ap-
paret.

¶ *Caucalis.*

Excalfacit & desiccatur. Præterea urinam ciet,
muriāq; ad repositionem conditur.

¶ *Carpesium.*

Simile est valerianæ, tum gustu, tum facultate:
sed plus habet tenuitatis. Proinde magis ea vi-
scerum obstructions extergit, urinam movet,
renesq; calculis degravatos expurgat.

¶ *Cenchrum, Milium.*

Primo ordine refrigerat. Exiccat verò tertio
exoluto, aut certē secundo intenso. Paululū e-
tiam tenuitatis sortitur. Quibus de causis inter
omnia frumentaria edulia minimum nutrimen-
ti largitur. Ventrem tamen desiccatur, forisq; ad-
motum in sacculis, idoneum fomentum est iis,
quæ citra morsum exiccari postulant.

¶ *Cedrus.*

Cedrus specie est duplex: altera fruticosa juni-
pero assimilis: altera arbor non exigua. Utraq;
est calidæ siccaq; temperaturæ tertii quodāmo-
do ordinis secundū utrunq;. Cæterū cedrea (vo-
catur ita cedri oleum) quartum etiam ordinem
attigisse videtur, admodum calida & tenuiū par-
tium. Quare mollem viventiu carnem promptē
citraq; dolorem putrefacit. Nam mortuorū cor-
pora exiccat, simulq; à corruptione tænetur, utpo-
te humiditates eorum depascens, at solida haud-
quaq; attingens corpora. Nee mirum videri de-
bet, si cum tanta vi polleat, lendes, pediculos, ti-
neas, auriūq; vermes interficere valeat: tum fœ-
tum viventem quidem interimat, extinctum au-
tem ejiciat: quēadmodū & ipsum semē, si coeun-
di tempore, pudendo ea circumlinatur. Proinde
partui adversum est medicamen. Quod etiā den-
tium foraminibus instillatū, eos & confringit, &
à dolore liberat. Extenuat quoq; oculorum cica-
trices, & visus hebetudini ab humorū crassitudi-
ne ortæ medetur. Utuntur autem ea plebei, cum
ad vulnera ovibus inter tondendum à forfice il-
lata, tum etiam contra ipsarum scabiem & rici-
nos, quos *περίττωες* vocant. At fructus modera-
tiores existunt, adeo ut comedi possint. Quan-
quā si iis liberalius utare, capiti dolorem inferent, ar-
doremq; ac morsum in ventre percipies.

*Centaurium
maius.*

¶ *Centaurium maius.*

Radix eius gustui acris simulq; astringens apparet, cum levicula quadam dulcedine. Quod verò ad actiones pertinet, menses provocat, vivum foetum extinguit, extinctumq; propellit. Præterea ulcera glutinat, sanguinemq; rejicientibus prodest. Exhibentur autem ejus binæ drachmæ, febrientibus quidem cum aqua: febri verò liberis, cum vino. Quinetiam ruptis, convulsis, dyspnœa, inveteratæq; tussi est auxilio. Eadem quæ radix, & succus ipsius præstat.

*Centaurium
minus.*

¶ *Centaurium minus.*

Huius radix planè inefficax est, at caulis & folia, & flores, utiliora sunt. Vincit enim in eis qualitas amara, paululum habens & astrictionis: ob idq; admodum exiccatorium est medicamen, ex pers mordacitatis. Ulcera itaq; magna herbæ ipsius recentis illitu glutinantur: & vetusta, quæq; ægrè ad cicatricem perducì queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta verò glutinatoriis & desiccatoriis miscetur facultatibus. Miscetur etiam iis quæ rheumaticis medentur affectibus. In quibus ea medicamina præstantissima sunt, quæ vehementer desiccantia cum quadam astrictione nullam habent mordacitatē. Decoctum herbæ quidam infundunt ischiadicis, ceu biliosa & crassa extrahēs: nam & talia purgat. Succus ejus præter dicta, cum melle oculis illinitur, mensesq; & foetum evocat. Jecinoris quoq; obstructions optimè aperit; bonumq; durato lieni est remediū, & impositum foris, & bibitum.

Cerasia.

¶ *Cerasia.*

Quæ dulcia sunt, magis alvū subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Austera verò, contrario modo. At acida, pituitosis excrementosisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiā incidunt. Ipsius arboris gummi, arterias asperas lenit, calculisq; vexatos adjuvat.

¶ *Ceratonia.*

Exiccantis astringentisque facultatis est, tum arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur humidus, magis ventrem subducit: si autem siccus, magis eundem sistit.

Cestrum.

Betonica.

Psychrotrophon.

¶ *Cestrum, Betonica, Psychrotrophon.*

Vim habet incidendi, ut gustus indicat: est enim subacris & amariuscula. Quare calculos renum frangit: pulmonem, pectus, & jecur expurgat: menses promovet: comitialibus prodest: rupta convulsaq; curat, omnibusq; bestiarum moribus illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus & ischiadicis, bibita prodest.

¶ *Cecis, Galla.*

Cecis.

Galla.

Quæ omphacitis dicitur, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentia terrene & frigida, per quā desiccatur, repercutitq; fluxiones. Esto verò tertii in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flavilla & magna, laxaq; & ipsa desiccatur quidem, sed tantò minus, quantò minus acerbæ qualitatibus est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua, aut si magis astringere vis, in vino aliquo austero, ac dein trita, cataplasma est non instrenuum sed inflammata, procidentiq; Gallæ combustæ, extinctæq; in aceto aut vino, sanguinis reprimendi facultatem acquirunt.

¶ *Cera.*

Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediū quodammodo obtinet. Habet verò quiddam crassæ essentia & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorum materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium. Habet tamen quiddam digerentis, calidæq; potentia, quæ plurima melli inerat.

¶ *Cici, Ricinus.*

Cici.

Ricinus.

Ut fructus ejus expurgat, detergit, & digerit, sic etiā foliū, sed unde quaq; debilius. Oleum q; ex semine conficitur, calidius atq; teruius est, cōmune oleum, ac proinde potentius digerit.

¶ *Cinnamomum.*

Cinnamomum.

Summè tenuiū est partiū, atq; ex tertio ordine calfacientium. Nihil autem æquè desiccatur, eorū quæ pariter calfaciūt, propter tenuitatē essentia. At Cinnamomis, veluti imbecillū est cinnamomum.

¶ *Circea.*

Circea.

Dioscorides ait radicem ejus ex vino dulci potam, secundas purgare. Est enim boni odoris, & calfactoria. Semen autē ejus in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem conducit.

¶ *Cisthus.*

Cisthus.

Frutex astringens est. Folia ejus & parva germina trita adeò desiccant astringuntq; ut ulcera glutinare valeant. Sed flores efficaciores sunt, adeò ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusq; & humiditates persanent. Cataplasmatibus ritu illiti, ulcerū putredinosa juvāt. Desiccant enim secundo excessu. Hypocistis multo est magis astrictoria quàm folia, admodū efficax remedium ad omnes fluxionum affectus. Quin si jam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitudinē illi haud segniter addit. Quo nomine antidoto ex viperis inditur.

¶ *Cisthos, Ladanum.*

Cisthos.

Ladanum.

Primo excessu medicamen est quodammodo completè calidum, ita & secundum attingat, habens etiā astrictionis nonnihil. Est præterea substantia tenui, & emolliens, necnon moderatè digerens, concoquensque. Peculiariter igitur ad uteri vitia est aptum. Diffuentes tamen capillos retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias sanare nō potest, quod hi affectus valentiora medicamenta desiderant.

¶ *Cissos, Hedera.*

Cissos.

Hedera.

Ex contrariis facultatibus cōstat. Habet enim quiddā astringentis substantia, quæ terrea & frigida existit: habetq; nonnihil acris, quam calidā esse vel gustus comprobatur: præterea si viridis sit, obtinet etiam quandam aqueam & tepidam. Virida igitur folia in vino decocta, grandia ulcera glutinant, malignaq; ad sanitatē reducunt. Igne factas exulcerationes cicatrice obfirmant: cum aceto decocta lienosis opitulatur. Flores autē quodammodo validiores sunt. Succus medicamen est errhinon: vetustas aurium fluxiones sanat, necnon vetera ulcera tum aurium, tum narium. Lachryma hederæ perimit lentes, pilisq; nudat. Adeò quippe est calida, ut etiā obscure adurat.

¶ *Clinopodium.*

Clinopodium.

Calfacit simulq; siccatur in tertio ordine, estq; subtilium partium.

¶ *Clematis.*

¶ *Clematis.*

Huius folia acrem & adurentē obtinent facultatem, adeo ut lepras excoriant. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Dicitur etiā Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellant: quæ tantum abest ut exulceret, ut profluvii & dysenterii cum vino pota auxiliatur, manſaq; dentium dolores mitiget, ac deniq; doloribus uteri in pefſo admota fit uſui.

¶ *Cnidos.*

Cnici ſemine duntaxat ad purgationes utimur. Eſtq; tertii ordinis excalfacientium, ſi quis foris eo uti volet.

¶ *Coccus cnidius, Granum gnidium.*

Et ipſum quoq; purgat, ſed acris eſt, adurentiſq; facultatis.

¶ *Coccus baphicus, Granum tinctorium.*

Aſtringentē ſimulq; amarā poſſidet qualitatem. Utraq; ſine morſu deſiccatur. Proinde ad ignē tia vulnera cōgruit, & ad nervorum vulneratio-
20 nes.

¶ *Coccy melea, Prunus.*

Pruni fructus ventrem ſubducit, recens quidem plus, aridus minus. Minus tamen ſubductiva ſunt Damascena pruna iis quæ ex Iberia advehuntur. Quin & ipſæ arbores fructibus proportionē reſpondent. Porro quorum in germinibus aſtrictio quædā manifeſta in eſſe apparet, iis decoctis phlegmonæ in columella aut tonſiliis cōſiſtentes idonee colluuntur. Jam verò agreſtium fructus, evidenter eſt aſtrictorius, vētremq; ſiſtit.
30

¶ *Colla, Gluten.*

Gluten quod ad libros præparant ex ſimilagine & garo, emplaſtica, concoctoriaq; facultatis exiſtit.

¶ *Colocynte, Cucurbita.*

Humida & frigida eſt in ſecundo ordine. Quare ſuccus eius roſaceo miſtus, aurium dolori contracto ex phlegmone, eſt utilis. Præterea reſtinguit ſitim.

¶ *Colocyntidis.*

Gusta amara eſt, vehementerq; purgatoria facultate prædita. Ipſius virentis ſuccus intritus, 40 iſchiadicis prodeſt.

¶ *Comarus, Arbutus: cuius fructus Vneda.*

Fructus unā cum arbore acerbus eſt. Eſt autem hic & inſenſus ſtomacho, & capiti dolorem concilians.

¶ *Commi, Gummi.*

Lachryma eſt concreta in truncis arborum ipſam pducenſium: eſtq; exiccatoria & emplaſtica facultatis, aſperitatibusq; medetur.

¶ *Conia, Lixivium.*

Omnium maxime abſterſorium exiccatoriūq; 50 eſt, quod ex cinere ficus & tithymalorum efficitur: ſereq; putrefacientis eſt facultatis.

¶ *Conyza.*

Conyza & major & minor adſimilis ſunt tū temperaturæ, tum facultatis: guſtu amaræ & acres. Luculenter autem excalfaciunt, ſive quis folia cum teneris ramulis parti inſricet, ſive ubi oleo incoxerit, eo utatur. Siquidē rigores per circuitum redeuntes, ſanare tale oleū videtur. Conſimilis quoq; flores ſunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex vino propinant, ad educendos menſes, atq; pellendum fœtum. Eſt & tertium conyza genus in locis humidioribus naſcens, utriſq; illis graveolentius & imbecillius. At primæ memoratæ calfaciunt & ſiccant in tertio ordine.

¶ *Coriannon, Corion, Coriandrum.*

Hanc herbam refrigeratoriā eſſe Dioſcorides prodidit, quod miſta pani aut polentæ, illitaq; eryſipelas curet. Quanquam certè exactū aliquod eryſipelas, quod utiq; inflammatum eſt, & flavum, haud unq; à tali cataplaſmate perſanabitur: ſed illud tantum quod refrigeratum jam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrariis facultatibus conſtat, plurimum habens eſſentiæ amaræ, quæ tenuium partium eſt & terrena. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis eſt facultatis. His adjunctum eſt quoq; aſtrictionis pauxillum. Quod autem longè à refrigeratione abſit coriandrum, hinc conſtat, quod chœradas ſive ſtrumas, cum lomento diſcutiat: id quod nullum refrigerantium medicamentorum facere eſt aptum.

¶ *Coronopus.*

Coronopodis radix cœliacis prodeſſe creditur manducata.

¶ *Coſtus.*

Levicolam planè amaram, plurimam autē acrem & calidam in ſe qualitatem ſimul & facultatem obtinet, adeo etiam exulceret. Quare in quibus excalfacere partem quamvis, aut ex alto in ſuperficiem extrahere quippiam eſt opus, ad coſtū confugit. Eadem de cauſa urinas menſesq; provocat: & ad rupta, convulſa, & laterum dolores congruit. Porro ob amaritudinem quæ illi in eſt, latos lumbricos enecat, maculasq; à ſole contractas exterit, illitus cū aqua aut melle. In eſt item flatuoſa quædam illi temperiei humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulſo.

¶ *Cotyledon, Umbilicus Veneris.*

Humidam, ſubfrigidam, obſcurè aſtringentē, ac leviter amaram obtinet facultatem. Unde refrigerat, repercutit, abſtergit, & diſcutit. Itaque phlegmonas eryſipelatodes, & eryſipelata phlegmonode perſanat: æſtuantiq; ventriculo commodiſſimum cataplaſma exiſtit.

¶ *Crania, Cornus.*

Fructus ejus admodum acerbus eſt, eſuiq; aptus: proinde valenter alvum reſtringit, quemadmodum & meſpila. Folia quoque & germina peracerba ſunt guſtui, valenterq; deſiccant. Itaq; maxima vulnera glutinare poſſunt, potiſſimūq; durorum corporum.

¶ *Crambe, Braſſica eſculenta.*

Deſiccandi vim habet, tum eſa, tum foris impoſita: non tamen admodum acrem. Præterea & vulnera glutinat, & maligna ulcera ſanat, phlegmonasq; jam induratas, atque ægrè ſolubiles, necnō eryſipelata id genus, epinyctidasq; & herpes curat. Habet quiddam etiam in ſe abſterſorium, quo lepras elicit. Porro ſemen ejus potū, amarum cum ſit, lumbricos perimit. Eadem facultate ephelidas, lentes, & quæcunq; modicam abſterſionem poſtulant, adjuvat. Cineres caulium braſſicæ deſiccant uſque adeo, ut cauſtica facultatis participes eſſe videant. Quibus ſanè cū adipe miſtis, cōtra inveteratos laterū dolores utuntur. Sic nāq; valenter digerēs pharmacū reddit.

¶ *Crambe agria, Braſſica agreſtis.*

Calidior ſicciorq; & amariorq; domeſtica eſt: quamobrem nec citra noxam intra corpus ſu-

mitur. Extergit autem & digerit quàm domestica etiam valentius.

Brassica marina.

¶ *Crambethalattia, Brassica marina.*

Non solùm alvum deiecit, subsalsa & subamara existens, sed etiam est ad externos corporis usus idonea.

¶ *Cratægonos.*

Cratægonos.

Fructus ejus & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

¶ *Crethmon.*

Crethmon.

Gustantibus salsum est, cum paucula amaritudine: quamobrem vis ejus est, exiccatoria & absterforia.

¶ *Crithe, Hordeum.*

Crithe.

Hordeum.

Primi est ordinis in exiccando & refrigerando. Habet etiam absterfionis paucillū. Præstat in cibo fabis, quod flatuosam naturam exuat. Quantumcunq; enim fabas coxeris, flatuosa semper illis natura remanet. Sunt quippe crassioris essentia quàm hordeū, ob idque, eo plus etiam alunt. At polenta multò plus hordeo desiccatur.

¶ *Crimmon.*

Crimmon.

Plus nutrit quàm polenta, sed ægrius concoquitur. Sorbitio quæ ex eo conficitur, si ex zea fiat, leviter ventrem sistit.

¶ *Crinos, Lilium.*

Crinos.

Lilium.

Lilii flos temperaturā mistā obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aqua, eaq; temperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerendi, emolliendiq; citra morsum facultatem sortitur: unde fit, ut uteri sit duritiibus aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita, desiccant, abstergunt, & digerunt moderatè. Proinde quoq; ambustis competūt. Radicem ergo tostam, ac dein rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix, imponunt: cum sit etiam ulcerum aliorum remedium. Emollit præterea uteros, mensesq; provocat. Cæterū cum aut vitilignes, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquod aliorum medicaminum validius extergentium, cujusmodi est mel. Imposuimus verò etiam quandoq; & foliorū succū cum melle & aceto coctum. Eratq; respectu utriusq; portio ipsius succi quincupla. Atque ita conficiebatur insigne medicamentum ad omnia ulcera, quæ exiccati absque morfu postulant.

Crocodilium.

¶ *Crocodilium.*

Crocodilii semen acre est, atq; odoratum, urinam mensesque ciens: itaque facultatem habet calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adjuvat. Radix pectoris excreationibus valenter conducit. Trahit verò etiam per nares sanguinem.

Crocus.

¶ *Crocus.*

Secundi quidem est ordinis excofacientium, primi verò exiccantium. Proinde concoquendi, quoq; vim obtinet, adjuvante etiam ad id, quadam exigua astrictione.

¶ *Crommyon, Capa.*

Crommyon.
Capa.

Capa ex quarto est ordine excofacientium. Essentia ejus potius crassarum est partium. Unde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecis attrita pilos halcyonio citius restituit. Succus ejus iis qui suffusi sunt, aut acie ocu-

lorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob hujus temperaturā tota capā flatuosa est, manducata. Itaq; quæ temperie sicciore sunt, minus flatuum generant.

¶ *Cyamos, Faba.*

Cyamos.
Faba.

Mediocriter exiccat, refrigeratq;. At caro ejus paulum quoq; abstergentis facultatis continet: sicuti putamen nonnihil adstringētis. Porro ut edulium, flatulenta est, & coctu difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pectore & pulmone idonea. Ut medicamentum verò, foris imposita desiccatur innoxie. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad nervorum tum contusiones, tum vulnera, farinam ejus cum oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu jam occupaverat phlegmone, cum polenta. Sed & testium & uberū aptum est cataplasma. Quo quidem & lac ipsum extinguitur, & puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet.

¶ *Cyclaminus, Rapum, Tuber terra.*

Cyclaminus.
Rapum.
Tuber terra.

Abstergit, incidit, ora venarum aperit, attrahit, & digerit. Succus ejus hæmorrhoidas reserat, violenterq; ad secessum provocat, in floccis appositus. Sic enim facultatibus phymata, strumas, aliasq; durities digerentibus commiscetur: ac suffusis cum melle illitus cōpetit. Ad hæc per nares expurgat. Adeo vehemens ejus facultas est, ut abdomine illito, subducatur alvū, & fœtū perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa vehemens satis. Nam & menses sive epota, sive apposita, evocat & aurigini prodest. Modus ejus bibendi est drachmarum trium sive cum melicrato, sive cum passo. Cutē detergit, ac tū alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curat: necnon auxilio est lienī indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quā nonnulli cyssanthemon nominant, cum vino pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas movens, atq; alvum subducens. Locos quoq; ejicit, atque asthmaticis auxiliatur. Qualitas ejus gustui acris est & sublentia.

Cyssanthemon.

¶ *Cyminum, Cuminum.*

Cyminum.
Cuminum.

Cymini semen calfacit in tertio ordine: urinā movet, extinguitque flatus.

¶ *Cynosbatus, Sentis canis.*

Cynosbatus.
Sentis canis.

Hujus fruticis fructus non segniter astrictorius est, folia verò mediocriter. Lanugo fructus, arteriam vitiat.

¶ *Cyparissus, Cupressus.*

Cyparissus.
Cupressus.

Cupressi folia, germina, pilulæ recētes & molles, magna ulcera glutinant in duris corporibus. Quare resiccandi vim habent absq; insigni acrimonia aut calore. Tāta enim ei acrimonia inest, caliditasque, quanta satis sit deducendæ in altum acerbitati. Proinde in alto latētes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates, innoxie depascit & populatur. Sic enterocœlicos juvat, exiccās, roburq; addens corporis partibus præ humiditate laxatis. Quidam ea utuntur ad carbunculos, herpesque polentæ miscentes. Sunt qui ad erysipelata utantur.

¶ *Cyperus, luncus quadratus.*

Cyperus.
luncus quadratus.

Cypero radices excofaciunt pariter & siccant absq; mordacitate. Itaq; ulcerib. inveteratis misceantur.

rificē

rificè profunt. Habent etiā quippiā astringens: quapropter ulceribus item oris cōveniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum est, qua & calculos exterunt, & urinā mensesq; provocant.

¶ *Cypros.*

Huius arboris folia summaq; germina habent in se quiddā digerens cum aquea substantia modicè calida: habentq; & astrictionem quandam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum decocto quidem ambustā foveant, necnō igneas phlegmonas, carbunculosq;. Nam absq; molestia siccant. Sed spontè ortis in ore ulceribus comman- sa folia commodissima sunt.

¶ *Cytisus.*

Cytisi folia digerendi facultatem obtinent, aquea & temperata mistam, ut inalva.

¶ *Conion, Cicuta.*

Quod extremè sanè refrigeret, omnes norunt.

¶ *Conos.*

Coni fructus, quem cocalum & strobilum appellant, viridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniam. Proinde purulentis, & iis quibus facile expuere est opus, accommodatur. Quod esculentū est, nutrimentum est coctu difficile & validum. Ut medicamen autem asperitati leniendæ cōgruit, si præ maceratus in aqua, omnē acrimoniam exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficit, in medio calidæ & frigidæ qualitatis cōsistens, ex aquea & terrea mistū substantia, minimū participās aëreæ.

¶ *Lagopus.*

Facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alvi probè exiccet.

¶ *Lathyrus.*

Et succo, & purgatoria vitichymalum refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximè sit purgatorium.

¶ *Lampsane.*

Esa quidem succos pravos proceat. At illita, abstergendi, digerendiq; nōnullam facultatem sortitur.

¶ *Lapathum.*

Digerit moderatè. At oxylapathum nonnihil etiā repercutit. Manifestè ipsorū semen astringit, ita ut dysenterias & dyarrhœas persanet.

¶ *Limonium.*

Ejus fructum, utpote acerbū, ex vino exhibet cœliacis, dysentericis, & hæmoptoicis. Juvat, & profluviū muliebre. Satis est oxybaphi mēsurā.

¶ *Lichen.*

Lichenas curat, extergentem, modicèq; refrigerantem, ac siccantem obtinens facultatē. Nascitur enim in humidis roreque perfusis faxis.

¶ *Leontopetalon.*

Radix ejus digerendi facultatē, & exiccandi, calfaciendiq; in tertio ordine possidet.

¶ *Lepidium.*

Ex quarto est ordine excalfacientium, simile prorsus nasturtio, nisi quod minus desiccet.

¶ *Leucas.*

Acrem possidet qualitatem exuperantē: temperaturam verò calidam, siccāq; in tertio quodammodò ordine.

¶ *Leucacanthos.*

Hujus radix amara est, ac proinde incēdit, ex-

iccatq; in tertio ordine. Calfacit autem in primo.

¶ *Leucoion.*

Leucoion.

Extergit, ac tenuium est partium: plus tamen flores, ac præcipuè qui sunt sicciore: hi quippe & oculorū crassas cicatrices extenuant. Præterea menses eorum decoctum mover: secundas, & partum emortuum elicit, bibitumq; facit abortum, maximè amarum cum sit. Quod si eius vires multa missione aquæ frangantur, erit contra phlegmonas, & difficilia ulcera, cōmodum medicamen. Semen etiam ejusdem est facultatis, radicesq; similiter, nisi quod hæ sunt crassioris essentia, terreaq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos persanant.

¶ *Leuce, Populus alba.*

Leuce.

Popul⁹ alba.

Ex aquea, tepida, & terrena extenuata essentia conflatur. Quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

¶ *Libanotus, Thus.*

Libanotus.

Thus.

Excalfacit secūdo ordine, desiccet primo: habet quoq; astrictionē pusillam. Cortex ejus evidenter astringit, desiccātq; in secūdo ordine. Est autem crassiorū partium quā thus, & minimū acrimoniæ possidet. Quare in hæmoptoicis, stomachicis, cœliacis, & dysentericis eo utimur. Ramus ejus sicciore & calidioris est facultatis quā ipsum thus, adeo ut ad tertium usque excessum perveniat. Habet verò etiam & absterforū quiddam. Unde expurgare & implere oculorū ulcerā potest.

¶ *Libanotides.*

Libanotides.

Libanotides tres existunt: una sterilis, duæ fructum ferentes. Omnes verò emolliētis, digerentis, incidentis, & abstergetis sunt facultatis. Succus tum radices, tum herbæ mistus melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Decoctū ejus, quam rorem marinum appellant, potum, regio morbo auxiliatur.

¶ *Lignys, Fuligo.*

Lignys.

Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrena essentia, habens quasdam etiam ignis et si pusillas reliquias: ratione quarum tenuium est partium. Cæterum quæ speciatim in ea differentia sunt, ex pro usta materia eveniunt. Thuris fuligine utimur ocularibus medicamentis permista, iis videlicet quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulcerative sunt, accommodantur. Nam & illa expurgat, & carne implet. Terebinthinæ etiā myrrhæq; fuligo molestia caret, nō secus quā thuris. Sed styracis quodammodo valentior est. Magis etiam picis liquidæ. Quæ adhuc magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad vitia superciliorum vocata ptila, & erosos angulos oculorum, & citra phlegmonem humidos.

¶ *Libysticum.*

Libysticum.

Libystici radix & semē, ex genere excalfacientium sunt, adeo ut & menses cient, & urinas provocent, flatuq; discutiant.

¶ *Linosperrmon, Lini semen.*

Linosperrmon.

Lini semen.

Flatuosum est esum, etiam si frangatur. At calfacit quidem quodammodo in primo ordine, humiditatis & siccitatis in medio existens.

¶ *Linozostis, Mercurialis.*

Linozostis.

Mercurialis.

Ea utuntur omnes ad subjectiones alvi duntaxat. Quamquam etiā admota, valenter digerit.

Lonchitis.¶ *Lonchitis.*

Radix eius, quæ semen gerit triangulare, urinam ciet. Folia ejus quæ scolopendriæ similis est, viridia quidem, vulnera glutinant: sicca autem, & cum aceto epota, lienes induratos persanant.

Lycion.¶ *Lycion.*

Arbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamen id liquidum, quo ad sugillata, sedis, orisq; phlegmonas, ulcerationes, herpetas, putredines, ulcera contumacia, aures pure fluentes, intertrigines, & paronychias utuntur. Est enim facultatis exiccatoriae, compositum ex diversi generis substantiis, altera quidem tenuium partium, digerente atq; calida: altera terrestri & frigida, ex qua astrictionem exigua obtinet. Cæterum digerit & siccatur in secundo ordine: in calore aut mediis est proximum. Est porro lycium Indicum ad omnia valentius.

Lysimachios.¶ *Lysimachios.*

Superantem astrictionem sortitur, per quam omnes sanguinis fluxus reprimat, tum pota, tum cataplasmatibus modo admota.

Lychnis.¶ *Lychnis.*

Semen ejus calidum & siccum est, secundo quodammodo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.¶ *Lotos herba.**Trifolium.*

Lotos domestica, quam trifolium nominant, ut mediocriter concoquendi, sic etiam exiccandi vim possidet, in caliditatis frigiditatisq; conjugio media quodammodo existens. Semen a- 30 grestis loti, secundi est ordinis calfacientium: habetq; nonnihil abstersorium. Porro Ægyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.¶ *Lotos arbor.*

Non ita multæ astrictoriæ qualitatis est particeps: sed & tenuium partium est, & exiccatoria. Cujus sicca ramenta profluvio muliebri, dysenteris, capillorum effluvio, celiacisq; affectibus accommodant, aut in vino, aut in aqua concocta.

Macer.¶ *Macer.*

Cortex est qui ex India advehitur, gustu multum acerbo, tum levicula quadam acrimonia odorata. Constat autem ex mista essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida & tenuium partium. Itaq; valenter desiccatur, astringiturq; ob idq; celiacis & dysenteris medicamentis miscetur, in tertio exiccantium consistens ordine: in caloris frigorisq; discrimine, neutrum insigniter præstant.

Malabathrum.¶ *Malabathrum.*

Malabathri folium cum spica nardi simillimam 50 obtinet facultatem.

Malache.¶ *Malache, Malva.**Malva.*

Agrestis quidem, digerētis paululum & emollientis leviter est facultatis: hortensis verò, quanto plus habet aqueæ humiditatis, tantom facultate imbecillior est. Fructus ejus tantom validior est, quanto & siccior. Cæterum Althea omnium efficacissime digerit.

Mandragora.¶ *Mandragora.*

Refrigerat tertio excessu. Nonnihil tamen pomis caloris atq; humiditatis inest. Unde sopore conciliant. Radicis cortex non tantum refrigerat, sed etiam siccatur. Quod eo includitur, imbecillimum est.

Marathrum.¶ *Marathrum, Fœniculum.**Fœniculum.*

Calfacit in tertio, desiccatur in secundo ordine: proinde lac gignit, auxiliatur suffusis, mensesq;

& urinas promovet. Radix & semen hippomarathri, amplius quam domestici siccant: quare & ventrem videntur sistere. Possunt etiam & calculos frangere, curare ictericos, mensesq; & urinas movere: minimè tamen lac gignere.

¶ *Mastiche.**Mastiche.*

Candida quidem & Chia, astringit simul emolliq;. Proinde stomachi, ventris, intestinorum, jejcorisq; inflammationibus competit, ut puta secundo ordine excalfaciens & siccans. Nigra verò, quæ Ægyptia dicitur, magis desiccatur, minusq; astringit: quamobrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per halitum postulant. Porro oleum, quod præcipue ex Chia conficitur, similis est cum mastiche facultatis.

¶ *Melanthium, Nigella.**Melanthium.**Nigella.*

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, estq; amarum, atq; tenuium partium. Quare catarrhos sanant in linteo admotum, atq; assidue olfactum: flatus potum extinguit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam foris applicitum: lepras, clavos, atq; myrmecias exterit: orthopnoeam juvat, & menses provocat. In summa verò, ubi sectione, extersione, desiccatione, excalfactione est opus, præstantissimum id remedium existit.

¶ *Melilotum.**Melilotum.*

Quiddam habet astringens, digerit tamen, concoquitque. Copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

¶ *Mel.**Mel.*

Desiccatur excalfacitq; secundo ordine: ac detergentem facultatem obrinet. Porro coctum, minus acre abstersoriumq; redditur. Itaq; ad sinuorum ulcerum glutinationem eo utuntur. Cæterum quod mel est amarum, mistæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex India & Felici Arabia 40 convehitur, cōcrescit in calamis, estq; mellis species, minus certe nostrate dulcius, sed similes ei vires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendum pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, ut nostras, nec sitim adferens, eatenus ab illo substantia differt.

¶ *Melissophillon, Citrigo.**Melissophillon.**lon.**Citrigo.*

Marrubio similis est facultate, sed plurimum ab eo vincitur. Quamobrem nec utitur eo quispiam, cum larga marrubij copia suppetat.

¶ *Mespilum, Tricoccon, quod tria grana gerat.**Mespilum.**Tricoccon.*

Fructus ejus admodum est acerbus, vixq; edipossit, ventrem extremè coercens. Quin & in germinibus & foliis acerba hæc qualitas non paucareperitur.

¶ *Medion, Trifolium odoratum.**Medion.**Trifolium.**odoratum.*

Radix quidem ejus austera est, omnesq; fluxiones cohibet. At semine tantum abest ut id molliatur, ut etiam menses ciet: nimirum tenuium partium cum sit, & facultate incidendi præditum.

¶ *Mecon, Papaver.**Mecon.**Papaver.*

Cum quatuor ejus insignes species sint, facultas omnium existit refrigeratoria. Cæterum sativi semen, mediocriter somnum conciliat, visu candidum: proinde panem ipsum inspergunt, ac melle maceratum esitant. At ex sylvestribus, ejusq; rhœas dicitur, quia flos ipsius celeriter defluit, semen validius refrigerat: itaq; nequaquam eo quis innoxie solo uti possit. Illius verò quod calicem 60 incidit



incidentem sustinet, atrum existit semē, medica-
mentosumq; atq; impensē refrigerās. Quod au-
tem longiorem emittit calicem, medicatissimū
omnium est, admodumq; refrigerans, idq; om-
nibus partibus suis. Adeo quippe refrigerat, ut
stuporem ac mortem etiam inducat. Est enim
ex quarto & ultimo refrigerantium ordine.

¶ *Mecon ceratitidis, Papaver cornutum.*

Vim habet incidendi extergendique. Itaq; ra-
dix eius in aqua ad dimidium decocta, hepati-
cos affectus adjuvat. Folia & flores sordidis &
contumacibus ulceribus prosunt. Sed ea rejice-
re oportet ulceribus jam repurgatis: alioqui sa-
nam carnem exepent.

¶ *Mecon Heracleia, Papaver Herculeum.*

Semen habet pituitam expurgans.

¶ *Melea, Mālus.*

Mālus non omnis eiusdem naturæ est, sicuti
neceiusdem fructus. Succus siquidem, cortices, fo-
liaq; arborū, etiam inter se dissident. Itaq; si aci-
diora austerioraque sint, illis vulnera glutinare
possis, tum in phlegmonarū initio repercutere
influxum, ac ventriculū exolutum & langui-
dum roborare: at a quosioribus, mediocres phle-
gmonas incipientes & gliscētes remittere. Quod
autem plurima pomis omnibus recrementitia
frigidaq; insit humiditas, hinc liquet, quod nul-
lus eorū succus servari possit: verū acescant cor-
rumpanturq; universi. Solus enim cydoniorū &
struthorū (quæ propter astringentem vehemen-
tem, cæteris minus sunt humida) succus coctus
cum melle durare potest: per se autem minimē.

¶ *Melea Persice, Persica mālus.*

In germinibus & foliis vincentem habet qua-
litate amaram. Proinde folia eists trita, & su-
per umbilicū posita, lumbricos enecant: estq;
digerens medicamen. Fructus humidior est, &
temperie frigidior.

¶ *Melea Armenice, Mālus Armenica.*

Fructus humidior frigidiorq; est, utrunq; se-
cundo quodammodo excessu.

¶ *Melea Medice, Mālus Medica, Citrium.*

Quod in fructu semen amplectitur, tertii est
ordinis resiccantium atq; refrigerantium. Cor-
tex desiccatur quidem in excessu secundo, non ta-
men frigidus est, sed temperatus, aut paulo in-
frā. Caro eius pariter crassi succi est, & pituito-
sa, frigidaq; Semen amarū est, digerereq; & exic-
care potens, secundo quodammodo ordine a tem-
peratis recedens. Folia exiccandi & digerendi
vim obtinent.

¶ *Meum.*

Radices eius sunt calidæ tertio excessu, in se-
cundo siccæ. Proinde urinas mensesq; movent:
Quod si liberali⁹ sumant, capiti dolorē cōciliāt.

¶ *Milax tracheia, Milax aspera.*

Variis claviculis suis arboribus circūvolvitur:
Folia eius & acria gustāti, & utēti calida existūt

¶ *Milax levis.*

Quodammodo jam dictæ similes vires obtinet.

¶ *Morea, Morus.*

Mori fructus maturus quidem alvū subducit:
immaturus verò, ubi aruerit, restringit admo-
dum. Quare ad fluentes affectus est commodus.
At maturorū succus, propter astringentē quam

habet, ad stomatica medicamēta est utilis. In ra-
dicis cortice purgatoria vis cum quadā amari-
tudine exuperat, ita ut latos vermes enecet.

¶ *Myagros.*

Oleum quod ex semine ipsius funditur, em-
plasticam facultatem obtinet.

¶ *Myetes, Fungus.*

Frigida humidaq; admodū planta est, quare
proximē ad enecantē facultatē accedit. Et sanē
inter eos sunt qui interficiāt, maximē qui ex na-
tura mistam habent qualitatem putrilaginosam.

¶ *Myle.*

Radix eius contrahentis est facultatis: quam
cum farina lolij apertā vulvā sanare ait Diosc.

¶ *Myosotis, Auricula muris.*

Desiccatur secundo ordine, cæterū nullam evi-
dentem caliditatem sortitur.

¶ *Myrice, Tamarix.*

Abstergit & incidentis est facultatis: absq; per
spicua desiccatione. Habet verò etiam astringen-
tem nonnullam. Igitur cum aceto decocta pro-
dest lieni iudurato. Sanat etiam dentium dolo-
res. Fructus & cortex non paucam possident a-
stringentem. At cinis myricæ, admodum desicca-
toria facultatis est, plurimam habens abstergen-
di vim, astringendi paucillam.

¶ *Myriophyllum.*

Adeo exiccat, ut vulnera glutinet.

¶ *Myrrhis.*

Radix eius est odorata & dulcis, mēsesq; mo-
vet, necnō thoracem atq; pulmones purgat. Cal-
facit itaq; secundo ordine, cum partiū tenuitate

¶ *Myrrhine, Myrtus.*

In hac planta vincit terreum & frigidum. Ha-
bet tamen aliquid tenue & calidum. Quare va-
lenter desiccatur. Porro quod ramis & trunco ad-
nascitur tuberosum, quantō siccior cæteris par-
tibus est, tantō desiccatur & astringit vehementius.
Folia item arida viridibus plus desiccant. Itaque
omnes partes eius restringunt, tum foris im-
posita, tum intrò assumpta.

¶ *Moly, Ruta sylvestris.*

Radicē habet nigram, & florem lacteum. Vis
eius tenuium partium est, & calida tertio ordi-
ne: unde crassos humores desiccatur, digeritq; &
urinam movet.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facul- tatibus, lib. VIII.

¶ *Nardus stachys, Spica nardi.*

Alfacit excessu tertio, desiccatur secundo cō-
pleto. Constat ex astringenti, acri, & levi-
ter amara substantia. Quare radix jecori
& ventriculo cōvenit, & pota, & admota extrin-
secus. Urinam ciet: morsus stomachi sanat: ven-
tris, capitis, & thoracis fluxiones desiccatur. Valen-
tior tamen est indica, quæ nigrior quàm Syriaca
exit.

¶ *Nardus Celtica, hoc est, Gallica.*

Ad omnia est imbecillior dictis, præterquàm
ad provocandam urinam. Nam calidior illis est,
sed minus astringit.

¶ *Nardus oreia, hoc est, montana.*

Plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infir-
mior.

*Narthex.**Ferula.*¶ *Narthex, Ferula.*

Semen eius calfacit et tenuat. Medulla autem astrictio est particeps. Unde hæmoptoicis & coeliacis convenit.

Napy.¶ *Napy.*

Calfacit desiccaturque ordine quarto.

Narcissus.¶ *Narcissus.*

Eius radix desiccatur adeo, ut vel maxima tendonum vulnera glutinet. Habet verò quiddam abstersorium & attractorium.

*Neuras.**Poterium.*¶ *Neuras, Poterium.*

Desiccatur citra morsum, adeo ut incisus nervos glutinare credatur, ac præcipue radices eius

Rhododaphne.¶ *Nerium, Rhododaphne.*

Foris quidem illitus is frutex, digerendi vim obtinet. At si intra corpus sumatur, virulentus homini & plerisque pecudibus est.

Nymphaea.¶ *Nymphaea.*

Tum radix eius, tum semen, desiccandi citra morsum vim habet. Itaque ventris profluvia, seminaque immodice profluens sistit. At cui adest candida radix, ea & muliebri medetur profluvio, ex vino nigro & austero epota. Utraque autem abstergendi quandam vim possidet. Quare macerata quidem aqua, sanant alphas: liquida verò pice, alopecias. Ad hæc tamen aptior est, cujus radix est nigra.

Xanthion.¶ *Xanthion.*

Semen eius digerendi vim obtinet.

Xyris.¶ *Xyris.*

Tenuium partium, attractoria, digerendi & desiccandi facultatis est, cum radix, tum multo magis fructus: qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

*Xyphion.**Gladiolus.*¶ *Xyphion, Gladiolus.*

Xyphij radix, maxime altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccaturque;

*Oë.**Sorbus.*¶ *Oë, Sorbus.*

Astringentem vim obtinet, at multo quæ mespilus imbecillior. Proinde fructus eius gustui jucundus est, minusque ventrem quæ mespilus costringens.

*Oënos.**Vinum.*¶ *Oënos, Vinum.*

Ex secundo est ordine calfacientium: sed quod admodum vetus est, ex tertio: sicuti mustum ex primo. Caliditati pro portione respondet siccitas.

*Olynthi.**Grossi.*¶ *Olynthi, Grossi.*

Acrem facultatem sortiuntur: Cocti itaque duos tumores discutiunt: crudi myrmecias & thymos ejiciunt.

Olofium.¶ *Olofium.*

Desiccandi vim obtinet cum astrictione: ideoque propinatur ad rupta.

Olyra.¶ *Olyra.*

Mediam tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quam ut medicamentum.

Onagron.¶ *Onagron.*

Hujus radix arefacta vinosum quiddam redolet, maximeque ad vini facultatem accedit.

Onosma.¶ *Onosma.*

Acrida & amara substantia constat. Cujus folia in vino pota, foetum extinguere expellereque creditur.

Onobrychis.¶ *Onobrychis.*

Rarefaciendi digerendique vim obtinet. Proinde folia eius virentis illita, phymata digerunt: arefacta verò, & cum vino pota, strangurias sanant: sudoresque eliciunt, cum oleo inuncta.

¶ *Ononis.**Onon.*

Radix eius calfacit quodammodo in tertio ordine, abstergitque; & non nihil incidit. Itaque non tantum urinas provocat, sed & lapides frangit, & crustas detrahit. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

¶ *Oxos, Acetum.**Oxos.**Acet.*

Ex frigida calidaque substantia constat: utraque; tamen tenuium partium. Verum calidum frigida exuperat. Desiccatur porro in tertio gradu.

¶ *Oxyacanthos.**Oxya.*

Ut specie, sic facultate hæc arbor piro sylvestri est similis. Cæterum piri sylvestris fructus, prorsus acerbus est: oxyacanthos verò, & tenuium est partium, & non nihil incisorem sortitur: estque rubeus & rarus. Qui quidem affectus omnes fluxionum cohibet.

¶ *Opos, Succus.**Opos.**Succus.*

Cyrenacius quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoque omnium maxime per halitum digerit. Quamquam sanè & cæteri admodum calidi sint, & spirituosi. Porro licet complures etiam sint alij succi, qui effluunt, incisa radice: ob excellentiam tamen sic dicitur Cyrenacius, & Medicus, & Syriacus.

¶ *Origanus.**Origa.*

Heracleotica quidem efficacior est onitide: agrestis tamè est valentior utraque. Omnes verò incidendi, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi continent facultatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

¶ *Orobis, Ervum.**Trago.**nus.*

Desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas evocat.

¶ *Orobancha, Ervagina.**Orobancha.**Ervagina.*

Sicca frigidaque; temperaturæ est, in primo ordine.

¶ *Oryza.**Oryza.*

Habet astrictorium quippiam, quare medio-criter alvum sistit.

¶ *Orchis, Testiculus canis.**Orchis.**Testiculus.**canis.*

Radici eius bulbosæ & geminæ, vis inest humida & calida, gustantibusque; dulciuscula. Cæterum major radix multam habere videtur humiditatem excrementitiam, & flatulentam: quapropter epota venerem excitat. Minor verò, cum ad calidius & siccus vergat, tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etià cohibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tostæ.

¶ *Orchis Serapias.**Orchis.*

Siccatur ultra primum excessum. Quare non ita est ad venerem commodus. Oedemata illitus discutit. Ulcera sordida expurgat. Herpetes sanat. Siccatus multo amplius desiccatur. Nam putrescentia contumaciaque; restituit ulcera, & subastringens cum sit, ventrem sistit ex vino potus.

¶ *Osiris.**Osiris.*

Amara est, & aperiendi vim obtinet. Quare jecur obstructum adjuvat.

¶ *Pancratium.**Pancratium.*

Radix hujus, scillæ similem gustum refert, & vires, multo tamen imbecilliores. Ea itaque pro scilla, ubi hæc non adest, utuntur.

¶ *Palin-*

¶ *Paliurus.*

Folia eius & radix adeo perspicue astringunt, ut fluxum ventris cohibeant: adeoque digerunt, ut mitiora phymata curent. At fructus, tanta incidendi vim possidet, ut calculos vesicæ comminuat, & pectoris pulmonisque excreationibus auxilietur.

¶ *Papyrus.*

Oxycrato vino macerata, recetia ulcera glutinat, maxime in circulo circumposita, ut materia sanantia medicamina excipiens. At ubi usta fuerit, medicamentum exiccatoriū existit, ut chartæ combustæ cinis. *Hoc tamen cinis papyri est infirmior.

¶ *Panax Heracium.*

Ex hoc conficitur opopanax, radicibus & caulibus eius incis. Porro opopanax ipsum tum molli, tum digerit. At calfacit quidem in tertio ordine, in secundo autem siccatur. Cortex radicis excalfacit etiam & siccatur, minus tamen quam succus. Cæterum abstergendi nonnullam facultatem sortitur. Quare eo utimur & ad nuda ossium, & ad ulcera contumacia. Sufficiens siquidem quæ talia sunt, carnem procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus movendis accommodus.

¶ *Panaces Asclepium.*

Minus est calidum supradicto panace. Quare floribus eius & semine melli mistis, ad ulcera, phymata, & phagedænas utuntur.

¶ *Panax Chironium.*

Prædicto similem facultatem obtinet.

¶ *Paronychia.*

Paronychias & favos sanat, digeritque ea quæ discuti postulant. Calfacit. n. & desiccatur in tertio ordine, estque tenuium partium, & sine mordacitate.

¶ *Pentaphyllum.*

Radix eius desiccatur vehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordicationem tamen. Minimum siquidem habet cum acrimonia, tum conspicuæ caliditatis.

¶ *Peplus.*

Succum habet similem tithymalis, cum in aliis, tum quia purgat ceu illi.

¶ *Peplium.*

Etiam fruticulus hic succum habet ut tithymali, validumque, non tamen admodum utilem. Radix eius videtur supervacanea. Semen utile est, & flatulentum, pepeli semini similiter purgans.

¶ *Peperi, Piper.*

Piperis radix vires costo simile obtinet. Fructus nuper germinatis, longum existit piperi: quare maturo est humidius. At fructus qui veluti omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud jam veluti supercrassatum videtur. Utrunque tamen valenter & calfacit, & desiccatur.

¶ *Persea.*

Perseæ folia modice astringunt, ita ut nonnunquam sistere queant sanguinem erumpentem.

¶ *Periclymenos, Volucrum maius.*

Fructus eius & folia adeo vehementer incidunt & calfaciunt, ut si diutius bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tantum urinam moventia. Fortis cum oleo illita etiam excalfaciunt. Juvant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens mensura est drachmæ unius cum vino. Desiccatur etiam semen, & (ut quidam tradunt) si liberalius bibatur, & sterilitatem inducit.

¶ *Peristereon.*

Vim habet hactenus desiccantem, ut vulnera glutinet.

¶ *Petasites.*

Ex tertio est ordine desiccantium: quamobrem ad cacoethe & phagedænica ulcera eam adhibent.

¶ *Petroselinum.*

Ejus semen est gustu acre, cum amaritudine. Sic & in operibus calidum, una cum incidendi effectu. Hinc menses & urinas affatim provocat, flatusque discutit. Calfacit itaque & siccatur in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecilliorē possidet facultatem.

¶ *Peucedanum.*

Succus eius admotum excalfacit & digerit, estque tenuium & incidentium partium. Quare omnibus, nervorum affectibus creditur opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorum ortis. Nec verò intra corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc sæpe foratorum dentium dolores, cavitati impositus, protinus mitigavit. Quinetiam induratos lienes juvat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerrime ab ossibus detrahit, & arida illita ulceribus contumacibus remedium est optimum, minus quidem quam succus excalfaciens, nempe in secundo ordine jam completo, desiccans verò in tertio incipiente.

¶ *Peganon, Ruta.*

Agrestis quidem in quarto ordine excalfacit, domestica verò in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, incidereque crassos & lentos humores potest, atque movere urinas. Quin & tenuium est partium, flatusque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac veneris appetentiam inhibet: digeritque atque exiccatur strenue.

¶ *Pissa, Pix.*

Sicca quidem siccatur & calfacit secundo ordine. At plus siccare valet quam calfacere. Humida verò contra, plus calfacit quam siccatur: habetque partium tenuitatem nonnullam qua asthmaticos & purulentos adjuvat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Abstergendi etiam, coquoquendi, digerendique quandam vim habent, veluti in gustu levem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasque detergunt. Coquunt item duros & crudos tumores, cataplasmatibus inditæ. Atque ad ea omnia, humida valentior est: arida verò glutinandis vulneribus aptior.

¶ *Pissaleon.*

Ex humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris.

¶ *Pistacium.*

Fructus eius quodammodo tenuioris essentia est, subamarum quid & odoratum retinens. Obstructiones itaque omnium viscerum aperit, sed præcipue jecinoris.

¶ *Pityides, Picearum fructus.*

Astringit, simulque acris est, cum amaritudine quadam. Unde thoracis pulmonisque exputionibus confert.

¶ *Pitys, Picea.*

Piceæ cortex vincentem facultatem astrictoria sortitur, sic ut intertrigines sanat, ventremque potus listat. Sed & ambusta cicatricem includit. Tede cortex

*Peristereon.**Petasites.**Petroselinum.**Peucedanum.**Peganon, Ruta.**Pissa, Pix.**Pissaleon.**Pistacium.**Pityides.**Picearum fructus.**Pitys, Picea.*

Teda cortex. cortex illi adsimilis est, viribus tamen moderatioribus. Utriusq; arboris folia glutinant ulcera. In coni foliis & cortice validior facultas est, adeo ut cum molestia mordicer. Fuligo q̄ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorū est cōmoda, itēq; ad angulos oculorū erosos, lippientes, & lachrymantes.

¶ *Pityusa.*

Pityusa. Viribus est similis tithymalo, succumq; sortitur similem, & similiter purgat.

Platanus.

¶ *Platanus.*

Humidioris frigidiorisq; est essentia, non ita multo quam symmetra. Proinde folia viridia tria & illita, nō obscure nascētes phlegmonas adjuvāt. Cortex & pilulæ magis desiccantem vim obtinent: ut ille quidem in aceto cōctus ad dentium adhibeatur dolores: pilulæ verò cum adipe ad ulcera ambusta. Vitandus est pulvis foliis arboris insidens. Alioqui si attrahatur spiritu, arteriam offendit, valenter siccans, exasperansque. Necnon vocem lēdit, sicuti & auditū & visum, si in oculos aut aures inciderit.

Polygonon.

¶ *Polygonon, Centinodia.*

Centinodia.

Ut astrictionis est particeps, ita in eo frigidū, aqueum vincit: ut secūdo excessu refrigeret, aut etiam initio tertii. Itaq; æstuantī ventriculo, erysipelati, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxiliatur. Sistit præterea universas fluxiones: qua ratione videtur exiccatoriū. Quare ad herpetas, ulceraq; bonum remedium est. Quinetiam cruēta vulnera glutinat, auriumq; puri & ulceribus confert. Stillicidio & stranguria affectis exhibitum, urinam movet, ut Dioscorides ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.

Polygalon.

¶ *Polygalon.*

Eius folia modicè astringunt, videnturq; si bibantur, lac generare. Itaq; superaverit in eo calidum humidumq;.

Polygonatum.

¶ *Polygonatum.*

Astrictionis pariter & acrimoniæ habet quippiam, cum fastidiosa quadā amaritudine. Quare nō usque adeo est vescū. Sunt qui radicē eius illinant vulnerib. Alii eo nævos in facie deterunt.

Polemonium.

¶ *Polemonium.*

Tenuium partium est, & desiccandi vim obtinet. Unde quidā radicē eius cum vino ad ischidas, dysenteriam, lienemq; induratū propinant.

Polium.

¶ *Polium.*

Amarū est ac modicè acre. Obstructione itaq; omnia viscera liberat, urinamq; & menses promovet. At viride magna etiam vulnera glutinat, & maximè species eius fruticosa. Aridum sanat rebellia ulcera, præcipuè quod minus est.

Polium minus.

¶ *Polium minus.*

Acrius & amarius est hoc quàm majus, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium: ex secundo autem completo calfacientium.

Polynemon.

¶ *Polynemon.*

Desiccet & calfacit secūdo excessu: itaque & ipsum vulnera glutinat.

Potamogeton.

¶ *Potamogeton.*

Astringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quàm polygoni est.

Polypodium.

¶ *Polypodium.*

Dulcem simul & austerā vincentem obtinet qualitatem, ut facultatis sit citra morsum admodum exiccantis.

¶ *Prasium, Marrubium.*

Prasium.

Marrubium.

Prasium amarum cum sit, jecur ac lienē liberat obstructione, thoracem & pulmonem expurgat, ac menses promovet. Sed illitū etiam detergit, & digerit. Calfacit itaq; secundo excessu completo: siccet autē tertio ineunte, aut completo. Succo eius ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle: per naresque auriginem purgat, ipsumq; ad inveteratos aurium dolores adhibent.

¶ *Propolis.*

Propolis.

Modicè quidē extergit, cæterū valide trahit. Est enim essentia tenui. Excalfacit porrò ordine secundo completo, aut certè incipiente tertio.

¶ *Ptarmice.*

Ptarmice.

Flores eius ciendæ sternutationis vim obtinent. Sugillata & cæteras ecchimoses digerit. Viridis porrò calfacit secūdo ordine, tertio autem siccet.

¶ *Ptelea, Ulmus.*

Ptelea.

Ulmus.

Ulmī foliis quandoq; recens vulnus conglutinavimus, confidentes astringentem simul & abstergentem inesse eis facultatem. Cæterum cortex magis amarus est, astrictoriusq; magis. Itaq; cum aceto & lepras sanat. Quod si viridis circūligetur vulneribus, ea glutinare potest. Radices etiam eandem vim obtinent, Quarum decocto sunt qui perfundant fracturas, quæ callo obducī desiderant.

¶ *Pteris, Filix.*

Pteris.

Filix.

Radix eius latum lumbricū perimit, si in melicrato pōdere drachmarum quatuor bibatur. Quare ipsam partum vivum necare, mortuum autem expellere, non est mirum. Siquidem amara existit, paulūq; astrictionis obtinet. Unde valde ulcera desiccet, citra morsum tamen similem ei vim habet Thelypteris.

¶ *Pycnocomum.*

Pycnocomum.

Radix, fructus, & folia eius, digerendi attrahendiq; obtinet facultatē: acria nimirū cum sint. Folia eius phymata furunculorūq; discutunt. Fructus valentior est: nam & palos, & tela infixa, ad extimam cutem elicit. Radix ad supradicta est infirmior, cæterum flavam bilem expurgat.

¶ *Pyrethrum.*

Pyrethrum.

Radix eius causticam possidet facultatē, quā dentes refrigeratos mitigat. Porrò ad rigores ante periodum cum oleo confricat: stupidosque & resolutos adjuvat.

¶ *Pyros, Triticum.*

Pyros.

Triticum.

Foris impositum, primi est ordinis calfacientium: cæterum nec siccare, nec humectare manifestò potest. Habet verò etiam quiddam lentoris, obstruentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tum siccus. Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̄ quod ex tritico, salis & fermenti ratione. Fermentum quippe vim attrahendi habet, digerendiq; quæ in alto resident.

¶ *Rhamnus.*

Rhamnus.

Desiccet & digerit excessu secūdo. Refrigerat in primo cōpleto, aut secūdo incipiente. Proinde herpetes sanat, & erysipelata nō magnoperè calida.

¶ *Rhaphanis, Radicula.*

Rhaphanis.

Radicula.

Excalfacit excessu tertio, desiccet verò secūdo. Agrestis in utroq; efficacior est. Semen etiā efficacius est planta. Ei enim inest digerēdi facultas.

¶ *Rheum.*

§ *Rheum, Rha.*

Quiddam habet terrestre frigidum, ceu indicia est astrictio: adjuncta est illi tamen quædam caliditas. Siquidem si madatur plusculum, sub-acre conspicitur. Est etiam æreæ cujusdam substantiæ subtilis particeps: quod indicat laxitas, levitasq;. Quare convulsis, ruptis, orthopnæaq; prodest. Sic quoq; liventia & lichenas cum aceto illitum per sanat. Astrictionis ratione, sanguinem expuentib. cœliacis, & dysentericis cōfert.

§ *Rhetina, Resina.*

Resinæ omnes deficiāt & excalfaciūt. Lentiscinæ tamen (quā vocant mastichen) primæ debentur partes. Nam præterq; quod pauculæ ei inest astrictio, qua stomachi, vētrisq; & jecoris imbecillitatib. phlegmonisq; etiam accommodatur, deficcatur insuper citra mordacitatē. Minimū enim acris est, & maximè tenuiū partium. Inter cæteras præfertur terebinthina, manifestam quidem, nō tamen similiter atq; mastiche, astrictiōnem possidens. Verū adjunctum habet quandā amaritudinē, per quam magis q̄ mastiche digerit. Per eandem etiam usque adeo abstergit, ut p̄foras sanet. Quinetiā quæ in profundo residet, magis cæteris extrahit, ob majorē tenuitatē partium. Attamen pinea, & hac etiam magis strobilina, acriores ea sunt, sed non magis tamen digerunt, attrahuntve. Media inter has sunt picea & abietina. Habet porrō & emolliens quiddam terebinthina. Secundū locum habet in emolliēdo lentiscina, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

§ *Rhodos, Rosa.*

Ex aqua substantia calida, duabus aliis qualitatibus mista, astringenti videlicet & amaræ cōposita est. Flos tamen magis, quā ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exiccatorius est.

§ *Rhodiarrhiza, Radix rhodia.*

Tenuium partium & digerentis est facultatis. In calfaciendo verō secundi ordinis est censenda, aut certè tertii incipientis.

§ *Rhododaphne.*

Tota sua essentia venenū est & homini & p̄risq; pecoribus. Porrō calfacit excessu tertio: primo autem deficcatur.

§ *Rhœa, Mālum granatum, sive punicum.*

Omne mālum granatū astringentē qualitatē fortitur: non tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quædam sunt acida, quædam plus dulcia quā austera. Pro ratione quarū qualitātū vincuntium, suos usus præstāt. Porrō acini astringentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamina, quæ sidia dicuntur. Ad similem illis vim habent flores qui cytini dicuntur.

§ *Rhus, Sumach.*

Ad deficcandum & astringēdum coriarii hac planta fruticosa utūtur. Medicis in usu sunt fructus eius & succus, austera admodum qualitatis. Exiccatur itaq; in tertio ordine, refrigerat verō in secundo.

§ *Rhypos, Sordes.*

* Sordes quæ à gymnasiarū statuis æreis abraditur, digerendi emolliendiq; vim obtinet: quæ autem ab ijs qui in palæstra exercentur, quantū accepit pulveris, tantū ab ea est diversa: atq; hac sordem *πύλον*. Græci nominant. Prior igitur quæ ob contractam æruginem, acrior etiam exiit,

cruda phymata digerit. Secunda autem, optimū est phlegmones mamillarū remedium. Constat enim ex pulvere percussiete, oleo emolliente, ac deniq; sudore & sordibus digerentibus.

§ *Sagapennum.**Sagapennum.*

Liquor est calidus & tenuiū partium, sicuti & alij liquores. Sed abstersionē quandam obtinet, qua oculorum cicatrices expurgat, extenuatq;. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorū, quæ à crassitie humorum proveniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua provenit, ferulæ assimilis, imbecilla est & in utilis.

§ *Sampsycho, Maiorana.**Sampsycho. Maiorana.*

Tenuium partium & digerentis est facultatis: deficcatur enim & calfacit ordine tertio.

§ *Saprotes ζύλων, Caries lignorum.**Caries lignorum.*

* Caries eorum præcipuè lignorum quæ participia sunt astrictionis & abstersionis, ut ulmus, expurgat, impletq; ulcera humida.

§ *Sarcocolla,**Sarcocolla.*

Mistam vim habet ex emplastica quadā substantia, & particula amara, Itaq; citra morsum deficcatur, ac proinde glutinare ulcera valet.

§ *Satyrium, Triphyllum.**Satyrium. Triphyllum.*

Humidū calidumq; est temperie, ob idq; dulce. Recrementitiā tamen & flatuosā humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat.

§ *Selinon, Apium.**Selinon.**Apium.*

Adeò calidū est, ut & urinam & menses cieat. Flatus quoq; digerit, & magis semen quā herba. Oreoselini & hipposellini similis vis exiit. Verum Hipposelinum imbecillius est, oreoselinum valentius.

§ *Seris, Cichorion.**Seris.**Cichorion.*

Holus est subamarum, & magis quod agreste est. Id nanq; est frigida & sicca temperatura, secundo excessu. Cæterū domestica magis quā agrestis refrigerat. Porrō utraq; astringentis qualitatis est particeps, ut chondrilla, quæ est etiam fereos species.

§ *Seriphium.**Seriphium.*

Absinthio est tum specie, tum gustu simile. Cæterum nō æquè astringit: sed calfacit valentius, necnon amaritudinem quandam falsuginosā refert, ventriculoq; est infestum: magisq; absinthio lumbricos enecat. Calfacit itaq; secundo ordine intenso, siccatur autem in tertio.

§ *Seseli.**Seseli.*

Adeò excalfacit tum radix, tum fructus, ut moveat urinās. Est etiam tenuium partiū, ut & comitialibus morbis, & orthopnæis competat.

§ *Sesamum.**Sesamum.*

Viscosum & pingue cum sit, emplasticū etiā existit, emolliensq;, ac modicè calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herbæ decoctū, ejusdem sunt facultatis.

§ *Sesamoides magnum.**Sesamoides magnum.*

Semen eius ut helleborus purgat, similiterq; abstergit, calfacit, & deficcatur.

§ *Sesamoides parvum.**Sesamoides parvum.*

Hujus semen nonnullam* acrimoniam fortitur, vehementerq; est amarum. Excalfacit itaq; rumpit, extergitq;.

§ *Sideritis.**Sideritis.*

Nonnihil abstergit, sed plurima pars eius est humida.

humida & mediocriter frigida, cum exigua astringitione, qua phlegmonē sedat & glutinat. Sideritis autem Achillea, dictam superans astringitione, sanguinis eruptioni, dysenteriae, & muliebri profluvio est aptissima.

Sicyos.
Cucumis.

¶ *Sicyos, Cucumis.*

Maturus, tenuioris essentiae est: immaturus, crassioris. Sed incidendi & abstergendi facultas eis inest. Quare & urinā movent, & corpus splendidum reddūt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix tum semen, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine: magisq; abstergunt, q̄ ipsius melonis caro.

Cucumis
agrestis.
Elaterium.

¶ *Sicyos agrios, Cucumis agrestis.*

Tum ipsa, tum eius succus, quem elateriū vocant, aut ex foliis & radicibus pressus, perutilis ad medicationes existit. Elaterium itaq; menses ciet, foetumq; perimit applicatū, ceu alia omnia amara & tenuium partium. Summē siquidē est amarum: calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiam digerit. Sic enim eo angina laborantes inungūt quidam cum melle aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectis infusum cum lacte in nares: similiter dolores capitis sanat. Radicis atq; foliorū succus similem, sed imbecilliorē facultatem sortitur. Radix etiam abstergit, digerit, emollitq;. Cortex potentius desiccatur.

Silphium.
Laserpitium.

¶ *Silphium, Laserpitium.*

Silphii liquor calidissimus est. Necnon folia, caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida: omnia tamen flatulentā magis essentiae sunt, ac proinde difficilia concoctu. Foris autem imposita corpori, efficaciora, liquor præcipuē, admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrementas exterrit, & quandam liquandi vim possidet.

Sison.

¶ *Sison.*

Calidus & subamarus existit. Unde urinā movet, concoquit, menses provocat, omnesq; viscerum obstructions reserat.

Sion.

¶ *Sion.*

Quantum gustu aromaticū est, tantū etiam excalfacientis facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam movet, & calculos renū frangit, & menses evocat.

Sisaron.

¶ *Sisaron.*

Sisari radix cocta stomacho grata est, & urinam movet: secundo ordine excalfaciens, cum amaritudine & astringitione levicula.

Sisymbrium.

¶ *Sisymbrium.*

Tenuium est partium, facultatisq; digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum vino exhibent singultientibus torminaq; patientibus.

Cardamine.

¶ *Sisymbrium, quod Cardaminem vocant.*

Si siccum sit, tertii est ordinis calfacientium & exiccantium: si humidum, virideq; secundi.

Scandix.

¶ *Scandix.*

Agreste est olus, subacre & amarum. Calfacit itaq; & siccatur secundo ordine intenso: valenter movet urinā: visceraq; liberat obstructionibus.

Scilla.

¶ *Scilla.*

Admodum quidem incidit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat eam assam aut elixam sumere, quod sic eius vehementia exolvat.

¶ *Scolymos.*

Radix ejus si quis illam in vino coctā bibat, graveolentem urinam abundanter elicit, foetoriq; alarum medetur. Succus enim ejus est purgatorius. Calfacit porro secundo & completo ordine, aut tertio incipiente: siccatur verò secundo.

¶ *Scordion.*

Nonnihil amarum obtinet & acerbum, & acre: ipsiusq; acrimonia, alij acrimoniae est perisimilis, expurgat igitur. Excalfacitq; viscera, menses urinamq; provocat. Convulsa, rupta, doloresq; laterum ab obstructione & frigore obortos, epotum sanat: illitum viride, magna vulnera glutinat: purgat sordida: inspersumq; aridū, contumacia ad cicatricem perducit.

¶ *Scorodon, Allium.*

Desiccatur & excalfacit, excessu quarto. Porro ophioscorodon, aliū agreste est, domestico valentius.

¶ *Scorodoprasson.*

Ut gustu & odore, sic viribus inter allium & porrum mediam naturam sortitur.

¶ *Scorpiodes.*

Excalfacit ordine tertio: desiccatur secundo.

¶ *Smilax, Cactus arbor.*

Facultatis est venenosa.

¶ *Smyrna, Myrrha.*

Secūdi est ordinis calfacientium & exiccantium. Unde capitis vulnera glutinat. Inest illi amaritas non exigua, qua foetum & lumbricos enecat, ejicitq;. Habet etiam & abstergendi vim moderatam. Quare ocularibus miscetur medicamentis, & iis quæ ad veterem tussim, atq; anhelationem administrantur.

¶ *Smyrna Boice, Myrrha Boeotia.*

Vim habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.

¶ *Smyrnium.*

Ex eodem genere cum apio est & petroselino: fueritq; apio quidem validius, imbecillius verò petroselino. Itaq; & urinas & menses prurit: calidum siccumq; tertio ordine.

¶ *Sonchus.*

Dum viridis est, aquea terreaq; essentia constat, utraq; leviter frigida: nam & astringitionis cuiusdam est particeps, & manifestē refrigerat, tū illius, tum estus, At arefactus, terrestrior redditur, modicam asciscens caliditatem.

¶ *Sparganium.*

Desiccantis est facultatis.

¶ *Spartum, Genista.*

Sparti (quo & vites alligāt) tum fructus, tum succus virgarū, valentē trahendi vim possidet.

¶ *Staphilinus, Pastinaca.*

Sativa imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesq; provocat, abstergitq; nonnihil, cum herba quidē tota, tum vel maximē semē & radix.

¶ *Stachys.*

Gustus est acris & amarus, tertiiq; calfacientium ordinis. Unde menses rationabiliter provocat. Facit tamen abortum, secundas ejicit.

¶ *Stæbe.*

Fructus ejus & folia astringunt citra mordacitatē, desiccantq; in tertio ferē incipiente ordine. Quare decoctum eorū injicitur dysentericis, auribusq; pure fluentibus: quod etiam magnā vulnera glutinat, præcipuē cū vino atro & austero.

Valenter

Valenter enim desiccant omnes præternaturā humiditates. Folia viridia illita erumpentē sanguinem supprimunt, suffusionibusq; oculorū exictu medentur.

¶ *Stachas.*

Amara est & mediocriter subastringens, cum nimirū ex terrena essentia frigida exigua, & extenuata altera terrena copiosa, constat. Quare obstructione liberat, extenuat, extergit, roboratq; & viscera & universum corpus.

¶ *Stratiotes.*

Aquaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestris verò, non nihil habet astrictionis. Proinde & ulcera glutinat.

¶ *Struthion.*

Radix ejus est acris, calida, siccaque temperamento, ex quarto propemodum ordine excalfacientium. Sed & abstergit, & irritat: proinde & sternutationem provocat.

¶ *Syrax.*

Excalfacit, emollit, concoquit. Quamobrem 20 tussi, catarrho, pituitæ destillationibus, raucedinibusq; auxiliatur. Tum menses, seu potum, seu admotum prolicat. Combusti ejus fuligo, thuris fuligini est similis.

¶ *Syca, Ficus.*

Aridæ excalfaciunt ordine primo aut secundo incipiente, habentq; partium tenuitatem quandam: quare tubercula dura concoquunt, digeruntq; tum ipsæ, tum ipsarū decoctum. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda 30 est farina triticea: ubi verò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pinguiore, magis possunt concoquere: quæ acriore, magis tum extergere, tum digerere. Ficus virides, imbecilliores sunt. Utræq; tamen & sicca & humidæ alvum subducunt.

¶ *Syce, Ficus arbor.*

Calidæ, tenuiumq; partium temperaturæ est, sicuti indicant tum liquor ejus, tum foliorū succus. Valenter enim calfacit uterq;. Itaq; non mor- 40 dicat tantū, aut vehementer absterget, sed & ulcerat, & ora vasorum reserat, & verucas extirpat. Quin & vim purgatoriam habet. Porro lachryma & succus aggestis ficus, quam caprificū vocant, ad omnia, q̄ sativè valentior est. Cæterū ipsarū surculi adeo calidi sunt, atq; tenuium partium, ut carnes bubulas duras, si coquendis adjiciantur, friabiles ac teneras reddant.

¶ *Symphytum petraum.*

Habet quandam vim incidendi, qua collectū 50 in thorace pulmoneq; pus expurgare potest: ac simul contrahendi facultatis est particeps, qua ejectionibus sanguinis auxiliatur: estque humidum, ac non immodicè calidum: unde & dulcè apparet, atq; odoratu jucundum. At hæc, manus sitim extinguit, & arteriæ sanat asperitates. Liquer igitur ipsum etiam & digerere, & cōstringere posse. Unde & enterocœliis imponit, & ad convulsa & rupta cum oxymelite bibitur.

¶ *Symphyton magnum.*

Similem dicto vim habet. Cæterū neq; videtur dulce, neq; odoratum. Est verò secundum viscositatem mordacitatemq; scillæ simile.

¶ *Spondylon.*

Fructus ejus acris & incidens est: itaq; ad asth-

ma & comitalem morbu aptum est medicamē. Prodest & aurigini. At radix ultra jam dicta, fistularū callos tollit, si sit circumrasa. Floris succus, ac diuturniora auriū ulcera conveniētes reponitur.

¶ *Schinos, Lentiscus.*

Schinos.

Ex aquea essentia leviter calida, & terrena frigida non pauca, constat. Desiccatur itaq; secundo ordine cōpleto, aut tertio incipiente, in caloris frigorisq; medio consistens quodammodo. Astringit autem ex æquo, moderateq; omnibus partibus suis. Succus bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quæ dysenterias & alvi affectus sanant. Quin & ad sanguinis exptiones, flores muliebres, necnon sedis vulvæque procidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nonnihil accedens propè.

¶ *Schinu anthos, Schini flos.*

Schini flos.

Modicè calfacit, modicèq; etiam astringit, nec planè a tenuitatis natura est alienus. Quare urinam & menses movet, sive potione, sive fomēto adhibitus. Prodest etiā jecoris, stomachi, & ventris inflammationibus. Cæterum magis astringit radix, quanquam flos etiam astringat omnibus partibus suis. Proinde medicamentis quæ hæmoptoicis exhibentur, miscetur.

¶ *Schænos leia, Iuncus laevis.*

Schænos leia, Iuncus laevis.

Quidā oxy-schænos, alius oligoschænos dicitur: gracilior duriorq; oxy-schænos, crassior laxiorq; oligoschænos. Fructus hujus somnū conciliat. Oxy-schæni autē duæ sunt species: altera sterilis, cujus nullus usus in medicina: altera quæ fert semen somni cōciliativū, sed minus q̄ oligoschæni. Utrunq; si cum vino bibatur, ventris fluxus desiccatur, muliebre profluvium rubrum sistit. Est itaq; eorum temperies composita ex terrena essentia leviter frigida, & aquea leviter calida.

¶ *Terminthos, Terebinthus.*

Terminthos, Terebinthus.

Cortex, folia, & fructus ejus astringunt, & secundo ordine excalfaciunt: unde etiā quod siccet, 40 liquet. Porro fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantiū, calfacitq; valenter. Quare & urinam provocat, & lienibus auxiliatur.

¶ *Teutlon, Beta.*

Teutlon, Beta.

Nitrosæ facultatis est particeps, quā tum digerit, tum extergit, & per nares expurgat. Cæterū cocta nitrositate exiit, evaditq; leniter digerens. Ad detergendū tamen digerendumque validior est beta alba.

¶ *Teucrium.*

Teucrium.

Incidit & tenuium est partium: quare lienes sanat. Ac exiccat quidem in tertio, calfacit autem secundo ordine.

¶ *Tephra, Cinis.*

Tephra, Cinis.

Ex partibus cum terrenis, tum etiam fuliginosis (quæ & tenues sunt, & cum aqua in qua macerati prius fuerint cineres, excolant) constat. Pro materia tamen cōbustæ differentia, cineris temperies variat. Quare haud scio qua ratione Dioscorides astringere cineres omnes prodiderit, cum ficulneus cinis eiusmodi omnis qualitatis sit expers, nimirū ipsa arbore nulla parte sui acerbam qualitatem reddente. At ex acerbis lignis cōfectus cinis, non parū quidem astringit: meminiqu; me eo aliquando sanguinis suppressisse eruptionē. Verū nullus unq; ad tale uti ficulneo audeat. Siquidē hic acrimoniæ plurimū, urētisq; fa-

Calx. cultatis obtinet, mistæ absterfioni. Est & calx cineris quædã species, cæterû tenuioris essentia, q̃ qui ex lignis fit. Porro elota, medicamē est citra morsum desiccans, magisq; si bis terve lavetur. Cæterû si marina aqua abluta sit, admodû digerit.

Telephium.

¶ *Telephium.*

Exiccandi & detergendi facultate est, nō tamē insigniter calida, sed forsan secundi ordinis. Desiccatur etiã secundo, intenso tamē, aut tertii principio. Proinde ad putrida ulcera cōgruit, & cum aceto utranq; vitiliginem sanat.

Telis.

¶ *Telis, Fœnumgræcum.*

Fœnumgræcum.

Calfacit secūdo ordine, desiccatur primo. Proinde fervētes phlegmonas irritat: quæ verò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerēdo p̃sanat.

Tithymalus.

¶ *Tithymali.*

Tithymali omnes vincentem habent acrem, calidamq; potentiã, cum amaritudine quadam. Validissimus eorum est liquor: dein fructus & folia: postremò radix. Hæc aceto incocta, sanat erosorum dentium dolores: liquor in ipsa foramina induitur. Cæterû si aliam partē contingat, cōtinuò adurit ulceratq; illam, ex quarto existēs calfacientium ordine, qui ad exurentia pertinet. Sic pilos quoque, & verrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inunctus succus evellit: detergitq; lichenas & p̃foras, propter amaritudinē: necnon ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter calfacit & desiccatur, aliquando juvare poterit. Ad hæc fistularû callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus præstare possunt, sed imbecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos, uti assolent. Celerrimè enim ab illis in vertiginem acti, ac semimortui reddit, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint tithymalorû genera, valentissimus est quē characiam maremq; nominant: & fœmina nuncupata myrsinites: & qui in petris nascitur arborescens. Deinceps qui phlomo assimilis est, & cyparissias. Dein marinus: ac deniq; helioscopius. Pro portione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixivium existet.

Tragacantha.

¶ *Tragacantha.*

Emplastica facultatem similem gummi obtinet, necnon obtusiores a credinem. Ac sanè similiter illi desiccatur.

Tragion.

¶ *Tragion.*

Tragii folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerentisq; sunt facultatis. Est verò & tenuiū partium, & facultate in principio tertii ordinis calida. Stipites, & infixæ corporibus extrahit, lapides frangit, menses movet, drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterum minus, cujus folia scolopendrio similia sunt, visitur quidē multis in locis, sed nō parum habet facultatis astringentis, ut ad fluxionum affectus conveniat.

Tragoriganum.

¶ *Tragoriganon.*

De hoc in sermone de origano diximus.

Tribalus.

¶ *Tribolos.*

Ex humida essentia modicè frigida, & sicca nō mediocriter, cæterû similiter frigida cōstat. Unde contra phlegmonarû generationes, & cōtra oēs influxus cōgruit. Porro terrestris ipsius fructus, cū tenuiū sit partiū, potus renū calculos cōterit.

¶ *Tripolion.*

Tripolia.

Radix huius est acris, & facultate calida in tertio excessu.

¶ *Triphyllum.*

Triphya.

Calfacit & siccatur in tertio ordine, ut bitumen cui odore est simile. Proinde potum laterū dolores ab obstructione natos juvat: & urinā mensesq; provocat.

¶ *Trichomanes.*

Trichomanes.

Eadem præstat quæ adiantum.

¶ *Trychnon, Solanum, Strychnon.*

Esculentum quidē astringit, refrigeratq; in secundo ordine. At eorū quæ esui nō sunt, unum quidem dicitur Halicacabum, fructū habens rubrum, acino uvæ persimilem. Alterū verò est fruticosum, à cōciliando somno Hypnoticū appellatum. At tertiu, quod ad insaniam adigat, omnes Manicū nominat. Halicacabū igitur, fructū fert ciendæ urinæ idoneū, compluribusq; facultatibus quæ ad jecur, vesicam, & renes accommodantur, miscetur. Solani verò hypnotici cortex radicis, si cum vino bibatur, somnū accersit, drachmæ pondere sumptus, existens succo papaveris similis, nisi quod imbecillior, utpote tertij refrigerantiū ordinis, cū ille sit quarti. Huius solani semen urinā ciendi vim habet. Si plus tamē duodecim corymbis hauseris, dementiam ascescet. Quod reliquū est ex solanis p̃positis, est ad medicationes intra corpus inutile. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortē inferent: si pauciores, insaniam. Una certè innoxie sumit: nihil tamē utile præstat. At foris corpori illitū, ulcera maligna p̃sanat. Verū ad thalia, radicis cortex p̃fertur, desiccatur secūdo ordine jam cōpleto, aut tertio incipiente: secūdo aut incipiente refrigerans.

¶ *Hyacinthus.*

Hyacinthus.

Radix ejus bulbosa est, desiccans primo ordine: secundo autem, aut initio tertij refrigerans. Fructus leviter extergit astringitq;: unde & regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris, frigorisq; consistens.

¶ *Hydnon, Tuber terra.*

Hydnon.

Substantiam habet vincentē terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permistam.

¶ *Hydropeperi.*

Hydropeperum.

Non usque adeo calidum est, ut piper. Viridis ipsa herba cataplasmatibus instar imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

¶ *Hyoscyamus, Altercum.*

Hyoscyamus.

Cui semen atrum est, insaniam ac soporem inducit: cui verò mediocriter flavum, propinquā ei obtinet facultatē. Utriq; tamen fugiendi sunt, ut deleterij & inutiles. At cui semen & flos est candidus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodammodo refrigerantium ordine.

¶ *Hypericum.*

Hypericum.

Calfacit & siccatur, essentia tenui, adeo ut menses urinæq; provocet. Illitū viride, ad cicatricem omnia perducit ulcera. Siccum cōtusumq; si inspergas, mollia, humida, & putrilaginosa sanabis. Sunt qui & ischiadicis bibendum propinēt.

¶ *Hypecon.*

Hypecon.

Refrigerat tertio ordine, parumq; à papavere distat.

¶ *Hypoglosson.*

Hypoglosson.

Radix ejus & succus emolliēdi vim possidet.

¶ *Hyssopus.*

¶ *Hyssopum.*

Desiccatur & exsiccatur ordine tertio, sed tenuius est partium.

¶ *Phaci, Lentesc.*

Valenter astringunt, mediūq; tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccant tamē in secundo ordine. Ipsum itaq; earū corpus, siccatur & sistit alvum. Ceterū decoctū provocat. Proinde prior aqua abjicitur, ubi retentionis causa exhibentur.

¶ *Pacos, Lenticula palustris.*

Humidæ frigidæq; temperaturæ existit, utrinque ex secundo ordine.

¶ *Phaleris.*

Succus, semen, & folia ejus, commodè potari creduntur cōtra vesicæ dolores, ceu in se habeat tenue quiddam & calidum.

¶ *Phalangites.*

Sic dicitur, quod morfi à phalangiis auxilio sit. Est autem facultatis tenuium partium, & exiccantis, quare tormina lenit.

¶ *Phlomis, Verbascum.*

Hujus herbae duæ sunt species. Quædā enim foliis est candida, quædam verò nigra. Rursus, albæ quidem mas est, cujus folia ambustiora: fœmina, cujus majora visuntur. Est & alia phlom⁹ agrestis, flores habens aureos & luteos: necnon alia quam phlomida appellant. Priorum duarū radix acerbæ gustu est, & fluxionum affectibus prodest, atque adeo dentium doloribus: quanq; folia digerendi vim habent. Similiter & aliarum 30 folia. Omnium quippe folia desiccandi & detergendi vim possident.

¶ *Phoenix, Palma.*

Astrictoriæ facultatis est particeps omnibus partibus suis. Igitur ramorū succus austerus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constitās. Similis facultatis est ejus cerebrū, esui aptū. At fructus, & maximè dulcis, non parvam obtinet caliditatem. Qui quidem cum edendo sit, magno est usui, non tantum foris impositus, ubi roborare, desiccare, contrahere, stipareq; est consilium, sed tanquam cibus sumptus, & simul cum aliis, & per se. Porro tenerū palmæ germen, eandem cum ejus cerebro facultatē sortitur. At cortex astringit quidem, ac plus quam dicta omnia desiccatur: utpote minimū habens humiditatis. Quare ad ulcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & vetriculi imbecillitates, eo intus & foris administrato utuntur. Radix citra morsum desiccatur, cum nonnulla astrictione.

¶ *Phormion.*

Phormij semine cum melle ad levcomata* utuntur. Sed spicula etiā extrahere creditur, veluti & ipsa herba. Quare tenuium partiū, & attrahendi digerendiq; potentiam obtinet.

¶ *Phu.*

Odorata quodammodo ejus est radix, nardo viribus similis: ad pleraq; tamen infirmior. Movet autem urinam, ut nardus gallica.

¶ *Phycos, Alga.*

Ex mari exempt⁹ & virens, siccatur refrigeratq; in secundo ordine: habet enim quiddam modicè acerbum.

¶ *Phyllitis.*

Acerba cum sit, meritò & diarrhœas & dysenterias epota juvat.

¶ *Phyllon malabathru, Folium malabathri.*
Nardo similem possidet facultatem.

Folium malabathri.

¶ *Chalbane, Galbanum.*

Chalbane, Galbanum.

Succus est plantæ ferulaceæ, molliendi & digerendi vi: calfacit enim ordine tertio incipiente, aut completo secundo; siccatur verò secundo incipiente.

¶ *Chamedrys.*

Chamedrys.

Vincentem habet qualitatem amaram. Est & quodammodo acris: quare meritò lienes colligat, urinas & menses provocat, crassitudinem humorum incidit, viscerumq; obstructions repurgat. Calfacit itaq; & desiccatur tertio ordine: plus tamen calfacit quam siccatur.

¶ *Chamacissos.*

Chamacissos.

Flos ejus admodum amarus cum sit, jecur obstructū aperit: daturq; & coxendice laborantibus.

¶ *Chamalea.*

Chamalea.

Vincentem habet qualitatem amaram: quare admodum sordida ulcera, & quæ maximis indurata sunt crustis, purgare cum melle est potens.

¶ *Chamaleuce.*

Calfacit quodammodo tertio ordine, siccatur primo.

¶ *Chamaleon.*

Chamaleon.

Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet. Quare foris usus ejus ad ea quæ absterfionē postulant, administratur. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur. Etenim siccatur tertio ordine, calfacit autem secundo absoluto. At albi radix quod non sit perinde acris, potui datur cum vino austero, mensura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem.

¶ *Chamapitys.*

Chamapitys.

Magis amara est quam acris: quare abstergit, purgatq; viscera, magis quam calfacit. Proinde auriginosis, & quibus facile jecur obstruitur, bonum remedium est. Quin & urinam, & menses ducit tum pota, tum illita cum melle. Viridis vulnera magna glutinat: ulcera putrescentia sanat: durities uberum discutit. Est enim in siccando 40 tertii ordinis: in calfaciendo, secundi.

¶ *Chamaesyce.*

Chamaesyce.

Abstergendi simul & acrem vim possidet. Itaque a crochordonas & myrmecias, caules ejus teneriores intriti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle crassas oculorum cicatrices detergunt: hebetudinem visus à crassitie ortam, adjuvant: sicuti & suffusionum principia.

¶ *Chelidonium.*

Chelidonium.

Admodum extergit & calfacit. Succus ejus ad acuendū visum est commodus. Quidam radicē ejus ad auriginē ab obstructione jecoris ortam, in vino albo cum aniso propinant. Mansa etiam confert dentium doloribus. Chelidonium minus, cum majori sit acrius, celeriter cutem exulcerat, unguēsq; scabros ejicit. Succus ejus per nares purgat. Hæc itaq; siccatur & calfacit in quarto incipiente ordine: at chelidoniū majus in tertio.

¶ *Chondrilla.*

Chondrilla.

Ejusdem ferè est facultatis cum seri: nisi quod 60 amariuscule est, ac proinde siccantior.

¶ *Chondrus.*

Chondrus.

Nutrimētū quidem est optimū, sicut triticū. Ut medicamen autem, emplasticæ est facultatis, tēperie tritico similis, nisi quod viscosior existit: qua ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semē

veluti materia quædã idonea excipiēdis medica-
mentis siccantib. Ipsum verò ex numero conco-
quentiũ existit, ut triticũ, quæ minimè profectò
desiccant. ¶ *Chrysocomo.*

Chrysoconze.

Radix vincentes habet acrem & astringentē
qualitates: quare non admodum multi usus est.
Quamquam cocta in melicrato, peripnevmoniis
& morbis hepaticis auxiliatur. Sed & menstruis
purgandis est utilis.

¶ *Pseudodictamnium.*

Pseudodictya
nana.

Vim dictamni, sed imbecillam sortitur.

¶ *Psyllium.*

Psyllium.

Semen habet admodum utile ex secundo refrigerantiũ ordine. In desiccando verò & humectando, quodammodo est symmetrum.

9 Ocimum.

Осітнѣт.

Ex secundo est ordine calfacientium. Habet autem recrementitiam humiditatem: proinde nec commodum est, ut in corpus sumatur. At foris illitum, concoquit digeritq;

9 *Ocimoides.*

Ocimoides.

Semen tenuium est partium, & citra morsum,
facultatis desiccatoriæ.

GALENI PERGAMENI DE
simplicium medicamentorum facultatibus,
Liber IX.

QUotquot plantarū sunt partes, fructus,
succī, & liquores, suprà dicta sunt omnia.

Nuncaũt de reliquis medicamentis, quæ

¶ De differentijs terræ.

*Terra differ-
rentia.*

Terra cōmuniter ac secundum agricolas, dicitur illa quæ agriculturæ est aptissima, quæq; humore macerata, lutū efficitur. Atq; in ea sanè plu-

20 Terra itaq; vel Latinis etiā dicitur usitatē, quę
injecta aqua solvitur, & fit lutū. Quę sanē quas-
dam differentias sortitur: secundum propriam
quidem rationē, ut videlicet pinguis si sit & vi-
scoſa, quę utique omnino & atra colore est: aut
contrā friabilis, & pinguitudinis expers, quam
argillam appellant, quę quodammodo candi-
dior existit: aut si inter has maximē cōtrarias ha-
beatur. Secundū misturam autē alienorū corpo-
rum, ut dum dicimus lapidosam aut arenosam
30 hanc esse terram. Porro talis substantia admista,
segregatur larga aque affusione, macerationeq;
donec universum perfluat. Sic enim quod lapi-
dosum & arenosum est, subsidit, & terra exacta
supernatat: in quē modum præparatur etiā & ter-
ra Lemnia, quam alij sphragida Lemniā (ob im-
pressum illi sigillum Dianę sacrū) cognomināt.
Quę quidem a Lemnia rubrica differt, quod cō-
tactu nō cōtaminet, perinde ut illa: quodq; secū-
dum collem in Lemnō, qui totus colore est ful-
40 vus, & in quo nec arbor, nec saxū, nec planta na-
scitur, tantū hujusmodi terra visitur. Ceterū eius
tres differentię assignātur. Una quam Lemniam
sphragidem diximus: quamq; alij nemini, præ-
terq; uni sacerdotissę, cōtingere fas est: altera ve-
rō ejus, quę miltos est, sive rubrica: ac denique
tertia, quę detergendi vim habet. Utuntur autē
priorē illa ad vulnera vetera & cōtumacia, ad o-
mnēq; ferarum morsus: sicuti adversus medica-
menta letalia. Distinguere itaq; ab ea terra quę
0 colitur, medicamentoſam oportet, qua ad cura-
tiones utimur. Tamen si ejus quoq; quę colitur,
si qua pinguis est, utilis ad curationes existit ea-
rum omnium partium, quę desiccari postulant.
Desiccandi nanque vim terra quęvis possidet.
Cum enim ejus corpus natura sit siccum, omni-
noq; igneę substantię expers, citra mordacitatē
exiccat. Ad quod quidem etiam ablutio juvat.

¶ De terræ lotionē.

Ac lavatur sanè terra omnis, ut Lemnia. Pri-
mo siquidem maceratura aqua, quæ nullâ habet
medicamentosæ qualitatis suspiciônẽ. Dein ef-
funditur quod innatat, colligiturque id quod est
à lapidosis & arenosis secretû. Gustus autem do-
cet, quænam terra lotionẽ indigeat, aut quæ mi-
nimè. At Lènia, cùm sit à sacerdote abluta, rursus
elui non exigit.

Elem
corpo.

*Terra
sim
differen
comple*

*Terra p
gandi*

Lemnia
Sphragm
Lemnia
brica.

Lemma
different

Terra quae
is deficiet
is vni p
et.

¶ De terra Samia.

terra
aster. At Samiam ne lavari quidē est opus. Utimur
autē altera eius specie magis, quā Samium altera
cognominant, ad sanguinis expuitiones, mulie-
briaq; profluvia, veluti & Lemnio sigillo, necnō
adversus ulcera dysenterica, priusq; putrescen-
tia evadant. Quāq; etiā & putrescentibus, quæ
depascentia vocant, interdum Lemnia ipsa pro-
fuit, injecta quidem per arnoglossę succū, bibita
verō ex oxycrato aquoso: prius tamē ablutis ul-
ceribus: idq; primō quidem, melicrato: dein au-
tem muria. Cæterū Lemnia terra q̄ Samia nō pa-
rum efficacioribus esse videtur viribus. Quare ab
ea, quæ phlegmone tentari cœperūt partes, exa-
sperantur, cum tamen à Samia juventur. Ex qua
& oleo rosaceo mitissimū conficitur pharmacū,
etiā cōtra alias ferventes phlegmonas, incipien-
tēsq; bubonas & fluxiones podagricas, & ad ea
breviter, quę refrigerare cum mitigatione est a-
nimus. Unde constat Samiā refrigerare. Quin &
magis aërea ejus essentia existit, collata ad Lem-
niā, cujus argumēto est levitas. Aestimabis por-
rō omnē terram medicaminosam, tum levitate,
tum gravitate: præterea circa gustū asperitate &
lenitate: ad hæc tenacitate & abstergerendi poten-
tia. Tenax enim & viscosus est Samius aster, cum
& Lemnia sphragis eiusmodi paululū quiddam
habeat. Absterforiā quoq; facultatē moderatam
obtinent & Selinusia terra, & Chia: quamobrē
mulieres quēdā iis ad faciē utuntur. Porro quic-
quid abstergit leviter, producendæ ulcerū carni
est idoneū. Quod si etiā siccet, cicatrici inducen-
dę est habile. At omniū aptissima sunt & ad ulce-
ra quæ in summa cute consistunt, & ad ambusta,
illā quæ citra morsum exiccāt, nec manifestō ex-
calfaciūt, nec refrigerant. Quocirca terra Selinu-
sia & Chia, pulcherrima sunt ad ambusta ulce-
rū remedia. Jam verō Cimolia terra cum mistæ
sit facultatis, partim sanē refrigerat, partim levi-
ter digerit, operaturq; pro natura illorum qbus
miscet. Verū unice ambustis cōvenit, veluti & a-
liæ omnes, illitæ ex aceto, aut oxycrato: nimirū
bullas existere prohibentes. Advertendum tamē
est, corpora mollia valentem medicaminū vim
haud posse perferre: dura verō posse. Terra itaq;
misionis expers, vim habet citra morsum siccā-
di. Cum aut nullū reperire sit corpus à misione
alienum, inspiciendum est, qualem nam miscel-
lam ipsa terra fortiat. Si qua ergo in ea astrictio
sentiatur, tantū frigiditatis assumpsit, quantū ha-
bet astrictionis. Sin acrimonia, tantum scito illi
inesse caliditatis, quantum & acrimoniæ. Simi-
liter, quantō levior terra ipsa fuerit, tantō acrior
existit. Quātō gravior, tantō etiam syncerior ter-
ra. At p̄prium terræ est, quod igni admota non
solvitur, aut liquecit: id quod accidit plumbo,
stanno, auro, & argēto. Cum igitur audis nomi-
nare terram argenteam, aut auream, minimē in-
telligas ipsum argentum, aut aurum p̄ totum ter-
rę corpus misceri: sed particulas qualdā exiguas
tū auri, tū argenti, illi conjunctas, atq; conti-
guas existere: easque ab igne in fornacibus fusas
coire invicē. Eundem in modum quæ vitrum cō-
tinet terra, arenosa est. Sed & auri quoq; glebulæ
exiguæ frequenter nō parvo numero in quibus-

dam reperiuntur arenis. Terrarum autē id genus
omniū quæ in metallis sunt, ubi ab eis separatur
id metalli aut æris quod continent, reliquæ vi-
dentur lapideæ: nec macerari, rigari, aut hu-
mectari per totam substantiā possunt: ut medica-
minosa illa, quæ cum aqua in lutum degenerat:
quæq; viti circūlita nascentes in ea vermes inte-
rimit, unde Ampelites vocatur. Cadmia etenim
ex illarū lapidearū est genere, neq; rigari potest.
Terra Cretica admodum imbecilla est, multū ha-
bens substantiæ aëreæ. Inest tamē ei quædam ci-
tra morsum vis extergendi. Eretrienfis, q̄ Lem-
nia, valentiorē possidet astrictionē, hæcenus ta-
men ut nondū mordicet. Expedit verō hanc ter-
ram bis terq; lavare, ut Cimoliam, quo modera-
tior reddatur. Eam etiam urunt, ut subtiliorem,
acriorem, & magis digerentē efficiant. Quod si
posteaquā cōbusta fuerit, abluatur, replendis &
cicatrice inducēdis ulceribus multō magis opi-
tatur. Cæterū quæ colore cineritio est, illi quæ
alba existit, præfert. Est & alia terra dicta Pigni-
tes, tota quidem facultate terræ Cimoliæ assimi-
lis, cæterū atra colore, quemadmodū Ampelites.
At terra, sive lapis, sive bolus Armenus, colore
est pallido, promptissimeq; solvit in lavorē om-
nino æqualem, ut calx, validamq; desiccandi vim
possidet. Siquidem ad dysenterias, ventris pro-
fluvia, sanguinis expuitiones, catarrhos, & pu-
trescentia oris ulcera, in primis cōpetit. Quin &
illos magnificē juvat, quibus ex capite in thora-
cem fluxio decumbit. Quare & iis quibus ex tali
occasione anhelitus difficilis est, valdē auxiliat.
Sed & eos qui tabe laborant, adjuvat: ulcus enim
ipso desiccatur. Maximē etiā cōfert Armenus bo-
lus contra pestilentes affectus. Ii siquidem usu
ejus nō persanantur, qui prorsus immedicabiles
sunt. Cæterū bibitur ex vino albo, cōsistentia te-
nui, modicē diluto, si is qui morbo est correptus
aut planē febre careat, aut leviter ea teneatur. Sin
gravius febriat, admodum aqueo. Non sunt ta-
men calore vehementes febres pestilenciales.

¶ De lapidibus.

Ex corporibus sponte natis sunt lapides, hoc
diversi à vulgo nuncupata terra, quod rigari non
sustinent. Vires habent partim secundum totius
substantiæ proprietatē, partim secundum qualita-
tes effectrices. Nunc autē sermo nobis esto de il-
lis viribus, quæ secundū effectrices agunt quali-
tates: in quib. sanē est & utendi ratio & metho-
dus. Nam facultates quæ p̄prietatis totius sub-
stantiæ ratione insunt, à methodo sunt atque ra-
tione alienæ, & per solam experientiam noscun-
tur. Nam cur hic lapis tacto vulnere unde san-
guis prorumpit, cursum ejus reprimat, haud no-
vimus. At cur hæmatites lapis in oculares facul-
tates indatur, novimus: quod sit rationis inven-
tum. Nam si in cote oculari cum aqua eum te-
ras, donec accipiat crassitudinē mellis, astringē-
tem facultatem percipies. At didicisti, quod gli-
scentes etiamnum phlegmonas restringentibus
medicamentis repercutere oporteat: ubi autem
jam sanguis nō fluit, astringentibus medicamē-
tis digerentia adjungere, & sensim ad ipsa sola
transire. Itaq; de iis lapidibus prius disseram, qui
mortarii aut cotis attritu, in liquorem solvuntur.

Ampelites
terra
Cadmia.
Cretica.

Eretrienfis
terra.

Pignites.

Boli Armeni
descriptio.

Febres pesti-
lentes non es-
se vehementer
calidas.

Facultates
quæ proprie-
tatis ratione
insunt, esse à
methodo alie-
nis.

Hæmatites
lapis commo-
dè ocularib;
medicamen-
tis miscetur.

Phlegmonarum genera-
lis curatio.

¶ Ciferis, Pumex.

Ciferis.
Pumex.
Smiris.

Pumex quidem abstergit. Sed Smiris acrimonia quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facultatibus additur, eisq; quæ curant gingivas laxas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior Smire, eosdem ad usus.

¶ Lapidēs qui in spongīs reperiuntur.

Spongiarum
lapides.

Frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapides in vesica comminuant. Rumpunt eos tamen qui coguntur in renibus: veluti qui advehuntur ex Cappadocia.

¶ Ostracites.

Ostracites.
Geodes.

Hunc lapidem ajūt desiccandi valenter facultatem habere, temperatā ex astrictione, acrimoniaq;: ut Geodem expurgare pupillas, uberumq; & testiu sanare phlegmonas, inunctum ex aqua.

Cotis Naxia
rumentum.

At cotis Naxia ramentum virginibus mammas prohibet tumescere: sicuti & testes puerorum: tanquam facultatis refrigeratoriæ sit particeps.

¶ Ophites.

Ophites.

Extergēdi confringēdiq; vim possidet, ceu etiā vitru. Admodū enim ipsum ex vino albo ac tenui epotū lapides vesicæ conterit, atq; cōfringit.

¶ Jaspis viridis.

Jaspis viridis

Ventriculū adhæsi, ipsiusq; os adjuvat. Porro Ophitem lapidē suspensum, juvare morsos à vipera tradit. Sed ejusmodi facultates nō constant methodo. Veluti etiā cum Hieracites & Indicus profluentē ex hæmorrhoidib. sanguinē sistunt.

Hieracites.
Indus lapis.

¶ Sapphirus.

Sapphirus.

Ictos à scorpione juvare creditur.

¶ Aphroselinus.

Aphroselinus

Liberat comitali morbo vexatos: id quod nondum sumus experti.

¶ Dioscoridis Thyites.

Thyites.

Subviridis est ut Jaspis, solviturq; in succū color quidem lacteum, gustu verò acrem: ac proinde nemo illum oculorum miscet medicamentis, nec fluxiones reperiuntibus, nec ulcera sanantibus. Sed eò tantum utuntur ad purgandum & abstergendum, quæ pupillam absq; phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

¶ Judaicus.

Judaicus lapis.

Colore est candido, specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. Utuntur ad vesicæ lapides in cote solventes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Præcipue verò ad eos qui in renibus hærent, est efficax.

¶ Pyrites.

Pyrites

Validam possidet facultatē, eoq; utimur digerenti emplastro admisto. Adjicitur etiā ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sæpenumero, & consistentia grumosa in spaciis intermediis musculorum nata, per halitum sunt digesta. Nisi autem dum in usum veniunt, pollinis instar cōtinuantur hi omnes lapides, ut profundū corporum quibus applicantur subeant, assimiles manent istis marinis fluviatilibusque arenis: quæ & ipsæ cōmunem omniū lapidum vim possident. Siquidem exiccant tumentum ab aqua inter cutem carnē, si in ipsis excafactis decumbat æger. Non tamen ad aliud quippiam eis utimur.

Arenæ quomodo exiccet tumentum ab aqua inter cutem carnem

Phrygius lapis.

¶ Phrygius.

Hoc semper utor combusto quidem ad ulcera

putrida, idq; ipso aut per se, aut ex aceto, aut ænomelite, aut oxycrato. Ad oculos verò ex eo permisto aliis, medicamē siccū efficio. Validè .n. desiccet, habēs quiddā astrictiōis simul & mor-dicationis.

¶ Ageratus.

Astringit simul & digerit. Atq; astrictiōe quidē evidēter juvat phlegmone columellas gravatas.

¶ Asius.

Colore & consistentia est ropho similis, friabilis, laxusq;. Innascitur ei quiddam instar farina tenuissimæ, qualis in molarum parietibus adhærescit. Appellant hoc medicamen petræ Asiæ florem. Est verò & tenuium partium, ut sine mor-su nimis fluidas carnes eliquet. At petra ipsa in qua nascitur, actionis vehementia est inferior. Habet etiam & falsedinē quandam ipse Asiæ petræ flos, ita ut inde videatur ducere originem: quod ros ex mari in petram residens, à sole postea exiccetur.

Asius

Petra
flos.

¶ Gagates.

Colore est atro, qui ubi igni fuerit admotus, persimilem bitumini odorē exhibet. Confert autem ad discutiendos flatulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq; & ægrè curabiles: ac præterea cruēta vulnera glutinat. Est & lapis Thracius, cujus in hūc modū Nicæder meminit: pu.

Si lapis uratur candenti Thracius igne, & post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem Mox oleo affuso penitus restinguitur. &c.

Nullus tamen ejus in medicina usus, nisi quod suffitu abigit feras.

¶ Magnitis, Heraclia, Magnes.

Assimilem hæmatiti vim obtinet.

Magnitis
Magnes.

¶ Arabius.

Lapis est elephantho similis, desiccatis abstergentiq; potentia.

Arabius
pis.

¶ Alabastrites.

Combustus in medicinae usum ingreditur. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

¶ Smiris.

Vehementer quidem abstergit: quare ipso ad annulos exculpandos utuntur, & ad dentes purificandos.

¶ Hematites, Galactites, & Melitites.

Hæmatites & Galactites lapides, à colorū similitudine, quos representant, sic nominantur. Galactites Ille siquidem sanguini, hic in succum solutus, lacti videtur similis. At Melitites, nō à colore, sed à sapore mellis talem nomenclaturam sortitur.

Hæmatites
Galactites

Melitites

Cum igitur succus omnis dulcis à temperato calore proficiatur, astringens verò à frigore, hæbet sanè hæmatites lapis tantum frigiditatis, quantum & astrictiōis: Melitites verò temperatā caliditatem: at mediam utriusq; temperiem Galactites. Merito itaq; ocularibus medicamentis lapis hæmatites miscetur. Ac solo eo uti possis superciliis exasperatis: si quidem cum phlegmone sint aspera reddita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis, etiam per decoctū scæniagræci. Sin verò citra phlegmonem, ex aqua. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis expuitioni conducit, ulceribusq; universis. Porro siccus, redactusq; in tenuissimū pollinē, reprimat excrescentia: ipsaq; oculorū ulcera solus per se cicatrice includit attritus, cæterū aut affusus, aut inunctus.

Dulcis succus omnis calore proficitur, ut adstringens a frigore.

¶ Schistos.

§ Schistos.

Hæmatiti per similem vim obtinet, sed infirmiorē Schistos: ac post eum Galactites. At Melitites non nihil caliditatis ascrivit. Ut igitur unusquisque leviter ac sensim ab hæmatitis facultate recedit, ita in usum oculorum accommodatur: est tamē mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictis semper gratiora sunt. Quæ quidem, liberis jam à phlegmone partibus, infirmiora sunt, quæ ut per sanare valeant. Porro cum lapidibus omnibus communæ sit ut desiccant, quotquot ex ijs in succū soluti, aut redacti in pollinē, nullam cōtinuō qualitatem in gustū obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos, tum mitissimos, tum minimè mordaces. At qui manifestā qualitatem exprimūt, ij pro qualitatis ratione potentiā possident. Ac si quidem astringant, ad cōprimendū, constringendū, spissandum, & contrahendū: si verò mordicent, ad excalfaciendum, digerendū, & colliquandū. Medij eorum sunt, qui abstergent, citra mordicationem. Igitur Hæmatites, Schistos, Galactites, & Melitites, in succum vertuntur. Quæ sunt & alii in succum solubiles, ut Moroxus qui in Aegypto nascitur, omnium dictorum minimè qualitatis pariceps. Quare tantū desiccandi vim possidet.

§ Metallica medicamenta.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis cōsistit, sive spontanea, sive per fornacē facta. Ut igitur lapidibus universis, & terræ medicaminosæ cōmune est ut siccet, ita metallicis quoque medicamentis omnibus. Est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris terræ significatū. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nonnunquam etiā aere, substantiā uniente, tēperanteque, ac postea desiccante, metallicorum medicamentorum cōsistentiæ proveniūt. Quemadmodū igitur in differentiis terræ, plurima essentia terræ elementaris habet: paulum verò aeris, ita in metallicis multū igneæ substantiæ est immistū. In medio autē eorum sunt lapides. Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum exiccant. At locorum, in quibus hæc proveniunt, natura, pro ut plus minusque est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatque.

§ Hales, Sales.

Sal partim ex mari fit in salinis, partim ē terræ offoditur. Cæterū utriusque vis est assimilis, impense videlicet exiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergēs: salis verò, tantò in abstergendo inferior, quantò in astringitione superior. In utriusque medio sapor nitri consistit.

§ Armeniacum.

Vim habet extergentē cum levicula tū acrimonia, tum astringitione. Unde meritò miscetur ocularibus facultatibus. Præterea ipso per se redactō in pollinē, atque sicco, utuntur ad pilorum in superciliis incrementum: ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutricantur.

§ Arrhenicum, Auripigmentum.

Facultatis est causticæ, tam combustū, quā ustionis expers. Cæterum per ustionem tenuiorū partium efficitur. Utuntur porro ipso ad denudan-

dam pilis quamvis particulam. Verum si diutius hæreat, ne cuti quidem pareat.

§ Aphronitrum.

Aphronitrum ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentū exiccatoriū existit, aspectu triticeæ farinæ similis. Etenim alba est, non ut Asiæ petreæ flos cinericea. Aphronitrum verò farinæ speciem non habet, neque solutum est, sed cōcretum & congelatum. Quod quidem adeo extergit, ut non modò sordes expurget, sed etiam pruritum sinet. At spuma nitri, ejusdem cum nitro est tum naturæ, tum facultatis: licet essentia tenuioris. Dictum autem est paulò antè, in medio aphronitri & salis, facultatem nitri consistere. Aphronitro enim sola inest vis detergendi: sali verò etiā astringendi, sed multò magis quam detergendi.

§ Gypsum.

Gypsum quidem tum desiccatur, tum vires habet emblasticas. Quare siccis medicamentis quæ ad sanguinis eruptiones accommodantur, utiliter cōmiscetur. Nam ipsum per sese lapidosum fit, coactum, & congelatum. Ac proinde diluendum est ovi tenui & cādida albugine, quæ & ad ophthalmias est utilis, admisto illi tenuissimo farinæ triticeæ polline, qui residet in molarū parietibus. Excipere verò quod sic maceratū est, tenellis leporis pilis, aut qui perinde sint molles, expedit.

§ Gypsum ustum.

Nō habet æquē emplasticā vim, cæterū tenuiorum est partiū, & valentius desiccatur. Quin & repperussoriū est, maxime si maceretur oxycrato.

§ Diphryges.

Mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in sese quiddā & mediocriter astringens, & mediocriter acre: unde ulcerū rebellium optimū medicamen est. Eo siquidē ad putrescentia oris ulcera, sive per se, sive cū melle, cū detracta erat spuma, tum ad anginā, ubi jam per astringentia medicamēta cōstitit quæ influebat, ac breviter ad columellam præcisam, pudendi, & ani ulcera cicatrice obducenda, sum quæ felicissimè utilis. Porro quo pacto adulterentur dictorum medicamentorum lingula, non videtur precium operæ scribere, cū talia posse discere homines sceleratissimi in lucro ponant.

§ Theion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi vim possidet, estque temperamenti calidi, atque essentia tenuis, adeo ut ad multa venatorum animalium resistat, si siccum ictui inspergatur, aut cum saliva, aut urina, aut oleo veteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanavi. Extergit enim omnes id genus affectus, absque hoc ut in profundum repellat.

§ Ios, Arugo.

Gustantibus acrem exhibet qualitatem, digerens, detrahens, & liquans non teneram modò, sed & duram carnē. Hallucinantur igitur qui talia medicamēta, epulotica appellant, hoc est, quæ cicatricem inducāt: cū nimirum epulotica phar-maca contrahant, constipent, & in calli morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum ulcera. Quod si paululum eius cerato non paucò admisceas, id quod

ex ambobus mistum est, citra morsum extergit.

¶ *Cadmia.*

Cadmia.

Cadmia fit, ubi in fornacibus æs paratur: nempe tota terra, aut lapide ex quo æs gignitur, in sublimem partem fornacis egerente, veluti fuliginem aut favillam quandam. In argenteis etiam metallis simili secretionem efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Cæterum absq; fornace in Cypro cadmia invenitur, quæ jure quispiam lapidem vocet. At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam placitin Medici nuncupant. Botryitin quidem, * quæ in editioribus ipsius fornacis muris colligitur. Placitin verò, quæ in humilioribus. Ac liquet sanè botryitin partium esse tenuiorum, crassiorum verò placitin: utranq; autem vi desiccandi, ac mediocriter digerendi præditam. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qualitatis necessario etiam aliquid habet. Merito itaq; eam abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum desiccans, tum 20 extergens absq; mordicatione: utile ad cava ulcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in toto corpore habentur. Igitur respicientes ad temperatam & mediam inter omnes excessus naturam, leniter desiccatoriam absterforiamq; cadmiæ inesse facultatem dicimus. In caliditatis autem & frigiditatis differentia, cadmia quodammodo temperata existit.

¶ *Cinnabari.*

Cinnabari.

Modicè acrem facultatē obtinet. Habet verò 30 & astringentis quippiam.

¶ *Ciseris, Pumex.*

Ciseris.

Pumex.
Exusta omnia reddi substantia tenuioris.

In sarcotica medicamenta inditur, & ea quæ dentes extergunt, partem ustiorem non expertus, partim etiā exustus: quandoquidē aliis omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterum ustione quiddam acquirit acrimoniæ, quam rursus lotionem exuit. Videri autē poterit, & conciliare splendorem, non tantum facultate, sed etiam asperitate, veluti si smirnam, aut 40 testam tritam admoveas. Eundem in modum cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Conia.
Lixivium.
Cinis.

¶ *Conia, Lixivium ex cinere.*

Abluto cinere fit. Cinerem autem, ustorum corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixivium pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidem qui acrimoniā igneam habet acerrimā, ipsum quoq; acerrimū est: eius quod tale nō est, etiam moderatius. Quare & putrefacientibus medicamentis miscetur, utpote causticā facultate 50 possidens: sed propter substantiæ suæ tenuitatem, citra dolorem adurens.

¶ *Cyanos, Ceruleus.*

Cyanos.
Ceruleus lapis.

Acrem possidet facultatem, ac tum detrahendi, tum digerendi, q̃ cinnabari, potentiorē. Inest quoq; ei nonnulla astrictio.

¶ *Lapis, Squama æris, & ferri.*

Lapis.
Squama.

Helitis.

Squama, alia est æris, medicamen multo utilissimum: alia ferri, & stomomatis: alia deniq; quæ nonnulli vocant helitin. Atq; omnes sanè vehementer siccant. Cæterum helites principē in desiccando locum obtinet: nam subtilissimæ omnium substantiæ est, nimirum quæ æruginis nonnihil assumpserit. Majorem obtinet astrictionē squama ferri, & hac etiam majorē stomomatis. Quæ-

obrē ad contumacia ulcera meliores sunt quam squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam valentius helitis. Omnes autem squamæ nō instrenuē mordaces sunt. Quare essentia ipsarum nō est admodum tenuis. Siquidem inter ea quæ parem vim possident, minus est mordax quod est tenuius.

¶ *Lithargyros.*

Desiccet quidē, sed omnium moderatissimè: 10 & secundū alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamen astringendi, abstergēdiq; facultas ei inest. Cæterum ad intertrigines femorum utilis medela est. Jure itaq; medi ordinis in metallicis habebit. Proinde frequenter utimur lithargyro ceu aliorum materia: sicuti in liquefcentibus ad pleraq; medicamenta, adhibemus ceram, tanquam materiam 20 mediā eorum quæ valentem possident facultatē.

¶ *Nitrum.*

Inter aphronitrum & salem vires medias sortit. 30

Cæterum ustum propius ad aphronitrum accedit, utpote ex ustione tenuius redditum. Desiccet itaq; & digerit: q̃ si intra corpus sumat, secet & extenuat crassos & lentos succos, multo potentius q̃ sal. Aphronitrum verò, nisi gravis urgeat necessitas, devorandum nō est, nimirum inimicum stomacho: quandoquidē plus etiā nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro usto simul & nō usto, & multo etiā magis eius spuma, uti consuevi-

Aphronitrum inimicum stomacho.

¶ *Melanteria.*

Valdè quidem astringit, astringentiaq; omnia 40 propemodum tenuitate superat.

¶ *Melan graphicū Atramentū scriptorium.*

Admodum & ipsum desiccet aqua solutum. Ul 50 cera autē igni ambusta protinus illitum juvat: & si acetum quoq; habeat, multo magis.

Melanteria.

Atramentū scriptorium.

¶ *Misy.*

In metallis ipsis, super chalcitum nascitur misy, ut ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tempore mutationem in chalcitum posse accipere. Quare mirum non est, tria hæc medicamina ejusdē genere facultatis esse, fori dico, & chalcitum, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diversa. Crassissimū enim est inter ipsa fori, tenuissimū misy: mediam utriusq; facultatem habet chalcitis. Adurūt universa hæc tria, & escharas efficiunt. Attamen nonnihil etiam astringūt. Cæterum misy ad motum corporibus duris, minus chalcitide mordicat, tamen si ea nō minus sit calidum: id quod beneficio tenuitatis sortitur. Porro cum utraq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis q̃ misy, fori tamē nō liquefit: nimirum quod lapidosius sit & vehementius compactum: sicuti rursus misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde siccus chalcitide, idcirco merito quoq; liquefit agrius.

Misy.
Ærugo.
Sori.
Chalcitis.

¶ *Molybdæna, Plumbago.*

Simile lithargyro vim possidet, tantum à media 60 tēperie ad frigidius paulum quid recedēs. Sed neq; abstergentis facultatis est particeps. Utrūq; autē medicamentum liquari potest, celerrimeq; ubi oleo nonnihil aceti est additum. Liquatur tamē etiā admista aqua, sed coctione longissima. Vidi equidē molybdænā projectā plurimū cum multis aliis lapidibus, in ea via q̃ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molybdæna.
Plumbago.

¶ *Molybdos.*

Mordacia minus esse qua sunt tenuiora, si partem facultatem obtineat.

¶ *Molybdos, Plumbum.*

lybdoi. Facultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modo multa habet substantiam humidam à frigore cōgelatam, sed & aerream: paucam autē terrēam. Igitur quod plurimum habeat essentia humidæ coacta à frigore, indicium tibi esto, quod ubi ad motum est igni, celeriter funditur fluitq;. Quod vero & aeræ sit particeps, hoc habeto signum. *mbū uni* Omniū quæ novimus, unicū plumbū tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in adibus subterraneis, aerem habentibus turbidum, ita ut quæcūq; illic ponantur, celeriter sitū contrahant. Jam verò si in mortario plumbeo liquorem quemlibet plumbeo pistillo contriveris, ita ut ex pistillo ipso, atq; etiā mortario exprimatur etiam aliquis succus, id quod ex utroq; conflabitur, multo erit frigidius, q̄ liquor infusus fuerat. *a mole & dere au.* Caterū si vis magis refrigeratoriū medicamen efficere, oleum omphacinū, aut rosaceū, aut melinum, aut myrtinum, sit liquor is, quem infundes; eritq; remedium optimū ad sedis phlegmonas cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, testibus, uberibusq; consistunt: similiter adversus cæteras omnes fluxiones, quæ articulis accidunt. Sed & ulceribus rebellibus etiā utile est. Nam ad cancos eo utens, virtutem medicamenti miraberis. Quod si celeriter multū succi plūbei velis colligere, conare in sole terere, aut quocūq; certè modo aere excafacto. Multo autem vilissimum habebis medicamentum, si affuso refrigerantium succorū aliquo teras, ut sempervi, cotyledonis, intybi, lactucæ condriles, psyllii, omphacis, portulacæ. In laminam etiā ductū plumbum, lumbisq; admotū, pollutionē per insomnia coerces, nimirū haud obscure refrigeras. Sed & bractea tenuis probè ganglio illigata, ipsum dissipat. Illigabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam noxā potius firmandū, quā hinc vel inde. Porro plumbū ustum, ac dein ablutum, refrigerat, confertq; ad implenda ulcera, eademq; cicatrice obducenda. *mbū uni* Convenit & chironiis dictis, & omnibus cancriosis ulceribus. Ante lotionē autem, ulceribus pertinacibus etiam auxilio est.

¶ *Ostræon, Testa.*

acon. Desiccandi, ostergendiq; vim possidet, maxime quæ ex fornacibus est. Ex qua quidem præparata emplastrum, optimè cicatricem inducit.

¶ *Pompholyx, Spodium.*

pholyx. Pompholyx fit & in æris fornace, veluti & cadmia: fitq; & dum in fornacib. cadmia utitur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum fornacis quadam favilla ascendente, quæ dum colligitur est pompholyx. Nam quod reflectens in pavimentum recidit, nominatur spodium. Cui videtur similem habere facultatem, quod antispodium appellat. At ego illo usus sum nunquā, cū largè mihi semper pōpholyx suppeteret. Nec enim quisquam ubi hæc adsit, spodio uti velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentū propè omnium quæ citra moriū desiccant, si elota fuerit, præstantissimū. Quamobrem ad ulcera cancrota idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyriis quæ ad oculorum imponūt fluxiones, quæq; bullas in eis natas cu-

rant. Præterea ad pudendorū & sedis ulcera optimū est remedium.

¶ *Sandarache.*

Urentis est facultatis, ut arsenicū. Merito itaq; *Sandarache* digerentibus facultatibus & exergentibus cōmiscetur.

¶ *Sandyx.*

Quia sit facultate prædita, in sermone de psim *Sandyx* mythio explicabitur.

¶ *Scoria.*

Scoria. Scoria omnis resiccatoriū est medicamen, potissimū autem ferri. Siquidem ad lavorem redigens ipsam in aceto quæcerrimo, posteaq; decoquens, ad aures jampridem fluētes pure, ea utor pro medicamento maxime exiccatorio.

¶ *Stimmi.*

Cum facultate desiccatoria habet astringentiē *Stimmi* adjunctam. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

¶ *Stryteria schiste, & strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum & humidum.*

Stryteria. Alumen vehementissimè astringit, Caterū cum sit crassarum partium tenuius quodammodo est quod vocatur fissile. Proximum est rotundum, & astragalotum. Admodum crassum est tum liquidum, tum placites & plinthites dictum.

¶ *Titanos, Calx.*

Titanos. Viva quidē vehementer urit, adeo ut crustas efficiat: extincta verò protinus etiā crustam molitur & ipsa: at post diem unum & alterū minus urit, minusq; inducere crustam potest. At verò temporis progressu prorsum nec crustā quidem gignere valet tametsi etiamnum calfacit, carnemq; liquet. Porro si lavetur in aqua, suā mordacitatem exuit, efficitq; nuncupatum lixivium. At ipsa absq; morsu desiccatur.

¶ *Hydrargyros, Argentum vivum.*

Hydrargyros. Non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quæ parantur: veluti psimmythiū, ærugo, psoricum, lithargyros. Caterū interimātne devoratu aut admotum extrinsecus, nōdum feci periculum.

¶ *Phycos.*

Facultatem eius, ubi de psimmythio agetur, *Phycos* exponam.

¶ *Chalcanthos, Atramentum sutorium.*

Chalcanthos. Chalcanthos, qui in Cypro ex viridi quadā aqua concrevit, extima sui parte in chalcitum temporis processu degenerat. Habet autem cum astringentiē maxima, caliditatem non vulgarem conjunctam. Unde omniū maxime condire servareq; carnes humiditas potest: nimirum caliditate humiditatem absumentes, astringentiēq; substantiam contrahens, atque constipans. Constringit itaque, siccatur & contrahit in sese totius substantiam carnis.

¶ *Chalcitis.*

Chalcitis. Mistas habet astringentem acremq; facultates. Caterū vincit acris, utpote adeo vehemens, ut carnem urat, necnō inducat escharam. Ustum hoc medicamen minus mordicat, nō tamen minus desiccatur. Verum non parum astringentiē remittit. Itaq; melior est undequaq; chalcitis tum adusta, tum lota, cum evadat sic minus mordax.

¶ *Chal-*

Chalcos cecavmenos.
Aes ustum.

¶ *Chalcos cecavmenos, Aes ustum.*

Habet & acrimoniam quandam, sed & astringentis est particeps. Proinde si lavetur, pulcherrimum est medicamen cicatrici inducendæ.

Chalcu anthos.
Flos aris.

¶ *Chalcu anthos, Flos aris.*

Tenuioris essentia est quæ aut æs ustum, aut squama. Quare ex eo factis collyriis extergunt, auferuntque superciliorum magnas asperitates.

Chrysocolle.

¶ *Chrysocolle.*

Carnem liquat, non tamen valenter mordicat: quanquam sit facultate admodum digerente exiccanteque. Preparare autem hanc chrysocolle debes tempore æstivo, aut aere prorsus calido: urinam pueri, mortario & pistillo, utroque ex rubro ære, contudens. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus cõtumacibus, tum per se, tum aliis mistum. Nam quãtò plus quæ chrysocolle metallica deficcet citra morsum, tãtò etiam ipsam excellit tenuitate.

Psimmythium.

¶ *Psimmythium, Cerussa.*

Si ex acri aceto solvatur, gultu tamen neque acere erit, neque mordax, sed emplasticum, & refrigeratorium. Cerussa adusta, in sandyca transit, medicamentum seipso tenuius, non tamen excalfaciens. Phycos autem servata cerussæ frigiditate, tenuitatem assumpsit.

Cerussa.
Sandyx.
Phycos.

Pforicum.

¶ *Pforicum.*

Cõficitur dupla chalcite admista lithargyro: antè tamè utrisque acerrimo aceto solutis, sicque in ollam novam coniectis, quam fimo æstate media diebus quadraginta obrutam sepelies. Hoc medicamen magis deficcatorium est, minusque chalcite mordax, cum partibus sit tenuioribus.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, liber X.

EXposuimus igitur quinque commentariis prioribus, qualitates quas secundas appellant, in medicamentis quæ effectricibus qualitatibus agunt, pro earundem effectricium specificarumque qualitatum mistura nasci. Ostensum præterea est, quo pacto universalis facultas unica experiëntia inveniatur: neque ea vulgari, sed quæ certis adhibeatur limitationibus. Porro in sexto, septimo, & octavo libro, materiã quæ ad plantas pertinet, explicavimus: in nono autem, eam quæ circa terrena & lapidosa versatur. Reliquum verò nunc est, ut eam quæ ab animalibus sumitur, in hoc decimo persequamur materiã. Nam ad finem undecimi agemus de iis, quæ provenientia in aqua, nec plantæ, nec terra, nec lapis, nec animalia sunt.

Hama.
Sanguis nulus est frigidus.

¶ *Hama, Sanguis.*

Pro natura animalium variat. Huic siquidè animalis est liquidior, siccior illi, calidior alteri. Nullus autem sanguis est frigidus.

Sanguis suillus.
lus, temperie est humano persimilis.

¶ *Sanguis suillus.*

Humidus & minus calidus est, temperie humano persimilis. Siquidem & carnes suum similes humanis existunt. Unde quidam ab hospitibus pravis appositas, avidissime humanas carnes ederunt. Etenim ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio ipsis carnibus constat. Itaque quisquis humanum sanguinem morbo alicui utile esse ait, in suillo primum id

comprobet. Nam etsi aliquatenus inferior is sit humano, saltem assimile quippiam efficiet: quo cognito, ab humano plenior fore utilitatè sperabimus. Porro similia efficere posse similia, experti sumus. Nam colubæ sanguinè, qui capitis ossa cõfracta perforant, in crassum cerebri involucrum effundere assolent. Quidam autè, cum non esset columba ad manum, palumbi sanguine usus, feliciterque successit. Alius turturem eundem ad usum applicans, nihil hominè læsit. Similibus siquidem ad eosdem affectus utimur, ubi quæ antea experti sumus non adsunt.

¶ *Hemaperisteras, Sanguis columba.*

Eo ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam utitur, venis ad alarum exortum incissi, quod sanguis calidus effluat, ut sic ad multos usus idè perduret animal. Alij pullorum tenerorum extractas penas, quæ humore redudant, in ipsum oculum exprimunt. Quam sunt nobis collyria varia hyposphagmatis oculorum aptissima, cuiusmodi est quod plurimum recipit myrrhæ, & quod multum thuris admittit: necnon quæ ex croco conflatur. Quin & fœnigræci succus sanguini columbino in hoc utique præstat. Præterea sexcentos noviorum quibus Romæ perforata fuere capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei, citra sanguinè columbinum, offensos. Quare id calidum sit æquè atque colubæ sanguis, necesse est. Cæterum præter moderationem caloris (cujus fortè cõtactu juvat) leviter etiã astringit. Itaque melius invenire nihil possis in capite pforato, quam ut probo rosaceo utaris.

¶ *Hemanycteridos, Sanguis vespertilionis.*

Si ubi hoc sanguine axillas illeveris, postea chalcanthon aut cicutæ semen inspergas, Xenocrates quidem ait, aut sub illis prorsum pilos non prodituros, aut certè lanuginosos. Alij verò & puerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, ut glabras illas partes cõservent. Ergo ex refrigeratione partis vehementi, ejusmodi quippiam posse cõtingere, non est à ratione alienum. Non tamen adeo frigida facultatis est sanguis vespertilionis, cum in totum nullus sanguis sit frigidus. Porro hæc dinum sanguinè fervefactum cum pari aceti portione, hæmaptoicos juvare prodidit etiã Xenocrates. Quod remedium tutò experiri poteris, ubi nullum aliorum ad manum suppetet.

Sanguis viridium ranarum.

Cum assereret quidam, illitum hunc prohibitorum quo minus evulsi semel palpebrarum renascerentur pili, falsum esse id experimento didici.

¶ *Gala, Lac.*

Perfectissimum lac, nempe quod ad omni aliena qualitate est immune, (hoc est, odoris expers, aut exiguum bonum odorem referens, præterea gustu suave, pauculam habens dulcedinè: sicuti & saluberrimus sanguis, ex quo & lacti generatio constat) ad acres & mordaces fluxiones est commodissimum, non abluens modò eas ratione seri ab afflictis particulis, sed etiã ob pinguitudinem corpora illinens, ut non in nuda cadat, quod defluit. Porro cum lac omnium alteretur facillimè, præsertim si ambiens fuerit calidus, multum à dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberibus effuso ipso calido utatur. Maxime igitur mulieris bene habitæ & bonæ victus ratione servantis, lacte

Columbinus sanguine infunditur cranij foras.

Sanguis columbinus hyposphagmatis cõfervitur.

Hyposphagmatis cõfervitur.

Rosacei modo in di per cõfracturæ sequi non nius calidus sanguinis columbinus.

Sanguis vespertilionis.

Sanguis in totum est frigidus.

Sanguis viridium ranarum.

Gala. Lactis opus nota.

Lactis usus.

Lac alteratur omnium facillimè.

Lac mulieris est bonum familiæ.

lacte utendum: nam id humano corpori est longè familiarissimū. Deinde aliorū animalū, quæ quidē ab humana natura nō lōgissimē absunt: id quod scies ex carniū odore. Nam fastidiosus est eorū quæ multū diversam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyenæ, ursi, & similiū. Non injucundus est eorum quæ nō porrō absunt, ut suis, capræ, equæ, bovis, ovis, & asinæ. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ovillo, bubulo, asininoq; lacte utuntur, & caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id planè tenue est, et plenū humoris serosi, veluti bubulū crassum: cæterum cōsistentia medium caprillū est. At sus crudum aqueumq; lac obtinet. Jam vero lac omne ex tribus constat essentis, caseosa, serosa, & pingui. Hæc plurimam habere conspicitur bubulū, ex quo butyrū cōficitur, facultatis cōcoquentis & relaxantis. Quare maximē illo utūtur ad parotidas & bubonas.

¶ Serum lactis.

At serum extergendi potentiā possidet, adhibeturq; subducendi ventris gratia, ac per clysteres injicitur, extergens & abluens sine mordacitate acrimoniam intestinorū. Præterea si quis ulcera quæ sanie infestantur acri, vice aquæ sero colluat, optimē sanē fecerit. Quæcunq; etiā medicamēta digerere solēt ecchymomata, & atra, ea præstat sero quā aqua diluere. At quod lacti caseosum inest, illitū adhæret magis: ob idq; acrimoniam retūdit. Atq; ubi aliam quampiam deficcantem facultatem habuerit adjunctam, optimum est dysentericiæ remediū, & omniū ventris acrium fluxionū. Eam autē accipit à lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui prædecocto lacti injiciuntur igniti. Ferrum siquidem astringentis facultatis etiam est particeps. Porrō lac totū ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorū quopiam, est utile: præterea ad hypopia & hyposphagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborat, somno sese dabūt, impositū simul cum rosaceo & ovo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & utero exulcerato. Sic eo & ad sedis & pudendorū ulcera utimur, & ad omnia breviter, quæ leniri postulant. Ea propter & cancrōsis applicatur ulcerib. medicamētis anodynis commistum, qualia sunt quæ constant ex pompholyge. Collutū etiam, oris phlegmonas mitigat: necnon tōsillas, columellam, antiadas phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam lenit. Est itaq; medicamen leniens, totā quidem substantiam habens mordacitatis expertem, sed multo magis ubi concoctione moderata, potissima pars feri consumpta fuerit. Sic mihi videntur etiā medici ad venena quæ erosione interimunt, lac propinare: veluti sunt lepus marinus, & cantharis. Sunt etiam qui & meritō id exhibent, iis qui aconitum & thapsiam devorarunt.

¶ Caseus.

Ubi pinguedo cum toto lacte concrevit, seroso duntaxat humore per coagulationē secreto, pinguis caseus efficitur. Qui quidem qualiscūq; sit, temporis spacio acrimoniam acquirit, quā deprehendes gustu & olfactu. Cæterum impen-

sè acris inveteratusq; jam redditus, maceratusq; decocto in suillarum carniū, tophos arthritico rum discutit. At recēs caseus & mollis, mirè vulnera glutinat: nam percutiendi vim possidet, leviter nimirum refrigerans. Cæterum oxygala ctinus, præter hæc, digerendi etiam quandā vim lenem obtinet.

¶ Butyrum.

Facultatis est cōcoquentis, paulum etiam habens digerentis potentia, in mediis nimirum corporibus secundū duritiem atq; mollitiem. Nam corporum planè durorum tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt phlegmonæ, eas & cōcoquit & digerit facile. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus illo solo curamus: nimirum puerilibus corporib; muliebribusq; eas petientibus. Sed & gingivis puerorū dentientium assidue illitū, nihilo imbecillius melle, extenuat exitū dentib; cæterosq; omnes oris phlegmonosos affectus, posteaq; fluxio restiterit, digerit pariter, concoquitq;. Proinde cataplasmatibus inditur quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondriis, bubonibusq;. Devoratū etiam, distributumq;, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuriticis peripnevmonicisq; affectibus: cum hoc quod eos etiam concoquat. Quod si solum lingatur, magis quidē concoquit, verū educit minus: si cum melle & amarum amygdalis, plus educit, sed minus cōcoquit.

¶ Pytia, Coagulum.

Coagulū omne acris & digerentis potentia est, atq; etiam exiccatoria: nam necessario id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulū comitalem morbum, si cum aceto bibatur, præterea proflavium muliebri sanare proditum est: necnon coactū in ventre lac dissolvere: id quod nos sumus haud dubiè experti, non solum in leporino, sed in aliorum etiam omniū animalium coagulo. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum coagulum leporinū dissolvit, ac efficacius quidem cæteris: verum non solum, cum hoc omni sit commune coagulo.

¶ Coagulum phoca.

Huic nonnulli vires castorij tribuunt.

¶ Chole, Fel.

Hic succus omniū qui in quoq; sunt animalū calidissimus est. Cæterū pro varia animalū temperie, calor eius variatur. Sunt autem in universum quatuor in singulis animalū sanguine præditorum humores: sanguis videlicet, pituita, & bilis tum flava, tum atra. Verū dum absolutè dicimus bilem, semper intelligimus flavā, quæ in jecoris vesica colligitur. At ipsam flavam bilem interdum medici pallidam nomināt. Sciendū tamen est, flavā tantō esse pallidiorē, quanto & crassiorē. Nam seroso recremento flavæ bili permisto, pallidam constitui cōtingit: sicuti & flavam plusculum excoactā, consistentia reddi crassam, colore autē flavam. Quin & in animalibus apparet flava quidem, iis quæ magis sunt calida: quæ verò minus, pallida. Et ubi animalia calida aut fame, aut siti torquentur, ad atrum colorem vergit, interim illū habens æruginosum, interim cæruleū, interim accuratè fuscū. Porrō ubi

Butyri facultas.

Butyrum extenuat infan-
tium exitum
dentibus.

Butyrum Co-
ratum plen-
riticis expue-
tionibus con-
fert.

Pytia.
Coagulum.
Coaguli lepo-
ri facultas
res insignes.

Coagulum om-
ne dissolvit
lac, & san-
guinem in
ventri con-
cretum.
Coagulum
phoca.

Chole. Fel.

Humores san-
guine prædi-
torum omni-
um cōmunes,
quatuor sunt.

Flava bilis
pallidioris
discrimen.

ocula-

*Castratum
animal red-
di simile fa-
mina.*

*Bilis quo pa-
cto accommo-
datur oculis.*

*Ance pure
fluentes, qua
specie bilis in-
feruntur.
Bilis differē-
tia pro ani-
malium di-
versitate.*

*Hydros.
Sudor.*

*Sudorem esse
salsuginoso-
sum.*

*Sordes exer-
citatorum.*

ocularia medicamenta præparant, callionymi, scorpium marini, hyænæ, galli, perdicis, & aliorum quorundam animalium bilem admiscunt. Quare color eius est explorandus. Jam verò taurorum bilis calidior & siccior est, quàm bouum castratorum: nam castratum animal semper simile redditur fœminæ & ijs quæ sunt ætatis minoris. Itaque, ut hæc humore superat adulta & perfecta, vincunturque ab iisdem caliditate: ad eundem modum bos castratus à tauris. Ut igitur urina à modica portione modicè pallere: & sitim famemque, et multum laborem perpeßis, flava esse cõspicitur: impletis verò atque inebritatis, albicans: ita bilis colores mutat. At verò quòd hic humor sit acris, hinc discas licet, quòd referat hæmorrhoidas, quodque illis ipsis qui utuntur, mordicare percipitur. Ac proinde cavemus, ne ad aliud morbum, aut symptomata, bilē usurpemus solam, atque per se. Quippe dum oculis ipsam accommodamus, miscemus illi tum mel, tum fœniculi succum, tum opobalsamum. Domesticarum suum bile (quæ imbecillima omnium, ac maximè aquea existit) utuntur quidam ad aurium ulcera: medicamento certè non reprobò. Cæterum ubi ulcus diuturnum fuerit, ac multà sanie & pus contineat, etià sicciorē bilem perferet, puta ovium, quæ paulò est acrior suilla: hæc etià magis caprarum, cui ad similes quodammodo est urorum & bouum. At taurorum his valentior est: inferior tamē bile hyænarum: & hæc quoque inferior bile callionymi, & scorpium marini, & marinæ testudinis. Volatiliū biles omnes tum aciores sunt, tum sicciores quàm quadrupedum: & inter ipsas quoque, volucres, gallinarum & perdicum biles ad medicinæ usum probatiores habentur. Milviorum verò & aquilarum, impendio acres sunt, erodentesque: quamobrem colore erugineo videtur, ac nonnunquam atro. Licebit itaque, tibi secundum exigentiā affectuum, hæc differentias bilis methodo ad experiētiā reducere.

¶ Hydros, Sudor.

Eandem quàm urina & materiam & modum generationis sortitur. Siquidem utriusque generatio ex bibito humore constat, ex calfacto simul in corpore, & biliofæ non nihil substantiæ adeptæ. Verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usque permeatis omnibus quæ intersunt partibus, pervenit. Sudores autē inter sese & urinas differre necesse est, tum pro animalium temperaturis, quæ & natura, & ætatem ratione non parum à se invicē sunt diversæ: tum pro ambientis nos aeris temperie. Quòd sudor salsuginosæ qualitatis sit particeps, gustus testimonio probatur. Nam sæpenumero nolentibus in os defluens, dictam qualitatem indicat. Sæpe verò etiam non obscuram præfert amaritudinē. Sed color etiam eius naturam designat. Nam sicuti urina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Porro tenues exercitatorum sordes, plus reperiuntur quàm sudor: minus autem digerunt. At ubi sudor illis permixtus est, multum facultatis digerētis acquirunt. Quare tumores præter naturam discutiunt: ad phlegmonasque uberum, præstantissimo sunt remedio. Quòd si sicciores esse sordes videantur, cyprinum superungito: aut eodem ipsis, si valde sint siccæ, subigito. Si verò cyprinum ad manum non sit, rosaceum bo-

num miscuisse sufficit. Hoc medicamentum est admodum utile, ad restinguendum & discutiendum lac, à partu in mammis concresecens.

¶ Urina.

Quanta est in animalibus bilis diversitas, tanta item est in urinis. Atque omnes quidem facultates sunt calidæ, sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum.

¶ Urina humana.

Hæc aliarum omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domestici, quibus exacti sunt testes: quorum ut temperies, ita urina similis humanæ existit. At montanorum aprorum valida est, ut vel ex odore acerrimo constat. Sed & in animalibus cæteris ex odore vim eius conjicere licet. Nam degustare ipsorum urinas, planè fuerit abominandum: cum ne pueri quidem urinam vir quidam honestus vita pariter & moribus, ebibere sustinuerit, etià si pestiferè ægrotaret in Syria, ubi multi ab humanæ urinae portione sese liberos profitebatur. Etenim urina hominum, ut si quid aliud, extergendi vim obtinet: id quod satis fullones indicat, qui sordida vestium expurgant usu illius, atque extergunt. Quod cõspicati nonnulli medici, ea psoras & lepras detergunt, perfunduntque: ulcera præhumida & sordida, multoque magis cõputrescentia. Sed & pudendis ubi sic afficiuntur, urinam infundunt, & auribus pure fluentibus. Quin & achoras & furfures ea curant, caput identidem perfundentes. At nos hæc facere odimus, cum ad manum sint alia, quæ illis conducant, medicamenta. Quamquam ulcera digitorum pedis, maximè quæ ex illusione inflicta essent, sæpe numero, ubi carerent phlegmone, & ipse urina curavi: idque in servis, & hominibus rusticis. Cæterum medicamentum quod ex urina pueri conficitur, quod quidem Chrysocolam appellant, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimum esse assero. Fit autem id, ubi in mortario æris rubei, pistilloque ex rubeo ære cõfecto, puerilis urina tandiu sub calido cœlo tunditur, donec ob eliquationem attritionemque pistilli & mortarij, mellis crassitudinem contrahat.

¶ Sielon, Saliva.

Ut urina & bilis, sic etiam saliva, sumpto quidem cibo imbecilla est: valida & acris eorum qui ingenti aut siti, aut inedia premuntur: in medio utriusque est, eorum qui propè concoxerunt quidem, nondum tamen cibum potumve hauserunt. Hac ergo saliva nutrices pueris lichenas curat, parvum videlicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Sed & triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitque: cum si macerarent aqua, non æquè prodesset. Ex quo liquet, salivam juvandi robur adferre. Atque corporibus mollibus, aut puerorum, panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro commansa omnia digerunt & sugillata, & cætera ecchymomata omnia, maximè ubi panis simul cum paucis radicula fuerit commansus. Jam verò universa substantia sua vel maximè adversa est saliva bestiis hominem interficientibus.

¶ Stercus caninum.

Stercus omne vim, maximè digerentem obtinet,

*Urina om-
niū facili-
calida.*

*Urina hu-
mana.*

*Urina hu-
mana potius
multis sese
berasos a-
stentis m-
bo profess-*

*Urina hu-
mana facili-*

*Chrysocol-
facienda
tio.*

Sielon.

*Saliva ien-
ni Gentrion-
ad qua co-
ferat.*

*Triticum
sum furum
los quam
lerrimè co-
coquit.*

*Saliva hu-
mana ad
satur best-
hominem
rimentibus
Stercus a-*

net. Cæterū canis, qui solis ossib. fuerit integrum biduum nutritus, durum, candidū minimeq; foetens stercus est: quod quidem exiccatum, redactumq; in pollinem, ad anginam, dysenteriam & summē inveterata ulcera optimē accommodatur. Ad anginam quidē, iis mistum, quæ alioqui huic affectui conveniunt: ad dysenteriam autem, injectum lacti decocto, & quod filices candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

¶ Stercus humanum.

Stercus pueri ficcū, & cū melle Attico ad leuorem tritū, illitumq; , sanat gutturis phlegmonas.

¶ Stercus lupinum.

Quidā lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi solent excernere, quodq; nō de cidisset in terram (lupi enim ut canes suspenso altero posteriorum crurum, & mejunt & cacāt, in eminente quopiam ex terra loco) aut vino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dabit: nec tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in intervallis, si quidem vacarent phlegmone: felicissimeq; cedebat illi negocium. Verum illud etiam in eo mirabar, quod vel appensum illis vinculo confecto ex lana ovis à lupo laniatæ, aut ex cervina pelle, evidenter aliquoties iuvisset.

¶ Stercus caprillum.

Omniū creberrimē utimur caprillo stercore, digerentis & acris facultatis: adeo ut induratis scirrhorū in modum tumorib. congruat, non lienis modo, sed etiam aliarū partiū. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceā, necnō oxycratum. Quin & ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, variē caprillo stercore utimur. Sed & usum tenuioris qdem essentiae, verum haud manifestō redditur acrius. Quamobrē sanē ad alopecias congruit, & omnia vitia, quæ extergentia medicamenta postulant, ut psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores bubonas. Est enim vis ejus tum usti, tum non usti, absterforia & digerens: nec eam parvā habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidā medicus utebatur in agris ad viperarum morsus, ac multo magis aliarum bestiarum: ac profectō ex iis complures servavit. Idem etiam ad auriginem spyrathos ipsas propinavit ex vino: & ad profluvium muliebre cum thure apposuit. Acrius tamē est medicamē, quā ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Jam verō animalium temperatura sicciorū, exiccantius stercus est: sicuti & calidiorum, magis exalfactorium. Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicuti neq; ullum humectat. Pro natura etiam eorū quæ eduntur, multa reperitur diversitas. Proinde in hominib. major est, quā in cæteris animalibus: quandoquidem hoc animal diversissimis maximeq; variis utitur cibis.

¶ Stercus bubulum.

Facultatē habet exiccatoriā, atq; attractoriā etiam, ut sanē ostendit, dum apū, vel parūq; morsibus auxiliatur. Quidam autem medicus aqua inter cutem laborātes bubulo stercore oblinens, in solem exponebat. Idem partibus rusticorum phlegmone obsessis, humidum illud vere collectum, dum herbam boves pascuntur, admovit.

Est enim id moderatius alio, quod à paleis comestis excernitur: ac proinde accommodatius ad phlegmonas. ¶ Stercus ovillum.

Ille idem medicus, oviū utebatur stercore ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos, aceto videlicet diluens. Quin & ulcerum ambusta, ac cicatricem illo ducebat, id cerato rosaceo commiscens.

¶ Stercus columbinum.

10 Stercore columbarum nomadū sicco, trito & cribrato, unā cū nasturtii semine, vice napyosutor ad ea quæ rubrificari postulant: nempe ad omnes inveteratos affectus, cujusmodi sunt coxendix, hemicrania, scotomata, vertigines, cephalæa, & in lateribus, scapulis, cervice, ac lumbis, antiqui dolores: necnō nephritides, affectus cœliaci, & podagricæ arthritides, quando in articulis nondum concreti sunt tophi. Est autē hoc stercus minimē foetidū, præcipuē si sit arefactū.

¶ Gallinaceum stercus.

Tritum, propinatumq; cum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis cyathis, eos celeriter juvat, qui à comestis fungis anguntur: nimirū per vomitum crassissimos humores eliciens. Est autē hoc stercus minus calidum columbino. Porro ut animalia quæ exercitantur, ociosis sicciora sunt: & quæ cibis utuntur calidioribus siccioribusq; iis quæ frigidis atq; humidis: sic etiam eorum & excrementa, & partes. Quare columbarū domesticarū stercus multo imbecillius est eo, quod à montanis excernitur. Gallinarum præterea quæ conclusæ servantur, & fursuribus aluntur, longē etiam infirmius stercus est, quā earum quæ in agris pascuntur.

¶ Stercus anserum, & ciconiarum.

Anserinū stercus præ nimia acromonia inutile est. Colligo etiā ita esse & accipitrū, & aquilarū. Sunt qui ciconiarū stercus morbo comitiali mēderi scriptitent. Quo epoto credulus quidā nihil adjutus est. ¶ Stercus murium.

Sic enim & murium stercus alopecias curare proditum est.

¶ Stercus crocodilorum terrestrium.

Crocodilorum terrestrium stercus, & sturnorum, quum solam oryzam ederint, utrunq; abstergendi, desiccandi; moderatam facultatem fortitur: ac multo moderatiorem sturnorū stercus. Porro crocodilorum stercus, quod mulierum luxus preciosum reddidit, ut à facie ephelim tollit, ita & vitiliginem, & lichenas.

¶ Rhypos, Sordes hominum.

Quod autiū sordes paronychis sit utilis, proditum est. Quæ verō in tota cute provenit, illius fordīs quā paton vocant, nonnihil actionem adjuvat: utpote desiccandi vim habens, cum nō nulla caliditate. Porro ea sordes quæ lanis oviū inhæret, ex qua œsypon conflatur, similē butyro concoquendi vim possidet: paulum etiam digerentis facultatibus sortita.

GALENI PERGAMENI DE simplicium medicamentorum facultatibus,

Liber XI.

PLeræq; partes sunt animalib. universis communes: nulla tamē est æquē cōmunis ut caro: hanc enim habet omne animal. Cæterū

*Caro proprie
qua dici me-
reatur.
Parenchy-
ma.*

eam quæ reperitur in musculis, solam Medici carnis appellatione dignantur. Nam carnem viscerum nonnulli parenchyma vocandam censent, propterea quod ex venis effusus sanguis, circum vasa omnia (ut ipsi arbitrantur) concreascit. Sed nos nominum contentione neglecta, persequamur proprietates particularum.

¶ Caro viperæ.

*Carnis vipe-
ræ facultas
& concinan-
da modus.*

Non omnes animalium carnes hominē nutriūt, sed quorundam etiam letales sunt. Tum inter eas quæ hominē nutriunt, quædam tantum sunt nutrimentum, quædam etiam medicamentū. Nam

*Elephantia-
sis curatio.*

viperarū carnes palam videre est excalfacientes & exiccantes, ubi condiuntur, ceu anguillæ, oleo, sale, anetho, porro, & aqua: horum omnium servato modo. Quod autem totum corpus per cutem vacuent, vel hinc tibi discere licet, quod ele-

*Viperarum
esum sitim
maximam
infert.
Viperæ cur
appellatur
dipsades.*

phantici quidam prorsus sint restituti, ex potu vini, in quo viperæ quædam fuerat extincta. Præterea nos elephantici quendam, misso prius sanguine,

*Carnes ani-
malium cum
cibis mutari.
Viperæ caput
non caudam
abijcere oportet
ad confi-
ciendos arti-
scos theria-
cos.
Artifcos the-
riacos confi-
ciendi ratio.*

atraque bile medicamento purgata, viperis quas capiebat uti iussimus, præparatis in olla, anguillarum more. Atque ita sanatus est, evaporato per cutem affectu. Porro viperarū caro adeo valentem

obtinere desiccandi vim, ut quidam qui eam esitarunt, vehementissima fuerint siti cruciati. Quam obrem eas dipsadas nominant. Sunt tamen qui

dicant demorsos à viperis satiari potu non posse, sed dirumpi potius quam liberari siti. Cavendum autem est, ne in locis maris proximis saluginosisve, vene-

mur viperas, seu ad esum, seu ad Theriacis antidoti præparationem: quum verisimile sit, earum quæ in id genus locis capiuntur, carnes salvas exi-

stere. Siquidem cum cibis etiam animalium mutantur carnes, Porro quoniam ex more dum art-

ificos Theriacos paramus, non tantum caput, sed earum etiam caudam abijcimus, subjicit mihi frequen-

ter rationabile fortassis esse, caput quod totum abijci, ob venenum quod ore continet: verum à ratione alienum esse, adimere & caudam. Theriacos

aut ipsos artifices sic præparamus. Purgatas illas in aqua cum anetho elixamustandiu, donec à carne separari facile possint spinæ. Mox pani purissi-

mo, probe cocto in clibano, salisque & fermenti quod sit satis habenti, ac breviter resiccato, & ad lavorem trito, necnon macerato cum ipso vipe-

rarum decocto, carnem prius in mortario tusam miscemus. Postea verò parvos artifices fingentes, atque in ædibus calidis & siccis siccantes, in talibus eos tandem reponimus. Hos ergo ineunte æsta-

te conficimus, sicut & salē ex deustis viperis, quo potissimum tempore optima ipsarum est caro. Urimur eis postea cōtusis denuo & cribratis, rur-

susque ad lavorem redactis, adjicientis nonnihil & salis, ad suavitatem compositi, cujus etiam ali-

quid ipsi theriacæ injicimus. Itaque caro viperæ siccat, valenterque digerit: excalfacit verò mediocriter. Properat enim vis ejus ad cutem, per eam videlicet quæ in corpore sunt recrementa exigens.

Quibus igitur copia mali succi in corpore abundat, iis pediculorum numerosa multitudo exoritur: & à cute ceu quædam squama abscedit, deciditque cuticula extrema, ad quam utique solent si-

peratura excedunt, & carnes quoque eorum differunt atque exuperant. Proinde talium animalium carnes perpetuo exhibere oportet, quale volumus corpus humanum reddere. Nec parva existit carniū differentia, dum quasdam sale cōdimus. Nam interdum animalis temperie humidissimi caro salita, longè exiccantior evadit ea, quæ

sicca natura existit. Verum inter eas quæ salitæ non sunt, siccior est assa, quam quæ in aqua est elixa.

At verò caro mustelæ arefacta, valenter digerit, desiccaturque: proinde morbo comitiali afflictos juvat epota. Salitorum etiam *αἰλῆων* carnem ad lavorem contritam, palos & spicula educere ajūt,

impositam: sicuti & mutulorum carnem ulceribus à mordente cane inflictis congruere. At cochlearū caro, prius in mortario cōtusa, ac postea

ad lavorem redacta, omnium valentissime desiccatur partes superfluo humore gravatas, adeo ut conveniat hydericis. Ipse autem humor solus,

thuri, aut aloë, aut myrrhæ permixtus, quoad cerati accipiat crassitiem, medicamentum fit tenax desiccaturque purulētos auriū humores. Sed & frōti impositum heret, oculorum fluxiones exiccans. Qui-

dam etiam ad palos eximēdos utuntur totis unā testis, ad levorem tritis: alii ad sistendos menses. Carnes etiam solæ cum farinæ polline trite, con-

tusorum vulnera glutinant. Ipsa cochlearum humiditas pilos superciliorum præter naturam habentes glutinat.

¶ Pinguedo & adeps.

Differt à pinguedine adeps, quod crassior sit: ac propterea animantibus totam naturam terro-

riore habentibus, ut bobus & capris, adeps provenit: humoribus autem, ut suibus bene habitis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo celeriter in igne posita colliquescit: nec facile ubi semel hi-

quata fuerit rursus concrescit, aut cogitur. At adeps nec facile funditur liquecitve, & fusus celerissime cōgelatur. Porro adeps suillus, aliorum

omnium est humidissimus, ob idque actione sua vicinam oleo vim possidet: quamvis oleo magis tum emolliat, tum cōcoquat: quamobrem cataplasmatibus

quæ ad phlegmonas accommodari solent, miscetur. Qui verò mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino, aut in colo, iis potius caprillum adipem

quam suillum injicimus: non quod plus acrimonias obtundat, sed quod cōcreascit citius, suillus autem instar olei defluat. Quare caprillus potius dysentericis & tinesimosi injicitur, quando morsum eo-

rum mitigare est consiliū. Quamvis ob tenuitatem essentia nonnulla magis acrimonias retundunt, ubi in alto mordicatorum corporum, quod molestum est, hæserit. Hac ratione adeps anserinus magis obtundit quæ in alto corpore mordicant: præter-

ea suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum & gallinarum adeps. Porro calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps: & horum ipsorum exectorum minus tum

calidus, tum siccus: quippe mas castratus ejusdem semper generis fœminæ assimilatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorum corporum. Caterum pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed non æquè excalfacere, sicuti neque oleum: talem quippe caliditatem obtinet, qualis spectat in nobis. Taurorum adeps suillo multo calidior & siccior

*Carnes affe-
siores su-
elixa.
Mustelæ ca-
epilepticis
auxiliatur*

*Cochlearum
carnes, &
succus.*

*Pinguedo.
Adeps.*

*Dysenteria
auxiliatur
caprillus
adeps.*

*Adipem di-
ferentia.*

*Castratus
masculus
eiusdem ge-
neris fœminæ
assimilatur*

ficcior est. Sic & adeps vitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hœdorū quam caprarum. At caprarū minus quam hircorū. Rursus taurorū minus quā leonum. Nam horum adeps omnium, propemodum adipe potētius digerit: quippe & caliditate exuperat, & partū tenuitate. Quare nimis ulcera & phlegmonas irritat. In veteratis tamen tumoribus, atq; scirrhi in morē duratis, tū nervorū curvaturis aptissimus est: in quibus sanē suillus videt minimē efficax. Taurin⁹ aut quātō calidior ficciorq; suillo est, tantō suspensatur a leonino. Itaq; tanquam in mediō consistens, meritō utriq; medicamentorū miscetur generi, & ei scilicet q; scirrhosis medet, & ei quod phlegmonas ad suppurationem perducit: cuiusmodi est tetrapharmacū, ex cera, resina, pice, & adipe cōstans. Verū omnibus quib. caro est mollior, adeps suillus convenit magis. Duram autē & siccam habentibus, taurinus. At verō adeps dum inveterascit, seipso & calidior, & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde valentius siccans & digerens, id quod omnibus inveterascentib. accidit, nisi interim computrescant. Porro urforū adipem alopecias curare verē est proditum: quū tamen ad eum affectum probatiora remedia habeamus.

¶ Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrhosa emolliendi. Optimā semper sum expertus cervinā: dein vitulinam. At hircorum & taurorū, tū acrior est, tū ficcior: itaq; durities scirrhosas molire nequit. Ex vitulina igitur & cervina pessi cōponuntur ad emolliēdos uteros. Ex extrinsecus uteris medicamenta imponūtur, quę ex medulla parantur, vim emolliendi habētia. Accipitur aut non solum medulla ex ossibus, quę sanē revera est medulla: sed ex spina etiam, quę tū durior, tū ficcior est altera. Utranq; autem hyeme collectā, in sicca editaq; domo cum foliis lauri siccis repono, ne videlicet cōputrescat. At si quādo ambiente existēte calido, austrinoq; medullas aut adipē velis reponere, uteris ad id cubiculo quammaximē fieri poterit temperato, quodq; ad aquilonē obversum, apertas habeat parvas fenestras, ut perpetuō flatus inspirantes excipiat.

¶ Caput menidum.

* Menidū sale inveteratarū capitibus ustis, ad sedis fissuras utebatur quidā: & ad columellam diu indurata. Videtur ergo vis illarum esse desiccatoria, non admodum acris. * Nam ut acrimonia adustarum nonnullis inest, sic omnibus vis exiccandi.

¶ Caput leporinum.

Alius capite leporis usto utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

¶ Caput saurarum.

Saurē caput contritū quidam palos & spicula extrahere prodiderūt memoriæ: tum myrmecias, acrochordonas, & clavos eximere.

¶ Cerebrum leporis.

Id attritū & esum, utile dicimus esse pueris detinentibus. Quidā etiā adversus tremores utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

¶ Cornua cervina & caprina, usta.

Dentes candidos reddūt, fluidaq; gingivas cōtrahunt. Quod si cervinum ab ustione lavetur, dysenteriam, & sanguinis excreationē, præterea

coeliacos affectus sanat. Aurigini etiam dicunt id esse utile. Ex quo quidē duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiunt. Quidā etiā ipsum miscuerunt collyriis desiccantibus oculorū fluxiones.

¶ Pulmo agninus & porcinus.

Intertrigines a calceamentis curare credit. At vulpinus si bibatur siccatus, asthmaticos juvat.

¶ Jecur canis rabidi.

Si assum edat, remediū existere iis qui ab ipso rabiente cane fuerint mori, quibusdā proditū est.

¶ Jecur caprinum.

Quidam ipsum affantes, sanemq; excipientes fluentem, ea utuntur ad nyctalopas. Vaporē aut ejus, dum elixatur, oculis apertis excipiendum præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eisdē affectus accommodari ajunt, & eos qui comitiali morbo sunt obnoxii, coarguere. Idem potest hircinum hepar.

¶ Jecur lacerta.

Erosis impositum dentibus, eos dolore liberare nonnulli scriptis mandarunt.

¶ Venter mergi.

Quod de hoc & de interna tunica ventriculi gallinarum proditum est, id vanam esse promissionem, comperimus.

¶ Castorium.

Testiculos castoris, vocāt castoriū medicamentum & celebre & multi usus. Evidenter siquidem calfacit. Quum aut calfaciētia omnia, quę cōsistentia sunt sicca, ubi cōtacta substantiē quippiā digerunt, continuo etiam illa desiccant: manifestum utiq; est, castoriū etiam desiccare haud obscure: id quod illi cum multis est medicamentis cōmune. Quia verō impensē subtilium est partiū, ob id plus valet quā alia, quę similiter ut ipsum tum calfaciunt, tum siccant. Nam quę tenuium sunt partiū medicamenta, iis quę sunt crassarū, efficaciora sunt, etiam si parem sortita sint facultatem: nimirū quia magis penetrāt. In cōvulsione igit a plenitudine, quę in nervis est, orta, & bibendum castoriū exhibe, & cuti foris etiam impone. Ubi verō ex siccitate nimia cōvulsio obvenit, scito hoc medicamē illic esse adversissimū. Ad eundem modum iis qui præ plenitudine aut tremūt, aut singultum patiuntur, est utilissimū: adversissimum verō iis, quibus id ab inanitione, aut acrium humorū morū accidit. Ubi itaq; ex calfactione, aut resiccatione, aut utraq; simul actione est opus, maximā in usu castorū experire commoditatem: nec ullam parti alicui noxi afferet, potissimū si homo nō febrat, aut febri non admodū calidam perpetiatur, sed tepidam, qualis maximē in cataporis & lethargis accidit. Ac multis sanis castorium unā cum pipere albo, utriq; mensura cochlearii, ex melicrato propina vimus: nec quisquā ullam percepit noxam. Sed & retentis mensibus, ubi per venam quę in talo est, modicē evacuassem sanguinē, oblato castorio unā cum pulegio, aut calamintha, semp medicamē hoc sum expertus purgationē ciere, citra ulla assumentis læsionē. Præterea locos morātes ejicit: eaq; omnia ex melicrato potū efficit. At q; ab occasione frigida ita venter flatu distenditur ut agrē curationē admittat, eos ex oxycrato potum castorium adjuvat. Quę porro juvat in corpore intro sumptū, iis prodest quoque cuti im-

fitum, eum Sicyonio, aut veteri oleo. Quæ verò ampliori calore indigēt, iis etiam per se infricari debet. Juvat etiam, si quis suffitū eius prunis impositi, inspiratione hauriat: illos præcipuè affectus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Attamen lethargicos & cataphoricos affectus, qui quidem habent adjunctā febrem, præstat non dictorum oleorum aliquo macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloq; imponere.

¶ Lumbiscincorum.

Sincorum lumbi. Quæ circa renes seincorū sunt, bibunt, tanquam pudenda intendere valeant. Contrarium aut moliri videtur semē lactucæ potum ex aqua.

¶ Ungues caprarum & asinorum.

Semen quæ promoveant & arceant. Quidam unguēs caprarum deustos, moxq; aceto perfusos, alopecius illinunt. Itaq; fuerit & talis cinis facultatis exiccatorix. Sunt qui combustos asinorum unguēs comitalem morbum curare dicant, si scilicet assiduò bibantur. Si verò macerati oleo applicentur, digerere chæradas. Sed & ipsum cinerem, si siccus inspersus fuerit, sanare perniones.

¶ Ossa combusta.

Ossa combusta. Admodū digerentem, exiccantemq; vim obtinent, maximeque (ut quidam ferunt) humana. Novi siquidem nostratū quosdam * combusta ossa humana potui exhibuisse, ac multorum sic epilepsiam & arthritim curasse.

¶ Senecta serpentis.

Exsiccium serpentis. Hanc scripsere quidam in aceto bullitam, dentium mederi doloribus.

¶ Pellis ovina recens detrahta.

Pellis ovilla. Circumposita verberatis, eos die ac nocte una persanat. Concoquit enim & discutit sub cute concretum sanguinem.

¶ Equorum lichenes.

Equorum lichenes. Eas aceto tritas comitiales curare scriptū quibusdam est. Alii verò & ad cuiusvis feræ morsum adhiberi consulunt.

¶ Tela aranei.

Tela aranei. Hanc scribunt nonnulli à phlegmone tueri summæ cutis ulcera.

¶ Coria vetera usta.

Coria vetera usta. Eorum cinis exiccatorius existit. Quare ulcera ex attritione, & ambusta, & intertrigines quæ in feminibus, persanat.

¶ Ostrea.

Ostrea. Ostrea quidā nuncupant testacea omnia: ostreum aut, unam tantum testaceorum speciem.

¶ Buccina & purpura.

Buccina. Purpura. Buccinarum & purpurarū testa usta, redactaque in tenuissimū pollinem (quod sit tibi commune præceptum in testaceis & lapidosis omnibus) desiccandi vim obtinet, ac proinde ulceribus malignis opitulatur: id quod etiam commune est omnium quæ citra insignem morsum vehementer desiccant: quippe quum alioqui fluxionum causa existant. Hoc etiam est omnium id genus commune, quòd ex aceto, aut oxycrato, aut œnomelite, aut oxymelite, idonea sint ulceribus putrescentibus.

¶ Ostrea.

Ostrea. Ostreorum testa usta similis est facultatis buccinarum testis, tametsi minus crassæ. Etenim oia id genus cogēdi quandā in se facultatē obtinent, per quam cōdensata eorum essentia, dura terro-

saq; sunt reddita. Quā ubi perustione posuerint, digerentē facultatem asciscunt. * Quòd si ea, ubi usta fuerint, laveris, quicquid habebant igneum, in qua ponūt. Quare aqua sanè ipsa exalfaciēs, cū tenuitate redditur, adeo ut putrefaciat interdum: reliquū verò terrosum, morsus expers efficitur: maximeq; implēdis & cicatrice claudēdis humidis ulceribus auxiliatur. Cæterum ulceribus, cavis & fistulosis, fluxioniq; obnoxio ulceribus, ex suillo adipe inveterato foris circūpono ipsum in sinū aut aliquid eorū quæ talia carne implent, impono, quale existit diaphanes ustum. Quin & dentes splendidiores testarū cinis efficit, nō tantum extergendi potentia, sed & asperitate substantiæ: veluti & pumex, & testa clibani. Verū in usu ejusmodi, nō est necesse quæ sic usta sunt admodum lævigare, sicuti dum insperguntur ulceribus. Porro excrescentiam mediocriter extērit, cōprimuntq;. Ad hæc, usta omnia id genus cum sale, dentium smegma efficacius reddunt, ut nō modò laxitatem molliemq; gingivarum deficiet, verum etiam ulcera putrescentia adjuvet.

¶ Sepiæ testa.

Sepiæ testa. Sepiarū testa admodū laxa est, non ut ostreorum lapidosa. Itaq; absterio illi cū aliis testis communis est, veluti & desiccatio: cæterum partiū tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quocirca usta ea utimur ad vitilignes, ephelim, lētes, & psoras. Quin & fossili sali mista, in oculis existentes unguēs, & sycoses vocatas eliquat. At anteq; uratur, dentib. splendorē cōciliat, & ulcera desiccatur.

¶ Opercula purpurarum.

Opercula. Ea quidam prodiderunt memoriæ turgidos lienes sanare: suffitu eas q; uteri suffocatione periclitatur, juvare: præterea retētos ejicere locos.

¶ Lana succida.

Lana succida. Idoneè excipit irrigationes, quæ adhibentur contusis, aut quovis modo percussis, ut quæ utilitatem ex illis proficiscentem promoveat: idq; propter œsypon. Lota verò, apta est humoribus qui irrigantur, excipiendis. Porro usta vim habet acrem, pariter & calidam, unā cū partium tenuitate. Itaq; molles præhumidasq; ulcerum carnes celerrimè eliquat. Inditur & in medicamen desiccatoriū. Urto eam tanquam alia plurima, ollā implens novam, quam tegat operculū multis foraminibus pertusum.

¶ Piliusti.

Piliusti. Similiter usta lanæ exalfaciendi exiccandiq; possident facultatem.

¶ Ovarum facultates.

Ovarum facultates. Ova partes animalium non sunt, sed proportionē respondentis quæ adnascuntur. Sunt aut facultates ad propagationem generis, perpetuitatemq; ac sunt utilia, ceu nutrimenta. Porro ovarum album & tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorū minimè mordicantiū. At unam pravitatē solum patiuntur ova, quā scilicet affert vetustas: eamq; facillimè effugas, si utaris recētibus. Est autem ovū symmetro temperie frigidius. Utendū autem est ovi albumine, nō tantum ad oculos, sed ad alia omnia, quæ medicamenta requirunt suavissima: ut sunt universa sedis & pudendorū ulcera cōtuma cia. Miscetur quoq; idoneè medicamentis profluviū sanguinis ex cerebri involucris reprimentibus.

tibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, astringuntq; Ceterum & ipse vitellus assimilis est naturæ, ac proinde miscetur ceratis morbus expertibus. Verum quanto plus deficcant quæ sunt assaova, tanto minorem mitigandi vim obtinent. Miscetur & cataplasmatiphlegmonem extinguentibus. Jam vero crudo toto ovo utimur admisto rosaceo, ad palpebrarum, aurium, mammarum, aliarumq; omnium partium phlegmonas. Ad hæc, in acetococtum ovum si edat, ventris fluxiones deficcant. Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam aut coeliacum affectum conveniunt, adjunxeris, atq; in igne modico, fumiq; experte frixeris, edendumq; ita præbeas, non minimè sanè ita laborantes adjuveris. Ad ambusta etiam ovum est, protinus impositum, utile: si quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat: si etiam cum vitello confundes, commiscensq; applicet. Mediocriter enim refrigerat, & citra morsum deficcant. Tale quum sit, & ad anacollemata vocata, quæ fronti imponuntur, eo utimur, et pilos palpebrarum agglutinamus: nimirum admisto idoneo rum quopiam, cuiusmodi est thus, potulimur pingue, ac non inveteratum & siccum. Ovum igitur medicamentis quæ humiditates deficcant, aut elixum, aut assumi, aut frictum, tanquam materia miscetur: iis vero quæ lentorem humorum in pectore pulmoneq; incidunt, sorbibile: id quod in aqua coitq; elixari debet, donec incalascit. Simili modo sumptum, gutturis, stomachi, ventris, intestinorum atq; venicæ medetur asperitatibus.

¶ *Echinus, hoc est, erinaceus, combustus.*

Erinacei utriusq; tum marini tum terrestris corpus ustum, cinerem efficit facultatis tum extergentis, tum digerentis, tum extrahentis.

¶ *Cochlea, siue limaces.*

Cochlea si tota cum testis uratur, admista galla omphacitide, simulq; pipere albo, mirè psumt dysentericis, in quibus ulcera coputrescere non ceperunt. Convenit aut ut pipere sit pars una, gallæ vero duæ, quatuor cochlearum. Hæc ubi ad unguem levigaveris, cibus inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex vino albo & austero, præbeo. Cæterum absq; gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil exustione calidum. Porro cochleæ quæ ustionem non sunt expertæ, si una cum testis trita imponantur, & toti ventri aqua inter cutem laborantium, & in articulorum tumoribus, egrè quidem divelli poterunt, ceterum impensè deficcant, vel si viscidus crassusq; humor in alto continetur. Et sanè inherere finire oportet, donec spontè decidant. Idem faciendum in tumoribus exictu natis, difficile solubilibus.

¶ *Carcini, hoc est, cancriusti.*

Fluviatilium cancrorum cinis, quam similiter prædictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in iis qui a rabiente cane sunt morfi, effectus: isq; tum solus, tum cum gentiana & thure, multo præstator. At thuris partem esse unam oportet, quinque gentianæ, cancrorum decem. Ex quo quidam medicamine Aesculion Empiricus, cocivis atq; præceptor meus, iis qui a rabido cane emorfi fuerat, quotiæ diebus, quadraginta mensuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat. At si non protinus ab initio, verum

aliquot post dies, cui a cepisset demorfi, tunc quotidie duo cochlearia aque inspergebat. Ad ipsum vero vulnus applicabat emplastrum, quod ex pice brutia, opopanace, acetoq; conficitur: habens picis libram unam, aceti acerrimi sextarium unum, Italicum, opopanacis vero uncias tres. Hæc itaq; monita volui de cancri, quum nullus eorum qui usi illo medicamento fuerunt, extinctus sit.

¶ *Chelidones, siue hirundines ustæ.*

Sed & hirundinum cinere permisto melli permulti utuntur, contra omnes affectus gutturis. Utuntur & ad acuendum visum nonnulli hoc cinere. At alii eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent.

¶ *Tettiges, hoc est, cicadæ.*

Cicadis etiam nonnulli utuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis. Alii assas edendas offerunt, quibus affecta vesica est.

¶ *Corydus, Galerita.*

Galerita, avis illa pusilla, quæ in capite veluti galerum ex pilis habet conflatum, in iure elixa colicos adjuvat, veluti & ipsa herba corydalis appellata. Verum assidue ea simul cum iure esse necesse est.

¶ *Alectorides, Gallina.*

Gallarum jus simplex retinendi vim possidet, uti gallorum subducendi. Concoquendi autem sunt cum sale diutissimè.

¶ *Gale, hoc est, mustela.*

Ejus cinerem cum aceto illitum podagricos juvare est proditum: ipsam vero arefactam prodesse comitialibus morbis.

¶ *Ranausta.*

Ranarum inspersum cinere sanguinis eruptio ni mederi referunt: cum liquida autem pice sanare alopecias.

¶ *Hippocampus.*

Hujus etiam cinere alopeciis prodesse est proditum, facultatisq; exiccantis & extenuantis existere.

¶ *Tellina salsa.*

Salfas tellinas ustas, adeo urentè efficere cinerè ajunt, ut is cum cedria evulsos radicitus ex palpebris pilos, instillatus in locum, eos renasci prohibeat.

¶ *Intestina terra, siue lumbrici.*

Contrita, nervisq; divisim imposita, mirum in modum ea prodesse est proditum. Præterea cum vino pota, medicamentum esse movendæ urinæ idoneum.

¶ *Cimices.*

Eas cum aceto bibitas, ejicere hirudines ajunt: quas nos semper esu alliorum ejecimus.

¶ *Cantharides.*

Cum idoneis emplastris impositæ, adeo scabros ungues educunt, ut toti cadant. Præceptorum meorum quidam, earum nonnihil solet diureticis medicamentis injicere. At nonnulli solas alas & pedes injiciunt: alii contra. Cæterum nos totas indimus. Porro aptiores sunt ex cantharides quæ nventæ in frumeto, lutea transversim in alis cingula obtinet.

¶ *Buprestis.*

Animal est catharidi tum specie, tum viribus simile.

¶ *Pityocampe, Erucapicearum.*

Ejusdem sunt facultatis.

¶ *Salamandra.*

Salamandræ, cinerem quidam septicis, lepricis, psoricisq; miscent facultatibus.

¶ *Narce, Torpedo marina.*

Si applicet viva cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet, similiter aliis quæ sensum obtupesciunt.

¶ *Draco marinus, & Trigla, & alia id genus.**Draco mari-**nus.**Trigla.**Mur.**Saura-**Mygale.**Scorpius.**Ascalabota.**Asiracus.**Cybius.**Pityocampe.**Vriska mari-**na.**Lepus mari-**nus.**Silphus.**Oniscus.**Vulpes.**Hyena.**Oleum Sul-**phuris summe**auxiliari**morbis arti-**cularibus.**Adarcion.**Alcyoniorum**facultates et**differentia.*

Vivas etiamnum hasce animantes apertas, & protinus partibus affectis appositas, pdesse traditum est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Trigla in draconis: mures domesticos in ictum scorpii, veluti & sauram: mygalē in suum ipsius: & saurā Chalcidicam, quam ex vino bibendam præbent, tanquam suum ipsius morsum sanet. Porro scorpium suum ipsius morsum curare, si tritus imponat, necnon si assus edatur. Congruere autem ajunt & iis qui à vipera sunt emorli: ascalabotam verò iis qui à scorpio. Referunt etiam & in Ægypti regionibus arefactum asiracum exhiberi iis qui à scorpio percussi sunt: & vocatum cybiū, utiliter vulneri à cane inflictio adhiberi. Ceterum in oleo frictis totis animalibus, ipso oleo utebantur nostratiū medicorū quidam: sed & superiorū nonnulli ad pilorum effluvium: nempe pityocāpis, urticis marinis, lepore marino, & scolopendro marino: ad aurium verò dolore, silphis in oleo coctis, & iis quos Græci oniscos, Latini multipedes vocant.

¶ *Vulpes & Hyena.*

Oleum in quo elixa vulpes est, non est potēioris in digerendo facultatis, quam in quo hyena: quæ si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum longè potentissimæ facultatis indigerendo reddit. Talia autem medicamenta vim habent, ea quæ in alto corpore delitescunt, ad extimam cutem trahendi, atque eo nomine quandoque dolores sedandi. Quare qui utuntur vulpibus, & ipsi oleū digestorium efficiunt, atque inde impletis eo alveolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tempore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut non tantum qui circa articulos sunt tumores vacuentur, sed etiā universum corpus. Unde certe magnum consequitur commodum, quum nihil præterea amplius in affectas partes sit defluxurum, nimirum evacuato jam corpore.

¶ *Adarcion.*

Essentia quidem sua veluti spuma est aquæ salis concreta, idque circa arundines & farragines. Est autem acerrimum, simulque calidissimū pharmacum: proinde & per se inutile. Verum commisceri solet iis quæ vim ejus retundunt: sicque fit multo utilissimum in iis affectibus, qui exalferi possulant, foris impositum. Nam id intra corpus sumi impossibile est.

¶ *Alcyonia.*

Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem & calidam. Est autem eorum unū densum & grave, odoris pravi. Olet enim pisces putridas, spongiæ in specie simile. Alterū verò figura longiuscula, leve, & rærum, odore habens similem phyciis. Aliud tertium, verni simile specie existit, colore purpureo, consistentia molli: vocant id Milesium. Post quæ quartum, secundo quidem jam posito similiter & leve & rarum, verum lanis succidis simile. Denique & quintum, extrema superficie lævi, ceterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre. Quod sanè omnium alcyoniorum est calidissimū, adeo ut pilos deurere possit. Itaque quū duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque adjuvent, præterea cutē splendidiorē efficiant, id præsta-

re non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa cutem duntaxat summā extergit, sed etiam excoriat, ita ut ulcera inducat. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium tenuissimū est. Quare ustum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fulvo, tenui tamē essentia. Quartum autē eiusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

¶ *Sal.*

Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: verum hoc differunt, quod salis est terra effossi substantia magis compacta sit, ac proinde in eo major partium crassities, & astringendi potentia. Marinus itaque affusa aqua liquescit protinus: id quod non accidit fossili. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdā saluginosis nascitur, estate videlicet aquis ex iis assu absumptis: cuiusmodi est Tragasius, non procul à Sminthio. Igitur quum qualitas salis digerat simul & contrahat contactum ab ipsa substantiā, aphronitrum in hoc differt, quod in ipso unum saporem exuperantem sit videre, quem vocat amarū, vim habentem digerendi, haud item contrahendi, uti salis fossilis. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: & quod reliquum est substantiæ solidæ, astringitione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes servat, à putredineque tueretur. Quippe quæ putrescunt, excrementitium humorem continent, substantiamque tum dissolutam, tum minimè compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum inest superflua humiditas, seu melli optimo, & substantia solida & compacta est, ut lapidibus, ea ut putrescat est impossibile. Quare in iis salis non probatur usus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

¶ *Salustus.*

Digerit quidem potēius, quam ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate, redditur.

¶ *Litrum, Nitrum.*

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri vires habere.

¶ *Halosanthos, Flos salis.*

Liquidum est medicamen, tenuiusque quam sal ustus: præterea qualitatibus acris, facultatibusque admodum digerentis.

¶ *Halosachne, Spuma salis.*

Spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris nature, quam ipse sal. Quare & extenuare, & digerere quæ ille multo plus potest. Verum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

¶ *Asphaltum, Bitumen.*

Unum & ipsum est ex iis quæ in aqua marina proveniunt, & in alia quapiam quæ non est marina dissimilis, ut in Apollonia Epiri, ubi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascentibus, veluti spuma quædam innatans. Quo sanè tempore est molle: postea verò resiccatur, pice sicca durius efficitur.

¶ *Bitumen proveniens in mari mortuo.*

Optimū verò bitumē in mari quod mortuum vocant, provenit. Cuius medicaminis vis est tum resiccatoria, tum exalfactoria in secundo excessu. Merito itaque utuntur eo ad cruentorum vulnerum glutinationē, & ad alia omnia quæ excari debent, seu modica exalfactione.

¶ *Spongos,*

¶ *Spongios, Spongia.*

Spongia usta
Spongia mar-
tem au-
liari eru-
tionibus
inguinis.

Spongia usta, acris est & digerentis potentia. Utebatur ea præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardente, ut & crusta parti induceretur, et ipsum spongiæ corp⁹, seu operculum adhereret. At verò spongia nova, non sicut lana aut linamentum, materia duntaxat est quæ humores irrigandos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Quare vulnera glutinat, si aqua, aut oxycrato aut vino admoveatur imbuta: aqua sanè, quæ antiqua est, longo spacio relinquatur.

¶ *GARYS.*

GARYS.

Facultatem habet admodum calidam atq; siccam. Proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putrescentia, tum dysentericis ischiadicisq; injiciunt.

¶ *Halme, Salsugo.*

Halme.
Salsugo.

Similiter garo ad putredines accommodatur: & ad ischiadas & dysenterias injicit. Etenim acrimonia sua humores coxam infestantes attrahit: ob idq; per intestina evacuat: putrescentia verò ulcera in dysenteria colluit, & siccatur. Maximè tamen salsugine salforum filulorum & manidum ad talia Medici utuntur.

GALENI LIBER DE
substitutis.

Substituta medicamenta dicuntur, quæ in alterius locum substitui possunt: quorum sanè cognitio, plurimum ad medendi usum confert. Plerumq; siquidem destituti Medici ijsq; ad morbum exterminandum maximè expedire arbitrantur, neq; expendentes ea quæ similem ferè vim obtinentia, vice illorum assumi possunt, ægris opitulari nesciunt. Quod ne tibi aliquando contingat, en subdimus omnia pharmaca substitutas ordine literarum disposita.

P R O

S U B S T I T U E S

A Brotono
Absinthio

Origanum.

Abrotonum.

Acacia

Succum lentisci.

Acoro

Radice asari.

Ærugine

Atramentum sutorium.

Amianto

Aphronitrum.

Agallocho

Calamum odoratum.

Agarico

Euphorbium, aut epithymum.

Alga

Anchusam.

Aloe Indica

Aloës viridis folia, folium, vel glaucium, vel fimum Ibis, vel Lyciū, vel cærausalem fossilem. (rium.

Alumine

Anisum.

Ammi

Propolim.

Ammoniaco thym.

Cappadocum salem.

Ammoniaco sale

Acorum.

Amomo

Gyrin siccam.

Amylo

Absinthium.

Amygdalis amaris

Hyacinthum.

Anchusa

Daucum.

Aniso

Sesamum.

Arace

Aristolochiam longam.

Aristolochia rot.

Sisymbrium.

Argemone

Atramentum Indicum.

Armenio lapide

P R O

S U B S T I T U E S

Asbesto

Adarcem.

Aspalatho

Ericis semen, aut viticis.

Alphodelo

Succum betæ.

Asaro

Zingiber.

Alio lapide

Gagatem, aut salem ammoniacum tostum.

Auripigmento

Sandaracham.

10 BAlaustio

Malicorium.

Bdellio

Sphagnum odoratum.

Bitumine

Picem Brutiam humidam.

Brutia pice

Picem in aceto fervefactam

Buccina

Ostreum.

Bupresti

Lafer, aut hirudinem.

Butyro

Lac bubulum coactum.

CAdmia

Leucographin Aegyptiam.

Calamo odorato

Sphagnum.

20 Canchri

Baccas lauri.

Cantharidibus

Phalangia.

Capparidis radice.

Ericæ radicem aut myricæ.

Cardamomo

Fructum myrti.

Casia

Cinnamomi dimidium.

Castorio

Silphium.

Cedria

Ladanum.

Ceraunio

Leucographin.

Cervine adipe

Anseris adipem.

Cera

Fabam fresam cum propoli coctam & tritam.

Cervi cornu

Caprinum.

Cerussa

Scoriam plumbi.

Chalbane

Sagapenum.

Chamaedry

Lapathi radicem.

Cicuta

Semen coriandri.

Cinerula Cypria

Cinerem foliorum olivæ

Cinnabari

Rosaceos pastillos.

Cinnamomo

Cassia duplum.

Clinopodio

Heliotropium.

40 Cnico

Viticis semen.

Colocynthide

Ricini semen.

Colophonia pice

Apochyma.

Corallio

Moly, aut symphytum.

Costo

Cedri fructum.

Cotyledone

Anagallin.

Crinanthemo

Aphrodisiam.

Croco

Crocomagma.

Crocomagmate

Agallochum Indicam.

Crocodili adipe

Canis marini adipem.

50 Cumino

Brassicæ semen.

Cynosbato

Solani vesicariæ semen.

Cypero

Juniperum magnam.

Cyphi

Caricam ustam.

DAmasonio

Eryngium.

Dauci semine

Sij semen,

Dictamno

Salviam

Diphryge

Phrygium lapidem.

Dorycnio

Alterci semen.

60 Dracontio

Aron.

EBeno

Loti arboris lignum.

Ebisiradice

Folia mori.

Elaterij succo

Ejusdem herbæ succum.

Elleboro nigro

Papyri radicem.

Enneaphyllo

Potamogitonem.

Bb iij

PRO	SUBSTITUES	PRO	SUBSTITUES
Epithymo	Colocynthis semen.	Myrrha Troglodyti	Calamum odoratum
Ericis fructu	Gallam immaturam.	Myrrhi oleo	(de Mori succum.
Erini foliis	Stercus ibis.	Misy Cyprio	Ochram Cypriam.
Erucæ semine	Erysimi semen.	Misy tosto	Diphrygem.
Erucis pini	Vespas cum cedria.	Nardo Syriaca	Juncum odoratum.
Eryfimo	Struthij succum.		
Euphorbio	Stercus columbæ agrestis.	Napi	Rapæ semen.
Eupatorio	Chamæpityn.	Nepita	Agrestem mentham.
		10 Nucleis pineis	Cucumeris semen
		Nuce pinea	Gallam.
Felle cameli	Fel Ascalaboti.		
Felle mustelæ	Fel cameli.	OChra	Misy Cyprium.
Felle hyænæ	Fel perdicis.	Ocimo	Sifymbrium.
Fellæ viperæ	Fel ichnevmonis.	Ocimoide	Mentham agrestem.
Flore æris	Squamam æris.	Oenanthes succo	Vitigineum succum.
		Oesypo	Viruli medullam.
Galla	Palæstræ sordes.	Oleo Cicino	Laurinum, aut vetus oleū.
Gentiana	Radicem apii odorati.	Oleo veteri	Fervefactum duplum.
Glycyrrhizæ succo	Mori succum.	20 Olivæ lachryma	Hypocistis succum.
		Omphace	Gallam immaturam.
Hedere succo	Perseæ succum.	Opobalsamo	Guttam myrrhæ.
Hedychroo	Amaricinum.	Opopanace	Lac sycamini.
Hyacintho	Florem Isatidis.	Oryza	Farinam hordei.
Hyænæ adipe	Vulpis adipem.	Orminio	Lini semen.
Hyoscyamo	Solani vesicariæ semen.	Ornithogali	Anthyllin.
Hippuri	Ajugam.		
Hyperico	Anethi semen.	Papaveris succo	Mandragoræ succum.
Hypocistide	Acaciam.	Phu	Sphagnum.
Hysso	Thymum.	30 Pipere	Zingiber.
		Pipere albo	Nigri duplum.
Iri Illyrica	Helenium odoratum.	Polij semine	Erucæ semen.
Junco odorato	Cardamomum.	Polypodio	Chamæleonis radicem.
Junco palustri	Polygoni radicem.	Polytricho	Abfintium.
		Pompholyge	Cadmiam ustam.
Lapathi radice	Pyrethri radicem.	Populi gemmis	Sampsuchum.
Lapide phrygio	Lapidem argyritem.	Propoli	Ladanum.
Lapide asio	Gagatem lapidem.	Psyllio	Lentem palustrem.
Lapide pyrite	Lapidem pyrobolon.	Pumice	Terram Creticam.
Lauri baccis	Serpyllum aridum.	40 Pyrethro	Zingiber.
Lathyri	Granum Gnidium.	Quercus visco	Chamæleonis viscum.
Lentisco	Terebinthum.		
Lepidio	Rubiam.		
Lepidii radice	Folia capparis.	Rapa	Heliotropium.
Lepore marino	Leporem fluvialem.	Raphanino oleo	Ricini oleum.
Lini semine	Fabulum.	Refina pini	Terebinthinam.
Loti semine	Betæ semen.	Roseis pastillis	Sinopidem.
Lupiadipe	Ursi adipem.	Rosis siccis	Perseæ folia sicca.
Ligustico	Pastinacæ semen.	Rhu Syriaco	Oxyacanthæ fructum.
Lyfimachio	Spinæ Egyptiæ semen.	50 Rubigine	Squamam ferri.
Magnete	Hematitem lapidem.	Agapeno	Refinam pini siccam.
Malabathro	Nardum Indicam.	Salvia	Calamintham.
Malo cydonio	Melilotum.	Salamandra	Lacertam viridem.
Malva	Fœnumgræcum.	Sale ammoniaco	Salem Cappadocium.
Mandragora	Dorycnium.	Sambuco	Spinæ viridis folia.
Manna	Thuris corticem.	Sampsucho	Rhus coquinarium.
Mastiche	Lentisci caulem.	Santonico	Abrotonum.
Medulla cervi	Viruli medullam.	Satyrio	Erucæ semen.
Melitoto	Lotum herbam.	60 Scammonio	Ricini semen.
Melle	Sapam.	Scilla	Bulbum esculentum.
Melle Attico crudo	Mel despumatum.	Scoria plumbi	Plumbum productum.
Meo	Myrobalanum.	Scoria Cypria	Melanteriam Egyptiam.
Myrsinite	Succum mori.	Sempervivo	Lactucam.
Molybdæna	Lithargyron.	Sepiæ crusta	Pumicem.
Mori succo	Rubi folia.	Sesamo	Lini semen.
Myrobalano	Glaucium.		

PRO	SUBSTITUES
Sesamoide	Amarathi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sifone	Anisum.
Sifymbrio	Ocimum.
Solano vesicaria	Semen solani hortensis.
Sphagno	Juncum odoratum.
Spondylion	Folia olivæ.
Stercore vulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi.
Stercore felis	Ichneumonis stercus.
Stibio	Aeris squamam.
Struthii radice	Ellebori nigri radicem.
Succo calpasi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succorhododaphnes	Viscum quernum.
Succo cyrenaico	Syriacum succum.
Succo papaveris	Mandragoræ succum.
Succo salicis	Hederæ nigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
Succo panacis	Lac sylamini.
Succo polygoni	Succum Plantaginis.
Sulfure vivo	Sandaracham.
Symphyro	Centaurium.
Seri	Lithargyrum.
Terra Samia	Leucophragen terram.
Terra eretria	Calcem Thebaicam.
Terra alana	Plumbaginem.
Terra asteri	Cimoliam.
Terebinthina	Mastichen.
Thapsiæ succo	Chamaeleonis nigri succum.
Thymo	Satureiam.
Tithymalo	Chamaeon.
Thure	Ampelitin terram.
Verbenacæ	Chamelæcen.
Viola	Florem radicula.
Vino Rhodio	Austerum vinum.
Vino Falerno	Vinum Mendesium.
Visco quercino	Chamaeleonis albi viscum.
Vulpis adipe	Vrsinum adipem.
Vulturis stercore	Columbinum stercus.
Uva domestica	Pulpam palmularum Syria- earum.
XYlobalfamo	Radicem violarum albarum.
Zingibere	Pyrethrum.

GALENI PERGAMENI
de compositione medicamentorum secundum genera, lib. I.



Quandoquidē ex cōmentario quem jam pridē de cōpositione medicamentorum conscripsi, priores duo libri, quæ exierāt in lucē, unā cum aliis in apotheca, quæ ad viā sacra est, perierunt, dum Pacis delubrum totum, & ingētes Palatii bibliothecæ maximo conflagnarunt incendio: equidē amicorum precibus victus, cogor nunc illos eosdē recudere: idque ab eodē initio auspiciatus, a quo in illis exorsus fuerā. Siquidē statim in auspiciis primi cōmentarii monebā, esse exterminandos sophistas, qui traditionem medi-

caminum compositorum ē medio tollunt: nonnulli quoque simpliciū peculiare quoddā facultates inficere inficiantur eos etiā excipientes scōmate, qui de illis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeo vires medicamentorum ignorant, ut nesciant prorsus, a marino lepore pulmonē solum exulcerari: vesicam solam a cantharidibus. At verō Emperici cognoscunt quidem ex erugine cerato simplici admixta, confici optimum sarcoticum medicamē: tamen si neutrum eorum per se, carnē gignere possit: qua autem ratione id contingat, ignorant.

Sunt igitur vires medicamentorum simpliciū, non generatim tantum, sed particulatim etiā investigandæ. Siquidem non sat est nosse hoc pharmacum calfacere, nisi etiā quo gradu id efficiatur. Calfaciunt quippe resine omnes: attamen majoris minorisque ratione plurimum inter se earum calores differunt. At qui in curatione particulæ impēsē refrigeratæ, medicamē admovebimus

admodum calfaciens: illi verō quæ paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditū.

Merito itaque nos quatuor ex calfacientium ordines statuimus, separātes a modicè calidis ea quæ evidēter ejusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna tum quæ vehemēti adeo, ut urere jam videantur: atque in singulis hisce ordinibus latitudinem momentaneam cōstituentes: similique in excessibus reliquarum qualitatū, ratione. Porro medicamentorum materiæ, quædam sanè a plantis, quædam a metallis, nonnullæ ab animalibus proficiuntur. Jam verō præter simpliciū omnium medicaminum facultates, omnium etiā præter naturā affectuum differētiās ad unguem novissime expedit. * Quippe primus curationis scopus a morbosicis dispositionibus nascitur: cum quibus simul indicat curationē natura particulæ affectus. Sed aeris etiā nos ambientis temperiem, constitutionemque: præterea ætatem, tempus, regionem, vitæ studia, & mores, multum præstantissimi Medici unā cum illis inspiciunt. Ergo si simplicibus tantum medicamentis, universos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquā egeremus compositis. Quum autem sapenumero aliquatenus calfacere corpus volentes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex variis unum conficimus medicamē, quod eodem, quo affectus, gradu a mediocritate recedens: id quod ex usu est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamēti miscellam, non posse adhiberi in emplastrum: alia, nisi retundantur, aut mitigentur, administrari non posse. In morbis etiā qui contrarias simul facultates desiderant, ut, repellendi & digerendi, detergendi ac lævigandi, vel attenuandi simul & incrassandi humores, maximus compositionis medicamentorum est usus: nec secus ubi unicum medicamen habere cupimus, quod multis venenum ejaculantibus feris, ac pharmacis exitiali adversetur.

Quum autē oleum vetus & adeps, vim digerendi fortiantur: chalcitis autem & palmæ succus, repellēdi, astringēdi: ex his ipse pharmacum phœnicinum dictum composui, glutinandis ulceribus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis accommodum: quo jam complures utuntur. Etenim ratio compositionem invenit

Sarcoticum optimum conficitur ex erugine cerato simplici admixta

Resina omnes calfaciunt

Calfacientium ordines quatuor: quos etiam reperire est in ceteris qualitatibus.

Medicamentorum materia unde proficiuntur.

Scopus curationis primus a morbosicis dispositionibus nascitur.

Compositis medicamentis in curandis.

Phœnicinum pharmacum compositum est.

nit: experientia, de inventorum virtute decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithargyrus, donec cōsistentiam consequatur emplasticam. Adeps porro ipse si tū insulsus, tum vetus, quē admodum etiā oleum: quæ sanè quò vetustiora fuerint, eò digerēt promptius, plegmonæq; diuturniori atq; contumaciori erunt magis accommodata. Verū ad incipientes atq; augeſcentes phlegmonas, ut quas astringere atq; refrigerare oportet, præstat emplastrū ipsum ex vino, vel aceto, vel aqua, vel oleo immaturo. vel astringente, liquare. Cōmunis autem compositionis modus est talis. Vetusti adipis lib. 2. olei veteris lib. 3. Lithargyri tantundē. Chalcitidos unc. quatuor. Liquato adipi reliqua eleganter atq; artificiosè misceatur, ferveſcātq; simul, ac rudicula palmæ viridi & succulenta moveantur, donec sibi emplastri cōsistentiam cōtraxerint. Quo quidem medicamine, ad ulcera quæ nō facilè cicatrice obducuntur, & ad cruenta est utendum. Auxilia tur etiam inflammationibus, articulorum morbis, bubonibus, phymatis, ambustis, pernionibus, fracturis, contusionibus, rhevmaticisq; universis constitutionibus, cujusmodi plures solent Romæ invalescere. Ceterū in phlegmonarum principiis vim repulſoriā esse validiorem oportet: in incrementis verò, hæc imminuenda: quæ digerit virtus, augenda est. Vigente phlegmone, partes invicem esse cōvenit facultates, nisi vehemens dolor pharmacum leniens requirat. At inclinante phlegmone, vim digerendi augebis. Quæ ex methodo licebit tibi secundū varias indicationes uti prædicto emplastro, variis oleis atq; succis liquato. Ego verò ad phlegmonas erysipelatosdes soluto ipso ex rosaceo utor. Cui etiā si æstas fuerit, uvæ acerbæ simul & portulacæ, vel sempervivi succū immisceo. Quippe uvæ acerbæ liquor per se, plusq; oportet astringit: tanta aut astrictio lædit erysipelata, ut q̄ calorē ipsorum, cutē dēſando, includat. Igitur in exactis erysipelatis, ea q̄ advētia sua frigiditate auxiliatur, ubi cōperint incallescere, sunt mutanda. Postea verò quā incendiū cōquieverit, aut si nec perfectū planè ab initio erysipelas fuerit, *haud amplius ascititiā frigiditatem desiderabimus: verum ijs succis diluemus phœnicinū emplastrū, q̄ moderatè refrigerēt. Ab his jam & lini seminis, & chamæmeli succū miscebimus: ipsoq; solo, sed fuso postea utemur emplastro, nihil aliud illi miscentes. Quod si quando lividum, ob refrigerantium usum, erysipelas ipsum evaserit, solū phœnicinium emplastrum, veteri oleo liquatū, id discutere potest: quò tēpore partes lividæ, aqua foveantur calida, atq; etiā scarificatur. Sunt q̄ calcis vivæ nonnihil ipsi pharmaco immisceat. Intrepidè itaq; in rhevmatis affectionibus hoc utor medicamine: utpote quod tum astringat, tum digerat, tum robur particularum cōfirmet. Etenim non semper ob calorē immodicum fluxione affliguntur particulæ: sæpe siquidem ob propriam imbecillitatē, quæ ab intemperie frigida ut plurimum proficiſcitur, tali corripiuntur affectu. Quare si humectet eas q̄ spīa, calfaciatq; medicamētis lavatibus, dissolutæ prorsus & imbecillæ fient. Sin tumores vehemēter astringat, initio quidem juvare videbitur: ceterū quod ex

eis reliquum est contumax atq; scirrhum reddiderit. Sed neq; id genus dispositiones ferūt nimis astringentia medicamenta, ut à quibus dolore & tensione affligantur. Atqui omnis dolor inflāmata exacuit, irritatq; & fluxionibus occasionem præbet, vel si rhevmatica intēperie æger non afficatur.

Sunt autem complura medicamenta, q̄ pharmaco cui miscentur, vim nullam aut pexiguam exhibent, cōmoditatem verò materiæ præstat, ut vel emplastri, vel cerati speciē referat. Atq; ex eorum sanè genere existit argēti spuma, nullam insignem possidens facultatē, præter siccandi modicū. Quæ ratione attrita femora ex itinere adjuvat. Est aut ex ijs pharmacis quæ liqueſcēre possunt, etiā argēti spuma, quam Græci lithargyron vocant: ut chalcitis quoq; & misy. Ceterū chalcitis quidem omnī celerrimè funditur: tardissimè argēti spuma: at in horum medio ærugo & misy cōsistunt. Porro candidū medicamē, quod ad parva ulcera utor, ex oleo, aqua & argēti spuma conficitur, ita ut libris duab; aquæ, tres quā purissimi splēdidissimiq; olei, totidēq; spumæ argēti injiciatur. Debent aut simul coqui ad ignē minimè fumidū, idq; in loco sub dio atq; soli exposito. Siquidē ut ær nubilus pharmacū ipsum denigrat, sic syncerus ad candorē eius plurimū cōfert. Hòc aut fiet glutinantius id medicamē, quò plus liquoris indideris. Aqua etenim substantia propria semper humectat, refrigeratq; At oleum si recens sit, pharmaco minimè reluctatur. Permanet itaq; humidum, ac modicè frigidum, quali maximè tenera corpora & cacochema indigēt. Ergo hujuscemodi emplastrum, pruritus, desquamata, & ut uno verbo expediam, ulcera exigua perſanat: utpote exulceratis partibus ne quid influat, impediens: & quod jam influxit, de nuò ad partes circumstantes retrudens. Adverte autem nullum humectans nec propria ratione, nec ex accidenti esse ulceribus utile.

Conficitur etiam pharmacum id ex oxaleo & lithargyro. Ceterū medicamē mediocriter siccās sit, si utriusq; nēpe olei & aceti, duplo major portio quā argēti spumæ misceat. Copiosior verò duplo utriusq; mensura, valētius facit pharmacum. Ipse enim triplam utriusq; nonnunquā miscens, tota die medicamē coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectū, colore atro splēdescit, maximaq; siccādi potentia pollet, ita ut curet ulcera cōtumacia, cruenta glutinet, fistulasq; in calum non induratas, adducat: ac breviter, citra morſum exiccet.

Ex œnelæo etiam lithargyroq; similiter medicamen paratur. Equidem per æstatē sub sole ardentem, ex vino Falerno, aut alio tenuiū partium, lithargyrum conterere soleo, idq; cōtinuis quindecim diebus. Quib; exactis, medicamē ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rhevmaticis affectibus utor, necnon ad vulnera glutinanda. Cruda itaq; ac per se argēti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto aut aut vino trita, siccataq; ulcerū quæ ob humiditatē ægrè cicatricem recipiūt, remediū fit. Quod si ipsa cupis roſionis expertē, elora utor. Ac minimū quidem roſionis exhibet, si vino vel aceto abluatur. Cōvenit tamē curiosè toto die cōtrita, cū liquore pnoctem

Roma incaleſcere complures dispositiones rhevmaticas. Phlegmonarum curatio.

Emphacis facultas.

Erysipelatis curatio.

Licentis erysipelatis curatio.

Emplastri phœnicini facultas.

Fluxionum causa.

Dolor inflammationis exasperat fluxionibus, occasionem præbet.

Lithargyri facultas.

Chalcitis omnium celerrimè funditur. Candidum medicamen Galeni.

Ærē nubilum denigrare pharmaca, syncerum conferre ad eorum candorem.

Aqua propria facultas.

Candidi emplastri Galeni facultas.

Ulceribus nihil humectans est utile.

Lithargyri præparandi ratio.

Lithargyri facultas.

Lithargyri redditus expertis roſionis, si ex vino vel aceto abluatur.

rem relinquere: quem postero die mane effunde-
mus, aliū denuo instillantes, ac postea rursus tun-
dentes: id quod singulis diebus facere sub ferve-
ti sole (hoc enim sit cōmune pręceptum in lapi-
dosīs omnibus) minimē desistemus, donec unā
cum humore ceu quidam flosculus ipsius argē-
ti spumę cernatur.

Quę ex lithargyro cōponuntur, fieri possunt
etiam ex molybdęna. Ceterum molybdęna sub-
stātię crassioris ac frigidioris quā lithargyrus
est: ac medicamenta quę ex ipsa parantur, cine-
ritia redduntur. Quum igitur discutere quid vo-
lueris, lithargyro potius quā molybdęna utitor.

At cerussam vel coloris causa ad emplastra cā-
dida conficienda medici lithargyro immiscunt:
velut quandam astringendi refrigerandiq; vim
medicamēto concilient. Sed resinam etiam inji-
cere assolent, quō sequax ac sibi continuum fiat
pharmacum. Verum quū mitissimę omniū resi-
nę sint tum terebinthina ipsa, tum illa quę larix
dicitur, has miscere pręstiterit, dum conficere ta-
le medicamē est animus. Multo etiam leniora ta-
ctu omnia fiunt, tum quę resina constant, si cerę
quid adjiciatur: tum quę ex cera, si modicū resi-
nę recipiāt. At candido emplastro alba cera desi-
deratur: quā, si spē sit nata, prius abluere oportet:
nimirum liquātes ipsam, ac mox in aqua fon-
tis mergētes, cōmoventes, & repurgantes: qua-
ratiōe etiā pix, resina & physēma, abluēda sunt.

Ubi igitur cerussę, spumęq; argenti adeo prę-
coctis ut minimē inficiāt manus, cera simul cū
resina fuerit admista, candidum emplastrum ha-
bebis, cui aquā aut oleum miscere poteris. Ex o-
leis autē omphacinum, Hispanicumq; pharma-
co vim astrictoriam adjiciunt. Istrictū verō cum
exigua astrictione quandam amaritudinē refert.

Atq; principio ulceris, finiq; potiora sunt astrin-
gentia: dulcia autem in mediis. Ponderus ergo hu-
jusce emplastri sit tale: Cerussę, lithargyri, singu-
lorū lib. j. olei lib. 2. cerę lib. 1. S. Terebinthina unc. 3. Quibus omnibus licebit tantū thuris, quan-
tū & terebinthina, aut etiā dimidiā portionē
addere. Quia industria medicamen maximē ano-
dynam reddetur, sed ad cicatricē inducendā ine-
ptius: quandoquidē ex ipsius usu caro ulceri ex-
crescet, quū thus sit facultate sarcoticū. Taceo
laxātia medicamenta corporibus plenis & caco-
chymis admota, fluxū ad affectas partes citare.
Satiū itaq; fuerit, tum ad cicatricē inducendā,
tū ad digerendū exactius, aluminis scissilis, can-
didiq; unam, piperis semenciā miscere.

Candidi ex pipere medicamēti, quod ad senū
ulcera, & eorū qui mollem sotiūtur cuticulam,
perfanāda est efficax, quodq; refertur ad Attalū
regem nostrum, qui olim Pergamensibus impe-
rabat, compositio habet in hūc modum: Argen-
ti spumę, cerussę, sing. lib. j. olei lib. 2. cerę lib. 1. S.
terebinthina unc. 3. thuris vel tantundē, vel me-
dia pars aluminis drac. 6. piperis drach. 3. Verum
apud Romanos librari quidem dicuntur solida,
ut mēsurari humida. Metallica in primis sub so-
le coquuntur, donec duriusculam cōsistentiam
adipiscantur: quibus reliqua postea misceri de-
bent artificiosē. Hoc pharmacū ulceribus humi-
dioribus, atq; abrasis medetur.

Alba quę oleo recēti, & aqua citra piperis atq;

thuris misturam confici docuimus, vehementer
cōmorfas partes offendunt. At minus illis Atta-
licum lędere solet, eō quod terebinthina, oleū
vetus, thus & piper, adjecta sunt. Ad commorfa-
nāq; minimē alumē conducit: quum opus hic
sit non astringentibus, sed abundē extrahentib.
ea: quę in alto nervos punctos affligunt, & ve-
nenatam animalium salivam. Distinguenda au-
tem sunt cacoethe ulcera, ab iis nō quę faciliē ad
cicatricem perveniunt: quum non omnia caco-
ethe ulcera agrē cicatricē admittāt. Porro blan-
dius medicamentum, ad sedandūq; dolorem
cōmodius conficere vis, aliquid adipis anserini,
vel gallinacei, vel procini immiscebis. Sic nanq;
magis anodynum effeceris: minus tamen idoneū
cicatrici inducendę. In universum autem, nemo
probē uti possit medicamēto cōposito, qui sim-
plicium vires prius non accurate didicerit.

Aliud albū Andromachi. Lithargyri, cerussę,
sing. minam Atticam. j. cerę partem quartam re-
sinę terebinthina tandundem, olei herminas 3. a
quę heminas duas. Cōficito. Nōnulli porro un-
cias 20. minam continere tradunt: nonnulli sex-
decim. Atqui miretur quispiā, quomodo Romę
degens, pro libris nominarit heminas: cui urbi
sunt familiaria vocabula, libra, sextarius, & un-
cia. Ex multis aut medicamentis jam pridem cō-
scriptis, priusquā potentia Romanorū usque-
adeo crevisset, sum cōjectura assequutus, quā il-
li vocarent heminam, fuisse æqualem novē un-
ciis unius librę Romanę.

Aliud album Andromachi. Argenti spumę
drach. 160. cerussę drach. 200. cerę drach. 50. te-
rebinthina drach. 24. olei heminam 5. aquę cya-
thos 6. Conficito.

Aliud candidū ab Hera descriptum. Cerę al-
bę Pont. lib. 2. lithargyri chrysidis lib. j. cerussę
tantundem: myrrhę, medullę cervinę, singul.
unc. 2. thuris insecti unc. j. olei veteris sextarium
unum. Lithargyrus oleo incoquit: ubi verō sor-
dium crassitudinem acquisierit, cera, mox cerus-
sa, aspergitur, moveturq;. Ubi unita fuerint, nec
jam polluat: ab igne extractis medulla injicitur.
Postquā refrixerit medicamentum, myrrha &
thus alijs miscetur. Deinde emollitū, subactūq;
manibus, ad usum servatur. Etenim rabidorum
morsibus auxiliatur, tum vulneri impositū, tum
mole avellanę nucis, catapotij instar exhibitū,
quadraginta diebus. Ad hęc, abrasa, suggillata,
& ulcera quę difficulter admittunt cicatricem,
perfanat: ad aliaq; pleraq; est utile. Ego tamen
propinare pharmacum hoc contra canis rabidi
morsus, nunquam fui ausus: quum haberem a-
liud, nempe ex cancris confectum medicamen-
tum, ad sanandos illos maximē efficax. Iis enim
remediis ipse uti semper conatus sum, quę licet
nonnunquam pręsidij quod allatura essent, du-
biam spem promitterent, neutiquam tamen ob-
esse possent. Porro Heras cum heminam scribit,
sextarij Romani dimidiū indicare videtur, con-
tinētis uncias viginti, quas cornibus majori ex
parte metiūtur, incisis extrinsecus lineis quibus-
dam orbicularibus. In universum aut, nisi me-
tallica medicamēta plenius coquātur, emplastrū
ex eis constans adeo friabile edetur, ut adherere
cuti absq; deligatura non possit. At coquuntur
largius

Compositis
quę conveni-
ant medica-
menta.

Cacoethe ul-
cera non om-
nia esse dys-
pnoica.

Compositis
revenue mo-
uti poterit,
qui simpliciū
vires prius
non didicerit
Candidum
Androma-
chi.

Heminam
fuisse æquale
novē un-
ciis librę Ro-
manę.
Candidum
aliud Andro-
machi
Candidum
Hera.

Morsus rabi-
di canis auxi-
liari medica-
men ex can-
cris confectū

Sextarium
Romanum
continere
uncias 20.

Metallica
plenius co-
quenda esse
ut adherent.

largius, dum maiorem liquidorum mensurā in mistura cōtinent. Quod verò ad adipis differentiā pertinet, in omni animantium genere juvenilia perfectis humidiorē, minusq; calidum adipem possident.

*Candidum
Mnasei.*

Album quod ad Mnaseū refertur, ad diuturna & difficilia cōferens. Lithargyri, cerussæ, singulorū drach. centū: cerę drach. 50. terebinthinę, thuris, sing. drach. 25. aluminis fissilis drach. 12. olei heminas 2. Nec verò differre putetis, si drachmas centū alicubi scriptas loco unius librę inveniat. Libra siquidem drachmas sex habet ad nonaginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic & hujus rursus dimidium, viginti quatuor.

*Librā constare
drach. 96.*

*Dyssepulotica
ulcera
quā dicātur.*

Porro quę ulcera ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrium oriuntur, ita tamen ut locus affectus huiusmodi in se dispositionē non habeat, qua influentem humorē, quamvis bonū, corrumpat: ea dyssepulotica, hoc est, ægrē pervenientia ad cicatricem appello. At quę dictam dispositionē sortiuntur, singulari vocabulo cacoethe, hoc est, malignantis naturę vocantur. Qui

*Ulcibus dy
sepuloticis
atque mali
gnis, qualia
medicamen
ta conveni
ant.*

bus sanē omnibus illa medicamēta cōveniunt, quę absq; rosione & morfu deficcēt: quęq; præterquā quod nō erodant, aut manifestō astringant, detergere etiam possint. Siquidem plurima eius generis ulcera, ceu ab exesione malignorū humorū sint cava reddita, impleri postulat. At qui omnia quę carnē gignunt medicamēta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa etiam alia siccā possident vim, ulceribus id genus curandis cōmodam. Eorū tamē meminisse impræsentiarum oportet, * q̄ aut tueri cōfecti emplastri candorem possint, aut nō usque adeo vitiare. Talia autem sunt, cadmia, pompholyx, calx, ostrea cōbusta, purpura, buccina, & sepię pars ossea. Parū officiet colori, & eris squama: & exusta chalcitide, id quod cinereū est, aut subalbidum. At verò dictorū quodq; si lavetur, totā rosionē amittere: quemadmodū tū cera, quę medicamini cōficiēdo admiscebitur, tum resina. Ceterū ut cera Tyr

*Cera Tyrrhe
nica.*

rhenica vel Pōtica est ad candidi emplastri præparationē præstantior: sic resina, tum quę larix, tum quę terebinthina appellatur, ad ulcera malignatā magis cōducunt. Sed thuris aliqua portio etiam indēda est, ut ulcerum malignorū ipsa dispositio coquatur, & ad suppurationē perveniat. Jam verò ad prætumida ulcera, ex aceto & marina curiosē lavigari debēt metallica. In quibus autem acre & mordax est quod in ulcera fer

*Metallica ab
luendi modi
diversi.*

tur, ex aqua potius macerāda singula sunt: quę admodū magis ex vino, ubi copiosus humor alceribus influēs apparet. Ubi igitur lithargyri cerussæq; utriusq; libram unam cum tribus olei, & selibra aquę simul & accuratē coxeris, resinę terebinthinę, aut eius q̄ larix dicitur, ternas uncias injicito: cerę autem duplum sufficit: nam thuris sat erit si uncia & semissem post ceram & resinā indideris. Deinde metallicorum tres uncias ad

*Unciam con
stare octo
drachmis.*

des, quas drachmę quatuor & viginti cōstituūt. Impones aut duorū, trium, plurium, atq; omniū quę numeravi: ita ut si omnia habeas, æquā singulorū portionē injicias, cadmię nempe, pompholygis, buccinarum cineris, vel ostreorum, & æris squamę, singulorū denarios septē, qui tres uncias absolvūt. Quod si calcē lotā immisceas,

singulorum drachmę quinę ponentur. Si ustam chalcitidem, singulorum drachmę quaternę, sic ut ex omnibus in unum cōeuntibus, tres tantū unicę conflentur.

Candidum emplastrū Damocratis, ad abrasas, ambustas & ulcera summa in cute suborta.

*Candid.
Damocr.*

Cerussę lib. j. lithargyri, trypherę, sineg. unc. 16. cerę Pōtica unc. 5. terebinthinę purissimę unc. j. thuris mānæ, vel thuris unc. 5. olei candidi lib. j. aquę sextarius. Conficiatur ut decet. Porro in iis qui molli sunt carne, in senibusq; aut iis q̄ malo sunt præditi corporis habitu, aluminis licebit etiam quatuor uncias miscere.

G A L E N I P E R G A M E N I

de compositione medicamentorū secundum genera, lib. I I.

U T igitur si quādo perdiderimus librū, cui inscriptę insint medicaminū consuetorum compositiones, similia reficere amissis valeamus, necessariū in primis est, nos universalem quandā viā formulam didicisse, qua propositum inveniamus: dein verò secundum hanc in multis particularibus exerceri, scientes absq; tali exercitio nullū posse rectē opus absolvi. Proponatur itaq; nobis cavum ulcus curandum. Etenim docti ab ipsa ratione cavorum ulcerū curationē subministrari succrescente alia carne loco deperditę, ex ea videlicet quę subjecta est: cogitamus fieri hoc non posse, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas subsit. Verū sordes medicamina detergētia auferūt: humorē, exiccātia discutiūt. Quocirca necesse est huiusmodi pharmacorum materias cognoscere idq; non simpliciter secundum genus eorū facultates considerantes, sed inveniētes etiam quo ordine, quove gradu, aut excessu, singula suas vires sortiantur. Fingamus ergo nobis ad manum tantū adesse cerā, æruginemq; quibus cavū ulcus repleamus.

*Cavi ul
generalis
ratio.*

Quum enim compertum habeamus, ceram quidem solam, ulceris sordes minimē prohiberurā esse, ut quę nec detergere, nec exiccare possit: æruginem aut per se adhibitam, excitatrum tum rosionem, tum phlegmonē, utiq; horum utrūq; vitabimus, mediū aut ex ambobus cōstituemus, ut imbecillius æruginē, sic cera valētius. Quia verò paulo hæc intervallo relinquitur, ab eo quod cōmodē administrari possit, ærugo autē magno id ipsum excedit, ob id sanē multę cerę modicā æruginē admiscebimus. At quantā quantā miscere oporteat, certē ante experiētiā exactē quidē nemo invenire poterit: conijcere autem poterit, judicareq; & ita cōficere pharmacum, ut primò nullum infelicē successum sit habiturū: quemadmodum aliquando ego in quodam vico confeci cum cerę fusę ex oleo rhodino libra unica, unciam unam æruginis temperans. Ceterū validiora corpora validiora medicamenta sustinent: quæ verò imbecilliora existunt, hoc est, humido & molli habitu prædita, haud itē talia perferūt. Duriora itaq; corpora ex copiosiori æruginē cerato admista, recipiūt carnē mollia ex pauciori. Quare ipsa experiētia docebit quatenus vel augere, vel remittere, vel tueri pharmaci facultatē expediat. Sunt namq; omnia medicamenta ei optima, qui affe-

*Ceram p
non cong
re ulceri
sordidus.
Ærugo p
se adhibi
rosionem
phlegmon
excitat.*

*Corpora
da, valida
medicam
ta perfer
posse.
Medicam
ta omnia
esse optim
qui affect
quibus ex
bentur, co
rit.
affe-*

affectus quibus singula offeruntur, cognoscit.

*Viride medi-
camentum Galli.*

Viride medicamentum Galli, ad glutinanda ma-
jora vulnera potentissimum, ab Andromacho
scriptum. Resinae strobilinae drach. ccc. cerae drach.

c. æruginis rasæ drach. i. thuris drach. xxv. Ace-

ti quod sit satis. Hæc Andromachus. Cæterum

quum strobilina resina aliarum omnium longè

calidissima sit: ambabus autem qualitatibus mo-

deratissima, quæ terebinthina vocat: certè mul-

tò satius videtur hanc omnibus medicamentis, quæ

rectè curabunt ulcera, præmiscere: quandoquidem

primus præcipuusque in eis scopus est, ut id quod

offertur, non mordicet. Cõmendanda est autè i-

psius thuris cõmixtio, quæ emplastri consistentiam

adjuvet, dolorè simul leniēs & cõcoquens. Qua-

re si in ea cõpositione equa ipsius portio conjun-

cta ærugini esset, tenacius & mitius ipsum redde-

retur medicamentum: æruginis tamen exiccanti-

tem facultatè exolveret, quæ ulceribus ægrè ad-

mittentibus curationè desiderat. Meminisse autè

oportet, fortium medicamentorum ex aceto die-

bus pluribus contritorum, morsum & acrimoniã

obtudi, vires augeri. Eadè ratio est in metallicis

medicamentis cõbustis. Hæc tamen ex ignis cõ-

mercio nõnihil mordax sive erodens perservat:

quod elota deponunt, ac lenia prorsus reddun-

tur. Proposito itaque emplastro, si ex rosaceo li-

quefacto utaris, præderit sordidis, humidisque, ulce-

ribus. Pura verò erodit: ac inde miscendū ei est

ceratum liquidum ex cera & resina confectum,

vel ex rosaceo, vel oleo liquatum. Est autem olei

nomē unum, qualitas & facultas diversa. Quip-

pe omphacinum frigidius est: ex maturis oleis

pressum, calidius. Temporis autè pgressu, calfa-

ciendi vim auget. Sic etiam quod salem habet,

quantum ex illo sumpserit, tantò calidius est: ma-

gisque, siccatur, quàm quod ipsius est expers. Jam quod

furculos oleæ cõtinet, valentius astringit. Indica-

bit autè quod utilius est, & ulceris forma, & cor-

poris ægri natura. Ulcus siquidem cõtrariis reme-

diis curabitur: corpus ulceratum, similibus. Rosa-

ceum verò præstantissimū esse nosti, quod solis

rosis pluribus, oleo citra salem preparato, plèius

maceratis confectum est. Quæ omnia si quis me-

moriter teneat, nec oblitus sit viriū medicamē-

torum simplicium, is & varia emplastra viridia

componet, & compositorū singulisque rectissimè

uter. Porro durioribus corporib. magis exiccanti-

tia medicamenta exhibenda sunt: min⁹ aut, mol-

lioribus. Ad hæc intendemus exiccatis medica-

menti vim, ubi opus esse videatur, admisto mel-

le: remitemus aut & mitigabimus, ex oleo, & ce-

rato, vel oleoso quopiam. Igitur cavū vulnus in

sano corpore, viridi emplastro, quod ex æruginè

cera & resina cõficitur, liquato ex rosaceo, cura-

bitur. In cuius medicamenti cõpositione, equi-

dem ceræ & resinæ soleo portiones pares misce-

re: æruginis aut duodecima, vel decimā, vel octa-

vam, nimirū pro ulcerum corporumque diversi-

tate. Atque erit sanè duodecima, si ceræ podo, & re-

sinæ tantundem, æruginis uncias duas tempere-

mus, decimāque & octava ad portionem.

Viride Hecatondrachmon dictū, quod cē-

tum drachmas medicamentorum recipiat, ad ma-

xij. mannae drach. viij. resinæ siccae drach. xij. æ-
ruginis drach. viij. sevi vitulini drach. xiiij. resi-
næ terebinthinae drach. viij. ceræ drach. xxx. olei
quartam cyathi partem, aceti quantum satis esse
videatur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnē gignendam efficac.

Aeris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, a-
ristolochiæ, thuris, sing. unc. j. Aloës, myrrhae, gonio.

chalbani, sing. unc. s. Aluminis rotundi drach.

vj. resinæ colophonice drach. cc. ceræ drach. c.

olei hemina dimidium. Misceto.

Viride Pasionis ad extrahendum & dige-
rendum utile.

Resinæ colophonice drach. ccc. ceræ drach.

el. æruginis drach. viij. aluminis rot. tantundem:

squamæ aeris drach. xij. thuris drach. xvj. aeris

combusti drach. viij. Salis Ammoniaci tantun-

dem. Olei dimidium cyathi: aceti quod satis ef-

se videatur. Conficito.

Viride Lite appellatum. Resinæ lib. xij. ceræ

lib. viij. æruginis rasæ lib. ij. Sevi vitulini lib. ij.

aceti lib. so. Ego autem mannae libram injicio.

Liquet igitur acetum cum duabus æruginis li-

bris, & una ipsius mannae, lævigandum esse, ac

dein liquida ipsis miscenda. Hoc medicamen-

tum emollit, concoquitque, adipis atque mannae

ratione.

Porro ad efficienda viridia medicamenta, æru-

ginem non modicam immittere oportet, ut ca-

tera in suum colorem permutet. Quare quæ per-

tinaciter proprium colorem tuentur, ea simpli-

cia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neque in-

ter coquendum est injicienda ipsa ærugo: verum

ubi in mortario unitas facta est, tunc miscenda.

Consilia igitur curandorum ulcerum sunt, sor-

didis adhibere abstergentia medicamenta: pro-

fluentibus exiccantia: atque id quod in fluxu est,

repellentia. At si copiosum & contumax sit quod

fluit, floris causa prius est amputanda. Constat

autem, inflammatorum ulcerum prius esse sanan-

dam phlegmonem: carnem intemperatā, redu-

cendam esse ad temperiem: cui sanè quatuor mo-

dis simplicibus, totidemque compositis, per con-

trarias qualitates succurritur.

Porro ubi sinum implere proponimus, medi-

camentum Isis vocatum, aut Machæionis em-

plastrum liquatū ex copiosiori oleo, per foratum

cornu infundendum est: ad quod etiam pyulcis

utimur. Est autem ipso medicamento tunc mera-

cior utendum, quum sinus oppletus est sordi-

bus: ut soluto ex oleo largiori, dū magis purus

existit. Cæterum si parvæ adhuc phlegmones si-

num infestantis suspicio adsit, medicamentū ex

rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamen-

tum siccū, quod ex charta combusta constat, ro-

faceo copiosior diluentes, ipsi sinui infundimus.

Quemadmodum verò sinus liquidioribus phar-

macis indigent: ita quæ superficiem corporis ca-

va ulcera infestant, crassius medicamentum po-

stulant. Merito igitur in id genus vitii, ceratum

validè abstergentibus admiscemus: in sinibus o-

leum, vel rosacei plurimum. At verò medicamē-

ta quæ ex salibus constant, ubi animus est carnē

gignere, offerenda non sunt. Sal quippe magis

astringit quàm purget: siccatur verò nihilo minus

¶ *Melina emplastra.**Melinorum
atq; viridia
discrimen.*

Quemadmodum viridium emplastrorū plurima, propter æruginem præpollentem talia fiunt, ita quoq; melinorum nonnulla. Sed viridia æruginem incoctam habent: melina verò coctam, sed medioeriter.

Melina Andromachi.

Andromachus igitur cōplura melina scripsit, ad glutinanda ulcera, carnem gignendam, inducendamq; cicatricem idonea: quale est quod subdam. Lithargyri drach. ciiij. olei heminam quidem æstate, hyeme aut tres cyathos: ceræ drach. xlvij. colophonix tantundem: ammoniaci thymiamatis drach. xxiiij. æruginis rasæ, chalbani, myrrhæ, sing. drach. viij. Conficito. Aliud simplex. Lithargyri drach. c. axungix drach. lxxv. olei veteris tantundem. Misce. Convenit enim carne molli præditis, digeritq;. Aliud Heraclidis interiores abscessus sine dolore discutens. Lithargyri, cerussæ, sing. drach. c. ceræ drach. lxxx. resinæ aridæ drach. lx. ammoniaci thymiamatis drach. l. chalbani drach. xvj. olei veteris heminas ij.

*Melinum
Heraclidis.*¶ *Melinum Meneti.**Melinum
Meneti.*

Lithargyri lib. iij. olei lib. iij. terebinthinæ lib. ij. ceræ lib. j. æruginis, thuris, chalbani, sing. un. iij. ammoniaci thymiamatis unc. vj. Conficito.

¶ *Melinum Serapionis, ad vulnera, & ad resoluendum.**Melinum
Serapionis.*

Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis drach. xxviij. ceræ drach. lvj. æruginis Cypriæ drach. ix. myrrhæ drach. j. colophonix drach. lvj. chalbani drach. viij. olei heminæ. s. Quod si æstas sit, quartam partem heminæ. Adverte autem myrrham non sustinere coctionem: quam nec thus, nec aloë ferunt.

*Coctionem
non sustinet
myrrha nec
thus, nec aloë
Hygieni em-
plastrum mi-
si usus.*

Hygieni emplastrū ad multa: q; ad ulcera vix cicatricem ducentia nullum melius extat. Lithargyri chrysitidis minam: ceræ tantundem: chamæleontis nigri radicis drach. xxxvj. æruginis rasæ drach. xvij. chrysocollæ drach. xl. olei veteris heminas iij. Conficito. Præparatur optimè argenti spuma, si intrita vino Falerno sub æstu Caniculæ, dein afficetur.

*Lithargyri
præparandi
ratio.**Emplastrum
ex chamæle-
onte.*

Emplastrū ex chamæleonte, quod cicatricem ulceribus difficillimis, callosis, & inveteratis inducit. Lithargyri minam j. ceræ minas vj. æruginis minas iij. chamæleontis minas viij. olei minam unam. Conficito ut decet.

¶ *De ruffis emplastris.**Ruffa empla-
stra fieri per
longā coctio-
nem ærugi-
nis.**Ruffum em-
plastrum Ga-
leni.*

Quemadmodum propter crudam quidem æruginem fiūt viridia emplastra: propter medio-riter aut coctam, melina: sic ruffa evadunt, ubi liberalius ea coquitur. Manifestum igitur est, melina ruffaq; oleum copiosius, quàm viridia, recipere. Ruffum porro, quo semper mea industria parato utor, in hunc modum coquitur. Argenti spumæ cū oleo prius coctæ, metallica ex aceto lævigata immitto, & sic coquo, donec amplius manus non polluat. Impono itaque olei vetustioris libras quatuor, argenteæ spumæ lib. iij. aceti quā acerrimi lib. ij. Horum trium metallicorū, squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis, sing. unc. ij. Cæterum hyeme plus olei quàm per æstatē miscendū est. Ac sanè hoc medicamē cruenta vulnere glutinat, magisq; in duris corporibus: curatūque difficillima ulcera concoquit. In summa verò, solū hoc sinus glutinat, astringit fistulas, exic-

cat, & prorsus claudit. Ipsum tamē juvat spongia recens veteri vino respersa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, versus ulceris osculum.

*Deligatur
qualis si-
bibenda
bus.*¶ *De iis quæ cicatricem obducunt.*

Quantò autem glutinantia sarcoticis magis dicuntur siccare, tantò glutinantibus epulotica, five cicatricē facientia. Ea tamē ex aliquo astringenti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est) solent administrari. Porro inter ea quæ apud omnes magnificè cōmendantur, inducendæ cicatrici præstantissimum est quod ex cadmia, quodque ex ladano constat.

*Cicatric
obducen*¶ *Emplastrum ex Cadmia.*

Cadmia ustæ, & ex vino præparatæ, chalcitidis tostæ, sing. drach. lxxx. picis colophonix unc. viij. vini Phalerni quod satis est. Conficito ut decet.

*Epuloti-
ex cadm*¶ *Aliud etiam ex Cadmia.*

Cadmia tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis, sing. drach. xvj. ceræ, resinæ frictæ, olei myrtei, sing. selibram: vini Italici quod sit satis.

¶ *Aliud ex Cadmia.*

Argenti spumæ, cerussæ, cadmiæ, diphrygis, resinæ, singul. drach. viij. chalcitidis drach. ij. ceræ, drach. viij. myrtei olei, & vini Aminæi quod satis esse videatur.

¶ *Emplastrum ex Ladano.*

Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singulorū drach. xxiiij. bituminis drach. viij. ceræ unc. ix. myrti heminam, vini tantundem.

*Empla-
ex Lad*¶ *Emplastrum Pyricavton dictum.*

Olei heminæ, aluminis fissi, mannæ, thuris, argenti spumæ, chalbani, singulorum drach. l. ceræ drach. xxiiij. anchusæ drach. viij. medullæ cervinæ, adipis suillæ, æruginis, cerussæ, sing. drach. ij. ovorum trium lutea. Conficiatur ut decet.

*Empla-
Pyrica*

¶ Medicamen Magne dictū, ac verè magnū cōtra ulcera quæ difficulter cicatricem admittunt: quod ex rosaceo dilutum, etiam sedis affectus sanat. Argenti spumæ drach. c. ceræ drach. l. Cerussæ drach. c. terebinthinæ drach. xxv. thuris tantundem: aluminis fissi drach. xij. olei heminas duas. Conficito.

*Medica-
Magne*

Aliud Thelamonis, accommodatum carbunculis, sinusq; exiccans. Pityinæ, ceræ, calcis vivæ, lithargyri, sing. drach. l. cerussæ drach. xxv. olei tres cyathos.

*Empla-
Thelan*

Aliud Moschionis unicè cōferens ad amoven- dum ulceris callum, sanandosque sedis affectus. Argenti spumæ, cerussæ, calcis vivæ, sing. drach. viij. medullæ cervinæ, ceræ, utriusque drach. xvj. olei myrtei quantum sit satis.

*Empla-
Moschi*¶ *Epuloticum medicamen Andromachi.*

Cadmia lib. j. chalcitidis ustæ, ceræ, sing. tantundem: resinæ aridæ lib. iij. myrtei tantundem, Vinum siccis immiscetur.

*Empla-
Androm*¶ *Aliud eiusdem candidum epuloticum.*

Argenti spumæ minam j. cerussæ tantundem: ceræ, resinæ, sing. minas iij. olei heminas iij. aque heminam.

¶ *Candidum Telephanis.*

Argenti spumæ drach. lxx. cerussæ drach. cxx. myrrhæ drach. iij. obo ij. Sagapeni drach. v. thuris drach. vj. obo. iij. olei heminas ij. s. Omnia simul coquito.

*Candia
Teleph*

Aliud ad herpetas, carbunculos, cōdylomata

& rhagadas maximè valēs: quod etiā phlegmōnas arcet. Adipis suilli drach. lxxxviij. ceræ candidæ drach. xlvij. cerussæ drach. xij. argenti spumæ tantundem. Conficito.

At verò nōnulla emplastra cephalica, & catagmatica nominantur, potissimū à calvariæ fracturis, quibus solent opitulari. Sunt autem talia, ab stergendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Pleriq; tamē paululū ex astringentibus pharmacis eis admiscēt: ut id quod affectis partibus influit, repellatur, & abstergentium facultas in altum usq; descendat. Cæterum nisi astringentia conterantur in tenuissimū pollinem, magis ob sunt, quā profint, iis quæ trahēdi vim obtinent.

¶ *Catagmaticū optimum ab Asclepiade traditum, ad confirmanda fracta ossa.*

Argēti spumæ, bituminis, sing. drach. cc. picis aridæ, ceræ, sing. drach. c. terebinthinæ drach. l. aluminis scissilis, propoleos, sing. drach. xxx. ammoniaci thymiamatis drach. xxiiij. æruginis drach. x. olei sextarios quatuor.

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contusiones, atque recentia vulnera, aliosq; affectus complures celebre. Argenti spumæ minam j. picis tantundem: sevi vitulini tantundem. Terebinthinæ drach. octoginta: mannæ thuris tantundem: ceræ drach. xl. æruginis, opopanacis, chalbani, sing. drach. viij. olei cicini, aceti, liquoris sycamini, sing. heminam. picis liquidæ heminæ dimidium. Conficiatur ut decet. Pro mina impræsentiarum intelligo uncias viginti: quarum singulæ pendent octo denarios. Sic itaq; continebit mina, centum sexaginta denarios. Propriè autem dicuntur emplastra cephalica, ea quibus Medici in iis capitis fracturis, quæ ad diploën penetrarūt, utuntur, ad extrahenda ex alto, superficiem versus, nō ossa modò sed his multò magis humores crassos & viscidos, intus delitescentes. Quare acrimoniam quandam sortiantur oportet. Itaq; catagmaticis cephalica generosiora existunt: quæ quidē mista cerato, carnem possunt producere. Quocirca sarcoticis quodammodo sunt similia.

¶ *Cephalicum optimum ad capitis fracturas ab Hera descriptum.*

Squame æris drach. xxv. aluminis, aristolochiæ longæ, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, sing. drach. xxv. myrrhæ drach. xij. sevi taurini, terebinthinæ, pityinæ, sing. lib. iiij. olei heminam: aceti quantum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdē, arcēs phlegmonē, maximèq; ad fracturas, & puncturas nervorum conducens.

Argēti spumæ drach. xxv. bituminis aridi drach. c. picis aridæ drach. l. ceræ drach. l. resinæ pityinæ drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, æruginis, aluminis fissi, propoleos, sing. drach. xv. olei veteris lib. iiij. Conficito.

¶ *Andromachi catagmaticum.*

Argenti spumæ, picis, ceræ, sevi taurini, thuris sing. minam: picis liquidæ, heminæ dimidium: liquoris sycamini heminā: terebinthinæ minam: opopanacis, chalbani, æruginis, sing. drach. viij. ricini heminam. Ammoniaci thymiamatis drach. xxv. Ex vino austero diluitur.

¶ *De emplastris glutinantibus.*

Quidam hæc *επαιμν* & *τρευματικα* nominant:

estq; opus eorū conjungere, & divisas partes conglutinare, reducereq; ad pristinam integritatem. Sunt autem sarcoticis ipsa glutinatoria ficciora.

Ad hæc sarcotica quidē detergendi vim, sed abscisione possident. Glutinantia autem, tantum desiccantia esse debent. Cæterum cicatricæ inducentia medicamenta, præterquā quod astringunt, ficciora etiā sunt glutinantib. Etenim glutinantiū est finis, nullā inter coitura subnasci humiditatē pmittere: cicatricē verò inducentiū, nō modò hanc prohibere, sed consistentē etiā in iisq; cicatricē sunt receptura, cōsumere: præterea callo obducere, & astringēdo obdurare. At sarcotica sanguinē ad refectionē idoneum tam quantitate, quā qualitate tuentur. Jam quod nullius sit mordicationis particeps medicamen, purū ulcus conservat, si quidem tale illud acceperit. Porro molliora humidioraq; corpora, imbecillioribus medicamentis indigent: ut vehementioribus, quæ prorsus contraria existunt.

¶ *Glutinatorium ab Andromacho scriptum, nomine Barbarum.*

Picis, resinæ, bituminis, sing. drach. cc. thuris drach. xxiiij. olei heminam. Conficito.

¶ *Aliud eiusdem.*

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammoniaci thymiamatis, mannæ, sing. unc. vj. cerussæ unc. iiij. olei heminæ dimidiū: aceti heminas iiij.

¶ *Aliud enamon Juliani.*

Argenti spumæ, bituminis, ceræ, picis brutiæ, sing. drach. l. resinæ frictæ drach. xv. æris squamæ drach. xij. thuris drach. xiiij. chalbani drach. viij. chalcitidis drach. iiij. aloës drach. vj. gallæ drach. iiij. myrrhæ tantundem: aristolochiæ longæ drach. vj. aristolochiæ rot. drach. iiij. olei veteris heminas iiij.

¶ *Nigrum enamon ab Hera conscriptum.*

Ceræ, picis, bituminis, pityinæ, sing. lib. j. mannæ unc. vj. cerussæ unc. iiij. chalcanti tantundem: opopanacis unc. ij. olei semiminam: aceti heminas duas. Conficito ut decet. Valet ad divisiones notatu dignas, maximè capitis: ad fistulas, sinus, fracturasq;. Cohibet mirificè sanguinem erumpentem. Canum hominumq; morsibus auxiliatur: ac prorsus phlegmonem arcet.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum genera, Liber III.

Quandoquidē quæ putrescunt omnia, ex humiditate & calore id patiūt: certē in vulnerib. obnoxiiis putredini, curatio nem p siccātia & refrigerātia moliendā esse, semper mecum existimavi. Rursum apud me cōtemplatū, frigidū nervis ab Hippocrate inimicū dici: optimum fore medicamen nervorum vulneribus intellexi, quod & siccaret, & medium esset inter ea quæ calfaciūt & refrigerāt: vel quod parum ad calfacientiū latus ab ipso medio recederet. Posse etiam calidum abundē esse pharmacū, modò siccandi facultate polleret. Quippe calor citra humiditatē humectare non potest. Cæterū ubi nudatis nervis medemur, tunc prædictā auxiliorum integram indicationē assumi ratio est. Ubi verò punctis, ita ut partes interjacentes sint

Putrescentiæ
curatio per
quæ fieri de-
beat medica-
menta.

Nudati ner-
vi quam me-
dendi ratio-
nem requi-
rant.
Puncti ner-
vi qualia me-
dicamenta
postulant.

sanæ, tenuius pharmacum inveniendū est, cuius virtus interjacentes particulas permeando non dissolvatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacum vehementer exiccans. Quod quidem, etiam non sit in calore & frigore symmetrum, offendere nervum læsum nō poterit: quum facultas calfaciendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddatur, dum particulas nervoso corpori præpositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi vim habent, tenuiorum partium acetum est quamacerimū: quod etiā caloris modici est particeps. Inter calfacientes aut liquores, qui partium tenuitate sint præditi, primæ tribuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum eius facultas non detur, utemur Medico, vel sagapeno vocato, vel euphorbio. Panacis etiā, & tithymalorū liquores, & opobalsamū, tenuiadi facultatē fortiuntur. Ex terrestribus etiam nitri spuma, aphronitrum, beroniceū nitrū, petra asia, eiusq; flos, partiū tenuitate insigniuntur. Ex metallicis auripigmentū, & sulfur, tū subtilia, tū calida sunt. Quibus succedit misy, æris squama, & chalcitis, parū simul astringentia. Citra calorē verò manifestū tenuis essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & psoricum. Subtilis abundē est & chrysocola. Ex succis, laurinus valenter calfacit, ac præterea tenuiadi vim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subjicitur, propter substantiæ tenuitatē, illi cedit. Eiusdē generis cum cedrino est lixivium, quam staeten vocant. * Quæ quidē si ex tenuiorū partiū materia usta fiat, cedrinū oleū virtute superat. Jam ex cerealibus, subtilissimus est eruus, sine insigni calfaciendi vi: lolium verò, cum insigni. Hordeum nequaquam calfacit. Mediā inter ea materiā obtinent, qualitatib; amara: ut quæ multum tenuibus substantia cedat, & crassi nihil possideat. Igitur medicamentorū materiæ non semel aut bis, sed frequenter sunt explorandæ: quandoquidem sensibiliū rerū cognitio, inspectione sedula confirmatur. Cujus rei indicium evidentissimū est, quod gemelli per oia similes esse nobis visi, differētes appareant iis, q non p transennā, atq; obiter, sed accuratē inspicere eos cōsueverunt. Itaq; herbarum, fruticū, arborūq; materiam, prius quā ē terra eximant, contemplari pulcherrimū est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum æduntur, dum augescūt, dum vigent. Ex hac nanq; speculatione assequeris, quādo excerpēdi sint, in siccisq; domunculis reponendi. Etenim commodē reponuntur in locis nec subterraneis, nec sub tegulis constitutis: sed mediis, atq; ostia ad meridiē cōversa habentibus: prope q tamē reponi medicamēta nō debēt. Amicos aut omnes adhortor, si artis opera pulchrē obire voluerint, ut me imitentur, qui ex omni natione quotannis præstantissima medicamēta ut mihi adferantur curo, eo quod perditī illi omnigenarū rerum cōemptores, illa indies adulterio cōtamināt. Cōvenit præterea medicum, nō modō affectionis, quam singula medicamēta inducunt, qualitatem, sed etiā ipsius (ut ita dixerim) quantitatem conjecturare. Quippe quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est ut siccitatis quātitas, copię humiditatis respondeat,

Aceti facultas.

Succorū calfacientium differentia.

Terrestria, partium tenuitate prædita.

Sensibilium rerum cognitio, inspectione sedula confirmatur.

Medicamenta reponendi ratio.

Galenus ex omni regione curabat sibi adferri omni genera medicamenta.

Porro nervosarū partiū doloribus à frigore obortis, unice opitulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera confectū: ad computrescentes autem circa articulos partes, cōfert cataplasma ex hordei farina & stillatio lixivio paratum. Perfundendæ aut liberaliter partes circūjacentes sunt oleo calēte: postea verò, ubi lana sicca, totus mador fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbiū admistū sit, illinendē. Porro secūda die, p hordeacea farina, miscere eruinam cōsuevi: atq; ubi jam totū quod cōputruit exemptum sit, paulatim primò quidem ad carnem gignētia, dein ad obducētia cicatricē trāsire. Quādo aut mihi nervus aliquis vulneratus occurrit, interim p liquida pharmaca curationē molior, interim per emplastra: lanā extrinsecus quāmolliissimā, imbutamq; oleo calēte, applicās. Quod si medicamentum ex aceto usurpem, aceti modicum oleo admiscēs, bis tēve quotidie solvo, & oleo calente foveo. Si noctes longæ fuerint, etiā in his solvere consuevi: idq; magis, dum ulcus à medicamentis eroditur. Oleum autē quo fovebimus, satis calēs esto: verū ita, ne vulneratam partē offendant. Nam ut frigidū huiuscemodi affectibus adversissimum est, sic tepens non omnino utile. Nam quemadmodum aqua ipsa, quatenus calet, aut friget, maximē contraria facere nata est, ita quoq; oleū. Frigidum siquidem corpori admotum, perspiratum ipsius obstruit, & prohibet: calidū verū digerit, extenuatq;. Porro ab aquæ usu in tota curatione ita tēpero, ut ne attingat quidē ulcus. Proinde, quū sanguis initio statim à vulnerata parte abstergēdus est, ex oleo id facere expedit. Jam verò acetum, si quando ipso ad affectos nervos utamur, in se nihil vinosum contineat. Oleū autem omni astrictione vacet, sitq; omni ex parte tenuissimum: quale Sabinū existit. Memini aut me, quum alia remedia deessent, nervorū vulnera propoli recēti curasse, interdum etiam antiquiori fermento: quæ ambo aliquando commiscui.

Vetus etiam euphorbiū oleo lavigās, instarq; cataplasmatidis adhibens, alias tendinem punctū sanavi: id quod, euphorbio recēti adhibito, ne utiquam successisset, quum calorē magnum, moridicationemq; atq; dolorē excitet. Eorum tamen euphorbium est, quæ calorem caducum, atq; statim evanescentē sortiuntur. * Cæterum aliis multis pharmacis accidit, ut pauculis annis eorum vis resolvatur: id quod, post thapsiam, nullo minus euphorbio cōtingit. Quippe thapsia bimula expirat penitus, quū euphorbij vires ad sextū usq; annū servari possint. Porro ubi pharmacū consistentia simile ac opis dictis unctionibus habere volueris, oleum sit quadruplū cerę. Ubi verò emplastri speciem referet, parem cerę portionem oleo expedit tēperare, maximē si sicca & vetusta fuerit: ac tum sanē ipsi cerę sic tēperate, poteris sextam partem euphorbij recentis adjicere: ita ut illius sex drachmæ, cerę sex, atq; itē olei sex misceantur. Licebit etiā resinæ aut picis aliquid emplastro ipsi adjicere, ut glutinosius evadat: tunc tamē minus infundendum est olei. Ac resinarum quidem omniū siccissima est, quam alij phryctam, alij colophoniā appellant. Huic succedit quæ ex figulinis impura sumitur: quam si purges,

Nervosarū partium doloribus & articulis.

Nervi vulnerati curatio.

Tepidum non casis & non coarctat.

Aqua non vulnerat & non coarctat.

Euphorbia ad punctum tendines cere.

Euphorbia cum cerâ nescere.

Thapsia bimula rare propter.

Resinarum differentia.

purges, in phryctem mutabitur. His ambabus sic
 cior est, quæ dicitur pityriō physēma. Ego tamē
 ad rem propositam phryctē utor, & liquidis. Ha-
 rum rursus nonnullæ diutius liquidæ pmanent,
 quemadmodū terebinthina: aliæ citō inarescūt,
 ut strobilina: media utriusq; est abietina. Quin-
 etiā facultate calidior est quidē strobilina, mox
 verō abietina, deinde terebinthina. Poteris autē
 medicamē quod euphorbiū receperit, experiri in
 tuo crure, vel brachio: atq; ita ex affectu quē in-
 feret, aut remittere ipsum, aut eius vires intende-
 re: remittere quē, mistura cerati: intendere verō,
 appposito euphorbio. Quod si propolim pingue
 habueris, eam omnibus resinis aptiorem fore ti-
 bi intelligito: ut quæ vaporosam spiritus crassi-
 tiem, humoresq; superfluos eliciēdi, atq; ex alto
 foras extrahēdi, à natura vim habeat: quæ facul-
 tas veteri etiā fermēto inest. Jam verō ad vulne-
 ratos nervos nonnunq̃ sum usus sulfure vivo,
 sicuti & arsenico, & sandaracha, & calce tum vi-
 va, tum extincta, lotaq; & illota: singulis nimirū
 horū per se cum tetrapharmaco temperatis. Por-
 rō Empirici ex casu unū aliquod simplex medi-
 camentum utile ad proposita inveniūt: at ratio-
 nalis methodus plurima simul invenit, & varias
 ipsorum compositiones. Etenim quæ ex alto hu-
 mores educere, digerereq; possunt, nervorū vul-
 neribus sunt ex usu. Quandoquidem verō non-
 nulla horū qualitates habent immoderatas, alia
 eis immiscēda sunt, quæ ipsorū excessus, illæsa fa-
 cultate, retundant. At rectē hoc fieri nequit, nisi
 cuiusque medicamenti non modō qualitatis ge-
 nus, sed ipsius etiā qualitatis gradum, quantita-
 tēve cognoscas. Quocirca Empirici, quod ig-
 norēt naturā simpliciū, homogenia tantum, at-
 que similia commiscēt: quemadmodum alij ple-
 riq; quod excessus quantitātē non assequantur.
 In universum autē, pharmaca liquidiora minus
 molesta sunt, cum aliis, tum vel maximē nervo-
 rum vulneribus. Cavendum tamē perpetuō est,
 ne aquis læsa particula respergatur. Verū q̃ pul-
 chrē nervorū vulneribus p̃specturus est, etiam
 particularum naturæ sit peritus oportet. Est au-
 tem curatio communis, sicuti & periculum par,
 tum in contusis ac vulneratis nervis, tum in sic
 affectis tendonibus. Porro in vulnerib; juxta fe-
 moris longitudinē factis, deligatura vulnerati
 muscoli partibus invicē cōtrahendis sufficit. Per
 trāsversum vulnere accepto, nihil deligatura cō-
 tulerit, sed sola futura totū opus absolvitur. Has
 igitur nisi q̃s altas faciat, muscoli partes pmane-
 bunt inglutinatæ. Consuendæ etiā sunt mēbranæ
 ipsæ cum musculis q̃bus cohærent. At tendines,
 membranarum instar extensos, & dilatatos, nō
 mediocri cum periculo consues. Ligamenta au-
 tem quomodocunq; afficiātur, ab omni sunt re-
 mota periculo: utpote insensilia existentia, & ex
 ossibus, non ex musculis, ut tendines, orta: neq;
 ex cerebro aut spinali medulla, ut nervi. Igitur
 medicinæ partes mutuā opem requirunt, tum quæ
 manu, tum q̃ medicamenti, tum quæ victu me-
 derur: maximeq; illa q̃ manu curat, reliquis dua-
 bus indiget. Porro punctiones nervorum augu-
 stam cutis divisionem habentes, non eodem cu-
 rantur medicamento, quod nudato nervo auxi-
 liatur: sicuti neque id quod puncturis medetur,

nervo nudo est ex usu. Quippe multō calidius
 est, magisq; mordet, quā ut nudus nervus ipsū
 perferre possit. Præcipuē autem danda opera est,
 ut oræ angustiorum punctuum apertæ sint, quo
 calidum medicamen admotum extrinsecus, per
 eas vapores eliciat, attrahens humiditatem circa
 affectum locum intus delitescentem. Quamob-
 rem orificium duabus in cute sectionibus ad re-
 ctos angulos dividere oportet.

¶ Confectiones medicamentorum ad ner- vorum vulnera.

Ex metallicis astringētia vitanda sunt, præser-
 tim ubi nervi sunt puncti. Detergentia aut con-
 ferunt: quæ tamē sub æstivo sole, ex acerrimo, ve-
 rustissimo, substantiaq; tenuissimo aceto læviga-
 re oportet, quō felicius crassitudo partium, qua
 omnia metallica prædita sunt, auferat. Quantō
 autem longiori tempore attrita fuerint, hoc te-
 nujorem cōsequentur substantiā: eruntq; aptio-
 ra angustis vulneribus: quemadmodum in ner-
 vi carne nudatis, admodum tenuia, exedentiaq;
 cavenda sunt: quib; sanē pastilli Andronis, Polyi-
 dæ, & Pasionis congruūt, ex sapa, quam Siræum
 vocant, appliciti. Ad punctos autē nervos equi-
 dem cōpositis medicamentis omnib; illud præ-
 stantius semp esse usu ipso comperi, cui copiosa
 æris squama inesset: dein chalcitis combusta, po-
 stea misy. Porro ubi nervus q̃ nudus erat, ab im-
 posito medicamento jam tectus fuerit linamētis
 extrinsecus, unum aliquod ex iis quæ ad angusta
 conveniūt vulnera, superponendū est: aliudq; e-
 jusdem materiæ toti affectæ particulæ circundā-
 dum, ita ut sanas quoque partes, præsertim su-
 perpositas, plurimū comprehendat. Quum au-
 tem permagna differentia humanorum corporū
 sit, ob idq; unicum medicamentū omnibus con-
 venire non possit, duo semper in promptu habe-
 to: alterum nempe valentius, sed ex similibus ge-
 nere confectum: alterū mitius & blandius: quæ
 invicem temperās, dum postulabit usus, pro va-
 rietate misturę, permulta alia media inter ipsa cō-
 stitues. Esto igitur valentissimū metallicum ta-
 le: Chalcitidis crudæ partē j. misyos crudi partes
 ij. æris squamę partes tres. Mitissimū hæc recipi-
 at: Misyos, chalcitidis, utriusq; cōbusti partem j.
 squamę partes quatuor. Mediū sit tale: Misyos,
 chalcitidos, æruginis, cujusq; usi partē unā: æris
 squamę partes tres. Præterea cerę in valētissimo
 duplū: * in mitissimo duplū, atq; ipsius dupli di-
 midium miscetur: at in medio, duplum, ac ipsius
 dupli quartā partem miscere oportet. Quum igitur
 validissimum ex sex partibus cōstet, duode-
 cim illi cerę partes miscebis. Imbecillimum au-
 tem, quandoquidē ex senis etiā constabat, octo-
 decim (quod duplū, ac dupli dimidium est) reci-
 piet. Mediocri verō dimidū harū partium om-
 niū indet. Atqui octodecim & duodecim, trigin-
 ta partes constituūt: cujus numeri dimidiū con-
 tinet quindecim partes. Tot igitur mediocri mē-
 dicamento adjiciuntur cerę portiones (id quod
 erat duplum, & dupli pars quarta) sive eę drach-
 mæ sint, sive uncia, sive etiam libra. Porro men-
 sura qua Romani metiuntur oleum, est cornea,
 discretaq; circularib; lineis, totā ipsam dividen-
 tibus in duodecim partes. Atq; integra quidem
 mensura ab eis appellatur libra: ut ejus duodeci-

Punctionum
 angustæ ora
 quomodo di-
 latanda.

Nervi vul-
 nerati qua-
 lia medica-
 menta con-
 gruant.

Medicamen-
 ta duo, eiusdē
 quidem gene-
 ris, sed facul-
 tatibus diffe-
 rentia, ad
 vulneratos
 nervos cur-
 in promptu
 habere sem-
 per oporteat.

Mensura
 olei erat olim
 apud Roma-
 nos cornea.

ma portio, uncia. Jam verò prædictis pharmacis omnib. juxta ceræ portionē, addatur oleū essentia tenuioris, minimeq; astringēs, quod quidem cerā ipsam dimidio superet: ita ut octo illius uncis, duodecim olei misceantur. Quinetiam ubi metallica plurib. diebus in mortario trita ex aceto fuerint, commodè illis thus candidissimum atq; pingue miscetur. Cujus quantitas mediæ omnium portioni sit par: q̄ licebit tibi augere aut minuere, prout volueris efficere medicamentū mitius, aut acrius. Ceræ etiam oleo liquatæ, poteris aliquā resinā ex prædictis injicere: sciēs acrius futurū pharmacū, si trobilina injecta: mitius, terebinthina: mediū utriusq; abietina. Ex harum genere quoq; est larix, cæterū prædictis humidior, liquidæ piceæ substantia similis. Miscebis igitur ceræ, sextam unius dictarum resinarum partem, si vis ut medicamentum emplastri formam retineat. Chalbanī verò æquale thuri pondus indes, ubi mitissimum reddere statuis: dum valentius, 20 dimidium: quando ipsorū medium, id quod inter æquale & dimidiū est. Inest porro chalbano, ut emollētibus omnibus, etiā putrificū qd: quare nudatis nervis non usque adeo cōvenit. At si nudus nervus nō sit, haud mediocriter p̄missio ipsius ad dolorē leniendū confert. Omnia quippe metallica exasperat, doloremq; excitant: ut ex humidis etiā, acetum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliat̄: fōtus ex oleo & chalbano mistis administratus. Nihil autē minus chal- 30 bano dolorē lenit adeps tenuitate substantiæ præditus: qualis à feris, & agrestibus animalibus sumitur. Nam animalium quæ cōclusa in urbibus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his igitur quæ leniant dolorem, habere aliquod medicamen expedit, quod ex metallicis composito possis interdum miscere.

¶ De medicamentis ex euphorbio confectis.

Vetus euphorbiū recētiore lōgē est inferius. Si igit̄ anniculū sit, etiā Cyrenco succo, quē nūc habemus, & cujus irrigatione stirpes augēt, & succulentas reddūt, magis excalfacit. Porro colore quidē vetus recēti flavidius pallidiusque apparet: substantia, durius & siccius. Conficit̄ aut̄ ex recēti euphorbio calfaciēs medicamentū in hunc modū. Euphorbiū un. j. ceræ un. iij. olei un. xij. q̄ sme- 40 gmate intrepidē uti ad pūcturas poteris, dū vereris ne oscula ipsa * cōniveāt. Quod si imbecillius fuerit euphorbiū ipsum, augenda ejus mensura est, pro imbecillitatis ratione. Cæterum cōfectura ceram euphorbiū triplicatam continens, aliarum est valentissima, quum illud recēs miscetur: quincuplam autem recipiens, invalidissima. At quadruplā capiēs, medio inter utrasq; gradu cōsistit. Quod si unguenta proponas facere, qualia 50 nuncupantur, oleum ceræ quadruplū immiscebis: si verò, ut in fracturis, liquidum ceratū parare, duplum. At emplaston medicamē cupiēs conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidem ambiēs fuerit calore temperatus. Sin autem ille frigidus sit, cera autem vetus & arida, paulò ampliori misceri debet. Ut autē tenacius hæreat, terebinthinā, aut colophoniam, soleo emplastro adjicere. Pix etiā, cerati consistentiam tuetur. Multo autem præstiterit medicamentum, si resinæ, picisq; loco, propolim ceræ

parē adjunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cupimusq; ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, vel laricem, vel syncomistēm pineā, vel resinas sua sponte fluentes, miscebimus.

¶ Medicamen confectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefcit ammoniacū thymiana, sagapenum, & opopanax. Igne verò solvuntur, propolis, cera, resina, & consimilia, quæ in duplici vase liquare est melius: nempe quū in 10 cacabo aquam calidam continente, incumben-
teq; prunis, alterum vas consistit, præter liquabilia etiam chalbanū continens. Valentissimū igitur ad vulneratos nervos medicamentū sit huiusmodi. Opopanacē ex aceto dissolutum diutius cōterito. Postea liquefacta illi super igne, propolim, chalbanum, & resinam terebinthinam misceto. Singulorū itaq; aliorum pars una esto, pro poleos recētis pinguisq; sex. Quæ si careas, eius loco picē pingue indes, qualis est brutia. Quod 20 si hæc non adsit, uteris terebinthina. Ego nō nunquam vel solum medicamentum ex pingui pice confectū imposui quo etiam ad canum morsus utimur. Id autem recipit, picis lib. j. opopanacis un. iij. aceti, in quo illa coquūtur, sextarium Romanum. Etenim puncturæ oras cōnivere non finit. Sic tamē cōposito, in duris tantū utemur corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed digerente, unguento vel oleo liquandum est. Quod si loco opopanacis, sagapeno prius in 30 pila trito ex aceto, liquefacta resinā, propolim, & adipē quandam acriorē adjicias, eiusdē generis medicamē habebis. Mollius tamē est q̄ ex resinis propoli, sevis, ac cera colliquatis, absq; aceto, conficitur. Cæterum q̄ indetur sebum, sit acre: quale est quod ab agrestibus animalib. sumitur, quod quæ vetustū existit. Porro ex medullis, cervina, vitulinaque antecellunt.

¶ De pharmaco ex columbarum stercore confecto.

Columbarum turrictularum stercus acre est: 40 quo interim ruri sum usus in adolescente, nervi vulnere affecto. Cuius sanē tum composicio, tū usus, idem est, qui medicamini ex euphorbio inest: aliis quidem eodem modo se habentibus, sed euphorbij loco, stercore indito.

¶ De medicamento ex herbis confecto.

Ex herbis etiam tenuiū partium, amaritudinem absq; astrictione, aut acorē modicum, referentibus gustu, haud inidoneum ad vulneratos nervos cōfici medicamē potest. Tales enim sunt dictamnū, amaracum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, centaurium, atq; id genus alia: quemadmodū etiam radices omnium aristolochiarū, dracūculi, cucumeris agrestis, bryoniæ, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phu, gentianæ, & panacis: q̄ omnes, perinde ut collyria arida, 50 lævigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod crassa est substantia, nervis vulneratis conducit nihil. Lævigatum autem medicamen, alio q̄ cerati modū habeat, est excipiendum: idq; ea tēperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

¶ De sumptuosis pharmacorum cōpositionibus, vulneratis nervis congruentibus.

Iis autem qui odoratis & preciosis oblectantur medicamentis, in hunc modum illa soleo conficere. Cinnamomi, dictamini, mari, singulorum 60 drach.

Resinarum
differentia.

Emollientib⁹
omnibus in-
esse putrifi-
cū quid.

Chalbanum
punctis ner-
vis conducit.
Metallica o-
mnia ad dolorē
excitant.

Adeps tenui-
um partiu,
lenit dolorē.

Euphorbium
Vetus recen-
tiori esse in-
ferius.

Medicamen
ex euphorbio
ad nervorū
punctiones
commodum.

Medicami-
num varias
consistentias
parandi ra-
tio.

Liqua-
medic-
ta in
vasis.

Medicam-
ex pice, oleo
ad canum
bidi morsus.

Medicam-
ex columbarum
stercore.

Medicam-
ex herbis
confectum.

Medicami-
na sumptuo-
sa vulnera-
tis nervis cō-
gruentia.

GAL. DE COMP. MED. SEC. GEN. LIB. III.
de compositione medicamentorum secundum genera, lib. III.

Quandoquidē ex dysepuloticis quedā, sa-
niet humorumq; ulceratis partibus in-
fluentū vitio, egrē cicatricē admittunt:

Dysepulotico-
rum differē-
tia.

quāda ipsa affecta sede influentē succum quam-
libet probū corrumpente, secunda ratione ul-
cera dysepulotica & cacoethe propriē nominat:
in quibus interim totam partim affectam excin-
dere, vel adurere nonnulli coguntur, aut medica-
mentis crustam inducentibus, aut igne utentes.

Ulcera tot
desiderari
pharmaca,
quot ipsorum
sunt differen-
tia.

Quum autem ampla utrinque latitudo sit, in eo
quod alterum altero magis dysepuloticum ma-
lignūq; est, tot sanē desideratū auxiliātia phar-
maca, quot fuerint ipsorum ulcerum differētia.

Quare duo ut minimū, quæ idem polliceantur,
eandemq; facultatem ostendant, differant tamē

maximi minimiq; ratione, in promptu adesse il-
li cōvenit, qui omnia id genus ulcera constitue-
rit curare. Cæterū ubi nullus vitiosus succus ul-
ceratas partes infestat, tale requiritur pharmacū,

Ulcera autē
partū, quas
non infestat
vitiosus suc-
cus, curatio.

quod influentē quidem humore repellat, infixū
aut parti, discutiat. Atq; hæc sanē vires contrarię
præstant. Siquidem influxū reprimūt astringen-
tia: impacta digerūt, quæ trahēdi potestate sunt

prædita. Porro quę astringūt, majori ex parte ex-
asperat, atq; hac occasione molesta sunt. Trahē-
tia verō ac digerētia ex alto humores, non citra

acrimoniā id faciūt. Ac acrimoniā dolor aliquis
necessariō sequitur, mordens ulceratam particu-
lam: unde influētes humores irritari cōtingit, ac

proinde in ulcere phlegmonem excitari. Ex qui-
bus liquet, medicamēta dysepuloticis malignis
quę ulcerib. cōgrua, esse q̄d difficillima inventu.

Dysepuloti-
cis congruen-
tia medica-
menta, cur
sint difficilli-
ma inveniētia.

Inveniēda tamē aliqua eorum materia est, qua
ulcus citra dolorem siccescat: quod accuratē fie-
ri nulla ratione licet, ignorāte medico, quem ef-

fectum admotum medicamen ostenderit. Quip-
pe ex erodente simul & astringente validū confi-
citur pharmacum. Cæterū sordes humorq; ul-
ceri incumbens, pharmaci rōsionem exolvunt.

Iraq; perpendendū est, quantū primus usus hu-
miditatis ac sordium in ulcere desiccaverit: atq;
ita secundū, tertiumq; uti illo debemus, donec

ficcum & purū ulcus ipsum appareat. Ubi verō
id tale conspexeris, ad aliud medicamentū te cō-
feres, ejusdem quidē speciei, sed priore imbecil-
lius. Scire autem oportet, medicamenta ipsa nō

alia ratione mederi ulceribus, quā q̄ in exul-
cerata particula eam siccitatem inducant, quam
fortiebatur quū se haberet secundum naturam:

id quod factū intelligimus, ubi neq; tenuis am-
plius sanies influit, nec pus, pducitur. Revocan-
da igitur ad memoriā sunt ea quæ citra morsum

exiccāt, cujusmodi complura metallica existunt.
Meminiſſe etiam oportet, combusta, & lota, acri-
moniā, quam prius habebāt, amittere: ac proin-
de ipsis utendum esse, in iis qui molli carne sunt

præditi, admodumq; ad sentiendū prompti, nec
non cacoehymi. Nam in aliis corporib. illicita e-
tiam usurpari licebit. Siccāt igitur modicē. Lem-
nia sphragis, cadmiāq; præsertim quę spontē na-
scitur: quam sub æstivo sole pluribus diebus ex

aceto, aut vino giluo pellucidoq; interēs, exiccā-
m

Ulcera quæ
ratione medi-
camenta me-
deantur.

Usta & lota
medicamen-
ta, acrimoni-
am quā prius
habebant

amittere, &
ob id ipsis utē-
dum est.

mo

&

m

drach. xl. amarici pauxillum. Hæc redacta in te-
nuissimū pollinem, cum ceratō ex opobalsamo
optimo, & cera Tyrrhenica factō, cōfundo. De-
bent autem ceræ partes octo, opobalsami decē,
in id ceratū coire. Adjicio etiam partē unā tere-
binthinæ odoratæ, ut medicamē non sit friabile,
sed sibi mutuo cohereat. Sed ex eodē ceratō, & li-
quore Cyrenaico, similiter aliud medicamen cō-
pono, mistura proportionē euphorbio facta: ter-
tiumq; aliud ex utrisq; temperatis conflātū: quār-
tum deinde, quod in se myrrhā stactē recipit. In
quibus autem nervus est nudus, ibi ceratū ex ce-
ra q̄ vocatur myrepſice, & unguentis apud Ro-
manos foliatis & spicatis dictis, compono, duō
decimam partem pompholygis ei admiscēs. Li-
cet autem ex Tyrrhenica cera id conficere, q̄ so-
lam nihil etiam prohibet ex nardo optima lique-
facere, idq; in duplici vase: quod in omnibus un-
guentis sit cōmunē præceptū. At raso ceratō, spi-
cæ nardi, amomi, folii malabathri, & elotæ pom-
pholygis, pares singulorum portiones miscebis.
Etenim in puncturis, acriora pharmaca ex usu
sunt, quæ vulnus apertū conservent: Denudatis
autem, mediocri astrictione, cum degerendi vir-
tute absq; morſu, prædita offerre convenit. At
amomū, astrictionis cuiusdam est particeps. Ma-
gis autem ipso nardi spica, et malebathri folium.

¶ Quæ alij scripserunt ad sananda ner-
vorum vulnera.

Quidā nostræ ætatis Medicus utebatur me-
dicamento, similiter meis cōfecto, ex metallicis.
Recipiebat enim cerę unc. vj. olei unc. ix. misyos
drach. vj. chalcitidis drach. j. squamæ æris un. ij.
s. thuris un. j. s. chalbanī un. j. Cera & chalbanū
liquata, metallicis aceto intritis superfundūtur.
Porro si nervorū vulnera non comitetur phle-
gmone, molliora humidioraq; statim à princi-
pio sunt potiora medicamētis duriorib. ac ficcio-
ribus: præstatq; liquata ipsa in digerente quopiā,
vel mitigatorio medicamine administrare. Vo-
co digerentia quidem, vetus oleū, & ricinū, &
sicyonium: mitigatoria aut, rosaceum chamæ-
melinū, & quod ex althea cōficitur. His fortio-
ra, eoq; durioribus corporib. magis idonea sunt,
quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta
exprimitur: & q̄ ex iride, bryonia, & aro parat.
His valentius est, ex dracunculo, aristolochia, &
panace factū. Nos frequenter usi oleo sumus ex
abietis semine, populiq; flore cōfecto.

¶ Claudij Philoxeni Egyptia, nervorum
vitis, alijsq; congruens affectibus.

Argenti spumæ, cerę, sing. drach. lx. ammonia
ci thymiamatis drach. lxxx. propoleos drach. xl.
resinæ ficcæ, terebinthinæ, squamæ æris, thuris,
sing. drach. xvij. lanæ succidæ exusta, squamæ
stomomatis, sing. drach. viij. opoponacis drach.
iiij. ricini heminas tres. Conficito artificiosē.

¶ Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniāci, cerę, terebinthinæ, æris cōbusti,
sing. drach. viij. picris aridæ drach. xl. lithargyri
drach. iiij. aloes Indicæ, aristolochiæ, chalbanī,
sing. drach. ij. æruginis drach. j. thuris drach. ij. olei
hyeme quartā hemina partem, æstate octavam:
aceti tres cyathos, quibus ammoniā-
cum dissolvatur. Con-
ficito.

*Chalcitis cru-
stas excitat.*

tiorem reddo. Chalcitis cōbusta, quā cadmia, valentius siccāt. Per se autē, nec combusta, si ad- ministratur, crustas excitat. Lotam igitur ipsam, deinde siccata habere est satius. Minus enim lota quā combusta desiccāt, tum lōgē mitior est, minusq; mordax. Persimile huic medicamētum est etiam ærugo combusta. Nam quæ ignem nō est experta, fortissimū medicamentum est, sicut chalcitis. Verū hęc nōnihil etiā astringit, & ea

Chalcanthū.

multo magis chalcāthum, quod inter metallica maximē siccāt. Misy autē & fori chalciti sunt cognata: tenuius tamē misy apparet, minusq; mordax & urens: crassius fori, & utrisq; siccāt imbecillius: quemadmodū & stimmi majorem astringendi, siccandi; vim, ac fori, possidet. Porro diphryges ulcerib. ægrē humoris vitio ad cicatricem veniētibus, aptissimū medicamē existit: validē nanq; siccāt, etsi sit mordax modicē. Ad hęc, præter acritatem, tum qualitatē, tum potentiā, vim

Diphryges.

*Alumine so-
locur non sit
ad ulcera
utendum.*

astrictoriā possidet. Jam omnes differentiæ aluminis, ulcera satis exiccāt, generosē astringētes: quare nemo solis ijs ad ulcera utatur. Igitur quæ plethora, vitiosoq; succo laborāt corpora, quæq; tenera carne prædita, & ad sentiendum maximē præpta sunt, faciliē ex morfu, rosioneq; phlegmonem cōtrahunt: quare mitiora medicamēta desiderāt: cuiusmodi sunt, sarcocolla, ichthyocol- la, chrysocollo, plumbū ustum, fori, stimmiq;: similiter etiam combusta. Insuper plumbi scoria, probē siccāt: quemadmodum ferri squama, quæ etiā abstergit, purgatq; unde pura ulcera reddit, quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hęc omnia medicamēta arida ulcerib. malignis contumacibusq; insperferis, mirificē videbis citra rosionem ea desiccari: sicuti ubi buccinorū testas cōcrematas, purpurarum, ostreorum aliorumq; id genus similiter adhibueris. Lapis etiam diaphanes, sive specularius dictus, leniter ac sine morfu exiccāt. Eiusdem facultatis est vitrū ustū.

*Siccantia si-
mul et astringen-
tia.*

Quinetiam Ægyptiæ spinę fructus, galla imma- tura, rheon, malicorium, siccandi & astringendi facultatem sortiuntur. Aristolochia etiam, iris, acorū, artemisia, panacis radix, argemone, chamæleontis nigri radix, cyperus, dracunculus, & gladiolus, affatim siccant. His evidentius adhuc centauriū & polium: quibus paulo imbecillior est terra eretrias dicta: uti valentior, vocata ampelitis. Porro ærugo ignem non experta, calx viva & illota, & molle aphronitrum (quod revera aphronitrum est) sola per se non admovētur ulceribus. Nihil autem nobis in prædictis ulcerib. tam evitandū est, q̄ tum oleosa & mollia medicamenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ scirrhos emolliūt: tum acria, ut piper, zingiber, sinapi, & alia id genus.

*Ulcibus cō-
tumacibus
adversari tū
oleosa, tum
acria.*

¶ *Medicamentis prædictis quomodo
sit utendum.*

*Ulcera quo-
modo sint tra-
ctanda.*

Ubi igitur siccum aliquod pharmacum ulceri imponere est animus, sordes prius sunt exprimēdæ, molli, puro, atq; sicco linteolo. Medicamento jam indito, platysma ex emplastro labris attenuandis cōmodo, extrinsecus superdandum est. Huic rursus linamentū undiq; æquale foris injiciendum: cui spongiā ex aqua aut vino tinctam applicabimus: quæ ut frigida maneat perpetuō, per assiduum frigida fotum curabimus. Porro

deligatura ipsa in ulcere inchoanda est, atque il- linc ducendā versus partes supernas: quā tertio quoq; diē, nō singulis, solvere expedit. Tunc autem si ambientes ulcus partes aliquid phlegmones referant, meo Phœnicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum vini astringentis permistum sit, externas platysmatis partes quālatē imbuerē expedit. * Verū non ex obvio quovis oleo phœnicinū liquare oportet. Sed si rubor quidem, atq; omnino caliditas dominet in adjacentibus ulceri partibus, ex aliquo astringentiū atq; refrigerantiū id solves: cuiusmodi sunt myrteū, melinum, & omphacinū. Sin durities aliqua cōspiciatur, oleo veteri, vel ricinino liquādum est. Tutius autē fuerit, vel si nihil in ambiente ulcus loco vitiosi appareat, superpositæ regioni ipsum medicamen apponere, ut repellat si qd prius vel pravum, vel plus q̄ par est, influat: maximē quū in crure ulcus obortū, superpositam habet varicem. Quæ dum sanguine melancholico turgēt, excidenda venit: q̄vis juxta excisionē ipsius, ulcus malignū & cōtumax interdū oriri solet. Igitur in id genus vitii præstat, viribus ægri consultis, a sectione venæ auspicari: deinde pharmaco purgare melancholicū succum, simulq; etiam pituitosum vacuare: quoniā is quoq; interdū unā cū melancholico influit, dum varices gignūtur. Postea venā ulceri suprapositam in longum scarificare cōmodum est. Ubi abundē vacuatis, ei ipsi venæ sectæ prius medendum. Postq̄ exactē jam cicatricē videtur recipere, tunc aggredere maligni ulceris curationem. Jam verō lien nonnūq; male affectus, vitiosi talis humoris est autor: sicuti ad jecur: quibus ubi in primis cōsultū fuerit, sic tandē accedere ad curandum ulcus oportet. Pari modo si universū corpus plethoricū, caco- chymūve existat, id prius vacuare expurgareque expedit, q̄ ulceri medicamentū admoveas. Cui quidē dum mederis, a valentioribus abster- foris pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si ulcus adamūssimū esse purū videatur quēadmodū in sordidis ad magis abstergentia transire cōvenit, nisi ex rosione medicamēti sint facta sordida. Sæpe siquidē ab acri medicamento colliquata & soluta caro, in vitiosam sanie degenerat. Cæterum cavitas ulceris major, oraq; rubentiores, & calidiores effectæ cernuntur, quum ob medicamenti acrimoniā ipsæ sordes acrescunt.

¶ *Compositio emplastrorum.*

Quādoquidem malignorū & difficulter admittentium curationē ulcerum summus scopus est, ut medicamentū citra morsum exiccet, aqua verō & oleum maximē omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cera deligēda est recens & pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem subacta, & in calidā aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autē medicamentum fiet, si quarta pars metallicorū ipsi ceræ adjiciatur: valentius autem si tertia. Etenim quū haud exiguo discrimine invicē corpora differāt, unum omnibus medicamētum rectē preparari non potest. Erit ergo temperati pharmacī cōpositio huiusmodi. Utriusq; æruginis, æris combusti, sing. drach. j. aluminis scissi drach. s. ceræ drach. x. Conficito. Minus autem mordebit, si loco aluminis integrā diphrygis drachmā adjicias,

*Deligatura
ulcerib⁹ qua-
lis sit adhibē-
da, & quan-
do solvenda.*

*Repellentia
esse applica-
da regioni
præpositæ
ceræ.*

*Varices quæ
do exciden-
t sint.*

*Ulcus cu-
varix incu-
bit, curat.*

*Sordes
cri me-
mento-
ta, quæ
discerni
ab iis
ulceri-
bus
prius
prode-*

*Ulcus
tum-
cur
aqua
sent-*

*Ulcus
tum-
phar-
ma-
rem-
des-*

adicias. Quòd si expurgare sordes consiliū sit, sic conficiemus. Aeris, æruginis ustæ, diphrygis, sing. drach. j. æris squamæ drach. s. ceræ pinguis drach. 2. Misceto. Ceterū si cera ipsa sit siccior, emollienda est aliquo astringēte oleo, vel larice, vel terebinthina.

¶ *Ad chironia & difficilia ulcera medicamen-
ab Asclepiade proditum.*

Aeris squamæ unc. j. æruginis rasæ tantūdem: ceræ selibram: resinæ laricis unc. s. Quæ liquari possunt, aridis affunduntur: quib. exceptis, ac curiosè emollitis, utitor. Ceterū platysma exiguū soli affectæ parti, ut ulcus tantū cōprehendat, imposito. Ambientis autē particulas pharmaco quod phlegmonē arceat, circūdare oportet. Inter curādum tertio quoq; die solvere, dein fomentis mitigare, ipsumq; emplastrum quod platysma vocatur à latitudine, abluēdo emollire, ac rursus imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Ego certè Attico nonnunq; æsypo cerā tēperavi. Meminisse autē oportet, qualitates om-
nium vicinorum corporum, mutuò in se agere, etiam si alterū ipsorum multò validius sit. Unde processu temporis quodāmodo evadūt similes. At ubi qualitas medicamēti curādo corpori specie similis fuerit, major utilitas sequitur. Porro diphryges, si vel solum inspergatur ulcerib. quæ difficulter cicatricem admittunt, p̄bē illis medetur: item & æs cōbustum. Ærugo autem exedit atq; mordet insigniter. Itidē calx ignē nō experta, quū insigniter mordicet, exigua portione aliis medicamentis à nonnullis miscetur. Extincta mediocre est pharmacum. Elota prorsus lene, & mordacitatis expers.

¶ *Pharmacum ad mitiora ulcera cicatrice
inducenda, ab Andromacho scriptum.*

Cadmiæ tostæ lib. j. chalcitidis ustæ tantūde: ceræ lib. iij. resinæ aridæ lib. iij. myrtei lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quum autē ad maligniora ulcera valētioribus utendi remediis sit, ut imbecilliorib. ad mediocria: aliud medicamentū subdam, quo utor ad dysepulotica. Æruginis, & squamæ, sing. unc. j. ceræ unc. viij. misceantur. Si igitur cavū sit ulcus, indito medicamēto repleatur. Post hoc rursus aliud platysma super accom-
modabitur, quod & labra comprehendat. Huic deinde linteus frigida madēs tantus undiq; ob-
icitur, ut medicamentū occultet. Postremò spongia mollis, fascia ex linteo excepta, vel semel, vel bis, affectā partē orbiculatim ambiēte, tantæ ma-
gnitudinis, quò totū ulcus cum labris, ac super-
positorū ipsis aliqd, subjectorūq; cōplectatur.

Deligatio autē ipsa à duobus initiis fiat. Vo-
cant sic quoties tota pars media vinculi affecto
loco incumbit: utrunque autem crus in opposi-
tam regionē deducitur. Ubi hæc primo die pere-
geris, altero aquam frigidā per spongiā irriga-
to. Si ambiens aer calidus & siccus fuerit, bis hoc
terve in dies singulos est faciendum, ac deligatu-
ra tertio quoq; die solvenda: per hyemē, quarto.
Affectus autem ipse indicabit, num fortius, vel
mollius, vel simile sit imponendum pharmacū.
Emollies ipsum paululo myrtini, aut rosacei,
aut melini, aut lentiscini, aut mastichini, aut cy-
prini instillato. Validius reddes, aliquid squamæ,
aut æruginis addens.

¶ *Aliud ad obducenda dysepulotica a-
ptissimum.*

Chrysocolle, squamæ, sing. drach. ij. ceræ drach.
vj. diphrygis drach. ij. lithargyri drach. viij. Con-
fundito. Advertendū autem est, mitia pharma-
ca mihi dici sarcocollam, chalcitidem ustam, æs,
æruginemq; combustam, atq; chalcanthon: quæ
ignem nō experta, acria omnia sunt: combusta,
moderata: lota post combustionem, lenia, rosio-
nisq; expertia.

¶ *Aliud mitissimum.*

Eloti plumbi drach. ij. spodij, cadmiæ, diphry-
gis, sing. drach. iij. terebinthinæ qua excipiuntur
drach. vj. Zeno addit chalbani drach. s. Etenim sa-
tius est modica portione misceri pharmaca id ge-
nus, quū nimirum confestim sibi saxeam duritiē
cōtrahant. Porro in hisce omnibus, illa q̄ liqua-
ri possunt, liquefacta & refrigerata, abraſaq; sic-
cis diligēter redactis in pollinē, admisceto. Nam
si liquida ipsis affundas, in grumos concreſcēt,
maximè ubi invaluerit frigus. In sole autē ferven-
ti si mistura fiat licet ea superfundere, moyendo
rudicula primū, dein cochleario: præstat tamē
ad omnia hæc, ramusculus palmæ.

¶ *Aliud ad desperata ulcera ex collecta-
neis Primionis.*

Soreos drach. xxiiij. aluminis scissilis, malico-
rii, calcis vivæ, sing. drach. xvi. thuris drach. xxxij.
gallæ omphacitis tantūdem: ceræ drach. cxx.
sevi vitulini (aut ejus loco, adipis porcini & ve-
tusti) drach. lx. olei veteris heminā. Conficito. Por-
ro fori, alumen, malicoriū, galla, nō digerendi fa-
cultate, sed astringendi eximia, sunt prædita. Ete-
nim sub astringentiū genere cōtinētur austera &
acerba: sed illa quidē astringūt mediocriter, hæc
aut, hoc est, acerba, vehemēter. Omnia igitur a-
stringētia cōtrahūt, ac desant meat⁹, vinciūtq; &
cōtinent partiū sibi cohærentiū substantiā: quo
fit ut altius ipsorū virtus penetrare nō possit, ni-
si ab aliis acribus, atq; subtiliū partiū ducantur:
id q̄ ipsis calx in præscripto medicamēto præ-
stat. At verò induratis ulcerū labris multò utili⁹
medulla cervina adhibetur: quæ si nō adsit, vitu-
lina. Porro inveteratū oleū ab adipe suillo (quē
oleo cōmuni liquatum institores pro oleo ven-
dunt) ex odore & cōsistentia discernes. Utrunq;
tamen inveteratū, rosionē quandā acquirit: quo
nomine ad ulcera præter modū maligna conve-
niunt. Talia enim appello, in quibus aut pars affe-
cta tam vitioso habitu est prædita, ut vel optimū
sanguinē, qui nutritionis gratia confluit, corrū-
pat: aut id quod influit, adeò perversum existit,
ut etiā si pars rectē se habeat, ab ipso tamē solo e-
rodatur. Igitur ut citra rationalē methodū medi-
camenta cōponere, ita vim illorū certò & accu-
ratè cognoscere sine experientia nemo potest.

¶ *Epuloticū* à Critonē conscriptum, quod prætumidis, durisq; & cavis ulceribus cō-
venit. Picis aridæ drach. c. æruginis rasæ drach.
xxiiij. eris combusti drachmas xv. squamæ rubræ
drach. xxiiij. ladani un. ix. argenti spumæ lib. iij.
olei sextarium j. s. Etenim arida pix evidēter sic-
cat. Calfacit autem modicè: ob idq; pus moven-
tibus medicamentis miscetur. At quum aliquid
calidum, frigidum, humidum aut siccum dici-
mus, cū optimo corporis temperamēto id con-
feri-

*Mitia medi-
camēta quæ
sunt.*

*Astringens est
se genus com-
mune auste-
ri & acerbis.
Astringenti-
um facultas.*

*Ulcerum mali-
gnantis na-
tura quæ sunt*

*Epuloticum
Critonis ex
ladano.*

*Picis arida
facultates.*

Ulcus cavū & purum, à quibus sanetur medicamentis.

Metallica diutius cocta, magis siccant, & minus rodunt.

Medicamen Critonis ex chamaleonte Lentiscini olei facultas.

Subtiliora fieri quales gantur aceto: quæ ex vino, magis cicatricem obducere.

Archigenis ad ulcera cōsumacia, remedia.

ferimus, Igitur cavum & purum ulcus, à medio-
criter siccantibus medicamentis curatur: sordi-
dum verò & malignū, & oris duris & præumi-
dis quidē, sed carne juxta cutem fluida, validissi-
mè siccātia requirit. Verū quæ metallica, ut sic-
cent sine ullo mōsu, præparas, coquere diutius
oportet. Sic siquidē magis siccant, ac minus ero-
dunt. Porro ladanū ipsum solū ex vino tritū, vl-
ceribus ægrè ad cicatricē venientibus auxiliatur.

¶ Medicamē ex chamæleōte à Critone descri-
ptum, inducens cicatricē periculosis & callosis
ulceribus. Lithargyri drach. c. ceræ drach. ærugi-
nis drach. xxiiij. chamæleontis drach. xij. olei mi-
nam. Cōficito. Ego tamen hujuscemodi empla-
stris adjicere lentiscinū consuevi, quòd emolli-
at nōnihil, digerat, & astringat: quæ omnia, diffi-
cilia ulcera cum labris induratis, desiderant.

¶ *Aliud Heraclidis Tarentini adversus
ulcera vetera.*

Squamæ drach. j. æruginis rasæ drach. iiij. ex-
cipiantur drachmis octo myrtei cerati. Misce. E-
tenim metallicorū facultas à quovis cerato re-
solvitur.

Aliud. Squamæ trite acetum affundito, eamq;
sub Caniculæ exortu lævigato usq; ad crassitudi-
nē mellis: vel etiā incoquito. Postea exiccata, re-
daetq; in pulverem, cerati partes octo misceto.
Valet advers⁹ recētia vulnera, & ulcera invetera-
ta. Licebit etiā ad ignē exiccare ipsam squamā, si
alio tēpore medicamē id cōficiamus. Porro sub-
tiliora fiunt quæ ex aceto lævigantur: atq; ob id
melius purgant, attenuāt, & siccāt. Verum ad ci-
catricem inducendā sunt ex vino trita meliora.

¶ *Aliud Andromachi cicatricem ducens.*

Ossium ustorum drach. ij. mānæ drach. j. cad-
miæ obolos iiij. tritis utitor.

¶ *Aliud eiusdem, quo malignis cica-
trix inducitur.*

Piceæ corticis drach. xj. cornu cervini usti drach.
iiij. cadmiæ drach. xvij. mannæ drach. iiij. ærugi-
nis rasæ drach. ij. siccis utitor.

¶ *Aliud ad excrescentia ulcera cicatricem
absq; mōsu ducens.*

Sandarachæ, chrysocollæ, arsenici, singulorū
partibus æquis confusis, aridisq; utitor.

¶ *Ad ulcera quibus callus obduci non po-
test. Ex Archigene.*

Cōmuni quodam oleo expurgatis, vetustissi-
mū cū linamētis imponitur. Ærugo rasa cerato
rosaceo, q; paulū resinæ habeat, excepta, impo-
nitur. Item squamæ æris rubri quamplurimū ce-
rato myrteo exceptum usurpatur.

Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculè tritum, inspersumq; cōdu-
cit. Vel aristolochiā rotundam, & gallam, equali
pondere ex oleo inungito. Vel cucumeris agre-
stis radicē cum foliis illigatā, calido cinere recō-
dito: quum aut emollierit: contritam imposito.

¶ *Eiusdem ad cancrofa.*

Cancri fluviatilis usti, & cadmiæ, pares portio-
nes tritas inspergito. Vel cinerē cancrorū cum
cerato imposito.

¶ *Eiusdem ad callosa.*

Nitrū torrefactum & calcem vivam cum lo-
tio pueri impubis lævigata circumlinito. Confe-
runt etiam caustica medicamenta.

¶ *Andrea emplastrū ab Asclepiade scriptū, om-
nem excrescentiam reprimens, atq; arcens infla-
mationem. Argenti spumæ lib. iiij. squamæ æris,
chalcitidis, æruginis rasæ, sing. unc. vj. aceti hemi-
nam: olei veteris lib. viij. Misce.*

¶ *Asteris medicamen ad idem.*

Lithargyri lib. j. olei veteris lib. ij. s. æruginis,
chalcitidis, squamæ rubræ, sing. unc. j. aceti hemi-
nam. Conficito.

¶ *Isis emplastrum rufum, ad fluida, diu-
turna & maligna ulcera.*

Argenti spumæ drach. c. minij sinopici drach.
viiij. diphrygis, ceræ, chalcitis combustæ, sing.
unc. j. chalcitidos crudæ drach. ij. olei heminas ij.
Conficito ut decet.

¶ *Aliud Scribonij Largi, ad eadē accōmodatū.*

Ceræ drach. c. lithargyri drach. l. olei myrtei
hemina m. misyos cōbusti, chalcitidis ustæ, alu-
minis scissi usti, cerussæ resinæ, therebinthinæ,
sing. drach. xij. Conficito.

¶ *Aliud ex chamæleonte ab Asclepiade scriptū
ad fluentia & ægrè curabilia ulcera. Lithargyri
lib. j. olei veteris lib. ij. chamæleontis radicis trien-
tem: aristolochiæ tantundē: chalbani unc. ij. gal-
læ unc. ij. thuris tandem. Conficito.*

¶ *Aliud ab Asclepiade scriptum ad ulcera quæ
vix curationem recipiunt.*

Squamæ æris, æruginis rasæ, sing. unc. j. ceræ seli-
bram, resinæ laricis unc. s. Conficito.

¶ *Decleōtis cephalicō ab Asclepiade scriptū, à
quo educūtur ossa corrupta. Aeris squamæ, man-
næ thuris, resinæ siccæ, sing. drach. c. aceti hemi-
nas xij. Terito squamā ex aceto, & quū lævis fa-
cta fuerit, thuris in pollinē redactū adjicito, resi-
namq;: atq; pastillos fingito: quorū assiccatorū
in umbra miscens partē unā cū cerati ex rosaceo
cōfecti pari portione, ipsa utitor. Aliud Hygie-
ni scriptum ab Hera, utile ulceribus ægrè ad cica-
tricem venientibus, necnō paronychis. Lithar-
gyri chrysitidis, ceræ, sing. minam j. chamæleon-
tis nigri radicis drach. xxxvj. æruginis rasæ drach.
xviiij. chrysocollæ drach. xl. olei heminas iiij. Cōfi-
cito ut decet. Aliud egregium. Ceræ, picis, bitu-
minis, sing. lib. j. mannæ, æruginis, gallæ, spinæ
Aegyptiæ, iridis Illyricæ, aristolochiæ rotundæ,
chalcanthi, singulorū unc. iiij. aristolochiæ lōgæ,
æris cōbusti, utriusq; un. ij. Conficito. Aliud. Bi-
tuminis, aluminis liquidi, sing. lib. j. picis, resinæ
pityinæ, ceræ, sing. lib. ij. māli terræ rotūdī, gallæ,
spinæ Aegyptiæ, sing. unc. viij. malicorij æris usti,
mānæ, māli terræ lōgi, sing. unc. iiij. olei ricinini,
aut veteris, lib. ij. Cōficito p dignitate. Aliud quo
utor in molli carne præditis. Ceræ lib. rosacei tā-
tundē, cerussæ unc. viij. salis ammoniaci unc. iiij.
squamæ Cypriæ. un. ij. thuris calcis vivæ, alumi-
nis, æruginis, malicorij, sing. unc. j. Conficito di-
ligenter.*

*G A L E N I P E R G A M E N I
de compositione medicamentorū secun-
dum genera, lib. V.*

60 **P**olychresta medicamēta, sive ad multos u-
sus utilia (de quibus agere in præsentī com-
mētario est animus) ex contrariis pharma-
cis cōstant, etiā juxta qualitates secūdas, nō tan-
tū primas. Etenim primas appello, caliditatē,
frigi-

*Andrea
emplastrum
ciens ad
crescentia
cera.*

*Asteris
camen.*

*Isis emp
strum.*

*Cepha
ossa corr
educem*

*Polychr
pharma
ex contr
constare
Qualita
prima &
cunda q
dicantur*

frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: tum ex harum conjugatione compositas: secundas autem, quæ has ipsas primas sequuntur.

Ex ijs est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, implens, valensq; ad Chironia ulcera: cujus temperies est talis. Ceræ lib. ij. phryctæ lib. ij. æruginis rasæ unc. vj. mannæ unc. iij. olei heminas v. aceti sextarium. Conficito.

Panacia Hera, ad omnem malignitatem ulcerum mire conducens. Rumpit atq; dissolvit quicquid corruptum est: omnem sanguinis eruptionem supprimit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefacit: omniq; ulceri imposita, quamvis agresti, mitius ipsum statim reddit. Chamæpityos, chamæleontis, symphyti, marrubii, singulorum drachmas iij. polii, centaurii tenuis, singulorum drachmas vj. helenii, Aristolochiæ, singulorum drach. iij. thuris drach. xij. s. myrrhæ drach. iij. aloes drach. vj. chalbanii drach. vj. obolum unum: olei drach. clxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. s. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcitidis, sing. drach. vj. obo. s. bituminis, terræ ampelidis, lithargyri, drach. l. gallæ & pulveris iridis sing. drach. iij. Conficito diligenter. Porro marrubio vel solo utri etiam quæ in ijs qui carnem abunde humidam & sordidam circa ulcus habent. Helenion vero haud item convenit solum inspersum: sicuti nec aliud quod vis acre. Nosti siquidem acris irritare, morderè, calcare, & fluorem concitare ad affectas particulas: amara vero exiccare citra morsum atq; calore: eoq; exulceratis conducere. Jam vero thus cõcoquit, & pus movet intemperatis naturis: nam in corporibus humidioribus carnem producit. Nullum autem eorum quæ cõcoquant, ac pus movent, valenter digerens est: sicuti neq; acre. Siquidem ejusmodi mediocriter excalfaciunt: emolliuntq; magis, q̃ exiccet. Oleum lenit, ac valida pharmaca obtundit. Terra ampelitis tum siccatur, tum digerit. Chalbanum emollit, concoquit, lenit, atq; dolorem sedat: quas vires thus, licet imbecilliores, sortitur. Terebinthina detergit, discutit, & quodammodo cõcoquit. Bitumen cum calore non admodum vehementi, etiam siccatur. Propolis attrahit. Mel siccatur, & digerit, putrescentibusq; est maximè congruens, ex ijs existens quæ minimè computrescunt: quare composita hujusmodi a putredine servat, præterquam extremè ad putrescendum prompta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rosionem siccant. Cæterum aloë astringit: myrrha tenuiorum est partium, magisq; siccatur.

Isis Epigoni ab Hera traditum, valens contra omnia vulnera, puncturas nervorum, hominumq; atq; canum morsus. Venenum a bestiis illapsum extrahit: curat fracturas artuum cum vulnere, fistulasq; & omnes abscessus sanat: atq; omnem fluxionem sistit. Ceræ drach. c. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri æris, æruginis rasæ, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ, sing. drach. viij. aluminis usti drach. vj. æris usti drach. viij. myrrhæ drach. xij. chalbanii tantundem: olei veteris hemina: aceti acris heminas ij. Conficito. Etenim hoc medicamine Epigonus conclusus in carcere, curavit quendam ex valde potentibus, unde confestum demissus est. Ego vero

prædictis etiam radicem dracunculi adjicio, quæ vel per se, in orbiculos secta, assiccataq; & redacta in pollinem, si inspergatur, malignis ulceribus auxiliatur.

¶ *Emplastrum ex Dictamno ad eadem faciens.*

Olei veteris heminas ij. lithargyri drach. c. æruginis rasæ drach. viij. squamæ drach. vj. colophonis liquidæ drach. l. mannæ drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. xxvj. æris combusti drach. viij. diphrygis drach. vj. gentianæ tantundem: aloës drach. viij. chalbanii drach. xij. propolis drach. viij. ceræ drach. xxv. aristolochiæ drach. x. dictamni Cretici tantundem. Conficito accuratissime.

¶ *Emplastrum ex utraq; aristolochia, cephalicum enamum, callosis ulceribus congruens, atq; articulos solutos confirmans.* Picis, ceræ, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. mannæ, æruginis rasæ, cerussæ, sing. selibræ: chalcanti, aristolochiæ longæ, iridis Illyricæ, sing. un. iij. malicorij, gallesimaturæ, æris combusti, sing. unc. ij. spinæ unc. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. aceti heminam. Ricini ni, vel olei communis tantundem. Conficito. Porro manna exigua astringendi vim possidet. Vocatur enim sic quod a thure excutitur, non nihil etiam illius corticis obtinens.

¶ *Emplastrum Azanite, malignis ulceribus, necnon ambustis conveniens.*

Picis aridæ uncia: ceræ, adipis suilli, sevi taurini, cæsyti, sing. un. iij. resinæ picæ unc. v. Conficito.

¶ *Emplastrum Haliei ex sinopide, nihil minus quam priora utile.*

Ceræ, lithargyri, utriusq; minam: mannæ, terebinthinæ, chalbanii, sinopidis, sing. drach. viij. olei veteris heminas duas. Conficito.

¶ *Emplastrum Macherionis à Critone descriptum, phlegmonem arcens, mireq; conducens ulceribus.* Aristolochiæ rot. chalbanii, opopanacis, æruginis, iridis Illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. un. j. terebinthinæ un. vij. s. ceræ un. lx. s. olei omphacini unc. vij. s. Conficito.

¶ *Emplastrum ex salicibus à Critone in multos usus descriptum.*

Misyos, chalcitidos, æruginis, cerussæ, galæ, aluminis scissi & rotundi, cretæ sutoriæ, sing. un. vj. ceræ resinæ pitynæ, picis, bituminis, salicis foliorum, sing. un. ij. olei heminas ij. un. iij. chalcanti un. vj. malicorij tantundem: aceti sextarios sex. Conficito.

¶ *Emplastrum venatorum, ad quadrupedum ictus, morsusq; & ad reliqua venenata.* Argenti spumæ minæ: olei veteris, squamæ æris rubræ, ceræ, resinæ phryctæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis triente: chalbanii, minij sinopici, sing. un. ij. Conficito.

¶ *Viride Alcimionis, conveniens fistulis, eduncens ossa, & strumas discutiens.*

Chalbanii drach. xvj. æris usti drach. viij. squamæ drach. xxiiij. ceræ drach. l. sevi caprilli, vel virulini, drach. xxx. thuris, resinæ siccæ, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, sing. drach. xxv. bryoniæ drach. xij. orcheos drach. xij. iridis aridæ drach. iij. aloës Indicæ drach. xij. scissilis drach. viij. fellis taurini tantundem: aceti, olei, utriusq; heminam. Conficito.

¶ *Viride ad herpetas, & ad Chironia ulcera ab Andromacho scriptum.*

Hordei combusti drach. x. æruginis drach. xx. ceræ drach. lxxx. cyprini hemina. Cæterum hoc medicamen

Emplastrum ex dictamno ad multa utile.

Manna quid sit.

Emplastrum Macherionis

Viride Alcimionis

dicamen æruginem multā cōtinet. Porro combustum hordeum, vel si per se inspergatur, chironia ulcera juvat.

Pastilli Aristarchi.

¶ *Pastilli Aristarchi* *πασίλλαι ἀριστάρχου*, hoc est, ad multos usus. Nam præter alia utiles sunt in principio phthificis, lienosis, celiacis, & dysentericis, trib. obolis in potu datis. Myrrhæ drach. vj. croci, crocomagmatis, sing. drach. iij. citinorum, chalcanti, aluminis scissilis, aloes. sing. drach. vj. excipiantur vino Falerno, finganturq; orbiculi, & assiccati in umbra ferventur.

¶ *Polyide Sphragis.*

Malicorij drach. vj. myrrhæ drach. viij. aluminis scissilis drach. v. thuris drach. iij. chalcathi drach. iij. fellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

¶ *Pastillus Threpti ad aures pure fluentes, carnis excrescentias, & narium ulcera.*

Malicorii drach. x. gallæ omphacitidis drach. viij. Aristolochiæ tantundē, aloes drach. iij. myrrhæ drach. viij. fissi drach. ij. thuris drach. iij. pas. 20 so excipiuntur.

¶ *Pastillus* *ἀλγὶς καὶ χυλὸν* ad nomas & scabiosos affectus.

Pastillus diachylum.

Licii Indici, aloes Indicæ, myrrhæ æris, aluminis scissi, citinorum, thuris, sing. drach. iij. succi myrti hemina dimidium. Conficito.

¶ *Pastillus niger, quo utor.*

Malicorii drach. x. aristolochiæ, gallæ, singul. drach. viij. aluminis fissi, aloes, sing. drach. iij. myrrhæ, chalcanti, sing. drach. thuris drach. iij. Vino 30 excipiuntur, & quā res exigit, vino dulci diluuntur.

¶ *Ad erysipelata.*

Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij. opij. drach. ij. thuris drach. iij. cū aceto excipiuntur. Faciunt etiam ad herpetas.

¶ *Ad herpetas, Tyberij Caesaris.*

Diphrygis, meconii, aluminis fissi, acaciæ, sing. unc. iij. aceto vel aqua diluens utitor.

¶ *Aridum putrefaciens absq; morfu, ex descriptione Andromachi.*

Putrefaciens absq; morfu.

Sandarachæ, arsenici, sing. drach. ij. calcis vivæ drach. iij. tritis utitor.

¶ *Pastillus sanguinem comprimens.*

Chalcitidis, misyos, manne, sing. drach. iij. tritis utitor. Ad ani vitia, alumine liquido nucis magnitudine cum mellis cyathis duobus cocto utitor.

¶ *Aridum cephalicum ab Asclepiade scriptum*, quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & cava implet. Iridis Illyricæ, panacis, sing. drach. iij. Aristolochiæ drach. ij. mannæ tantundem: 50 contusis cribratisq; utitor.

¶ *Aridum Asclepiadis, cicatricem inducens.*

Calcis vivæ drach. vj. mannæ thuris, squamæ, sing. drach. iij. reductis in pollinem utitor.

¶ *Crustas inducens, Asclepiadis.*

Chalcitidis crudæ, cadmiæ, sing. drach. iij. junus ex saliva excipito.

¶ *Medicamen Diatesaron.*

Medicamen diatesaron.

Chalcitidis tostæ, misyos tosti, diphrygis, chalcanti, sing. drach. iij.

¶ *Ad nomas Asclepiadis pharmacum.*

Sulfuris vivi, auripigmēti, squamæ, sing. drach. j. æris combusti quantū color exigit. Arido & ex melle utitor. Etenim putrida ulcera, quā ambiē

tes partes depascunt, nomas propriè appellant. Qui affectus vehementissimis medicamentis indigent, ut sæpe in eis etiam cauteriis utamur.

¶ *Apellis medicamentū* *διὰ χάρου*, quod nomas nō solum sistit, sed incipientes prohibet. Chartæ combustæ, plumbi usti, æris usti & loti, arsenici, squamæ stomomatis, singulorum æquas portiones, sulfuris vivi dimidium: tritis utitor, vel cum melle, vel rhodino.

¶ *Ad carbunculos.*

Nitri rubei, arsenici, sandarachæ, chalcitidis, atramēti sutorij, diphrygis, singulorū parem mēsuram aceto lævigas, exiccansq; postea eis tritis utitor. Etenim carbunculus ulcus est crustam citō cum valida phlegmone circumstantiū particularum excitans: adeo ut febres vehemētes, & extrema particula inferat. Quare ipsi crustæ validum medicamentum imponere expedit, & ex iis quæ ad nomas conducunt.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secundum genera, lib. VI.

IN præsentī cōmentario ad ea *πρόλογος*, hoc est, multi usus medicamēta, me cōvertere est animus, quæ tum ad alia multa singulatim faciunt, tum & putrescentes particulas aliter quidem affectas quā illa ulcera, quæ difficulter curabilia appellantur. In putrescentibus siquidem ipsa putredo vagatur, ob idq; tales dispositiones cōplures Medicorū *νομῶς*, hoc est, depastiones appellant. In illis aut, affectus secundū unum locū est circūscriptus, absq; ulla putredine: ita ut phagedænē vocatē, exedant quidem partes vicinas, non tamen putrefaciāt ipsas, nec febres inferāt, quæ cōsequi ad depascentes affectus cum putrilagine, consueverunt. Hæc igitur quæ nunc scribentur omnia, mordacia sunt, si quis ipsis solis nō cerato tēperatis utatur. At quæ cerato miscetur, purgare quidē ulcus sordidum, & carne replere possunt, atq; etiam duritiē quandā & tensionē discutere: nō tamē difficilia curare. Quocirca tum plurimū cerati miscemus medicamentis acribus, quū ulcus purum & siccū est: corpus autem curandū, & molle, & ad sentiendū promptum: paucissimum verò, si ulcus quidē ipsum sordibus, humiditateq; redundet plurima, ægri autem corpus sit durum, & parum sensile.

¶ *Anicetos Critonis, quasi dicas insuperabile pharmacum.*

Extrahit, rumpit, purgat, glutinat, pus educit, duritias discutit, lassitudines lenit, fracturis cū vulneribus auxiliatur, curat hominū atq; ferarū morsus, ad innumeraq; alia cōducit. Squamæ æris drach. lvij. pyrethri, staphisagriæ, cocci gnidij, sinapi seminis, cachryos, columbini stercoris, aristolochiæ tenuis, æruginis, cyperi, erucæ seminis, cumini, singulorū drach. xvj. nitri, salis ammoniaci, singul. drach. xxxij. baccarū lauri, mannæ, iridis, singul. drach. cxx. aceti acris sextarios sedecim decocti caricarū cyathos iij. & semis. Tusa cribrataq; omnia simul cum aceto sub æstu caniculæ lævigantur. Ubi siccū & viride evaserit, ficuū decoctio adjicitur, & simul emollita tolluntur, & in olla æris rubri asservatur. Uteris autem

autē unā ipsius medicamēti parte aceto diluta, usq; ad consistentiā sordium, permista sex resinæ portionibus, cui nōnihil ceræ sit temperatū. Scribitur etiā impetigini agresti cōgruere. Sic enim vocant, quæ a medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuvatur: irritatur autē a validis. Porro caricarū decoctum lenissimū est, & maximē concoquit, simulq; digerit. Acetū verō efficacīā aliorum medicaminū juvat. In quo quidem quæ macerantur sub sole æstivo, tenuē substantiam acquirunt, eoq; altius virtus ipsorum penetrat.

¶ *Emplastrū Serapionis*, cōtra omnia vulnera punctus & parotidas maximē valens. Educte etiā pus, glutinat, seniliaq; & chironia per sanat. Olei veteris heminas iij. argēti spumę drach. cc. ammoniaci thymiamatis drach. clxviij. resinæ colophonix, pityinæ, singul. drach. lxviij. ceræ drach. clxviij. chalbani drac. xx. æruginis tantūdem, myrrhæ drac. viij. Conficito.

¶ *Humidum Andromachi ad nomas.*

Cerę, resinę terebinthinæ, utriusq; drach. viij. adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis drac. ij. squamæ æris drach. iij. mannæ thuris drac. ij. gallæ immaturæ drach. iij. olei myrtei heminas v. Arida aceto & melle excipiuntur, dein liquida supfunduntur. Porro quod auxiliōrū quædam a ratione sola inveniantur, quædā ab experientia, * quæ ad id ratione nō indiget, nōnulla utriusq; opem desiderant, persæpe jam vobis est demonstratū: sicuti & quod ratione & experientia comperta, coniecturali via ad eorum quæ ingruunt inventionē perveniunt: quæ verō per rationem sperata sunt, confirmentur experientia. Cum igitur omnia artium opera frequenti exercitio absolvantur, non satis profectō est generalia duntaxat ipsorū addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam actionū usus exercitatioq; ad perfectorū possessionē est via.

¶ *Aegyptia Andromachi.*

Argenti spumæ drac. xliij. ricini heminas vj. ceræ drac. cxliij. ammoniaci thymiamatis drac. lxxij. terebinthinæ drach. xxxvj. lanæ ustę drach. xvij. squamæ stomomatis, squamæ æris, aristolochiæ, thuris, singul. drach. viij. myrrhæ drac. iij. opoponacis drach. ij. marinæ aquæ, ad conspergendam ceram, drach. l. Conficito. Etenim argenti spuma, quum mediū temperamenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus, paululū ad siccitatem inclinat. At cera, materię locum obtinet, non virtutis efficaciam adiuvat: tametsi vis quædam ei perexigua emolliendi insit. Jam terebinthina, q̄ cera, magis mollit, calfacit, & digerit. Porro ammoniacū inter emollientia principatum obtinet: in digerentibus mediū est. Quare compositum ex oleo ricinino & gutta ammoniaci medicamentū, abundē potest digerere, emollire, & nimirū etiā siccare. Jam lana cōbusta, aristolochiaq; plurimū digerūt, exiccantq;: thus autē digerit cōcoquitq;. Myrrha etiam nō ignaviter calfacit & exiccat: sed utrunque opopanax præstat multō absolutius. Cæterū squama æris, stomomatisq;: præterq̄ quod validē siccant, vim etiam astringendi fortiuntur. Consentaneū autē est, Andromachum pro hemina uncias novem mensurales accipere, ita ut sex heminæ uncias

quingenta quatuor mensurales absolvant: quod idem est ac si dicas, mensuræ Romanæ lib. iij. s. Ego verō olei Romanā libram, quam per dissecta cornua metiunt, ponderavi quandoq; discere cupiens quantū gravitatis pondus, contineret, inveni; duodecim mensurales, decem unciis ponderis æquales existere. Præscriptum igitur medicamen, cruentis vulneribus, ulceribusq; aliis nō paucis bonum medicamentū redditur:

10 sicuti & ad abscessus, & omnia quæ discuti possulant. Nec ignoratis medicamenta quæ simul cum digerentibus etiam astringentia recipiunt, longē tutiora esse: quæ verō absq; adstringentibus digerūt, efficaciora quidē, non tamē perinde tuta. Sæpe siquidē fluxiones attrahunt, dum corpus quod curatur, plethoricū est, aut pravis succis redundat. Adeo itaq; digerit generosē prædictum pharmacum, ut etiā pus, si non admodum copiosum sit collectum, discutiatur, absq; incisione cutis: emollireq; callosa, & quomodocūq; indurata possit. Congruit etiam nudatis nervis, & si in parte quapiam abscessi fuerint. Etenim præcisi nervi, tametsi periculo q̄ consortii lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas inferuntur, sensu destituūt: taleq; medicamē desiderant: nam quæ humectāt, faciliē eos putrefaciūt.

¶ *Medicamen fuscum Andromachi, Athenæ dictum, ad difficilia ulcera congruens.*

Argenti spumæ drach. c. terebinthinæ drach. xxxvj. ceræ drach. xxv. minii sinopici drac. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. xxxvj. chalbani drach. xij. aloës drach. viij. diphyrgis tantundem, æris combusti, mastiches, sing. drach. vj. aristolochiæ drach. v. propolis tantundem, mannæ drach. vj. squamæ æris tantundem. Lapidis asii drach. iij. trifolii seminis drach. ij. symphyti radice drach. j. & obolos iij. olei heminas iij. Conficito.

¶ *Hellespontia Andromachi*, propulsans phlegmonem, strumas, panos, & parotidas curans: nec non pus maturans, abscessusq; & rumpens & glutinans. Argenti spumæ drach. c. picis drach. l. ladani drach. xxv. æruginis rasæ drachmas viij. æris combusti tantundem, squamæ drach. ij. olei veteris drach. cc. Conficito.

¶ *Tyria Damocratis, ulceribus ac moribus quadrupedum congruens.*

Lithargyri lib. v. ceræ lib. ij. pityinæ pinguis lib. iij. æruginis, chalbani, æris combusti, squamæ, singulorum unc. iij. pinguis olei lib. xvj. cariosē. Conficito.

¶ *De emplastris digerentibus & attrahentibus.*

Attrahentia medicamēta nonnihil etiā discutiunt: & quæ discutiunt, pariter etiam attrahunt. Verum in digerentibus medicamentis, discusso-ria virtus: in trahentibus, attractrix præpoller.

¶ *Salsum Andromachi, digerens, extrahens, ad multaq; utile.*

Salis cōmunis lib. iij. squamæ æris unc. iij. magmatis lib. s. mannæ lib. j. ceræ lib. xliij. olei Cyprini lib. xvi. quibus acetum affunditur.

¶ *Aliud Cresiphontis, partim discutiens, partim evocans, atq; detergens.*

Aphonitri lib. mānæ thuris tantundē, lixinæ stactæ lib. Sunt qui addant etiam libram aceti.

Libram mensuralem olei, continere unc. x. ponderales, Gal. expressus est.

Digerentia quibus adstringentia sunt mista, esse longē tutiora sed minus efficacia illis quæ tantum digerunt.

Humectantia, preciosos nervos facile putrefaciunt Athenæ Andromachi.

Hellespontia Andromachi.

Tyria Damocratis.

Attrahentium digerentiumq; discrimin.

Salsum Andromachi.

*¶ Aliud ex baccis lauri.**Medicamen
ex baccis lau-
ri.*

Resinæ, nitri rufi, ceræ recentis, baccarū lauri, colophonix, sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. lxx. Cyprii decimam sextam heminæ partem. Conficito.

*¶ Aliud attrahens & digerens, ad multa utile.**Digerens
Alexandri.*

Argenti spumæ, cerussæ, chalbani, sing. libræ: salis fossilis, æruginis rasæ, sing. selibram: olei sextarios tres, atramenti sutorii unc. ij. Conficito.

¶ Aliud digerens meliceridas, Alexandri.

Salis Hispani, argenti spumæ, cerussæ, sing. libram. Ceræ, terebinthinæ, utriusq; unc. j. chalbani, vel opopanacis unc. ij. sinapios unc. vj. olei veteris lib. iij. aceti sextarium. Confundito.

¶ Aliud epispasticū, discutiens strumas, parotidas, atq; omnes abscessus, conferensq; ad articulorum vitia. Salis fossilis lib. strigmenti purissimi lib. iij. Chalbani drach. l. Conficito.

*¶ Aliud, quo usus est ad eadem Andromachus.**Digerens
Asclepiadis.*

Cerussæ, salis fossilis, sing. drach. lxxx. chalcanti drach. xij. olei veteris heminas iij. aceti heminas iij. Aliud Asclepiadis ad eadem, quod valenter etiam mammarum abscessus digerit. Ceræ, terebinthinæ, nitri, olei veteris, singulorum libram, aquæ heminam. Nitrum in aqua solutum igni admoveo, vaseq; cooperto, coquito, movens ex intervallis. Cum autē strepere adeo defierit, liquida infundito, movens assidue, donec non coinquant. Postea in mortarium transfusa, rursus tundito: inde excipiens, utitor.

¶ Aliud ad eadem.

Ceræ, terebinthinæ, sing. drach. c. nitri spumæ, olei veteris, mannæ thuris, sing. libram: lapidis asii floris selibram: chalbani, propolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. aquæ lixi- næ quod sit satis. Conficito.

G A L E N I P E R G A M E N I D E
*compositione medicamentorum secun-
dum genera, Lib. VII.*

*Malagmata
qua dicantur.*

Malagmata sive emollientia vocant Medici, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, calido omnia temperamento prædita: non tamen exiccantia, quemadmodum nec manifestò humectantia. Nā cum exactè emollientia medium quendā ordinem inter humectantia siccantiaq; fortiantur, indurescentium substantia veluti fusionē quandā molliuntur. Ubi verò fusa durities fuerit, digerentiū medicamentorum usus succedit. Porro leoninus adeps valentissimè tum calfacit, tum digerit. Proximum locum habet pardi adeps, ut qui modicè emolliat. Vim minorem in calfaciendo ac digerendo habet anserinus: habet tamen aliquatenus majorē in molliendo. Pari spacio ab hoc recedit gallinaceus. Suillus adeps, mollissim⁹, humidissimus, atq; aliorū imbecillissimus est: quare teneris corporibus convenit. Caprarū & bovm adeps quātō suillo est validior, tantō magis corporibus & natura durioribus, & inter duriora scirrhorioribus congruit. Taurinus hircinusque adeps validioribus tum corporibus, tum affectibus auxiliatur. Est autem commune tum phlegmone, tum scirrhoparticulis laborantibus, reniti prementibus digitis: distinguunt tamen affe-

*Digerenti-
bus quando
utendum.
Adipis diffe-
rentia.*

ctus ijsensu doloris & indulgentia. Igitur magna phlegmone cataplasmatibus & humidis quibusdā medicamentis sanatur: parva, cui scirrhoparities permista fuerit, tum cataplasmatibus, tum medicamentis cerati modo cōfectis: liquidisq; emplastris atq; emollientibus.

*Phlegmone
quibus med-
icamentis in-
digerent.*

Medicamen Parygron Heræ, quod medetur particulis exigua phlegmone afflictis, non multo post cōfectionem tempore. Si verò duritiem absq; dolore pars affecta contraxerit, aut si phlegmonode affectu sit libera, paulò etiam recenti vetustius utile fuerit. Eius itaque compositio est talis: Adipis suilli recentis curati unc. xliij. ceræ unc. xxiiij. cerussæ unc. vj. argenti spumæ tantundem. Conficito. At duritiem in scirrhum abeuntem, valentiora præsidia perosanant: cuiusmodi sunt, tum medullarum genus, tum bdellium utrunq; Arabicum nempe, & Scythicum: necnō styraces, ex quibus eligendus est pallidus: nam niger deterior est. Jam ammoniacū thymiam, inter ea quæ emolliunt durities annumeratur, præcipuè quod pingue est & recens. Medullarū optima est vitulina. Ex resinis aptissima est, Chia vocata, & larix. Post has pinea. Inde abietina. Strobilina verò vehemèter est acris. Pityina, quā propriè physema vocant, pinguitudinis expers, exiccat admodum. Has igitur fugere, Chia verò & abietina uti oportet, non ipsis per se, sed cum cera, & aliquo aliorum, q̄ cōducere affectui videantur. Brutia pix & ipsa eadem obtinet vim, nōnihil pinguis & tenax. Pix alia nō est miscēda, sicuti nec bitumē, utpote iusto sicciora. Exiccantia quippe, mollientibus sunt cōtraria. Quoniā verò & piceā, & phrycten resinā, & colophoniam appellare cōsueverūt, sciendū est et aliā colophoniam quandam haberi, Chiæ mastichæ similem, quæ nonnihil molliens sortitur, quemadmodū ipsa mastiche & thus. Ad hæc Aegyptia mastiche nōnihil emollit. Thus etiam quandam molliendi vim obtinet: verum hoc quidem coctum ex usu est, veluti & sænigræci semen: hoc etenim probè coctum emollit, ac magis adhuc, si adipi temperetur. Quæ citra coctionē liquari, diluiq; ob consistentiæ siccitatē, nō possunt, oleoso aliquo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleū ipsum, cui nihil astringēs inest: tum balneorū strigmenta, & quod vocatur Susinū, & hoc multo magis Comagenū. Huius generis est butyrū, althæaq; & sænigræci decoctū. Porro inter ea quæ sic emolliunt, & ea quæ validissimè (cuiusmodi existūt styrax, & bdelliū) ammoniacū thymiam idem potest quod propolis. Cæterum Scythiū bdellium Arabico est multo ad emolliendū præstantius. Chalbanum & opopanax, præterq̄ quod digerūt, etia aliquid molliens sortiuntur. Opopanax tamen digerendo, chalbanū molliendo, coquendoq; præcellit. Ex his igitur quæ produximus, valida validis, imbecilla imbecillis sunt ad hibenda affectibus. At ubi post primā pharmaci impositionē, denuò ipsum applicas, oleo pingui partē affectam fovere convenit. Ex iis autē quæ exzozza (quod tenacius hæreant) vocantur, nullo modo auferendū est prius, q̄ sua sponte abscedant: * sed ut adhæreant semper sinenda sunt, etiam si ægrotans lavetur. Vitanda autem omnino sunt medi-

*Parygron
Heræ.**Styracis dif-
ferentia.**Medullarū
optima est
vitulina.**Resinarum
differentia.**Colophoniam
duplex.**Mastiche.
Thus.**Sænigræci
semen.**Bdellium.**Ammoniacū
thymiam
Chalbanum
Opopanax**Tenacia
dicamenta
non esse ad
secunda prin-
cipia sua
sponte excu-
dant.*

medicamentis aquarum lavacra: præsertim quæ chalcantem, alumen, & sulfur referunt. Cum igitur malacticorum sint varij gradus, & differentiæ, certè malacticis primi ordinis ad exiguas durities, atq; in mollibus utemur corporibus: ut secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporum habitus: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

¶ *Malactica primi ordinis.*

Butyrum, vel resina colophonia, & cera candida non vetusta, singula pondere æqualia, invicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquidum similiter medicamen, quod Parygron vocant, primi ordinis est. Emollientiū imbecillimū est cera cum butyro soluta, aut ex fusino, aut comageno. At his imbecillius ceræ non dictum. Jam ex ovis cerata facta, exiguum quandam relaxandi vim possidet. Valentiora his, verum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex œsypo, resina, & cera pari pondere liquefactis.

¶ *Malactica secundi ordinis.*

Emplastrū quod ad Mnasæū refertur, rectissime secundo malacticorum ordini ascripseris: nimirum constans ex oleo veteri, argenti spuma, & suillo adipe. Cæterum si omnia illa fuerint recentia, imbecillimū pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente veteri: adipe autem recente. At validius adhuc, ex vetustis ambobus constiterit. Quocirca secundum vetustatem quidem olei & adipis, pondus autē singulorum quæ induntur, varias differētiās ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argenti spuma injecta, medicamen potestate mollius evadet: pauciore, validius: ac magis emolliet, si plus adipis immittam: digeret fortius, si augeamus oleū.

¶ *Amythaonis malagma ab Asclepiade scriptum.*

Ammoniacy thymiamatis unc. xxxvj. ceræ tantundem: terebinthinæ unc. viij. bdellij tantundem: chalbani, thuris, myrrhæ, sing. unc. iij. Cyprini heminas iij. Conficito. Discutit omnē duritiem. Valet contra præcordiorū tensiones, impeditosque articulorum motus.

¶ *Malagma Dioscoridis, ad eadem.*

Ceræ minā unam: resinæ phrycæ, chalbani, iridis Illyricæ, sing. minæ dimidium: irini facule quod satis est. Vini quantū volueris. Conficito.

¶ *Malagma Lucij omnem duritiē digerens, articulosq; impositos relaxans.*

Bdellij, sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sing. drach. xvj. opopanax, chalbani, cachryos, styracis, thuris, sing. drach. viij. piperis grana clx. irinæ faculæ quod sit satis: ceræ, resinæ terebinthinæ, sing. sēlibram. Vini quod satis esse videatur. Conficito. Est enim extremi emollientium ordinis, ut quo nullum durefcentia magis emollire comperias.

¶ *Malagma Neapolitæ ab Asclepiade scriptū, cōtra omnes durities: quod etiam pleuriticis auxiliatur.* Vini pissitæ sextarios sex: ceræ lib. vj. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, utriusq; unc. iij. terebinthinæ, thuris, myrrhæ, aloës, aphronitri, lapidis Asij floris, gentianæ radice succi, sing. unc. vj. sagapeni, sulfuris vivi, propolis, sing. unc. iij. panacis rad. sampsychi, piperis albi, sing. unc. iij. Conficito, & utitor.

¶ *Malagma Andromachi.*

Picis lib. iij. ceræ lib. ij. resinæ libram: chalbani unc. ij. ammoniaci thymiamatis tantundem: mannae unc. iij. aceti sextarios iij.

¶ *Malagma Andromachi ex meliloto.*

Nardi Gallicæ drach. x. cyperi, cardamomi, reos Illyricæ, myrrhæ, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. viij. terebinthinæ drach. l. ceræ recentis drach. c. cyprini hemina dimidiū: aceti quod sit satis. Conficito.

¶ *Malagma ex baccis lauri, Andromachi.*

Ceræ, picis brutiæ, baccarū lauri, nitri, resinæ phrycæ, sing. drach. lxxv. chalbani, ammoniaci thymiamatis, cachryos, ameos, sing. drach. xij. piperis albi drach. xvj. cyprini hem. vj. Conficito.

¶ *Ad ischiadicis generosum.*

Rutæ agrestis seminis, silphii, baccarū lauri, aphronitri, abrotoni, colocynthidis, cardamomi, ameos, sing. drach. iij. Rutæ viridis, picis, terebinthinæ, ammoniaci thym. ceræ, sevi, sing. minæ partem octavā: chalbani drach. vj. opopanax drach. iij. sulfuris vivi tantundem. Conficito.

¶ *Ad lienosos.*

Ceræ minam: ammoniaci thymiamatis minæ dimidiū: aluminis liquidi drach. l. stringenti heminam. Capparis rad. calaminthæ rad. myrobalani facis, quod magma vocant, sing. drach. l. acetum aridis, oleo adjecto liquidis, utitor.

¶ *Malagma ad hepaticos.*

Ammoniacy thymiamatis, bdelli, sing. drach. cxliij. croci, myrrhæ, sing. drach. xij. ceræ drach. cxliij. aceti quartam partem hemina: cyprini heminam. Conficito.

¶ *Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum.*

Oenanthæ unciam: omphacii unc. iij. phoenicobalani carnis unc. ij. acaciæ, rosarū, aloës, singul. unciam: gallæ, aluminis, picis, sing. unc. iij. ceræ unc. iij. Vinum aridis affunditur.

¶ *Ad hydropicos & flatuosos.*

Picis liquidæ, ceræ, utriusq; librā: nitri, sulfuris vivi, aluminis fissi, sing. unc. vj. Permisco.

¶ *Malagma Antipatri ad colicos.*

Silphii drach. ij. elelisphaci, casia, melanthii, staphidis agriæ, chalbani, struthii, sulfuris vivi, sing. drach. iij. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, sing. drach. vj. Asii floris drach. xxv. ceræ drach. cl. resinæ tantundem: olei heminam. Conficito.

¶ *Anodynon Nicostriati ad podagram.*

Ceræ libram: ammoniaci thymiamatis unc. iij. opopanax unc. iij. s. meconii unc. iij. cyprinum ad contusionem eorum adhibetur.

¶ *Aureum malagma ad arthriticos.*

Resinæ strobilinæ lib. ij. chalbani drach. xij. a-xungia porcina tantundem: ceræ drach. xxiiij. baccarum lauri drach. xij. Incoquito ut decet.

¶ *Aliud ad laterum dolores.*

Cypero, cardamomi, manna, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, ceræ, irini, sing. libram. Misceto. Porro phlegmones, scirrhiq; eadē quodammodo generatio & curatio est. Nascitur enim ex confluxu humorum uterq; affectus: curatur iisdem vacuatis: quanquā evacuationis mo-

*Inflammatio
nis curatio.*

*Scirrhi ca-
ratio.*

*Scirrhi incu-
rabiles, ab
is qui possunt
curationem
suscipere,
quomodo di-
scernantur.*

*Phlegmona
quando in
scirrhum de-
generent.*

*Pori quomo-
do generen-
tur.*

*Calculi ut gi-
gnantur in
renibus.*

*Refrigeran-
tia quando
scirrhos pro-
ducant.*

*Inflamma-
tionibus qua
medicamen-
ta consentire
videantur.*

*Acopa medi-
camina qua-
lia nam esse
debeant.*

*Resinarum
differentia.*

*Adipis diffe-
rentia.*

*Dura corpo-
ra valentio-
ra medica-
menta postu-
lant, quam
qua molli
carne sunt
prædita.*

dus utrobique idem non est. Quippe inflammatis quidē particulis tum repulsoria medicamento- rum qualitas, morbi initio, tum discussoria, semper ex usu est. Schirrhosis autē sola discussoria, sine repellente. Itaq; summē indurata scirrho, prorsus insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, quod nullus sensus partibus affectis supersit. At in quibus sensus quidē est, sed obscurus, hæc curantur pharmacis digerentibus incrassatum humore: non tamen validē, ac universim hoc agētib;: quod epispastica solent. Quocirca minimē sanē oportet mirari, si partes inflammate scirrhum interdum contrahant, dum videlicet humor quidē influens est simul crassus & viscidus: curatio autē medicamentis valdē exiccantibus administratur. Nam quemadmodū in externis rebus, permulta corpora quæ ignē contingunt, ab ipso torrentur, atq; rursus ab aqua emolliuntur: ita in particulis inflammatis, ex humore ipso, a calfacientibus & exiccantibus acerrimē deficcato, relinquitur quippiā crassum & viscidum, nimirum omni tenui discussio. Atq; hac sanē ratione in morbis articularibus pori gignuntur: nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quæ phlegmonē gignit, tenui substantia sit, curatioq; ejus per siccantia & calfacientia pharmaca administretur, nihil scirrhosum relinquitur: imō refrigerantia vehementer, astringentiaq; scirrhos procreare tunc solent. Unde multis per erysipelata vehementer refrigeratis, occalescere solent humores. Igitur optimus usus in dolentibus inflammationibus est, qui medicamentis abundē humidis simul & modicē calfacientibus administratur. Alter paulō crassioribus & siccantioribus constat. Tertius relaxantib; nominatis, quæ nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximē emollientia quidem, quæ cōsistentiam cerati referūt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante cōstantur. Temperatur ipsis œsypi, resinæ, & picis, modicū: sicuti & thus & chalbanum, & nonnihil ireos Illyricæ.

¶ De acopis, sive labores lenientibus.

Acopa medicamenta omnia, liquidæ cōsistentiæ necessariō esse debent. Inter quæ sanē oleum per se, eos labores qui summam cutem infestant, persanet: altius autem ingruentes, vehementioresq;, alicui relaxanti, & mediocriter calfacienti cōmixtū: ut chalbano, resinæ terebinthinæ, colophonixq; phryctæ appellatæ. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthinā verò laxior nonnihil calore superat. Cæterū id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est Saba-num, injecta interdum & cera. Jam verò unguen est, ubi dolor altius infestat, medicamen ex semine abieris, chamæmeli, anethi, & floris populi: præterea fufinum, gleucinū, & comagenum, & quæ tum ex medulla, tum adipe componuntur: suillo quidem, moderatissimē relaxate: gallinaceo autē, his vehementius: & hoc adhuc magis anserino. At adeps leoninus, & pardi, validior est, ut jam vehemēter calfaciat, eoq; discutiat insigniter. In medio horū, bubuliq; & caprilli, consistit vulpiū atq; hyænæ adeps. Meminisse autē oportet, dura corpora requirere valentiora pharmaca: mollia verò & humida, minimē ta-

lia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quæ dicuntur myracopa medicamenta, ex acoporum cum unguentis temperatura fieri, nihilo cæteris præstantiora, nisi odoris fragrantia.

¶ Acopon Themisonis ab Asclepiade scriptum.

Sampfuchi, roris marini foliorum, fœnigræci, sing. sextariū unū: cardamomi, brathyos, sing. sextarij dimidium: vini dulcis sextarios tres: olei venesfrani trepodo: ceræ lib. ij. Cōficito ut decet.

¶ Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cyprini, gleucini, ceræ, terebinthinæ, sing. unc. iij. Cōficito.

¶ Acopon Aphrodæ dicitur, hoc est, fœtidum appellatum.

Ceræ, terebinthinæ, sing. drach. viij. chalbani drach. vj. olei veteris heminas duas: medullæ cervinæ drach. viij. Cōficito.

¶ Aliud ad omnem nervorum dolorem.

Resinæ terebinthinæ drach. lvj. ceræ drach. xxviij. ammoniaci thymiamatis drac. xxxij. chal-bani tantundem: medullæ cervinæ drach. xxiiij. olei veteris heminas duas. Cōficito.

¶ Aliud dicitur castoreo, hoc est, ex castorio: quod solutis, & omni diuturno malo auxiliatur.

Œsypi unc. iij. medullæ cervinæ uncias iij. terebinthinæ uncias iij. ammoniaci thymiamatis, chalbani, castorij, piperis albi, euphorbij, adarces, nitri spumę, opopanacis, sing. unc. ij. olei styracis unc. j. olei irini unc. ij. olei veteris heminā unam: ceræ selibram. Cōficito.

¶ Unguentum dolores articularum discutiens.

Thuris, piperis albi, sing. drach. x. aphronitri drach. viij. myrrhæ drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. vj. aceti quod satis: oli Cyprini heminam unam.

¶ Medicamen ex populo.

Populi nigra furculorum minam: cucumeris agrestis rad. lib. iij. casia fistulæ lib. ij. unguenti crocini lib. ij. croci unc. iij. vini odorati sextarios xij. olei Sabini sextarios x. sampfuchi, ceræ, sing. lib. iij. Surculos populi diligenter cōtusos in vase duplici unguentario cōtineto: quibus sampfuchum, cucumerisq; radices concisas adjicito. His vinum superfundito. Omnia diebus novem macerari finito. Sequenti die oleum adjiciatur, & rursus accuratē tunsa, igne non acri incoquito. Postea liquori expresso ceram subactam, & medullam lævem factam indito. Igni imposita coquito. Ubi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinum adjungito, movetoq; continuē. Crocinum verò læve factum, terrestris testudinis sanguine excipito, ut olei veteris crassitudinē habeat. Liquata croco injecta rursus tūdito, atq; exceptis utitor. Arthritide & ischiade liberat.

¶ Aliud Flavij Clementis, cuius usu novim⁹ homines toto distortos corpore, convaluisse a podagra, chiragraq;. Olei Sabini lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib. xij. ceræ, terebinthinę, medullæ cervinæ, chalbani, sing. lib. j. Oleū dividimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmaci confectionem utimur.

¶ Acopon viride Haliei.

Ceræ, terebinthinæ, olei veteris, sing. selibrā: aphronitri unc. iij. chalbani, eruginis rasæ, sing. unc.

Acopon Themisonis.

Acopon ex melle.

Acopon Aphrodæ fœtidum.

Acopon ad omnem nervorum dolorem.

Acopon ex castorio.

Acopon ad articulares dolores.

Medicamen ex populo ad articulares dolores.

Podagricum medicamen Flavij.

Acopon Haliei.

unc. iij. opopanacis unc. vj. ammoniaci thymiamatis, mannae, sing. unc. iij. acetii, melini, cyprini, irini, sing. unc. ij. sevi caprilli unciam. Conficito.

¶ Casti Acopon, ad diuturnos affectus & convulsiones.

Pysselæi, Syriaci unguenti, utriusq; sextariū: ireos Illyricæ parem modum: terebinthinæ lib. axungia tantundem. Rasuræ navalis unciam. Incoquito, ruta viridi movens.

¶ Glencini confectio Andromachi.

Myrrhæ, nardi Indicæ, cuiusq; lib. ij. costi lib. iij. styracis libram: bdellij, sampsuchi, xylobalsami, junci odorati, cardamomi, spathæ, ireos Illyricæ, misyos, asari, sing. lib. ij. meliloti, nardi Gallicæ, sing. libram: aspalathi, calami, sing. selibræ: aristolochiæ longæ tantundem: roris marini seminis sextarios duos: thuris, casia, sing. lib. iij. fœnigræci sextarios duos: sphagni, amomi, sing. lib. ij. corticis thuris libram: rosarū siccarū lib. ij. carpobalsami tantundem: croci unc. iij. baccarū lauri libram: piperis albi tantundem: opobalsami vascula tria: malabathri foliorum lib. ij. nucleos pineos virides duos: rutæ viridis unc. ij. salis ammoniaci, nitri, cuiusq; unc. iij. vini veteris sextarios duos: musti boni vascula duo. s. olei veteris lib. v. præparato diebus quinquaginta. Ad dolorem lassitudinemq; tollendam, medicamē est longè accommodatissimum.

¶ Acopon Heræ, ad diuturnos dolores coxendicis, articulos impeditos, & paralyfin, admodum efficax. Olei veteris, irini, laurini, pyraccini, ceræ, sing. lib. vj. terebinthinæ, piperis, euphorbij, sing. uncias ij. ammoniaci thymiamatis unc. iij. castorij, opopanacis, chalbanii, medullæ cervinæ, sing. unc. ij. Liquabilia liquata siccis affundito, & unitis utitor.

GALENI PERGAME NI de compositione medicamentorum secundum loca, lib. I.



Quod non modò affectus ipsi, sed etiam ægri temperies, naturaq; partis affectæ, ipsam curationem commovent, alibi à nobis est demonstratum. In hisce autem commentariis, de compositione pharmacorum ad singulas corporis partes congruente, differere est animus: ad quod jam negotium accingimur, à vitijs capillorum exorfi. Porro generatio pilorum, eadem est quæ plantarum. Nam quemadmodum ex istis quædam arte & arbitrio agricolæ, quædam juxta naturales causas proveniunt: eodem modo & in animalium corporibus, arvo quidem alicui tritum, aut hordeum, aut aliud quoddam cerealium seminū in se insita habenti, caput assimilatur: aliis verò herbis quæ in aridioribus crescunt regionibus, reliqui totius corporis pili similem generationem sortiuntur. Siquidem non secundum primam rationem, sed per accidens quodam natura ipsos consuevit gignere. Igitur affectus pilorum sunt, tum deperditio omnimoda: tum coloris mutatio, qualis in vitiligine alba, quæ leucen vocat, fieri consuevit. In id genus autem affectibus, sicuti in aliis omnibus, summè curandum est, ut quæ præsidia adhibebimus, aut ju-

vent, aut certè non noceant. At qui usus pharmacorum a methodos, non modò non prodest, sed etiam obest frequenter.

¶ De alopecia, calvitie, & ophiasis.

Quemadmodū ex plantis ipsis, nonnullæ quidem ob humorum inopiam resiccatae extabescunt: nonnullæ autem, quod humoribus à sua natura alienis imbuantur: eodem etiā modo capilli, aut propter penuriam humorum à quibus consueverunt nutriri, aut propter pravitatē, corrumpi assolent. Ac propter inopiam quidem, calvitie accidit: propter vitium autē succorū, alopecia, & ophiasis. Etenim læsa capitis pars, serpenti similis in ophiasis apparet. Alopecias autē, ob id ita appellari ferūt, quod vulpibus frequenter accidunt. Jam verò quales tandem sint ipsi corrupti humores, ex colore cutis in capite facile licebit tibi discernere. Aliis nanq; albidior apparet, aliis nigrior, atq; pallidior aliis. Quare in istis primū totius corporis purgationem molieris, aut pharmaco pituitā ducente exhibito, aut quod bilem pallidam, aut nigram eliciat: conjectura redundantis humoris, ex colore cutis inita.

Ego verò hiera exhibita semper ipsos purgavi: aliquādo nigro veratrō adjecto, ubi melancholicum succum vacuare erat animus: aliquando scammonio, si amara bilis purganda esset. Ubi verò pituitosiorē exuperare humorē conjeci, nihil admiscui. Tales siquidem, præsertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare humores consuevit: simulq; cum iis alios quosdā, etiā si scammoniū, aut veratrū nigrum, aut epithymū, non addatur. Catapotia etiam ex aloë, quæ tum scammoniū, tum colocynthidem admixtam habent, commodius ita affectos purgare solent. Post totius autem corporis purgationē, apophlegmatismis pituitam à capite detrahare præstat, ac deinde localibus uti auxiliis. Cæterum incipientes ophiasis & alopecias, per astringentia & refrigerantia

præsidia cohibere, convenit: adultæ aut, digerentibus discutienda sunt. Ego verò quendā adolescentē in principio affectionis curavi sola purgatione ex hiera diacolocynthidos. Prius tamē catapotia ex aloë undecim ei exhibueram, cicerum magnitudine. Habent autē catapotia hæc, colocynthidis partem unam: aloës & scammonii, utriusq; partes duas: quibus partem unam succi absinthii addo. Antea verò etiam mastichem Chiam, & bdelliū immiscebā. Porro pharmacū extrinsecus adhibendū, si præter hoc quod vitia

tos humores discutiat, etiam idoneū sit ad probum sanguinem attrahendum, veluti est thapsia, censendum sanè est optimū medicamen. At verò cum thapsia longè calidior sit, quàm affectus postulet, meritò ejus per se usum vitamus. Exulcerationes quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædā quæ illius vehementiā mitigent, necessario admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partium (cujusmodi Sabinum est) præstare commodè poterit. Usus quādoq; sum etiam sola thapsia, sed vehementi illius facultate, larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, vehementer quidē calfacit euphorbiū: sufficiēter aut laurinū,

Medicamenta sint semper talia, ut si non prosint, non laedant.

Capilli à quibus causis corrumpi soleant. Calvitie: Alopecia: Ophiasis.

Color cutis qualitatem humorū subtus putrescentium indicat. Pilorum corruptionis ratio.

Hiera ex colocynthide.

Catapottioria ex aloë compositio.

Thapsia faculta.

Euphorbiū. Laurinum.

sive oleum, sive unguen. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidem, oleo intrito, ac lavigato: laurino verò solo, citra alterius admistionem illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum ceræ ipsi addatur. Cum verò multò calidius sit recens euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso utaris, ad libram unam Romanam olei, euphorbii unciam unam injicies: recenti autem euphorbio, sicuti & thapsia, & omnibus for-
 ribus pharmacis, parcius utendum est. Peccatū siquidem infra modum, nullum detrimentum adfert: supra verò, aliquando exasperat, exulceratq; cutem, atq; inflammationē excitat. Similiter etiā fugienda sunt omnia valde vetusta phar-
 maca: quandoquidem vel metallica ipsa, ubi nimis antiqua sunt, suas facultates amittūt. Unius-
 cujusq; autem medicamenti vigorem, iis qui sæpe ea conspexerunt, licet cognoscere, tum ex o-
 dore, tum ex gustu, atque adeo interdū ex colo-
 re consistentiaq;. Est itaq; inter ea quæ alopeciiis
 conferunt, calidissimum medicamen euphor-
 bium: eo autem minus calidum est thapsia: post
 hanc, sinapi nasturtiumq;. Juxta alium autē mo-
 dum limnitis (quæ adarciū & adarce vocatur)
 nulli horum secundum est. Post hæc succedunt
 sulfur, & nitri spuma, ipsumq; nitrum molle, u-
 stum, & quod Berenicariū vocatur: quemadmo-
 dum & aphrolitron albū, læve, atq; laxū. Dein-
 de veratrum utrunq;, & erucæ semen, & laurini
 unguentum, aut oleum: ad hæc alcyoniū utrun-
 que, ustum, & non ustum: calamiq; tum radices,
 tum cortex, ambo usti. Quin & pix liquida, &
 cedrinum, quod cedriam vocant, & muriū ster-
 cus, ursæq; adeps. Hyænæ etiam, leonis, parda-
 lis, anserisq; adipēs congruunt: & quicunque te-
 nuium partiū substantiam sortiuntur. Amygda-
 læ etiam amaræ totæ ustæ, cōmodæ sunt: & thus
 aceto acerrimo maceratum. His itaq; omnibus
 pharmacis licet utaris, fortibus quidem, ceratū
 liquidum temperans: debilibus verò, laurinum
 oleum immiscens. Rursus inveteratas quidem,
 ac difficulter curabiles, cum fortibus persana-
 re conaberis: incipientes autem & parvas, cum
 imbecillis.

¶ *Ad Alopecias composita.*

Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing. drach. ij. sul-
 furis vivi, veratri, utriusq; drach. j. ceræ drach. vj.
 Misceto, utitorq; hoc, ceu fortissimo pharmaco,
 ad inveteratas, ægreque curabiles alopecias. Si
 thapsia non adsit, pro ipsa licet tantundem adji-
 cere seminis nasturtii, aut erucæ, aut ipsiusmet
 nasturtii. At loco laurini, picē liquidam pones.
 Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius e-
 vasit pharmacum. Porro quæ ex adipibus ac
 modica item thapsia constant, similiter profunt,
 præsertim si euphorbium & adarcium addatur.
 Sit autem adipis leonini, pardalii, & hyænæ, cu-
 jusque pars una, quibus miscere anserinum atq;
 ursinum poteris: ita ut ad duodecim adipum
 uncias, thapsiæ aut euphorbii unciam unā inji-
 cias: quanquam ambo etiam potes adjicere, si
 efficere fortius pharmacum velis. Auspicari au-
 tem semper à levioribus cōvenit, & respectu ef-
 fectus, quem pharmacum primò admotum pro-
 duxerit, sic facultatem ejus aut lenire, aut auge-

re. In alopecia igitur, primū quidem capillos no-
 vacula tollere expedit: deinde affectam cutem per
 lintheolum nec asperum, nec molle nimis, confri-
 care: ac videre ad quantum ruborem per huius-
 modi motionem pervenit. Magnā nanq; spem
 successuræ curationis tibi injicit, si per modi-
 cas defrictiones rubescat: quæ moderatæ affe-
 ctionis significatio existit. Si verò per multas fri-
 ctiones tandem succedat rubor, graviores tum
 affectionem, tum curationem indicat: præser-
 tim si quædam cuticulæ, etiam si multum confri-
 ces, non rubescant. Præ omnibus autem caven-
 dum est, ne in fortium pharmacorum admotio-
 ne, cutis ultra quàm par sit, concalescat: id quod
 tum ex colore ipsius, tum tactu deprehendes.
 Colore nanque flavior apparebit, & digitorum
 contactu satis calidam agnosces. Quare tunc ad
 molliora transeundū: aut eodem utendum qui-
 dem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiuspiam
 oleosi, vi ipsius exoluta. Utendum est & olei ca-
 lidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane,
 fomentisq; & scarificationibus: necnon cucur-
 bitis, & cerati inunctionibus. Cæterum perse-
 verante affectione, utendum est assidua rasura,
 & rubificatione ex sinapi, præscriptisq; frictioni-
 bus: sequentibus autem diebus, illita pice, aut o-
 leo cedrino, & post frictionem, scarificatu. Qui-
 dam verò acicularū acervo affectam cutim com-
 pungunt. Post hæc omnia, pharmacis quæ ex al-
 to evocare, & meatus transmutare possint, uten-
 dum. Curandum autē perpetuò est, ut in aëre ca-
 lido, insolatoq; (si id fieri possit) omnē pharma-
 cum applicetur. Hyemis verò tempore, præstite-
 rit in balneo his pharmacis uti. Porro alcyoniū
 ustum, illitumq; ex lucernarum oleo, mediocres
 discutit alopecias, pharmacum mediocre cum
 sit. Est autem lucernarum oleum communi ma-
 gis tenuium partium.

¶ *Aliud Hera, ad molli carne præditos.*

Sem. erucæ, & nasturtij, nitri, sing. partē unā:
 contritis affundito picem liquidam, utitorq;.

¶ *Aliud à Critone descriptum.*

Erinaceorum cinere permisto ursino adipi,
 utitor. Aliud. Calami radices usti, adipeq; ur-
 sino exceptas, impone.

¶ *Aliud ad inveteratas.*

Muscerdæ, thuris, cuiusque drach. ij. aceto a-
 cerrimo dissolutis utitor. Aliud. Cinerum ra-
 narum minimarum in ollula ustarum, muscer-
 dæ, veratri albi, radices calami ustæ, piperis al-
 bi, singulorum æquis portionibus aceto exce-
 ptis, fricato.

¶ *Aliud ex libris Cleopatra.*

Sandarachā tritam, largiq; visco querno ex-
 ceptam, loco per nitri prius præparato, imponi-
 to. Aliud. Scillæ, veratri albi, utriusq; drach. j.
 ex aceto trita, prærasis & nitro confictis, impo-
 nito. Aliud. Muscarum capita contrita affrica.

¶ *Aliud præcellens.* Murium domesticorū u-
 storū, panniculi ampelini usti, dentium equino-
 rū ustorum, adipis ursini, medullæ cervinæ, cor-
 ticis calami, singulorū æquis portionibus simul
 exceptis melle, utitor.

¶ *Aliud Archigenis, ad alopecias in alrum
 progressas.* Cum aceto, nitri gleba, aut fici fo-
 liis,

*Peccata in-
 fra modum
 non adferūt
 detrimentū.*

*Vetusta phar-
 maca suas
 facultates
 amittere.*

*Vigor medi-
 camentorum
 ex quibus no-
 tis expendi
 queat.*

*Alopeciiis cō-
 gruentia me-
 dicamenta
 simplicia.*

*Limnitis.
 Adarcium.*

*Alopeciu in-
 veteratis o-
 ptimum me-
 dicamen.*

*Levioribus
 medicamen-
 tis esse in pri-
 mis utendū,
 quando alo-
 peciis mede-
 mur.*

*Alopecia
 oleo curat
 lis argum-
 tum.*

*Alopecia
 bellis cura-*

Alcyoniū

*Lucernarū
 oleum est
 nussus com-
 muni.*

*Alopecii al-
ius progres-
s remedia
Archigenis.*

liis, usque ad dilanationem defrica: deinde de-
terfo sanguine, betam ex vino coctam impone.
Aut caricas uistas, cum vino, aut lenis farinam ex
vino, pro cataplasmate adhibe. Aut cantharidas
uistas, pice liquida exceptas, ad ceratūq; liquidi
formam redactas, impone. Aut testudinis ma-
rinæ sanguinem illine. Aut thapsiæ succum ce-
rato exceptum illine.

¶ *Aliud Aesclepiadis Bithyni.*

Spumę nitri partes dua s: salis ammoniaci par
tem unā: quibus tum uistis, tum tritis, acerrimoq;
aceto dilutis, præscalptā leviter alopecia illinito.

¶ *Aliud Sorani.*

Stercoris felis aut crocodili drach. viij. sina-
pis drach. iij. ex acri aceto lævigatas imposito.

Aliud. Fici folia cū aceto, donec lanugo p die
rit, affrica: dein stœbes succū illine. Aliud. Locū
p pumicē, pritato, & sulfuris, spumę nitri, ammo-
niaci, sing. equas partes mixtas cū aceto illinito.

¶ *Aliud calvescentes præter ætatem, & ad* 20
menti pilos non nascentes, remedium.

*vescenti-
s maturi,
pedium.* Adipis taurini insolati lib. j. adarces unc. j. suc-
ci thapsiæ unc. j. s. myrrhæ unc. j. polytrichi, cal-
litrichi, sing. lib. s. membri asini, splenis asini,
ladani, sing. lib. j. Ladanum in modico vino
conterito: adipem ad aquæ vaporem liquafaci-
to: dein asinum membrum affatum, donec in-
sumatur, radito: splenem verò cum polytricho
& callitricho in nova olla torrefacito: omnia de-
niq; confusa glaucino, aut sabino excipito, & an-
te balneum ijs utitor. Sciendum autem est, lada-
num sordes esse ab hircorū barbis desumptas,
quas illi sibi ex cisthi madore contrahunt.

¶ *De capillorum defluvio.*

*danum es-
ordes ab
corū bar-
desum-
s.* Est & alia pilorum affectio, quæ ad raritatem
cutis, inopiamq; substantiæ pilos gignentis, con-
sequitur, maximè superveniens à morbo conva-
lescentibus. Quapropter curatio etiam hoc mo-
do læsorū non eundem scopū, quem alopeciæ,
habet. In alopeciis siquidem, ut vitiatus humor
consumatur, primariū scopum habemus: in his
verò, ut capitis habitum robores, & alimen-
tum boni succi attrahamus, cutiq; densitatem &
raritatem moderatā restituamus. Quamobrem
ad pharmaca humectantia aliquid moderatè a-
stringens admiscere oportet, quale est ladanum,
quod utraque in se moderatè complectitur, quæ
ad hoc symptoma cōveniunt: caliditatem nem-
pe mediocrem, & astringendi vim moderatam.

*illorum de
ij causa.* Quare si capiti prius raso, p̄fricatoq;, aliquo
mediocriter astringenti oleo (cujusmodi Hispa-
num, & lētiscinum est) illinatur, maximè ex usu
est. Nam quæ vehementer astringunt, omnia e-
tiam refrigerant, & alimenti influxū reprimunt:
propter cujus inopiam capilli defluūt. Atqui in-
tentio nostra est sanguinem affluentem non mo-
dò non præpedire, sed etiam prolektare: cogere
autem sensim, & astringere rarefactam cutem.

*ingen-
hehemen
efrige-
alimen
influxū
munt.* Quare ad defluvios capillos omniū præstantis-
simum medicamen est, quod ex ladano, & lenti-
scino oleo conficitur. Quod si largè defluant ca-
pilli, majorq; videatur esse raritas cutis, pro leni-
tiscino, myrteo utendum. Licebit aliquando un-
guentum adhibere nardinum, in ætate frigida,
& hyemale tempore: sicuti in divitibus foliarū,

& spicatum. Debet autem ladanū liquari in du-
plici vase, ac reliqua postea illi misceri. Atq; hæc
sanè medicamenta mihi suffecerunt, unā cum re-
fectoria, salubriq; victus ratione, quæ in plerisq;
etiam sola suffecit.

¶ *Archigenis remedium contra de-
fluvios capillos.*

Ladani & absinthij æquales partes, & junipe-
ri baccas x. tritas, in linteolū illigato, & in oleo
per dies quinq; macerato, ex eoq; caput illinito,
& neq; capilli decident, neq; gignentur furfures.

¶ *Aliud Cleopatra, capillos augens citò,
densansq; & denigrans.*

Ladanum ex oleoq;, vino dulci lævigatū in-
erassatumq; præfrictis illinito.

¶ *Comptoria ab exornatoria medicina par-
te, quomodo differat.*

Comptoriæ quidem scopus est, inducere pul-
chritudinē. Exornatoriæ medicinæ partis, quic-
quid secundum naturam est, id omne in corpo-
re custodire: ad quod etiam naturalis pulchritu-
do cōsequitur. Indecorū enim aspectu est caput
alopecia vitiatum: sicuti etiam oculi ciliis & su-
perciliis nudati. Non solum verò ad pulchritudi-
nem, sed multò prius ad ipsam partium sanita-
tem, pili conducunt. At faciei colorem per phar-
macea nitidiorem, aut rubicundiores reddere,
aut pilos capitis crispas, aut fulvos, aut nigros,
aut auctos: hæc inquam comptoriæ pravitatis,
non medicæ artis sunt opera.

¶ *De tincturis capillorum.*

Quandoquidem tamen jam consuetudo hæc
invaluit, ut vetulæ quidem passim capillos de-
nigrent, tanquam turpe sit canos habere: mari-
ti autem id probent, spectaculum per molestum
censentes, uxorem anniculam cano capite habe-
re: sanè quæcunq; præ deliciis seipsas ornant, ea-
rum nulli tale quippiam à me petenti, exhibui:
quæcūq; verò honestiores, tum ut notæ culpam
effugerent, tum ut molestias maritorū vitarent,
capillos suos nigros reddere optarunt, iis certè,
ne ex astrictoria vi nigrorem inferentiū oblæde-
rentur, consului, ut cedri liquore uterentur, ita
ut tribus aut quatuor horis ante balneum illine-
rent, & postea detergerent: idq; per quatuor aut
quinq; dies facere pergerent. Cedria siquidem
non modò nihil lædit, sed etiam cōmoda est eis
quæ facile offenduntur è frigore, abundè videli-
cet calfaciens. Ad hæc, defluentes capillos corri-
git, & non defluentes, auctiores reddit. Contra
verò, quæ ex austeris & acerbis composita sunt,
magnoperè lædunt. Cæterum materia ex qua
constat hæc, etiam quippiam tenuium parti-
um habeat oportet, quò non in superficie tan-
tū, sed in profundo etiam cutem permutent,
progrediendo usq; ad capillorum radices. Non
solum autem in periculo versatas sæpe scio fœ-
minas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capi-
tis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offen-
duntur tamen citius, quæ frigidius capitis tem-
peramentum sortiuntur. Frigidæ nanque parti-
culæ frigidis affectionibus, calidæ calidis cor-
ripiuntur facilius. Verum minus periculum
subeunt, utpote cū à minori causa lædantur,
quæ frigidius habent temperamentū. At calidæ

*Comptoria est
exornatoria
artis pars
quomodo dif-
ferant.*

*Pili ad quid
conferant.*

*Aniculam et
cano capite
uxorem ha-
bere, specta-
culum fasti-
diendum cen-
setur.*

*Capillos deni-
grari cedri li-
quore.*

*Similibus af-
fectionibus
facilius sin-
gula corripi-
untur tamē
periclitant.*

*Periclitari
in morbis mi-
nus, quibus
contingat.*

propterea quod ægrè & vix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperata causis, maiorem læsionem incurrunt. In morbis siquidem minus periclitatur illi, quorum naturæ, ætati, habitui, ac temporis, ipsa ægritudo congruit.

¶ *Tingentia capillos, ab Archigene prodita.*

*Capillos tin-
gentia, ab
Archigene
prodita.*

Radicem capparis cum muliebri lacte vel asinino ad tertias cōcoquito, & ad noctem pro capta-
10 taplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asservata lavato. Aut corticis salicis succum ex oleo affricato. Summè nanque denigrat. Denigrant barbam suber aridum & plumbum ustum, cum betæ crudæ succo mellis spissitudine illita. Fulvos autem reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti.

Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaveris.

¶ *De pharmacis corrumpentibus pilos.*

*Pilos corrumpentia phar-
maca.*

Ex pharmacis corrumpentibus pilos, quædam proprie psilothra nominantur: quædam capillo-
rum attenuatoria: quædam penitus extirpantia. Atq; hæc sanè ultimò nominata, periculosi sunt
20 usus. Ex liquidis igitur est lixivium tali vi præditum. Ex aridis autè & metallicis, arsenicū, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaq; est, vehemētē ipsorum vim, per admistionem imbecilliorum pharmacorum frangi: quorum congruentem miscellæ modum cōjiciet primò, 30 qui ipsorum vires cognorit. Dein verò per experientiam defectum corrigit, aut etiam addet.

¶ *Psilothra Critonis.*

*Psilothra
Cronis.*

Calcis vivæ partes duas: auripigmenti partē unam. Hęc in mortariū plumbeū coniecta, aqua aut ptisanæ succo affuso terito: atq; ubi nigra red-
dētur, calfacta illini, maximè in balneo, jubeto.

Aliud. Amyli, calcis vivæ, auripigmenti, sing. unc. j. contritis utitor ex aqua dilutis.

¶ *Quæ pilos disperdant.*

*Pilos disper-
dentia.*

Disperdentia pilos componunt ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum cruore, marinæ testudinis sanguine, lachryma vitis albæ, lachryma hederæ, similiterq; bryoniæ, atq; oleo infuso. Ex marinis item scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admistis. Quin & fortiora his ex erinaceis & salamandra cōponunt, in oleo coctis. Admiscent autē ipsis alcyonia, & sandarachen.

¶ *Quæ pilos attenuant.*

*Pilos attenu-
antia.*

Attenuantia pilos deterforiæ sunt facultatis. Igitur hordei, fabarū, atq; erui farina, spuma nitri, atq; ipsum nitru, familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollendas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiam pilos attenuat. Quæcunq; verò fortius detergent, in ijs qui valdè du-
ros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sanè sunt, nitrum ustum, nitri spuma, & aphrolitrum spumofum, pumex, testæ ustæ, os sepia, utrunq; veratrum, struthium, bryoniæ & 60 dracunculi radix, aristolochia utraq;, canchry, radix panacis, atque id genus alia. Quod si hæc ipsa odorata facere vis, cyperum, melilotum, rosas siccas, junci odorati florem, iridem Illyricā, melissophyllum, et cydoniam herbam eis admi-

scebis. Si verò pro divitiis pharmacum præpa-
res, spicam nardi Indicam, Celticamq;, & mon-
tanam injicies: necnō Eretriada terram, solum
malabathri, amomum, myrrham, crocum, co-
stum, & hedychrom.

¶ *De furfuribus.*

Quibusdam se scalpētib; furfuribus similia
ex capitis cute decidunt: ob idq; medici hoc sym-
ptoma furfures vocant, à vitiosis iisdemq; sero-
10 sis succis proveniens: quos absumere propositū
est, iis qui huic malo mederi volūt. Manifestum
igitur est, discussoria & extersoria pharmaca ad-
hibenda esse, præparato prius universo corpo-
re, si vitiosis succis redundet. Admiscuerūt qui-
dam hujuscemodi pharmacis etiam astringētia
nōnulla, quibus partē læsam ita corroborarent,
ut non facilè influentes humores susciperet.

¶ *Remedium Archigenis contra furfures.*

Nitri spumā, & atramentū sutoriū æquis par-
20 tibus, cum vino tundito, utitorq; ter aut quater
in mense. Aut vini Rodij facem, & pumicis,
& nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

¶ *De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.*

Pediculi nōnullis in capite acervatim gignun-
tur, ex multis humoribus calidis quidem, sed nō
ad tantam caliditatem progressis, ad quantam
perveniūt acres atq; serosi humores. Quare ma-
nifestum est, in profundo cutis, pedicularis mor-
bi affectionem fieri, ubi etiam animalcula hujus-
modi gigni possibile est: nō in superficie, in qua
ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaq; ipsorum
necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alto trahere
& evacuare possunt, magis utique quàm ea, q
conveniunt furfuribus.

*Furfures cu-
piti a sero-
succis oriri-
tur.*

*Furfurū
piti curat.*

*Pediculi in
capite a qu-
bus causis
oriuntur.*

¶ *Remedia Archigenis contra mor-
bum pedicularem.*

Staphitis sylvestris partes ij. sandarachæ & 10
nitri utriusq; partem j. cum aceto & oleo capiti
illine. Aut oxylapathi radicem cum oleo.
40 Aut veratrū album, & staphidem sylvestrem, &
nitru, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

¶ *De achoribus, hoc est, ulceribus capi-
tis manantibus.*

Inter affectus invadentes capitis cutē, achor
annumeratur, ex genere tumorum præter natu-
ram existens: quo affectu infelata particula, fo-
raminibus quibusdam tenuibus eroditur, tenui
humore modiceq; viscido redundantibus. Ad si-
militudinē verò eius proximè accedit alia cutis
50 affectio, quæ Cerion Græcis, Latinis favus vo-
catur, habēs majora foramina, in quib. humor
hymettio melli similis continet. Generatio ipsis
ex humore mixto est, qui partim tenuem, sero-
sumq;, ac mordacē, partim crassū succū in se ha-
bet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primū
quidem ad scalpēdum ipsos impellit: progressu
verò temporis, ad scalpēturam tum tumor auge-
scit, tum foramina circa ipsum erumpunt. Mani-
festum igitur est, humores qui affectionem gi-
gnunt, debere vacuari. Qui si etiam fluant am-
plius, prohibendus in primis est ipsorū influxus
per capitis atq; universi corporis evacuationē.
At verò si affectio ipsa sit parva, sola remedia lo-
calia sufficiūt, vel si minimè totū corp' vacuet.
Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum
humorem

*Pedicular
morbū rem-
dia.*

Achoris.

Cerion.

*Achorum
forūm q;
ratio.*

humorem incidant, quæq; facultate sua necessa-
rio discutiant repellantq;. Atqui acetum ex inci-
dentium ordine existens, ultra hoc quod discu-
tit, etiâ reprimat, depellitq; id quod influit: cum
nimirum secundum substantiam suam habeat exi-
guum quid calidi: plurimum autem frigidi, sed te-
nuium partium. Esse autem debet acetum exqui-
site acutum, in quo nulla penitus vini qualitas
persentiat. Ac tali profecto pharmaca metalli-
ca imbues, achoribusq; ex ipsis medeberis. Inci-
pere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim
si simul dolor infestet. Aptæ igitur ad hanc rem
sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaq; terra:
præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & ca-
dmia tenella. Quod si his remediis malum non
cedat, pharmacū ex charta siccā, aceto dilutū il-
linito. Prius tamen capillos abrasdes. Quod si
quādo in ulcus manans inflammatum simul &
afflictum dolore incidas, lenies primū dolorem
ipsum per humectum concoctoriumq; & emol-
liens pharmacū, & quod acrimoniā arcere pos-
sit: cuiusmodi sunt tum vocatū Parygron, tum
quæ sedis ulceribus, & canceris opitulantur.

¶ *Remedia Archigenis ad achoras.*

Cadmia cum oleo veteri illinito. Aut cinna-
bari similiter tritū imposito. Aut chalcitidem
cū myrteo oleo, vel suillo felle liquido inungito

¶ *Remedij Apollonii ad achoras.*

Caput succo betæ illinito, aut laurino oleo,
aut crocino unguento, aut taurina, aut camelina
urina. Vel furfurum chœnicem dimidium in a-
quæ heminis duabus madefacito, posteaq; teri-
to, cremoremq; excolato, cumq; dimidia aceti
hemina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo ca-
put fricato. Vel cucumeris agrestis radicem co-
ctarum succū partem laesam illinito. Vel argenti
spumæ drach. viij. foliorū rutæ tenerorū drach. v.
olei drach. viij. aceti quartam partem hemina,
simul trita capiti illinito.

¶ *Quæ Crito ad achoras prodidit.*

Ficulneæ furculos, aut folia tenera trita cum
aqua imposito. Aut recrementi ferri, & rosarū
par pondus cum vino tundito, impositoq;. Vel
lithargyri drach. l. foliorū rutæ tenerorū drach.
xxv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo exce-
pta, cum penna illinito. Vel, si affectio fuerit in-
veterata, ladani, cerussæ, sing. drach. viij. sulfuris
vivi drachmas iij. vino & myrteo oleo suba-
ctis utitor.

¶ *Ex libris Cleopatæ ad achoras.*

Fœnogræco tenui cocto, & in betæ nigræ suc-
co macerato, caput eluatur. Post ablutionē verò
myrto cū vino & oleo trita, illinatur: superneq;
betæ folia imponentur. Vel cerussæ, thuris, sing.
drach. ij. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

¶ *Remedia Sorani contra achoras.*

Plumbaginis, sulfuris vivi æquales partes te-
rito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lentisci-
no, illinito. Vel sulfuris vivi, lithargyri, cerussæ
sing. æquas portiones, croci dimidiam, trita cum
passo Cretico illinito.

¶ *Ad psyracias & achoras, pustulasq; ulcero-
sas, & eruptiones in capite.*

Ad affectiones præscriptas, convenienti uti
oportet victus ratione: corpusq; atq; caput pur-

gare, cataportis ex aloë, colocynthide, & scāmō-
nio, succo brassicæ coactis. Dein localia reme-
dia adhibenda sunt, cuiusmodi existit adiantum
ex rosaceo illitum: aut fœnigræci decoctum affri-
ctum: aut malua cum farina hordeacea pro cata-
plasmate imposita: aut melilotū cum farina fœ-
nigræci, cicerumq; decocto impositū: aut ipsum
met cicer decoctum, impositumq;: aut amaræ nu-
ces cōmansæ & illitæ. Discutit autē maximē & li-
lij radix affricata: & thus cum vino & aqua, & lu-
pinorum amarorū decoctū, & bulbi cum nitro
affricati: thus præterea ex aceto illitum, putamen
māli punici cum laurino illitum, & anchusæ ra-
dix usta, tritaq; cum oleo, & per plinnā inuncta.

G A L E N I P E R G A M E N I

de compositione medicamentorū secun-
dum loca, lib. II.

Qui citra distinctionē scripserūt auxilia
doloris capitis, majus detrimentū q̄ e-
molumentū attulerūt iis, q̄ eis fidē adhi-
buerunt. Nec. n. omnes ob unā affectionē caput
dolent: sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum
curatio ipsarum singulatim propria existit. Una
etenim affectio est juxta intemperiem simplicē
citra humorū affluxum: alia juxta humorū quali-
tatem versatur, tertia secundum eorum solam
multitudinem accidit: quibus accedit quarta,
cū transitus liquorū atque vaporū ipsi hu-
mores obrurāt: ac præterea quinta, dum in qui-
busdam capitis partibus, propter imbecillitatē
spiritus flatuosus innascitur. Est cū ob causam
aliquam procatacticam (cuiusmodi sunt ardor
extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut
ictus) dolor capitis accidit. Vehementissimi igitur
capitis dolores fiunt juxta caliditatē & frigi-
ditatem, maximē cū inæquales fuerint: mode-
rati autē juxta siccitatē: ad humiditatē verò nul-
lus consequitur dolor. Eodem modo cū ob re-
dundantes humores capitis dolor oritur, vehe-
mentior quidem ob calidos & frigidos accidit:
moderatio autē, ob exiccantes citra calorē aut
frigus. Humectantes verò, penitus nullū dolorē
interūt, quantū ad qualitatem quidem ipsorū atti-
net: nam ob multitudinē sanē instrumentalium
partiū morbos efficiūt, non tamē similariū parti-
cularū ullum aliquē: cū nimirū earū morbi in
pura intemperie consistent. Ad hæc affectiones
ob copiam humorū ortæ, citra quidē obturationē
caput gravāt, cum obturatione verò, si quidē ea
moderata fuerit, moderatē dolorificæ fiunt: sin
fortes, vehementer affligunt. Quod si etiā mor-
dace[m] qualitatem multitudo humorū sortiatur,
etiam juxta hanc dolorē augebit. Quod verò ad
naturam affectarū particularū pertinet, interdū
quidem extra calvariam affectio fit, aliquando
intra: & interdum quidem omnes externas, aut
internas partes infestat: interdū autem non om-
nes, sed unam tantū speciem corporis, arteriam
nempe, aut venam, aut nervum, aut membranā,
aut cutem, aut ipsum deniq; cerebrū. In univer-
sum igitur, singulariū affectionū curationis scopū
ratio nos docet: materię verò facultates experie-
tia cōmonstrat. Porro aliquādo sola intemperie
calida

Capitis dolo-
rum disci-
mina, & ge-
nerationes
varie.

Dolor capitis
nullus ad hu-
miditatem
consequitur.

Similarium
particulariū
morbi in pu-
ra intempe-
rie consistunt

Capitis dolo-
rum disci-
mina, secun-
dum differen-
tiam affecta-
rum partiū
larum.

Plethorā fieri, quatuor ex aquo humoribus aut etiam sanguine solo. Doloris capitis ab ardore contracti indicia, & curatio.

Occiput nec facile exurit, nec citra noxam refrigerari, principium spinalis medullae cum sit. Spinalem medullam in sexaginta nervos distribuit. Sincipitis regionem esse aptissimam ad transmittendas vires applicandum medicamentum. Rosaceum ex ustis commodum, qualiter confici debeat. Chamamelino oleo in quibus sit utendum corporibus. Refrigerandi medicamentorum ratio. Pergam⁹ Galeni patria.

Stupefacientia, et quae vehementer astringunt refrigerando, vitanda in capitis doloribus esse. Refrigerantia sive a quibus tutum in capitis doloribus possumus.

calida ex insolatu laborat caput: aliquando cum ipsa intemperie accedit etiam humorum affluxus, praecipue cum universum corpus laborat plethora, quae fit ipsis quatuor humoribus ex aequo aut etiam sanguine solo. Nam cum alius quispia humor redundarit in corpore, non plethorā, nec simpliciter plenitudinem, sed pituitā, aut bilis flavā, aut atrā, tunc plenitudinem dicimus. Igitur eius quae ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primum contactum apparet: oculosque; 10 rubros habent, ac frigidis tum perfusionibus, tum illitionibus, oblectantur. Principio itaque; repulsoria curatione est utendum, ex refrigerantibus, astringentibusque; constante. Postea vero mitigatoria & concoctoria pharmaca, ad repulsoria miscere oportet. Deinde etiam ex discussoriis quippiam addendum, paulatim detractis pharmacis quae repellunt. Optima sunt autem celsenda quae substantia tenuium partium sunt praedita. Quapropter in principio quidem melius est frigidissimum 20 rosaceum perfundere, juxta fronte nempe, & tempora & occiput: non tamen longe inferius. Neque enim facile exurit ea pars: neque etiam citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea quod isthic principium medullae spinalis existat, ad stuporis modum in ramulos complures divisae, videlicet in sexaginta (ut existimo) nervos. At vero regio capitis juxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis ad coronalem futuram: & ob ossium tenuitatem & raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem 30 omnium quae adhibentur pharmacorum, intro distribuit. Quare si refrigerare oporteat ex caliditate ardore, siue calfacere frigiditatem, aptissimum est capitis juxta sinciput locum. Rosaceum autem ipsum, quo in exustis utemur, ex oleo crudo (quod omphacinum appellant) citra salis admixtionem, confici debet nempe rosae quae plurimis in eo maceratis. Sic autem Rosaceum non vetus, sed eo ipso anno confectum. Proximum a rosaceo chamaelinum existit, quo utendum in iis corporibus 40 est, quibus inducere vehementem frigiditatem veremur: qualia sunt foeminarum, evnuchorum, puerorumque; ac breviter eorum omnium, qui molli carne sunt praediti, albumque; colorem sortiuntur. Refrigerabis autem quaecunque adhibere voles, in aqua vehementer frigida collocata: quae si non adsit, nivem vasculo circumpones. Etenim frigidorum fontium & nivis maxima Roma est ubertas, quemadmodum apud nos in Pergamo. In regionibus autem calidis, qualis Aegyptus 50 est, ubi maxima fontium frigidorum atque; nivis penuria, sub dio rosaceum per integram noctem exponi debet: eique; sempervivi, aut portulacae, aut lactucae, aut psyllii, aut polygoni succum injicere oportet: sicut & solani aliquando paululum, & pampinorum vitis, & uvarum immaturarum. A papaveris vero & mandragorae succo abstinendum, cum non citra damnum refrigerent. Vitanda etiam sunt, quae cum refrigeratione manifeste astringunt: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscendum, si quando necessitas postulet: propterea sane & solani succum aut nunquam penitus, aut modice certe admiscemus: sic etiam & mali punici, & mali cydonii, & mespili. Ad hanc tamen rem malorum punicorum acidorum succus praestantior est: ma-

gis enim refrigerat. Equidem aliquando cucurbitae cremorem permiscui omphacio. Poterit etiam quis similiter feridis succo uti, nec non tum hortensis, tum sylvestris lactucae. Quin & mororum non admodum maturorum succus est aptus ad refrigerandum. Si igitur calvus sit aeger, aut breves habeat capillos, uberrime refrigerari poterit, tum per jam dicta, tum per omnia illa quae erysipelatis auxiliatur. Qui ex frigore caput dolent, iis facies decolor, minimeque; arefacta conspiciuntur: & frigidis neque; gaudent, neque; item juvantur. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceum oleum, si calidum affundatur sincipiti, perfecte hominem liberat. Si vero vehementiori calore sit opus, euphorbium oleo indatur, & pharmaca quaecunque; constant ex pipere. Inungenda autem est facies, ac tum aures, tum nares, praecipue irino, amaricino, & nardino unguentis: nec non foliatis spicatisque; vocatis. At opobalsamum saepe experti sumus ad nullam affectionem calore indigentem, evidenter opitulari. Sampsuchinum autem, laurinum, & serpyllinum comendo. Propinandum praeterea iis est vinum tenuium partium: & motus corporis praecipiens, lavacraque; calida: & quandoque; a raphano vomitus. In capitis autem inveteratis affectibus necessario pilos radimus, aut praefecamus ad cutem usque; ac rasis quidem admoveamus pharmaca emplastica: liquida vero iis, qui brevissime habent capillos praefectos. Ac sane medicamenta refrigerantia, ex iis quae erysipelata curant, sunt transferenda: calfacientia vero, ex pharmacis calfacientibus conficienda: quorum simplicissimum est ex euphorbio compositum. Sufficit autem unciam euphorbij unam, ad tres cerae liquefactae in olei libra una, conjicere. Atque; utendum quidem astringenti oleo, ad affectiones quae indigent calore, non est: sed aliquo tenuium partium, cuiusmodi Sabinum existit. Quibus autem ob positionem calidiorum vinorum, caput repletum vaporibus aut humoribus calidis (solent enim hi vel absque; vini potu, suapte natura ad caput attolli) dolore affligitur, jubendi iis sunt, si crudum adhuc in eis vinum permaneat, ut hausta aqua tepida vomant. Quod si etiam post concoctionem caput doleant, refrigerantibus ac repellentibus est utendum: quale est rosaceum per se & cum aceto, aut hederae & brassicae cremore. Quin & ipsa brassicae folia calida macerata: capitique; circumposita, ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Ceterum somni quietisque; cura in primis habenda est: ubi vero per totum diem quieverint, ad vesperam loti, cibis boni succi nutriendi sunt, non tamen calfacientibus. Sunt autem tales, ptisanarum succus, & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, & ova forbilia absque; garo. Admisceatur autem eis ex melle, vel ex sale condimentis aromatatum praeparato, quantum sit satis ad suavitatem saporis. Ex oleribus congruit illis lactuca, utpote boni succi atque; refrigeratoria: nec non brassica, ut quae vapores resiccat: sic & leguminibus lens. Potu vero omnino aqua utendum est. At quia nonnullis ventriculus a frigida potu subvertitur, malum punicum ipsis superedendum est, aut solum per se, aut cum aliqua flaccida calida, probeque; cocta. Quin & mala 60 Cestiana appellata in urbe Roma, citra cocturam quidem

Doloris capitis ortu a frigore indicia, & curatio.

Opobalsamum ad affectiones indigentem calorem magnopere opitulari.

Dolorum capitis inveteratorum ratio.

Dolorum capitis ab ubertate curatio.

Cestiana mala.

quidem sunt austera: post cocturā verò, stomacho evadunt commoda. Coquenda aut sunt ad vaporē aquæ suspensa. Abstinentium verò à pal-
 mulis est, ut quæ ex proprietate dolorem capitis
 excitent. Quod si moderatè jam habeant, & a-
 quam bibere nequeant, permittendus est eis po-
 tus alicujus vini diluti & aquosi, quale est in Ita-
 lia Sabinum, in Asia Titacazenum. Quin & mo-
 deratè habentibus, gallorū testiculi & alæ, & sa-
 xatiles pisces, mollesq; exhibendi sunt: nec non
 columbarū pulli. Hæc verò omnia, citra garum
 & vinum, in albis simplicibusq; coquantur juri-
 bus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modico porri
 constant: ad cocturæ finē, salis paxillo adjecto.
 Ceterum ante cibum quidem pluribus deambu-
 lationibus est utendum: post acceptū verò cibū,
 brevibus ac lentis. Oportet tamen nec multa e-
 disse, nec statim post cibū sumptū inambulare,
 sed post duas, aut tres, aut plures horas. Quod
 si quando à vaporibus aut humoribus in caput
 sublatis, reliquæ quædā supersint, in poris ipsis,
 meatibusq; angustis impactæ, & ob id etiā per-
 severet capitis dolor, non rosaceo, sed utendum
 primū chamæmelino est, moderatè calido: po-
 stea verò irino. In balneo verò caput calida per-
 fundatur, non modò ut aliquid eorum quæ cir-
 ca ipsum cōsistunt, discutiat, sed somni etiam
 conciliandi gratia. Quapropter secundū etiam,
 aut tertium, ad vesperam balneum apparandum
 est: post quod exhibendæ lactucæ ex aceto, cui
 paxillum, aut omnino nihil gari additum sit:
 verum aqua affusa multa, ita ut acetū exaquet:
 nisi acetum sit planè aquosum, quale utique illi
 desiderant: quandoquidem quod acerrimū est,
 aliquem calorem sortitur. Post hæc verò poste-
 ra die, quæ magis caput calfaciant, administran-
 da sunt ita ut ad irinum, aliquando amaricinum
 unguentum, aliquando nardinum addamus.

At capitis dolor ob plagam conspicuam or-
 tus nihil est aliud quàm inflammatio, quæ non
 ex plaga solum aut casu, sed absq; manifesta etiā
 causa, juxta omnes partes fieri ob affluxum hu-
 morum consuevit. Si igitur plaga vulneris aut
 contusionis existat causa, plures scopi erunt ad
 inveniendā præsidia. Unus qui circa vulnus ver-
 satur, quod, posteaquàm fuerit cōstrictum fi-
 bulis, glutinantiæ & arcentiæ phlegmonem me-
 dicamenta postulat. Secundus contusioni est in-
 tentus. Tertius totus in doloribus est: qui inter-
 dum quidem in ipsis solis percussis partibus fi-
 unt, plurimum autem ad vicinas etiam partes
 se extendunt. Etenim pericranium, & eius cutis
 exterior, propriam continuamque substantiam
 habent, per totum caput extensam: ob idque sa-
 nè contingit universum caput dolore affici, præ-
 fertim si ad perioption membranā, quæ cra-
 nio est adhærens, plana ipsa penetret: cui me-
 debimur dividentes pericranium membranā,
 subditumq; illi os radentes, utq; illic rursus con-
 crescat caro, curantes. Quod si ob commercii
 illud quod per futuras perioption habet cum du-
 ro cerebri involucro, etiam intra calvariā di-
 stribuatur phlegmone, non absque periculo ta-
 lis dolor contingit. Contingit autem non rarò,
 ubi quis ex sublimi cecidit, ut aliquid circa cere-

brum, aut membranas eius, rumpatur: quod ubi
 cōtingit, adhuc amplius invalescit ipse capitis do-
 lor, affectioq; tota ægrè curabilis redditur, & pe-
 riculum majus, magisq; præceps imminet. Opti-
 mum itaq; fuerit in his, nisi ætas prohibeat, vita-
 lisve facultas appareat debilis, curationem à ve-
 næ sectione auspicari: & convenientibus capitis
 irrigationibus subinde uti, oleo dulci imbuētēs
 lanam, capitiq; illam circumponentes. Quod si
 aut per ætatem, aut vires, non liceat sanguinem
 ipsum detrahē, deijcienda alvūs per clysmum
 est, tum ut eius excrementa vacuentur, tum mul-
 tō magis ut revellantur humores ij, qui consue-
 verunt ferri ad affectas particulas. Postea verò
 auxiliis utemur ad inflammationes congruenti-
 bus. Si igitur membrana cerebri vulnerata fue-
 rit, egregiè ipsam conglutinat (ut ait Archige-
 nes) calaminthæ succus infusus, & farina mi-
 lij arida inspersa: deinde butyrum & rosaceum,
 acadeps suillus insulsus, vetusq; omnia in unū
 cōmixta, tepēfactaq; & infusa. Hoc modo affe-
 ctos, à vino & cibis crassioribus abstinere opor-
 tet, maximè si correpti sint febri. Etenim affe-
 ctio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatem au-
 tem singulorū, particularemq; materierū diffe-
 rentiam, tum affecta particula, tum ægri tempe-
 ramentum cōmonstrat: nec non vitalis facultas,
 deinde ætas, ambientisque nos aeris temperies,
 juxta regiones, anniq; tempora, & prædominan-
 tem anni constitutionē evarians. Porro ad phre-
 niticos, quando quidem omnia, quæ extra cal-
 variā circa cutem atq; ipsum pericranium cōsi-
 stunt, immunia ab affectu sunt, rectè, mea qui-
 dem sententia, aliis pharmacis acetum miscue-
 runt veteres. Siquidem ad affectiones in pro-
 fundo delitescētēs, pharmaca diversa ab iis, quæ
 affectibus in superficie hærentibus congruunt,
 debent administrari. Exolvitur nanq; omnium
 ipsorū vis in transitu per profundum: & ob id ad
 propria affectioni auxilia, aliquando contrariā,
 & nocentis facultatis pharmaca temperamus.
 Quippe acetum ex se, cum nec mitigandi, nec la-
 xandi vim habeat, præter rationē miscetur auxi-
 liis iis, quæ ad dolentem inflammationē admini-
 strantur. Quia verò per sinciput pharmacū pe-
 netrare volumus, ob id sanè aliquod eorū, quæ
 in profundum deducunt, miscemus: interdum
 quidem frigida facultate, sed tenuium partium,
 præditū, cujusmodi acetum existit: interdum ve-
 rò calida, quale est euphorbiū. Quocirca, dum
 crassæ membranæ cerebri nudæ instillamus ro-
 saceum (quod fieri solet, ubi officulum aliquod
 est exemptum) solum ipsum leniter tepēfactum
 infundimus. Cum verò citra denudationem, in-
 tegra existente calvaria, rosaceum cupimus ut
 per sinciput ad membranā cerebri penetret, ace-
 tum illi, ut ipsum perducatur eò, temperamus: cu-
 jus vehemens facultas, tum per viarum transi-
 tum, tum per rosacei miscellam, exolvitur. Jam
 verò inflammationes quæ in capitis cute, aut e-
 tiam in pericranio consistunt, si quidem citra ve-
 hementem dolorem accidunt, per modici aceti
 ad rosaceum missionem juvari possunt: lāden-
 tur autem, si & magnæ fuerint, & dolorē vehe-
 mentē induxerint. Ad hæc rosaceū cum aceto,
 incipi-

*Meningem
cerebri vul-
neratam con-
glutinantini*

*Affectiones
sita in pro-
fundo, diversi
pharmaca
ab iis quæ hæ-
rent in super-
ficie, deside-
rant.*

*Acetum cum
miscetur ro-
saceo ad phre-
nitidem.*

*Fractio cra-
nio commodè
instillari ro-
saceum tepēs
in crassam
meningem.*

*Acetū quan-
do sit rosaceo
miscendū ad
affectiones
capitis.*

*Acetum rosæ
ceo mistum,
quibus profic-
et quibus ob-
sit inflammā-
tionibus.*

incipientibus: in vigore verò consistentibus, ro-
faceum solū administramus: quemadmodū etiā
in induratis, absinthium ei atq; pulegium misce-
mus: nam quæ absq; duritie jam decrescunt in-
flammationes, pharmaca laxantia desiderant.
Porro ad dolores capitis, in quibus exiccare est
animus, commodissimū cataplasma ex lolii fari-
na & adipe anserino conficitur. Sciendum autem
est, myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolo-
rem capitis conciliare: vnde eos, ipsos qui jam
caput dolent, non parum offendet. Opio autem
eo tantum tempore uti cogimur, dum præ do-
loris vehementia æger de vita periclitatur. Ex-
tinguit siquidem sensus, maximeq; solidas par-
tes offendit, adeo ut postea correctione sit opus.
Cum autem difficile sit, ut qui homo est non in
multis hallucinetur, quædam videlicet penitus
ignorando, quædam malè iudicando, quædam
negligentius scriptis tradendo: mirum cui quam
esse non debet, si aliquando deliquisse compe-
riatur Archigenes, in ijs quæ de auratione capi-
tis doloris conscripserit.

¶ De capitis dolore à ventri exorti.

Nonnulli aut vel si modicus humor in eorū
ventriculo colligatur, & præsertim circa os eius,
statim caput dolent: atq; ob id, si diutius à cibo
abstineant, offenduntur. Augetur quippe esu-
rientibus eiusmodi humorum malitia. Cum igitur
huiusmodi affectus capiti proprii non sint,
sed ab humorum noxiis vaporibus à ventricu-
lo volitantibus exoriantur: quemadmodum e-
tiam ob id genus succos, aliis suffusorum sym-
ptomata eveniunt: capiti adhibenda remedia
non sunt, sed q̄ celerrimè qui in vêtre cōtristant
succo, vacuandi. Vacuantur autem in ijs qui ad
vomitum sunt proclives, facile ab aquæ potu:
ægrè verò vomentibus, difficilius. His igitur co-
nabimur quāprimum cibū boni succi, ac ventri-
culo commodum exhibere, si res ita ferat, à bal-
neo: si non, ante balneum tantum cibi offere-
mus, ut non lædantur inde postea lavantes. A
cœna autem modicum absinthii in potu dabi-
mus: postridie verò, in posterumq; similem vi-
ctus rationem illis instituemus, donec exactissi-
mè concoquant. Quo tempore jam licebit illis
modicum panis præbere circa tertiam aut quar-
tam horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, ut
satis amplum spacium ad consuetam balnei ho-
ram intersit. Quod si qui panem absque obso-
nio edere nequeant, his olivas, aut palmulas, aut
uvæ, aut tale quippiam addemus, juxta naturæ
cujusque proprietatem. Cæterum ad pravo-
rum in ventre colligendam succorum copiam,
plurimū conducit tum imbecillitas cōcoctricis
potentiæ, tum oris ventriculi infirmitas: quem-
admodū etiam ad capitis hinc dolores gigen-
dos, tum facilitas sensus, tum caput ad ejusmo-
di humorum vapores suscipiendos promptum:
sicuti etiam & in nonnullis oculi. Qui igitur pro-
pter acres humores caput dolent, mordacem
dolorem, non tensivum, percipiunt, at fames in
tensionibus commoda est: contraria autem ijs,
qui mordaces humores collegerunt in ore ven-
triculi. Quum itaque hic mordax humor fue-
rit amarus, pallida & flava bilis vocatur: quæ

ob levitatē insitam sursum fertur, ad os ventri-
culi: cum verò pituitosus, aut acidus, aut sal-
sus fuerit, magis in totius ventris spacio cōtinetur:
ac fuerit sanè optimū, si in fundo ventris is con-
tineatur. Omnium autem est pessima constitutio,
dum vitiosi humores, ventris tunicis ineluibili-
ter sunt defixi, & imbibiti: quibus educēdis opti-
mum remediū est hiera picra, cujus talis sit com-
positio: Aloës drach. c. cinnamomi, spicæ nar-
di, xylobalsami, chiæ mastiches, asari, & croci,
sing. drach. vj. Præstantius autem est pharmacū,
ubi minus de aloë additur, minusq; etiā ex cro-
co: quandoquidem nonnulli ex usu ipsius obla-
duntur capite, id quod sæpe ex solo eius odore
perpetimur. Quare optima erit ea compositio,
quæ aloës drach. xc. croci quinas receperit: qua
sanè ipse utor. Præstat etiam pro asaro carpesiū
conjicere. Propinatur ad summū ex pharmaco
drachma una cum aquæ calidæ cyathis tribus:
minimū verò, dimidiū eius præbetur. Cōfert au-
tem hoc pharmacum ijs qui suffusorū afficiuntur
symptomatis, & mulieribus quæ nō pro digni-
tate purgātur. Quemadmodū autem in ventris
& intestinorū regionibus ob caloris quidē ino-
piam, interdum ex cibo ac potu vapor flatulen-
tus producitur: propter imbecillitatē verò facul-
tatis comprehensivæ, adeo inflantur atq; replen-
tur ea organa, ut ipsius quidem repletionis ra-
tione tendantur: ob tensionem aut impensè do-
leant: sic etiam in partibus quæ ad caput perti-
nent, possunt hæ eadem cōtingere. Etenim ob
dissolutionē continuitatis partium dissimilariū
dolor oritur. Dissolvunt autem ipsam, eroden-
tia, dissecantia, distendentia, vehementer calfa-
cientia, atq; refrigerantia. Si igitur erosionis, aut
punctionis sensum percipiant ægri, acredo vel
humorū, vel flatus, causa putanda est. Si verò ci-
tra morsum tendantur, tensio ipsa vel ab spiritu
flatulento, vel ab humoris colluvie, oboritur:
quo in genere phlegmone erysipelasq; consistit:
phlegmone quidem, ubi plurimū sanguinis affe-
ctam particulam occupat: erysipelas verò, ubi
biliosus fuerit is humor. Quod si ab utrisque re-
dundantibus aliqua pars repleatur, aut inflam-
matio erysipelatoza, aut erysipelas inflamatū ra-
lis affectio erit. Maximè itaq; artis curandi con-
jectura in affectionū cognitione consistit: quæ
ubi inventæ fuerint, curationē nō conjecturali-
ter, sed scientificè indicant: cum hoc quod etiam
cognoscere datur, q̄ ægrè aliquæ affectiones me-
delis cedant: in quibus ut utamur semper reme-
diis ab indicatione profectis, rationi est confo-
rum, tamen si nihil juvare in principio videan-
tur. Aliquando enim adeo vehementer in angu-
stis meatuū flatus vaporosus, atq; eo adhuc ma-
gis viscidus crassusve humor impingitur, ut mul-
to tempore ad curationē sit opus. Ac sanè quæ
sic infarcta sunt, attenuare oportet, dilatareque
meatus per quos excernantur, habita simul provi-
dentia, ne quid aliud amplius influat: utq; pars
affecta corroboretur, ne ipsa etiam flatulētum gi-
gnat spiritū. Qui igitur primi ad ejusmodi affe-
ctiones pharmaca cōposuerūt, meritò habuerūt
opus materia varia: si quidem influentē substan-
tiam, sive humor, sive vapor ea sit, repellere ne-
cessarium.

*Myrrhæ odo-
rem concilia-
re dolorem
capitis.*

*Opio quando
ad capitis do-
lorem uti de-
beamus.*

*Hominem in
multis hallu-
cinari.*

*Capitis dolo-
ris ob ventri-
culi confor-
tium oborti,
& indicia,
& curatio.*

*Vitiosis suc-
cis in ventri-
culo colligen-
dis, quæ con-
ferant.*

*Famem ad-
versari ijs
qui mordaces
humores
collegerunt
in ore ventri-
culi.*

*Hiera p
optimi
camini
expurge
humore
nicis &
culi inf
descrip
Croci od
ferire a*

*Hiera p
quibus
gruat a
bus.*

*Dolor um
exoriatu
Continu
tem qua
gant.*

*Phlegmone
fit a sang
ne.*

*Erysipela
oritur a
sa bile.*

*Tumores
positi.*

*Coniectu
artis med
in affectu
cognitione
consistit.*

*Præsidia
ma cur sa
in princ
nihil us
videantur*

impacta esse
quæda, at-
enuanda, di-
cutiendaq.
 cessariū existit: impactū verò cōcoquere & at-
 nuare, eandemq; ipsam discutere: ac nihilomin⁹,
 imò longè magis, affectæ parti robur inducere,
 ne videlicet q; influit, suscipiat: aut attenuatum
 excernat, impactumque concoquat, atque subti-
 lius reddat. Ergo in proposita dispositione, si
 dolorificus calor unā cum spiritu flatulēto præ-
 polleat, in principio quidem repulsoria curatio-
 ne est utendū, quæ ex facultate refrigerante con-
 stat. Quod ubi factum moderatè est, ex mitiga-
 toriis & cōcoctoriis quippiam ad repulsoria mi-
 scere oportet: dein discussoria addenda, ita ut
 paulatim repulsoria detrahamus, donec phar-
 macum ipsum plurimum quidem digerēs at-
 tuatoriumq; reddatur, minus autem concocto-
 rium & mitigatorium, minimum verò repulso-
 rium. Portulaca igitur refrigerantis & aquosæ
 substantiæ est: minus ea polygonū: in solano tan-
 tum crassæ & terrex est admistum, quantū astri-
 ctionis. Acetum repulsoriam simul & attenuato-
 riam, imò & discussoriam facultatē sortitur: ut-
 pote quod secundū temperiem, frigiditate qua-
 dam tenuium partiū præpolleat, nō secusq; ex-
 quisitè serenus boreas. Rosaceum porrò, repul-
 sorix, cōcoctricis, mitigatricis, ac deniq; discus-
 sorix facultatis est particeps. Ut ergo sermonem
 jam habitū repetam: neq; in biliosis causis injun-
 genda est inedia: neq; utendum venæ sectione, si
 puer aut senex sit eger, aut viriū imbecillitas ad-
 sit. Licebit autem uti validis clysmis, quòd maxi-
 mē hi possint revellere à capite, vacuareque non
 modò quæ circa ventrem & mesenterium confi-
 stunt, sed etiā quæ in simis hepatis hærent. Com-
 mendat autem Archigenes irrigationes ex ruta,
 oleo, & aceto intrita, ad dolores capitis, sicuti &
 succum baccarū lauri cum aceto & ruta. Scien-
 dum verò est, aridam rutam esse multò acriorē,
 & calidiorem viridi. Qui caput ob humorem
 biliosum dolent, iis signa similia sunt eis quæ ab
 ardore proficiscuntur. Accedit his major mor-
 sus, & faciei pallor, & nonnunquā oris amaritu-
 do. Aetati autem vigoris, & temperaturis cali-
 dioribus, & vitæ sollicitæ, & iis qui flavam bilem
 accumulāt, hæc affectio præcipuè contingere
 solet. Itaq; balnea temperata, & unctiones, & po-
 tus dilutus, eis exhibenda sunt, omnisq; victus
 ratio tum* humidior, tum boni succi, cōstituen-
 da. Evacuandus item biliosus humor per absin-
 thij cremorem est, aut per aloë, & per ipsam pi-
 cram antidotum, per se datam, aut modico scam-
 monij adjecto: vel per catapotia ex aloë confe-
 cta. Illinenda frons pastillo croceo, aut appella-
 to Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum u-
 niverso corpore caput confortij lege afficiatur,
 prospiciendum illi est. Igitur si plenitudo humo-
 rum, ac maximè circa venas constiterit, tunde-
 mus venam. Si verò magis qualitas invaluerit,
 utemur purganti pharmaco. Si caput uni tantū
 parti condoleat, ut hepati, ventri, aut ipsius ori,
 illius in primis opitulabimur: nempe calida in i-
 psis præpollente intemperie, panem ex diluto vi-
 no exhibentes, sorbitionesq; ex alica: ac foris e-
 tiam utentes irrigationibus, quæ tum refrige-
 rent, tum firmitudinē addant. At si ob viscidos
 & crassos in vetriculo cōtentos humores caput

quis doleat, etiā hos exturbabimus, acetū mul-
 sum in potu præbendo. Ex hyssopo etiam origa-
 noq; potionibus, & quæ his adhuc valentiores
 sunt, magisq; incidendi vi præditæ, utemur: nec
 non à radiculis vomitu, irrigationibusq; & cara-
 plasmatis calidioribus. In doloribus autem ca-
 pitis qui ab initio invaserūt cū febribus, vena se-
 canda est, post primā aut secundam remissionē,
 nisi quid impediāt: & præsertim in corporibus
 bonæ habitudinis, & multo sanguine redundan-
 tibus. Quòd si serius post septimā diē dolor ipse
 prehenderit, alvo prius abundè per clysterem so-
 luta, cucurbitulæ ad occiput, aut cervicem, sunt
 affigendæ: caputq; irrigationibus ex oleo foven-
 dum: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in
 calidioribus, & tempore æstivo: chamæmelino
 verò, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme,
 quinta parte aceti illi adjecta. Illinenda frons in
 frigidioribus quidem est, ex cyphi: ex crocoma-
 gmate autē, in calidioribus. Porrò vitanda sunt
 in omnibus capitis affectionib. ea quæ subdun-
 tur: nēpe viticis semē, absinthij succus, lac in po-
 tu, glandes quercinæ in cibo, olivæ nigrae, arbuti
 fructus, eruum, quòd etiā exolvit articulos: am-
 plius autem offendunt myrrha, thus, hederæ ca-
 cumina. Mentē etiā perturbant lentisci fructus,
 crocus, peucedanū, ciclaminus sicca cum vino
 epota. Styrax modicus quidē potatus, tristitiam
 vultus discutit: multus verò, somnos turbulen-
 tos conciliat.

De Cephalæa.

Cephalæa, inveteratus & ægrè cedēs capitis do-
 lor vocatur, qui ex levi occasione maximas exacer-
 bationes habet, adeo ut neq; strepitū, neq; vo-
 ces vehementiores, neq; lumen splendens, neq;
 vini potum, neq; odora menta caput replentia,
 ægri perferre possint, neq; itē motū: sed in quie-
 te & tenebris decumbere ob doloris magnitudi-
 nem velint. Etenim tanquā à malleo percuti sibi
 videntur. Sunt qui veluti contundi ac distendi
 sibi ea quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis
 verò usque ad oculorum radices ipse dolor pro-
 greditur. Habet autē hæc affectio aliquādo qui-
 dem continuos dolores, aliquando verò exacer-
 bationes, & intervalla. Manifestū igitur est, hanc
 affectionē consimilē aptitudinē capitis, ut oblæ-
 datur faciliè, habere, quemadmodū in cephalal-
 gia. Verūm ad maiorem imbecillitatē deveniūt
 in hac affectæ particulæ capitis. Ac sanè quidā ex
 sic affectis, cerebri involucra dolitant: quidā pe-
 ricraniū duntaxat. Dolores igitur cum gravita-
 te, multitudinem humorū significant: cum mor-
 dacitate verò, aut humorū, aut vaporū acredine:
 ut cum pulsu, obortā inflammationē: at cum ten-
 sione, si quidē citra gravitatē & pulsum accidat,
 spiritus tenuis ac flatulenti multitudinē indicāt:
 cum pulsu verò, membranosi corporis inflam-
 mationem: ac si cum gravitate distentio accidat,
 humorū multitudinē intra membranas conten-
 tam arguit. Rursus, dolores quidē in superficie
 hærentes, pericranii affectionem significant: qui
 verò in pfundo sunt, cerebri involucrorū. Qui-
 buscunq; autē affectio intra calvariā est, iis usque
 ad oculorū radices dolor extenditur, propterea
 quòd oculorū tunicæ ex cerebri involucris suam

Capitis dolo-
rum cum fe-
bri ab initio
affluentium
curatio.

Cucurbitula
quando affi-
genda occipi-
ti.

Capitis in o-
mni dolore
qua sint vit-
anda.

Crocus per-
turbat men-
tem.
Styracis fa-
cultas.

Cephalæa de
scriptio.

Cephalæa
magis deijcis
facultatem,
quàm cephal-
algia.

Cephalæa & a
ria sympto-
mata a cau-
sis diversis
producta.

Dolor capitis
intra calva-
riam situs,
cur extendat-
ur ad oculo-
rum usq; ra-
di.

ducunt originē. Si verò putrefactus humor calidior fiat, cum febris capitis dolor invadit. Febricitant aut omnino, & qui dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore universo vacuato. Si verò imbecillū existens caput, sublato ad se humores ac vapores susceperit, materiā revellere oportet in totū corpus, atq; ita mederi particulā. Revellemus itaq; & clysmis, & vinculis extremorū, & pluribus infernarū partium frictionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractio. Quod si amplius redundare sanguis videatur, etiam reserata in naribus vena & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus exacuata: posteaq; apophlegmatismis elicientibus pituitam, & medicamentis quæ naribus inferunt, utemur: qualia sunt quæ ex elaterio, & cyclamino, cum lacte & porro apparant. Caput autē curabis, quando quidem revulsoriis uti oportet, per repulsorias irrigationes. Ceterū post totius corporis evacuationem, uteris caput vacuantibus: dein iis qui firmitudinē addant. Repellit igitur immaturum oleum, rosaceumq; per se, & cū aceto, & ex papaveris capitulis, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, & mentha viridi præparatū. Applicentur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior multitudo humorū extiterit: frigida verò, ubi calidior, biliosiorq;. Digerit autē oleū dulcissimū calidum, & magis inveteratū, itemq; sicyonium. Si verò crassior sit copia humorū, spondylium, aut serpyllum, aut pulegii comam, aut calaminthen, aut mentham, oleo incoquēs, multitudinē evacuabis. Eadem hæc parti etiam firmitudinem addunt: quapropter usq; ad perfectam curationem ipsis utendum est. Omnium porro longē maximē discutit, ac perfectē corroborat, verbenacæ recta oleo incocta. Cōjicienda etiā ad eā crocodiliadis, præsertim juxta aquas nascentis, radix. Maximē etiā conferunt sub hydris aselli nascentes, si oleo incoquant. Adverte autē, capitum papaveris usum, tempestivum esse incipiente affectione: nocere autē, si iis in dolore inveterato utantur. Juvant verò non instrenuē fomenta tum ex semine lini & rosaceo, tum etiam confecta ex milio: nam quæ ex sale fiunt, ob gravitatē capiti negocium facessunt. Archigenes inter cataplasmata varia, viticis semen, persea viridis folia & myrrhā æquis portionibus mista, exceptaq; Ægypto ungueto, fronti admove re præcipit. Ceterū in sola Alexandria ipse perseam arborē vidit: cujus fructū in Persis quidem letalem esse, in Ægypto autē innocuū, sunt qui cōtendant. Porro sanguinis à locis affectis detractioes convenire in affectibus inveteratis, non Archigenes modò, sed omnes ferè medici confitentur. Verū cucurbitæ occipiti affixæ, ex revulsoriis auxiliis sunt, cum humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri cōsuetos, avertere properamus. Jubet autem Archigenes ut sternutatoriis quatiamus caput, fasciolaq; circumposita collo, spiritu cohibitionē moliamur. Jam verò ad affectiones frigidas inveteratas, equidē medicamenta ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minime autem ad calidas. At chamæmeli (quā anthemiden

Revellendi à capite modi diversi. Venam reserata in naribus conferre ad dolorē capitis.

Errhina.

Caput esse vacuandum post totius corporis evacuationem. Repellentia.

Digerentia.

Verbenacæ recta facultas.

Aselli.

Papaveris capitibus, quādo sit nobis utendum.

Sale est ad capitis fomenta ineptum.

Persea fructū in Persis letalem esse, in Ægypto autē innocuū.

Cucurbitulis in affectibus capitis quando utendum.

Cohibitio spiritus.

vocat) florem quidem, olfactu auxiliari dolenti capiti, ait Archigenes: folia autem nocere.

§ Sternutatoriū ab Asclepiade scriptum.

Veratri albi, rad. cucumeris sylvestris, struthij sing. partes ij. castorij, acori, nitri rubei, euphorbij, cūini Æthiopici, sing. partē j. trita insufflato.

§ Medicamē ab eodem traditum, quod mansum caput purgat.

Piperis albi, origani, staphidis sylvestris, casia, sing. drach. ij. excipiantur passularū exacinarū, aut caricarū carne, & mandenda exhibeātur. Ceterū nō statim à principio efficacissima adhibere cōvenit, sed à debilioribus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad movenda sternutamenta utimur, mitigatoriorū admistione lenita, moderata fiunt. Ob id quædā ipsorū muliebri lacte receti & aqua diluo: post hoc oleo dulci: dein betæ succo: & anagallidis quæ florē cœruleū habet, itidem succo: atq; ita sensim in usu eorū progredior, donec postremum etiā p opobalsamum talia dissolvo. Ego autē melanthium soleo infundere naribus: aliquando quidem aceto acri præmaceratū, aliquādo oleo veteri intritū. Interim verò dū æger errhinis utitur, habeat os aqua plenū

§ De hemicrania.

Hemicrania verò affectio dolorifica est, dimidiam tantū capitis partē infestans, interdū quædam dextram, interdum autē sinistram: quæ futura extensa secundum illius longitudinem, terminatur. Ut plurimum autē p circuitus exacerbatur, influxu vaporū, aut humorū, causam dolori suggerente. Quidā igitur ipsorū circa temporū musculos vehemēter dolitāt: quidam dolorē longē ulterius, pgradientē habent. Sunt quæ adeo vehementer cruciuntur, ut ne manus quædam contactum facile ferant, in quibus palām est, pericraniū affectum esse, neq; eius cutē omnino immunē ab affectione existere. Rationi igitur cōsentaneū est, vaporū aut humorū, aut utrorunq; influxū, aut à cerebro & illius involucris, aut ab universo corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur, prius quali purgatione, aut venæ sectione æger indigeat, consideret: atq; ita deinde ad capitis auxilia pgradienti, tum per digitos suæ manus, tum per lintheum, dimidiam frontis partē, & eam maximē quæ circa temporis musculū est, confricando excalfaciat: id quod ante exacerbationis tempus faciundum est. Post exacerbationē verò, pharmacis hemicranicis dictis utendum: si quidem multa caliditas in doloribus piciatur, iis quæ refrigerans quippiam habent: citra verò hanc, eis quæ sufficiēter excalfaciūt. Utriusq; tamen aliquid ex iis quæ robur & firmitudinē addunt, misceatur, quæ astringentem videlicet facultatē sortiatur. Porro ex meis præceptoribus quidam ad hemicranias inveteratas utebat: piperis albi, & crocomagmatis, singulorum drachmis duabus, mistis cum euphorbij drachma dimidia. Cum autē citò facultas euphorbij exolvatur, in huiusmodi sanè medicamentis nō est utendū veteri. Est autē candidius, quod recēs est: nam quæ inveteratū existit, flavio-

Sternutatoriū ab Asclepiade scriptum.

Errhina quibus leniri debent liquoribus.

Os aqua replendū esse, dum quis errhinis utitur. Hemicranie descriptio.

Hemicranie causa.

Hemicranie curatio.

Hemicranie inveteratæ remedium.

Euphorbiæ recens quid sit, candidius, pallidius, autem inveteratum.

addere

addere utriusq; dimidiam drachmam, ex ipsiq; omnibus aceto acerrimo dilutis, cōficere medicamen hemicraniæ sanādx idoneū. Ad hanc aut rem, Pergamenū nostrum atramentū multo est præstantius. Aliud pharmacum, ad hemicraniā, & omnē inveteratam capitis affectionē summē utile. Croci drach. xv. chalcanti drach. x. aluminis scissilis drach. xiiij. myrrhæ, opij, omphacij, sing. drach. iij. gummi drach. xv. omnibus tritis vinum Falernum adjice, & rursus tanquam collyrium tere, deindeq; in pastillos redige. Postea verò ex posca dilutis utere. Sæpe simpliciter euphorbij illitione misti cum oleo & cera, summus. Sufficit autem ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrantem iniicere, & euphorbij unciā unam: quo quidem medicamine utendum in ea tantum hemicrania est, quæ a frigidis causis oritur. Juvat etiam hos, si oleum tepidum instilletur in aurem, euphorbij unica, cum libra olei prius temperata.

G A L E N I P E R G A M E N I
de compositione medicamentorum secundum loca, Lib. III.

De affectibus aurium.

Aurium dolores nonnulli quidem fiunt ex frigiditate: nonnulli ob inflammationē, vel cutis meatū auris ambiētis, vel etiam nervi auditorij. Quæ verò ratione inflammatio ipsa partes inflammatas distendens, dolorē excitat, eadem flatulentus spiritus, transitū non habens, dolore cruciat. Consimilis etiam fit dolor à serosis humoribus* in toto corpore genitis, ei qui ex mordaciū humorū forinsecus advenientium illapsu contingit. Dolores igitur à sola ortos frigiditate, callacientia quam celerrimē curant. In quem usum solent nonnulli rustici exenteratas capas oleo replere, & in ferventi cinere modicē calfacere, atque ita auribus ipsum infundere. Alij nō capas modō, sed allium etiam oleo fringentes postea ipsum instillāt auribus. Ego verò euphorbio omnino modico, ad multū vetus oleum admisto utor, veluti etiam pipere exquisitissimē trito. Prodest etiā amaracinū oleum ipsis infundi, & optimā nardū. Quod si aliquod oleum tenuiū partiū, in quo rutā præcoxeris, auri infundas, magnoperē juveris. Magnificē autē eos mitigat ovi candidū: quo etiā ad lippitudines utimur: itemq; lac muliebre. Plurimū juvantur item ex adipe anserino, vulpinoq; infundi tamen omnia debent mediocriter calida. At si inflammatio adsit, nardinū unguentū, cum pharmaco appellato Basilico, cōmodissimē infunditur. Porro medicamen Basilicō, alio nomine dicitur tetrapharmacū. Est etiā & Comagenum perutile, & ex adipibus pharmacū. Cogēte verò dolore necessum est etiā iis quæ sensum stupefaciāt, uti. Miscetur aut opium muliebri lacti, & ovi cādido: quæ ipsa per se, sæpe aurium inflammationibus contulerunt. Miscetur etiam & castorio opium: verum multo ante usum tempore, præparatū id esse oportet: & miscetur quidē, in vehemētissimis doloribus, pari: in minoribus autem, duplo. Li- quor quo hæc diluētur, sit sapa ex musto: multo nāq; magis hæc, q̄ dulcia vina, dolorē sedat. Verū

ego nullum pharmacū dolore vexatis infundo: neq; etiā per lanam instillo: nimirum experiētia edoctus, quod præstet neq; omnino contingere doloris tempore auditoriū meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obvolūtū lana molissima, partē dolentē foveo, pharmacumq; injicio modicē tepesactum in aurifusorio specillo: postea verò forinsecus tum orificio auditoriū meatus, tum universæ auri, mollē lanam impono. Jam quæ ex fomentis crassa & spissa fuerint, cujusmodi sunt spicata & foliata unguēta, diluēda sunt unguēto nardino: vel (si æstas sit, & calor sensus ægrum in aure inflāmata infestet) rosaceo, vel amygdalino. Conficitur bonū rosaceū ex oleo immaturo, salisq; experte, in quo plurimæ rosæ sint maceratæ. Si verò flatulentum spiritū, aut humorē crassum & viscidū, qui transitū non habeat, inclusum esse conjeceris, etiam ex pharmacis liberantibus ab obstructione, quipiam admisce. Porro frigiditate antegressa, spiritus flatulentus colligitur: gravitate verò capitis, cibisq; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores: quibus si accedat frigiditas, dolores contingunt. In his igitur spuma nitri, & nitru ipsum molle, ejusmodiq; aphrolitru, & oleum amygdalinū, rationabiliter in pharmaca auricularia miscentur. Ex hoc genere est utrunq; veratrum, & struthium, & amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochiis, quæcunq; fuerint ad manū, & iris Illyrica. Injicies autem & cinnamomū si habueris: aut, si id non habeatur, casiam, tum eam quæ Zingir, tum quæ Motos vocatur: ac præterea Carpesium. Aurium etiam meatus ab obstructione liberant, quæ lapides in renibus atterunt: atque omnia breviter, quæ tenuium partiū substantiam absq; mordacitate sortiuntur. Ex quorū numero est etiam cucumeris sylvestris radix, itemque bryoniæ, & ari, & dracunculi, & centaureæ, & polii, & omnino amarorū omniū. Rursus, moderatæ aurium inflammationes, & nō pulsatiles, rosaceo & aceto simul temperatis, tepesactisq; atque infusis curantur. Glauciū etiam ex aceto in cote medica tritū, doloribus à modica inflammatione ortis opitulatur. Præstat autē pastillum ex glaucio, multæ sanē utilitatis pharmacum, prius præparatū habere: qui fit ex glaucio probē cum aqua pluviali trito, deinq; in pastillū coacto, exiccatoq; . Licebit verò decimāquintā gummi ad glauciū portionē addere, ut melius compingi in pastillū possit. Quin & collyria ex glaucio eodē modō cum aceto trita, eis prosunt, aurib. instillata: atq; his nihil minus collyria ex croco. Ulcera aurium recentia, tum glauciū solum cum aceto tritum curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosis cōfecta: quemadmodū etiā quod Nili dicitur. Curat itē ea Damocratis collyriū ex myrrha. Quæ verò pure manāt citra dolorē, atq; id moderatē patiuntur, iisdē medicamentis curant. At q̄ fortiter affliguntur, p̄ ejusmodi qualis est pastillus Andronis, & q̄ ad Musam refert, sapa, modicoq; aceto dilutus. Quod si hæc ab ipso morbo vincant, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex acerrimo aceto cōtrita, levigataq; est intrepidē utendū. Hujusmodi etiā ulcera pastillo meo ex charta combusta, ipse ali-

Dolore affligente præstat omnino non tangere auditorium meatum.

Rosacei optimi compositio. Doloris aurium à flatu lento spiritu, aut à crassis humoribus excitati, curatio.

Aristolochia triplex.

Casia duplex

Aurium meatus obstructos quærescent.

Aurium moderatè inflamationes rosaceo & aceto simul temperatis curantur.

Pastilli ex glaucio, ad inflamas aures.

Aurium ulceratarum remedia.

Aurium purulentarum curatio.

Pastillus ex charta combusta.

Papaveris succus aurium dolores mitigat: affectio nem autem non sanat, nisi ex accidenti quodam.

quando curavi. Porro per papaveris succum mitigantur aurium dolores: haud item affectiones juvantur: nisi forte ex accidenti quis eas juvari dixerit, quod nimirum sedato dolore, atque inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignentes concoquat. Per aurium autem inflammationes, gallinaceus atq; anserinus adeps, si quidem evacuatum corpus invenerint, & humore qui inflammationem excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectioni q; auxiliantur.

Stupefacientibus quam docogamur uti medicamentis.

Si vero humore adhuc fluente adhibentur, affectioni quidem nihil opitulantur, leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humorum credinem aliquis morbus contingat. At pharmaca ex papaveris succo omnia, sensum stupefaciunt: & ob id sane tunc solum illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigativum doloris contulit. Miscetur autem castorium papaveris succo, ut vehementem ejus frigiditatem retundat: quo nomine etiam meconium ipsum, & quidem recte, nonnulli torrent: 20 quam satius mihi videtur uti illo minimè torrefacto, inveterato tamen, & cum castorio permixto. Porro galbanum susino unguento dilutum, melli q; & rosaceo comixtum, discutit citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fluit jam amplius, doloribusq; à frigore opitulatur.

¶ *Ad vehementes aurium dolores medicamenta ab Andromacho scriptum.*

Castorii drach. ij. succi papaveris drach. iiij. opopanax drach. ij. spumæ lycii drach. j. passo 30 excipito, & tepelactis utitor.

¶ *Aliud eiusdem ad purulentas aurium & veteres affectiones.*

Fabæ Egyptiæ internæ amaræ, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opii, malicorii, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. ij. castorii drachmam j. aceti & mellis quod sit satis. Conficito.

¶ *Aliud eiusdem, ad dolores flatulentos, & aurium sonitum congruens.*

Nitri, myrrhæ, sing. drach. j. rosacei cyathum 40 j. aceti tantundem: simul tritis utitor.

¶ *Aliud ad aurium sonitus.*

Veratri albi drach. j. castorii obolum j. spumæ nitri sesquibolus: tritis cum aceto optimo utere.

¶ *Aliud ad purulentas aures.*

Alumen scissum ustum, & myrrham cum melle terito, & præelotæ auriculæ pharmacum lana exceptum imponito.

¶ *Auricularis compositio probata, ex Apollonii libris.*

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amarum drach. j. spumæ nitri drach. ij. aluminis scissilis, malicorii, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloës drach. iiij. vini mulsi veteris cyathos iiij. Arida trita vino mulso admisceto, & cocta in stanneo vase reponito, ac tepido utitor.

¶ *Ad carnem excrecentem in auditorio meatu, quo usus est Heraclides Tarentinus.*

Æruginis rasæ drach. viij. squamæ æris drach. iiij. mellis heminæ dimidiū. Arida trita, ac melle 60 excepta, donec rubefiat, cocto, & ablatis utitor.

¶ *Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini.*

Marrubii succum exprimito, & aceto dilutum infundito. Aut mali punici in aceto cocti

succum exprimito, infunditoq; Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad vermes innatos auribus, veratrum album cum melle immitte, aut aridum insuffla: aut rubi succum infunde.

¶ *De sonitu aurium.*

Ex sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flatulenti sunt soboles: alij verò ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt: quemadmodum etiam in oculis oriri solent suffusorum imagines, ob vapores exhalantes ab ore ventriculi. Cæterum neutrius affectionis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiant, minimè interturbandi sunt: ut plurimum namq; statim sedantur. Si verò ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus, sonitum fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, attenuatoriis, ac discussoriis ad motis pharmacis, nihil cõtulerit: simulq; apophlegmatismis usus sit, & universo prospexerit capiti: huic merito in hac suspicio nem inclinatus animus erit, videlicet sensus audiendi exquisitam facilitatem, causam eius rumoris existere, præsertim si acuto audiendi sensu præditus esse æger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefacientibus quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mædragoræ, & papaveris succus.

¶ *Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.*

In sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudine mellis. Aut radices sylvestris cucumeris succum. Si verò, pertrahatur, omnibus amaris, acris, attenuatoriis & discussoriis, quibus utimur ad dolorem ex crassis humoribus ortum, utaris, singulis in aceto coctis, admistoq; melle. Aut reclinato ægro, & nitro trito in aurem insperso, acre acetum infunde tepidum, ac postquam fervere desierit, exerge lana, & nucum amararum succum infunde, lanaq; obtura. Cæterum quibus ob maximam ad audiendum facilitatem id genus sonitus fiunt, castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla.

¶ *Ad auditus gravitatem.*

In surditatibus, qui exiguas quidem voces omnino non audiunt, magnas autem vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectum habere oportet: paulatim namq; temporis progressu augescens, perfectam surditatem inducit. Quapropter per hieram purgandi sunt, & per catapotia ex colocynthide: pituitaq; eis per apophlegmatismos detrahenda, & caput reliccandum est, eiq; ut robur addatur, omni studio curandum. Utendum etiam attenuatoria victus ratione. At in ipsam aurem pharmaca injicienda sunt, quæ crassos viscososq; humores cõtineant, & dissecent. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit: Cæparum succo & resina oleo dilutis, utitor. Aut oleo nucum & resina mistis pariter utitor. Vel adipem anserinum, & fel bubulum, ac laurinum, ex æquo mista instillato. Porro surdastri cõtariis præsidii habent opus, iis qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desiderant: surdastri verò, vehementem motum postulat, transmutationemq; in contrariam ei, quæ jam adest, dispositionem.

¶ *Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio scripta.*

Fomentis porro utendum est per spogias aqua calida

Aurium excrecenti ulceri remedium

Aurium sanguine effundentium remedia.

Aurium mes ex nartia.

Sonitus in auribus causa.

Sonitus aurium per bres, non compescendos.

Sonitus auris ob exstusam sensum endi facit tam ortu curatio stupefacientia.

Sonitus aurium remedia Archigene prodita.

Auditus vitatus

Aurium lori fomenta calida

calida imbutas, ac sufficienter expressas: itemq; per cucurbitas affixas. Amplius verò & per vaporem ex arundinibus perforatis allatū. Oportet autem alteram arundinis oram, auriculæ cavitati adaptari: alteram verò in ollam perforatum habentem operculum, & undiq; obturatū, incumbere. Sit autē in olla absinthium in aqua fervefactum, quò vapor inde sublatus perferatur ad auditoriū meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui gravi.

§ Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanū cum aceto & melle fervefactum in stilla. Aut collyrio ex nitro, ficu, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea verò assiduis acutisq; vocibus, & vicissim gravibus inclamamus: & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc & asphodeli radices oleo veteri incoctas, commodè infundimus, caprinaq; assidue eluimus urina.

§ Eiusdē de corpusculis que aurib; illabuntur.

Quòd si aqua illabatur aurē, auxiliatur acetū, & cum altero pede, qui responder affectæ auri, exilire, aliquantulum se ipsum inclinādo: hoc enim modo facile excernitur. Quin & exustio simplex per os, aut etiā per stipulā, egregiè aquam extrahit. Si verò calculus, aut fabæ, aut consimile quid in auditoriū meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auriculariū specillum obvoluta, & resina tincta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacum fieri potest. Quòd si neque sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac nares obturato. Facta namque spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aure inflammata convulsiones inducet. Optime etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt electionem, cōcussio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, coneuientis ipsum, vibrabis. Si verò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto: dein levata tabulā iuxta caput parte, deferri finito, idq; sæpius facito. Movebit enim sic quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur. Atque ita angusta & concava specilli parte immissa, scitè extrahito. Si verò faba, aut cōsimile quippiam in aurem illapsum, in ea hæreat, madefactumq; & tumefactum dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concavum di-
videre id industriè expedit, atq; ita particulatim extrahere: deinde saram, aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex lancinatione oblæsum. At verò si animal aliquod sit illapsum, scammoniū aceto dilutum, aut absinthij, aut peucedani succum, nitrumq; ac sulfur, cum radiculæ succo instillato.

§ De parotidibus.

Parotides è genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem, glandulis secundum aures affectis. Cæterū prima parte curationis partium inflammatarū in eis minimè utimur. In illis siquidē plurimum curatione reprimente, repulsoriaq; uti convenit, præcipuè cum nec malignum sit, nec multum quod influit: nec univer-

sum corpus plethoricum. Sic namq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes repressit. Verum in parotidibus contrariam curationē molimur, nepe pharmaca attractoria adhibentes: & si hæc nihil memorabile efficiant, etiā cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, conantesq; ut infestans humor ad cutem ipsam trahatur, præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter cum natura per acutas febres, redundantes humores ex vasis ad regionē inter cutem & subjecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ imbuuntur, multo satius videtur tunc opitulari naturæ, febres per
* abscessus curanti. Verū si vehemēti impetu influant humores, nihil nos curiosius agētes, omnia permittemus naturæ. Nam si ve cucurbitā, si ve aliud pharmacū humores ex alto eliciens, ad moverimus, vehemens dolor hominē apprehendit, unde & vigiliæ & febres oriuntur, atq; exolvuntur vires. Mitigare itaque tunc, & non influxum provehere, oportet, per cataplasmatū maxime lenientiū usum: cuiusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum mulsa, aut fœnigræci, aut altheæ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcunq; nō modo humectam habent caliditatē, per quam mitigare dolores valent, sed etiam influentes succos possunt cōcoquere, suppurareq;. Quòd si etiam sanguis redundare videatur, per venæ ipsum sectionē vacuabimus, præsertim si liceat per vires. Ergo si humor non discutatur, suppurantibus pharmacis est utendū: cuiusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarū decocto: item quod ex polline & fermento conflatur pharmacum. At si suppurata fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacū abscessum rumpere, quale est Smiliū vocatū, & ex aliis constat: aut tentare, ut ipsum per attractoria & tenuiaria medicamēta discutiamus, bis in die iisdē ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remiserint. Ubi verò jam plurimū puris discussum fuerit, tunc jam primum semel solve-
re ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: dein verò neque ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid reliquū in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quòd si durities adsit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admistis.

§ Archigenis ad parotidas.

Rumicis radices in vino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra vehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imposito. Aut ficū aqua marina muriave incoctā, admove: aut lanā etiā butyro imbutā. Cōmendat etiā usum plātiginis, tametsi ex mistis facultatibus, discussoria nempe & repulsoria constet. Ego verò nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri operæ præciū existimo, nisi fortè aliquando paucillū repulsorii multo diffusorio addatur: idq; ubi citra vehementē dolorem ipsæ irruunt parotides.

§ Aliud Archigenis ad discutiendas parotidas.

Lupinorū amarorū farinam cum melle coctā, modica calce viva addita, pro cataplasmate im-

Parotidibus
medicatio.

Natura im-
petus quan-
do minimè sit
incedendus.

Cataplasma
dolorem leni-
ens.

Suppuratis
quando &
quibus medi-
camentis mo-
lienda.
Pus suppurat-
arum paro-
tidum quibus
modis vacan-
dum.

Parotidibus
varia reme-
dia ab Archi-
gene prodita

Plantago cō-
stat ex facul-
tate discusso-
ria simul &
repulsoria.
Repulsoria
quando mi-
scenda medi-
camentis pa-
rotidis.

ponito. Aliud. Picis brutiæ, manniæ thuris, utriusq; drach. j. terebinthinæ, palmulæ Syriacarum nō vetustarum, pinguium, carnis puræ, utriusq; drach. ij. omnibus simul unitis utitor.

Aliud. Caricarū, chalbanī, nitri, sing. drach. j. sulfuris tertiam unius drachmæ partē: terebinthinæ, opopanacisq; utriusq; pauxillum: simul unitis utitor. Quod si medicamentis parotis non cedat, Archigenes consulit esse confugiendum ad cucurbitulam, adhibita scarificatione. Porro simplices parotidas curant, emplastrū Mnaseæ, & quod ex succis constat, & quod ex ptisana. His molliora adhuc sunt, cerati forma, tum ex butyro, tum ex œsypo conflata, ostreis, aut buccinis, aut purpuris ustis additis, adipeq; porcino salis experte, singulis quadrantis pondere. Sic ipsum etiam licet conficere: Butyri unc. j. ceræ unc. ij. s. ostreorū ustorū, redactorumq; in pollinē, unc. ij. Cōficio & utitor: efficacissimū namq; est ad parotidas. § De affectibus narium.

Polypodes.

Ex genere tumorū præter naturā polypodes in naribus generantur, ut ozænæ ex genere ulcerum. Secundū genus aut excretionum præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primū itaq; de ozænis sermonem faciam, quæ ex humorum acrium, putrilaginosorumq; influxu gignuntur: nam si i duntaxat sint acres, ægrè curabilia ulcera inducūt, graveolentia verò non item. Cæterum cura cōmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primū caput siccare, corroborareq;: cum palam sit ob redundantiam vitiosorū humorum, fieri ab eo in ipsas nares defluxum. Capite roborato, naribus adhibenda curatio est, scopo in ozænis proposito, ut affecta pars per mixtæ facultatis pharmacā repellentia, tum discutientia, exiccet. Repellentia itaq; tum austera, tum acerba, quæ cōmunem astringentiū appellationē sortiuntur. Discutiunt calidam & siccam vim obtinentia.

Ozænæ à quibus gignatur hamoribus.

Ozænæ atq; polypi cōmunis curatio.

Repellentia quæ. Discutientia quæ. Ozænarum remedia.

§ Archigenis remedia ad ozænas.

Oblino eos chalcitide, vel atramento sutorio, vel psorico, ex melle tritis. Vel iridem & sandaracham cum melle illinito.

§ De polypo narium.

Polypi descriptio, causa, remedia.

Polypus tumor est qui præter naturā in naribus generatur, polypodis carni assimilis. Quæ affectio ex crassis & viscidis humoribus gignitur: ob idq; mista medicamentorū materia indiget, quæ partim astringat, partim secet & tenuet, partim etiam discutiatur, condensetq;.

§ Asclepiadis ad ozænas remedium.

Ozænarum remedia varia.

Aluminis scissi drach. ij. myrrhæ, sandarachæ sing. drach. iiij. gallæ drach. j. æris usti tantundē. Tritis utere, naribus prius vino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum admoto.

§ Lamponis ad ozænas, ægilopas, polypos, & quæcunq; velis citra sectionem, uisionemve extirpare, remedium. Scobis æris rubri unc. j. salis ammoniaci sextantē: ammoniaci thymiamatis tantundē: aluminis rotūdi quadrantē: aceti acerrimi heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, omnia in vas æris rubri cōjicito, in eoq; ad solem sub ardore Caniculæ cum rubri æris radio agitato, donec exarescat pharmacum: quod postea in mortariū translātū, diligenter terito, in fictiliq;

recōdito. Ufu verò exigente, aquam sorbendam dato, quæ ut ore cōtineatur, præcipito: dein pharmacum per fistulam insufflato, vel etiam melle exceptum immittito. Cæterum post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam sternutato riis utimur, quò videlicet tectoria ulceri obducta excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferè excidere cōsueverunt. Ubi verò exciderint, adipe anserino, ac butyro cum cerato curantur.

Porro ipse in ozænis polypisq; præstantissimū pharmacū reperi succū ex mālīs punicis tum dulcibus, tum austeris, acidisq; & maturis & integris, pariq; magnitudine & numero maceratis, expressum. Cæterū si humectior esse polypus videatur, plus ex austeris mālīs est contundendum. At ex aridis pharmacis, diphryge citra mordacitatem aliquando per multū tempus consumptū polypum novi. Probatum etiam prædictū ex mālōrum succis collyrium, si ubi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exuffletur, aut etiam per specilli nucleum indatur. Omnia autē hæc assidue facere oportet, ut nunq; ab affecta parte absit pharmacū, cum facile ab humiditate eluatur.

Jam verò rosæ siccæ cōtusæ, inditæq; in iis qui molli carne sunt præditi, citra noxam curare aliquando solent polypos. Nam pleraq; eorū quæ polypodas exterunt, eos exacerbant, si quando ab scopo aberrarint. Cæterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curavi, Androniū videlicet, & Pasionis, & Polyide, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In divite verò quopiam, qui odoratum pharmacum exigebat, hedychroi usum excogitavi, ipsumq; Falerno veteri dilui, & mirum quā brevi affectio ipsa est curata.

§ Heraclide ad sanguinis e naribus eruptiones remedia.

Ubi grumos sanguinis eduxeris, lanam specillo obvolvito, eamq; in lycio aqua diluto imbuito, & sanguine manantē locum illinito. Aut linamentū ex ellychnio contortū, madidatumq; aqua, & chalcitidis polline inspersū inferito. Aut menthā tritam indito. Juvat etiam frontē spongiis refrigerare, extremaque vinculo excipere, qua parte magis contracta videntur: obturareq; aures, & os pluviali aqua & frigida opplere.

§ Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem e naribus.

Spongiā cruda pice imbutā, & linamento exceptā indito. Aliud. Putaminis ovi, & gallæ omphacitidis, utriusq; partē unā. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacto, excipito, inditoq;.

§ Andromachi ischamom.

Chalcitidis drac. c. chalcāthi drac. l. misyosafati drac. xxv. æris usti drach. xij. & s. tritis utere.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorum secundum loca, Lib. III.

DE oculorū affectibus, oculariisq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est cōsiliū. Pompholyx igitur lota nulli pharmacorū mordacitatis expertiū inferior est: atq; ob id ea utimur ad tenues & acres oculorum fluxiones, sed vacuato prius capite & universo corpore.

Escharas gentas m bus, excru das stern toris esse Punicorn succum a ozænas p posq; m fice comm dat Gale

Rosarum sis in qu curare p pos soleant

Narium ra quibus medicam tis curent

Sanguin naribus p tionum media.

Pompholy optimum medicame oculorum xionitue.

porē. At vacuamus quidem corpus venæ sectione, purgationeq;: caput autem per apophlegmatismos vindicamus à pituita. Potest tamen pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atq; amyli, simul & moderatè resiccare humores: simulque ne per tuniculas evacuetur ea quæ in magnis oculorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quàm caput ab humoribus ad oculos defluentibus purget, utatur obturantibus pharmacis, vehementes dolores ob tunicas distentas inducet, & ob multitudinē influentium humorū, aliquando ipsarū rupturā aut erosionem pariet. Eiusdem generis cū prædictis pharmacis subtenuis ovorum liquor existit, abundè valens humiditates oculorū abluere & exasperata lenire: obturandi autem tennes meat⁹ nō parē illis facultatē sortitur, sicuti nec similem vim resiccandi. At fœnigræci succus, quod ad viscositatem attinet, similis est ovorū albugini: discussoriam tamen possidet facultatem, & moderatè calfactoriam: ob idq; multos dolores mitigare cōsuevit. Maximè prædictis cōtrarii secundum genus existunt liquores acres, ut Cyrenaicus Medicus, ac tum sagapenū, tum euphorbium, omnesq; breviter, qui citra exasperationē calfaciunt vehementer. Forti autē facultate sunt prædicta extergētia medicamēta, cuiusmodi est æris squama, chalcitis usta, æs ustū, flos æris, misy, sori, atq; stibium. His adhuc aliud genus adiacet, erodentium videlicet, sive putrefaciētium: quale est auripigmentum, & sandaracha, & Asie petre flos: cuius facultatis misy etiam paululum particeps est. Est & aliud genus pharmacorum, quod in oculares cōpositiones injicitur, eorum videlicet quæ natura astringunt. Quæ igitur mediocriter hanc vim habent, influxus repellunt: quæ verò vehementer, ampliorem dolorē infligunt, tunicas exasperando, quæ iuvent influxionū imperiū repellēdo. Porro quæ mediocriter astringunt, lippitudinibus cōmodissima existunt: conferunt autem & reliquis ferè omnibus affectionibus ulcerū, pustularum atq; fluxionum. Sunt verò huiusmodi, folia rosarum, & flores, & succus: ericæ fructus, spica nardi, malabathri foliū, crocus, lycium, & hypocistis. Vehementiorē his astringendi vim acacia & omphacium habent, quæ & ipsa in succorum genere numerantur. Balaustrū etiam, & cytini, & gallæ omphacitides, ex genere eorum sunt quæ multum astringunt. Inflammationes & alias affectiones concoquunt, myrrha, crocus, castorium, thus, & cremor fœnigræci decocti: quæ etiam discussoria facultate sunt prædita, & præsertim ex ipsis myrrha. Hæc itaq; sylva ocularium medicamentorū existit. Porro quæ medicamenta substantia terrestri sunt, citra manifestū calorem aut frigus, ea emplastica nominantur, vim habentia contrariam ijs, quæ ab obstructione liberant: qualia facultate insigniuntur samius aster, pōpholyx lota, ejusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum usta, tum lota, cui detorsorii etiā nōnihil inest. Pompholygi verò & spodio parū quid inest astringens, quem admodum etiam plumbo post exustionē. Nam & hoc pharmacum omnis mordacitatis est expertus, parum tamen quid astrictionis sortitur.

Amylum etiam exactè lotum, quod minutissimū est, & medium ut nec astrictionum nec acredinem habeat: hoc est, nec calorem, nec frigus. Quin & cerussa lota proximè accedit ad facultatē plumbiusti atq; eloti: manifestè tamē astringit: amyllum autem & samius aster quatenus ex gustu & odore licet colligere, sunt penitus qualitatis expertes. Igitur universum huiusmodi pharmacorum genus, sive modicā in gustu aut odore qualitatem exhibeat, sive penitus nullā ostendat, veluti aqua purissima, expertus qualitatis vocat⁹, moderatèq; p solā terrestre substantiam secundū propriā naturā siccatur. Ac sanè sola hæc medicamēta cōveniunt in erosionibus corneæ tunice, ipsiusq; rhagoidis prolapsibus, ob influxū tenuiū atq; mordacium humorum ortis: cum nimirum astringentia cohibeant effluentes humores, atq; ob id dolorem ob mordacitate ipsorum ortum intendunt: acria verò affectionem simul adaugeant. In universum tamen ipsi particulæ affectæ, quod facilius curationem recipiat, prospicimus, tum universi corporis purgationibus, tum revulsionibus: primum quidem ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput, & ad capitis cutem. Utimur etiā sectionibus arteriarum, interdum quidem incidentes eas quæ retro caput iuxta aures sunt exporrectæ: interdum autē earum partem, quæ temporibus inest: idque ut medeamur dispositioni, quæ tunicis oculorum est generata, ob quā etiā optimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpitur. Ad has igitur solas dispositiones convenire videtur prædictorū medicamentorū genus, citra mordacitatem exiccans in affecta parte cacochymiā, à qua id quod influit corrumpitur. Vocatur autē collyria quæ ex ejusmodi medicamentis cōstat, tum Libiana, tum Cygni: nempe ob candorem, qualem cygni possident. Prævalet quippe in ipsis amyllum, & terra Samia, & cerussa Rhodia, quæ præstantior est & candidior. Sunt qui collyria id genus in cotibus terant, lacte boni succi ex nutritis uberibus instillato: ut astrictoriam vim quæ ovillo inest, effugiant. Etenim cum in lacte serosa quædam extersoriaq; facultas insit, eius usus congruens est ad propositam curationē: quippe ulcera explenda, extergentibus citra acrimoniā habent opus medicamentis. Quod si huiusmodi haberi lac nequeat, per fœnigræci decoctū terere collyria præstiterit, utpote quod extersoriā quandā vim habet, qua ova omnino sunt destituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

Cum ægrè curabiles prædictæ dispositiones existant, adhuc earum difficultatē adaugent palpebrarum asperitates: à quibus etiam in lippitudinibus, tunice oculorū commorsæ, affliguntur dolore. In illis tamen audemus ad pharmaca inflammationi cōgruentia, nonnihil ex detergentibus immiscere: veluti est collyriū ex vino, aspritudinibus accommodatū, quod primum ea quæ ad palpebras succrevēre, deprimantur. Nam ubi oculi minus infestantur inflammatione, ea quæ aspredines expurgare possunt, administramus. At dum cornea exulcerata est cum mordaci influxione, impossibile est tali aliquo uti pharmaco. Cornea siquidem ipsa amplius exasperabi-

Amylum

Aqua purissima sunt qualitatis expertes. Cornea tunice crosa, quæ medicamentis congruant

Arteria scilicet aures, et temporum, quando incidenda sint.

Collyria Libiana & Cygni.

Collyria lactis sigandi modis.

Lactis mulieris usus cōmodissimus ulceribus corneæ existit.

Fœnigræci decoctum.

Collyrium ex vino.

*Aspritudi-
nis palpebra-
rum curatio.* tur: uvea verò impensius procidet, hominemq;
vehemens dolor corripit, augebiturq; ipsius flu-
xionis malignitas. In huiusmodi itaq; affectio-
num miscella, solent medici, præ inopia consilij,
palpebras ipsas revertere, atq; absq; medicamen-
tis purgare, idq; tum specilli concavo, tum mol-
li spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex
pumice lævigato, cum tragacantha aut gummi,
collyrium faciebat, eoq; ab extentis atq; reversis
palpebris, aspritudines deradebat. Ubi verò tem-
poris progressu per prædicta collyria fluxio fue-
rit sedata, audemus tunc jam ea quæ palpebras
extergūt, paulatim adhibere medicamenta: quæ
admodum ubi fluxus omnino fuerit jam resicca-
tus, & palpebræ moderatè habuerint, cava ulce-
ra sunt collyrio ex thure complenda.

¶ De lippitudine, siue ophthalmia.

Lippitudo. Ophthalmia est inflammatio periosij mem-
Ophthalmia brane, quam etiam agnatam vocant, quod aliis,
*est inflamma-
tio periosij
tunica, quæ
barbari con-
vulsi & am-
pellant.* quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forinse-
cus adnascatur, ligamentum existens toti oculo,
ad circumfita ossa. Ob id enim omnia quæ cir-
cum oculos sita sunt, usq; ad malas quandoque
simul per vehementem lippitudinem intumescunt.

Igitur pharmaca omnia huiusmodi affectio-
nem curantia, ex genere eorū sunt quæ meden-
tur inflammationibus: assumunt tamen necessa-
riò non nihil, pro ipsius partis natura, quæ excel-
lentem mollitiem, atque eximiam quandam su-
pra omnē totius corporis cutem, ad patiendum
facilitatem est nacta, ob sensus subtilitatē, ac ra-
ritatem substantiæ. Adhibenda itaq; sunt phar-
maca repellentia, minimè tamen exasperantia,
hoc est, non vehementem astrictionem sortita:

Ophthalmia sed quæ tum propria sua substantia moderatio-
congruentia ra sint, tum lenitivi liquoris admistione adhuc
*medicamen-
ta qualia ef-
se debeant.* magis talia reddantur. Voco autem lenitivos li-
quores, ovi candidum, & fœnigræci decoctum.

*Lenientes li-
quores.* magisq; adhuc ipsum lac. Ut plurimum verò al-
bumen ovi cum accommodatis pharmacis lippi-
tudines curare sufficit, per collyria videlicet vo-
cata monohemera, hoc est, diaria. Sæpe siqui-
dem magnas inflammationes, hæc adeò miti-
gaverunt, ut in vesperam quidem homo bal-
neo uteretur: in sequenti verò die, nardino col-
lyrio ad instaurationem & corroborationem in-
ungeretur. Admiscere autem ei circa primā in-
unctionem minimum quiddā acrium & sisten-
tium medicamentorū oportet: ut circa secundā
paulò amplius quiddam priore. Sufficiunt nanq;
hæ duæ pharmaci adhibitiões, & deambulationi
cula aliqua nō multa ante balneū. Foveri tamen
oculi per spongiā debent ex meliloti & fœni-
græci decocto, semel quidē aut bis in die, si me-
diocris sit dolor: sæpius autem, si vehementior.

¶ De ulceribus oculorum.

*Oculorum ul-
cera, qualia
medicamen-
ta postulent.* Oculorū ulcera eandem secundum genus cu-
rationē requirunt, quā reliqua omnia: ob ipsius
tamen partis naturam, q̄ lenissima eis adhiben-
da sunt, quale est, quod ex lota pompholyge cō-
stat. Admiscuntur ipsis etiam succi quidam non
solum mordacitatis expertes, sed qui etiam ve-
hementissimos mitigare dolores possint, velu-
ti mandragoræ succus. Quidam etiam polygo-
ni succum miscuerunt, ut alii ipsorum ovorum

candidum. Quæ omnia, dum tempus utendi in-
stat, miscenda sunt, propterea quod facile ace-
scunt: quo tempore etiam rosarum additur suc-
cus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut
ulcus mundum serverur: utpote partium natu-
ra ipsum replente, atq; ad cicatricem ducenre. Si
itaq; inflammatio adhuc oculū urgeat, aut quis-
piam etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis
lotis, & succis mordacitatis expertibus, adhiben-
da sunt. Ubi verò sordida reddita ob eorū usum
ulcera fuerint, ex repurgantibus quippiam mi-
scendum est: quale existit Paccianum croceum,
ex vino: quod etiam aspritudines exterit, ptery-
giaq; attenuat. At verò ulcera quæ per erosione
tunicæ corneæ fiunt, ita ut aliquid ex ipsa rha-
goide procidat, repellentibus & astringentibus
pharmacis opus habent. Discussoria autem po-
stulant tum pustulæ, tum pus intra rhagoidem
contentum. Recentia igitur & adhuc inflamma-
ta, pharmacis ex myrrha: thure, & croco sedan-
tur: vetustiora autem, nō nihil ex discussoriis de-
siderant, quemadmodum etiam indurata tuni-
carum inflammationes.

¶ De ocularium pharmacorum viribus.

Igitur omnimodæ acrimoniæ sunt expertes
hi tres liquores, fœnigræci decoctum, lac, & can-
didum ovi: ex quorum genere exultimare opor-
tet tum gummi, tum tragacantham. Quippe nisi
prædicta illa tria, tum copia, tum usu prompta
& expedita essent, possemus utiq; parum gum-
mi, aut tragacanthæ in multa aqua maceratum,

in eundem usum veluti illa assumere: & per ipsa
etiam in medica cote collyria terere: & per sola
infusa, serosos in affectis oculis generatos hu-
mores eluere. Oculariū itaq; pharmacorū unū

genus in illis tribus liquoribus, atq; etiam in tra-
gacantha, gummi, metallicisq; elotis consistat.
Alterum verò genus eorum sit, quæ modicam
mordacitatem sortiuntur, propterea quod quæ-
dam eis sunt admista, quæ parum astringunt de-
terguntq;: qualia sunt, rosæ, & thus: illæ quidem,
pauculam astrictionem: thus verò modicam ex-
tergendi vim possidentes. Habet tamen ob mo-
deratum calorem thus etiam & concoctorium

quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem gene-
re cum ipso, quantū ad concoctionem & discuf-
sionem attinet, censendus est crocus & myrrha:

quæ inter se in eo differunt, quod crocus qui-
dem moderatè astringat: myrrha verò citra a-
strictionē non instrenuè discutiat, & resiccet hu-
miditates. Suntq; hæc viribus præstantiora thu-
re, & ob id etiam maiorem discutiendi vim ha-
bent: cum autem careant vi detergendi, ad ulce-
rum curationem thure inferiora existunt. Hujus
generis medicamentorū, cōcoctorij inquam &
discussorij, lycium quoq; est, & castorium. Sarco-

colla etiam concoctoriū & discussoriū medica-
mentum existit: ac magis quàm ipsa, chalbanū.
Meliloti verò decoctum ad concoctoriam facul-
tatem assumpsit etiam quid astrictoriū, ejusdem
ferè generis cum croco existens. Injicitur etiam
in oculares compositiones lapis hæmatites vo-

catus, humores resiccandi vim habens, veluti
& cadmia. Mitius tamen pharmacum lapis i-
pse quàm cadmia existit, utpote ex humida sub-
stantia,

Paccianum
collyrium.

Ocularium
medicamen-
tum.

Gummi.
Tragacan-
tha.

Ocularium
medicamen-
torum gene-
ra varia.

Thus dolorē
lenit, conco-
quitq;.

Crocus mode-
ratè astringit.

Myrrha ci-
tra astrictio-
nem discutit
resiccantq;.

Lycium.
Castorium.
Sarcocolla.
Chalbanum.
Meliloti de-
coctum.

Lapis hæma-
tites.

Cadmia.

stantia, non terrestri, veluti cadmia, generationē indeptus. Huic similis est lapis Schistus dictus, sed fortio- rem obtinet facultatē. Quod verò stibium vocatur, illotum quidem, fortem astrigen- di facultatem ostendit: lotum autem, exolvitur, ut propē ad vim mordacitatis expertum acce- dat. At æustum vehementem extergēdi possi- det facultatem, itemq; squama eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordacitatis expers, chalcitis usta est. Quod si laventur talia pharma- ca, exterforia quidem adhuc manent: tantō ta- men imbecilliora, quātum amiserunt mordaci- tatis. Hujus generis sunt etiam misy, & ærugo, fortissima pharmaca, ijs quæ sycosi & callis cō- veniunt, admista. Sunt qui etiam gallas admi- sceant, vehemēter astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod unā cum acridi- ne vehementissimē astringit. Moderatius tamen redditur ustum, et lotum. Ad hanc sylvam perti- net & stomomatis squama. At thuris cortex, a- stringit quidem & ipse admodum, prædictis ta- men est longē inferior. Porro māna thuris à thu- re ipso differt, quod exiguum: quid astringentis sortiat, ratione corticis thuris, cujus non nihil contrahit. Quæcunque igitur ex astringentibus multam terream compagem habent, aspritudi- nes, & sycoses, & callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, veluti omphaciū, & hypocistis, eluūtur facili in sublimationibus, dif- fluentia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glaucium et acacia. Citra mordacitatem verò ex terget cervicornu ustum, veluti etiam caprinū: non tamen dolorem sedant, nec concoctoria fa- cultate sunt prædita, ut thus, frigidi nimirum & sicci temperamenti existentia. Mixtæ facultatis est aloë, quemadmodū rosa. Habet enim quod extergere est natum, aliquid in se amarū: sicuti & astringentium quippiam, ut & committat, & ad cicatricem perducatur.

¶ *Quæ ad scabras affectiones convenient.*

Ex ijs quæ ad scabras palpebrarum affectio- nes cōveniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis A- sius, tum ipse, tum eius flos: & quod pforicū ap- pellatur, nō simplex, neq; spontē natum, sed præ- parationis modum indeptum. Admiscetur ijs & misy ustum, & sandaracha, & arsenicū. Ex me- dicamentis verò aromaticis, casia, malabathri fo- lium, & amomum, cinnamomumq;.

¶ *Quæ induratis auxiliantur.*

Compositiones quæ ad induratas oculorum tu- nicas congruunt, ex succis constant, & ammo- niaco thymiamate. Miscuntur autē eis myrrha, thus, chalbanum, & consimilia.

¶ *Quæ suffusis medeantur.*

Ad suffusos habetur compositū medicamen- tum, ex succo fœniculi, hyæne felle, ac melle Attico constans: cui nōnulli caprillum fel addiderunt. Nunc autē in precio habetur pharmacum ex fel- le scarorū cōpositum: sicuti & quod ex myrrha stacte conficitur: quorum omniū promissa ma- gna, effectus autem interdum nullus.

¶ *Pharmacum aridum ad tuendam oculo- rum valetudinem à me compositum.*

Lapidis phrygii ter usti, totiesq; extincti: sed prima quidem extinctione, butyro: secunda, vi-

no odorato, tertia Attico melle, ad ipsum extin- guendum, injecto lib. j. aris usti, piperis albi, fo- lij malabathri, sing. unc. j. stibij drach. xij. Post- quam verò omnia fuerint lævigata, & reponere medicamentum velis, adjice opobalsami Syriaci unc. j. s. Porro usus ipsius ad solas palpebras competit cum specillo inducti, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

¶ *Aridum ad circumrosos oculos angulos ab Asclepiade scriptum.*

Spodij Cyprij drach. iiij. omphacij arida dra- chmas ij. nardi obolos tres: piperis fricti grana xv. tritis utere.

¶ *Pharmacū calliblepharon, exornandis palpe- bris accommodatū. Facit & ad lippitudines inve- teratas.* Stibij usti ac vino extincti drach. xvj. plumbi usti & loti drach. viij. fuliginis thuris, spi- cæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squamæ aris, sing. drach. j. omnibus tritis ac repositis utitor.

Aridum Philoxeni ad pruriginosos & circum- rosos angulos. Facit & ad obtusum visum. Ca- dmia drach. iiij. salis ammoniaci drach. ij. pipe- ris albi drach. j. tritis & lævigatis utitor.

¶ *Liquida oculares compositiones ad omne exuberantiam carnis tollendam, & ad incipientem lippitudinem.*

Cōpositio qua usus Philippus est in Cæsaria. Misyos assati drach. viij. myrrhæ drach. iiij. ca- dmia drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantundem: nardi Indicæ, piperis albi utriusque drach. j. mellis Attici cyathum unum. Misceto.

¶ *Panchrestos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas anres.*

Aeris usti, myrrhæ, sing. drach. j. piperis obo- los ij. misyos tosti drach. j. croci obolos iiij. vini Chij heminam j. passæ cretici hemina dimidiū. Coquantur ad lentum ignem, ut decet.

¶ *Philoxeni liquida exacuens visum, accica- trices & callos exterens.*

Ammoniaci thym. drach. iiij. æruginis drach. ij. vino diluta, & contrita, melle Attico excipito.

¶ *Compositio Largi exacuens visum.*

Succi radice fœniculi partē unā: mellis tantū dem. Misceto. Alia. Succi radice fœniculi, succi chelidonis, mellis Attici, sing. drach. j. Misceto.

¶ *Ad tingendas albugines.*

Gallam tritam per specilli nucleū calfactū im- ponito: dein chalcantū aqua dilutū admoveto.

¶ *Ad glaucos oculos, quò pupillæ nigra reddantur.*

Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis intervallū hyosciami florem cum vi- no tritum instillato.

¶ *Ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus.*

Chalbani partem unam cum modico nitro mixtam imponito.

¶ *Cataplasma Heraclidis Tarentini ad ve- hementes oculorum dolores.*

Rosarum viridium, aut siccarū drach. iiij. cro- ci drach. j. opij tantundem: excipito meliloti de- cocto, aut passo, utitorq;. Aliud. Rosarū, vio- larum albarum, meliloti, capitū papaveris, sing. drach. ij. croci, opij, myrrhæ, sing. drach. j. ovi as- sati vitellum. Tritis & passo subactis utitor.

¶ *Agglu-*

Ocularia me- dicamenta varia, à me- dici variis conscripta.

Ocularia ve- hementes do- lores solven- tia cataplas- mata.

¶ *Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis.*

Oculorū fluxionibus repellendis agglutinatoriū pharmacum

Pollinis, myrrhæ, mannæ thuris, singulorum drach. j. candido ovi excipito, temporibusque & fronti admoveo.

¶ *Collirium Moschionis, ad epiphoram, dolores, atq; fluxiones congruens.*

Glaucii drach. vj. sarcocollæ drac. viij. croci drach. iiij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ, singul. drach. ij. opii drach. j. Aqua pluviali excipito, utitorq;.

¶ *Paccij sphragis.*

Cadmia ustæ & lacte caprillo, sive muliebri extinctæ ac lotæ, assiccatæq; in umbra, drach. x. æris usti ac loti, acaciæ, utriusq; drachmæ x. opii drach. vj. croci tantundem: gummi drach. xv. aqua pluviali excipiantur.

¶ *Collyrium ad acerbissimos oculorum dolores.*

Cadmia ustæ & lotæ, acaciæ, stibii usti & loti, aloës Indicæ, sing. drac. viij. croci, myrrhæ, opii, sing. drach. iiij. gummi drach. viij. aqua excipe, utereq; ex ovo. Ego etiam pompholygis & thuris, utriusq; drach. iiij. adjeci.

¶ *Malabathrinum nostrum ad vexationes dolorum.*

Malabathrinum medicamentum & vehementibus oculorum doloribus.

Cadmia drach. xvj. acaciæ drac. xl. æris usti & loti drac. xiiij. opii, lycii Indici, malabathri, nardi Indicæ, castorii, croci, aloës, sing. drac. ij. myrrhæ drach. iiij. cerussæ drach. viij. stibii loti tantundem: gummi drac. xl. aqua excipito, & utitor ex ovo in principio affectionū, & etiā in declinatione, *ubi panchrestum ab ipsa parte removeris.

¶ *Collyrium albū tryphera dictum, admodū lenē, ad epiphoras maximè congruens.*

Collyriū tryphera nominatum.

Cadmia lotæ drach. xvj. cerussæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, sing. drach. iiij. opii drach. ij. aqua excipito, & cum ovo utitor.

¶ *Cygnus inscriptus Regina, ad maximos oculorum dolores.*

Cadmia drach. xvj. cerussæ lotæ drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciæ, opii, sing. drac. ij. gummi drac. xij. excipe aqua pluviali, & dum uti voles, adjice candida ovorum quatuor recentium.

¶ *Aerianum pharmacū ad veteres ac recentes affectiones accommodatum.*

Aerianum pharmacum affectionibus oculorum accommodatū.

Cerussæ drac. xxiiij. cadmiæ ustæ & lotæ, stibii usti & loti, thuris, singul. drach. x. squamæ æris drach. v. opii drach. iiij. myrrhæ tantundem: gummi drac. xij. aqua pluviali exceptis, utere ex ovo.

¶ *Collyrium ex cornu cervino, ad ulcera & pustulas, quod cicatrices exterit.*

Cornu cervini usti & loti, thuris, plumbi usti, sing. drach. iiij. squamæ æris lotæ drach. ij. opii drach. j. gummi drac. iiij. excipe ex aqua pluvia.

¶ *Collyrium diarhodon, ad fluxiones atq; dolores oculorum congruens.*

Rosarū drach. c. croci drach. j. opii, myrrhæ, sing. drach. viij. gummi drach. l. vino odorato excipito, utitorq; ex ovo. Ego verò pro foliis rosarum, tantundem earundem florum injeci, feliciterq; successit.

¶ *Lyncens, ad affectiones callosas, exacuens visum.*

Cadmia, æris usti & loti, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvj. lapidis

hæmatitæ drach. vj. opij tantundem: aloës, fellis taurini, chalbani, sing. drach. iiij. eruginis drac. j. opopanacis drach. iiij. salis ammoniaci drach. ij. gummi drac. vj. Aqua omnia pluviali excipito.

Melinū Lucij præceptoris, ad scabros & corrosos angulos, intēsos prurit⁹, oculos humectos, omnemq; hebetudinē visus, cicatrices etiā & callos exterens. Cerussæ, croci, sing. drac. xxiiij. ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myrrhæ omphacij, sing. drach. vj. gummi drach. xxiiij. Excipiantur aqua pluviali.

¶ *Quæ Archigenes ad oculos affe-ctos scripserit.*

In fluxionibus oculorum primo cōvenit cibi atq; potionis parcitas, aquæ potus, ac maximè rei venereæ abstinentia. Subducatur alvus, & facies assiduè primū multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulveres, fumumq; & tum solis, tum lucernarū splendorem. Si augeat fluxio, dolorq; accedat, cōfert etiam phlebotomia. Circa frontem porrò & tempora conveniunt medicamenta astrigentia. At super oculos lana pura ovi candido madefacta imponatur: aut ovi assiluteum, aut melilotum in passococtum. Omnia enim ex astringentium genere in principiis conferunt. Ad plagas illatas oculis facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam ovi eodem modo in oculum instillatum, ac præterea lana exceptum, & super nē impositū. Prodest etiam melilotum coctum cum vino, impositumque. Ad tumores ex plaga in oculis ortos valdè cōvenit fomentum per mollem spongiam aceto diluto madentem.

Ad palpebrarum defluvia, æruginis trite partem unam ammoniaci thymiamatis tantundem, trita imposito. Ad inutiles atque pungentes palpebrarū pilos. Ubi avulsi fuerint, illinito sanguinem cimicum, & non renascent: aut chamæleonem albam & tritam, cui viridium ranarum sanguis sit mistus, inungito. Offuscationē omnem incipientemq; suffusionē, sanat fel omne, cum marrubij succo ac melle Attico. Ad pterygia, Chalcanti, & salis ammoniaci æquales partes: gummi dimidium cum aceto in collyria formato, illinitoq;.

GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorū secundum loca, lib. V.

¶ *De suggillatione, quam Græci hypopion nominant.*

HYPOPION ex genere effusionum existit, estq; affectio cutis ipsi oculo subditæ, ubi cōtusis venis quæ in ea sunt, sanguis per fissuras effunditur: qui quidem nisi discutatur citò, interdum progressu temporis livescit & denigratur. Quare meritò ad eius curationem statim festinant medici. Ceterum quum tunica venarum, ex quibus sanguis exilit, rumpatur, parum quiddam ex astringentibus ad discutientia admiscant. Ubi verò ad propriam naturam redierint venulæ, tunc discussoriis solis uti admodum oportunū videtur: ex quibus tamē imbe-

Oculorum a fectibus re- media ab Archigene scripta.

Oculorum plagis quæ opistulentur

Hypopion. Suggillatio quid sit.

Suggillatio- nis curatio.

imbecilliora quidem in primis sunt adhibenda, fortiora verò inveteratis & denigratis conveniunt. Ego igitur Nili collyrio diarhodon, in oculariorum coticula ex aqua trito, partem suggillatam illino, fertula campanae ac foenigraci decocto prius pro fomento usus: quo ipso decocto, postea etiam collyrium dissolvo: ac dein etiam ex solius foenigraci decocto. Quod si quæpiam affectionis reliquiae restiterint, in foenigraci decocto collyria ex myrrha dissolvo, illinoque. Ubi verò affectus his remediis non cedit, collyrium ex sandyce est commodum.

¶ Archigenis pharmaca ad suggillata.

Summe facit ad recentia & livida suggillata, spogia muria intincta, & assidue imposita, sublataque: postquam fomentum ex aqua calida prodest. Cataplasmate autem utere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano, raphani cortice, uva passa exacinata, unoquoque per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimè tamè rectè mihi videtur præcipere, ut differenter uno aut alio utamur. Aqua quippe acrimoniae omnis expertissima est. Mel autem ulceribus mordax, cutem haudquam offendit: acetum verò utrisque mordax existit. Aliud. Aut fabam frescam commansam, cum melle imposito. Etenim fabae lomentum, etiam citra manducationem cum melle subactum, livida discutit. Ex manducatione autem, summe discussorium efficitur, nimirum viribus à saliva assumptis.

Aut cerussae & lithargyri partes aequas cum melle terito, atque admixta faba fresca, ad cerati formam reducito, utiturque. At hordeaceam farinam cum aceto mulso coctam imposito. Aut thus & thapsia aequis portionibus cum rosaceo cerato. Hæc Archigenes. Dictum autem à nobis est, quod ex discussoriis medicamentis in principio præstantiora sunt, quæ modicam astringendi vim possident: qualia sunt rosæ, melilotum & crocus. Apollonius autem ad inveterata suggillata, ari radicem rasam, melleque subactam impositamque commendat. At Critobryoniae radicem tritam cum melle, aut rosaceo cerato exceptam, inter remedia suggillatorum recenset.

¶ Medicamen Herae conscriptum ad suggillata.

Succi cicutæ obolos ij. croci drach. ij. myrrhæ, acaciae, sing. drach. j. opij. drach. ij. succi thapsiae, gummi tragacathæ, sing. drach. j. cum aqua cogito. Tribus enim horis (ut inquit Hera) suggillata dispungit. Ego verò nucem per ætatem jam oleaginosa effectam expertus sum aliquando ad cruentatos facientem.

¶ De agilope.

Inter nasi os & magni oculi angulum, parvum quoddam exiguo abscessui persimile tuberculum nascitur: quod sanè sæpe in ipsum angulum rumpitur, ægreque curationem admittit, ni maturè illi occurratur. Igitur mederi ipsi oportet medicamentis quæ absque mordacitate discutiunt. Quippe coafficitur ab acris oculis, ac sic inflammatio particulæ augetur.

¶ Hera ad agilopas.

Malvæ folia cum sale & melle trita imposito. Alica etiam in aceto cocta, incipienti agilopi opitulatur.

¶ Archigenis remedia ad agilopas.

Agilopas eruo cum melle integimus, aut cinere viticis cum aceto subactum. Probè facit & thus cum recenti columbino stercore impositum.

In nondum foratis, staphidem sylvestrem, & ammoniacum thymiam cum melle veluti splenium, imposito aut alumine scissile cum terebinthina.

Si morbus his remediis non cedat, diviso angulo, osseque nudato cauterium admove: sic siquidem decedunt squamulae, atque ipsum malum curatur.

¶ De varis.

Tumor parvus & durus in faciei cute oboritur, varius Latinis, Græcis jonthos dictus, à crasso coctus succo, ostendensque meritò sui ipsius curationem futuram per emollientia & discussoria pharmaca.

¶ De ficosis tumoribus.

Una quædam hæc affectio est ex iis quæ in mento enascuntur, differens è varis in eo, quod non solum crassus sit qui hos tumores excitat humor, sed serosa etiam tenuitate participet, ob quam exulcerantur citò, si non, ut decet, curetur: & ob id magis exiccantibus pharmacis quam vari opus habet.

¶ De lichenosis in mento tumoribus.

Et hæc affectio ex mixto, quopiam generatur humore, serosis nimirum tenuibusque & acris succis cum crassis mixtis: quapropter facile etiam in psoram ac lepram transit: indigetque etiam ipsa pharmacis fortiter exiccantibus. Ubi verò in psorâ aut lepram transierit, ultra hoc quod resiccantibus indiget, etiam repurgantia & exterforia desiderat.

¶ De mentis eruptionibus.

Hoc eruptionum, sive exanthematum nomen, quidam in communi usurpant de affectionibus ulcerosis & asperis in mento sua sponte oborientibus. Indiget verò & hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

¶ De furunculis.

Furunculi, Dothienes Græcis vocati, ex similibus humoribus, veluti vari gignuntur, per universum corpus duplices existentes: nonnulli quidem variosi, duri, & ægre concoctiles: aliqui verò inflammati: in quibus aliquando febres consistunt, & tumor excrescit in magnitudinem, & in pus transmutatur. Unde curatio ipsorum ut plurimum eadem quæ inflammationum existit.

¶ Critonis ad varos remedia.

Mellis Attici, & acerrimi aceti, sing. cyathum unum misceto, ipsisque varos illinito, cum digito perfricando. Vel amaras amygdalas aceto intritas, faciei illine. Aut alumen scissile probè lavigatum terebinthina excipito, impositoque.

¶ Ad varos callosos.

Saponis gallici drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. j. thuris drach. j. aqua dissolvito, & cerati spissitudinem facito, eoque illinito, & post horæ interstitium calida ablueri jubeto.

¶ Ad affectiones eminentiores, ac principium elephantiasis.

Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulfur vivi, sing. aequales partes aceto dilutas ac probè tritas, in pastillos redige, eosque in umbra exicca: usu verò expetere, aceto dilutos illine, atque ubi resiccati fuerint, subscripta compositione deterge. Saponis gallici li. j. ammoniaci thym. tantundem: thuris, mastiches, spumæ nitri, sing. unc. iij. Saponem & ammoniacum in fictile vas cojecta, & aquæ sextarius duobus affusis, coquito: atque ubi dissoluta fuerint, arida contusa atque cribrata adjicito: deinde in mortarium transfusa, & probè conquassata

in va-

Vari descriptio et curationis.

Ficosus tumor à varo quomodo differat, et qualia medicamenta possint.

Lichenes à quibus gignantur humoribus, et qualia medicamenta desiderent.

Exanthemata resiccantibus medicamentis indigent. Dothienes.

Furunculorum species.

Varis remedia scripta à Critone.

Elephantiasis incipienti medicamentum egregium.

in vase vitreo reponito. Ufu verò postulantē, faciem ex eo smegmate inquinato, et post modicū tēporis larga aqua molliter perfricādo abluito.

¶ *Eiusdē ad fiscosas menti papularū eruptiones.*

Papulis in mento erumpentibus medicamenta congruentia.

Spumæ argenti, misyos crudi, æquas partes tritas insperge. Aliud. Atramenti sutorii, sulfuris vivi, sing. drach. ij. æruginis drach. j. nitri rubri drach. ij. trita insperge.

¶ *Andronis pharmacū ad idem accommodatū.*

Chalcāthi, myrrhæ, sing. drac. ij. thuris, aluminis scissi, sin. drac. iiij. malicorij, gallarū, aristolochiæ, sing. drac. viij. vino austero exceptis utitor.

¶ *Citronis remedia ad lichenas.*

Lichenū remedia scripta à Crito-ne.

Tritici grana multa imposito in incudem: deinde laminā æris candentē tritico superponito: & resolutū ab eo liquorē, calidū adhuc, auferto, illinitoq;. Aut portulacæ succum assidue illinito. Quod si inveterati sint lichenas, capparis folia trita cū aceto imposito. Aut corticem radices hortensis rumicis, similiter ex aceto tritam.

¶ *Pastilli lichenici.*

Glutinis fabrilis, chamæleonis, sing. drach. iiij. sulfuris vivi, thuris, sing. drach. ij. aceti hemina dimidium. Glutinum aceto dissolvitur, dein aridis affunditur. Ufus tepore, quantum satis est, aceto diluo, calidumq; impono.

¶ *Humida ad impetiginosos affectus.*

Impetigini congruentia remedia.

Misyos peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, sing. drac. viij. aloes, sulfuris vivi, utriusque drach. iiij. Passo excipito, ad spissitudinem strigmenti, & bis aut ter in die perfrictis illine.

¶ *Emplastrum lichenicum.*

Ceræ, picis coctæ, terebinthinæ, sulfuris vivi, sing. libræ dimidium: liquida committito aridis.

¶ *Excoriatorium lichenum.*

Lichenas excorians.

Squamæ æris drach. vj. auripigmenti, sandarachæ, utriusq; drach. iiij. æris. ulsi, veratri albi, sing. sesquidrachmā: ventrium cantharidū tantundem. Singula per se terito: dein simul mista, cedria excipito, & ad strigmenti spissitudinē reducta, pyxide æris cyprii reponito. Cæterū antequam excorioria imponantur, circumscitas & vicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationem arcente in splenio excepto, integere ac tueri oportet. Post excorioriorū usum emplastra viridia & alba sunt imponenda.

¶ *Emplastrum viride Pamphili ad lichenas.*

Ceræ libram: æruginis rāsæ quadrantē. resinæ phrycæ lib. ij. olei cyathos iiij. aceti acerrimi q; sit satis. Conficito ut decet.

¶ *Viride Herophili.*

Æruginis drach. ij. mannæ drach. iiij. adipis vitulini drach. xij. chalbani drach. iiij. ceræ drac. lxxx. resinæ drach. xx. aceti quod sit satis.

¶ *Emplastrum album, quo Magnus circulator est usus ad excoriatos lichenas.*

Lichenas excoriatos sanantia medicamenta.

Lithargyri, ceræ Tyrrhenicæ, sing. lib. j. olei sextarii j. cerussæ lib. j. aquæ sextarium j. Conficito.

Aliud. Lithargyri, cerussæ, plumbaginis lotæ, sing. drach. xxv. ceræ, terebinthinæ, sing. drach. xvj. olei hem. j. aquæ tantundem. Conficito.

¶ *Compositio Menecratis squamas decidere faciens, & corpora attenuans.*

Picis brutæ pellucidæ, siccæ, & electæ, drach. ij. s. resinæ pinus pellucidæ lib. j. & quadrantē: ce-

ræ ponticæ tantūdem: chalbani quadrantē: acciti heminam unam. Conficito diligenter.

¶ *Heraclide Tarentini ad capitis & mentis ficosos tumores.*

Elaterij salisq; pares portiones cōfundito utitorq;.

¶ *De dentium affectibus.*

Equidem in me ipso manifestē aliquādo percepi, nō dolentē modō, sed etiā pullantē dentē: quemadmodū carnosæ partes inflammatione vexatæ consueverūt. Quare mirabar sanē, quod in dente oriri inflāmatio posset. Atqui cū etiam alio tempore dentem dolerem, perspicuē sensi, nō ipsius dentis, sed gingivarū inflammatarum, eum dolorem existere: ita ut etiam citra coarctationem dolerent, ob vicinitatē tamen durorum dentium illis in augeretur dolor. Utriusq; itaq; doloris sensum expertus, aliū quidem in gingivæ, alium in ipsius dentis substantia esse clarē scio.

At verò, & quod nervus quidem ad radicem dentis substratus, aliquando etiam doleat: imponat autē nobis, ut credamus ipsum dentē dolere, consentaneū rationi est. Etenim quod dente exempto remaneat adhuc exigua quædā portio doloris, id ob nervi inflammationē contingit: cū nimirū tunc dolor nervi levior tantum reddatur, eò quod nō amplius ab osse, cui cohærebat, tendatur: & quod jam liberius perspiret, fruaturq; medicamentis quæ illi adhibentur. Neq; enim per contactū, neq; per distributionē possibile fuerit inflāmato nervo mederi, utrinq; à dentium locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso dente. Jam verò cū lividi tota substantia sua interdū reddatur nervi, nihil mirū sit, si phlegmone simile quid patiatur. Cui rei hinc major accedet fides, quod tum nutriatur, tum augeatur per totū ferē ipsius vitæ curriculum: id q; evidenter sæpenumero in iis dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi, utpote qui semper augeantur. Siquidē quantū augentur dentes, tantū in ciborū lavigatione atteruntur. Cū igitur illis absq; nutrimento augeri nō liceat, utiq; duabus affectionibus, & his contrariis, obnoxij erūt, inopia scilicet & redundantia alimenti, q; ipsis suppeditatur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores & atq; ob id tenuiores eos efficit: redundantia verò, consimilē in eis excitare affectionē potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac proinde eundem est, ut redundantia evacuet, partim discutendo, partim eam repellēdo. At tenuitatis dentium ob alimenti inopiā, nullū remediū est, cū tunc necessariō laxetur moveanturq; nempe cōpage ipsorū laxiori reddita, ob tenuitatē nō modō dentium, sed locellorū etiā eos amplectentiū. Hæc itaque affectio senibus accidit citius aut ferius, veluti etiam magis aut minus. Quæ verò phlegmonē refert, magis juvenes corripit. Auxiliari tamē etiā oportet senibus, auxilio gingivis adhibito. Eas autē astringentib. medicamentis robustiores, & magis circa dentem astrictas facere cōvenit: tanq; ipsæ ad stabilitatem & firmitudinem dentium, aliquid etiam conducant. Porro forantur dentes ab humorū acrium & erodētium influxu: quemadmodum etiam cutis citra externam causam solet exulcerari. Verū cutis exulceratur assidue & multis: ossa aut rarius, quod ob

duritiem

atium fo-
orum cu-
so.

duritiem ægrius quam cutis ipsa patiantur. Igitur corporum erosorum medela, erit resiccatio vi-
riati influentis humoris: qui si paucus fuerit, per
localia exiccantiaq; auxilia absumetur. Si verò
multus, universi capitis providentia est habenda:
quod quidem si ob universum corpus affectum
sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erosos
ob molitudinem dentes, duriores impatibilio-
resq; per austera & acerbissima medicamenta reddendi
sunt. At lividos redditos, per siccantia curare
oportet, ut qui ex vitiosorum humorum influ-
xu id patiantur: unde similem cum foratis cura-
tionem desiderant.

¶ De gingivarum medela

atium li-
orum cau-
g curatio

Gingivis ex inflammatione dolentibus, optimū
pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfa-
ctumq; in duplici vase, atq; ore retentū. Repellit
enim citra molestiā, discutitq; absq; mordacita-
te, cuius rei inflammatis præcipuus est usus.

¶ Que Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

givas in-
amatas
in leni-
um per-
at.

Dolentes dentes colluantur acri aceto calido
cū galla. Aut pinguibus tedis in aceto fervefactis.
Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepefactis.
Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucu-
meris radice, vel marubio, singulis cum aceto,
pipere, & nitro. Aut pulegij decocto. Mirificè fa-
cit dens caninus ustus & tritus; deinde cum ace-
to coctus, & ore retentus. Aut scillam, aut radi-
cem hyoscyami in aceto coctā colluito. Aut py-
rethrum cum hyssopo, & colocynthidis medul-
la similiter coquito, liquoremq; ex eis longo tē-
poris spacio in ore teneto. Hæc Archigenes. Por-
rò solanū stupefaciendo sensum duntaxat, auxi-
liatur dentium doloribus.

¶ Ad foratos atq; dolentes dentes reme- dia ex Archigene.

atium do-
lus medi-
na ab-
bigene
lita.

Sory Aegyptium resina terebinthina exceptū
obline, indeq; intra dentis cavernulā. Aut sene-
ctam anguis dentib. apprimito, & excident. Aut
vermes terrenos tostos cavernulæ præmundatæ
inspergito. Aut piper, vel rorismarini sement o-
pio exceptum, in cavernulam inde. Aut in au-
rem denti vicinam oleum sesaminū, in quo ver-
mes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso au-
tem dolente dente hyoscyamum cōterant. Ero-
sis etiam atq; dolentibus dentibus, candens ad-
moveto cauterium. Præstat ad eliciendam pi-
tuitam, staphidem agrestem per se, & cum pule-
gio mandere.

Fomenta ad dentium dolores extrinsecus fiunt
ex sale & milio, simul & torrefactis, & coniectis
in sacculos. Dolenti autē denti affricetur origa-
ni ramulus, oleo fervido intinctus. Aut opopa-
nacem & peucedani succū unita, linteolo illiga-
to, & intra oleum fervefacta, denti dolenti appri-
mito. Aut bene cōtecto, & hiare iussu, hyoscy-
ami semina in suffimentum adhibe.

¶ Ad eximendos absq; dolore dentes.

tib' exi-
du citra
remre-
ia.

Pyrethrū acerrimo aceto ad dies quadragin-
ta condito, terito, & reponito. Usū verò exigēte,
reliquis cera obturatis, dolentem ipso pharmaco
integito. Deinde hora interposita, digitis extra-
hito, aut scalpello exigito. Dentes educunt forti-
ter tity mali succus, & fori, cum chalbano impo-
sita. Apollonius autem radice betæ succum per

se jubet instillari in nares, ad solvendum dentium
dolorem.

¶ Eiusdem, ne erosi dentes vacillent, neve factorem edant, remedium.

Veratrum nigrū erui magnitudine, melle co-
cto exceptum, cavernis inde.

Dentium feto-
ri remedium

¶ Eiusdem ad dentes denigratos opti- mum dentifricium.

Alabastritæ usti drach. viij. pumicis usti drac.
iiij. salis torrefacti drach. iij. tritis utitor. Ab ho-
num usu collutione utendū est, ex vino odorato,
in quo ad multū tempus iris sicca fuit macerata.

Dentifriciū
optimū.

¶ Asclepiadis remedium ad dentes motos.

Cornu cervi usti drac. viij. Rhois rubri drach.
iiij. omphacii drach. ij. balaufti drach. iiij. corti-
cis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis utitor.

Dentes con-
firmans re-
medium.

¶ Collutio eiusdem ad molarium dolores.

Radices smyrnii cum aceto mulso coquito, &
excolatum liquorem ore tenendum dato.

¶ Ad erosos dentes præservativum.

Zingiber cum aceto mulso coquito, ac pbe te-
rito, indeq; in cavernam indito, forisq; dentem
ex eo integito. Aut hederæ lachrymam chalba-
no misceto: aut tithymali, vel ficus sylvestris suc-
co dissolvito, ac utitor.

¶ De mobilibus & prominentibus dentibus.

Ubi dentes absq; ictu præcedente moventur, ve-
rissimile est nervos radicibus eorū adnatos, præ-
nimia humiditate laxatos esse: ob idq; siccantib.
medicamentis eis esse opus. Quum autē emoti
dentes prominentiores sint reliquis, præcipuè
ubi ex plaga moventur: sanè semper optimū ju-
dicavi fore, si sic affecti, in tantum attererentur
lima, quantum super reliquos prominent: idq; ne
oppositos sibi offenderent, in loquendo, mādē-
dove: quod consiliū semper mihi satis feliciter
cessit. Oportet autem gingivis linteolum molle
usq; ad radices dentium circundare: dein digitis
sinistræ manus leniter amplecti, simulq; tutē, &
citra compressionem, ne concutiatui cui limu-
lam adhibemus, chirurgiā ipsam aggredi: eamq;
non una vice absolvere, sed pluribus. Imperan-
dum etiam est ægro, ut nec loquatur, nec du-
rum aliquem cibum accipiat: utatur autem ali-
mento succo prisanæ, & sorbitione ex alica, &
pane madido, atq; aliis id genus mollibus.

Dentes pro-
minentes ex-
torendi ratio

¶ Ad firmandos dentes, ex Ar- chigene.

Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amy-
li, æquales singulorum partes tritas admove. Po-
stea asininum lac colluant calidum, aut acetum,
aut vinum, in quo malicorium & galla sint co-
cta. Ad dentium autem stuporem portulacam
manducent.

Dentium stu-
pori portula-
ca auxilia-
tur.

¶ De dentitione puellorum, eiusdem.

Dentienti infantulo, si doluerit, canino lacte
gingivas obline. Aut si leporino cerebello gingi-
vas ejus illeveris, citò dentes provenient. Mul-
cet gingivas dolentes acetū cui hyoscyami radix
incocta fuerit. Quod si enascēs dens ægrè erum-
pat, & cōpungat gingivam, cyperum ex butyro
& unguento fusino juxta exortum illinito.

Dentitioni
puerorū con-
gruentia me-
dicamenta.

¶ Præservativa dentium ab Archige- ne prodita.

Alumine scisso & modica myrrha confricato,
nec erodent unq;. Aut iridem Illyricā mandito, ita erosionē.

Dentes præ-
servantia cō-

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans.

Piperis, pyrethri, succi tithymali, chalbani, sing. drac. j. chalbano excepta in caverna indito.

Alia. Seminis hyoscyami, opii, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing. drach. j. chalbani drac. ij. tritis ex vino utitor.

Collutio ad motos dentes, Critonis.

Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta colluenda præbeto. Ejusdem ad corrosos dentes. Capparis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, & colluito tepidum.

Dentifricium ad gingivas madore laxatas, putrescentes, & cruentatas, concussos dentes, ozænas, parulidas, dolores, & omnia oris ulcera.

Dentifricium ad omnia gingivarum & oris ulceras faciens.

Perdicii recentis drac. x. mellis, aluminis scissi, iridis Illyricæ, sing. drac. iij. piperis albi drach. viij. nigri drach. iij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pullegii, seminis apii, sing. drach. ij. myrrhæ, menthæ siccæ, herbæ fideritidis, sing. drach. iij. salis fossilis drac. iij. Perdicium, fideritidem, mel, & salelem, mista urito: alumē verò per se ustū vino extinguit: dein omnibus simul contusis utitor.

Smegma dentes reddēs candidos, eosq; ab erosionē defendēs, oriq; bonum odorem concilians.

Dentifricium insignis.

Nitri, testæ sepiæ, myrrhæ, sing. unc. j. tritis utitor. Aliud ad idem. Aluminis scissi fescuncem: mastiches unc. j. comæ rosarū quadrantem: iridistrientem. Tritis utere, indeq; aquam tepidā colluendam præbe.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum locos, Lib. VI.

Inventionē rationalem auxiliorum præstare illi, quæ soli experientia innititur.

Inflammationis causa, & curatio.

Astringentium facultas.

Quamvis plurimū interest, ex vivāne aliquo voce, an ex libris discat, nō tamē parvum cōmodū studiosis ex cōmentariis accedit: ob idq; ad hosce cōscribendos me accinxī, quum rationalis auxiliorum inventio præstet illi, quæ soli experientiæ innitit. Igitur in stomaticis pharmacis, de quibus agere in præsentī cōmentario est animus, primus medendi scopus est communis omnium partium inflammatarum: secundus autem, proprius illius cui medemur. Porro inflammationes, ex influxu calidi sanguinis fiunt: qui repellendus est, nisi vereamur ipsum ad partē aliquam principem recursurum, atque illic graviores aliquem morbum excitaturum. Utimur igitur venæ sectione, & purgatione, & clysteribus, etiam inedia, ubi totū corpus plethoricum, aut cacochymum extiterit. Si verò neutrum sit horum, statim properamus ad curationem per localia remedia. Impossibile autem est, pharmaco ritē uti eum, qui vim ipsius nō cognovit, secundum quam auxiliatur. Porro medicaminum repellentium genus, quibus utimur in principiis inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanē ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciorē vim habent, ad ocyus repellendum influxum. Inest quippe ipsis statim etiā facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur.

Communis itaque scopus in oris inflammationibus est, prohibendi eos dum incipiunt. Se-

cundus autem ab ipsa particula sumitur, quum sciamus longē rariorem atq; molliorem esse oris tunicam, cute qua universum integitur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorū insuavitatem percipere: posseq; medicamēta ori indita defluere in ventriculum & pulmones: quorū neutrum cuti reliquæ adest. Quare fortibus medicamētis, cuiusmodi chalcanthos existit, quæq; venenosam facultatem sortiuntur, uti ad oris affectiones non licet, nisi magna urgeat necessitas.

Ergo succus mororum solus, recensq; à fructu i-
plo expressus, ad incipientes oris inflammationes est melior illo, qui, ut asseruari diutius possit, ex melle coquitur: quanquam ad sequentia inflammationis tempora, utilior est qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio utilia sunt pharmaca repellentia id quod influit: sic post principii usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq; misto, repellente videlicet facultate, & discutiente prædito: ac primo quidem tempore, astringens præcellere oportet: ad finem verò discutiens: atque interpolito tempore æquales utrorumq; partes esse convenit. Quando verò veluti induratum quippiam ex ipsa inflammatione relinquitur, penitus non convenit astringens ad disculorium miscere, si prius universum corpus fuerit vacuatum. Similiter neque in principio bonum est disculoria miscere astringentibus. Merito autem qui pharmacum diamoron composuit, parum ex croco & myrrha ei cōmiscuit, quod communem habeant facultatem conco-

ctoriam inflammationum: privatim verò crocus quidem astringat: myrrha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat, tenuium partium etiam substantiā possidens, qua facile in altum subire possit, viresq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum diamoron miscere rhois succū, aut om-

phacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas ficcas, necnō balaustium, cytinus, malicorium aridum, gallam omphacitin, pini, thurisq; corticē, hypocistidem, lentisci succum, ac breviter astringentia omnia, præter ea quæ corruptentem possident facultatem, quæ & deleteria dicitur, & letalia species quædā existit: quippe cū non omne letale, necessariò etiam deleterium, hoc est, venenosum existat. At ubi inflammatio jam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflammatio coquantur. Quæ ubi concocta fuerit, addere aliquid ex disculoriis licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarium, sulfur vivum, sapa, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbra, aut thymo, aut calaminta hortensi & agresti. At verò Erasistratus, quum mororū succus illi ad manum non esset, ubi cremore usus, seipsum curavit. Ego autem pharmacum ex succo nucum viridum confeci, facultate ad oris inflammationes cæteris omnibus stomaticis plurimum antecellens. Cujus compositio est huiusmodi. Succum externi nucum viridum corticis cū mellis iusta portione coquo, donec ex utroque mellis crassitudo consistat. Hinc autem liquet, qualis sit eorum corticū succus, quantaq; astringendi vis, quod ne per fortissima quidem exterioria, nigredo elui possit ab eorū manibus

Oris affectibus curandis sunt fortia nec generosa medicamenta. Oris inflammationibus quæ opisthotica sunt medicamenta.

Digerentibus solis utendum esse, ubi dures aliquæ ex oris inflammatione relinquitur: tunc prius corpore uncto.

Crocus facit. Myrrha facit.

Diamoron medicamentum.

Letalia omnia non esse deleteria.

Oris inflammationes coacta quæ coquantur.

Stomaticis succo nucum viridum, oris inflammationes coacta quæ coquantur.

qui

qui virides nuces decorticant. Atqui nisi in profundum manuum illa facultas descenderet, non cerè ægrè eluibilis esset. Quum autè descendat, indicat planè substantiam succi, tenuium partium esse. At rationi est consonum, astringendi vim esse maximè ex usu, ubi in eiusmodi cõtineat substantia: ineptam autem existere, quæ crassarum partium substantia est cõtuncta. Optimum itaq; ac simul suavem esse nucum succum mihi psuadens, eum in quatuor partes divido: & ad primam statim aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiã, sulfuris & niri nonnihil. Quartam verò solam synceram servo, ob dulcorè futuram utilem pueris, mulieribusq; & viris effœminatis. Est autè quod ex succo rubi cõtatur, fortius eo quod ex moris conficitur: quemadmodum hoc eo, quod ex musto paratur: omnib. tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutiuntur, maximè conjectare oportet naturam eorum qui ipsa fument. Namq; cum molestia aut fastidio se accipitur, os ventriculi evertit. In stomaticis autem medicamentis, eiusmodi synceritatem interdum contemnere licet. Si quis igitur medium aliquod medicamen cõficere omnibus aptum velit, ut (exempli gratia) quod constat ex succo mororum, ad quinq; libras succi, unam mellis adjiciat: croci autem & myrræ, utriusque drach. j. s. Vini item austeri hemina unam: omphacij, drach. j. Quod si non adsit, pro ipso rhois succum injicies: & si volueris par pòdus utriusq; imponere, nihil peccaveris. At Hera drachmam unam scissilis aluminis addit. Quod verò ad coquendi modum spectat, ego sanè cenfeo succum ipsum solum esse per se præcoquendum usque ad crassitudinem strigmentitiae: dein verò adjiciendum mel: atque ubi jam cacabum ab igne velis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim ut spuma argenti, & plumbago, aliaq; multa metallica, per cocturam meliora evadunt, sic vis cõplurium aromaticorum exolvitur. Ceterum ad induratas inflammationes, quum jam præterierit vigor, nec amplius influat quicquam, prædicto pharmaco discussoria miscere oportet: cuiusmodi sunt, spuma, nitrû, petræ aliæ flos, sulfurq; vivum. Ac sufficit sanè niri uncia semis, sulfuris uncias duas, si addideris. Quod si nihil horum sit præstò, in sapia aut mulla origanum fervefacito, ipsamq; stomatico pharmaco adjicito, & gargarizare jubeo. Nihil autem refert, etiam si hyssopum conjicias pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbram, aut calaminthem, aut hedyosmum. In vigore autem inflammationum collutionibus & gargarismis concoquere inflammationem oportet, pinguium caricarum decocto, lèriscinoq; oleo tepefacto in duplici vase. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in vigoribus gargarizare convenit mullæ dilutioni permistum, aut calidæ sapæ, aut etiam aquæ calenti. At meum ex succo nucum medicamentum, aliorum omnium est validissimum, utilissimūq;. Quum aut tres sint Punicorum malorum species, austerorum nepe, dulcium, & acidorum, equas singulorum partes, unam cum corticib. soleo ipse etiã cõtundere, expressūq; succum cum melle coquere, ac sic cõficere medicamentum non solum stomaticum, sed ad multa alia utile. Con-

tunditur etiã cum illis & rubi fructus: cujus succus similiter præparatus succo mororum, melius illo pharmacum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & malorum cotoneorum, & pirorum sylvestrium, ac mespillorum succus, similiter præparatus, stomaticum pharmacum redditur, aptumq; etiã ut devoretur: quum hoc quod ex nucibus cõtatur, devorare non liceat. Verum quod ex punicis constat pharmacum, aptum est exoluto & cibos fastidiendi ventriculo: deficit tamè ab eo quod ex malis cõtatur. Innotuus est etiã rubi mororum succus voratus, veluti & ipsorum mororum: sed succus rubi mororum habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum, mororum cremor non habet. Jam verò succus nucum plurimo melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modico autem, malorum & punicorum, & pirorum sylvestrium. Medius inter hos est mespilorum succus. Ex cornis etiam, brabylisq; & prunis, stomatica præparantur. Ceterum si crassus esse videatur succus, statim mel admiscere oportet: si liquidior, præcoquatur. Suscipit autem pirorum atq; malorum succus parem mensuram mellis. Succus verò eorum quæ nimis acerbæ sunt, veluti est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro si atramentum sutorium admistum sit, non admodum deglutire oportet confectum pharmacum, præterquam si juxta stomachum aut alvum ulcerosam affectionem fieri vereamur. Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, præstant ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit aut drach. ad prædictam compositionem admista, in qua una mellis libra conjici dicebamus. Jam verò quum rhodus sit duplex (alter enim obsonius inspergitur, stomacho commodus: altero coriorum tinctores utuntur) uterq; sanè musto incoctus, stomaticum efficitur medicamen. Mustum etiã solum, citra mellis misturam in mellis compagem redactum, bonum fit pharmacum in principiis, augmentis, atq; vigoribus. Ad declinationem autem præstiterit, si in ipso diem integram tedas pingues præmaceraveris. Quod si preciosius efficere pharmacum vis, injicies etiam casia corticem, aut nardum Indicam, aut malabathi folium, singulorum nempe unam drachmam. Ad induratas autem inflammationes cõticiuntur quæ generosius discutere possint, rufa videlicet, & cribrata: idq; ubi olla ab igne est exēpta. Ac talia sanè sunt, costus, amomum, macer, Cyrenaicus succus, Medicusq;. Pauperibus tamen pro sumptuosis discussoriis pharmacis, aut dictamnium, aut acoron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut sinapi injiciendum cenfeo, pari pondere: ita ut ad trium drachmarum pondus, eorum mistorum moles perveniat ad prædictam symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Verum pro cõstitutionis affectuum proportionem augeri ac minui pharmacorum vehementiã oportet. Ergo pharmacum cõficientes ex musto, ad decem multi heminas, tres injiciemus heminas rhois coriorum, aut ejus q obsonius inspergitur. Si verò utrumq; injiciamus, utriusq; una & dimidia injicienda est. Juxta proportionem etiam, ex discussoriis, quodcunq; tandè in promptu habeamus. Quod si unum tantum suppetat nobis astringendi vim habens, quod in principio injicia-

Stomaticum ex nucibus de vorandū non esse.

Rubi mororum succus os ventriculi roborat, id quod succo mororum non inest.

Succorum quoniam plus, est qui minus requirant mel.

Calcanthion quando stomaticis miscere expediat medicamentis.

Rhus duplex

Musto quando & qualiter præparato utendum moris inflammationibus.

Discussoria pharmacum quam sint

Stomatici ex musto compo-

mus: aut unicū discussorium, quod juxta finem: ex illo totū pondus explebimus, quod ex omnibus alioqui fuisset conflandū. In universum autem, austeriora quidē, in principiis, & vehementibus influxionibus congruunt: moderatiora in vigoribus: ut magis discussoria in declinationibus. Porro ex astringentibus facilia paratu sunt, rosæ, bacca myrti, myrtus, lētiscus, rubus, canirubus, galla omphacitis, fructus Ægyptiæ spinæ, oia aluminis genera, unus & alter rhus, glauciū, omphaciū, cytini, & balauftia. Ex discutientibus moderatē, faciliē parantur caricarū furfurumq; decoctum: aut mulla, in qua organum, aut hyssopū, aut thymus, aut calamintha, aut pulegiū, aut hedyosinum cōcocta sint: quæ si diutius coquantur, fortiora redduntur: amplius autem & nitri spuma, aut ipsum nitrum ustum. Fortius verò his est sulfur vivum. Rectē autem Andromachus medicamini ex succo mororū confecto addidit glycyrrhizam, ut exasperata leniret, asperitatemq; astringentium mitiorem redderet.

¶ *Stomaticum Andromachi ex musto, quo utor.*

Stomaticum Andromachi ex musto Gallas xxx. Rhois coriarii sex. ij. musti sex. vj. Gallas confractas per diem & noctem in musto macerato: dein cogto, donec ex toto quarta supersit portio: quam per linteolū colatam, expressamq; in olla ad mellis crassitudinē spissato: dein trita addito, aluminis scissi, croci, myrrhæ, singul. drac. j. permista reponito, tandemq; eis utor. Jam verò, quod ex dulci confectū est musto, magis mitigatorium & moderatum erit, sed minus efficax: id autem quod ex acerbis fit uvis, vehementius quidem astringit, leniendi vim tamen non habet: ex medio vino paratum, mediā facultatem sortitur.

¶ *Stomaticum ex besafa, anginis congruens ab Andromacho scriptum.*

Stomaticum ex besafa Andromachi. Sem. anisi, apii, ammi, floris junci odorati rot. aluminis scissi, iridis Illyricæ, besafa (hoc est, seminis rutæ sylvestris) cinnamomi, myrrhæ, Troglo ditycæ, aristolochiæ longæ, casia, rosarū siccarū, crocomagmatis, sing. unc. j. croci, cineris hircinū tenellarū, utriusq; quadrantē: croci sesquiunciam: nardi Indicæ, amomi, utriusq; unc. s. gallas viij. tritis cum melle utitor.

¶ *Stomaticum Asclepiadis.*

Hirundinū sylvestriū ustarū cineris drac. iiij. croci, nardi Indicæ, utriusq; dra. j. melle excipito.

¶ *Aliud Andromachi, ad columellam laxatam.*

Columella laxata remedium. Aluminis liquidi lib. j. florum rosarum lib. s. succi hypocistidos quadrantem. Alumen in melle coquito, dein sicca inspergito, utitorq;.

¶ *Aliud eiusdem ad omnia vitia oris.*

Stomaticum ad omnia vitia oris. Crocomagmatis drach. ij. iridis drach. iiij. sandarachæ drach. s. terebinthinæ drach. ij. lycii Indici drach. j. uvæ passæ drach. viij. aloës, omphacii, singul. drach. j. nucum pinearum tostorum drach. viij. succi glycyrrhizæ, aluminis scissi, balauftii, sing. drach. j. floris rosarum drach. ij. mellis hem. ij. s. Conficito.

¶ *Stomaticum Asclepiadis.*

Stomaticum Asclepiadis. Succu hypocistidos drac. ij. balauftii, lycii, acaciæ, sing. drach. j. excipito olivæ immaturæ succo, & postea melle subactis utitor.

Si verò æger stomatica id gen^o fastidiat, in mo-

deratis quidem inflammationibus sufficiet succi soli fructuum jam dictorum, ut rubi, & mororum, punicorumq; malorū & cotoneorū. Quin & succus nucum ubi cum solo melle paratur, gustui suavis existit: itemq; mustū ex uvis acerbioribus pressum, si rhus in id cōjiciatur, optimum pharmacum redditur. Ad eas verò inflammationes quæ multa astrictione indigent, austerorū punicorū, aut cotoneorū, aut utrorumq; succus, melli admistus, sæpe mihi fuit satis. Singulis aut horū succorū licet omphaciū adjicere. Vehementissimū medicamē reddet, si punica integra tundas unā cum corticibus, indeq; succū exprimas: atq; hoc magis si acerba fuerint. Acerbissimum etiam fiet, si ad punicorum austerorum ita tusorū succū, omphacium superaddatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharmacum, si tota cōtusa punica mālā, passo cocta excolaveris. Ne verò valde exasperet, glycyrrhizæ succum admiscens, conficies optimū pharmacū. Si quid verò induratū appareat, iis succis qui medias facultates sortiuntur, injicies aliquid, dum coquuntur, ex pulegio, aut thymo, aut organo, hyssopo, mētha, aut calamintha: dein colabis, & habebis optimū medicamē. Quod si calidius efficere velis, piper addes. Omnib. tamen si glycyrrhizæ succus addatur, melius pharmacū efficiet.

¶ *Decrustis.*

In calidis & humidis corporis partibus, qualis est os, ex quacūq; tandem causa fuerit exulceratum, citò putredo oboritur. Ad cujus ulcera fortissimis sæpe uti cogimur medicamentis. Atqui fortissima sunt, quæ escharam instar cauterij excitant. In externis igitur corporis partibus, ubi parti curandæ crusta fuerit inducta, à fortib. superfedemus pharmacis, transgredientes ad deterforia, quæ escharas tollunt. In iis verò quæ in ore excitata sunt escharis, tutius mihi videt^r esse admiscere ad exteriora pharmaca, alia quædā fortiora, & quæ per se admota, crustas etiā inurerēt. Melli itaq; maxima extergēdi vi prædito, crustifica medicamēta immiscemus: quemadmodū ad sordida quæ in corporis cuticula oriūtur, miscere illi leviter extergētia solemus, ut thus, eruum iridem, aristolochiā, & alia id genus. Porro Andromachus, ad oris crustas, ex nucib. pineis, amylo, alumine scisso, flore rosarū, croco, & melle, composuit optimum stomaticum.

¶ *Critonis ad oris crustas medicamentum.*

Misyos torrefacti drac. iiij. mellis optimi cyathos sex: misceto & utitor. Idem etiam præstat chalcitis assata cum melle.

¶ *Archigenis ad crustas oris remedia.*

Commodissimū est stercus canum, aliorum ossibus, ex melle illitum: quod etiā in angina auxiliat^r. Aut rhus Syriacus ex melle. Aut hirundinum ustarū & stercoreis humani par modus cum melle illitus. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda dato. Ego verò medicamē ex rhoë damno, quod astringētis sit facultatis, quæ minimè crustis cōvenit. At hepar lupinū eupatorio mistum, ad hepaticas etiā bibit^r affectiones.

¶ *Sorani stomaticum ad crustas, foetentesq; gingivas & humore pregnantas.*

Misyos usti drachmas viij. iridis Illyricæ drachmas iiij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea Sorani reponi-

Acerbissima
stomatica
conficienda
ratio.

Induratis in
inflammationibus
apta stomatica.

Glycyrrhiza
stomatica ad
dita, ipsa me
liora reddet.
Putredo oboritur
citò in calidis & humidis partibus.

Oris pustulis
extirpandis
miscenda ceteris
esse vehementissima
pharmaca, et quæ per
se admota excitare possent
escharas

Oris crustis
delendū remedia varia

Crustis non
convenire
astringentia.
Hepar lupinum
conferit hepaticis.

Stomaticum

reponito, & tum per se, tum ex melle utitor.

¶ Aliud nomine Anthera.

Iridis Illyricæ, sandarachæ, cyperî, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, sing. drach. ij. tritis & mistis utitor.

¶ Stomatium Heraclidis Tarentini ad vehementes putredines oris atq; reliqui corporis.

Chalcitidis partem j. calcis vivæ tantundem: auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis utitor. Aliud. Florum rosarum drach. iij. aluminis scissi, gallæ, sing. drach. ij. myrthæ drach. j. trita mella misceto, utitorq; Quidam sale mace rato in aceto, resiccatoq; utitur. Si hæc remedia putredo ipsa respuat, utendū cauterio est: postea verò colluendū ulcus prædictis, imponendaq; anthera, donec crustæ abscedant.

¶ De columella.

Caruncula illa quæ ad extremum oris dependens cernitur, à veteribus quidem gargareon, & cion, hoc est, gurgulio & columella: neotericis autē cionis, hoc est, columella, vocatur: cujus sanè affectionem quandam, staphylen, hoc est, uvā, dicimus. Raro tamen affectio hæc circa columellam contingit, licet ea sæpe inflammetur. Et sanè quemadmodū in aliis omnibus, in quib. ex humorum influxu contingit morbus, sic etiam hic prima auxilia debet fluxionem ipsam repellere: quare astringentis sint facultatis oportet: verum si quidē influxus sit moderatus, moderatè astringentis, quam privatim austerā vocat: si verò vehementior, acerbæ. Ambæ quippe facultates astringunt, sed debilius austerā, vehementius acerbā.

Porro moderatæ collutiones sūt ex palmularū, rosarum, panipinorum vitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperî, cytinorum, siliquarum, radicū mori, hypocistidis, málorum austerorum, pirorum acerborū, ac sorborū decocto. His fortiora sunt myrti & baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorum tenerorū ilicis, arbuti, simlacis, fagi, & ipsarum glandium: mespilorum item, & cornorum, & fructus memecili. Generosissimū autem est decoctum gallarum, & rhois culinarij, & corarij, fructusq; myricæ, & Aegyptiæ spinæ. Ex his singula tū per se, tum etiā mixtum cocta ex aqua, gargarizare oportet. Mirū. n. quam mixturæ ipsorum utiliores sæpe sūt ipso simplici usu. Quin & arida etiam columellæ insperguntur. Jam verò moderatè astringūt etiā lapis Ageratus, aloë, cyperus, flos junci odorati, radixq; nardi Indici. Eximie astringūt omnia aluminis genera: scissū verò inter ea tenuiorū est partium, & ob id utilius. Aratramētū sutorū vehementem astringendi vim possidet: nō est tamē expers calfactoriæ: ob idq; putrilaginosi ulceribus cōvenit. Caterum gurgulionem exasperat, etiam si jam scirrhum cōtraxerit. Corruptuntur autē succi omnino, si absq; melle reponantur: aut resiccantur, si plurimū fuerint cocti. Nōnulli tantam ariditatē asciscunt, ut conteri queant. Tales sunt hypocistidis, uvæ acerbæ, glycyrrhizæ, & cetaurij succus. Ridiculum autē est quærere, inter duo eiusdē generis pharmaca, utrū sit ipsorū præstātius. Omnia siquidē medicamēta respectu ad aliquid tum utilia, tum noxia dicuntur. Quocirca si pronūciaveris pharmaca nihil esse sola per se,

recte dixeris: nihil enim sunt, nisi nacta fuerint utentē recte. Si verò cōtrā, pharmaca deorū esse manus fatearis, similiter recte dices. Juvant quippe maxime, si is q; eis utit, in rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura prudēs. Porro mistura pharmacorū ejusdē generis, medicorū pharmacorū usus sit gratia: ob idq; semper duo contraria medicamenta in unoquoq; affectu vos habere operæ precium duco: quæ quide permiscendo, multis pharmacis abundabit. Quū autem raro quis affectionē inveniāt, quæ (exempli gratia) solis discussoriis, aut repulsoriis indigeat, cogimur etiam sæpe diversi generis medicamenta miscere: quemadmodū ubi cum repellentibus aut anodynis discussoria cōfundimus: ut si gurgulione inflāmato, ad alumē iridem misceamus Illyricam, aut farinam eruina, aut thus, aut myrrham. Etenim quū discussoria sint multa, est semper à mitioribus auspicandum: quandoquidem inflammata exasperantur ab acerbis.

¶ Quæ Archigenes scripsit ad gurguliones inflāmatos.

Uva laxata, succum Cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritā cum sale: aut ipsum sal dissolutum: aut lycii radicē tritam: aut omphaciū cū melle. Si fortius medicamentū vis, atramenti sutorij, squamæ æris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, gallæ, æquas partes tritas, ac vino exceptas illine. In principio tamen sale non est privatim utendū, sicuti nec Cyrenaica lachryma: sed ubi columellæ inflāmatio indurata jā fuerit. De gurgulionis aut inflāmatione sic Hippocrates differit: Gurguliones cū periculo excindunt, uruntur, ac resiccant, quādiu rubri fuerint & magni: q; tempore aliis artib. graciles sunt reddendi. Quū verò torū id quod appellant uvā, abscesserit, extremum autē gurgulionis majus, lividumq; redditum fuerit, superior verò pars tenuior, tunc sanè intrepidè curationi admoliendæ sunt manus.

¶ Quæ scripserit Archigenes ad vigentē inflāmationem gurgulionis & tonsillarum.

Si verò in vigore affectio pervenerit, subducatur alvus, aut calidam lotionem furfurum gargarizet, aut prisanæ succum, aut passum tepidū, aut radicis dulcis decoctum cum passo & hyssopo: aut ficus vino incoctas: aut succum prisanæ, in quo uvæ sint passæ incoctæ. Magnoperè juvantur, si amygdalinum oleum in aures infundens, forinsecus spongus expressis leniter foveris. Quin & omelysis ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina seminis lini aut scenigraci. Quod si jam ppē ad suppurationē accedere tonsillæ videant, cōadjuvare assidue per ficū decoctū oportet, ppemodūq; incessanter id gargarisma exhibere, similiterq; aquā mulsam calidā. At si nihil tale apparuerit, augeat autē malum ita, ut ægri vix transglutire possint, ac suffocationis principiū sit nobis suspectum, alvus forti clystere, aut glande subducenda est, & secunda cubiti vena, cucurbitaq; cū scarificatione collo ac mento affigendæ. Fomentis etiā & cataplasmatibus robusioribus est frequentius utendum, gargarismisq; assiduis. Quod si ne his qdē remediis minorescat morbus, sed augeatur indies, venæ sub lingua secent, aut juxta angulos oculorū, atq; illa in fronte consistit. Illinatur autē assidue fel tau-

ri, & elateriū cum melle: aut sal cum oleo veteri, melleq; & aceto: aut centaurea cum melle: aut absinthium cum nitro & melle.

¶ Hera medicamen ad columellam laxatam.

Columella laxata medicamen Hera.

Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares portiones conterito, inspergitoq;. Vel ageratum lapidem deraſum in polinem ſimiliter columellæ imposito. Porro Heraclides Tarentinus rectè ſanè poſt uſum medicaminum exacerbantium, jubet colluamus fauces lentium decocto, ad tollendam vehementem illam aſtringentium aſpredinem.

¶ Ab Aſclepiade prodita.

Paucibus inflammatis re media ab Aſclepiade deſcripta.

Rosarum ſiccarum ſextarium j. nardi Celticæ unā cū radicibus, & adhærente terra, faſciculum j. nidi hirundinū ſylveſtriū aridi drach. iij. myrrhæ drach. viij. gallas omphacitidas numero xv. cōtuſa & trita digitis apprime. Eſt enim hoc miſtæ potentia pharmacū. Aliud. Piperis albi, myrrhæ, ſing. drach. j. aluminis ſciſſi drach. ij. gallæ omphacitidis tantundem: tria admove. Hoc tamen utendum nō eſt in gurgulione vehementer rubente. Aliud ejuſdē facultatis, quo & nos ſumus uſi. Lapidis agerati, Aſiæ petræ, terræ ſamietis, ſing. drach. iij. aluminis ſciſſi, croci torrefacti, gallarū omphacitidū, ſing. drac. ij. tritis utitor.

¶ Critonis medicamentum digerens.

Oſſium palmularum, nucū tenerarum immaturarum, ſiccarū, utrarumq; drach. iij. Urito, atque in pulvillum terito, utitorq; arido admoto.

Aliud Sorani, maximè mitigatoriū, ac proinde convenientiſſimum ad vigentes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, & mel & aquam pari menſura aſfundito: dein coquito, & liquorem ipſum gargarizandum præbeto.

¶ De pharmacis ad ulcera oris aphthas appellatis.

Aphtha ſunt oris ulcera præcipue inſadentia inſantes.

Aphtharum curatio per moderatè aſtringentia.

Ulceratiōes in ſuperficie oris obortas, aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Fiunt aut plurimū pueris lactentibus, quum aut vitioſum fuerit lac nutriceis, aut nō probè ipſum cōcoxerit infans. Curantur facilè, utpote quæ vel à moderatè aſtringētibus compeſcātur. Quandoque tamē diuturnæ ſiūt, ægreq; ſolubiles, & progreſſu temporis nonnihil putrilaginoſum acquirūt: atq; hæ ſanè fortiora medicamēta poſtulat.

¶ Andromachi medicamē ad aphthas malignas.

Aluminis ſciſſi, uſti, drac. ij. fructus ericæ drac. j. oleo excipito, & per digitum locis apprimito.

¶ Ejuſdem ad aphthas leviores.

Lycium Indicū vino tritū: circumlitū, & ericæ fructus tritus, aut roſæ ſiccæ cum melle, auxiliantur. At Crito, adipem ſuillum, & mel, ſimul liquefacta, commendat: ut collutionē etiam ex aſinino lacte manducationemq; portulacæ intinctæ melle: quæ omnia & ſimpliciſſima ſunt & pueris maximè idonea.

¶ Quæ ſcripſerit Apollonius ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcitidē oleo tritā penna illinito. Poſtquā verò puræ factæ fuerint, myrricæ fructū tritum, aut aqua mulſa, aut vino dilutum, illinito, maximè infantibus. Ad nigras aphthas, uvam paſſam exacinatam, & aniſum, trita cum melle illinito. Vel atramento ſutorio trito cum melle utitor. Vel æruginis vermiculatae obolos tres in vini quarta hemina parte gar-

garizandos præbe. Vel muriam olivarum & acetum pari menſura miſta, colluenda dato. Mandendæ ſunt etiam oliuæ muria conditæ. Hæc Apollonius. Etenim oliuæ ſic aſſervatæ, diſcutiūt, atq; vehementer aſtringunt.

¶ Quæ Archigenes ad aphthas ſcripſerit.

Ad aphthas faciunt collutiones ex decocto ſoliorum oleæ, aut myrti albæ. Facit & amurca, & marrubij ſuccus, aut lentis decoctū. Aut ſax vini dulcis cum melle illita. Sumè facit ad depaſcentes, ſcœniculi radicis uſtæ cinis. Porro ex colore ipſo facilè licebit colligere, quī nam humores ipſas aphthas produxerint. Rubicundiores liquidem, ſanguinem præcellere indicant: flaviores, amarā bilem: albefeſcentes, pituitoſum humorem: quemadmodum nigreſcentes, melancholicū ſuccum. Qui autem hæc ritè diſcreverit, noveritq; facultates ſingulorū medicamentorū ſimplicium, is unicuiq; aphthæ ſpeciei, proprium ſciet adminiſtrare remediū. Expēdet aut ſimul ipſas naturas corporum. Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibēda ſunt: debilioribus imbecilliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutribus aluntur, lentem cum modico pane, & medulla cervi, aut vituli exhibeo. Admiſceo etiā cibis nonnihil ex aſtringentibus fructibus. Quandoq; etiā de lactuca, leride, ſolano, & portulaca cōpicio aliquid, ſi aphtha ſit inflammata. Quod ſi cibum aſſumere nequeat, nutricem ejuſmodi victu alo, utq; cōcoquat rectè, proſpicio. Veruntamen etiā infantes illino, ſi quidē ſubrubras videro aphthas: in principio quidē, iſ quæ moderatiſſimè aſtringunt, & frigeſciūt: dein verò, eis quæ citra mordacitatē diſcutiunt. Si verò ſubſtans videro, iſdē utor, ſed magis refrigerantibus. At ſi pituitioſiores, aſtringentib. ut ſi nigreſcentes, diſcuſſoriis generoſiorib. Cæterū in majoribus pueris, ejuſdē generis facultatibus pharmacorū utor, auctis tantum ipſorū viribus: quemadmodū etiā in perfectis & duris corporibus, ſingulis relatis facultatibus fortiffimis utor. Sufficit autem mihi in his per omnia miſyos uſus cum vino aſtringēte, quod tum intendit, tum remittit vim ſuam, prout magis aut minus vinū fuerit aſtringens: & prout craſſius aut liquidius efficitur pharmacum ex miſyos ac vini miſtura. Quod ſi ſordida appareat aphtha, miſy cum vino mulſo tero. Iſ verò qui fortiora quā miſy, medicamenta poſtulat, ærugo ſimiliter diſſoluta, eſt utilis. Cōmodum eſt etiam pharmacū ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atq; hæc quidem efficaciora. Moderata verò, & maximè ad incipientes affectus, omphacium cum vino & cœnomelivæ: ſimiliter etiam rhus. In pueris ſufficit roſarū flos, & ipſæ etiā roſæ ſiccæ. In ſumma verò, moderatæ aphthæ, maximè in corporib. teneris, moderatis pharmacis opus habet: fortes verò & maximè in duris corporibus, curantur à validioribus. Fortiora pharmaca intelligo, tum quæ aſtringunt vehementer, tum quæ etiam mordicāt: ſicuti moderata, quæ prorsus ſunt mordacitatis expertia, nonnihilq; aſtringūt. Porro oleū per ſe, infeſtiſſimū eſt aphthæ affectui: veluti etiam chalcitis: quandoquidem alterum quidem humectat, & ſordes gignit: mordet autem vehementer chalcitis. Verum moderata miſtura ipſorū, optimum pharmacum

Oliuæ muria condita diſcutiunt & vehementer aſtringunt.

Aphtharum cauſas ex colore diſcriminetur.

Fortiora corpora ſaluberrima eſt medicamentis, ut imbecilliora nutrioribus.

Aphtharum quæ infeſtiſſima infantibus, citra ratio.

Aphtha moderata moderata medicamentis deſiderant: ut maxime fortiores.

Aphtha ſi optimam medicamentum ex chalcitide & oleo moderata commiſtis,

macum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & ærugine incarnans effici pharmacum solet, tametsi ambo per se sint contraria carni gignenda: eadem ratione ex oleo & chalcitide aptum medicamentum conficitur.

G A L E N I P E R G A M E N I
de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VII.

De affectionibus contingentibus circa respirationis organa.

Asperæ arteriæ pharmacum mos est appellare arteriaca. Vocant enim arteriā asperā, viam illā quæ ducit à larynge ad pulmones, ex cartilaginosis corpusculis, brōchis dictis, conflantur: unde etiā tota arteria, interdum dicitur bronchos. Vestit autē ipsam intrinsecus quædam crassa membrana, quā ob crassitudinē nonnulli tunicā nominant. Scripserunt porro veteres multa & diversa medicamenta ad affectus organorum respirationis: ad vocemque tum interceptā, tum rācā. Etenim ubi instrumenta vocis ab humiditate vehementius atque tenacius impacta fuerint imbuta, vox intercipitur: quū verō moderatius humecta sunt, oboritur rauco. Organa vocis quum dico, intellige arteriā, & laryngē, et pharyngem, siue epiglottidā. Qui igitur ex vehemēti clamore vocē amplius oblātā habent, ijs similis quædā affectio cōtingit in illa tunica asperæ arteriæ interna, ei quæ manib. cruribusque, & musculis, ubi plurimū laborant. Ceterum curationis genus evariat. Siquidem crura & manus cōfricare per oleū licet, quū per cutem in adjacentes musculos penetrare ipsius possit facultas. Juxta asperā verō arteriā cartilagineas post cutē sitas, prohibent in subjectā pellaculā transitum facultatis unguētorū mollientium. Itaque auxiliorum materia cōgruentiū respirationis organis, quum ab aliis petenda est, tum etiā à balneis dulciū aquarū, cibisque, & lenibus, & laxantibus. Si qua verō aspredo sentitur, cibis utendū est, qui diutius hæreant partibus quæ cum loco affecto cōmerciū habent. Est enim una, eademque sibi cōtinua & cohærens tunica, quæ pharyngem, laryngem, gulā, & internā ipsius asperæ arteriæ vestit, obducitque. Quare cibi cōgruentes tūc erunt, qui ex lacte, amylo, alica, ovis, & libis dulciariis cōstant. Si verō per hæc nō curetur affectio ipsa, invēta sunt à medicis pharmacum sub lingua tenenda, ob idque hypoglossides appellata. Quæ eadem facultate cū arteriā cis vocatis prædita, ex vino Theræo, gummi, tragacantha, & glycyrrhizæ cōstantur: quæ lavigat quidē reprimuntque oēs asperitates, quicquid verō reliqui est ex inflammatione, cōcoquunt, & citro perferant. Qui autem pharmacū linguæ subder, patiens sit laboris oportet, ut ipsum paulatim liquefcens, in laryngē excipiat, renitens interim tūsi, si qua excitari videatur. Impossibile tamē est, ut hi clara vocē elidant, citra usum pharmacorū absque acrimonia extergentiū: qualia sūt faba fresa elixa, ptisana, ac semen lini torrefactū. His magis detergunt resina terebinthina, thūsque, ac despumatum mel, & amygdalæ amaræ: quemadmodum istis rursus fortiora sunt farina crui, semē hormini, radix iridis, panacisque. Cete-

rūm his omnib. vina mollia, & passum Creticū, & Theræum, & Scybelites, & sapa, & decoctū caricarū, cōveniunt. Est autem ab affectionis principio, usque ad finem ejusdē, paulatim progrediendum à levissimis tū cibis, tum medicamentis, ad ea quæ discutiāt detergentque; vehementius. Igitur primi ordinis sunt tragacantha, gummi, samius aster, amyli, sorbitio ex alica & trago, lac, panes dulciarij, ova sorbilia, sesama, & nuces pineæ, quas strobilos vocāt. Ab his autē deinceps est butyrū, & glycyrrhizæ decoctū: id quod præstiterit ad sapā ex musto, vel ad Creticū passum miscere, rursusque coquere. Hæc itaque in affectionib. inflāmatas circa arteriā atque laryngem ortis cōmoda in principio sunt, donec moderata inflammatio fiat: ac præ omnib. à vini potu hoc tempore abstinentum est. Quum verō moderatior facta inflammatio fuerit, vinum dulce Theræum, aut Scybelite bibere licet: quo tempore etiā butyrū est aptum, & sorbitio ex amygdalis, necnō ex lacte & melle diutius coctis, amyloque injecto, aut filigine. Quæ sanē victus ratione inflāmatio quidē ipsa sedatur: relinquitur tamē humiditas multa, ob quā impossibile est clarā vocem proferri. Quare transire tunc convenit ab his edulis, ad omnia ex melle cocta, & ad fabā fresam elixā, & ptisanā, & brassicā, & porrum probè coctum. Si militer etiā pharmacorum usus idoneus est, quo tempore inflāmatio aut aspredo præcellunt, eorum quæ detinentur sub lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia exhibemus: idque gradatim facimus, donec ad ea quæ acredinis nonnihil fortiuntur, perveniamus. Deinceps igitur ex arteriacis quæ à veteribus prodita sunt eligens præstantiora, huic methodo adjiciā: quæ quidē nec discernere, nec ijs probè uti poterit, qui in cōmentariis simplicium medicamentorum accuratē non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

Thuris, myrrhæ, croci, sing. drach. j. scillæ drach. ij. prassi Cretici sextar. iij. Scilla in passo coquitur, donec inspissetur passum: dein scilla abjecta, in sparguntur reliqua: sitque electio, hoc est, delingibile pharmacum.

Alia arteriaca confectio.

Aloës sextātem: croci unc. j. mastiches tātundem. Conficito. Solvit enim alvum, cōcoquitque (croci ratione) ea, quorum gratia exhibetur.

Alia leniens exasperata, concoquensque & extergens.

Thuris, succi glycyrrhizæ, sing. unc. j. tragacanthæ drach. vj. nardi drachmā j. myrrhæ amomi, croci sing. drach. iij. mellis Attici quod sit satis. Conficito.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & oēs inveteratos pulmonis & thoracis affectus. Cinnamomi, thuris, utriusque unc. j. succi glycyrrhizæ, myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indicæ, amomi, sing. drach. iij. croci drach. j. Melle Attico excipito. Alia ad arteriā affectū, ulcera pulmonis, puris & sanguinis rejections, fluxionesque in thoracē, & ad ea quæ ægrè educi possunt vehementer efficax. Resinæ terebinthinæ, croci Cilicij, thuris, myrrhæ Troglodyticæ, cinnamomi, amomi, nuci pineæ, glycyrrhizæ absque medulla, asteris samij, chalbani, costi, singul. drach. iij. nardi Sy-

Voci autē impedita, aut rauca, ob inflammationes circa laryngem, aut asperam arteriā oboritur, quæ medicina ratione cōveniat.

Arteriaca, hoc est, ad affectum organorum vocis & respirationis congruentia, pharmacum Andromachi.

Tabidos, id est, riacum optatum.

Hamopteicā arteriaca confectio.

riacæ drac. ij. s. casia nigre drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnis, sing. drach. iij. Mellis Attici heminas iij. Confito.

Hypoglottides, hoc est, orbiculi sub lingua tenendi, ad aspredines gutturis, interceptā vocem, & sanguinem rejectantes. Tragacanthæ drac. vj. gummi drach. v. thuris drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j. obol. ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ drach. j. obol. iij. aut rad. drach. ij. s. piperis albi grana xxv. palmularum pinguium carnis drach. iij. Tragacantham passo maceratā & tritam reliquis tritis cōmittito, fingitoq; catapotia magnitudine fabæ.

*Hydriopis re-
centi optimū
medicamen.*

Arteriace delingibilis, ad tabescētes, purulentos, atq; hydropas incipientes, & tussis inveteratas cōgruens. Datur per diem & noctē cochlearii mēsurā. Succī seillæ sext. iij. passi Cretici sext. iij. vini Falerni sext. viij. mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientē: croci, thuris, utriusq; sextantē: aristolochiæ oblōgæ minam j. s. glycyrrhizæ minam unam: radicis eryngii sextantē: casie, nardi Celticæ, singul. un. j. xylobalsami bessem. Lignosa illa contusa in vino macerato per triduū, dein ad lentū ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retrimentis abjectis, passum, mel, & scillæ succum cōjicito, & ad mellis crassitudinem coqto. Crocum verò, thus, & myrrham, cum vino terito, atq; ubi optimē habuerit pharmacū, addito: postquā verò fuerint modicē fusa, ab igne tollito, & reponito ad usum.

§ *Alia arteriaca media, medijs congruens arteriæ affectibus.*

Croci, uvæ passæ exacinatae, utriusq; drach. j. amygd. dulcium drach. viij. myrrhæ obolos iij. tragacanthæ drach. iij. piperis albi obolos iij. mello cocto excipiantur.

§ *Critonis arteriaca, ad vocem interceptam.*

Voci intercepta arteriaca Critonis.

Ficum & eryngium probē coquito, & ad decoctum ipsorū gummi addito, ut melle durior confectio fiat: exhibetoq; ad noctem.

Ulcibus aurium pudendiq; medicamentum.

Alia ejusdē, faciens ad affectus arteriæ, & ulceratum aurium, tum etiam pudendi. Thuris obolos iij. myrrhæ drach. ij. passi cyathos iij. Passum ad mellis spissitudinem coquito: dein myrrham & thus cū passo semicocto ablato, misce-to. Facit etiam ad dysentericos & cœliacos. Rectissime autem fecerit, qui arteriacas concoquētes atq; lenientes, in duplici vase coxerit: nempe vasculum quod coquendum pharmacum continet, in aliud plenum aquæ ferventis imponens.

Coquenda esse arteriaca lenientia in duplici vase, & quomodo. Diacodyon Critonis.

Confectio Critonis ex capitibus papaveris, diacodyon dicta, ad affectus organorum respirationis conducens. Capita papaveris agrestis octingenta: aquæ sextarios lxxx. Coquito ad tertias, hoc est, donec flaccida appareāt: atq; expressis addito mellis lib. x. Si verò variā efficere vis, adde croci, myrrhæ, succi hypocistidis, singul. drach. xij. thuris drach. vj. acaciæ drach. xij. Optima tamen est simplicissima.

§ *De usu confectiois ex papaveris capitibus.*

Diacodyon, hoc est, ex capitibus papaveris confectum medicamentum, quibus conveniat.

Usum eius est in ijs qui somno opus habēt: quibus etiam ex opio confecta sæpe exhibere cogimur. Opus habent maximē huiusmodi pharmacis ij. quib. tenuis fluxus à capite ad asperā arteriā destillat, nō pmittens dormire ob cōsequen-

tē tussim. In talib. ego etiā ex sapa, hoc est, hepse mate, sive musto cocto, quod etiā sirāon vocāt, pharmaci cōpositionem parare soleo. Quin & per passum aut Theriū Creticū melius est q̄ per mel cocturā fieri, ubi fluxus valde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendum tunc est quum tenues fluxiones augeat, facultate tenuandi præditum. Admiscetur etiam huiusmodi pharmacū glycyrrhiza, ita ut simul cū ipso coquatur. Si verò in pulmone consistat copia humoris delapsi à capite, cōfectio ex melle est præstantior. Datur cōmoderata mensura duorum cochleariorū satis magnorum copia. Augebis autē & minues hanc copiam, respiciens ad magnitudinē corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim his frigidioribus minimū dabis, calidioribus amplius.

Mellis usum fugiendum esse, ubi tenuis fluxus à capite ad asperā arteriam delapsus: recipiendum autem duntaxat Diacodyon medicamentum utendum.

§ *Arteriace ab Asclepiade scriptæ.*

Brassica succum melle coctum lingendū exhibe. Alia. Cremoris eryngij in aqua cocti, heminas ij. Cremoris caricarū similiter coctum, tantundē. His adde gummi subtilissimē dissoluti drac. viij. coquito diligenter ad arteriacā spissitudinem, & inde cubitum ituris ad cyathi mēsuram lingendum dato. Alia. Chalbanī drach. vj. piperis drach. j. nitri tantundem, mellis Attici cyathos vj. Chalbanum & mel coquito, densatq; adjicito cæteris, utitorq; Alia insignis. Croci, myrrhæ succi glycyrrhizæ, thuris casie, sing. drach. j. piperis grana xxiiij. passi Cretici sext. iij. mellis Attici cyathos vj. utere.

Arteriace medicamentum ab Asclepiade relictum.

§ *Hypoglossis Dioscorida.*

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drac. j. nuces pineas repurgatas, contusasq; numero. lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle decocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenenda.

Hypoglossis hoc est, medicamentum sub lingua tenendum, Dioscorida.

§ *Alia Mithridatis.*

Myrrhæ, croci, utriusq; drach. iij. nardi Indicæ, terebinthinæ, utriusq; drach. ij. thuris, casie, cinamomi, sing. drach. j. passi Cretici heminas iij. Passum & terebinthinā ad perfectā compagem coquito, & cum siccis cōmittito, indeq; ad nucis ponticæ magnitudinē sub lingua tenendū dato.

Hypoglossis Mithridatis.

§ *Alia mirifice faciens ad affectiones thoracis.*

Farinæ fabacæ tostæ hem. j. iridis Illyricæ quadrantē, nucum pinearū tostorum sextantē, pulegij aridi cōtusi sesquidrachmam: seminis urticæ drac. j. piperis unc. s. Mellis boni sext. ij. Farinā cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiā tusti, tosti & cribrati heminam unā in promptu habeto, cum cæterisq; adjicito.

Hypoglossis variæ, multiq; usum.

§ *Alia ad tussim & spiritus prolationem, valde probē expurgans.*

Hyssopi, pulegij, utriusq; sextantē: iridis, sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. unc. j. tusa & cribrata, melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura.

§ *Confectio ex marrubio Platonis.*

Myrrhæ, styracis, opij, succi, marrubij chalbanī, croci, equales partes. Utere melle cocto exceptis.

Marrubio constans medicamentum Harmonia dictum medicamentum destillatum ad peti conferens.

§ *Pharmacum Harmonia dictū, ad destillationem, insuperabilem q; defluxum conducens.* Styracis, castorij, piperis, cardamomi, singulorum drach. iij. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, sing. drach. iij. passo excepto in catapotia redu-

cito,

cito, datoq; ciceris magnitudine ad somnum.

rofia
roma-
obribus
entibus
rcutius
rens.
Medicamen Andromachi, Ambrosia dictū,
ad phthificos & febres repetentes per circuitus,
Nardi, croci, myrrhæ, colli, casia, cinnamomi,
junci rotundi odorati, piperis nigri & albi, casto-
rii, chalbani, terebinthinæ, styracis, succi papave-
ris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacanthæ
drach. vj. anisi, sem. lini, sing. drach. j. mellis quod
sit satis: vini Falerni heminam. Tragacantham
vino sufficienti macerato, & reliqua simul cum
melle cōmittito. Datur febrientibus sesquidra-
chma ex aqua mulsa: febre carentibus uncia di-
midia cum melle & aceti cochleario uno, & vi-
ni Falerni cyathis duobus.

¶ Aliud ad omnem tussim.

Anisi drach. ij. costi obolos iij. myrrhæ, castorii,
chalbani, piperis alibi, sem. hyoscyami, opii, suc-
ci glycyrrhizæ, sing. drach. j. passo excipito, redigi
toq; in catapotia, ciceris magnitudine.

¶ Aliud ad omnem tussim, & fluxio-
nem, & abscessus internos.

omni-
medica
optimū.
Sagapeni, & gētiænæ, myrrhæ, opopanax, pipe-
ris albi, sing. drach. ij. baccharū lauri mund. drach.
iiij. trita, & aqua excepta, exhibeto ad græcæ ma-
gnitudinem fabæ: ischiadicis tamen paulò plus,
ex vini diluti cyathis tribus.

¶ De reiectione sanguinis.

moptoico-
a curatio
curatio
orum a
bus fiat.
utatio
orum &
um a qui-
fiat.
nutritio
orum a
bus fiat.
tributio-
ratione
scera-
ngentib;
edicamen-
contraria
positioni
moptoica.
upefacien-
a medica-
enta qua
utione phar-
acis con-
nentibus
d sanguinis
reiectiones
isecantur.
In reiectione sanguinis primū periculū est,
ne immoderata eius vacuatio fiat. Ubi verò sup-
pressus est, curatio eius quidē, quæ ex refectione
osculi alicujus vasis contigit, per obturationē sit
osculi dilatati: eius verò quæ ex vasis ruptura, p
conglutinationem eiusdem: quemadmodū eius
quæ ex erosione, per osorū renutritionem. Ob-
turatur igitur osculum resecratum, per astringen-
tia: conglutinatur autem ruptum, per eadem, &
quæcunq; ipsis in compositione miscentur, citra
mordacitatem resiccantia, & glutinosum quid-
dam habentia, velut est Lemnia terra, & Samius
aster. Renutriūtur corrofa per cibos boni succi,
& pharmaca carnem gignentia. Igitur juxta pri-
mam rationem, ex talibus pharmaca cōponun-
tur congruentia ad curandam sanguinis ejectionem:
juxta secundā verò, in ijs qui ex pulmone,
aut thorace, aut arteria, aut larynge rejectāt san-
guinem, miscentur prædictis cōgruenti mēsurā
calida & tenuiū partiū medicamenta, quæ infe-
stissima sunt tribus illis affectionibus dictis: mi-
scentur inquā gratia distributionis, ut videlicet
astringentibus medicamētis præparēt, ac veluti
sternāt viā. At quum ex locis circa stomachum,
aut alvū, aut aliquod intestinū, sanguis educit,
hujusmodi pharmacorū mistura nō est opus. In
festissimū tamē his est id genus pharmacorum,
quod in tantū refrigerat, ut affectū stupefaciat:
quamvis & hæc misceātur medicamētis ad san-
guinis reiectiones cōgruentibus: quū altiorē
somnia conciliant, & cōmodissima sint ijs qui
tussi lancinantur, sistētia nimirū sanguinē qui
ad vas affectum defertur: atq; hoc per suā frigi-
ditatem, Atq; hi sanē sunt compositionis scopi.

¶ Quæ ab Andromacho ad sanguinis reie-
ctionem scripta sunt.

hemoptoicis
remedia ab
androma-
cho scripta.
Acaciæ drach. iiij. rosarum siccarum, balaustii,
sing. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ,
drach. j. cum aqua pastillos facito, quorū singuli

pendeant drachmā unam. Dato ex aqua pluvia:
habet enim vim astringendī. Aliud listens san-
guinem. Croci Cilicij, myrrhæ, iridis, nardi Indi-
cæ, thuris acaciæ, sing. unc. j. succi papaveris, co-
sti, piperis. sing. unc. s. rosarū siccarū trientē. Mel-
le excipito. Datur fabæ Ægyptiæ magnitudo.

Aliud. Succu hypocistidos, balaustij, acaciæ,
gallæ, cytinorū, sing. drach. xij. succis papaveris
drach. vj. croci tantundem. Redigito in triobola-
res pastillos. Aliud egregium. Balaustij, acaciæ,
opij, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hy-
pocistidos, florum rosarū, seminis hyoscyami,
singul. drach. iiij. thuris drach. iij. excipito succo
polygomi.

¶ Aliud ad hæmoptoicos & dysentericos.

Floris rosarū, opij, acatiæ, gummi, balaustij
hypocistidos, sing. quadrantē: gallæ unc. j. semi-
nis plantaginis, ejusdemq; succi, utriusq; sextā-
tem: lycij Indici, succi rosarum, utriusq; unc. j. re-
digito in pastillos drachmales.

Dysenteria
remedium.

¶ Quæ Asclepiades ad sanguinis reiectionem
scripserit.

Radicis polygonij manipulū: rad. symphyti
tantundem: rhois rubri acetabulum: aquæ sexta-
rios iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris
cyathū unum dato, cum gummi tenuissimē tri-
ti & dissoluti drachma una. Aliud. Mororū ru-
brorum nōdum maturorū lib. xvj. aquæ pluvie
sextarios xvj. coquito ad tertias, & expressum li-
quorem reponito. Idē licebit facere etiā de cor-
ni fructu. Aliud. Balaustij terræ Samiæ, corticis
thuris, gummi, singulorū æquale pondus. Trita
& cribrata exhibe cochlearis mēsurā in aquæ fri-
gidæ cyatho uno. Aliud. Succu hypocistidos,
succu acaciæ, succu rhois Syriaci, balaustii, opij,
gummi sing. drach. iiij. Vini myrtitis quod satis
est. Conficito, & utitor.

Hæmoptoicis
remedia ab
Asclepiade
scripta.

¶ Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diuturnæ
& recenti tussi, phthificis, sanguinē rejiciētibus,
purulentis, cœliacis, dysentericis, & inflatis cō-
ferens. Psylli mundi drach. xlv. iridis Illyricæ
mastiches, ramentorū succini, croci, sing. drach.
xxx. opij drach. xv. Psyllium in aquam calidā cō-
jectum macerari finito. Ubi verò suo glutine &
mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorē ex-
primito, & cum eo pharmacum in pastillos co-
gito: ex quibus obolos tres ad somnū dato. Sint
autem aquæ sextarij terni.

Pastillorum
ex succino
Confectio,
quos Barba-
ri trochiscos
de Chiraba
appellant.

¶ Pastillus ex corallio.

Corallij, terræ Samiæ, utriusq; drach. viij. Balau-
stiorum amyli, terræ Lemnij, sing. drach. iiij. se-
minis hyoscyami albi, opij hypocistidis. singul.
drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogeq; in pa-
stillos, & exhibe.

Pastillus ex
corallio.

Cōfectiones sedantes dolorē, tabescentib. &
sanguinē rejectātibus, internorumq; affectibus
cōmodæ, ab Andromacho scriptæ. Radicis pa-
naxis, seminis dauci castorij, sem. hyoscyami, o-
piij. sing. drach. iiij. Mellis quod sit satis. Dantur
oboli quatuor cum aquæ cyathis tribus.

Anodyna
Androma-
chi, ad affe-
ctus organo-
rum respira-
tionis, aliā-
que internas
dispositiones
congruentiā.

¶ Alia sedans dolorem, valens ad tormi-
na & dysenterias.

Sem. apij drach. ij. anisi drach. j. piperis albi ta-
tundē: myrrhæ, castorij, utriusq; obolos iiij. opij
croci, sing. obolos iij. gentianæ drach. ij. Pastillos
triobolares conficito, varieq; utitor.

¶ Aliud

¶ *Alia jucunda appellata.*

Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chiæ, sing. drach. xxx. psylli drach. xlv. succi papaveris drach. xv. cum aqua pluvia pastillos, quorum singuli pendeant drach. j. s. conficito, & exhibeto. Psyllium tamen per diem ac noctem aqua pluviali macerato: dein coquito, & exprimito, cremoremq; cum aliis misceto.

Alia dolorem sedans ad omnes internos affectus & sanguinis rejectiones, undecumq; erumpat. Facit & ad nephriticos & hepaticos. Hæc ne prius dederis, quam mercedem accipias. Cinnamomi, casia, utriusq; drach. ij. myrrha, piperis utriusq; chalbani, sing. drach. j. opii drach. ij. Trita cum melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudine fabæ, partim quantitate araci. Dato juxta cuiusq; vires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

¶ *Alia ad eadem, Mysterium dicta.*

Croci, costi, castorii, asari, sem. hyoscyami, opii, styracis, sing. drach. j. Excipito melle utitorq; 20

¶ *Anodyna ad easdem affectiones ab Asclepiade scripta.*

Anodyna ad internos affectus ab Asclepiade scripta

Seminis cucumeris hortensis decorticati drach. viij. amyli drach. iiij. sem. lini, sem. papaveris albi, utriusq; drach. ij. Tusa & cribrata excipe tragacanthæ cremore, & in drachmales pastillos redige. Dantur oboli iiij. non febrientibus quidem, ex vino: febrientibus verò, ex succo rhois. Faciunt ad fluxiones thoracis.

Panchrestos Asclepiadis multis usus ad varios internorum affectus.

Cōfectio Panchrestus dicta, hoc est, multi usus, ad tussim antiquam, purulentos, orthopnoicos, tabescentes, ad omnesq; inflationes. Pellit secundas & menses, medeturq; vesicæ affectibus. Te rebinthinæ drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ, drach. v. croci, iridis, chalbani, sing. drach. iiij. Seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, sing. drach. ij. piperis, spumæ nitri, utriusq; drach. j. passo excipito.

Antidotum Aristarchi admiranda.

¶ Antidotum Aristarchi admiranda, cōferens ad affectiones prædictas, renitensq; venenis, exterminansq; febres repetentes per circuitus, una hora ante exacerbationem exhibita. Cinnamomi, costi, chalbani, castorii, succi papaveris, piperis nigri & longi, styracis, sing. unc. j. mellis sextarium unum. Arida teruntur & cribrantur. Chalbanum coquitur cum melle: excolatis verò reliqua adduntur, reponunturq; in vitream pyxidem, argenteamve. Datur fabæ Egyptiæ magnitudine, cum aqua mulsa cyathis duobus, instillatis digito guttis aceti novæ.

¶ *De orthopnoea.*

Asthmatici cur sic dicantur. Orthopnoici cur sic dicantur.

Orthopnoea causa.

Purulentis.

Peripneumonicis. Respiratio- nis organorum angustiam quæ efficere possint.

Qui citra febrem dense respirant, ob symptoma id dicuntur asthmatici, hoc est, anhelosi. Eodem etiã ob symptoma aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spirare cogatur, metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quam pro usu respirationis, etiamsi thorax ipsis plurimum dilatetur. Ex quo manifestum fit, internam capacitatem coarctatam ipsis esse præter naturam: id quæ gri etiã haud obscuro sensu perceptat. Fit etenim et purulentis locorum coarctatio, ob collectum inter thoracem & pulmones humorem. Fit etiã peripneumonicis, ob pulmonis inflammationem. Restant autem adhuc affectiones duæ, quæ angustiam locorum faciunt in viis per quas aer inspiratur: quum aut humorum crassorum & viscidorum multitudo pulmonis bronchiis fuerit impacta, aut tu-

mor abscessui similis in ipso constitit. Ceterum curatio ambarum affectionum aliquid commune habet, aliquid privatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem utrisq; est, ut absumatur redundans humoris affectiones gignētis: proprium, affectioni quidem viscidorum humorum, ut per attenuantia & extergentia pharmaca dissipentur: ei verò quæ propter tumorem accidit, ut per attenuantia & exiccantia eadem consumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus communis existit. Vini itaq; potus ambabus competit. Omnis autem potus modicus sit in iis qui alibi abscessum habet: multus contra, in illis quibus viscidis & crassis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca ejusmodi repurgantia humores, tussis necessario excitant: non verò facile per sputum rejicitur, quod expurgatum est, nimium ob crassitudinem: quapropter humectatione multa opus habet, quo efferatur facile.

¶ *Quæ scripserit Asclepiades ad dyspnoicos.*

Scillæ crudæ succo exprimito, eiq; parem Atticis mellis mensuram addito, & ad prunas admotas cogito. Dato inde & ante & post cibum mystri mensuram. Aliud. Origani drach. viij. comæ thymi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, sing. tantundem. Cribrata melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinem. Aliud. Uvæ passæ Rhodiæ, exacinatæ, acetabulum: scenigræci loti tantundem: aqua pluvia sextarium j. Coquito donec dissolvantur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assidue, & juxta singulas irritationes, cyathi mensuram calfactam. Aliud. Anisi, sulfuris vivi, utriusq; quadrantem: ammoniaci thymiamatis, castorij, melanthij, singul. drach. iiij. aqua diluta in catapotia cogito, unumq; in aceti mulsi cyathis tribus ppinato. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, quibus pulmonis bronchia crassis & viscidis humoribus sunt referta. At verò abscessus qui attenuantibus & resiccantibus opus habet, maxime gaudent aromatum facultatibus, quæ & tenuium partium sunt, & resiccatoriæ, præter hoc quod calfaciunt. Porro iis qui proprie orthopnoici & asthmatici nominantur, pharmaca conveniunt secantia citra calfactionem: ob id juvantur maxime ab scillitico aceto, necnon ab scilla, & ab aceto mulso eodemq; scillitico. Quemadmodum autem in hac affectione vehementer cavendum est, ne calfaciamus, propterea quod viscidis & crassis succis non modo non juvantur, sed offenduntur etiam usu calfacientium: eodem modo quæ valde refrigerant sunt omnino vitanda.

¶ *Quæ pharmaca scripserit ad eiusmodi affectiones Andromachus.*

Ad dyspnoiam. Sulfuris vivi drach. j. Semi. rutæ sylvestris tantundem: aristolochiæ, absinthij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, sing. drach. iiij. trita cum aceto in catapotia fabarum instar redigito. Dato mane tria: & vesperi totidem. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, abrotoni, sing. drach. ij. sulfuris vivi drach. j. formato cum aqua pastillos, & cum aqua mulsa cyathis tribus præbeto. Aliud. Scillæ, sulfuris vivi, bituminis, sing. partem unam. Dantur. oboli iiij. in aceto mulso.

Potius esse debere modicum suum quibus organa respirationis ab aliquo tumore angustantur: contra multum illis quibus bronchia a crassis & viscidis succis obstruuntur. Dyspnoea remedia ab Asclepiade scripta.

Scillitico acetum orthopnoicis & asthmaticis maxime opitulatur.

Dyspnoea remedia Andromachi.

GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VIII.

De pharmacis congruentibus ori ventriculi.

Porro difficillimum est, ad veritatem eos revocare, qui sese alicui sectae serviliter addixerunt. At qui prudentes sunt, veritatisque ardenti desiderio tenentur, iis (ut spero) custodient ea quae a natura nobis veluti iudicandi instrumenta concessa sunt, ad actionum vitae cognitionem. Experientia nempe & rationem quorum semper alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsa opinioniones animos hominum praecipuantes, non solum surdos, sed adeo etiam caecos efficiunt, ut videre ne queant, quae ab aliis conspiciuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex iis qui sese Methodicos jactant, per pharmaca relaxantia curantes inflammationes oris ventriculi & hepatis (quae miscellam astringentium desiderant) aegros omnes ad unum occidant, atque in exitium adigant. Quippe nisi facultatem quae firmitudinem addat, in illarum partium affectibus ad relaxantia permisceas, vita in discrimine vocatur. Igitur astringentia omnia quae ad illarum partium affectus, partim emplastris atque ceratis mista adhibentur extrinsecus, partim intus vorantur, impraesentiarum ea ipsis indicabo, auspiciatus ab iis quae conveniunt inflammationibus: quod maxime in ipsis aegri periclitentur. **CERATUM** ergo quo assidue utor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & unguento nardino constat. Ceterum ad unciam unam mensuralem nardini olei, hyeme quidem octo, aestate autem septem cerae partes induntur. Liquatis igitur in duplici vase, refrigeratisque & deralis, addes aloes & mastiches, reductorum in pollinem, utriusque drach. j. & quandoque plus, sic tamen ut ad sesquidrachmam non pergradiaris. Quod si ampliori opus sit astringentia, nimirum tanta imbecillitate existente, ut ventriculus retinere cibos non possit, addes drachmam unam omphacilidis: id quod primo injici debet in cerati praeparatione. Similiter licebit absinthii succum miscere, quandoque etiam ambo: sicuti & tertium hypocistidis, & quartum cenanthes. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, juxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At in veteratis atque induratis inflammationibus, magis varia conveniunt pharmaca, & quae ex aromatis quippiam habeant, non nihilque etiam emollientium atque digerentium sortiantur: cuiusmodi est quod ex meliloto conficitur, congruens omnibus juxta praecordia inflammatis. Porro os ventriculi, nonnulli hodie communiter stomachum nominant: quam partem olim frequentius cardiam, hoc est, cor, appellabant: unde vox cardialgia est deducta, quae minime quidem cordis, sed oris ventriculi dolorem & mordicationem significat. Fiant quippe in ipso tum morsus, tum in explebilis fames, ut interdum etiam nauseosae dispositiones: in quibus omnibus communis quidam astringentium pharmacorum usus inventus est: admista autem sunt plerisque ipsorum calfacientia simul & resiccantia. Verum affectus in profundo sitos

ut cognoscamus, maximis utamur coniecturis est opus: ob idque utilissima Medicae artis pars est, quae cognitionem ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singulis partibus intemperantiae corporis: atque haec omnes aut secundum solas nudas qualitates gignantur, aut accedente alicuius humoris complexu: certe earum singulae per contrarias qualitates sunt reducendae ad mediocritatem. Quia vero plurimae intemperaturae hominibus ex redundantia humorum, magis quam ex inopia fiunt, pharmaca resiccantia plerisque magis juvant. Quum autem resiccantia ipsa partim quidem astringant, cogendo astringendoque substantiam eorum quae contingunt: partim vero discutiant, & in hoc substantiam eorum dissolvant: ob hoc ipsum sane plures sunt qui astringentibus indigent. Verum si humida intemperies coeat cum frigidityte, laeduntur qui per sola astringentia curantur, quae frigidae facultatis existunt. Quare merito plurima pharmaca per experientiam inventa, ex miscellanea materia constituuntur, astringente videlicet atque calfaciente: quorum omnium differentiam cognoscas, si simplicium pharmacorum facultates memoria tenueris.

De Confectionibus stomachicis Andromachi.

Hiera ad stomachicos. Floris junci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indicae, asari, cinnamomi, singulorum drachmas vii, aloes lotae drach. centum. Simul trita reponere, praebereque jejunis cochlearia ii. Sunt tamen qui ad aloes drachmas centum, singulorum aliorum octo drachmas adjiciant. Non desunt qui absque flore junci odorati conficiant. Porro ad ventris subductionem illota aloë est aptior: elota autem multum de medicamento vi amittit: quam etiam febricitantibus dare aliquis possit, si febris sit valde mitis. Infestissima autem est aloë, vel lota, iis qui citra vitiosos succos intemperie affliguntur calida & sicca. Proximam ab his cladem percipiunt, qui siccam intemperiem habent vel frigidityti etiam implicam: & in universum, qui ex sola qualitate periculam aliquam affectam ac laesam possident. Etenim intemperantiae in humoribus consistentes, pharmacis ipsas evacuantibus egent: quae vero absque his infestant, penitus commigrant in tabem, ob pharmaci huius ex aloë constantis exhibitionem. At ubi vitiosa humiditas pererrat ventriculi tunicas, hiera ex aloë est utilis. Omnino autem sic affectis plus aut minus adsunt nausae quaedam symptomata. Jam vero purgatio quam aloë molitur, imbecillior est, quam ut universum corpus purgare queat. Addit illi mastiche, ut vires eius refringat, ventriculo existens etiam grata, & odora. Cinnamomum vero, quum ob easdem causas, tum etiam ut partium suarum tenuitate aperire ventris meatus possit, extergereque atque attenuare, si quid viscosum aut crassum in humoribus insit. Crassos quippe succos ob purgatoriae facultatis imbecillitatem aloë trahere non potest. Quapropter biliosarum ventris dispositionum optimum pharmacum est. Ad haec cinnamomum vim obtinet alteratricem vitiosorum humorum, in id quod naturae modo respondet. Scire itaque licet, eas dispositiones quae a pravis succis circa ventrem stomachumque oboriuntur, maxime per medicamenta ex aloë juvari: mirum autem in

Affectus in

terti ut cognoscantur,

opus est con-

iecturis.

Intemperam-

tia particu-

larum sunt

octo, quae per

contrarias

qualitates

reducere ad

mediocrita-

tem oportet.

Stomachicae

confectiones

Andromachi.

Hiera piera

Varia compo-

sitiones.

Albes lotae et

illota facul-

tas.

Aloë est infes-

tissima in

qui citra vi-

tiosos succos

intemperie

affliguntur

calida & sic-

ca.

Aloës usus,

laborantes

intemperie

citra redun-

dantiam hu-

morum, de-

ducit in tabe-

m.

Hiera piera

quibus utilis

Hiera ex

aloe est infes-

tior, quam

ut totum cor-

pus purgare

possit.

Mastiche & E-

triculo grata

Cinnamomi

facultas.

Aloë biliosarum

dispositio-

num ven-

tris optimis

est medica-

men.

Astringen-

tia esculenta

potulentiaque

maxime le-

dunt disposi-

tiones ventri-

culi a pravis

succis obor-

tat: insunt

autem eas

quae a me-

non

dum lædi, ab eduliis, potionibus, & pharmacis astringentibus. Cōtrā verò, ubi humores non qualitate, sed copia os ventriculi affligerint, utilissimus astringentiū est usus, nimirū languida tunc existente ipsa particula affecta, instar laxatorū articulorum, quod etiam per astringentia affectio corrigitur. Porro polychresta, sive multi usus medicamenta apparantur, quū unum habere viginti affectionibus congruum malumus, quam tot numero alia: quum tamen ad singulas affectiones unum aliquod destinatum, eo quod ad plures paratum est, melius existat.

¶ *Ad stomachicos hiera Antipatri.*

Aloës electæ drach. iij. mastiches drach. ij. asari drach. iij. rosarum siccarum, junci odorati, mei, phu, casia, sing. semunciam. Tritis utitor.

¶ *Stomachica Galli, affectionibus quæ calficari & sicari postulant, utilis.*

Corticis radicis fœniculi lib. s. aceti acris sextarium unum s. aloes quadrantem. Mellis Attici lib. j. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito: atq; ubi coctæ fuerint expressas projicito, & affuso ad acetū melle, simul coquito. Dein aloen inspergito, & cochlearia tria cum aqua dato. Etenim ubi per profundum ventriculi, hoc est, altius, copiosa, sed non prava, fuerit defixa humiditas crassa simul et viscida, opus est mistura pharmaci attenuatorii, perrosivique, quale est tum acetum, tum oxymeli. Si verò nec talis sit humiditas, nec altius imbibita, sola ad curationem astringentia suffecerint. Est autem sufficiens signum frigida affectionis ventriculi, si æger se non sitire percipiat.

¶ *Asclepiadis stomachica, ad roborandū ventriculum, exprimendasq; illius adventitias humiditates congruentia.*

Ad stomachi subversiones. Nucleorum māli punici tusorum succi sextarios iij. succi menthæ sextar j. mellis Attici tantundē. Coquito in fictili vase, assidue agitando: & ubi densata fuerint, ab igne ablata reponito: porrigitoq; mystorū unum, aut duo, ante cibum.

¶ *Confectio ex fructibus, ad stomachi subversionem, cœliacos, & dysentericos faciens.*

Māla cotonea numero x. sorba numero l. mē spila totidem. Rhois rubri sextarium unum. Aquæ congios vij. fructus tusos & in aquam conjectos, diligenter coquito: & ubi dissoluti fuerint, liquorem exprimito, ac rursus coquito. Quum verò tertia pars liquoris super fuerit, addito mellis Attici lib. iij. & ad prunas assidue agitando coquito, ac spissata reponito.

¶ *Catapotia ad subversionem ventriculi.*

Rosarum recentium defectis unguibus, drach. viij. sem. papaveris albi drach. iij. sem. hyoscyami drach. ij. aloes obolos iij. asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigito, præbetoq; ciceris magnitudinem.

¶ *Ad ardorem stomachi catapotium, resinguens sitim.*

Seminis sativi cucumeris drach. viij. sem. portulacæ tantundē: tragacanthæ drach. iij. Tragacanthā ovorum crudorū recentium candido dissolutam, pbē tritis reliquis addito, & ex eis mistis fingito catapotia, quorū assicatorum in umbra sub lingua unum tenendum dato. Hæc Asclepi-

des. In universum aut fugienda ea pharmaca sunt in ventriculi affectibus, quæ chalcanthon, mandragorāve, aut alia id genus recipiunt.

¶ Ad volvulosas stomachi subversiones pastillus Amazonum ab Asclepiade scriptus. Seminis apiij. & anisi, utriusq; drach. vj. absinthij drach. iij. piperis, myrrhæ, opij, castorii, sing. drach. ij. cinnamomi drach. vj. cū aqua pastillos fingito, & summum drachmā unā dato, stomachicis cum protropi diluti cyathis iij. cholericis & vomitentibus cibum, cum frigida: cœliacis & dysentericis cum baccarū myrti decocto: spleneticis cum hydro-melitos cyathis tribus. Ego verò, quod myrrhæ aliquid medicamentosum cōtineat, line illa majoris securitatis gratia hoc pharmacum præparare consuevi, piperis quantitatem adaugens. Porro per ejusmodi volvulosas dispositiones, aliquando stercus per vomitū redditur: ubi videlicet particula affectæ, a serosis medicatisq; humoribus affliguntur magnoperè. Quod si etiā imbecilliores sint, geminat malum. Erit itaq; in iis curatio nis scopus, ut ad affectas partes odorata admoveamus, cujusmodi sunt, anisum, apiū, daucus, cuminum, & fœseli. Nam quemadmodum grave olentia omnia stomachū subvertere solēt, sic odorata corroborare. At absinthiū miscet in præscripto pharmaco, quod habeat vim extergēdi, repurgādi, & subducendi vitiosos stomachi humores: quodq; constringat, & dēset, roburq; affectæ particule addat. Cinnamomū autem foetidis omnibus, putrilaginosiq; humoribus adversatur. Cæterum si cinnamomū non adsit, licebit casiam pro illo assumere.

Alia stomachica Asclepiadis compositio, utilis ardorē sentientibus, & ad intensos singultus, & stomachi volvulosas dispositiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalanorū, rosarum viridiū, mastiches, sing. drach. iij. aloës, asari utriusq; drach. ij. opij drach. j. succo psyllij excipito, atq; ad pastillorum formā reducito, oboloq; tres exhibeto.

Dictum mihi tamē jam est, impossibile esse ut inveniamus pharmacum, ad affectiones multas optimum: multoq; præstantius esse, quod singulis earū destinatur. Porro Hippocrates fieri convulsionē prodidit ex repletionē simul & evacuationē: quemadmodum etiam singultum. Quamquam hic aliquādo excitari citra plenitudinem aut inanitionē solet, ubi ventriculus ab acribus, serosis, medicamentosisq; humoribus mordicatur: quos ubi quis vomitu ejecerit, singultu subito liberatur. Multi etiā devorato pharmaco diarrion pepereon, si vinū insuper bibant, omnino singultiunt. Similiter ex cibo in mordacē qualitatem corrupto, nonnulli singultiūt, confestimq; a vomitu liberantur: ut alij ex rigore oris ventriculi corripuntur singultu. Verum pueros maxime singultire contingit, tum ob alimenti corruptionem in ventre, tum ob partis frigiditatē. In universum autē, vomitus est sufficiens medela eorum, qui ob copia, aut mordicationē singultiunt: ut caliditas, eorum qui ob frigiditatē. Ex medicamentis quæ pharmacum illud cōstituunt, opium, rosæ, & psyllij succus, refrigerant. Spicanardi & chrysobalanus, digerūt & corroborāt. Asarum per urinas deducit vitiosos succos. Aloe pravos humores purgat. Crocus concoquit, & partes

Polychresta, hoc est, multi usus medicamenta, relinquitur ab iis quæ ad singulas affectiones parantur.

Hiera Antipatri faciens ad stomachicos.

Stomachica Galli.

Ventriculi tumores humores crassi altius imbibiti, qualia medicamenta desiderant.

Ventriculi frigidam affectionem significat, prorsus nihil sitire.

Stomachica ab Asclepiade scripta.

Confectio ex fructibus. Asclepiadis, subversioni ventriculi, cœliacis & dysentericis faciens.

Catapotia ad subversionem ventriculi.

Catapotia ad ardorem ventriculi conferentia, si sub lingua teneantur.

Ventriculi affecto fructu esse pharmaca quæ chalcanthon, mandragorāve, recipiuntur.

Myrrhæ non esse medicamentum.

Volvulosas ventris affectiones esse per odorata curandas. Græce volentia subvertunt stomachum. Absinthij facultas. Cinnamomum facultas. Casia licet uti pro cinnamomo.

Pharmacum unum multis affectionibus optimum, recipi non posse. Convulsio non ob repletionem simul & inanitionem. Singultus a quibus causis.

Singultus quæ medelantur.

partes corroborat. Costus calfacit abunde, astringitq; mediocriter. Stupefacientib. miscetur calfacientia, ut eorum malignitatem corrigant, eisq; sint instar vehiculi. Quippe viventiu corpora mortificationi simile quid perpetiuntur ab eoru medicaminum usu, quæ ex opio, hyoscyamo, & mandragora constant, ita ut infestantes causas nō sentiant. Quare multi qui talibus assidue utuntur, particulas ad immedicabilem frigiditatem perducunt.

Descripsit etiam Asclepiades Hieræ compositionem, in hoc ab Andromacho dissidens, quod ille quidem aloës drach. c. ac reliquorum singul. indiderit drach. vj. hic autē octo drachmas scripserit, floremq; junci odorati omiserit, quæ aliis miscuit Andromachus: quodq; non xylobalsamo (ut Andromachus) sed pro illo sit carpobalsamo usus. Confert autem hujuscemodi pharmacum iis qui ob vitiosos humores, & præcipue biliosos, tardè concoquunt. Siquidem quibus bilis altius tunicas ventriculi infestat, ij præstantius pharmacum non invenient. Cuius moderata exhibitio ad quatuor usq; drachmas extenditur. Similiter auxiliatur viscerū jam concoctis inflammationibus. Recte aut hoc pharmacū tardè concoquentibus, aut bilem vomitentibus propinatur ex aqua cyathis quaternis: ut ex aqua mulsa, ad viscerum inclinantes inflammationes: ac deniq; ex vino mulso, dum aut urinas ciere, aut promovere menses est animus. Adverte autem nos appellare drachmā, quod Romani vocant denarium.

Stomachicum dictum Aster inexpugnabile, ab Asclepiade proditum, sedans dolorem, inducens somnum, ac varios affectus sanans. Myrrhæ, styracis, nardi Indicæ, casia fistulæ, terræ Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, singulorum drach. iiij. Croci, succi papaveris. singul. drach. vj. seminis dauci Cretici, anisi, fœselis, seminis apij, sing. drachmas octo. Myrrha, styrax, & opium, vino dissolvuntur odorato, & teruntur: arida verò cribrata miscetur, subigunturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singuli drachmā dimidiam pendeant.

¶ *Quæ scripserit Archigenes ad affectus ventriculi.*

Ubi ructus acidus editur, coriandrum cochlearij mensura edendum ante reliquū cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutū ventriculum absque febre, menthæ ramulū contritum bibendum dato. Aut oenanthen similiter tritam cum nardo Indica bibendam dato. Aut marrubij succū cum melle: & ubi paululū quieverint, vinum cum polenta exhibeto. Aut Chie mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciem jejunis quotidie porrigito. Dolores oris ventriculi lenit, ac maximè iis quibus tristitia aut desperatio accedunt, lac asininū, aut muliebre, aut bubulum, filicibus incoctis, potatum. Si una cum humectatione ventriculi etiā inflammatio adsit, oenāthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo, parum resinæ ustæ habente, imposito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignunt, stomachus inflatio ne tentatur, spongas aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum ipsum imposito. Quod si

tensio adhuc perseveret, alumen liquidum cum atramento futorio trito, melle exceptum imponas. Aut hæc & aloem pari portione mista & myrteo cerato excepta. Aut armentariæ bovis stercus aridum vino incoctum. Aut poli fasciculum coquito, & bibendum dato. Aut calaminthæ decoctū per noctem sub dio expositum, modico melle & piperis drachma admistis, porrigito. Solvit autē dolores cuminum apiumque tosta, si modica portione cum aqua bibantur.

Aut aloes obolos duos, cū vino mulso, aut vino, aut aqua, bibendos dato. Aut abrotoni & thymi, utriusq; obolos duos, ex vino præbe bibendo. Ligaturas insuper extremorū fortiter adhibe, & circa ipsum stomachū cucurbitulis & fometis variis utare. Quod si vehemens sit distensio, etiā venæ sectio efficax erit auxilium, & alvi solutio per glandem supposititiam. Porro eos qui ex ingenti fame linquuntur animo, revocabimus odorem aceti aut pulegii, aut mālīs, aut piris. Excitantur etiā ad carnem suillam assatam, & ad omnia quæ multum alunt, præsertim ea quæ odorosum odorem exhibent. Instaurabis autem ipsos iis quæ confertim vires reficere possunt: cuiusmodi sunt ova sorbilia, bulbi, cochleæ.

At singultientibus rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua mulsa, aut opium, aut castorium, aut abrotonum, aut aristolochiam.

¶ *Medicamen ex cydoniorum succo, sanans medicresoris ventriculi affectus.*

Succi cydoniorum malorum sextarios ij. melis Attici tantundem: aceti fœsiquisextarium, vel sextarium unum. Zingiberis quadrantē: piperis albi unc. j. Arida insperges, ubi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

¶ *Quæ pharmaca Asclepiades scripserit ad affectus oris ventriculi.*

Emplastrum ad subversiones oris ventriculi, doloresq; atq; etiā inflammationes. Oenanthes, drach. j. croci, myrrhæ, floris rosarū, melilori, mastiches, aloes, corticis mandragoræ. singul. drach. iiij. Carnis palmularū quadrante. Omnia cerato ex rosaceo confecto excipito, admove-toque.

¶ *Aliud Nicerati, coeliacis, dysentericisq; admodum generosum.*

Oenanthes unc. ij. rosarū siccarū, mastiches, aloes, gallarum omphacitidum, aluminis rotundi, acaciæ, sing. unc. j. ceræ lib. j. picis brutiæ quadrantem: olei myrtei lib. j. Arida cōmittito liquidis. Aliud ad eadē insigne. Oenanthes, omphacii, gallæ omphacitidis, aluminis scissi, acaciæ, cytinorū mali punici, balaustii, mastiches, sing. unc. j. Vini myrtitis, quantum satis est his subigendis. Carnis phœnicobalanorum fescuncē, exceptis lētiscino cerato utitor. Etenim in his, q̄ sint stomachica, meritō astringentia vis dominatur. At in medicamentis hepaticis relaxantia misceri astringentibus debent: quemadmodum fit in his quæ jam subdā, etiā ab Asclepiade prodita.

¶ *Malagma Nilo inscriptū, faciens ad præcordiorum dolores, dissolvensq; omnem duritiem, spleneticis atq; hepaticis maximè salutare. Cestrammoniacci thymiamatis, olei cyprini, sing.*

Cucurbitulas admodum esse dolentes ventriculo, monet Archigenes. Deliquium animi patientes ex fame insigni, quomodo sint revocandi.

Singultientibus quæ optulerunt.

Dicydonion medicamen.

Oris ventriculi affectibus pharmaca ab Asclepiade scripta.

Stomachica medicamenta debent habere astringentiam si prapollentem Hepatica medicamenta mista esse debent ex astringentibus et relaxantibus.

lib. j. croci semuncia: aceti quod sit satis. Ammoniacum dissolvito, deinde arida adjicito.

¶ Aliud Nili Crocerum, prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam ad erysipelata.

Nili Crocerum

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosacei, sing. lib. j. croci unc. j. aceti quod sit satis. Conficito.

Malagma Hieraticon ex meliloto, Viscerum doloribus accommodatum.

¶ Malagma ex meliloto, Hieraticò dictum, ad viscerum dolores accommodatum. Nardi Celticæ, cyperi, myrrhæ, sing. drachmas x. cardamomi drach. viij. meliloti drac. xl. croci, amomi, utriusq; drach. viij. cypheos sacrificulorum drac. xvj. ammoniaci thymiamatis drac. xl. resinæ terebinthinæ drach. octo: ceræ minam unam: olei cyprini drac. cxx. Vini odorati Italici heminam unam: præpara, & utere.

Malagma Polyarchion.

¶ Malagma Polyarchion, peripnevmonicis, stomachicis, lienosis, hydropicisq; maximè ex usu: faciens etiam ad affectiones circa vesicam aut uterum, ad omnemq; nervorum per consensum affectionem. Ceræ, terebinthinæ, bdellii, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, sing. minam unam: meliloti, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, sing. drach. xxv. olei cyprini heminam j. Vini Italici quod sit satis. Conficito & utitor.

¶ Malagma Andromachi ex meliloto.

Malagma Andromachi ex meliloto.

Nardi Celticæ, cyperi, iridis Illyricæ, myrrhæ, sing. drac. viij. croci drac. iij. meliloti drac. xxv. ammoniaci thymiamatis drac. l. terebinthinæ tantundem: ceræ drach. c. Cyprini heminæ dimidium. Aceti quod sit satis.

¶ De hepatis affectibus & facultatibus.

Pleriq; idiotæ quemadmodum stomachicas, sic hepaticas affectiones, vocant cōplures dispositiones jecinoris, tametsi maximè inter se contrarias, hoc est, sub eodem genere plurimū inter se distantes. Non peccaverit autem quispiam dicens, propemodum omnia contraria eidem esse generi subdita. Cæterum contrariorū notio contingit, ubi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoque genere utrinque distant à mediis extrema. Porro ipsius imbecillitatis jecinoris licebit nobis vicinam assignare dispositionē, ceu causam, nepe intemperiem: quæ quidē quum in octo intemperantias distribuatur, rursus non malè dixerō, intemperiem ipsam non unam, sed octo dispositiones existere. Ad hæc juxta aliā sectionem duæ intemperierum differentiæ sūt, ac juxta aliam tres: dum videlicet aut secundū qualitates tantum alterantur partes affectæ: aut accedente etiam humorum affluxu, qui aut spacia tantum occupent in particulis affectis cōtenta: aut etiam substantiam ipsarum imbuat. Igitur circa ventrem & intestina quidem, una in singulis cavitas est, quæ possit vitiosam humiditatem suscipere: circa hepar autē tot numero sunt, quot habentur arteriæ & venæ. Etenim quū hæ omnes oscula angusta possideant, qua parte hujus visceris sima cum gibbis coeunt, obstructions ab illis vitiosis succis aliquādo oboriuntur, brevi in frigidis intemperaturis ut temporis progressu in calidis: ad quas tandem obturationes putrefactio consequitur. Quum autē hoc viscus tot facultates sortiatur, quot actionum species, contingit sæpe unam ipsarum præcipuè lædi, sæpe

duas & tres, atq; omnes quatuor simul. Est itaq; actio ipsius una quidem, ad se cibum & alimentū attrahere: altera verò, ambire, cōtinereq; do-

Hepatis facultates.

nec alterans ipsum, sui ipsius illud partē efficiat. Atq; hæc sanè dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissima existens, & cui ferè primè debentur partes. Quæ verò juxta hæc alterationem remanent excrementa, ea per excreticē facultatem exterminantur. Ostensum autē est has quatuor facultates, universis, quandiu vivunt, inesse corporis partibus. Vocatur autem alteratio ipsa donec alimentū parti quæ nutritur assimiletur, concoctio. Ubi verò jam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex ventre & intestinis alimentum trahere nō potest, liquida per sedem, & nondum exquisitè exuccata excernuntur: simulq; cruda, si etiam cum hoc viscere ventriculus imbecillus existat. Si verò traxerit quidem alimentum hepar ex ventre simul & intestinis: in sanguinem autem ipsum nequeat convertere, ob facultatis languorē: quemadmodum in ventre multiformis corruptio cōtingit, eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Est enim peior transmutatio in peregrinam qualitatem, juxta cruditatem facta: moderatior verò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem indeptum. At qui & tertia præter has, species frustratæ concoctionis existit, ubi semicoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate dejiciuntur, referunt prorsus aquam, in qua victimæ recens mactatæ carnes ablutæ fuerint. Aucto autē affectu, nihil tale amplius excernitur, sed multiformes aliæ qualitates consistentiæq; expurgantur, veluti à ventre dum cruditate laborat. Calida igitur intemperies si viscus affligat, colliquationes accidunt, primum quidem humorū, dein carnis ipsius hepatis: deiciturq; bilis crassa, graveolens, atque admodum colorata: quemadmodum contingit in pestilentibus febribus. Si verò frigida intemperies præpolleat, neque assiduæ excretiones, neq; multæ fiunt: durat tamē affectus diutius, & per aliquos dies profluit ipsis venter confertim magis: neq; fætor excrementorum similis est iis quæ ex calore sunt liquefacta: neque color aut consistentia similis: verum minus graveolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colliquatæ carnis, habentia. Aliquando verò id quod deicitur, nigrum sanguinem refert: diligēter tamen consideranti, nec sanguis niger est, nec grumus, sed veluti limus quidam sanguinis crassi, qui propè ad atram bilē accedat: in summa, plures, ægreq; judicabiles colores circa huiusmodi affectionē cernuntur in alvi excrementis. Scopus igitur curationis in hujusmodi affectibus, communis quidem fit juxta contrarietatem intemperantiæ: peculiaris autem unicuique, per cuiusque contrarietatem. In universum autem, affectio hepatica peculiariter appellata, veluti etiam cœliaca, stomachicaq; citra tumoris præter naturam circa ipsa: partes ortum, contingit. Siquidem quum citra manifestū aliquod in viscere malum, in actionibus propriis languet, scit hepar, cum agrum vocant hepaticum.

Alteratrix facultas hepatis est inter alias principalissimas.

Quatuor facultates inesse corporis partibus.

Hepatis languida ab intemperie trahuntur symptoma.

Malitia ciborum per cruditatem peregrinam qualitatem esse alimentum.

Hepate imperfecte mactante ablutæ in sanguinem.

Qualitas excrementa excernuntur.

Hepatis intemperiem calidam quæ sequuntur symptoma.

Hepatis frigida intemperie signa & symptoma.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Hepatis intemperantia, per contrarietatem sanandæ esse.

Contraria esse quæ sub eodem genere plurimum inter se dissident. Externa plurimū utrinque distant à mediis in quoque genere. Hepatis imbecillitatis intemperies est octuplex.

Hepatis obstructions fieri quæ parte eius sima cum gibbis coeunt.

¶ Quæpharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

Antidotus cyphoides, ad hepaticos & omnia thoracis vitia. Uvæ passæ carnis drach. xxv. croci drach. j. calami drach. ij. s. bdellii tantundem: cassiæ sesquidrachmam: cinnanomi obolos iij. spicæ nardi drach. iij. floris junci odorati drach. ij. s. myrrhæ, terebinthinæ, sing. drach. iij. ramē totū aspalathi drachmas duas: mellis drachmas xvj. vini quod sit satis. Conficito, Etenim cinnanomum omnes putrilaginosas, virulentasque corrigit facultates, quemadmodū cassia, & post hanc omne aromatum genus. Crocus astringens & cōcoctorium pharmacum, etiam putrefactiones corrigit. Uva passa astringit quidem quantum requirit affectum viscus: habetque vim aliquam cōcoquendi crudos humores, & coercendi maligna, existens etiam secundum totam substantiam jecori familiaris. Quippe ad intemperantias viscerum ea pharmaca optima sunt, quæ præterquamq; intemperiem corrigit, etiā alimentum largiuntur. Quo nomine vinum convenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intemperiem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & cōcoquit, & roborat, & putrefactioni adversatur, & si intemperies ab humiditate & frigidityte proficiscatur, eā citra omnem molestiam, atque tutō persanat. Eadem est & mellis facultas, præterquamq; non condensat substantiam cōtacti corporis: sed pro hoc vim extergendi, & aperiendi, & purros reddendi meatui, urinamq; ciendi, non parva sanè auxilia, possidet. At bdellium sufficienter emollit, concoquitq; necnō moderatē discutit. Cōsimilem fermē vim terebinthina sortitur, supra hoc quod angustos meat⁹ extergit, expurgatq; quibus auxiliis viscus curandum indiget. Siquidem obstructio meatuū solet putrefactiones efficere. Nonnulli autem huiuscemodi pharmacis opium, aut hyoscyamum, aut aliud quippiam refrigeratium miscendo, ad calidas intemperies utilia medicamenta efficiunt: quanquam ex hepatis pharmacis nullum esse debet vehementer refrigerans.

¶ Alia ad hepaticos & ictericos.

Amygdalarum amararum drach. ij. anisi, absinthij, cumini, seminis apiij, sing. drach. j. cornu cervi obolos iij. Trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; unū manē ac vesperi, cum vino mulso dato.

¶ Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ictericos, copiose sudorem promovens.

Croci drach. ij. nardi tantundem: cinnanomi, cassiæ, myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Attico excipito: datur fabæ Aegyptiæ magnitudine: febricitantibus ex aqua mulsa. Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicosq; Auxiliatur etiā molestiis ex partu, & convulsis. Prodest & cōvalescētib⁹: necnō ad humores vitiosos, ictericos, tussientes, pleuriticos, atque ad letalia venena, & ferarum ictus. Nardi Indicæ, costi, utriusq; drach. ij. cassiæ, croci, utriusq; drach. j. piperis albi obol. v. seminis apiij drach. j. obolos iij. iridis Illyricæ tantundē: acori drach. i. obol. j. opobalsami drach.

j. succi ari masculi drach. tres: uvæ passæ exacina tæ drach. vj. Terito cū passo, aut melle excipito, ac drachmam unam cum vino dulci dato, aut cū aquæ mulsæ cyathis iij. Nullum tamen horum medicamentorum calidis intemperaturis convenit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex utrisque compositis.

¶ Confectiones hepatica ab Asclepiade prodita.

Succi cichorii cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus, & mellis Attici cochleari uno, porrigito. Aut filicis, aut seridis succi cyathum unum, cum aquæ mulsæ cyathis trib. dato. Porro cichoriū & seris ex genere cibariorū existunt. Facultas autē ipsorum subfrigida & subamara est, moderatēq; astringens: quarum qualitatū ratione, calidis hepatis intemperantiis summē cōveniunt. Nam ultra hocq; moderatē refrigerant, visceri firmitudinem addunt. Sed nec frigidas intemperies magnoperē lādūt, quemadmodū quæ frigidā humiditatem absq; astrictione aut amantudine possident, facere solent. Jam, ob miscellā mellis, humores per urinas eliciunt. Quare si ficcata & tusa quis potioni inspergat, itidem juvant. Ad visceris autem expurgationem, apertionemq; meatuum, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, filix optimum pharmacum est, amaram qualitatem habens prædominantem.

¶ Catapotion hepatices.

Radicis chamæpityos drach. viij. rad. cichorii drach. iij. contunde, & excipe melle cocto, præbeq; nucis ponticæ magnitudinem: & aquæ calidæ cyathos iij. insuper bibendos dato.

¶ Pastillus hepaticus.

Anisi, sem. apiij, asari, amygd. amar. mūd. absinthij, sing. drach. iij. macerata ex aqua in pastillos redigito, exhibitoq; drachmā unā cū vini diluti cyathis iij. febrientib. tamen cum hydromelite.

¶ Eclegma hepaticum Paulin. auxiliatur confestim.

Chamæpityos siccæ lib. j. myrrhæ unc. j. passi protropi sextarios iij. Chamæpityn & vinū dulce coquito ad tertias. Postea liquorē exprimito, eique mellis Attici librā dimidiā adjicito, ac rursus coqto. Dein verō myrrhā addito assidue agitādo: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystum propinato. Ad hanc cochlearū trium carnē probē tritā, & cū tribus vini nigri cyathis calfactam porrigito. Hæc .n. juxta totā substantiā sunt efficacia, nō secundum unā aut alterā qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachma una lævigata cum vino aliquo dulci, exhibitaq; manifestē hepaticis auxiliatur.

¶ Cōfectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad spleneticos, & ægrē se à morbo recuperātes: necnō ad hydropicos. In universum, probum colorem conciliat. Croci, nardi cassiæ, sing. drach. ij. costi floris junci odorati, cinnanomi, myrrhæ stactæ, sing. drach. j. mellis cocti drach. xxvj. datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum vini mulsi cyathis iij.

Alia eadem cōmoda præstans, ad aliasq; internas affectiones, citra tussim, cōducens. Rad. gentianæ, chamæpityos, marrubii, seminis petroselinij, fellis ursi, sinapis, sem. cucumeris, scolopēdrii panacis, rubricæ sinopicæ, rubiæ, seminis bras-

ficæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, sem. erucæ, eryngii, baccarū juniperi, sem. fraxini, chamædryos, dictamni Cretici, seminis cestri, sem. dauci sing. unc. j. mellis Attici q̄ sit satis. Cōficito. Datur nucis pōticæ magnitudo, ex passi Cretici cyathis duob. Hæc Asclepiades ad indurata viscera. Miscēda tamē in hisce affectib. sunt cum discutientib. etiam mollientia phar-
 ca, quæ præparent indurata corpora, aptaq; prædictis medicamentis excipiendis efficiant. Siqui-
 dem citra præmollitionem diffunduntur quodā-
 modo ea ipsa corpora, & uestigiō manifestā im-
 minutionem habent: sed quod reliquum ex affe-
 ctu est, ubi exiccatū improbē fuerit, immedicabi-
 le pmanet. Cæterū quū hepatis corpus sit cō-
 sistētia humidū, moderatis emollientibus eget.

¶ *Quæ Archigenes scripserit ad hepaticos.*

Unguenti nardini cochlearia iij. quotidie bi-
 benda dato, & maximē in induratis. Aut aristolo-
 chiæ obolos iij. ex aqua quidem, febrientibus: fe-
 bre autem carentibus, ex vino porrigito. Aut fel
 ursinum in vase leniter fervefacito, & in sole as-
 ficcato, atq; ex eo hepaticis cochleare unū dato.

In magna durtia abrotoni succū quam cras-
 sissimum da bibendum. Aut acori obolum unū,
 panacis tantundem, propinato ex aqua. Aut spi-
 cæ nardi decoctū assidue exhibeto. Cataplasma
 hepaticū fit ex malis cotoneis cū farina hordea-
 cea, & fœnogræco concoctis. Aut ex semine lini
 trito cum polenta vino incocta. Aut ex capparis
 radice in aceto mulso pcocta. Aut ex farina hor-
 deacea cum ficibus. Aut ex palmularū carne tu-
 sa, mistaq; pari rosacei cerati portione.

¶ *Malagma Andromachi ad hepaticos.*

Ammoniaci thymiamatis drach. cxliiij. bdel-
 lii drach. xxiiij. aceti hemina iij. Cyprini hemi-
 nam unā. Cōficito.

¶ *Malagma Apollophanis.*

Ceræ drach. lxxx. ammoniaci thymiamatis
 tantundē. Terebinthinæ drach. xl. mannæ thu-
 ris tantundem. Cum irino contudito.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secun- dum loca, Lib. IX.

¶ DE ICTERICIS.

*Ictericia per
marborū in-
dicationes or-
ta, curatio.*

Funt etiā icterici, ratione optimæ judicatio-
 nis in febribus, proriente nimirū ad cutem
 bilioso humore: ac faciliē sanē hi curāt bal-
 neis potabilium aquarū, & olei discussorii affri-
 ctu, omniumq; rarefacientiū cutē: quale est ane-
 thinum oleum, chamæmelinū, atq; cicinū. Post
 hæc etiam unguenta faciunt, gleucinū, & coma-
 genum: dein irinū atq; amaracinū. Verū alias
 confectioes privatim ictericas appellatas, ne
 putes ad hujuscemodi ictericos cōvenire, sed ad
 eos, q̄ vasorū juxta hepar obstructione laborant,
 necnō ad illos qui ex inflammatione icterici fiunt.
 Cæterū qui in regione morbum ex obstructio-
 ne inciderūt, absq; febre permanent. Qui verō ex
 inflammatione, omninō febricitāt. Quæcunq; igitur
 admodū medicametosa existūt, itidēq; facul-
 tate calida, febrientes magnoperē lædunt. Talia
 sunt gentiana, struthion, heleniū, costus, aristolo-
 chia, poliū, cētaurea. Cōveniunt aut ictericis ex

inflammato hepate, quæcunq; sanāt inflammatio-
 nes: quemadmodū etiam iis qui ex obruratione,
 omnia q̄ strenuē extergēt, etiā si medicamento-
 sam substantiā, calidāq; facultatem sortiantur. Si
 verō obstructio simul & inflammatio coeant, la-
 xantibus simulq; extergentibus opus erit.

¶ *Ad ictericos absq; febre, medicamen-
Andromachi.*

In colocynthidis calicem vinum fundito, cal-
 facitoq; & bibendū dato: subducit enim alvum.
 Aliud. Adianti obolos iij. nardi obolos ij. ab-
 sinthij, drach. j. myrrhæ obol. iij. Passo excipito,
 instarq; avellanæ nucis ex aquæ cyathis duobus
 porrigito.

¶ *Asclepiadis remedia ad ictericos.*

Cichorij succi cyathos vj. febrientib. per se da-
 to: febre verō carentibus, cū vini cyathis tribus.

Aliud. Anchusæ tenuissimē trite cochlearia ij.
 cum aqua potabili exhibe. Aliud Nicerati, urinā
 ciens. Cicerum siccorum sextariū j. roris marini
 manipulum: aquæ sextarios vj. fœniculi mani-
 pulum j. rad. asparagorū palustriū manipulum j.
 Decoctū excolatum porrigito assidue, febrienti-
 bus quidem simpliciter, febri aut carentib. ex vi-
 no diluto. Aliud. Asari, absinthij, utriusq; drach.
 viij. seminis anisi, fœniculi, apij, amygdalarum a-
 mararū repurgatarū, sing. drac. iij. Aqua subigi-
 to, atq; pastillos formato, ex quib. drac. j. cū vini
 mulsi cyathis tribus non febrientibus exhibeto.

¶ *Errhinon trahens bilem per nares.*

Nasturtij & roris marini viridiū succum, aut
 elaterium cum lacte muliebri tritum, infundito
 naribus, atq; attrahere jubeto.

¶ *Archigenis remedia ad ictericos.*

Chelidoniæ herbæ succum cū vino aut aqua
 mulsa propina. Vel adiāti, vel rubiæ radice ob-
 los tres, cum aqua mulsa exhibe. Aut fellis ursini
 cyathum bibendū dato. Aut stercoris canini albi
 sextantem, cum mellis quadrante ad triduum
 bibendū dato. Aut adianti, & menthæ, & rubiæ
 parē mensuram in aqua fervefacito, & heminam
 inde bibendam exhibeto, diutius ad solē insola-
 to, sitienti q; & anheloso, quò post acceptum po-
 tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

¶ *Desplenis affectibus.*

Quum autem omnes corporis partes familia-
 rem sibi ipsis ex venis humorē trahāt, lien certē
 id quod veluti fœx sanguinis est, ex qua gignitur
 atra bilis, ad sui alimoniam asciscit: unde hoc vi-
 scus minimo negotio cōtrahere sibi scirrhu est
 natum, sanguine nimirū in venis ipsius obturato,
 & ob crassitudinem nec excerni, nec discuti faci-
 lē potente. Attenuantib. igitur opus habet phar-
 macis, citra manifestā caliditatem, ne impactus
 in ipso succus impingatur vehemētius. Quò ve-
 rò actiones ipsius conserventur, ex austeris aliqd
 eis admiscetur: quale etiā astringentium genus
 existit. Porro quum universæ particulæ, propria
 incolumitatis gratia, certas quasdam facultates
 possideant, attractricem videlicet familiarium,
 ac tum alienorum expultricem, tunc assimilatri-
 cem eorum quæ sibi attraxerunt: aliquibus ipsa-
 rum insuper inest, ut ex accidenti sint universo
 corpori ex usu. Ex horum itaq; est genere lien,
 qui ex hepate ad se veluti limū sanguinis trahit,
 quēadmodū fellis vesica bilē, atq; renes urinam.

Si

*Ictericis q̄
medicamē
conferantur*

*Ictericorum
remedia q̄
ria, à dīse-
sis conscrip-
tis*

*Errhinon
trahens bilem
per nares.*

*Partes singu-
las familia-
re sibi alim-
tum trahere
liem ali-
sanguinis
dimenta.
Lien cur in-
duretur fa-
cile.
Lien affectu
qualia con-
ferant me-
dicamenta.*

*Ictericia ex
obstructione
orta, absq; fe-
bre perman-
et: quod nō
contigit illi
qua ab inflā-
matione du-
cit originem*

Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minimè potes, p. universū corpus vitiosus humor dispergit. Ob id itaq; naturalē ipsius firmitudinem custodire oportet, quō cōveniens sibi alimentū alliciat: per quā actionem universo corpori ad humorū bonitatē conducit, & excrementa genita in ipso demittere in ventrē potest, ut unā cū excrementis alvi excernantur. Igitur hac ratione ipsi valde amara medicamēta exhibemus: quibus miscemus etiam ex austeris nonnulla: sicuti & alia quædā, ceu materiā cōgruentem ad unguentorū & cataplasmatū cōpositionē: cuiusmodi sunt cera, resina, pix, & bitumēn. Nam primaria ratione acetū & oxymeli, visceri cōmoda existūt, utpote secare & attenuare crassos humores valētia, citra calfactionem. Deinceps itaq; eorum pharmacorū mentionem faciam, quæ lieni indurato auxiliantur.

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad spleneticos conscripta. Potio Antipatri.

Carnis myrobalani drac. iij. scolopēdre drac. vj. cort. rad. cap. costi, sing. drac. iij. chamēdryos drac. vj. polii. drach. ij. rad. cotyledonis drac. ij. corymborū hederæ nigræ grana xxv. ammoniaci thymiamatis drac. iij. sem. hyperici drach. ij. chalbanitandem: sem. periclymeni drach. j. aut rad. drach. iij. cardamomi nigri sesquidrach. succi scillæ drac. xvj. Dantur oboli duo in aceto mulso. Aliud stomachicum, spleneticumq; Myrrhæ, nardi Indicæ, cort. rad. capparis, radicis p. n. rad. peucedani, dictamni, cort. rad. periclymeni, sing. drac. iij. costi drac. v. polij. drac. ij. rubiæ drac. iij. s. ammoniaci thymiamatis drac. iij. s. iridis tantundem. Excipito aceto mulso, datoque obolos ij. cum oxymelite.

Pharmaca potabilia ab Asclepiade ad splenem conscripta.

Cynoglossi manipulum cum vini cyathis iij. terito, & expressum liquorem ante cibum bibendum dato. Colligere tamen oportet herbā sinistra manu ante solis exortum. Aliud. Trixaginis manipulū cum vini sextario uno coquito, & expressum liquorē reponito: atq; ex eo cyathos ij. ante cibū dato. Catapotiu spleneticum, Myricæ fructū tusum & cribratū chalbano excipe, in catapotiaq; redige, q exhibebis pro viribus. Pastillus spleneticus. Fructus ericæ drac. iij. piperis albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis, sing. drac. ij. arida tundūtur & cribrātur. Ammoniacū dissolvitur aceto scillitico, & aridis additū in pastillos cogitur, quorū singuli pendeāt drachmā. Daturq; drac. j. ex oxymelitis cyathis trib.

Ephithemata & emplastra eiusdem Asclepiada.

Foliorū tenerrimorū sambuci arboris lib. iij. aloës lib. j. cum aceto subigito, & linteolo infarta admoveo. Vel. Cera, resina pinus, & frictæ, sing. lib. ij. arsenici, aluminis scissi, calcis vivæ, singulorum sextantem: aceti, olei: utriusq; cyathos viij. Conficito & admoveo.

Malagma Antiochidis, ad splēeticos, hydro picos, ischiadicos, arthriticosq; conveniens. Cera lib. iij. resina terebinthinæ tantundem: retinētorū ab expressa myrobolano reliquorū, spumæ nitri, floris lapidis Asij, ammoniaci thymiamatis, sing. lib. j. olei Cyprini lib. iij. aceti q fit

satis ad ammoniacum dissolvendum,

Malagma aurei coloris.

Auripigmenti unc. j. aluminis scissi, calcis vivæ, sing. sextantem. Cera, resina frictæ, & pinus sing. lib. ij. myrrhæ sextantem. Arida increta, lavigataq; per affusionem aceti cyathorum viij. liquidis excipiuntur.

Pharmaca ad spleneticos ab Archigene scripta.

Potus sit aqua quæ ferrū cadēs extinxerit: sola quidē, febrientibus: vino aut immista, iis q febre carent. Aut corticis radicis periclymeni, & seminis ejus, quantū tribus digitis apprehendi possit, in vino albo meraco calido, jejunis curriculo xl. dierū bibendū dato. Aut vulpis hepar sicū ex oxymelite p. pinato. Aut folia capparis arida & trita exhibeto. Cataplasmata aut eadē spleneticis & hepaticis admovebis, ampliusq; cinerem ex ferraria officina cū aceto. Aut nasturtiū & foenumgræcū, & calcē vivā, & nitru, cum melle emollita imposito. Aut facē acris aceti, aut capparis radicem cum aceto imposito. Perseverante malo cucurbitas cū scarificatione affligito. Aut venam retro sinistram aurem secato, & detracto sanguine confricato affectum lienem.

Remedia ad hydropē ab Asclepiade scripta. Malagma aut poteriū, resorbēs humiditates ab alto, simulq; duritias discutiēs. Cera, picis aridæ, utriusq; lib. j. aluminis liquidi, sulfuris vivi, manna, nitri rubri, sing. lib. j. resina frictæ lib. iij. olei veteris heminam. j. Arida liquidis permisceto.

Malagma ex baccis lauri ad eadem.

Cera, resina pinus, picis brutiæ, baccarū lauri siccarū, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis vitulini subacti, sing. lib. j. Liquefabilia liquentur, & frige facta misceantur aridis redactis in tenuissimum pollinem.

Emplastrū Tonforis, ad spleneticos & hydro picos, quo etiam ischiadicos liberavit.

Picis aridæ lib. iij. cera, resina pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, baccarū lauri aridarū, sing. lib. ij. adipis taurini lib. j. iridis lib. ij. canchryos unc. xvij. farina fœnigræci, pollinis, radicis chamæleonis nigræ tenuissimè trita, sing. sextarium unum: cumini tenuissimè triti sesquiseptarium: passi sextar. i. Conficito & utitor.

Cleophanti cataplasma ad hydro picos.

Cera, resina, spumæ nitri, sing. drach. c. chalban, propolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. s. cyprini cyathos ij. aceti tantundem. Conficito cataplasma.

Archigenis remedia ad hydro picos.

Stercus bovis armētarie tritū, coctūq; in posca, insperaq; sulfuris vivi quarta portione, redigito in cataplasma, idque toti ventri admoveo. Aut elaterii, staphidis sylvestris, hyssopi, fellis taurini, æquales omniū partes ficub. confusis excipiens, mulsaq; lavigās, similiter applicato. Aut veratrū nigrū, fel taurinū, nitru, piperq; ex æquo mista, melleq; excepta, per semihoræ tēpusculū ventri imposito. Per omne aut curationis tempus cotyledonis, scillæ aridæ, sing. drach. j. in vin mulso diluto quotidie exhibe. Aut corticis rad. ari. similiter drach. j. Aut radicem calaminthæ coctā propina. Ad hæc hydro picos diutius ad solē, sed cōtectō capite, inungito ex oleo, cui candos.

multū salis admistū sit: ex multaq; pfundito sal-
fugine calida. Inflatos verò maxime locos, vesi-
cis magnisq; pbe inflatis quotidie cōtinenter pul-
sato. Incisis itē aut scarificatis ipsorū talis, & vul-
nusculis impactis, in ferculo ipsos aut lectica cir-
cum vehito. Summe etiā faciūt Theriacæ oēs u-
rinā cientes, insuperq; poriones aquā ducentes.

¶ *Depharmacis dolorem sedantibus, ano-
dynis, & colicis appellatis.*

*Anodynis
uti quibus
de causis so-
leamus.*

Hujusmodi pharmacis, ob dolores ingētes, 10
aut vigilias, aut ne per violentam tussim lancine-
mur, uti consuevimus. Ad quas quidem affectio-
nes, si modicæ sint, cōfectiones ex seminibus, pri-
vatim tussiculares dictæ, sufficiunt: quæ & ipsæ
aliquid ex soporiferis seminibus possident, ve-
rū modicū inter multa adeo semina, quæ odo-
rata, & tenuium partium, ac urinam moventia
existunt: cujusmodi sunt, euminum, daucū, fese-
li, apiumque, & anisum.

¶ *Philonis Antidotus, ad omnes graves dolores
viscerum, ad aliāq; multa conveniens.*

*Philonis an-
tidotus ad
graves inte-
ratorū cru-
ciatus conse-
rens.*

Opij vires.

*Opij misce-
da qualia ef-
se debeant
medicamēta*

*Compositio-
nis medica-
mentorum
optimū sco-
pum tria sibi
proponere.*

Croci drac. v. pyrethri, euphorbiū, spicæ nar-
di sing. drac. j. piperis albi & hyoscyami, utriusq;
drac. xx. opii drac. x. Melle Attico excipito. Ete-
nim opiū validissimū est inter ea quæ sensum stu-
pefaciunt, atq; soporē conciliant. Operatur au-
tem hæc etiā solum, sapa dilutū, tormentoq; ex-
ceptum ac sedi inditum, necnō illitum fronti &
naribus. Si verò cum alio quopiā vim ipsius mo-
derante misceatur, moderatius hæc facit. Verū 30
quæ admiscuntur ipsi, aut concoquant, aut miti-
gent dolorificam actionem oportet, aut humo-
res affectionem gignentes discutiant, aut disse-
cent, aut attenuent, aut juxta totā substantiā al-
terent. Quum igitur optimus cōpositionis sco-
pus, tria sibi proponat: nimirū ut & sensus stu-
pefiat, & nullum in posterū circa particulā inde
detrimentum remaneat, ampliusq; ut affectio
ipsa inde juvetur: ad hæc omnia respiciēs Philo,
prædictum cōposuisse videtur pharmacum: ex
opij quidem, hyoscyamiq; mistura soporē, sensi-
triciq; facultatis stuporē inducere volens. Quò
verò hæc citius distribuerētur, & totā affectarū
partium penetrarent profunditatē, calfacientia
admiscuit, pyrethrū, euphorbiū, & piper, q no-
centes humores discutere possunt, extergere vi-
scidos, incidere crassos, ac deniq; flatulētos atre-
nuare & dissolvere. Est aut nō modica cōcocto-
ria via omnium frigidarum affectionum in nar-
do sita: quæ aut Indica, aut Celtica injicienda est. 50
At crocus humorum crudorum est concocto-
rium, atq; item affectionum virulentarum.

¶ *Colica medicamina Andromachi.*

*Colica medi-
camina An-
dromachi.*

Anisi drac. vj. seminis apii drac. xij. nardi drac.
iiij. castorii drac. iij. petroselini drac. iiij. piperis
albi & lōgi, utriusq; drac. v. myrrhæ drac. vj. jun-
ci odorati drach. tres: succi papaveris drach. vj.
croci drac. iij. Melle excipito. Datur ad summū,
nucis regiæ parvæ magnitudo ex aquæ calidæ
cyathis tribus: minimum, nucis ponticæ ma- 60
gnitudo.

¶ *Aliud admirabile colicum ad voluulosos,
& stercus per os reddentes.*

Piperis albi, sem. hyoscyami, utriusq; drac. xl.
opii drac. xx. croci drach. x. spicæ nardi, euphor-
biū, pyrethri, sing. drach. ij. Excipe melle cocto.

Datur magnitudine fabæ in aqua frigida cya-
this iij. aut iiij.

Colica Isotheos dicta, ad stomachicos, oculo-
rum dolores, uteriq; labores, ex aqua mulsa, ubi
ruta fuerit incocta. Croci sesquidrachmā: nardi
drac. ij. myrrhæ drac. viij. costi, piperis albi & lō-
gi, chalbanī, sing. drac. j. opobalsami drach. iiij.
cinnamomi, succi mandragoræ, castorij, singul.
drach. ij. seminis dauci drac. iiij. s. sagapeni drac.
iiij. casia drac. iiij. Excipe melle Attico. Alia non
minus admirabilis. Succī cētauræ, castorij, scil-
læ satæ, piperis albi & lōgi, myrrhæ, rutæ hortē-
sis, hyssopi, abrotoni, iridis Illyricæ, sing. drac. ij.
croci, ammoniaci thymiamatis, rad. acori, phu-
pontici, zingiberis, veratri albi, sing. drachmā j.
Oxymelite excipito. Datur etiam drachma una
ex aceto mulso.

¶ *Chariclis, ad coli inflationes remedium.*

Cumini Æthiopici drac. vj. sem. apij drac. v.
seminis dauci Cretici drac. ij. piperis albi drac. j.
Tusa & cribrata reponito. Dantur cochlearia
duo, cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

¶ *Confectio Lingonis colica, quæ data ex
frigida, statim solvit dolores.*

Sem. hyoscyami albi drac. xx. opij, seminis dau-
ci Cretici, utriusq; drach. x. petroselini drach. vj.
croci, spicæ nardi, pyrethri, sing. drac. iiij. euphor-
biū, opobalsami, cinnamomi, sing. drac. ij. Excip-
ito melle cocto, ac fabæ Aegyptiæ magnitudi-
nem exhibeto, cū aquæ tepidæ aut frigidæ cya-
this tribus, in irritationibus.

DE DYSENTERICIS.

Deinceps medicamenta scribemus, quæ verè
dysentericis auxiliantur, quos nulla alia infestat
affectio, præter ulcus intestinorū, aut nudū, aut
cum putredine obortum, quā nomen appellant.

*Dysentery
veri sum
quibus et
aliquod
sinum ex
ceratum.*

¶ *Quæ ab Andromacho ad dysenteriam
scripta sunt.*

Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Florū
rosarū, opij, acaciæ, gummi, sing. drach. iiij. ba-
laustij tantundē: succi hypocistidos tantundem:
gallarū, seminis plātaginis, succi eius, sing. drac.
ij. lycij Indici, succi rosarum, sing. drach. j. Con-
fice pastillos drachmales, & variè utere.

*Dysentery
remedia
pta ab
dromachi*

¶ *Ad dysentericos & celiacos confectio
ex fructibus.*

Mala punica integra xx. cydonia totidē: erui
sextarium j. prunorum sylvestrium sextarios ij.
Sorborum Ephesinorum tātundem. Rhōis Sy-
riaci sextar. iiij. pira Terentiana xx. Cestiana xxx.
filiquas xl. baccarū myrti nigrarum sextarios iiij.
musti aminæi ad tertias decocti sextar. xlvij. Co-
quito simul ad mellis spissitudinem, & in figuli-
no reponito. Alia. Nardi croci, utriusq; drach.
viij. aloes, thuris, singulorū drac. ij. acaciæ, myr-
rhæ, succi hypocistidis, rosarum siccarum, lycij
Indici, tragacanthæ, opij, sing. drach. iiij. piperis
drach. ij. Aqua excipito, pastillosq; duarum dra-
chmarum facito, & cum vino myrteo exhibeto.

¶ *Ad dysentericos & celiacos, & hæmoptoi-
cos, ex Cornelio medico.*

Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opij, rhōis Syriacæ
& coriariæ, lycij Indici, acaciæ, malicorii, succi hy-
pocistidis, gallæ, balaustiorū, singulorū par pon-
dus in pastillos cogito, & ad noctē febre caren-
tib. ex vino, febrientib. verò ex frigida ppinato.

*Hæmoptoi-
cos medicame-
Corneli.*

¶ *Potio*

¶ *Potio Apollonij ad fluxum mulie-
brem sistendum.*

*ni mu-
i sisten-
tio Apol* Coralli, balaustii, utriusque; obol. iij. gummi o-
bol. j. Excipe ovi crudi candido, & dimidium to-
tius cum aqua cyathis quatuor propina.

¶ *Infusa dysentericis commoda. Infusum A-
thenæi ad recti intestini ulcera.*

*mi dysen-
ti apti.* Omphacii, aluminis scissilis, calcis vivæ, squa-
mæ æris, sing. drach. vj. auripigmenti drach. viij.
sandarachæ drach. iij. chartæ ustæ drach. xv. cum
vino myrteo pastillos drach. iij. aut triū, forma-
to. Infunde autem cum vini diluti cyathis iij. &
aqua tepidæ cyathis duobus.

¶ *Infusum Hera.*

Chartæ ustæ, cadmiæ, auripigmenti, singulo-
rum unc. j. calcis vivæ extinctæ succo plantagi-
nis, unc. s. Omnia redigito in pollinē, & cochlea-
ria duo, cum decocto baccarum myrti, aut vino
myrteo, infundito.

¶ *Infusum Nicostrati.*

Calcis vivæ drach. j. gypsi drach. viij. acaciæ
drach. ij. omphacii drach. j. stibii drach. iij. thuris
drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ drach. ij.
cum vino myrteo in pastillos redigito.

¶ *Asclepiadis ad dysentericos remedia.*

*dysentericis
remedia ab
Asclepiade
scripta.* Rhois Syriaci, farinæ polætæ, uvæ passæ sing.
drach. ij. malicorii tusi & cribrati drach. j. Exci-
pito melle cocto, atque mystrum unum ante cibū
porrigito. Aliud probatum. Gallarum redacta-
rum in pollinem cochleare unum: piperis albi,
rhois rubri, malicorii tenuissimè triti, singulo-
rum tantundē. Omnia ovi luteo excipito, & in
vacuam mæli punici testam conjicito, atque ob-
turato cum farina osculo ipsius, ad prunas torre:
depurgata mæli punici testa, cochlearium unum
edendum dato.

¶ *Pastillus Philippi ad dysentericos invetera-
tos, dolorem sedans, qui bibiturque & infunditur.*
Balaustii, acaciæ, succi hypocistidis, rhois, apii,
thuris, myrrhæ, baccarum myrti nigrarū, croci,
gallarum, lycii, aloes, rhei pōtici, malicorii, sing.
drach. iij. Excipito vino Italico, cogitoque; pastil-
los pondere obol. iij. ac porrigito non febrienti-
bus quidē, ex vino: febrientibus verò, ex mulsa.

¶ *Epithema celiacis dysentericisq.*

*Dysentericis
epithema co-
modum.* Seminis hyoscyami albi, apii, utriusque; trientē:
anisi, floris rosarū, succi hypocistidis, balaustii,
rhois Syriaci, sing. sextantem: succi papaveris,
croci, utriusque; unc. j. Singula cum vino myrteo
terito: dein mista in pastillos redigito, quos in
umbra assiccato. Inde verò quantū sufficit tun-
dens & cribrans, palmulis pafis excipito, ac tan-
dem linteolo imposita, ventri admoveo.

¶ *De affectibus sedis.*

*Sedis ulcera
cur agrè cu-
rationem re-
cipiant, &
qualia phar-
maca postu-
lent.* Sedis vitia, ob ipsius partis sensum exquisiti-
simum, & ob crebrum per ipsam excrementorū
decursum, agrè curationem recipiunt. Aptissi-
ma autem ipsis pharmaca sunt, quæ absque aspre-
dine astringunt: qualia maximè sunt, quæ ex me-
tallcis neque acris, neque acerbis existunt. Hæc si-
quidem lota, citra mordacitatem (id quod re-
quiritur) operantur.

¶ *Medicamenta sedis ab Andro-
macho scripta.*

*Sedis medi-
camenta ab
Androma-
cho scripta.* Cerussæ, lithargyri, utriusque; drach. v. thuris a-
luminis scissi, utriusque; drach. iij. croci obolos iij.

Vini & rosacei quod sit satis. Conficito. Aliud.
Butyri, ceræ, utriusque; fescunciam: medullæ cervi-
næ, æsypi thuris, singul. unc. j. aluminis scissi,
quadrantem: lycii sextantem: vini & rosacei quod
sit satis. Misceto. Aliud. Adipis anserini curati,
ceræ, thuris, medullæ cervi, floris rosarū, pom-
pholygis, cadmiæ, plūbi loti, sing. drach. iij. ce-
russæ drach. viij. cerebri gruis drach. ij. succi papa-
veris sesquidrachmā: æsypi drach. v. succi feri-
dis heminam j. rosacei heminam s. Confundito.

¶ *Pinguis compositio ad achoras & psoras.*

Spumæ argenti, cerussæ, utriusque; drach. xxxij. *Psoris utilis
compositio.* atramenti sutorij drach. xvj. sulfuris vivi drach.
viij. Olei myrtei aceti quod sit satis. Misceto.

¶ *Ad prolabantem sedem.*

Recrementi plumbi drach. viij. Rhois Syriaci *Sedis prola-
psus reme-
dium.* tantundem: floris rosarum drach. iij. myrrhæ Min-
næ drach. ij. Insperge siccum, ubi prælueris vi-
no austero, aut vini decocto. Aliud. Gallæ om-
phacitidis, rhois coriarij, sing. drach. ij. plumbi
usti drachmas iij. spumæ argenti drachmas viij.
trita inspergito. *Hæmorrhoidibus ab Asclepiade scri-
pta remedia.*

¶ *Hæmorrhoidibus extrahendis pharma-
ca ab Asclepiade scripta.*

Piperis, nitri, utriusque; drach. j. terito admove-
toque. Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, staphidis
sylvestris, sing. drach. j. Trita, exceptaque; modico
melle, adhibeto. Postea verò quàm eminentes
fuerint, atque in propatulo, accipe cerussæ unc. j.
spumæ argenti quincuncē: pompholygis unc. j.
olei myrtei bessem: vini boni tantundem: butyri
unc. j. Confunditoque; & applicato. Cæterum ad
ardentes sedis dolores, ovi assati vitellum vino
albo terito, & cerato myrteo exceptum illinito.

¶ *Ad pudendorum affectus.*

Exulcerati pudendi cognitio, ex manifesto cir-
ca ipsum dolore paratur: unā cū hoc, quod etiā
circa mictiones excernitur quid ex corpore ulcus
ulceri ipsi insidētibus. Discernuntur autē hæc ab
illis quæ ex vesica ferūtur, quod statim in ipso pri-
mo lotij exitu appareant: quæ verò à vesica excer-
nuntur, deferantur cū urinis permista. Cæterum
ulcera pudendorū, & circa sedē citra inflāmati-
onem cōsistentia, resiccantibus valdē indigēt phar-
macis: qualia sunt quod ex charta combusta cō-
stat, & anetū ustū, & cucurbita usta. Verum sic-
cis & recētibus ulceribus, etiam aloe bonum est
medicamen. Omniū autem maximè dolorem se-
dat, nec ullo minus efficax est pompholyx. Si ve-
rò humectiora sint ulcera, pinus cortex per se, &
lapis hæmatites: ut si profunda, manna etiā præ-
dictis addatur. Porro quæ circa uterū aut vesicā
consistunt ulcera, eisdē medicamentis indigent,
sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa
intromittāt, ut sunt metrenchytæ, & catheteres
vocati. Aptiora itaque sunt arida, qualis est cro-
cus, pōpholyx, & aloe, quæ faciliè plāraginis, aut
alteri tali succo miscerur. Ad scroti & pudēdi do-
lores, Butyri & resinæ pari mēsurā utere. Aut se-
men lini cū aqua coquito, & admista myrrhæ fer-
mè decima parte & resinæ tantundē imponito.

¶ *Ad pudendum intumescens.*

Foliorum vitis tenerorū drach. j. cerussæ drach.
v. trita cataplasmatibus vice impone. Aut lenticulā
in aqua coquito, & cum mæli punici cortice tri-
tam imponito. Si verò è sudoribus ulcera in-
GG iij

Pudendi fissuras, tuberculaq; quæ sanant.

Pudendorum inflammatio nibus quæ opitulentur.

Priapismus est auctio colicis permanens in latitudine longitudinemq; citra rei venereæ appetentiam. Priapismi cura ratio.

Mingentibus inter dormiendum remedia.

Uteri suffocationes quæ sequantur symptomata.

Uteri suffocatione affligente, per arterias tantum fieri per spirationes.

Uteri suffocationis causa.

Uteri suffocationis remedia.

scroto fiant, gallâ tritâ cum alumine inspergito. Ad Tubercula in pugêdis nascêtia, piri semen inspergito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas juvat rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mista. Aut foliorum hederæ aridorum ustorumq; cinis, cû oleo in plumbeo mortario triti. Ad pudendorum inflammationes, farinam hordeaceâ hydromelyte incoquito, & vitis folia tenera cû polenta terito, simulq; omnia imposito. Excrefcentem testiculorum carnem cinis sarmentitius cum nitro & aqua subactus sanat, cataplasmatibus vice impositus.

De Priapismo.

Priapismus est auctio colicis permanens, in longitudine atq; orbem tumefacti, citra rei venereæ appetentiâ. Cujus affectionis est causa, flatulentus spiritus ex humoribus crassis & viscidis genitus per moderatam caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter partes per ceratum rosaceû in aqua maceratum, itemq; per chamæmelinû ceratum, tum pudêdo ipsi, tû lumbis impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, citra manifestam calfactionem. Præterea nymphæa in potu est danda, & viticis semen: nec non ruta viridis obsoniis misceatur, post aliorum tenuantium usum. Quod si evacuatione uti libeat, administretur per vomitum. Ad eos qui se in somno permungunt, vesicam caprillam, aut ovillam ustam, ex posca bibendam dato: & ad vesperam siticulosus inire somnum jubeto. Facit & testiculus leporis in vino odorato fervefactus, atque ita potus. Aut calamintham & myrrham in vino ante coenam bibendam dato. Oblinant autê pudendum cimolia terra cum perdicis succo.

Ad uteri affectus.

In uteri suffocatione contingit sensus ac motus privatio, & pulsus obscurus, & parvus, & penitus interceptus. In aliquibus verò tum sensus, tum motus adest, ratioq; cõstat, cæterum vix respirant. Aliquibus etiam vox intercipitur. Aliis contrahuntur artus. Fiunt igitur viduis sensus & motus & respirationis interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neq; uteribus illa quæ per os fit respiratione. Etenim quû prius probè repurgarentur, cõciperent, atq; coirent viris, verisimile est, postea quû omnibus his privatur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad vulvæ itaq; strangulatus convenit agarici drach. j. in potu accepta cum vino: & plantaginis semen & succus, um vino: nec non acetum scillinum absorptum. Olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium, chalbanum, pix liquida, cedria, piliusti, ruta, allium, cæpa. Eandem in rem & cornu cervi suffitus: & ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum partes, lib. X.

Nephriticorum medicamentum diffinitione.

EX nephriticis antidotis, hoc est, renalibus quædam calculosos renes juvant: quædam verò inflammatos & ulceratos, quæ etiam ad vesicam affectâ conveniunt. Maximè autem contrariæ inter se sunt prædictorum pharmaco-

rum facultates. Siquidem quæ ad inflâmatas & exulceratas affectiones componuntur, mitigatoriis medicamentis indigent. Cæterum quum impossibile sit hæc cito penetrare ad regionem renum, ob id ipsis miscemus diuretica. At quæ calculosis opitulantur, unicam facultatē postulant, quæ secare & extergere est nata, cum conspicua caliditate. Sunt autem talia ferè omnia amara. Confectiones Andromachi ad renum & vesicæ affectiones. Potio ad vesicam exulceratam & urinæ emittendæ difficultatem. Seminis lini, sem. papaveris albi, sem. cucumeris, tragacanthæ, sing. drach. ij, amyli drach. iiij. Cum aqua in pastillos redigito, exhibetoq;.

Alia ad eadem, & vesicæ dolores.

Croci, seminis rutæ sylvestris, seminis malvæ sylvestris, sing. drach. vj. sem. hyoscyami drach. xij. opij drach. vj. sem. apij drach. xij. nuces avelanas xij. amygdalas xx. sem. cucumeris drach. xij. mellis Attici quod sit satis. Datur magnitudo ponticæ nucis cum vini mulsi cyathis iij.

Alia ad profluvia sanguinis ex vesica.

Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gummi obolum j. Dato ex passo quâdoq; obolum j. quandoq; duos.

Alia calculos frangens, ut nō renascantur.

Casie, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem. papaveris albi, spicæ nardi, sem. smyrnij, cyperi, sin. drach. ij. seminis apij, thuris styrcis, iridis Illyricæ, amygd. amar. asari, sin. drach. iij. myrrhæ minnæ drach. iiij. mellis Attici quod sit satis. Cõfici to, & quotidie exhibeto nucis pōticæ magnitudinē ex aquæ cyathis tribus, idq; jeuno stomacho.

Nephriticæ compositiones ab Asclepiade conscriptæ.

Seminis sativi cucumeris tosti drach. iij. seminis malvæ drach. v. nucum pinearum drach. vj. sem. apij drach. vij. seminis lini drach. j. amygd. amaranu mund. drach. ix. Excipe passo, & exhibe nucis ponticæ magnitudinē cum protropi cyatho j. & aquæ calidæ cyathis duobus. Alia. Malvæ sylvestris, & rutæ sylvestris, & apij montani radices in vino coquito, & expressi liquoris cyathos ij. cum pari aquæ portione exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapides qui spongiis inest, pulegij aridi, seminis malvæ sylvestris, ocy mi aridi, sing. pares portiones tundito, incernitoq; & reponito. Propinato autem cochleare unum cum vini diluti cyathis duobus.

Pastillus ciens urinas, atq; expellens lapillos.

Asari, petroselini, phu, mei, sing. drach. iiij. acori, sem. anisi, sem. dauci, apij montani, carpobalsami, tragacanthæ, singulorum drach. ij. Tragacantham passo dissolutam aridis adjicito, & pastillos formato, indeq; obolos iij. cum passi diluti cyathis ij. exhibeto.

De ischiade, podagra, & arthritide.

Ex genere arthritidis est tum ischias, tum podagra. Quod enim in omnibus articulis est arthritidis, hoc in uno juxta coxedicem quidē, ischia da, juxta pedē verò, appellat podagram. Incipit igitur plerunq; podagræ generatio ex uno articulo, tēporeq; in omnes progreditur. Cõmunē habent hi tres affectus redundantiam humoris. Cæterum aliquando irruens humor sanguineus est, ut

Renum inflammationibus qualia medicamenta conveniant. Calculosis congrua medicamenta omnia ferè esse amara. Vesicæ ulceris & urinæ difficultatis medium.

Sanguinis ex vesica fluxum remedium. Calculosis frangens medicamentum.

Nephriticæ compositiones ex Asclepiade.

Arthritidis Ischias. Podagra.

Articulorum morborum communis causa.

est, ut plurimum autē pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mistus: quibus etiam interdum misceatur sanguis. Porro ubi pituitosus humor, qui propriè appellatur crudus, in articulis delituerit diutius, crassior atque viscosior efficitur, tofisq; aut callis dictis præbet generationem. Qui quidem postquā producti fuerint, non est quod speres illos posse exactè dissolvi. Differentia affligentium humorū facile ex colore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multæ caliditatis sensum

exhibet ægrotati, à calorificisq; remediis exacerbatur, quemadmodū remittitur rursus à frigidis. Curatio autē ipsa exordida est ab evacuatione affligentis humoris: si quidē ex æquo humoribus redundarit corpus, venæ sectione primò omnium administrata: dein purgatione: quib. accedat pharmacorū dicendorum cōueniens atq; opportunus usus, ita ut in manibus pedibusque

pharmacis repellentibus fluxionē utamur: iuxta coxendicē verò, ea minimè administremus. Quum enim iunctura ea in profundo sit sita, sanguis ex vicinis & ambientibus vasīs à musculis ad illā truditur. Mitigatoris igitur in principio medicamenti utendū est ad dolores coxendicū,

& quæ nec frigerent multum, nec fortiter calfaciant. Exacerbantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimirum plus attrahēte ipsas, quam impediēte. Rarò itaq; fit coxendicum dolor ex sanguinis multitudine: citissimèq; curatur, venis circa poplitē aut malleolos pertusis. Quemadmodum autem sola sæpe sanguinis evacuatio

sufficiens auxilium existit, sit cōtra in omni dolore coxendicū, & præsertim eo, qui ex humorum copia est exortus, si quis ante evacuationē totius corporis acerbis pharmacis circa affectā partem utatur, affectū ægrè curabilē reddet, copia videlicet indissolubiliter ibidem cōdensata. Ob idq; ab evacuatione incipiendum est, non solum

à cruribus, sed à cubito etiā sanguinis detractio- ne facta. Auxiliatur etiam vomitus ipsis ischiadicis, magis utiq; quā evacuationes p ventrem, ut qui revellant humorem repentem deorsum. Movendi itaq; sunt vomitus in principio ab accepto cibo: postea verò, etiā per vomitoria medicamēta, initio à mediocribus facta. In quibus autem vehemens humorum densatio, quæ ægrè dissolvi possit, à medicis intempestivè utētibus acerbis pharmacis facta est, ijs maximè cucurbita affixa auxiliatur, & purgatio per clysmos efficaciores, qualis est qui ex colocynthide constat.

Compositiones ab Andromacho scriptæ ad ischiadicos. Emplastrum è profundo extrahens humores affligentes coxendicem. Seminis rutæ sylvestris, silphii, spumę nitri, baccarum lauri, abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, ammii, singul. drach. iij. rutæ viridis minæ octavam partem. Quidam horum singulorū drach. xx. accipiunt: necnon picis, adipis taurini, terebinthinæ, myrtei, ceræ sing. tantundem: chalbani, ammoniaci thymiamatis, utriusque drac. vj. opopanax, sulfuris vivi, sing. drach. iij. Conficito, & admoveo.

Aliud ad coxendicum, capitisq; dolores, atq; ad alios omnes antiquos.

Ceræ drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. vij. terebinthinæ tantundē: succi thapsiæ

drach. viij. olei cyathum unum. Aliud. Ceræ drach. c. visci quercini drach. xvj. myrrhæ drach. vj. terebinthinæ drach. xxv. chalbani drach. vj. iridis Illyricæ tantundem: ceræ heminam s. Cyprini tantundem.

¶ Asclepiadis malagmata ad ischiadicos.

Myrrhæ stactæ, bdellij onychis, medullæ cervinæ, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ; sing. lib. ij. opopanax, chalbani, styracis, mastiches, floris lapidis Asij, succi sycomororum, canchryos, piperis albi, sing. lib. j. ceræ, terebinthinæ, utriusq; lib. v. Tundendum est pharmacum ita, ut qui tundit, facem unguētī irini adhibeat, quò mollius reddatur.

¶ Aliud mirè iuvans ischiadicos, discutiensq; omnem duritiem.

Ceræ, visci quercini, terebinthinæ, iridis siccę myrrhę, chalbani, sing. drach. xlvij. Olei cyprini, aut unguētī Ægyptiaci quod sit satis. Cōficito.

Aliud. Picis liquidæ brutiæ lib. iij. facis aridæ ustæ lib. ij. nitri rubri lib. j. s. resinæ pini, ceræ, staphidis sylvestris, sulfuris vivi, sing. lib. j. pyrethri lib. s. cardamomi sextariū unum. Picem, ceram, atq; resinam, solvito: arida tundito, cribratoq; & liquefactis cōmittito. Porro Damocrates, Archigenesq; plurimum ad ischiadicos commendant malagma ex iberide herba (quam nasturtium sylvestre vocant) cum adipe porcino tusa confectum: quod sanè imponi jubent ad horas tres, indeq; ad balneum accedere.

¶ De podagricis & arthriticis affectionibus.

Scopus in hisce affectibus est, si quidem adhuc fluant humores, ipsos per astringentia repellere: si verò amplius non influant, discutere qui sunt jam impacti.

¶ EPITHEMA Asclepiadis, ad arthricos, mirè dolorem sedans.

Succi papaveris drach. iij. croci drach. j. cum lacte bubulo, caprillōve, & panis medulla contundito, lævigatoq; ac deniq; ex rosaceo emolliēs, cōficito cataplasma. Aliud. Styracis drach. ij. opij drach. j. Confice, utereq; Aliud tofos & duritias discutiens. Farinæ fœnigraci, floris lapidis Asij, lomenti fabæ nigræ, farinæ lupinorū, singulorū sext. j. Omnia mixta & aqua subacta calida, imposito. Pastillus podagricus. Aloës lib. j. succi cętaurij fescuncę, thuris masculi trientem: myrrhæ tantundem: floris lapidis Asij, opij, succi mandragoræ, aluminis scissi, singulorum sextantē: passo excepta in pastillos redigito. Usū expetente, lacte dissolutos cum pēna illine, & supra illitionem linteolū passo imbutū impone.

Aliud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthinæ, utriusq; lib. j. adipis taurini, floris lapidis Asij, calcis vivæ, mannæ, singulorum quadrantem: cyprini lib. j. Conficito, utitorq;.

F I N I S.

Ex industria omisimus libellum de facilibus paraturæ remedijs, quod omnia quæ in illo habentur, reperiuntur in hisce commentarijs longè cumulatoria.

ILLU

Arthriticis congruentia epithemata ab Asclepiadis scripta.

ILLUSTRI ADMODUM, ATQUE ORNATISSIMO VIRO, D. D. ARIO GONZALO, COMITI PUGNI IN ROSTRO, ANDREAS LACUNA SECABIENSIS, Doctor Medicus, Miles S. Petri, Salutem.



GALENI COMMENTARIOS DE THERIACA ET DE ANTIDOTIS, Hoc nomine dicar et tua Dignationi statui, Vir citra controversiam splendidissime, ut generosum istum animum tuum, ex tam longa lite & controversia defatigatum, varia eorum lectione, dulcissimaq; oblectarem: contra iudicialiaq; molestias, atq; ingentes difficultates (quæ optimorum ingeniorum veluti deleteria & exitialia venena existunt) salutaris alexipharmaco commu-
nitem, atq; corroborarem. Quanquam hercle adeo invicta, insuperabilisq; tua ista est animi magnitudo, ut nullis tormentis succussa, possit unquam everti, aut quoquo modo labefactari. Nam tametsi varij fortune fluctus, acerbissimaq; procella, & quæ vel fortissimum queng, prosternere minimo negotio potuissent, iam ante multos annos in te maximum impetum fecerint, adeo tamen fortiter sustinisti omnes eius insultus, tam heroice restitisti afflictionibus undiq; tua mœnia circumvallantibus, ut ob nullam tempestatem ingruentem, vultum unquam, aut colorem, mutaveris. Quam sanè tam insignem constantiam, animiq; raram serenitatem, nō aliunde quàm à philosophia comparasti: cuius nimirum amator longè indulgentissimus es. Siquidem præter alias virtutes quibus te exornavit Deus Opt. Max, etiam in sevit tibi ardentissimum quendam omnium disciplinarum amorē: quo accensus, adeo illis perpetuò indulges, ut ab ipsis revocari non possis. Id quod ipse exploratum habens, non posse me Dignationi tuæ rem ullam gratiorem facere existimaui, quàm si ad eam mitte-
rem hosce cōmentariolos Galeni, ut mole exiguos, sic plenos eruditione, varijsq; naturæ mysterijs auctos. Tuum igitur fuerit, Vir Clarissime, hoc nostrum quantulumcunq; munusculum, illius ferventissimi amoris, quo optimus pater meus prosequabatur olim totam familiam vestram, officijq; mei in tuam Amplitudinem, futurum veluti monumentum quoddam perenne, æqui boniq; consulere. Vale. Venetijs, Calendis Aprilis
M. D. XLVIII.

GALENI PERGAMENI
de Theriaca ad Pisonem, lib. unus.



Medicamentum ex viperis meritò est apud homines inter alia omnia celebratissimum, Optime Piso, & q; vim habeat efficacissimā, & q; neminē pmissis frustretur. Siquidem nullam à feris cōmorsum, hac statim epota antidoto, perijisse, memoriæ proditū est. Nullus etiā eadē præsumpta, vel si paulò post impeteretur, morsu interiit: id quod indies experiuntur prætores in hominibus capitali supplicio damnatis. Cæterum si epota theriaca nō purgetur qui huius sit medicamentum purgans, id tibi erit indicium, antidotum præstantissimam esse, quæ sæpissimè solet adulterari. Porro Divus Marcus Aurelius, qui legitime aliquando gessit habenas Imperii, affatim, & veluti alimento quodā hoc utebatur medicamento: primusq; fuit, qui ipsius existimationem fidemq; auxit. Verum illius quidem principis tempore, ad familiarium tantū notitiam, theriaces perveniebat opus: sub hisce autē monarchis maximis, ususeius prodiit in publicum. Siquidem nobis omnib; licet eorum bonis probè uti, liberaliterq; aliis mederi, alio ab alio medicamentum capiente: quum nō solum hoc nomine cæteris omnibus antecellant, quòd Imperium à Diis sint adepti, sed quòd etiam universa bona cunctis libenter impertiant, ac non secus quàm Dii ipsi, tantū ex æquo gaudii concipiant, quantum illi qui ab ipsis servantur: quum ni-

mirum censeant maximā regni esse partem, cōmunem omniū salutem Quo sanè regio cando-
re præditi, adeo exquisitè & diligenter theriacē præparant, ut ipsi quidem nihil prorsus omittāt: antidotus autem, admiranda opera exhibeat. Igitur morbi cujusq; natura cōperta, differentiāq; simplicem pharmacorū penes temperamentū, cognita singulis morbis quod cōgruū sit medicamen cōpositum præparabimus. At simplicium medicaminum vires sensu & experientia cognoscimus: quibus postea rationem jungētes, eamq; ceu ducem sequentes, hallucinari nō possumus. Etenim quum cernamus liquidò, scammoniā bilem flavam educere: epithymum, atram bilē: ac deniq; coccum gnidium, pituitā: nec credamus medicamenta ipsa purgantia, in suam naturā huiusmodi transmutare & convertere (id quod Asclepiades somniavit) sanè persuasum habemus, quemadmodum magnes trahit ferrū, sic medicamenta singula, sua insita facultate cōvenientē sibi succum attrahere: nimirum id ratione comprehendentes, quod proprietatem facultatis naturæ cujusq; pharmaci verè testari atq; exprimere potest. Medicamentorū itaq; alia p totas substantias agūt: alia in substantia sua miscellaneam facultatē sortiuntur, adeo ut sæpe in corpore effectus maximè contrarios producant. Siquidem lapathi folia comesta subducunt alvum, quam sumptum eius semen astringit. Similiter & succus brassicæ, & vetulorum gallorū jus, & cochlearum marinarum cremores, ventrem commovent: olus autem ipsum, atque illarū carnes cōfectus produ-
mestæ, cere.

Theriaces
cōmendatio.

Theriaca
perfecta pur-
gantū phar-
macorū ope-
rationem sup-
primit.
Marcus Au-
relius Imp.
auxit fidem
Theriaces.

Severum &
Lucium eius-
dem Imperij
moderatores
collegasque
magnificè cō-
mendat Ga-
lenus.

Regni max-
imam esse pa-
tem commu-
nem omniū
facultatema-

Simplicium
vires cogno-
sci sensu ex-
perientiaq;
quibus ad
iuncta sit ra-
tio.

Scammoniū
trahit flava
bilem.

Epithymum
atram bilem
expurgat.

Coccum gni-
dium solvit
pituitam.

Medicamen-
ta singula
propriū si-
bi succum at-
trahere.

Medicamen-
ta plura, se-
cundum di-
versos sui in-
pforum par-
tes, varios ef-
fectus produ-

meſſæ, eundem cōprimunt. Aloë, ſquamaq; æris, excreſcentes ulcerum carnes aſtringunt: aſſumpta verò per os, univerſum corp⁹ expurgant. Lac ubi à nobis dividitur, contrarias facultates oſtendit. Nā ſerum ipſius bibitū ventrem reſolvit. Caſeus ingeſtus, ipſum cohibet exactè. Triſoliū herba decocta, impoſitaq; ferarū morſib. auxiliatur: quæ ſi ſanæ parti affricetur, nō ſecus quàm ferarum morſus eam affligit. Cicuta ſtornos quidem alit, nos autem è medio tollit. Veratrum coturnicib. cibis, homines malè perimit. Nōnulla præterea partes quaſdam certas corporis viciant. Nam lepus marinus pulmonem exulcerat. Cantharis veſicam peculiariter efficit. E contrario, affecto jecinori ſæpe fuit herba eupatoria ex uſu. Myrobalanus lienem adjuvat. Saxiſfragon & Betonica, renes optimè afficiunt. Quū igitur veteres illi Medici reputarent ſecū, inevitabiles eſſe noxiarum ferarum morſus: necnon deleteriorum pharmacarū ſymptomata eſſe omnino letalia: quumq; etiā perpenderent, hominū naturas diſferre inter ſe plurimū, aliudq; aliū medicamentū idoneū eſſe, meritò ipſius theriaces accuratā, exquiſitā, & variā, ſunt moliti præparationem: ut hoc nomine ipſa in omnib. ſuū finem aſſequeretur, & ob uſus neceſſitatem magno ſtudio eam mortales omnes expeterent. Nihil ſiquidem inter vitæ incommoda difficilius mihi videtur deleteriis medicamētis, ac feris noxiis. Primus autem qui antidoto cōtra ferarū morſus immiſcuit ſeras, fuiſſe perhibetur Andromachus, vir mehercule memorabilis, nec multò ante nos natus: quippe qui Neroni (cujus aſſecta fuit) ipſius vires atq; cōpoſitionem dicarit. Summa autem deſcriptionis habet in hunc modum.

Andromachi ſenioris, Neronis archiatri Theriace ex viperis, cui nomen eſt Galene, maxime ſalutaris ad ſerpentium atq; omnium ferarum iectus, pharmaca deleteria, affectionis vetriculi, anhelationes, dolores colicos, morbū arcuatū, hydropem, phthiſim, omnimodā convulſionē, pleuritidem, veſicæ ulcera, ſuppreſſiones urinæ, cruciatus renū, peſtiferos morbos, ac deniq; canis rabidi morſus, ſi pondere fabæ Ægyptiæ ſumatur, cū ternis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas vere ineunte viperas, cervices illis atq; caudas præcidito, quantū arcta Pygmæi manus extenditur, nam utraq; parte venenum gerunt. Poſtea verò excoriatis eviſceratasq; ab ipſiſq; omni adipe amoto, in fictile vas cōjicito, affundens aquæ quod ſatis eſſe videatur, addensq; germen anethi, ac pauxillū ſalis recētis, & ſinito coq, donec facile a carne ipſæ ſpinę amoveat. Tūc itaq; carnes ipſas exemptas, cum ſufficienti ad paſtillos ſingendos medulla panis puriſſimi, contundito & lævigato, aſtuſoq; juſculi quod ſatis eſſe videatur, manibus opobalſamo intinctis, conficito orbiculos, eoſq; in umbra reponito ad totius antidoti cōpoſitionem. Dein fermento illine ſcillam recentem, non admodum magnā, eamq; in furno vel in patina coque, ut torreantur omnes eius partes ex æquo. Id ubi factū fuerit, partes eius internæ & tenerrimę cum pari portione optimæ farinæ eruinæ contundantur & levigentur, atq; in orbiculos digerantur. Verūm Andromachus duplicem portione eruinæ farinæ adji-

ciendam cenſet, quū tamen æqualis modus ſingendis paſtillis ſit optimus. Hæc ubi facta fuerint, accipies paſtillorum Theriacorū drachmas xxiiij. paſtillorum ſcillinorum drachmas xlvij. piperis longi, ſucci papaveris, magnatis, hedychroi, ſingulorū drach. xxiiij. roſarum ſeccarū, iris Illyrica, glycyrrhizæ, ſeminis napi ſylveſtris, quæ buniada appellant, ſcordij, opobalſami, cinnamomi, agarici, ſing. drach. xij. myrrhæ, coſti, croci, caſiæ, nardi, ſchœni, id eſt, jūci odorati floris, thuris, piperis albi & nigri, dictamni, praſij, rhœu, ſtœcados, petroſelini Macedonici, calaminthæ, terebinthinæ, zingiberis, quinque folij radicis, ſingulorū drachmas vj. polij, chamæpityos, ſtyracis, amomi uvæ, meu nardi Gallicæ, Lemnię ſphragidis, phu pontici, chamædryos Creticæ, foliorū malabathri, chalcitidis toſtæ, gentianę, aniſi, hypociftidis ſucci, carpobalſami, gūmi, marathri ſeminis, cardamomi, ſeſelis, acaciæ, thlapſis, hyperici, ſagapeni, ameos, ſing. drach. iiij. caſtorij, ariſtolochię tenuis, dauci ſeminis, bituminis Judaici, opopanacis, cētauri tenuis, chalbani, ſing. drac. ij. mellis lib. x. Vini Falerni quod ſit ſatis. Conveniebat tamē prius hedychroi unguentum deſcribere, cujus apud Magnū talis eſt præparatio. Aſpalathi radicula corticis, calami aromatici, ſchœni floris, phu, coſti, aſari, xylobalſami, ſing. drach. vj. cinnamomi drac. xxiiij. amomi tantundem: amaraci drac. xx. nardi Indicæ drac. xvj. foliorū malabathri drach. vj. myrrhæ drach. xxiiij. maſtiches drac. vj. croci drach. xix. Excipiuntur vino Falerno, manibusq; opobalſamo intinctis, in paſtillos coguntur, & aſſiccantur. Elegit porro Andromachus ex aliis feris ſolas viperas ad hujus præparationem antidoti quod hæc minus aliis tabificam vim obtineant. Nam baſiliſcus, belua ſubſlava, & triplici frōtis apice munita, vel ſi cernatur tantum, aut ſibilus eius audiat, acturum hominē perimit. Quod ſi ex cæteris animalib. aliquod attigerit animal à baſiliſco extinctum, ſubitò etiam exanimatur. Dryinus ſerpens tam eſſe pernicioſus proditur, ut ſi qui ipſum per imprudentiam calcarint, eis pedum plantæ exorientur, totaq; crura intumeſcant, periclitenturq; etiam illorum manus, qui ipſis auxilium tulerint. Hæmorrhæus, & hæmorrhœus, adeo inimici ſunt homini, ut qui ab ipſis percuſſus fuerit, ſanguine per os & nares, ac per univerſum corpus effuſo, vita fungat. Cōmorſi à diſſade, cōficiuntur cauſonide. Nam & inexpugnabili ſiti, & æſtu vehemēti cruciati, interdū & diſrupti, diē obeunt. Acontias ſerpens, ubi ſe multum extenderit, ceu jaculum quoddam inſiliēs corporibus, ita perimit. Inter aſpides nominata Ptyas, cervicē exporrigens, longitudinēq; intervalli merita, venenum corporibus inſpuit. Etenim harum ferarum una (tres quippe aſpidū ſunt ſpecies, hæc videlicet, & cheriſæ, necnō che- lidonia) perhibent reginam Cleopatram, quū vel let latere cuſtodes, citra ſuſpicionem ſibi mortē ſubitò cōſciſſiſſe. Nam quum Auguſtus devicto Antonio eam capere incolumem vellet, ac vivere, ſtudioſiusq; (ſicut par erat) ſervare ut Romanis tam inſignem mulierem in triumpho oſtenderet, hæc, re intellecta, optavit regina adhuc ex humanis potius decedere, quàm privata Ro-

Hedychroi
unguenti
præparatio.

Viperas aliis
feris minus
obtinere ta-
bifica facul-
tatis, ob idq;
ad antidotū
ab Andro-
macho ele-
ctas.

Baſiliſcus cō-
ſpectus audi-
tusve, homi-
nem perimit.
Dryinus ſer-
pens.

Hæmorrhæus
Hæmorrhœus.

Diſſas ſitim
inſert in ex-
pugnabilem.

Acontias ſer-
pens ut peri-
mat.

Ptyas ſceno-
num corpori-
bus inſpuit.

Aſpidū tres
ſpecies

Cleopatra
poſt victum
Antonium,

ne ſi a du-
ceretur Ro-
mam à Caſa-

re, aſpide ſibi
mortem con-
ſciſſit.

manis

actis ſub-
antiā diſſer-

riſolium af-
igit ſanus
articulus.

icuta ſtur-
nos alit, nos
perimit.

eratrum
le coturni-
s, homines
percat.

epus mari-
us pulmonē
exulcerat.

antharis
veſicam aſſi-

difficilius in-
ta nihil re-

eriri poſſe
deleterius me-

dicamentis,
vriq; ſerius
maculantib.

Androma-
chæ cōmune-
ratio.

theriace qui
us cōſe-
nat affectū

Artiſcorum
heri. morum
ræparatio.

paſtillorum
ſcillinorum
ræparatio.

Theriaces
antidoti ſe-
cundæ An-

tromachum
cōpoſiſſe.

manis conspici. Quo consilio duas mulieres fidi-
simas, Naëra nempe & Carmionem, quas ad pul-
chritudinē corporis mundo subministrando ha-
bebat, ad se vocavit, eisq; iussit ut ferā uvis ficu-
busq; tectam importaret, quō (ut dixi) custodes
falleret, prius factura periculum in ipsis mulieri-
bus, an subito perimere posset. Quēq; dem quum
actutum perissent, ferunt ipsam postea sibi exi-
tium pariter conciliasse: fuisseq; tandem inventā,
manu dextra capiti admota, & diadema, sicut
est consentaneū, tenente, ut vel eousq; spectatori-
bus videretur esse regina: quemadmodum Poly-
xenā scribit Tragicus, quā & ipsa moriens, accu-
ratē tamen dedit operā, ut cum decoro caderet.
Qua ex re Augustum vehementer fuisse attoni-
tum memorant, partim ob ancillarum erga regi-
nam amorem, ut cū ea mori nō dubitarint: par-
tim quod illa generosam potius mortē maluerit
oppetere, quam vivere in servitute. Recitavi
hac historiam, ut ex ipsa intelligeremus, q̄ subi-
tam id genus ferā nobis perniciem concilient.

*Polyxenam
dedit operam,
ut cum decoro
tam moribunda
caderet.*

*Viperam ore
excipere geni-
turam a ma-
re, eiusq; ca-
put abscinde-
re post semen
exceptum.*

*Viperam pro-
lem iniuria
paterna sin-
dicem ma-
tris & ventrem
perfcindere,
atq; sic nasci.*

*Murium ca-
pita.*

Milvi caput.

*Cameli cere-
brum.*

*Hirundinis
cerebrum.*

*Cornu tau-
rinum.*

*Cornu cervi-
num.*

*Castorium.
Stercus bu-
bulum.*

Muscerda.

*Lac Vaccinū
dysentericos
sanat.*

*Viperæ pelli-
cula mirē pi-
los regenerat.
Cancer flu-
vialis.*

Ceterum vipera inter reliquas omnes feras ca-
put habet ad inferendū exitū promptius. Ajūt
autem ipsam os aperire ad excipiendam genitu-
rā a mare, qua excepta, illius caput abscindere:
atq; hūc ipsis esse pravi cōplexus modum: dein-
de prolem ex semine genitā, matris ventrem e-
rodere, forasq; erumpere, ac sic injuriæ paternæ
vindices, propriā matrem perimere. Mirum au-
tem esse nō debet, si capitibus & caudis præcis-
is, reliquæ viperarū partes efficacius medicamen-
tum reddant: præcipuē carnes ipsarum quib. ad
servandum facultas quædā est insita, quum reli-
quorum animalū etiam plerāq; partes, multis
morbis opitulentur. Nonnullis quippe murium
capita usta, ex melleq; indita, alopeciā sanare pos-
sunt. Milvi quoq; caput absq; plumis cōbustum, si
quis ex eo quantum tribus digitis comprehendi
potest, bibat, ajūt podagræ opitulari. Cameli ce-
rebrum arefactū, potumq; ex aceto, comitialib.
morbis medetur: & mustelē similiter. Hirundi-
nis cerebrum ex melle, ad suffusiones oculorum
conducit: ut ovillum ad dentitiones infantium.
Taurini cornu rasura cum aqua pota, sanguinis
eruptionē cohibet: femoraq; cōbusta, etiam san-
guinem supprimūt, ut sæpenumero alvum solu-
ta. Cervini cornu ramentū adustum, & cum vi-
no tritum, circunlitumq; vacillantes dentes cō-
firmat: id quod bovis talus etiā facere perhibe-
tur: qui etiam ex lacte potus, educit rotundos lū-
bricos: ex oxymelite, lienem consumit: et leucas
tollit illitus, mediocriterq; venereus existit. Te-
sticuli castoris poti, cōvulsionib. auxiliātur. Ster-
cus bubulum aridum cōbustumq; trium coch-
learium mēsurā juvat hydropicos. Muscerda ex
aceto trita alopecias per sanat: in potu aut sum-
pta, lapides vesicę comminuit. Adeps anserinus
inflammationib. cum rosaceo medetur. Cervi me-
dulla mitissimum medicamen existit. Vaccini la-
ctis potus dysentericos adjuvat. Fel hyænæ, vi-
sum exacuit. Hippopotami cutis usta, & laviga-
ta ex aqua, illitaq; digerit phymata: quemadmo-
dum pellicula viperæ redacta in pollinē, alope-
ciisq; imposita, mirē pilos regenerat. Exuvium a-
spidis ex melle tritū, illitumq; acutissimū visum
cōciliat. Cancer fluviatilis tritus, illitusq; spicu-

la & surculos extrahit. Cātharis similiter laviga-
ta, cū bryoniæ radice pota, educit vermes. Scor-
pius assus, atq; ex pane comestus, vesicæ lapides
cōterit. Terræ intestinū ex vino assumptum, idē
molitur. Tritum & ex melicrato bibitum, arcua-
tum morbū explodit. Ex rosaceo cerato impo-
situm, podagricis inflammationibus convenit. Ac-
cipiter in sulino unguēto decoctus, hebetudini
oculorū medetur. Scarabeus in oleo frictus, au-
riq; instillatus, dolorib. ipsius auxiliatur. Alau-
da usta si edatur, mirificē colicos juvat. Multa e-
tiam vel cōspecta duntaxat, vim suā ostendunt.
Stellio quippe visus a scorpionibus, substringit
ipsos & perimit. Amphisbenā si q̄ mulier gravi-
da supergrediatur, facit abortum. Itaq; nō est mi-
rabile, si viperarum corpora, amputatis partib.
illis, auxiliandi etiā robur obtineant: imō nec si
morsib. ab ipsis met factis solæ viperę succurrere
possint, vel si nobis inimicissimæ sint. Traditur
liquidē nonnulla animalia, si sanguinem q̄dem
humanum ex vulnere manātem cōtingant, cō-
morsos occidere: si verō vorentur, nec sanguinē
degustarint, vulneratos servare incolumes pos-
se, quemadmodum & de Helenio etiā proditum
est, quo nimirum Dacas, Dalmataq; ajunt cus-
pides telorum imbuere, q̄ videlicet postquam
sanguinē vulneratorum attigerit, ipsa occidere
possit: quum ab ipsis tamē citra ullā noxā edatur,
cervi; a sagittariis per cōtactum eius enecti, tu-
tō etiā comedi possint. Jā verō a crocodilo ob-
latis, ipsius adipem vulnere impositum, summo
esse præsidio novimus: murisq; aranei morsus
æque letales, ab ipso redacto in pulverem, sup-
positoq; citra dolorem juvari. Similiter qui a vi-
pera sunt percussi, effugiunt periculum, si trita
ipsarum corpora vulneribus imponantur. Ete-
nim si q̄l veneni in viperea carne est relictum,
id multiplex ea præparatio delet: plurimum aut
illi facultatis auxiliatricis largitur. Cantharis
nāq; sola exhibita, vesicā exulcerat, & inimicum
est ipsi medicamentum, sæpenumeroq; sua facul-
tate vehemēti, hominem jugulat: multa verō q̄
busdā aliis, salutaris vesicæ redditur, urinamq;
vehementer provocat. Succus etiam papaveris,
q̄ potus per se admodum perniciosus existat, la-
tere neminem arbitror: sin autem cum nonnullis
aliis sit præparatus, ægros ita subinde juvat, ut
maximē saluiferum esse ipsis medicamentum vi-
deatur. Itaq; phreniticorū deliria sæpe genero-
se curavit: destitutosq; robore, ob diuturnas vi-
gilias, cōcilians illis somnū, manifestē restituit.
Quin etiā ab araneis cōmorsos ipsi aranei triti,
& cum vino poti, malo liberant. Si igitur solum
vinum feris mistum, a periculo reddit securos,
nimirum theriaca maximē salutare medicamen-
existet, utpote ex tottalibusq; cōfecta pharma-
cis, quorū qualitates totæ per totas miscētur, &
alterantur, cōspirantesq; in unam eandemq; na-
turalem temperiem, cōmunem quandam facul-
tatem atque naturā acquirunt, ab ea diversam,
quæ antea singulis inerat. Eligenda tamen sunt,
explorandaq; singula medicamenta, prius quā
antidoto indatur: solent quippe a fraudulentis
hominibus quam creberrimē adulterari. Unus
autem cuiuspiam vitium subinde universa con-
taminat. Porro quū varij variē hanc antidotum
præpa-

Cantharis

*Terræ in-
stinum.*

Alauda

*Stellio &
a scorpionibus
eos perimunt.*

*Vipera fo-
morsibus
ipsis met factis
opus est.*

*Helenij su-
infestas fa-
tas, esse le-
les.*

*Muris ara-
nei pulvis
nat ab ipso
emorsos.*

*Cantharis
per se vesicā
exulcerat,
aliis autem
admissa salu-
tare illius
redditur me-
dicamen.
Papaveris
succi facul-
tas.*

*Aranei triti
poti; ex vi-
no, morsus ab
ipsis asserunt
Theriaca*

*constitues-
tum phar-
macorū qua-
litates, totas
per totas mi-
sceri, conspi-
rareq; in na-
turalem quā-
dam communemq;
omnium tempe-
riem.*

præpa

Theriaca præparent, nos compositione Andromachi, ceu
Androma- omnium præstantissima utimur, in regioſq; uſus
chi præfer- eam præparamus. Venari autem oportet viperas
tur ceteris. initio veris, cum latebris relictis, foras in apricū
Vipera quan- prodeunt, & non adhuc virus tam exitiale reti-
do venanda. nent. Intus nāq; deliteſcentes, cum nulla ex par-
 te diffentur, magis ſunt pernicioſæ. At egreſſæ,
 exuvium, crasſum tegumentū ſolent deponere.
 Quare non ſtatim ipſas capere oportet, ſed per-
 mittere ut aëre aliquandiu fruantur, conſuetōq;

Vipera qua-
les ſint deli-
genda.

Vipera ſemi-
na masculis
discrimina.

Theriaces cō-
ficiunda ra-
tio.

Theriacam
reponendi
ratio.

Theriacam
duodecim an-
nis ad perfe-
ctionem con-
coqui, eſſeq;
validam uſ-
que ad annos
triginta, ju-
vareq; etiā
ſexagenariā.

Theriaces
probanda ra-
tio.

Theriace
quibus opi-
tulatur affe-
ctibus.

vescantur cibo, hoc eſt, herbis, bupreſtibus, can-
 tharidibus, & pityo campis. Eligendę autem ſunt
 colore ſubflavæ, * eximia quadā agilitate mobi-
 les, cervices admodū extenſas habentes, oculosq;
 tum inflāmatos, tum impudētes, atque adeo in-
 tuentes ferinū. Sint etiam latiore capite, corpore
 aut atq; ventre craſſiori, meatūq; habeant magis
 ad extremū caudæ locatū: quæ non involuta, ſed
 potius cōverſa eſſe debet: ac deniq; trāquillū in-
 cedant: qua ſanè re à masculo diſtinguitur ſcemi-
 na, quodq; caninos dētes habeat plures duob. Jā
 verò ſi caudis capitibusq; amputatis, exanguia
 protinus, immobiliaq; ac prorsus mortua, ipſa
 animalia cernātur, ad medicaminis cōpoſitionē
 nō conferūt. At ſi motū, ſanguinemq; conſervare
 aliquandiu poſſint, tunc eas, ceu præſtantiffimas
 coques ad conſciendos trochiſcos, quatenus di-
 ctum eſt. Porro medicamenta reliqua cōtunde-
 re, cribrōq; incernere quam ſubtiliſſimo oportet:
 nam lævia inſigniter admodū mihi juvare viden-
 tur, quod facilius apponantur corporib. Quæ con-
 ſpergenda lævigandaq; ſunt, ea vino Falerno lævi-
 gentur & conſpergantur. Deinde omnib. in hunc
 modum contritis, Hymettii mellis mediocriter
 cocti, liberas denas adjicies. At reſinam chalba-
 nūque, ſeorſum prius eliquata, in mortario po-
 ſtea ipſi medicamento immiſcebis: omniāq; tan-
 dem manibus modicè opobalſamo intinctis, ſi-
 mul atq; accuratè conſundes: atq; itaq; antidotū
 in vitreis aut argenteis vaſis repones. Non autem
 vehementer ipſa replebis, ſed relicto quodā ſpa-
 cio, quò medicamentū perſpiret. Quare frequen-
 ter operculum detrahes, ut & liberiſus exhalet, &
 maturior tibi ipſius uſus cōtingat. Quippe haud
 modico tēpore ad concoctionē indiget, ut quan-
 do uſus poſtulet, antidotus probè ſit cocta. Con-
 coquitur aut plurimū duodecim annorū ſpacio.
 Cæterū qui vigentiore ipſa uti volunt, etiā quin-
 to anno, ſeptimōq; eam exhibent: præſertim iis
 qui à virulentis beſtiis, & à cane rabido ſunt com-
 morſi: necnō in medicamentis letalibus. Eſt au-
 tem potens medicamentū ad uſq; triginta annos.
 Nam in aliis affectibus, ubi tanta noxæ cauſa non
 eſt, ſufficere videtur, cum uſus exigit, etiā ſexage-
 nariū. Etenim ubi huius antidoti facultas eſt vā-
 lida, ſi ſumatur poſt pharmacū purgās, eiſus ope-
 rationē ſupprimat: ſi verò imbecilla, minimè pur-
 gationem impedit. Juxta differētias autem affe-
 ctuum, ipſius medicamēti quantitātē metimur,
 congruūq; miſturæ modū adminiſtramus. Si-
 quidem præter affectus doctos, capitis diuturnos
 dolores atq; vertigines ſanat, auditūq; difficul-
 tatem, & oculorū hebetudinē corrigit. Comitā-
 libus etiam opitulatur: rejicientēſq; ſanguinem
 plurimū juvat, ſi quis ipſam cum ſymphyto de-

coctā, dilutāq; ex aqua exhibuerit. Inſuper in-
 teſtinorum vermes exterminat, hepaticos & lie-
 noſos reſtituit, dyſenterias, lenterias, volvolōſq;
 præſertim cum inteſtina vacant inflammatione,
 perſanat. Præterea cum corpus multis & copio-
 ſis ſudoribus diffluit, ipſiusq; robur eſt exolutū,
 nec morbus vini potionē admittit, theriace epo-
 ta ſudorē ſiſtit, & collapsas vires corroborat. Jam
 verò in mulieribus etiam menſes educit, & uteri
 ſedisq; ſuppreſſas hæmorrhoidas ſubinde ape-
 rit. Nam cum varia miſtāq; facultate ſit prædita,
 ideo alia diffundēs extenuanſq; cogit ut excer-
 nantur: alia ob virtutis imbecillitatē præter mo-
 dum fluentia, ſolet, vires inſtaurans, cohibere.
 Quin etiam univerſis articularibus morbis auxi-
 lio eſt, cum præterierit augmenti tempus, vigo-
 riſq; ſtatus acceſſerit: tunc nāq; fomentis dolo-
 rem leniens, antidotū propinabis: quæ ſanè flu-
 xiones infarctas diſcutiet, & irruentes arcebit.
 Prodeſt Theriace & ſanis, ſi crebrò ipſam aſſu-
 mant. Hoc auxilio uſi ſæpe ſuccurrimus elephan-
 tiacis. Nec verò corporis tantū, ſed animi quoq;
 affectibus auxiliatur. Quippe melācholicis vitiis,
 ſi ſæpe exhibeatur, medetur, ipſam atrā bilem ex-
 hauriens: quare pulchrè ad febrem etiam quar-
 tanā convenit, quandoquidem ab atrā bile tra-
 hit ortum. Ego igitur multos laborantes quarta-
 na, hoc præſidio facile liberavi. Nam vomitū
 prius ſecundū cibum ipſos evacuans, deinde inſe-
 quenti die ſuccū abſinthii exhibēs, ita horis dua-
 bus antè acceſſionem propino antidotum, proti-
 nūſq; æger frequēter liberat ab acceſſione. Aquæ
 etiam pavorē, omnium morborum peſſimū, qui
 morſos à cane rabido ſæpe invadere ſolet, tollere
 hoc medicamen conſuevit. Quo quidem morbo
 correpti, aquā timent, ac propter multā aridita-
 tem, humidi deſiderio tenentur, cæterum à potū
 abſtinent, quia mente alienati, id quod auxiliari
 poſſit, non conſiderant. Proinde ſit, ut aquā fu-
 gientes, inareſcant, & convellantur, ob febrem
 qua intus uruntur: miſerrimoq; tandē mortis ge-
 nere intereant. Canē porro furentē & rabidū, ab
 eo qui nihil tale perpeſſus ſit, facile dignoſcere li-
 cet. Siquidē ſi audieris gracilem corpore, ſiccū,
 oculis inflāmat, caude demiffa, ſpumante ore,
 lingua exerta, eaquē bilis colore infecta, obvium
 quemq; inſiſſiſſe, citraq; rationē cucurriſſe: dein-
 de rursus ſubitò volentē cōſiſtere, furorē quodā
 inſano percitū, momordiſſe nō ſibi anteā prævi-
 ſos: hæc inquā ſi in eo ſic habere intellexeris, ſta-
 tim rabidū eſſe canē intelliges. Quare vulnus ab
 ipſo illatū longe vaſtius efficies, carne multo in-
 tervallo orbiculatim præciſa, ne facile ad cicatri-
 cem perveniat: ſed foramen diu, quadraginta ut
 minimū diebus, pateat, ut per ipſum canis vi-
 rus emanet. Cauteriis igitur admodū candenti-
 bus locū ſolemus adurere, & alius uti medicamē-
 tis, quæ extrahendi vim obtinent. Ego vero anti-
 dotum ipſam roſaceo miſtam aliquando in vul-
 nus indidi, ut cucurbitulæ inſtar exurgeret, ab al-
 toq; virus ipſum extraheret: ut quæ non modò e-
 pota, ſed etiā admota extrinſecus rabidorū mor-
 ſibus præſentaneum remediū exiſtat. Sed neq; ad
 peſtilentē luem (quæ & ipſa velut ſera quædam
 exiſtens, ab aëris putredine exorta, per inſpira-

Theriace cor-
poris & ani-
mi affectib.
auxiliatur.

Quartana
febris cura-
tio.

Aqua pa-
ris omnium
morborū pe-
ſſimi deſcri-
ptio.

Canis rabidi
noſe.

Morſus à ra-
bide cane cō-
tracti cura-
tio.

Morſum ra-
bidi canis eſ-
ſe conſervan-
dum apertū
ut minimum
quadragin-
ta dies.

Theriacam
etiam admo-
tā vulnere,
auxiliari ca-
nis rabidi
morſui.

Peſtilentē lu-
em eſſe vel-
ut ſeram
quandā, ab
aëris putre-
dine exorta,
eig; nihileſ-
ficatus The-
riaca.

tiones infiliens, haud unum aut alterum hominem, sed plures quoque civitates depascit, vastat, & populatur) reperire est aliud efficacius remedium.

Pestilentiam Nam quemadmodum constat divum illum Hippocratem, per solam alterationem aeris, discussisse olim ab Athenis pestilentem ejus constitutionem, nimirum abegit Hippocrates per totam urbem ex aromaticis lignis & suavissimas pyras simis floribus, variis pyris extructis, ut aerem purum hoc modo redditum, inspirarent homines in mali subsidium: simili ratione theriace, seu ipsa quoque ignis quidam purgatorius existat, praesumens quidem ipsam in pestilenti aeris statu, nequam malo corripere finit: correptis autem mederi potest, malitiam inspirati aeris in alteras, nec ipsam amplius grassari permittens. Quare in prospera quoque valetudine, ut crebro utaris hac antidoto, consulo, sed praecipue dum per horridam hyemem iter facturus es. Jam vero antidotus haec sensus omnes confirmat, acuit mentem, adeoque ob varietatem miscellae, ab injuriis corpus securum facit, ut ne a deleteriis quidem evinci possit: ut fertur de Mithridate, qui non theriace (ut quae nondum erat) sed alia antidoto, quam Mithridationem appellavit suo nomine, praemunitus, non potuit veneno interire. Cum enim a Pompeio victus, in extremis cogeretur sibi sano per venenum mortem committere, medicamento copioso epoto, ipse quidem ob praesumptam antidotum defungivita non potuit: filiae autem, quae ob eximium erga patrem amorem, oppetere cum eo mortem volentes, idem medicamentum hauserunt, subito animam exhalaverunt. Quod Mithridates sentiens, Pytho suo familiari injunxit, ut ipsum jugularet: qui pharmaci opus absolvens ferro, eum mori violenter coegit. At vero theriace utendum est post absolutam coctionem, interdum quidem instar Aegyptiacae fabae, cum binis aquae cyathis, ubi exiguum ad concoctionem ipsius intervallum erit: interim vero avellanae nucis magnitudine, ex tribus aquae cyathis, cum plus temporis ad pharmaci distributionem es habiturus. Ceterum per aestatem ne utiquam id pharmacum capere consuluerim. Similiter aetate florentibus, calidissimisque naturis, nec multum, nec saepe id exhibendum censeo: iis vero qui jam inclinant, & plurimum, & crebro, non ex aqua, sed ex vino, ut propinetur, suadeo. In pueris omnino vitandum id medicamentum est, ut quod facile corpora eorum dissolvat. Memini siquidem aliquando puellum ex intempestivo usu antidoti dissolutum fuisse.

De salibus theriacis.

Sales theriaci ad praedictos etiam affectus faciunt, modice tamen ac longo tempore. Neque enim evanescit ipsorum facultas, tamen ex combustis viperis conficiantur. Multa siquidem evadunt ignis commercio meliora, aut latentem naturam edunt. Aurum quippe judicamus per ignem: adulteratumque igne coargitur: ac flamma exacte purgatum, esse probum apparet. Ferrum igne mollescit, flexumque nobis ad multos vitae usus est aptum. Nunquid etiam plurima quae ingeruntur in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea redduntur? Etenim (ut alia praeterea) vinum statim ab uvis pressum, est crudum: a Solis autem igne concoctum, suavissimum & maxime potabile redditur. Chalcitis etiam cruda quidem corpora exurit: cocta vero

cicatricem inducit corporibus. Lapis Phrygius crudus acerrimus est: ignitus & cum aliis quibusdam tritus, fit oculorum praesentaneum remedium. Spongiae combustae cinis, sanguinis fluxionem potenter inhibet. Viperarum itaque simul omnes integraeque combustae, infusa pravitate deponunt, ab igneque salubres redduntur. Peculiariter autem sales medentur maxime affectibus per summam cutem obortis, leucis dico, lepra, atque agresti impetigini: abiguntque pedunculos, proprie ex corruptione enascentes. Praeterea dentes optime abstergunt, erodique non permittunt, ac flaccidas gingivas condensant, earumque fluorem atque putrilaginem reprimunt. Praeparatio autem eorum est talis: Viperarum praedictis similes, & eodem tempore captae, numero quatuor, non plus biduo post venationem sumantur. Praestiterit tamen si eodem die quo sunt captae, iis utaris. Dein salis ammoniaci, vel communis, colore albi, & leniter splendentis, modius Italicus. Cum quo tunduntur minutatim, gentianae Creticae lib. j. s. astrolochiae rotundae tantundem. Centaurii tenuis comae lib. ij. cardamomi, Armeniaci prasii, sing. unc. vj. Scordii montani, selini, chamaedryos Creticae, sing. lib. j. rutae sativae seminis tantundem. Melle Attico haec uniuntur, & selibra ipsorum in ollam fictilem vacuum conjicitur. Postea quatuor serpentes vivae: mox scillae tenerae, admodumque recentes, quinque numero, conciduntur minutim: ita reliqua aliorum pars dimidia adjicitur: atque ubi cooperueris ollam, lutoque diligenter obleveris, quatuor foraminibus ipsam pertundes, ut per eam vapor coctionis mensuram indicet. Nam primum fumus copiosus, obscurus, turbidusque expirare videbitur, notans ignem jam invasisse bestias: quae quidem ne inspires ipse, tibi summe cavendum est. Postea ubi vapor cessaverit, & tenuem quandam flammam per foramina exhibere contpexeris, tunc ipsa exquisitè esse cocta censeo: atque ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerans. Deinde exemptos carbonem, diligenter eos tundito, & cum his quae subdam, incernito. Rutae agrestis seminis, hyssopi Cretici, sing. unc. ix. agrestis feniculi seminis, nardi Celticae, stachyos Scythicae, sing. unc. vj. petroselini Macedonici unc. iij. amomi uvae unc. iij. origani heraciotici summitatum unc. ix. hormini seminis torrefacti unc. iij. thymi Attici summitatum unc. ix. Malabathri Indici fol. unc. iij. baccarum juniperi Laconici carnis lib. ij. coriandri sativi sem. uncias vj. piperis albi & nigri, singul. unc. ij. silphii rad. unc. x. zingiberis lib. ij. satyrii sem. vel rad. pulegii montani, seselis Massaliotici rufi, tortili montani seminis, menthae, sing. unc. vj. casiae optima unc. ij. cinnamomi unc. j. Rursus omnia contundito, concernitoque, & reponito in vitreis vasis: neque utaris ipsis nisi post dies fere denos. Porro ego sales ipsos alias praeparavi, non viperarum sed earum loco tantundem theriacorum pastillorum, una cum aliis medicamentis comburens: qua industria ipsos longe praestantissimos feci.

Quae habentur in libello de theriaca ad Pamphilianum, ea omnia huic, qui ad Pisonem inscribitur, insunt longe cumulatiora. Quare illum ex industria reliquimus.

GALENI PERGAMENI
de antidotis, lib. I.



Edicamenta quæ non extrinsecus corpori imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliant, antidotos Medici appellant. Tres autem in universum differentiæ ipsarum existunt. Nonnullæ siquidem lætaliū medicamentorum gratia offerunt: quædam cōtra virulentas feras opitulant, aliæ affectibus ex prava victus ratione obortis succurrunt. Sunt quæ tres hosce polliceant usus, ut theriace ab Andromacho præparata, quæ Mithridation dictam ab usu hominum relegavit. Siquidem cum theriace haud exigua viperarū carnē contineat, hoc nomine ad viperarū morsus præstantior q̃ Mithridation existit. Ad alia verò Mithridation nihilo minus valet: imò est etiā in quibus præstantius se exhibeat. At nō easdem vires obtinet ipsæ antidoti, & post noxia medicamenta, & ante eadē assumptæ. Nam quæ ipsarū quantitas, cum præsumunt, sufficit ut hominem illæsum custodiat, ea quadruplo, aut quincuplo aucta, cum post venenum datur, auxilio est: idq; non semel quotidie, sed bis. Quod si quis etiā singulis diebus, quemadmodum nostro seculo Imperator Aurelius Antoninus, vel ut ipse Mithridates, medicamentū capiat, omnino à deleteriis venenis erit securus: ut Mithridatē ferunt, cum exitiali hausto medicamento, potius mortē oppetere, q̃ subijci Romano Imperio, eligisset, nihil reperisse quod perimere ipsum potuerit. Porro Antoninus summo studio singulis diebus ex ipsa theriace, instar fabæ Aegyptiæ, deglutiebat citra ullum liquorē: à qua postea, cum in quotidianis actionibus premeretur sopore, detraxit papaveris succū. Rursus autem cum cruciaretur vigiliis, coactus fuit ex theriace inveterata; cæterum ex opio confecta, aliquantulū addere. Quippe eiusmodi medicamenta, si vetustiora sint, ipsam papaveris lachrymam longē mitiorē obtinent. Danda autē maximē opera est, ut medicamenta ex quibus huiuscemodi antidoti præparantur, q̃ exploratissima sint: quandoquidem passim solent adulterari. Quæ quidem ut exquisitissima habere, ipse invisi alias tum Cyprū, tum Palæstinā Syriæ: navigaviq; in Lemnū. Porro in quo singula medicamenta aliis gustu aut odore præstāt, in illo sanē, id quod validū est, principē inter similia specie, sibi vendicat locū. Sic enim mel dicimus præstantissimū esse, quod dulcissimū & acerrimū inter omnia alia fuerit: quodque colore pallidum, media sit cōsistentia, defluensq; sensim, suam cōtinuitatem tueatur. Danda autē opera est, ut quod vinū hisce medicamentis miscetur, validū atq; firmissimū sit, ita ut nō immutetur amplius. Etenim imbecillima & aquatissima vina, aut vehementer austera, maximeq; omnium vinorū acefcentia (hæc enim sunt alba & tenuia) ubi prævenerint primis annis acefcere, reliquo tempore permanēt. Hæc autē ut caput minimē feriūt, sic nec corpus manifestē calfaciūt, nec cōcoctioni in vētriculo & venis quicq̃ perspicuē conferūt, nec alendo corpori subministrant: q̃vis inter omnia vina celerrimē inveterent, hoc est,

promptē in veterascentiū qualitatem mutantur: quæ qualitas, acrimonia est cum perspicuo calore: postea verò, amaror, in quem acrimonia mutatur. Cæterū ut vina ipsa vel acorem, vel amaritudinē contrahāt, locus in quo asservātur reposita confert. Qui quidē optimus initio est frigidus: postera verò calidus: aut ē contrario, calidus per initia. Nam tepidus, faciliē ipsa in acorem vertit. Nonnulla autem sunt adeò imbecilla & aquosa, ut ne initio quidē frigus tolerant. Ac talium custodiendorum gratia, Pater meus stoicis copiosa calidaq; in calidissimā domum coniecta, vasa repleta occultabat: qua industria usus, nunquam habuit acidum vinum, sed celerrimē omnia veterascentia. Quò autem nunquā ab scopo aberraret, vasis infundebat vinum non novis, sed ex quibus aliquod jam vetus vacuasset: curabatque ut furni, fociq; in propinquo ipsi thecæ vinariæ essent: qua ratione etiam in multis Italiæ locis vinum calferi intellexi. Verū quæ in hunc modū parantur vina, ut firma durabiliaq; sunt, sic capitis dolorem conciliant, propter fumi qualitatem quā contraxerunt. Itaq; eiusmodi omnia vina in medicamentis componendis, quæ intra corpus sumenda sunt, evitabis. In emplastris verò, & aliis quæ extrinsecus imponuntur medicamentis, etiam talibus uti, si meliora desint, nihil prohibet. Ad antidotos ergo Falernū vinum, quod nondum præ vetustate amaricet, optimū est. Præstat autem ad theriacen deligere id quod dulcius fuerit, gratia gustus gratioris: cuius sollicitudo in medicamentis quæ deglutiuntur, habenda est. Jam verò mel omne vetustum, redditur ex coctione amarum: neq; id mirū est, cum vel citra cocturam, tēpore amarior ex dulciori reddatur. Quare quod fuerit inveteratum, fugiendum ad antidotos est. In universum autē, Medicum debere esse peritū omnium stirpium, aut plurimarum, oportet. Siquidem cōpositorum medicaminum virtus, vires simplicium sequitur; exigua quadam in ipsa cōposituræ ratione differentia obveniente. Differentiæ autem stirpium sunt, arbores, frutices, herbæ, spinæ, virgulta. Porro theriaces cōpositio quam descripsit carmine Andromachus, habet in hunc modum.

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac deinceps rationem conficiendæ Theriaces explicat: quæ omnia consulto reliquimus, quod sint prorsus eadem quæ habentur in commentario ad Pisonē. Itaq; ea tantum annotabimus impræsentiarum, quorum in illo non meminit.

GALENIUS.

Quod pertinet ad viperarum capturas, neq; iuxta marina loca, aut aquas falsuginosas venandæ sunt. Quippe antidotum ex huiuscemodi cōpositū viperis, sitim conciliat. A foetis etiā est abstinentum. Jam verò, dum coquuntur, salis injici debet, siquidem convenienti tempore viperas ceperis, modicū: sin autem æstate, nihil. Panis ad cōficiendos artifices soleo miscere ipse vipereis carnibus quartam aut quintam partem. Qui nisi probē sit tostus, verendum est ne pharmacum ipsum acefcat. Satius autem est ut multo citius siccentur, aridum panem cum ipsis carnibus accuratissimē lavigare, ac si tennes orbiculos fin-

Veterascentiū
um vinorum
qualitas est
acrimonia
cum perspi-
cua calore,
cui postea
succedit a-
maritudo.
Vina repo-
nendi ratio
Tepidus lo-
cus vina in
acorem ver-
tit.
Stoben con-
ducere ad ce-
lerem conco-
ctionem vino-
rum.

Vina quæ
maturaverūt
presidio i-
gnis, capitis
dolorem con-
ciliant.
Vina anti-
dotis empla-
strisq; com-
moda, qua-
lia esse debe-
ant.

Mel vetu-
stum ex cocti-
one amari-
cat, id quod
tempore vel
citra coctu-
ram perpeti-
tur.

Compositorū
virtus, vires
simplicium
sequitur.
Stirpium
differentiæ
quæ sint.

Viperas ce-
nandi ratio.

Artifices The-
riacos confi-
cendi ratio.

gere, quàm si etiam brodium viperarum affundas. Reponi aut debent ubi afficati fuerint, in vase stæneo, vitreove, aut aureo. Cæterum vitreum quidem & aureum, nullum dolum admittit: stæneum verò adulteratur plumbi mistura. Tale igitur vitare convenit in universis antidotis: veluti & quod argento non purgato confectum est. Celerimè namq; & huic ærugo oboritur. Durat vigor ipsorum orbiculorum, si curiosè sint resiccati, & repositi, tribus & quatuor annis. At scillini trochisci, ex tribus scillæ optimè tostæ partibus, & duab. tenuissimæ farine erui, similiter conficiunt. *Post hæc subdidit Galenus descriptionem magnatis Hedychroi, quam habes in commentario de Theriaca ad Pisonem.*

GALENUS.

Ex medicamentis quæ theriacem cōstitunt, longum piper solet adulterari. Cæterum adulteratum quidem, affusa aqua solvitur: quod verò adulterio caret, insolubile permanet. Contrà autem, verum sagapenum statim aqua rigatum solvitur: quod non tale est, eliquescit minimè. Sciendum autem est chalbani partem in sagapenum degenerare. Similiter etiam optima casia in cinnamomum transit. Nec secus in optima myrrha opocalpason reperitur, ab ipsa mirrha diversum. At opocalpason est letale: mutisq; ob insciam mirrhæ, quæ opocalpason continebat, conciliavit exitium. Nam de industria nonnulli antidotum præparantium, ipsam ut laudatissimam injecerunt: quod collyriis inditam, optimū esse medicamentum viderent. Quemadmodū igitur in pueris gemellis invicè similibus, qui quidem non eis assueverunt, alterum ab altero nequeunt discernere: iis autem qui unà vixerunt, facillima est ipsorum dignotio: ita qui inter singula medicamenta est versatus, facile vel minimas eorum differentias cognoscit: quæ latent illos, qui ipsa semel tantum aut bis conspexerint. Rosæ ad theriacem eligendæ sunt aliis omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Unūquodq; si quidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem valentissimum possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exilia, sed quæ probè nutritam, solidamq; consistentiā sortiuntur. Scordium optimum, ex Creta nobis advenit: quod quidem cadavera supra ipsum jacentia, diutissimè tueri à putredine proditur. Opobalsamū adulteratur plurimis modis, quos præmoneo, ne qs fortè doctrina mea abutar. Quare neq; eos probo, qui scripturas letalium medicamentorum invulgant. Porro cinnamomū optimū debet odoratissimū esse, gustanti calidū: colore autē tale, ut si quis lactis colorē fusco admiscuerit, cum cœrulei pauxillo. At agaricū (quod sanè adulteriū nullū admittit) laudatissimū est, quod levissimū: ut densum, grave, & lignosum, deterimum. Crocus optimus est, qui flavissimus, odoratissimusq; existens, longo tempore in vigore perdurat. Jam verò in cinnamomi penuria, duplicata casia portio injicienda est. Carpesio etiam sæpe loco phu utimur: est enim similis genere cū eo facultatis, sed valentioris, nonnihilq; odoratum refert. Sunt enim tenues festuæ, sur-

culis cinnamomi persimiles. Nardus Indica quæ radix quidem est (licet ob similitudinē formæ quam cum spicis habet, spica nardi vocetur) non est emenda elota. Unguentarii quippe, coquentes prius eam, ut ad alia ipsius decocto utantur, postea inutilem vendunt. Rheon quoque ipsum adulteratur. Quandoquidem statim in regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipsum, decoquunt, donec totum cremorem reddat: quem postea cremorem, ubi accuratius percoxerint, ceu purum, atque ab aquæ mistura alienum, ad nos transmittunt: sicuti & rheon ipsum siccatur, tanquam neque id prius cocturam fuerit expertum. Cognoscetur tamen facile dolus: nam ejusmodi rheon nec densam, compactamve substantiā possidet, ut quod integrum est, sed rarius apparet, astrictionemque aut obscurā, aut planè nullam gustanti exhibet: quam tamen rheon vicens validissimam possidet.

Deinceps Galenus modum præparandæ Theriacis tradit: qui quidē iam expositus est in commentario ad Pisonem. Subiungit etiam compositiones eiusdem antidoti, à Damocrate, atque etiam Critone proditas: quas quidem (quia descriptionem Andromachi unice commendat Galenus, eiq; esse inhaerendum censet) studiosi brevitatis omittimus.

GALENI PERGAMENI
de antidotis, lib. II.

Quandoquidem de Theriace toto priore libro tractavimus, in præsentī de cæteris antidotis differamus, ab iis quæ Andromachus descripsit, exorfi.

Antidotus Mithridatia, ad letalia peculiariter efficax, ad omnesque internos affectus. Dulcis radicula drach. vij. s. obolos iiij. opii drach. iiij. obol. ij. castorei drach. vj. polii drach. v. obol. ij. costi tantundem: spicæ nardi drach. vj. obol. ij. casia drach. v. obol. ij. thuris drach. vj. seseleos drach. v. obol. ij. hypocistidis succi drach. vj. acri drach. ij. scordii drach. vj. obol. ij. folii drach. iiij. salis drach. vj. cypheos drach. vj. obolos ij. myrrhæ drach. vj. croci drach. vij. obol. ij. cinnamomi tantundem: styracis drach. v. obol. iiij. dauci seminis drach. vj. obol. iiij. zingiberis drach. vj. obol. ij. phu Pontici drach. ij. petroselini drach. iiij. obol. iiij. nardi Gallicæ, fœniculi seminis, nardi Indicæ, sing. drach. iiij. hyperici, acaciæ, utriusque drach. ij. gentianæ drach. iiij. anisi drach. iiij. Thlaspi drach. vj. obol. iiij. meu athamantici drach. iiij. rosarum siccarum, cardamomi, sing. drach. iiij. gummi drach. ij. junci odorati rotundi drach. vj. obol. opopanicis tantundem: opobalsami drach. vj. obol. iiij. chalbani drach. vij. scinci drach. ij. obol. ij. resinæ terebinthinæ drach. vj. obol. ij. vini Chii quod sit satis: mellis Attici cocti quantum sat esse videatur. Conficito.

Antidotus Aëlii Gaii, ad letalia & virulenta omnia: quæ, si inspergatur ubi frequentant serpentes, eos fugat. Facit ad omnē oculorum fluxū, & reliquarū partium. Discutit omnes molestias animi, febresq; longas & circuitu repetentes persanat. Ad hæc, menses, fœtusq; absq; difficultate educit, auxiliaturq; phthificis, avellanæ nucis instar epo-

Vasa vitrea
et aurea
nullum dolum
admittere,
stænæ aut
adulterari
plumbi mi-
stura, ac pro-
inde ablegan-
da ab anti-
dotis.
Scillinorum
confectio.

Piper longū
adulteratū
affusa aqua
solvitur.
Sagapenum
aqua rigatū
solvitur.
Chalbani
pars transit
in sagapenum.
Casia in cin-
namomū con-
vertitur.
Opocalpasū
est letale, re-
periturq; in
myrrha.

Præstantissi-
mum esse me-
dicamentū
quod propriū
generis sui o-
dorem Galen-
issimū pos-
idet.
Scordium ca-
davera in-
corrupta tue-
ur.
Letaliū me-
dicamentorū
doctrinā in-
vulgandā nō
esse.
Cinnamomi
optimi nota.
Agarici opti-
mi nota.
Crocii optimi
nota.

Carpesi fa-
cultas.

Spica nardi
radix est, sed
ob similitudinē
nam quæ
cum spicis ha-
bet sic appel-
latur.
Rheon ad-
ulterandi mo-
dus.

Rheon esse &
hermenter a-
stringens gu-
stus.

Antidoti Mi-
thridatis de-
scriptio.

Antidotus
Aëlii fugans
serpentes ad
compluresq;
affectus per-
utilis.

star epota, cum aqua cyathis quaternis. Ad vi-
pereos tamen morsus, ex vino exhibetur. Myr-
rhæ drach. xij. croci, nardi, utriusque drach. xij.
iunci odorati rotundi drach. xij. cinnamomi
drach. ij. amomi drach. iiij. chalbanī drach. ix.
resinæ terebinthinæ drach. v. piperis albi drach.
x. longi drach. xxxij. costi drach. viij. thuris drach.
xij. lachrymæ papaveris tantundē: scordii drach.
l. polii drach. iiij. hypocistidis succi drach. xij. pe-
trofelini drach. viij. seselis drach. xiiij. dauci se-
minis drach. xvj. opobalsami drach. xij. opopa-
naxis tantundem: castorei drach. viij. mellis At-
tici sextar. ij. Conficito.

¶ *Damocratis Antidotus ex sanguinibus
ad venena.*

*Antidotus ex sanguini-
bus a Damo-
crate scri-
pta.* Sanguinis anserini, & marinæ testudinis, & a-
natis, & hædini, siccorum omnium, sing. drach.
ij. Myrrhæ stillatitiæ, spicæ nardi, sing. drach. x.
cinnamomi drach. vj. rosæ fol. sic. drach. viij. iun-
ci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, pi-
peris albi, utriusque drach. iiij. piperis longi drach.
j. s. croci drach. xij. casia drach. viij. trifolii radi-
cis drach. v. polii tantundem: opobalsami drach.
iiij. petrofelini drach. iiij. baccarum juniperi, aco-
ri, rheu pontici, meu, dictamni, phu, ammoniaci
thymiamatidis, fœniculi, sing. drach. ij. agarici
drach. ij. s. saxatilis rutæ drach. iiij. dauci drach.
ij. anisi, asari, ameos, cumini, sing. drach. j. s. sem-
napi sylvestris drach. iiij. scordii Cretensis drach.
v. mellis optimi duplum omnium. Detrita om-
nia, coctoque melle excepta, vasis indito.

¶ *Rosacei pastilli confectio ex Damocrate.*

*Rosaceorum
pastillorum
confectio ex
Damocrate.* Rosæ virentis foliorum lib. iiij. iunci rotundi
drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Con-
tusis rosas atque per setaceum transmissis, addan-
tur reliqua cominuta: ac postea rursus simul tun-
dantur, rediganturque in prægrandes orbiculos.

¶ *Crocomagmatis preparatio.*

*Crocomag-
matis prepa-
ratio.* Croci Cilicii drach. c. myrrhæ pinguis, rosarū
ficcarū, amyli, gummi, sing. drach. l. Omnia vino
odorato, marinæ aquæ experte, excipiantur &
lævigentur, ac denique in trochiscos fingantur.

¶ *Antidotus Prælagiens nomine: qua ebibi-
ta, venenum cum cibo sumptum, prorsus red-
detur vomitu.* Lemniæ terræ drach. j. obol. ij.
baccarum juniperi drach. ij. lævigentur exacte
cum olei dulcis pauxillo. Propinatur ex mulsa,
nucis ponticæ magnitudo.

¶ *Asclepiadis, ad eos qui letalia bi-
berunt, remedia.*

*Remedia ab
Asclepiade
scripta ad e-
os qui letalia
biberunt.* Papaveris lachryma epota, cōfert movere vo-
mitum ex hydrelæo calente, vel ex oxycrato cali-
do, alvumque clysmis subducere. Opio epoto, me-
rum copiosius statim bibitū iuvat: aut piper cum
vino. Conducit etiam lac asininū haustum: atque
clysmi mitiores. Sumpto aconito, iuvat mani-
pulum rutæ, lævigatum vino meraciori, ebibere.

Si altercum nocuit, lac asininū, vel quodvis a-
liud, cū mulsa calida opitulatur. Si viride corian-
drum, auxiliatur vinū meracū potum, & pingue
jus gallinarū. Lepore marino assumpto prodest
lac asininū bibere: sin minus, vaccinū, aut capril-
lum. Si toxicum potum sit, vinum dulce adjuvat,
oleum rosaceū, sanguis caprillus, semenque napi
contritum ex vino. Quibus fungi obfunt, dari de-

bent raphani crudi quamplurimi: item vinū me-
racū, & cineris sarmentarii lixivium: præterea si-
trum aceto dilutū, aut sæx vini combusta, tritaque
cum aqua: aut absinthium ex aceto, aut denique
ruta ex aceto trita exhibetur. Si iuxta fuerit inge-
sta, succurrit absinthium potū cum vino, casto-
reo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & vomitio-
nes ciere. Buprestis assumpto, passi plurimi po-
tus, ac dein vomitus opitulatur: nec non lac ca-
lidum bibitum, decoctumque ficuum in potu da-
tum. Si cantharides haustæ sint, conducit passum
ex oleo bibere, plurimumque etiam lactis haurire,
& plures nucleos pini esse: aut cantharidum alas
pedesque cum melle detritos linctu assumere. Psi-
lithro hausto, prodest calentis olei potio, & vo-
mitio excitata: nec non lac caprillum, & malvæ
coctæ succus, si cum oleo hauriatur. Spuma ar-
genti pota, auxiliatur, piper, apiū, myrrha, cum
vino lævigata, bibitaque. Gypso ingesto, dari debet
potui, cineris sarmentarii lixivium, & thymus ex
aqua tritus. Lacte in grumos coacto, iuvat aceti
potio. Item coagulum ex aqua fontana bibitum.
Vel sulfuris, sulphurisque æqualis portio, lævigata ex
posca, bibitaque. Hirudinem devorata, alii
muria, alii nivis, alii aceti potu expellere tentant.

Asclepiades spongiam teneram frigida imbu-
tam faucibus demittere jubet, ut hirudo spongiæ
infixa extrahatur. Qui cerussam hauserint, iis con-
fert olei calidi potus, vomitusque: nec non lactis
asinini haustus. Cum autem ignoratur species dele-
teriorum quæ aut comesta, aut bibita sunt, aqua
affatim calidā cum oleo propinare convenit, ad
vomitumque incitare. Utile etiā fuerit, & circun-
cidere somnum, subscriptisque confectionibus uti.

¶ *Apolloniæ pharmacum præserva-
trium veneni.*

Rutæ folia xx. nuces juglandes ij. salis grumus
unus, caricæ duæ. Offerantur simul jejuno stoma-
cho: noxam quippe a letalibus prohibent. Aliud, *Antidotus
Apolloniæ
Veneno præ-
servans.*

Baccarū juniperi drach. ij. lemnii sigilli drach. ij.
& obol. ij. trita exceptaque oleo reponito. Porrigi-
tur ex hydromelite instar avellanæ nucis. Hac an-
tidoto Nicomedes rex utebatur, si quando eorū
qui invitassent ipsum, habebat fidem suspectā.

¶ *Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta ad
letalia medicamēta, & cuiuslibet virulenti ictū.*
Auxiliatur etiam ventriculo, in quo cibus ace-
scit: nec non sanguinē spuētibz, diuturna tussi
infestatis, ac breviter jecorariis & lienosis, vesi-
cæque & uteri affectibus. Piperis albi grana xl.
costi, meu, asari, acori, dauci Cretici seminis, pe-
trofelini, nardi Indicæ, lapidis Nestoris, sing.
drach. iiij. croci, myrrhæ, sing. drach. viij. cinna-
momi, casia, sing. drach. xij. mellis Attici cocti
quod sit satis. Datur nucis avellanæ magnitudi-
ne, ex mulso temperato.

¶ *Antidotus Zyporia vocata, ad prædicta om-
nia, ad aliosque affectus efficacissima.*

Opobalsami drach. iiij. nardi Indicæ, myrrhæ
Troglodyticæ, iunci rotundi floris, cinnamomi,
characii, costi recentis, piperis longi, hypocisti-
dis, polii, piperis Peræatici, scordii, meu Cretici,
cardamomi, sing. drach. iiij. thuris masculi, car-
pobalsami, dictamni, sing. drach. vj. petrofelini,
casia rubentis, singul. drach. viij. croci Corycij
HH iiij

*Antidotus
Apolloniæ
Veneno præ-
servans.*

*Athanasia
Mithridatis.*

*Antidotus
Zyporia.*

drach. viij. mellis Attici quod sit satis. Datur nuncis avellanæ instar, si febris abest, ex vino: febrilentibus, ex hydromelite.

¶ Mithridatis Theriace, qua rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à lethali veneno assere- ret. Cum itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibi ipsi mortē intulit. Confectio ipsius secundum Androma-

chum habet in hunc modum. Pastillorum scil-
linorum drach. xlviii. pastillorum theriacorū,
piperis nigri, hedychroi magmatis, lachrymæ
papaveris nigri, sing. drach. xxiii. rosarum sicca-
rum, junci rotundi odorati floris, polii, scordii,
feminiis napi, iridis Illyricæ, agarici, cinnamoni,
dulcis radiculae succi, opobalsami, sing. drach.
xij. roris marini drach. viij. myrrhæ, croci, zin-
giberis, rheu pontici, quinquifolii radicis, nepi-
tæ montanæ, marrubii, petroselini, stæchados,
costi, piperis albi, thuris, sing. drach. j. oboli. ca-
siæ nigrae drach. iij. piperis nigri drach. j. longi
tantundem: mei, asari, acori, dauci feminiis, an-
serini sanguinis sicci, anatis sanguinis, sing. drach.
iij. Excipiantur melle Attico, & cocto.

¶ Theriaca Aelij admodum efficax.

Bryoniæ radicis drach. xvj. trifolii feminiis, o-
popaniceis, sing. drach. viij. aristolochiæ tenuis
drach. xij. roris marini radicis, iris Illyricæ, zin-
giberis, opii, sing. drach. viij. rutæ sylvestris semi-
nis drach. xij. cumini Æthiopici drach. xvi. myrrhæ,
casia, castorei, feselis, eryngii radicis, serpyll-
li, lachrymæ Cyrenaicæ, sing. drach. vi. Medicæ
drach. xii. sagapeni drach. vi. croci drach. v. erui
farinæ drach. xxiiii. Finguntur pastilli ex aqua
triobolares, danturque cum vino.

¶ Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspi-
dum morsus, pleuritidesque, & quartanam fe-
brem, si post vomitum, instar avellanæ nuncis su-
matur. Castorei drach. vi. opopaniceis, sagapeni,
feselis, cachryos, chamædryos, chamæpityos,
marrubii, sing. drach. xvi. styracis, bituminis
Judaici, myrrhæ, sing. drach. vii. lachrymæ pa-
paveris drach. viij. mellis lib. j. Conficito.

¶ Alia ad febres omnes repetentes per cir-
cuitus, Harpalo authore.

Myrrhæ drach. iij. piperis longi vel albi, opii,
sing. drach. ij. castorei oboli. iij. s. cardamomi
drach. iij. sagapeni drach. ii. Trita cum aqua in
pastillos coguntur, qui obolos duos pendeant.
Propinentur singuli cum cyathis duobus Adria-
ni vini, & aquæ fontanæ coctæ, quaternis. Si fe-
bris urgeat, cum hydromelite.

¶ Potio Cratippi ad morsus rabidi canis.

Cancrorum ulstorum drach. xx. myrrhæ drach.
ij. croci drach. i. s. gentianæ drach. j. piperis albi
grana x. vini quod ad excipienda sit satis. Datur
drachma una, cum vini cyathis tribus temperati.

¶ Album emplastrum Baphulli, quod rabido-
rum moribus commodissime extrinsecus admo-
vetur: daturque etiam catapotium ex eo nuncis avel-
lanæ instar, ad dies xl. Est autem alternis diebus a-
movendum à vulnere, ac rursus, ubi elueris sor-
des, imponendum. Ceræ ponticæ lib. ii. spumæ ar-
genti, cerussæ, sing. lib. olei veteris sextarii: myr-
rhæ, medullæ cervinæ, utriusque drach. ij. thuris
drachma. Argenti spuma oleo coquitur, & cum

mutata fuerit, cerussa inspergitur, ac cera misce-
tur. Ubi tam spissum evaserit, ut manus non in-
ficiat, ab igne sublato, medullam, myrrham, &
thus injicito.

¶ Diophanti medicamentum, ad Scorpionum
ictus, & phalangiorum morsus.

Aristolochiæ drach. iij. piperis drach. ij. opii
drach. j. pyrethri drach. iij. Fingantur pastilli
fabæ Ægyptiæ magnitudine, denturque duo de-
glutiendi, & vini meraci cyathi duo.

¶ Aliud ad periculosos Scorpionum & pha-
langiorum ictus.

Rutæ sylvestris seminis, erucæ seminis, pyre-
thri, styracis, sulfuris vivi, sing. drach. vj. casto-
rei drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ter-
nos obolos ex meraco vino exhibero.

¶ Aliud ad eadem optimum, conferens
etiam parturientibus agræ.

Myrrhæ, castorei, styracis, singulæ drachmæ.
Opium drach. ij. chalbuni drach. iij. Apii seminis a-
cerabulum. Anisi tantundem. Piperis grana 30. Fin-
gitur ex vino, daturque drach. j. ex vini hemina.

¶ Epithema ad phalangiorum ictus, & omnis
serpentis: quod etiam in potu auxiliatur. Sulfuris
vivi, chalbani, utriusque, denarii iij. Liquoris Liby-
ci, nucis avellanarum purgatarum sing. drach. ii. vino
dissoluta, & melle excepta imponuntur. Ad vi-
perarum morsus optimum pharmacum ab Apol-
lodoro compositum. Cumini sylvestris seminis
acetabulum, testudinis marinæ sanguinis drach. iij.
coaguli hinnuli, vel leporini, drach. iij. hædini
sanguinis drach. iij. Omnia mista, vinoque opti-
mo excepta, reponito: atque olive magnitudinē,
ex vini optimi cyatho dimidio, dum usus postu-
labit, porrigito. Heræ antidotus, qua Marcus
Cathegetes est usus. Trifolii bituminosi seminis,
aristolochiæ rotundæ, rutæ sylvestris, erui in-
solati, sing. drach. vj. Vini excipiuntur, fiuntque
pastilli drach. iij. daturque unus ex vino & oleo.

¶ Alia ad letalia, iecinorosos, inflationes ven-
tris, & incipientes aquæ subter cutem suffusiones
efficacissima. Myrrhæ drach. v. nardi Syriacæ
drach. v. s. junci rotundi floris drach. ii. s. casie
drach. iij. cinnamomi drach. iij. piperis albi ses-
quidrach. thuris drach. & obolus: costi drach.
Excipiuntur Attico melle, fingunturque nuncis a-
vellanæ instar, ac dantur ex mulso vel aqua.

FINIS.

Complura alia ad eosdem affectus, ex diversis au-
toribus congerit Galenus remedia. Nos vero ex om-
nibus ea in tuam gratiam, Candide Lector, eligimus,
quæ & præstantissima videbantur, & facilius para-
ri possunt. Habes ita omnes commentarios Galeni,
in compendium enchiridionque redactos, excepto forte
uno vel altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit.
Nam quod pertinet ad commentaria in Hippocra-
tem, quicquid in eis continetur cremoris (nisi fatalia
decreta consilium nostrum hoc intercipient) hoc est,
universas sententias, instar Indicis atque alphabeti
digestas, brevi in lucem edemus. Tuum igitur est,
illis bene precari, qui in hoc sunt tori, ut tuis com-
modis serviant, recteque tuis studiis
consulant.

AD

Mithridatis
regis theria-
ce, qua præ-
munitus, cum
postea Gene-
no extingui
non posset, se
se gladio per-
emit.

Theriaca Ae-
lij.

Theriaca
Euclidis.

Diophanti
medicamen-
tum ad Scor-
pionum & pha-
langiorum
ictus.

Parturienti-
bus agræ, me-
dicamentum con-
veniens.

Viperarum
morsibus
pharmacum.

Apollodori
pharmacum.

Morsus rabi-
di canis potio
Cratippi.

Candidum
Baphulli.

AD ORNATISSIMUM VIRUM, D.D. CASPARUM DE LAHOZ, CANONICUM SECوبيENSEM,
Scriptorem Apostolicum, ac bonarum literarum cultorem maximum, ANDREÆ LACUNÆ
Secوبيensis, Militis S. Petri, de ponderibus & mensuris medicinalibus
Commentarius.



ETUS PROVERBIUM, ET QUAM VERISSIMUM EST, MI Caspare, Vir ornatissime, optimam esse, mensuram in rebus omnibus: cum nimirum omnia quæ in vita & sunt & geruntur, ab ea suam absolutionem, suam lucem, suumq; ornamentum sortiantur: nihilq; iustum, rectum, aut inculpabile sit, quod mensura (quæ sola virtus inest omnibus rebus) destituatur. Quamobrem si exquisitè expendamus singula, quæ cælesti illa machina ambiuntur, quæq; supra cælos consistunt, omnia certè inveniemus exactam quandam mensuram, commodationemq; à suo conditore accepisse, quam perpetuò tuentur, dum nature leges non transgrediuntur. Quippe uniformes illæ orbium cælestium lationes, perennes astrorum cursus, ordinatæ vicissitudines temporum, conspirationes elementorum, generationes deniq; omnium quæ supra terram & subter illam fiunt, non aliandè quàm à symmetria quadam, quæ in accurata partium mensura consistit, proficiscuntur. Iam verò, quod sanitas quidem corporum, aliud sit nihil, quàm debita & absoluta mensura eorum, ex quibus conflantur: morbus autem, ab hac symmetria recessus quidam & lapsus, quis ambigit? Nemini etiam est dubium, decreta & leges Reipub. mensuras quasdam existere, quæ singulis suum ius dispensant. Ut autem ipsius mensuræ summam efficaciam & vim, exemplo familiarissimo exponam, pœmata optimis documentis & sententijs exculita: si metro claudicent, hoc est, mensura non consent, confestim stomachū movent, nauseamq; & fastidium gignunt. Contrà verò, quæ symmetra existunt, etiam si pudicitiam offendant, moresq; iuventutis corrumpant, magnificè ab omnibus celebrantur: tantum authoritatis vendicare sibi videtur emmetron. Ceterum cùm in alijs omnibus humanis actionibus, si rectè perfici debeant, mensura quadam exquisita desideretur, tum vel maximè in arte Medicæ ea ipsa requiritur: ut in qua, vel minima à pondere ac mensura aberratio soleat semper agris perniciofa & piacularis existere. Nā cùm generatio nostra, incolumitasq;, miscella quatuor elementorum debeat, certa quadam mensura confluentium & conspirantium in unā eandemq; temperiem: sanè si quando rhythmus huius solvatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eò, iusta etiam, exploratissimāq; mensura eius, quod lapsus corrigere possit, administrata. Quæ neglecta, si quispiam admoliatur prasidia corpori, morbi seminariū augebit, aut affectum alium maligniorem inducet: ita ut nō minus cavendum à tali medico sit, quàm à morbo ipso. Cùm igitur inter alia Galeni opera, redegissem nuper in succinctam periochen commentarios illos de compositione medicamentorum κατὰ τὴν φύσιν κατὰ τὸν πῶς, ditissimos nature humane thesauros: persuasumq; haberem, neutiquam ex eorum lectione percepturos aliquid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarū non essent ad amassim exercitati: sed potius occasionem capturos, quæ sibi ignominia notam, agris conciliarent summam internecionem: precium operæ me facturum existimaui, si quæ veteribus, ac præcipuè Galeno, circa pondera & mensuras medicinales conscripta sunt, aggerans, ea omnia paucis exposita, sub præfatione nominis tui, in publicam studiosorum commoditatem ederem: ut vel ex hoc argumento, amicitia nostra, & nunquam peritura necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si quis hinc fructus ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec verò collectanea hæc de mensuris cuiquam aptius quàm tibi nuncupari potuissent, qui (ut ceteras ingenuissimas tui animi dotes impræsentiarum subiceam) diu noctuq; astronomicis studijs indulgens, in eisq; felices tuas horulas haud oscitanter collocans, non modò plagas has inferiores, sed cælos etiam ipsos metiris, menteq; supra illos eveheris: contrà quàm faciunt pleriq; alij, qui ubi semel quæ pertinent ad cutem curandam sunt nacti, adeò ingenuarum artium, bonorumq; omnium institutorum infelices obliviscentur, ut ne inesse quidem sibi animam recordentur: ac proinde obruti, demersiq; cæno suarum cupiditatum, corporisq; mole depressi, eam, quocunq; tandem irruat, sequantur: tantū abest ut (exemplo tui) cælum unquam suspectent, aut in meditatione rerum palcherrimarum asininas suas cogitationes exercent. Hi tamē mancipia umbilici sunt: à quorum ingenio tam abes ipse, quàm qui longissimè. Quippe ita uteris fortuna bonis, quæ tuo Marte acquisita, tibi quàm largissimè suppetunt, ut eorum quidem quæ ex usu sunt, nihil desit corpusculo, amicisq; omnia communia fiant: animus autem ipse minimè ab eis præpediatur, sed ad altiora aspirans, excolatur atque locupletur alijs ornamentis & opibus, quæ tantò illis

*splendidiores & augustiores sunt, quãdò mens nostra corpori dignitate antecellit. Quo sanè tã admirabili amore sapientie accensus, etsi fluctibus negociorum nunquam non obruaris, quæ maxima cū dexteritate administras: semper tamen philosophiæ studiis incumbis, in eisq; tam feliciter promoves, ut diuinum istud ingenium tuū sæpenumero admirari cōpellar. Ne aut̃ huic nostro cōmentariolo contingat, quod patriæ utriusq; nostrum communi Secobia accidit, cuius quidem suburbia sunt civitate ipsa ampliora, non agam hīc tecum pluribus, cū tempe-
liuum iam sit, ut promissis satisfaciamus.*

1289



Orum quæ metiri homines solent, quædam solida, corpulenta, gravia, & sibi cōtinua sunt, ut lapis, cera, lignum, & ferrum: quædā solida quidem & sicca, sed dissoluta & minutula, qualia accumulare cōsuevimus, ut hordeū, oryza, & triticum: quædam demum in liquidis fluidisq; consistunt, e quorū numero est oleum, vinum, & mel. Quæ igitur sub prima differentia comprehenduntur, gravitate dijudicantur: cui negocio statera est inventa. Quæ verò humidam consistentiam possident, vasculi cavitate expendantur. At ea quæ cū sint arida, aggerari in cumulum possunt, medio genere ambigūt: modò quippe ipsa librare, modò vasculis mensurare cōsuevimus: quemadmodū liquores fluentes. Quāq; hi quoq; sæpenumero revocāt ad stateram. Liquida quippe omnia quæ corpori administrant, universi ferè jam ponderāt, si Hispāos pharmacopolas excipias. Hi nanq; nō pondere, quæadmodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed vasculi cavitate liquida medicamenta metiūtur: id q̃ equidē probare ullo modo non possum. Nam cū ex liquoribus, hi quidem graviores sint, illi autē leviores, atq; tenuiū partium: certē necessum est, dum eos omnes ex æquo pari vasculi cavitate dispensant, gravissimè interdum hallucinentur, capitaliq; errore labāt. Nemini siquidē in ambiguo est, quæ crassa sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimū continere substantiæ: ut pauxillum sub tumore laxiori, quæ raram consistentiā sortiuntur. Etenim si accipias unam heminam olei, vini aliā, ac tertiam deniq; mellis: cōperies planè oleum quidē ipsum, uncias ix. pendere, vinum autem x. mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad vinū sit sesquiplum. Quod verò ajunt, se nō una eademq; mensura, oleū, mel, atq; vinū metiri, sed eorum liquorū singulis habere suā destinātā: id illos non reddit à culpa immunes. Nam cū in generibus singulis nō parvum discrimen sit penes gravitatē & levitatem (omphacinū enim oleum, exempli gratia, quod olivæ immaturæ fuderunt, hyoscyaminūve, tenuitate partiū & levitate, multis numeris ab irino relinquitur) contingit sanè, ut dum cujusq; individui uncia unā sese administrare arbitrant, alterius quidē plus, alterius autem longè minus exhibeāt, ac sic artis præcepta evertant. Deberent itaq; aut liquorum universos librare, aut singulis eorum speciebus, mensurā peculiare præscribere: quam quidem investigare, esset nimis operosi negocij.

Porro mensura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornea, pellucidaq; , & lineis quibusdam orbicularibus, quibus uncia discerneretur, incisa. Sunt autē innumera ponderū ac men-

1290

surarum genera, secundū varietates regionū ac morū. Quamobrē ea describemus impræsentiarum duntaxat, quæ urbi Romæ, antiquissimæ totius orbis metropoli, semper fuerunt familiarissima: cū præsertim Galenus universas ferè pharmacorū compositiones, ad mensuras Romanorū, ponderaq; , reduxerit: cum quibus, ubi exposita fuerint, facillimum cuiq; erit, quæ apud alias civitates in usu habentur, conferre.

¶ De ponderibus.

Nomina ponderū medicinaliū, in quæ medicī passim incidunt, sunt, mina, libra, uncia, drachma, scriptulus, obolus, filiqua, & granū. Romana igitur mina continet libras xx. Nam Aegyptia, & Attica, xvj. tantum constant. Libram autem xij. uncia constitunt, quarū singule ex drachmis octo cōstantur. Porro drachmā Galenus idē esse vult cum Romano denario: quāvis contendat aliqui, eam esse partem septimā uncia. Constat autem drachma scriptulis tribus, quæ à Græcis δραχμή, scrupuli à neotericis, corrupta voce appellantur. Quorū quisq; duos obolos continet: ut horum singuli, filiquas tres, quæ & cerialia dicuntur. At verò unaquæq; filiqua, grana quaternā pendet. Reperiūtur etiā creberrimè inter nomenclaturas ponderum, faba Græca & Aegyptia: ac præterea nux juglans, & Pontica. E quibus Græca quidē faba, duos obolos pendit: Aegyptia autem, drach. j. s. At iuglans nux, filiquas lxxij. ut Pontica xvij. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, facillè ex hac tabella discernes.

Mina Aegyptia	unc. xvj.
Mina Romana	unc. xx.
Libra Romana	unc. xij.
Uncia	drach. viij.
Drachma, five denarius, five olca, script. iij	obolos ij.
Scriptulus, five scrupulus	filiquas iij.
Obolus	grana iij.
Siliqua	obol. ij.
Faba Græca	drach. j. s.
Faba Aegyptia	filiquas lxxij.
Nux iuglans	filiquas xvij.
Nux Pontica	

Si igitur ubiq; locorū & gentiū, libræ, uncia, & drachmæ, essent inter se eadem, liceret profectò nobis, iuxta Galeni dogmata, in quavis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Cū autem evariēt passim ea pondera, certē nisi quis omnia illa ad tabellam præscriptā revocet, singulaq; ad amussim expendat, priusquā alicui pharmacū catharticū porrigat, fieri ullo modo nō potest, quin ab scopo aberrer, videlicet aut plusq; sit ex usu, propinans, aut minus quàm morbus postulet. Equidē experiētia didici, Hispanicā uncia Romana esse obolis duobus maiore. Parisiensem, ferè integra dra-

chma;

chma. Coloniensis, Bruxellensis, atq; Antuerpiensis uncie, sunt similes: quarum singula Romanam tribus obolis superat. Ab hac uncia Veneta (qua experiundi gratia, nuper in officina quadam libravi), p. modum sesquidrachma relinquitur. Si quidem Veneta libra medicinalis, Romanae librae uncias x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harum differentiarum possem ipse jam in singulis horum locorum numerum drachmarum intrepidè & augere, & detrahère: id quod mihi non perinde liceret absq; summa ægrotantium clade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuo, accuratè prius non explorassem. Quam cum haberem perspectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus illustrissimi D. D. Ioannis à Mendozza, Cæsarei apud Venetos Oratoris splendidi, suscepi curandum, unciam unam solventis pharmaci exhibui: cuius in urbe Roma propinare drach. vij. ausus non fuisset.

De notis ponderum quibus medici in officinis utuntur.

Ut autem Græcorum characteres, quibus pondera exprimunt, impræsentiarum præteream, ceu nihil ad eos pertinentes: Medici recentiores provincia, hanc notam & usurpant: quemadmodum hanc, & pro drachma: similiterque illam & pro scriptulo: subdentes postea numerum quem expedire arbitrantur. Ut si ori ventriculi confirmando huiusmodi unguen instituerimus: & olei absinthii, & cydoniorum, ana. & ij. nardini. unc. s. ceræ elotæ drach. v. pul. coralli, & menthæ, ana. & i. perinde sonant ac si scribamus: Olei absinthii & cydoniorum, sing. unc. ij. Nardini unciam dimidiam: ceræ elotæ drach. v. pulveris Coralli & menthæ, singulorum scriptulum unum, &c. Quippe vox, ana, quæ aliquando etiam in Galeni commentariis occurrit, cuiusq; partes æquas significat. Præstaret autem medicamentum ipsa quæ in se humani generis vitam, necemque gerit, minime quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Quandoquidem jota unum sublatum aut additum, imò verò etiam apiculus unus, sepe ægros ipsos in exitum atq; internecionem adegit. Porro ut flores solent dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Communiter autem volunt esse pugillum, quantum tribus digitis apprehendi possit: manipulum verò, quantum tota manu. Ac pugillum quidem hac nota, P. manipulum autem hac, M. nostri Medici exprimunt.

Græce liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in usu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex commentariis Iacobi Sylvij, Medici hac nostra ætate clarissimi, excerptæ.

Cadus, sive sive Cerauniu, capit choas, hoc est, Romanos congios xij. vel libras mēsurales cvij.

Choa sive Cōgius, sextarios sex capit, seu Atticas cotylas xij. seu libras ix.

Sextarius cotylas ij. seu libram unam & dimidiam, seu cyathos xij. continet.

Cotyla, quam nonnulli heminam appellant, quartarios ij. seu uncias mensurales ix.

Semicotyla recipit acetabula duo, vel uncias

iiij. cum dimidia, existens quarta sextarii pars.

Acetabulum (Græci ἀέβειον vocant) sesqui cyathum, seu uncias ij. & drach. ij. pendet.

Cyathus conchas ij. seu mystra iiij. seu chemas v. cochlearia x. seu secunciam.

Concha Mystra ij. seu chemas ij. cum dimidia, seu drachmas sex.

Mystru chemen unam, & quartam eius partem, seu cochlearia ij. cum dimidio, seu drach. iiij.

Cheme cochlearia ij. seu drach. ij. script. j. & grana iiij. & quatuor quintas grani.

Cochlearium drach. j. scriptulum dimidium, grana ii. & duas quintas grani.

Porro vinum nona parte pondus olei excedit. Mellis autem ad vinum proportio est sesqui pla: hoc est, tertia parte mel ipso vino est gravius, ut liquet ex tabella subdita.

Cerauniu I-	OLEI	VINI	MELLIS
20 talicu habet	lib. xc.	lib. c.	lib. cl.
	lib. vij. & semisse	lib. viij. unc. iiij.	lib. xij. & semisse.
Congius		unc. xv. drach. v. script. j.	lib. ij. unciam una
Sextarius	unc. xv.	unc. viij. drach. ij. script. ij.	lib. j. drac. iiij.
Cotyla	unc. vij. drac. iiij.	unc. ij. scrip. ij.	unc. iij. drach. j.
30 Oxybaphu	seunciam drach. iiij.	unc. ij. scrip. ij.	unc. ij. scrip. ij.
Cyathus	drach. x.	unciam j. drach. iiij. siliquas iiij.	unc. ij. scrip. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximè utuntur.

Medimnus capit chœnicas xlvij.

Chœnix cotylas iiij. vel sesquiseptarium, seu libras ij. & quadrantem unum, & unc. iiij.

Sextarius cotylas ij. seu unc. xiiij.

Cotyle oxybapha iiij. seu unc. ix.

Oxybaphum, sesquicyathum, seu unc. ij. & drach. ij.

Cyathus cochlearia x. seu secunciam.

Cochlearium drach. j. script. s. grana ij. & duas quintas grani.

Crebro autem usurpat Galenus hanc vocem Bessum, quæ quotiescunque occurrerit, pro uncis octo accipiat.

Hæc sunt itaq; Vir ornatissime, quæ sub tuo nomine volui ut omnibus fierent communia studiosis: quare pro tua feceris dignitate, si ea contra vitiligatorum morsus defenderis. Vale feliciter, plurimumq; saluta meo nomine communes utriq; nostrum amicos, atq; integerrimos viros, D. Berrocalem, Scriptorem Apostolicum: necnon D. Falconem à Guevarra, Iurisprudentiæ licentiatum absolutissimum,

Venetis, III. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

HH

CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO VI-
RO, D. D. JOANNI AQUILERIO, MEDICO PONTIFI-

cio, bonarum literarum fautori maximo, ANDREAS LACUNA Secobiensis,

Doctor Medicus, Miles S. Petri.

S. P. D.



QUOD ACCIDERE UNIVERSIS PARTURIENTIBUS SOLET, ut dum in labore quidem versantur, se iurent amplius non parituras: postea verò extra discrimen posita, rursus & concipiant, & pariant: id nunc mihi planè contigisse videtur, Vir clarissime. Nam cum haud ita pridem Epitomen omnium Galeni operum, verè laboriosissimum partum, exarandam in publicam studiosorum commoditatem curarem: ac partim quidem immensis laboribus fractus, partim praeli difficultates ac molestias summas pertasus, constituiissem, ac propèmodum apud me deierassem, non futuram mihi amplius rem cum typographis: posteaquam fœtus iam editus est in lucem, violare iusiurandum compellor, Galeniq; Pergameni vitam toti Operi, cœu colophonem quendam, apponere. Revocavit siquidem me ab instituto, cum illius Viri dignitas, amplitudoq; tum mea in eum observantia, adeoq; ipsius utilitas operis. Sciebam quippe Galenum, is qui vitam illius, mores, atque instituta praelegerent, incredibilem quendam amorem sui excitaturum, ut multò ardentius, maioriq; cum voluptate, in Epitome sese nostra exercerent. Quocirca illum quidem ad vivam formam exprimere, expressumq; unà cum operibus suis edere, statui. Caterùm quia verendum erat, ne Galenus noster, hospes & peregrinus cum sit, si in quempiam nebulonem incideret, contumelia aliqua afficeretur, (sunt enim exteri maximè iniurijs obnoxij) haud perperam me facturum existimaui, si ductorem illi & protectorem aliquem iungerem, qui eum contra insultus Arabum, ac Barbarorum insidias, tueretur. Cui muneri subeundo, dum quoque versus, dispicerem, neminem te aptiorem inveni, Vir ornatissime, qui adeò illius semper fuisti studiosus, ut vel me ipsum etiam impuleris, ad condendam illam omnium operum eius periochen: quam provinciam, nisi victus instigatione tua (id quod ingenuè fateor) neutiquam suscepissem. Nam cum de nulla re sis aequè sollicitus, ac de salute publica (qua tua summa bonitas, atque animi integritas est) semper aliquid meditaris, quod in communem omnium usum redundet. Quo nomine universi tibi debemus plurimum. Taceo singulares tuas istas animi dotes, prudentiam, temperantiam, lenitatem morum, constantiam, multiugamq; omnium disciplinarum peritiam, quæ nos adducunt, ut non minori admiratione, quàm amore, te prosequamur. Meritò igitur ob hasce tam insignes virtutes, quibus conspicuus eras, reverendiss. & illustrissimus in Christo Pater D. D. Ioannes à Toletò, Cardinalis Burgensis (iudicio cuius exquisitissimo non solent placere nisi optima) ex Salmanticensi Academia, in qua olim cum maxima laude & gloria profitebaris artem Medicam, simul & Astronomiam, te allectum, nec vulgari conditione honestatum, unà secum abduxit Romam. Quæ in urbe, quanta cum dexteritate, studio & pietate, artem Medicam exerceres, abundè exploratum habens Paulus III. P. M. ultrò accersivit te, ascripsitq; inter primarios Medicos suos, summisq; tandem vitæ ornamentis auxit atq; locupletavit. Qui quidem non secus tua dicta amplexatur, acquiescitq; consiliis tuis, ac si illa ab Apolline acceperit. Ut igitur eò undè digressa est, nostra revocetur oratio, Emittimus tibi cœu strenulam quendam, Galeni Pergameni vitam, per quem ipse tantum honoris & dignitatis es consequutus. Quam quidem ubi diligenter perlegeris, non modò non pœnitebit te propensionis, qua in illum hætenus indulgentissimus fuisti, sed etiam multò ardentius posthac amore illius inflammaberis. Vale Vir ornatissime, pergeq; ut cœpisti, de ingenuis artibus ac disciplinis mereri optimè. Venetijs, quarto nonas Aprilis,

M. D. XLVIII.

GALENI

GALENI PERGAMENI VITA, CUM EX IPSO GALENO, TUM EX HIERONYMO GEMUSÆO, ALIISQUE VARIIS AU-

toribus, per ANDREAM LACUNAM Medicum, militem S. Petri,
summo studio collecta.



ON POSSUM NON EXCANDESCERE IN VIROS QUOSDAM novarum opinionum autores, qui Galenum, Pergamenum fuisse inficiantur. Cuius rei non modo apud varios historicos, sed etiam apud ipsum Galenum, innumera testimonia extant. Nam ut complura alia omittam, certè libro primo de Compositione medicamentorum secundum genera, apertissimè patriam suam Pergamum esse testatur, hunc in modum pronuncians: Hoc medicamentum non ex eorum numero est, quæ à me primum composita sunt: sed iam annis multis antè, à Rege nostro, Pergamensibus imperante, Attalo, viro omnigenorum medicaminum studioso, &c. Similiter libro secundo de Pharmacorum compositione secundum partes, sic ait: Nam & frigidorum fontium & nivis, multa Romæ est ubertas, quemadmodum apud nos in Pergamo. Eodem libro sic rursus subdit: Atq; ad hanc rem nostrum Pergamenum atramentum scriptorium præcellit, &c. Fuit autem Pergamus Asia civitas nobilissima, ingeniorumq; optimorum alitrix: quæ diu quidem sub regibus Attalica familia florens, postea Romanorum legibus paruit. Quare Galenus merito ab illa oriundus gloriatur, contra quàm faciunt Normani, qui declinaturi ignominia notam, passim nomē patriæ commutant. Porro patrem habuit divitem, Nicone nomine, Geometram & Architectum insignem, studiisq; philosophicis deditum: qui ob modestiam suam & equitatem, probis omnibus erat semper admirationi. Mater eius fuit pudicissima, admodumq; circa augendam rem familiarem sollicita: adeo tamen iracunda & viperea, ut vel ex levi occasione, mordicus ancillas impeteret: nec minus contumeliosè cum Nicone viro suo contenderet, quàm Xantippe, nequissima quidem illa, cum Socrate: quemadmodum ipsemet Galenus testatur libro de Cognoscendis curandisq; animi affectibus. Fuit autem Galenus usq; ad annum decimum quintum, Arithmeticis, Grammaticis, Logicisq; disciplinis sub Nicone patre institutus: ad quas quidem capeffendas, adeo erat natura promptus, ut vel ex primis illis auspicijs, de se maximam exhiberet expectationem. Dein verò ad philosophiam, se verioraq; promotus Mathematica, audire philosophos optimos quosq; cæpit, qui haberentur Pergami: quorum omnium doctrinam & mores, ut rectè consuleretur filio, explorabat pater, assidue ad illos unà cum eo ventitans. At verò ubi iam annum decimum septimum attigit, evidenti patris insomnio admonitus, studijs Medicinae se dedit, eiq; adeo strenuam navavit operam, ut pauculis quidem annis, facile commilitones omnes, postea verò etiam præceptores suos superaverit. Quem fervorem augerat summa liberalitas patris, largè illi omnia suppeditans, quæ ad studia eius videbantur ex usu fore. Sæpè siquidem ob inopiam & egestatem optima quaq; ingenia elanguescunt, & collabuntur. Nam, ut rectè ille monuit Poëta,

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domi, &c.

Præceptores habuit in philosophicis & medicis musis, primò quidem, Satyrum: dein Pelopem, apud Smyrnam. Post quos Numesiano Corinthi sedulam operam dedit. Caterùm quamvis eorum omnium amantissimus esset, eosq; ceu parentes quosdam summa reverentia observaret, noluit tamen eorum cuiquam addictior esse, quàm veritatis ipsius studiosior. Quocirca nec sectæ ulli se addixit: & ob id sæpè hominum rusticorum iudicium in plurimis esse sequendum monuit, quòd incorruptum esset, ac liberum, utpote ab hæresi nulla occupatum. Postquam verò in Gracia neminem iam haberet, ex quo discere quicquam posset: maximeq; expedire Medico existimaret, varias orbis oras ac regiones lustrare, omnimodaq; hominū temperaturas, ac vires medicamentorum cognoscere, incredibilis tandem incessit illum peregrinandi cupiditas. Quare primò quidem ad Alexandriam se contulit. Quæ in urbe cum aliquandiu hæssisset, totamq; Aegyptum illi adiacentem lustrasset, ad Palestinam Syria, exportandi opobalsami gratia, contendit. Navigavit etiam in Lemnum insulam, necnon in Cyprum, ut ex illa quidem, Sphragidem terram: ex hac autem, Cadmiam, Pompholygem, Diphrygem, aliaq; metallica innumera, in usum Pergamensium adveheret. Aquibus peragationibus iam annos octo & viginti natus, in patriam rediens, omnia medicamenta quæ attulerat, amicis est impertitus, ut de illis periculum facerent. Postea verò ex omni natione curabat

rabat sibi asportari pharmaca exquisitissima, habens suspecta ea omnia, quae ab institoribus venderentur. Cognita igitur summa peritia illius, atq; in curandis agris rara quadam dexteritate, Pontifex Pergamenus Provinciam gladiatores curandi soli ipsi credidit, quum vix annum vigesimum nonum attingeret: quod sanè munus antea iis tantum delegabatur, qui etate, ac longo rerum usu proveci essent. Caterum non diu illic commoratus, quod seditio quadam esset inter Pergamenses oborta, Romam profectus est: ubi ob incomparabilem doctrinam suam & probitatem, fuit statim notus & familiaris totius civitatis primoribus. In primis siquidem Eudemum Peripateticum, magni nominis virum, laborantem quartana triplici, ob pessimè administratam theriacem ab alijs Medicis, iamq; ingravescentem etate, ac media hyeme, restituit, tempestivo usu eiusdem antidoti adhibito: praedixitq; omnia quae evenitura essent: id quod nomen illius, existimationemq; per totam urbem plurimum auxit, sic tamen ut invidia pari etiam gradu cresceret. Postea ad Iusti uxorem vocatus, quae absque manifesta occasione consumebar, ex pulsu eam non modo amare, sed quem deperiret etiam, viro quodam artificio deprehendit. Simili etiam industria divitis cuiusdam servum, non ex morbo, sed metu, quod eorum quae administraverat, pro dignitate reddere rationem non poterat, contabescere agnovit. Restituit etiam Boethi uxorem, diutino fluore muliebri, & quem alij Medici non potuerant cohibere, laborantem. Ob quam quidem sollicitudinem, aureos quadringentos, aequipollentes mille coronatis solaribus, Boethus ad illum misit, ipsumq; per totam urbem summis laudibus extulit.

At verò annum iam tricesimum septimum agens, ubi audivit patriae seditionem sedatam, partim quidem ut suos necessarios inviseret, partim ut Romanorum Medicorum declinaret odia & insidias, simulans se proficisci in Campaniam (ne fortè ab amicis detineretur) reversus Pergamum est. Sed non multò interiecto tempore, à Marco Aurelio & Lucio, Romanis Imperatoribus, revocatus, e nomine ut sequeretur expeditionem, quam instituerant adversus Germanos, Romam invitatus redijt. Quò dum pervenit, multis tandem precibus impetravit à Marco Aurelio Antonino (qui equus, pius, facilis, & clementissimus erat) ut liceret sibi manere Romae, expectareq; illic creditum ipsius Antonini à bello: intelligens nimirum quantopere abhorrerent Musae ab strepitu armorum. Memor autem pravitatis Medicorum atque Philosophorum Romae degentium, quandiu Marcus Aurelius abfuit, apud Commodum, filium illius primogenitum, sese continuit, qui extra urbem educabatur sub Pittholao: cui etiam fuerat ab Imperatore iniunctum, ut si quando puer agrotaret, Galenum accerferet, quò illi ferret manus auxiliatrices. Eo igitur tempore plurimum ocij nactus, varios commentarios conscripsit, ad philosophiam Medicinamq; spectantes. Quum autem interim febre corripereetur Commodus, ex pulsu agnovit faucium inflammationem causam illius extitisse: ac proinde congruis remedijs usus, à phlegmone & febre confestim eum liberavit. Qua ex re Faustina matrimonio Imperatori coniuncta, cepit Galenum ipsum laudibus usque ad sydera evehere, alijsq; omnibus antepone: quae tamen commendatio, apud praecipuos Medicos illum magis exosum reddidit. Sexto etiam, alteri ipsius Imperatoris filio, quum similiter in febriculam incidisset, praedixit crisin, ac tum horam, tum solutionis modum, tum recidivam.

Postea autem, quum reversus ex bello Marcus Aurelius, crederet se aliquando febrire, nec minus Medici qui peregrinationis suae comites fuerant, initium febrilis accessionis illi adesse putarent: ascitus Galenus, iussusq; arteriam contingere, dixit se nihil tale percipere, sed potius à cibo assumpto eius ventriculum opprimi. Quam agnitionem quanti fecerit Imperator, significavit ter repetens, Ita est, ut dicis, Profectò id ipsum, Vt dixisti res habet. Ventriculum igitur fovens nardina, bibensq; Sabinum vinum cum pipere, quemadmodum Galenus suaserat, minimo negotio fuit restitutus, Galenumq; postea magnoperè commendare non desistebat, eum Medicum praestantissimum esse, ac tum virum ingenuum, tum summum philosophum praedicans. Nec verò argumentum vulgare Galeniana doctrina, atque morum integritas est, quòd à Marco Imperatore, omnium qui illum praecesserant, iustissimo simul & sapientissimo, quiq; ob singularem sapientiam suam est nomen Philosophi indeptus, celebratus encomiis fuerit, ascitusq; in suorum Medicorum clientelam. Taceo eundem ipsum Imperatorem, quum singulis diebus uteretur theriace, quam summa fide preparabat illi Demetrius, primarius Medicus, postea vita Demetrio functo, soli credidisse Galeno antidoti ipsius compositionem. Antonino è vivis sublato, successit ei filius Commodus, certè incommodus Romanorum Reipub. utpote iuvenis omni pollutus libidine, omniq; flagitiorum genere obsessus atque contaminatus. Quo quidem imperante cessavit compositio atq; usus theriaces, ut aliorum omnium optimorum institutorum: donec postea Imperator Severus institit Galeno (quem diligebat unicè) ut antidotum rursus ipsam in communem omnium usum conficeret. Quod autem

autem ad Galeni salubritatem pertinet, usque ad annum quidem vicesimum octavum sapius correptus est morbis: reliquum verò ætatis, saluberrima victus ratione usus, sese conservavit sanissimum, ita ut nullum morbum contraxerit, præter febrem ephemeram, in quam aliquando ob labores immodicos incidit.

Fuit autem perpetuò iam inde à pueritia sua, moribus innocentissimis præditus, adeoq; blandus & mitis, ut nunquam propria manu famulos verberavit, ne lapsos quidem: sed tum minis, tum paternis admonitionibus, peccata semper eorum correxerit: irascentis impetum nihil differre ab insania & furore prædicans. In disputando tamen adeò gravis atq; severus extitit, ut nunquam non suis antagonistis pudorem, sibi gloriam maximam conciliavit. Præterea admirandam illam docendi facilitatem, puritatem atq; elegantiam sermonis, sententiarum pondus & altitudinem, creberrimam historiarum atque exemplorum copiam, summum denique dividendi, demonstrandiq; artificium: quibus nimirum omnibus adeò accuratè Naturam rerum expressit, adeò illam oratione exornavit, ut verus interpret eius solus ipse dici mereatur. Fuit porro adeò constans atque inconcussus animo, ut ob nullam fuerit unquam rerum vicissitudinem consternatus: sed fortunam & infortunium, honorem & contumeliam, sanitatem & morbum, pari semper alacritate exceperit. Gloriam & popularem auram sic perpetuò neglexit, ut ne libris quidem suis præscribi suum nomen sit passus. Quippe multitudinis laudem, commodum instrumentum nonnullis viventibus aliquando esse dicebat: mortuis autem, nihil omnino prodesse: imò verò nec viventium quibusdam: quum eis qui plurimum philosophia indulgerent, non parvo impedimento esset apud vulgus fama, id est, videlicet à rebus pulcherrimis plus iusto transversos auferens. Quocirca, ceu divino quodam afflatus numine, vulgarem illam gloriam contempsit, veritatisq; solo studio flagavit, nullam esse nec honestiorem, nec diviniorem possessionem existimans. Tam studiosus autem fuit humana salutis, ut quum vel maximè optaret insignem illam sapientiam atque doctrinam suam facere universis communem, veritus tamen fuerit exprimere, describereque pharmaca deleteria, ne quis fortè pessimus sycophanta in perniciem nostram illis abuteretur. Quo etiam nomine varios modos adulterandi medicamenta, sibi notos suppressit, ne videlicet ansam & occasionem circumveniendi nos imposturis, daret flagitiosis & fraudulentis hominibus: si qui id genus artem in lucro ponerent. Extant eius pietatis amorisq; argumenta complura, in Deos, in parentes, in patriam, in artem ipsam, in universum denique humanum genus. Dei quippe iustitiam, vim, & providentiam agnoscit, suspicit, maximaq; cum reverentia admiratur, quum aliàs, tum præcipuè in commentariis de usu particularum humani corporis, quos tanquam hymnos quosdam, Deo consecravit: hoc esse sacrificium illi acceptissimum censens, non si ei hecatombas, victimasq; offerret quispiam cruentas, aut casiam & thura accenderet, sed si mysteria illius, operaque, primum quidem ipse cognosceret, expendereq; postea verò alijs communicaret: in quorum ignoratione profitebatur summam impietatem consistere. Iam verò parentis sui cum in alijs plerisque locis mentionem honorificentissimam faciat, tum vel maximè in commentario de cognoscendis, curandisq; animi affectibus, illum commendat unice: quod sanè opus, veluti encomiasticum paternarum virtutum est. Patriam autem, concivesq; suos, tanto est prosequutus amore, ut quò eorum usui inserviret, favores Imperatorum, amplissimamq; stipendia neglexerit: idq; merito. Nam quum maiori ex parte nemo sit patria acceptus (sic siquidem natura comparatum hominibus est, ut perigrina quidem & adventitia ingenia admirentur: sua verò, domesticaque, ob familiarem usum, despiciant) Galenum certè Pergamensem tam studiosè colebant, & observabant, ut ipsum & servatorem suum, & Patrem patriæ, omnes communi ore vocarent: neque id iniuria. Siquidem non modò curabat sedulo, ut suorum civium rectè valerent corpora, sed quemadmodum legislator atq; philosophus summus, etiam erat sollicitus, ut eorum animi optimis documentis instituerentur. Quocirca varios commentarios conscripsit, ad excolenda iuventutis ingenia admodum salutare. Conciliavit autem sibi maximè plebis animos, quod medicamentis simplicibus, vulgaribusque, & quæ minimo negotio parari apud quemvis possent, plurimum utens, eorum quos suscipiebat curandos, minimè facultates opprimeret: contra quàm faciunt hac nostra ætate plurimi pharmacorum aggeratores eximij, qui ut admirandam suam illam sapientiam ostentent, adeò miscere sacra profanis assolent, ut quem morbum facile depellere posset interdum radícula unica commodè administrata, eum sæpenumero varia indigestaque, ac longè petita medicamentorum congerie, alant, foveant, adaugeant. Quòd si eger fortè bona quadam fortuna sua, vel Dei potius, quàm pharmaci, beneficio, aliquando ab affectu recuperetur, necessum haud dubiè est, si tenuioris fortunæ is sit, in alium rursus morbum, priori longè graviolem, incidat: videlicet egestatem extremam: quum nimirum pro
tot gen.

tot gemmis & margaritis, vel (quod plerunque contingit) calculis ex fluente aliquo allatis, satisfacere pharmacopola urgenti non possit: ac proinde si quid reliquum illi suppellectilis fuit, totum id exponatur sub hasta, cogaturq; tandem miser, exosam habens vitam medicinam, & medicos, in angustiam maximā rei familiaris adactus, unā cum uxore & liberis, fame acerbissima contabescere: cui quidem prastitisset longē, si servatus non fuisset. At Galenus noster, id genus aromataris, institoribusque non indigebat: quippe qui propria manu singula medicamenta conficeret, confectaq; officiosissime semper agris administraret: in egenos interrim non exiguam suarum facultatum portionem erogans artemq; ipsam, non avaritia ductus, aut quapiam cupiditate, sed propter solam virtutem, piē simul & religiosē exercens. Fuit autem erga agros semper moribus placidissimis preditus, quibus adeo illos exhilarabat, ut vel solo sermone videretur eos restituere. Quae sanē gratia & venustas maximē desideratur in Medicis. Sunt quippe nonnulli etiam in aulis Principum, adeo tetrico aspectu, fastidiendoque, ut ex quartana simplici duplisem suo accessu reddant, soloq; visu, Basiliscorum instar, interimant. Nec verō cuiquam pharmacum admovit aut propinavit Galenus, cuius prius in seipso non fecisset periculum. Quae omnia reddiderunt illum semper adeo inculpabilem, ut calumnia in ipsum moliri nihil unquam potuerit. Scripsit autem Attico sermone & purissimo permulta opera & varia, non ad artem Medicam tantum, sed etiam ad Philosophiam, Grammaticen, Rhetoricen, Mathematicen, atque Geometriam pertinentia: quorum non contemnenda pars, dum templum Pacis, simulq; omnes Bibliothecae Palatii, olim conflagraverunt incendio (o iacturam irreparabilem) nobis intercidere. Quae verō extant, atque inter eruditorum manus versantur, non secus suspiciuntur ab universis, quibus mens falsis dogmatis corrupta & depravata non est, ac si planē divina oracula sint, ex tripode pronunciata. Nam qui in sophistarū scholis sunt alii, nugisq; & paralogismis referti, ijs certē nec placet, nec prodesse vera Galeni doctrina potest. Siquidem quemadmodum corpora impura, quō magis quispiam solido alimento nutrierit, eō magis laeserit: sic animum opinionibus pravis imbutum, nisi prius ab eis expurgetur, ne Musa quidem ipsa recta docere possint: id quod fuisse in causa videtur, ut Galenus semper in operibus suis, primō quidem exterminaret iniqua dogmata, postea verō ipsam veritatem tradiderit: optimi agricolae exemplo, qui prius quā terra sua semina mandet, spinas, herbas, segetes, radicesq; omnes evellit, omniaq; breviter quae possint tritici germinationem extinguere. Fuit autem tam acris & vehemens in refellendis aliorum tam Medicorum, quā Philosophorum erratis, tantūque valuit suadela, ut eorum quos persequutus est, universa scripta perierint. Hippocratem verō ita semper & reveretur & colit, ut passim eum & prudentissimum, & sapientissimum senem, summūque Medicinae parentem, autoremq; & largitorem bonorum omnium institutorum, predicet. Caterū quemadmodum Traianus olim omnes Italiae vias inaccessas, praeputasq; aut rupibus in vias, refecit, instauravitq;, quō facilius pervadi possent: sic etiam fatetur se non quidem artem condere (quam laudem tamen iurē sibi vendicare potuisset) sed iam ab Hippocrate inventam, incultam tamen & asperam, explanare, ut ab omnibus intelligi ac percipi queat. Vixit sub Marco Aurelio Antonino, Commodō, Lucio, & Severo, Caesaribus. Praecipue tamen Marco Aurelio Antonino fuit summa familiaritate coniunctus. Quo extincto, tametsi postea esset Severo Imperatori acceptissimus, detineri tamen diu apud urbem Romam non potuit, quō minus in dulcissimam sibi patriam reverteretur. In qua quidem iam factus septuagenarius, imperanteq; eodem Severo, requievit, magnam apud homines gloriam consecutus: maiorem etiam apud Deum habiturus, si CHRISTI institutis, cuius semel atq; iterum meminit, credere atq; obsecundare voluisset.

Sunt tamen qui Galenum tradant vixisse annos CXL. Siquidem Ludovicus Calius, lectionum antiquarum lib. x. vi. sic ait: Galenum Philosophum & Medicum singularem, cuius scientissima & plurima extant ingenij monumenta, quae geminam sapiunt eruditionem, memoria proditum à nonnullis est, CXL. vixisse annos, tantaq; in cibo & potu abstinencia usum, ut ad satietatem nunquam comederit, biberitve, nec crudum quicquam gustarit. Unde sit factum, ut odoriferum semper anhelitum spiraret: sed, quod longē apud me mirabilius est, citra ullam omnino affectionem, sola defecerit senectute, quod est in humanis rarissimum.

Magis tamen testimonio Suida acquiescendum est, qui sic de Galeno pronunciat: Γαλῆνος ὁ διασημότερος ἰατρός Περγαμῶος γεγονώς, ἐπὶ Μαρκοῦ καὶ Κομμόδε, καὶ Σεπτιμίου τῶν Καισαρέων ἐν Ρώμῃ, υἱὸς Νίκων καὶ Γεωμέτερος, καὶ Ἀρχιτέκτονος, πολλὰ συντεταχώς ἰατρικὰ τε καὶ φιλόσοφα, ἐπὶ Γραμματικῇ καὶ Ρητορικῇ, ἅπαντα διὰ τὸ πᾶσιν εἶναι γνώριμα, καταλέγειν ἀκαίρον ἡγήσαμην ἐν τῷ παρόντι. Εἰς ὃ ἐπὶ ο. σημαίνει ὅτι τὸν ἡσύχιον. Quae sonant: Galenus Medicus celeberrimus,

leberrimus, Pergaminatus, Marci, Commodi, & Pertinacis temporibus, vixit Roma. Patrem habuit Niconem, Geometram, Architectumq. Plurima non in arte Medica tantum, sed in Philosophia etiam, condidit: imò verò & in Grammaticis, Rhetoricisq. Quae quidem quòd omnibus obvia & notissima sint, non videtur mihi operae precium ut recitentur impraesentiarum. Vixit annos LXX. Porro hac vox Galenus, tranquillum, serenumq. significat.

VITÆ GALENI FINIS.



WILLIAM L. GALT

